

LOUIS VIDAL


---

DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES

---

1943

OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE  
PARIS





~~83218~~

P 11247-1993

LOUIS VIDAL

83218

DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES

2<sup>e</sup> éd.

1943

*Encl. au*


83218



OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

11, rue Quentin-Bauchart, PARIS (VIII<sup>e</sup>)

*Aug 27/543*



Cet ouvrage est distribué par les soins de :

**OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE**

===== **SIÈGE SOCIAL :** =====

11, rue Quentin-Bauchart, Paris (VIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Élysées 90-91.

**AGENCE DE LYON :**

8, rue des Marronniers,

Tél. : Franklin 39-83.

**OFFICE BELGE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE**

47-51-55-57, rue François-Bossaerts, Bruxelles.

===== Tél. : 15-79-05. =====



## AU CORPS MÉDICAL

---

Trois années... Trois années écoulées, combien longues et lourdes, depuis que nous vous avons envoyé notre dernier *bouquin rouge* !

Bien à contre-cœur, nous avons arrêté sa publication en 1941 et en 1942, mais nous y fûmes amenés par l'impossibilité de toucher effectivement nos fidèles usagers dispersés par l'exode, le changement de résidence, la ruine de leur foyer ou retenus prisonniers. D'autre part, le nombre de spécialités nouvelles était relativement faible et diminuait l'intérêt d'une réédition.

Depuis, les circonstances se sont modifiées. Peu à peu, notre fichier médical a été remis à jour, de nouvelles spécialités ont été créées (sulfamides par exemple). Quelques Laboratoires, par suite de la crise aiguë des matières premières, sont tombés en léthargie et attendent des jours meilleurs pour reprendre leur activité ; certains souffrent des restrictions et ne peuvent répondre aux demandes que partiellement ; quelques-uns, continuant leur fabrication,

voient, pour des causes difficilement explicables, leur production se raréfier sur le marché ; un assez grand nombre, heureusement, parviennent encore à assurer les besoins sans défaillance. Il importait que le Corps Médical fût mis au courant de la situation et que les milliers d'exemplaires du *Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques* dispersés dans la tourmente fussent remplacés à ceux auxquels ils font tant défaut.

Enfin, nous voulions joindre notre contribution de travail à l'effort général, si nécessaire au redressement de notre pays.

Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus au bout de notre chemin. Les difficultés de communication entre les deux zones ont souvent rendu difficile la liaison avec les Laboratoires de la zone libre.

La pénurie de papier ne nous a pas permis d'utiliser une matière aussi belle et aussi soignée qu'autrefois ; le format a dû être modifié, et le tirage limité.

Les circonstances matérielles interdisent de servir un certain nombre de Médecins, comme ceux de Belgique, d'Afrique du Nord et des Colonies.

Il nous est pénible d'effectuer une sorte de recul sur le passé, mais nous faisons ce que nous pouvons, le mieux que nous pouvons, persuadés que vous le comprenez et ne nous tiendrez pas rigueur des petites imperfections de la XXII<sup>e</sup> édition du *Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques*. Nous ne voulons retenir que les nombreux encouragements que vous nous avez donnés pour persévérer dans notre effort.

Il y a peu de chances pour que nous puissions faire paraître une édition en 1944, et nous ne savons pas quand nous pourrions entrevoir la mise au point de la prochaine. Soyez donc ménager de cet exemplaire, qui ne pourra peut-être pas — contre notre volonté — vous être renouvelé d'ici longtemps.

Cependant, nous ferons toujours tout ce qui sera en notre pouvoir pour conserver la liaison entre le Corps Médical et les Laboratoires. Nous restons entièrement à votre disposition pour tout service d'ordre médico-pharmaceutique que nous pouvons vous rendre ; notre courrier quotidien est important, nous ne demandons qu'à l'augmenter.

Si les circonstances ont amené la fermeture de nos agences de Marseille, Lille, Bordeaux, nous avons conservé celle de Lyon, dont la compétence s'est étendue à toute la zone libre. Vous

pourrez donc toujours nous écrire aux adresses suivantes :

Pour la zone occupée, à notre Siège social :

OFFICE  
DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE  
11, rue Quentin-Bauchart, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Pour la zone libre, à notre Agence :

8, rue des Marronniers, LYON (Rhône).

D'autre part, nos visiteurs continuent auprès de vous leur besogne de documentation. Moins nombreux qu'autrefois (cinq des leurs sont tombés au champ d'honneur, une trentaine furent faits prisonniers), ils vous présentent toujours les Spécialités Pharmaceutiques dont ils ont la charge. Ces lourdes pertes, dans un corps d'agents sélectionnés et éduqués pour une fonction aussi spécialisée, sont difficilement réparables. Vous qui connaissez les qualités requises (présentation, tact, intelligence, instruction) aidez-nous à reconstituer notre effectif en nous adressant vos protégés, qui seront toujours comme de tout temps, accueillis avec bienveillance et incorporés dans la mesure du possible.

Pour terminer, en vous remerciant de l'appui que vous nous avez toujours consenti et des encouragements que vous nous avez prodigués nous sommes heureux de vous offrir, cette année encore, notre ouvrage, compagnon fidèle de votre labeur de chaque jour.

Louis VIDAL.



*Première Partie*

---

# DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques doit son excellente réputation au soin apporté à sa rédaction. Sa composition est cependant si complexe qu'une erreur a pu s'y glisser. Il va sans dire que nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en résulter.

## ACÉCOLINE

**Chlorure d'acétylcholine en solution anhydre et stable.**

Boîtes de 3 et de 8 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cg.

**Propriétés.** — L'Acécoline dilate les artères de la périphérie, résout les spasmes vasculaires et régularise la circulation périphérique. Elle renforce, en outre, puissamment le tonus des muscles lisses et rééquilibre le système neuro-végétatif.

L'Acécoline est parfaitement tolérée, elle n'a pas de contre-indication.

### Indications et posologie :

- 1° *Affections artérielles périphériques* : Artérites chroniques, syndrome de Raynaud : 20 à 60 cg. par jour ;
- 2° *Affections veineuses périphériques* : Ulcères variqueux, 10 cg. par jour ; Phlébites, 10 à 40 cg. par jour ;
- 3° *Affections vasculaires générales* : Hypertension artérielle, angine de poitrine : 10 à 20 cg. par jour.
- 4° *Affections neurologiques* : Ramollissement cérébral, 20 à 40 cg. par jour ; troubles de la ponction lombaire, 20 cg. ; sciatique, 20 cg. par jour ;
- 5° *Indications ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques* : Spasmes de l'artère centrale de la rétine, 20 à 40 cg. par jour ; Glaucome, 20 cg. par jour. Vertiges labyrinthiques, Bourdonnements d'oreilles, Ozène, 10 à 20 cg. par jour ;
- 6° *Indications gastro-entérologiques* : Hypochlorhydrie, Hyperchlorhydrie, 20 à 40 cg. par jour. Atonie vésiculaire, 10 à 20 cg. par jour ;
- 7° *Indications phthisiologiques* : Sueurs profuses des tuberculeux, 2 à 4 cg. par jour.

Injectons intramusculaires.

*L'Acécoline ne doit pas être prescrite en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées.*

Boîtes de 3 amp. à 10 cg. : 14 fr. ; 8 amp. : 35 fr. 20.  
Boîtes de 3 amp. à 20 cg. : 17 fr. 60 ; 8 amp. : 46 fr. 90.

**Laboratoires LEMATTE et BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — Paris.)

## ACÉCOLINE-PAPAVÉRINE

### Composition :

	Pour 1 ampoule de 2 cc.	
Chlorure d'acétylcholine.....	0 g. 10	0 g. 20
Phénylglycolate de papavérine.....	0 g. 05	0 g. 05

Boîtes de 3 et de 8 ampoules pour chacune de ces deux formules.

Bien préciser, en Acécoline, le dosage prescrit (10 ou 20 cg.).

**Propriétés.** — L'Acécoline dilate les artères par voie nerveuse en excitant le parasymphatique.

Le phénylglycolate de papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel. Il en provoque le relâchement et s'oppose ainsi à toutes les excitations spasmodiques réflexes.

De l'association de ces deux actions, nerveuse et musculaire, résulte une artério-dilatation maximum, propriété essentielle de l'Acécoline-Papavérine.

Il en résulte, en outre, un renforcement et une prolongation du pouvoir hypotenseur de l'Acécoline.

### Indications médicales

- 1° *Artérites des membres, claudication intermittente* : 1 à 3 ampoules à 20 cg. par jour ;
- 2° *Spasmes des artères rétinienes*, 1 à 3 ampoules à 20 cg. quotidienne-ment ;
- 3° *Migraines ophtalmiques* : 1 ampoule à 10 ou 20 cg. ;
- 4° *Hypertension artérielle, migraines rebelles* : 1 à 2 ampoules à 10 cg.
- 5° *Ramollissement, épilepsie* : 1 à 3 ampoules à 20 cg. dans les accidents graves. Dans l'état de mal épileptique, injection intraveineuse d'une ampoule à 10 cg. ;
- 6° *Angine de poitrine* : 1 ou 2 ampoules à 10 cg. par jour.

### Indications chirurgicales.

- 1° *Gangrènes par artérites* : 1 à 4 ampoules à 20 cg. par jour ;
- 2° *Embolies artérielles* : 1 à 4 ampoules à 20 cg. par 24 heures.  
Injectons intramusculaires.

*L'Acécoline-Papavérine ne doit pas être prescrite en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées.*

Boîtes de 3 ampoules à 10 cg. : 15 fr. 20 ; à 20 cg. : 18 fr. 70.  
Boîtes de 8 ampoules à 10 cg. : 37 fr. 50 ; à 20 cg. : 49 fr. 20.

**Laboratoires LEMATTE et BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — Paris.)



## ACÉCOLINE-SPARTÉINE

### Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque.

Chl. d'Acétylcholine.....	0 g. 10
Spartéine (Sulfate) .....	0 g. 05

*Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.*

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour.

Boîtes de 3 ampoules : 14 fr. 60 ; de 8 ampoules : 36 fr. 30.

## ACÉCOLINE-CAMPHRE

### Vaso-dilatateur et Eupnéique.

Chl. d'Acétylcholine.....	0 g. 10
Camphre .....	0 g. 20

*Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hypertendus.*

**Posologie.** — 1 ampoule matin et soir.

Boîtes de 3 ampoules : 14 fr. 60 ; de 8 ampoules : 36 fr. 30.

## ACÉCOLINE-YOHIMBINE

### Hypotenseur et Sympathicolitique.

Chl. d'Acétylcholine.....	0 g. 10
Yohimbine .....	0 g. 01

*Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions paroxystiques.*

**Contre-indications.** — Ramollissement cérébral et spasmes des artères rétinienne.

**Posologie.** — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules dans les cas d'urgence.

Boîtes de 3 ampoules : 14 fr. 60 ; de 8 ampoules : 36 fr. 30.

*Les associations thérapeutiques de l'Acécoline ne doivent pas être prescrites en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées.*

## ACÉCOLEX

### Pâte trophique à l'Acécoline.

*Traitement des Ulcères variqueux, des Plaies atones et des Dermatoses Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de zinc, de titane, etc.) Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.*

Le tube de 35 g. : 20 francs.

**Laboratoires LEMATTE et BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — Paris.)

## ACÉRYL

**Composition.** — Extrait fluide concentré sucré et aromatisé, contenant les principes actifs du trèfle d'eau, du pissenlit, du maïs, de l'épine-vinette, de la benoîte, associés aux principes aromatiques de la verveine, de l'angelique et de l'écorce d'orange amère.

**Propriétés et indications.** — Médication apéritive et stimulante du foie et de l'estomac. — Spécifique de l'anorexie. — Uniquement à base de plantes. — Aucun produit chimique. — Aucun produit toxique.

**Posologie et mode d'emploi.** — Aucune contre-indication. Une cuillerée à café dans un 1/2 verre d'eau trois fois par jour, un quart d'heure avant chaque repas. *Enfants* : demi-dose.

**Prix** : 24 francs le flacon de 125 cc. représentant 8 à 10 jours de traitement.

**Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE**

**J. BLANCHARD**

PONT-DE-VAUX (Ain).

(Tél. : 86.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1195-1.

## ACÉSINE GUILLAUMIN

**Composition.** — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétole et de stovaine.

**Propriétés.** — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

**Indications.** — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

**Mode d'emploi.** — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS. (Tél. : Littré 26-92.)

## ACÉTAMONE

Préparation à base d'acétate d'ammoniaque stabilisé chimiquement pur.

**Composition.** — Présenté dans une solution de pH optimum assurant une conservation indéfinie.

Une cuillerée à soupe = 1 gr. d'acétate d'ammoniaque stabilisé.

**Propriétés.** — Stimulant diffusible le plus énergique et le plus inoffensif, diaphorétique, tonique, anti-infectieux.

**Indications.** — Toutes les *maladies fébriles*. — *Maladies infectieuses* : grippe, rougeole, rubéole, varicelle, oreillons, scarlatine, etc. — *Les affections aiguës de l'appareil respiratoire* : angine, trachéite, bronchite, congestion pulmonaire, broncho-pneumonie, pneumonie. — *Les affections cardiaques* : myocardites, collapsus.

**Présentation et prix.** — Flacon de 150 cc. : prix 16 fr. 80.

### Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 3 à 8 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 3 à 8 cuill. à dessert par jour suivant l'âge.

Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café par jour à prendre pur ou dans un liquide tiède.

### Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD

Pharmacien, Docteur ès sciences.

Ancien chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris  
40, rue de Bellechasse, Paris (VII<sup>e</sup>). Tél. : Inv. 78-44.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 111-10.

## ACÉTO-STÉRANDRYL

Acétate de testostérone.

**Composition.** — Hormone testiculaire estérifiée de synthèse, cristallisée, chimiquement pure.

**Indications.** — Titrage à 10 mgr. : thérapeutique féminine ;  
Titrage à 40 mgr. : prostatisme.

**Présentation.** — Solution huileuse injectable d'acétate de testostérone, en ampoules de 1 cc. dosées à 10 et 40 mgr.

**Posologie :** Mastopathies : 40 à 80 mgr. par cycle menstruel.  
Métrorragies : 10 mgr. par jour jusqu'à cessation (50 mgr. par cycle menstruel pour la prévention).

Rétention urinaire complète : 40 mgr. par jour pendant 10 jours.

(Consulter les monographies éditées par le « Département scientifique » des Laboratoires Roussel.)

### Prix au public :

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 10 mgr. .... 75 fr.

La boîte de 1 ampoule de 1 cc. à 40 mgr. .... 60 fr.

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 mgr. .... 275 fr.

### Les Laboratoires du Dr ROUSSEL

LABORATOIRES FRANÇAIS

DE CHIMIOTHÉRAPIE

S. A. au cap. de 10.000.000. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 58-43.)

## ACÉTUMINE MERCIER

*Spécifique de toutes les affections cutanées.*

**Composition.** — Complexe de sulfate d'alumine, d'acide acétique, d'acide citrique.

**Propriétés.** — Combinaison aisément dissociable, dans laquelle les propriétés respectives de chacun des composants demeurent entières. Antiseptique cicatrisant, non toxique, non caustique, d'odeur agréable, solution incolore, pommade non grasse ne tachant pas.

**Indications.** — Plaies, brûlures, contusions, boutons, crevasses, eczéma, ulcères, prurits, maux de gorge, enrouement, gingivites, hémorragies, vaginites, métrites.

**Présentation.** — Solution, pommade, pastilles, gargarisme sec, ovules.

**Prix :** Flacon ..... 9 fr. 50

Tube ..... 9 fr.

Pastilles ..... 6 fr. 50

Ovules ..... 19 fr.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1051-2.

### Laboratoires MERCIER

41, route de Turin — NICE

## ACÉTYLARSAN

4 oxy — 3 acétylamino — phényl — 1 arsinate de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien tolérée. Toxicité réduite.

**Indications.** — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanées ou intramusculaires.

**Présentations et posologie.** — *Acétylarsan pour adultes :* solution à 23,6 p. 100, 1 cm<sup>3</sup>. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cm<sup>3</sup>. (Boîtes de 10.)

*Acétylarsan infantile :* solution à 9,4 p. 100, 1 cm<sup>3</sup>. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cm<sup>3</sup>. (Boîtes de 10.)  
Injections hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter la Notice spéciale).

Prix de vente :

A. Pour adultes : 41 francs.

A. Infantile : 27 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)



## ACIDOFÇO

Traitement des colibacillooses et des intoxications d'origine intestinale.

**Composition.** — ACIDOFÇO est une culture pure de *Lactobacillus acidophilus*, seul ferment lactique capable de s'adapter à l'intestin humain. Cette culture est réalisée à 37° en lait OFÇO, provenant d'étables soumises au Contrôle officiel (décret du 15-11-27).

**Indications.** — Tous états toxiques de l'intestin, colibacillooses, embarras gastriques, entérites, troubles hépatiques, migraine, anxiété, découragement, dermatoses, etc.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 4 comprimés par jour à n'importe quel moment, de préférence à jeun ou loin des repas.

*Enfants* : 1 à 3 comprimés par jour.

*Nourrissons* : 1/2 à 2 comprimés.

**Prix** : la boîte de 30 comprimés, 19 francs (Seine), 0 fr. 70 en sus (province).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1833.

**Laboratoire ACIDOFÇO**

25, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

## ACIDOL-PEPSINE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Chlorhydrate de bétaine et pepsine.

(Un comprimé contient 0 gr. 10 de pepsine et 0 gr. 40 d'Acidol correspondant à 8 gouttes d'acide chlorhydrique dilué.)

**Propriétés et indications.** — Préparation de goût agréable, d'activité constante et de bonne conservation.

Hypochlorhydrie, Dyspepsie, Anorexie, Diarrhée chronique liée à l'Hypochlorhydrie.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés dissous dans 1/2 verre d'eau à prendre pendant ou après les repas.

**Présentation.** — Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50 (acidité normale).

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

**Forme.** — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

**Formule.** — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; Extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de Lobelia, 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dover, 0,06 pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

**Indications.** — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-1.

**Laboratoire HOCQUETTE**

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III<sup>e</sup>)  
(Tél. : Arc. 47-13.)

## ACOLITOL

Topique Intestinal.

**Composition.** — Charbon organique pur, charbon activé, carbonate de calcium amorphe, salicylate de bismuth, peroxyde de magnésium, belladone pulvérisée titrée (0,01 par dose).

**Présentation.** — Granulé fondant et poudre.

**Propriétés.** — Topique intestinal de choix, neutralisant, fixateur et sédatif. Entrave les processus inflammatoires. Ramène à la normale le chimisme de l'intestin, en régularise le péristaltisme. Empêche les fermentations anormales. Adsorbe les toxines microbiennes endogènes ou exogènes. Modifie la flore protéolytique.

**Indications.** — Colites, gastro-entérites, entéro-colites, fermentations, intoxications et auto-intoxications, infections intestinales, dysenterie, entérite des tuberculeux, colibacillose.

**Posologie.** — Une cuillerée à entremets croquée ou délayée dans un demi-verre d'eau le matin à jeun, et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

**LANCOSME**, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Élysées 17-46.)

## ACONITINE HOUDÉ

Granules titrés à 1/10<sup>e</sup> de milligramme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action analgésique, puis anesthésique, *élective*, sur les noyaux sensitifs bulbo-spinaux (Nerfs de la face, *trijumeau*).

**Indications.** — Médication *spécifique* des *névralgies faciales graves ou rebelles*. Très efficace dans certaines *sciatiques*.

**Présentation.** — Granules titrés à 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Nitrate d'aconitine (alcaloïde de l'*Aconitum Napellus*).

**Posologie.** — Produit très actif à petite dose. Débuter par un granule (dépistage des intolérances). Augmenter jusqu'à 5 granules *pro die* par doses réfractées. Limite maxima : 10 granules (1 milligramme). Contre-indication : Insuffisance cardiaque ou rénale.

### Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X). (Tél. : Nord 40-58.)

## ACOQTOL-MIALHE

Gouttes à base de Chloro-Bromo-Méthane.

**Spécifique de la Coqueluche,  
des toux spasmodiques et Coqueluchoïdes.  
Calme la toux des bronchites chroniques.**

Aucune toxicité, goût agréable.

**Doses.** — Les gouttes seront toujours prises dans un demi-verre d'eau :

De 6 mois à 2 ans : XV gouttes 2 à 3 fois par jour.

De 2 ans à 5 ans : XV gouttes 3 à 8 fois par jour.

De 5 ans à 15 ans : XXV gouttes 4 à 8 fois par jour.

*Adultes* : L. gouttes 4 à 8 fois par jour.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

L. N. C. M. n° 417.

Prix : 18 fr. 40.

Conservation indéfinie.

N. B. — *Acoqtol* existe aussi sous forme sirop, demander échantillons et littératures aux laboratoires Mialhe.

### Laboratoires MIALHE,

8, rue Favart — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

## ACTINE

Reconstituant physiologique.

### Composition :

Ergostérine irradiée, Phosphate de chaux,  
Foie, Lait, Cacao, Sucre.

### Indications :

Rachitisme, troubles de croissance, déminéralisation, dentition, gestation, ostéomalacie, allaitement, anémie, chlorose, asthénie, prétuberculose, convalescence, surmenage.

### Présentation :

Poudre, ampoules buvables et tablettes.

### Mode d'emploi :

*Poudre* : 2 à 4 cuillerées à café à diluer dans eau tiède.

*Ampoules* : 1 ampoule par jour.

*Tablettes* : 1 à 2 tablettes par jour.

### Laboratoire Biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

## ACTIPHOS

Solution stable et équilibrée de phosphates diacides à bases alcalines, alcalino-terreuses et métalliques.

**Propriétés.** — Correcteur du déséquilibre acido-basique humoral. Acidifiant sans altération de la réserve alcaline. Recalcifiant et reminéralisant. Anticolibacillaire. Puissant tonique musculaire, nerveux, cérébral et génital.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 3 cc.  
La boîte de 14 ampoules..... 28 fr. 20  
Le coffret de 30 ampoules..... 52 fr. 80

### Posologie :

*Adultes* : 2 à 4 ampoules par jour,

*Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour,

diluées dans un grand verre d'eau et absorbées par petites gorgées au cours des repas.

**Indications.** — Alcalose. Décalcifications (fractures, rachitisme, caries dentaires). Déminéralisation de la grosse et de l'allaitement. Infections cutanées ou urinaires (colibacillose). Vagotonie. Dépression physique ou intellectuelle. Insuffisance génitale. Rhumatisme. Maladies allergiques. Troubles de l'hémostase.

Pas de contre-indication.

Aucune action irritante sur les voies digestives.

### Laboratoire ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 fr.

Louis FERRAND,

Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris,  
Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, avenue Marceau —  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élys. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch —  
AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

## ACTIVAROL

Tonique général biologique  
en ampoules buvables.

**Composition.** — Ensemble de bio-catalyseurs spécialement sélectionnés pour dynamiser l'organisme dans toutes ses fonctions :

Extrait de foie : antianémique et reconstituant.

Vitamine C : l'« amine vitale » par excellence.

Glycocolle : régénérateur musculaire.

Extrait cortico-cérébral : stimulant de l'activité cérébrale.

Hématoporphyrine : stimulant des fonctions végétatives et du psychisme.

L'ACTIVAROL ne renferme aucun excitant artificiel, tel que la strychnine ou l'arsenic.

**Indications.** — Tous états de dépression physique, intellectuelle ou psychique : Débilité, asthénie, convalescence, surmenage, neurasthénie, etc..

Aucune contre-indication.

**Présentation.** — Ampoules de 10 cc.  
Boîtes de 8 ampoules.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 ampoules par jour.

*Enfants* : 1 ampoule par jour au-dessus de 6 ans.

**Mode d'emploi.** — A prendre dans un peu d'eau aux repas.

### Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)



## ADALINE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Bromodiéthyl-acétylcarbamide.

**Propriétés et indications.** — Sédatif et hypnotique bromé d'une innocuité absolue.

Etats anxieux, Neurasthénie, Troubles nerveux et psychiques de la vie génitale et de la ménopause, Troubles cardio-vasculaires, Insomnie liée à l'anxiété et aux états fébriles.

**Posologie.** — *Comme sédatif :*

1/2 à 1 comprimé dans un peu d'eau plusieurs fois par jour, si besoin.

*Comme hypnotique :*

1 à 2 comprimés dans une infusion chaude, 1/2 heure avant le coucher.

**Présentation.** — Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## ADÉNOSEPTYL

**Solution pour instillations et pulvérisations nasales.**

**Formule :**

Argent colloïdal.....	0,30
Protéinate d'argent.....	0,30
Vitellinate d'argent.....	0,30
Solut. Adrenaline au 1/1 000 <sup>e</sup> ....	1
Essence de Niaouli.....	0,016
Eucalyptol.....	0,016
Camphre.....	0,02
Excip. Glycéro-Hydro-Alcool.....	98,05

**Indications.** — Toutes les Affections du nez et de la gorge, Sinusites, Adénoïdites, Laryngo-trachéites, Etat grippal, etc.

*Détérge la muqueuse sans l'irriter.*

**Mode d'emploi.** — En instillations, à l'aide du compte-gouttes spécial ou en pulvérisations.

**Prix au public :** 19 francs.

Enregistré au Laborat. Nat. de Contr. sous le n° 884-3.

**ASSOCIATION TECHNIQUE  
PHARMACEUTIQUE**

T. VINCENT, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Action thérapeutique.** — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

**Avantages.** — Etalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

**Posologie.** — XL gouttes ou 4 granules ou un suppositoire = 1 cm<sup>3</sup> d'une solution à 5 p. 1.000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Modes d'emploi.** — Par voie buccale : XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules. 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Par voie rectale : 1 suppositoire une à trois fois par jour.

### Adoverne « Roche »

**Gouttes** (flacon de 15 cm<sup>3</sup>).

**Granules** (flacon de 60).

**Suppositoires** (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n° 504-2 (gouttes), 504-3 (granules), 504-64 (suppositoires).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## ADRÉNALINE CHOAY

**Chlorhydrate d'Adrénaline physiologique.**

**Nature.** — Principe hypertenseur, vasoconstricteur et cardiotonique extrait des capsules surrenales (Adrénaline naturelle).

**Indications:**

**Applications locales:** Hémostase, Anesthésie locale (fixation de l'anesthésique).

**Injections hypodermiques:**

Hypotension. Etat de shock. Crises nitritoïdes.

Asthme essentiel.

**Par la bouche:** Peu active. Préférer l'opothérapie surrenale totale.

**Formes pharmaceutiques:**

**Flacons** de 15 cc. de solution au 1/1000°.

(Vingt gouttes représentent 1 cc. de solution, soit un mgr. de chlorhydrate d'adrénaline.)

**Ampoules** de solution au 1/1000° (1 cc. = 1 mgr.).

**Laboratoire CHOAY**

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

(Tél.: Auteuil 44-09 et 44-10.)

## ADRÉNALINE CLIN

Lévogyre, pouvoir rotatoire: — 53°,3.

*Maximum de pureté et d'efficacité.*

Propriétés vasoconstrictives et hypertensives.

Excitation du système nerveux sympathique.

**Formes.** — Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate) à 1/1000.

XX gouttes = 1 cc. = un milligramme.

Flacons de 5, 10 et 30 cc.

**Ampoules** d'Adrénaline Clin injectables, dosées à 1/10, 1/4, 1/2 et 1 mgr. par cc.

**Granules** d'Adrénaline Clin dosés à 1/4, 1/2 et 1 milligramme.

**Suppositoires** d'Adrénaline Clin dosés à 1/2 milligramme.

**Collyres** d'Adrénaline Clin en ampoule compte-gouttes de 10 cc.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V°).

## ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au contrôle le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

**Indications.** — Rachistisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

**Formes.** — Solution au millième, flacons de 5 gr., 10 gr. et 30 grammes.

**Pharmacie Centrale de France**

379, avenue Président-Wilson,

La Plaine-Saint-Denis (Seine).

(Tél.: Plaine 16-70.)

## ADRÉNARGOL

**Composition.** — Adrénaline physiologique associée aux sels d'Argent: protéinate d'Argent et vitellinate d'Argent, en solution aqueuse, isotonique et stérile.

**Avantages.** — Bactéricide stable et énergique. Action rapide. Tolérance parfaite.

**Présentation.** — Ampoule nasale scellée très pratique à l'emploi. Olive compte-gouttes stérilisable.

**Indications.** — Infections du Rhino-Pharynx (Sinusites, Coryzas, Angines, etc.); Antisepsie des Voies respiratoires, de l'Œil, de l'Oreille; Prophylaxie des maladies contagieuses (Grippe, Coqueluche, Rougeole, etc.).

**Posologie.** — Rhinologie: IV à V gouttes dans chaque narine, matin et soir, plus souvent si nécessaire.

Otologie: quelques gouttes dans l'oreille malade, 2 à 3 fois par jour.

Oculistique: introduire 2 fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Durée du traitement: 15 à 25 jours.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## ADRÉNOÏDES BÉRAL

**Comprimés** pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

**Composition.** — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter. » (*Bulletin Société Biologie*, mai 1922.)

**Mode d'emploi.** — Laisser fondre les Adrénoïdes dans la bouche. « Ce serait perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

**Posologie.** — Un Adrénoïde toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Tous états de dépression organique et circulatoire.

**Formuler :** Adrénoïdes Béral. Une boîte : 16 fr. 40

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ADRÉNOLÉINE

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile adrénalinée au millième, avec addition de chlorotone, orthoforme et essences antiseptiques. (Flacon de 20 grammes.)

**Propriétés.** — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique des voies respiratoires.

**Avantages.** — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée* d'action est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

**Indications thérapeutiques.** — Sinusites, Hémorragies nasales, Catarrhe nasal, Troubles respiratoires et Coryza de l'enfance, Adénoidites aiguës.

L'Adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine), 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique (type Vaast grand modèle), avant les inhalations.

**Prescription.** — Un Flacon Adrénoléine Falvy.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences, Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.  
40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## ADRÉPATINE

**Composition.** — Association pluriglandulaire : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate. — Extraits végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamélis. — Excipient antiseptique et calmant.

**Propriétés et indications.** — L'ADREPATINE est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits pluriglandulaires englobés ;
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3° Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique, est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroides. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des hémorroides internes et externes, des Rectites, Prostatites, du prurit anal et des fistules.

**Formes.** — Suppositoires et pommade.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de pommade est muni d'une canule rectale.

**Durée moyenne des unités de vente :** 12 à 15 jours.

Prix de vente {	Boîte de 15 suppositoires.....	16 fr. 80
au public {	Tube de pommade avec canule rectale ...	16 fr. 80

**Laboratoires LALEUF**

**Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.**

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). — (Trocadéro : 62-24.)

## ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

**Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.**

**Composition.** — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Éphédrine Béral par centicube.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à dose égale elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

**Indications.** — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment : Accès d'asthme déclenchés, États de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), États hémogéniques, Purpuras, Anémies, Hémoptysies, Urticaire (effet immédiat), etc.

**Posologie.** — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débute par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

**Formuler :** Adréphédrine : Une boîte. 18 fr. 70 et 25 fr. 80.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.



## AEÏNE

Médication type des troubles vago-sympathiques et particulièrement de l'émotivité et du trac.

**Forme.** — Petits comprimés jaunes de 0 gr. 25, non solubles.

**Composition.** — Complexe de cortico-surrénale (2 cgr.) associé à la Malonylurée (15 mgr.), Ephédrine (5 mgr.) et Peptone polyvalente.

Coefficient de toxicité nul, élimination en 1 h. 1/2 au lieu de 7 à 8 heures. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Toutes affections ou symptômes sous la dépendance du déséquilibre vago-sympathique et endocrinien (instabilité vagale). C'est le terrain neuro-végétatif qui conditionne la maladie que le Dr Bayard a décrite sous le nom d'AEÏSME (Anxiété, Émotivité, Irritabilité et Insomnies). C'est le médicament de l'anxiété pré-opératoire, de l'asthme, névrose des voies respiratoires, des troubles psychiques de la menstruation et de la ménopause. (C. Litt. avec préface du Prof. Laignel-Lavastine et communications aux Sociétés Savantes. — Thérapeutique et Pathol. comparée.)

**Posologie.** — 4 à 10 comprimés par jour, 2 avant chaque repas ou en se couchant. 2 à 3 comprimés chez les enfants.

**Prix :** 15 fr. 60 le tube (pour 8 jours de traitement).

Laboratoire de l'AEÏNE

6, place Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trinité 65-18.)

## AÉROCID

Conception entièrement nouvelle.

**Traitement opothérapique de l'aérophagie** et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par des nombreux auteurs.

**Formule :**

Parathyroïde.....	0,001
Hypophyse.....	0,0035
Poudre pancréas.....	0,02
Surrénine.....	0,02
Hépatine.....	0,30

**Indication.** — Aérophagie, Asthme, Emphysème, Fausse Angine de poitrine, Insomnie.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 cachet ou 2 comprimés au lever et au coucher, avec un verre d'eau.

**Présentation :**

Boîte de 20 cachets.....	24 fr. 40
Étui de 40 comprimés.....	24 fr. 40

Suivre le traitement 50 jours.

La boîte-cure : 109 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 1315-2 et 1315-3.

Laboratoires de l'AÉROCID

R. DERAMBURE, Pharmacien.

20, r. de Péetrograd — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Europe 52-99.)

## AÉROCOLYL

Granulé Fondant.

Introduction dans la thérapeutique courante de trois corps nouveaux :  
1<sup>o</sup> **GEL DE SILICE** en association synergique avec le **charbon suractivé** (aires d'absorption mutuellement augmentées de 50 p.100).

2<sup>o</sup> **LE SILICATE DE CALCIUM ACTIVE.** — 5 gr. absorbent 268 cc. de gaz de fermentation.

3<sup>o</sup> **LA FORMINE ARGENTIQUE** (combinaison d'argent et d'hexaméthylène-tétramine), antiseptique puissant non toxique.

**Formule.** — Gel de Silice, 5 (aire d'absorption 4,5 x 106 cc.).

Charbon activé, 15 (aire d'absorption 6,3 x 106 cc.).

Silicate de Ca activé, 7,50 (5 gr. absorbent 268 cc.) de CO<sub>2</sub>.

Formine argentique titrant 13 p.100 d'argent, 2.

Poudre de belladone, 0,15 pour 100 gr.

**Indications.** — Aérocolie, Aérophagie, Colites diverses, états infectieux du tube digestif, diarrhées, colibacillose, auto-intoxications, dermatoses.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café aux trois repas.

**Prix :** 20 fr. 30.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoires M. de RIVE

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert, PARIS (XX<sup>e</sup>).

## AÉROGASTER

**Forme.** — Granulé et cachets.

**Indications thérapeutiques.** — Aérophagie, Aérocolie et leurs conséquences, Catarrhes pulmonaires, Insomnies, Gastrites et Troubles nerveux.

**GRANULÉ AÉROGASTER**

**Formule.** — Extrait hépatique, 5 gr.; Surrénine, 0 gr. 50; Parathyroïde, 0 gr. 01; Hypophyse, 0 gr. 50; Splénine, 0 gr. 50; Poudre de Belladone stabilisée, 0 gr. 75; Hexaméthylène-tétramine, 2 gr.; Citrate de sodium sec, 5 gr.; Menthol, 1 gr.; Hydrate de Magnésie, 8 gr.; Kaolin, 8 gr.; Carbonate de Chaux, 8 gr. pour 100 gr.

**Posologie.** — Une cuillerée à café de Granulé AÉROGASTER diluée dans un demi-verre d'eau après chacun des principaux repas. Répéter cette dose à l'approche de toute gêne respiratoire ou à chaque crise d'angoisse.

**CACHETS AÉROGASTER**

**Posologie.** — Un cachet après chacun des deux principaux repas. Renouveler cette dose à l'approche de toute gêne respiratoire ou à chaque crise d'angoisse.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## AÉROGÈNE

Spécifique des voies et de l'appareil respiratoires.

Ampoules buvables de 10 cc.

**Composition.** — L'Aérogène est une médication iodurée obtenue par des procédés nouveaux.

Iodure de Potassium ..... 0 gr. 50

Eau distillée ..... 3 gr.

Sirop d'écorces d'oranges amères ..... 5 fr.

Excipient, Q. S. P. .... 10 gr.

**Propriétés.** — Modificateur biologique et hygiénique, s'adresse directement aux facteurs pathologiques des maladies dyspnéiques; il les modifie, les atténue et les combat.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Catarrhe bronchique, Dyspnée cardiaque, États hypotensifs, Pneumococcie, Intoxications par les gaz.

**Posologie.** — *Adultes*: 1 ampoule quelques minutes avant chacun des principaux repas.

*Dans les fortes crises, une troisième ampoule, 2 heures après le repas du soir.*

*Enfants de 5 à 12 ans*: la moitié d'une ampoule au repas du midi et l'autre moitié au repas du soir.

Enregistré au L. N. C. M. sous n° 1426-2.

L'Aérogène se boit pur sans aucun mélange.

**J. GAUDIN**

5, rue de Clamart — BOULOGNE-BILLANCOURT (S.).

## AÉROPHAGYL

Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br, sédatif; et Ca, antispasmodique.

**Indications.** — Spécifique de l'Aérophagie, dans toutes ses manifestations: digestives: éructations, ballonnements, aérocolie; respiratoires: dyspnées, faux asthme; circulatoires: tachycardie, palpitations, faux angor. Insomnies d'origine digestive. Gastrites nerveuses. Médication bromurée calcique dissimulée (0,25 CaBr par comprimé).

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau au milieu des repas. En cas de crise, 2 comprimés à la fois.

*Enfants*: Demi-dose.

**Présentation et Prix.** — Boîte de 45 comprimés, pour 2 semaines de traitement: 20 fr. 20.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).

(Tél.: Nord 76-85.)

## ÆSCULASE

**Composition.** — Alcoolature de marrons d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

**Indications.** — Tous les troubles circulatoires, Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

**Mode d'emploi:**

*Troubles de la circulation*: XV gouttes avant les deux repas.

*Hémorroïdes*: pour éviter les crises X gouttes avant les deux repas.

*Dans les crises aiguës*: XX à L gouttes 2 fois par jour.

Prix: 14 francs.

**Laboratoire MIOHELON**

**Docteur en pharmacie**

20, boulevard Heurteloup — TOURS.

(Tél.: 4.308.)

## ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.*

**Doses.** — 1° Pour les enfants, administrer:

5 à 6 fois par jour { de 1 mois à 1 an: I goutte par mois d'âge.  
de 1 à 2 ans: XII à XX gouttes.  
de 2 à 5 ans: XX à XXV gouttes.  
de 5 à 10 ans: XXV à XXX gouttes.  
de 10 à 15 ans: XXX à XXXV gouttes,  
et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer: 5 à 6 fois par jour: L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée, de sirop de tolu additionné d'eau, ou dans une infusion de Guimauve sucrée avec du miel. L'Æthone doit être administrée 1/2 heure avant ou 2 heures après le repas.

Prix au public: 15 fr. 20 le flacon.

**Laboratoire de l'ÆTHONE**

35, rue Boissonnade — PARIS.

(Tél.: Danton 92-10.)

## AGOBYL

**Formes.** — Granulés. Dragées.

**Composition.** — Peptone, Sulfate de magnésie, Camomille.

**Posologie :**

*Granulés :* Le matin à jeun, 1 à 2 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau.

*Dragées :* 6 à 10 dragées par jour avant les repas.

**Indications.** — Toutes affections hépatiques, drainage des voies biliaires.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER.**

## AGOCHOLINE

**Stimulant hépato-biliaire.**

**Forme.**

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

**Composition.**

Sulfate de Magnésie desséché.  
Peptone sèche purifiée.

**Propriétés thérapeutiques.**

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.  
Réalise le drainage des voies biliaires *per os* et le rend facile en clientèle.

**Indications :**

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.  
Lithiase biliaire.  
Ictère et Cholémié.  
Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs.	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.
------------------------------	---	--

Certains troubles généraux.	{	Céphalées, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.
-----------------------------	---	--

d'origine  
hépato-biliaire.

**Contre-Indications (Temporaires).**

Cholécystites aiguës.  
Diarrhées aiguës.

**Posologie :**

*Adultes :* 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau chaude.

*Enfants :* A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

**N. B.** — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 23 fr. 20.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.  
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.  
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.  
24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Diderot 28-96.)



## AGOMESINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN HYDROSOLUBLE.

**Action physiologique.** — Congestionnante de la muqueuse utérine, stimulante de l'ovaire, aide au déclenchement du flux menstruel et favorise l'apparition ou le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

### Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec la Sistomensine).
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

*Comprimés.*

**Doses.** — 3 à 9 comprimés par 24 heures.

**Formuler.** — Flacon de 20 comprimés.

— de 40 —

— de 100 —

(Voir OVOCYCLINE.)

Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup>. P. DENOYEL  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## AGOREXINE

Gentiane, Condurango, Colombo, Simarouba, Camomille romaine, Badiane, muqueuse gastrique.

*Toutes les Inappétences.*

**Posologie.** — Flacon contenant 1 000 gouttes, 1/4 d'heure avant les deux principaux repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée :

**Adultes :** XX à XXX gouttes.

**Enfants :** A partir de 1 an : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

**Prix :** 15 francs.

Laboratoires de l'AGOREXINE

## AIQUE D'OR

Anaïga du D<sup>r</sup> Redier.

### Composition :

Diméthyle amido-antipyrine.....	0,25	} pour un verre à liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Hérolne.....	0,001	
Plantes sédatives .....	Q. S.	

**Propriétés.** — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Hérolne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

**Indications.** — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées, Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, Gripes.

**Posologie.** — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après. *Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.*

*Enfants :* 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

*Sans contre-indication.*

**Présentation.** — Liqueur agréable.

Le flacon de 6 doses.

Laboratoire de l'AIQUE D'OR  
53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord).  
(Tél. : 5-45.)

## AIROGLYCE

**Composition.** — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

**Mode d'action.** — Réalise le pansement et l'antiseptie de la muqueuse urétrale.

**Indications.** — Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

**Mode d'emploi.** — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

**Injection :** 34 fr. 50.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Prov. 10-51.)

## AKÉSOL MUZI

Spécifique de la douleur. Antithermique.

**Rhumatisme. Sclatisme. Règles douloureuses  
Migraines. Grippe.**

Cachets de valériamidoquinine caféinée :

Phénacétine .....	0,20
Pyramidon .....	0,10
Sulfate de quinine (essai physiologique) .....	0,15
Caféine (essai physiologique) .....	0,05
Valérianate de zinc .....	0,05
Poudre de cannelle .....	0,05
Bicarbonate de soude .....	0,20

pour 1 cachet.

2 à 3 cachets par jour au moment des repas dans  
1/2 verre d'eau, ou mieux une infusion chaude.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1750-3.

**Laboratoires BIOPHARMAX**

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.)

## ALBUCID CRUET

Chimiothérapie par voie buccale et intraveineuse  
des infections à cocci et des colibacillooses.

**Composition.** — P-aminobenzène-sulfonacétylamide. Sulfamide désintoxiqué par acétylation et dont le pouvoir antibactérien puissant et la grande solubilité dans les milieux organiques permettent de réaliser une concentration optimum sans aucun danger d'accumulation et d'incident. Employer des doses élevées les premiers jours pour assurer un résultat rapide et définitif.

L'ALBUCID permet de traiter dans les meilleures conditions la blennorrhagie de la femme, qui est encore plus sensible que l'homme aux effets secondaires de la sulfamidothérapie.

De nombreuses observations cliniques attestent la grande activité de l'ALBUCID dans différentes autres affections à cocci :

Pneumococcies, streptococcies, staphylococcies, méningococcies.

**Posologie.** — Nous recommandons le schéma posologique suivant :

1<sup>er</sup> jour : 4 fois 3 comprimés  
2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> jour : 4 fois 2 comprimés  
4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> jour : 3 fois 2 comprimés  
Soit 2 tubes d'ALBUCID

Si nécessaire, la cure peut être répétée sans inconvénient après une semaine d'intervalle.

**ALBUCID injectable :** dans les cas graves, il est utile d'avoir recours, pendant les trois premiers jours, à un « traitement combiné » : la cure *per os* et les injections intraveineuses quotidiennes de 1 ou 2 ampoules d'ALBUCID injectable.

**Présentations :**

Tube de 20 comprimés : 32 fr. 20  
Boîte de 3 ampoules de 5 cc. : 32 fr. 20

**Laboratoires CRUET**

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

**E. KELLER, Docteur en Pharmacie**

(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE  
87, avenue de Saxe — LYON

## ALBU-COLI

Adopté par le Ministère de la Marine.

A base d'extrait de feuilles de **BIGUIGNAN**  
(*Psiloxylon Mauritianum* D. Th.) (1)

**Antiseptique, Diurétique, Décongestif.**

Granulé de saveur agréable.

La boîte de 20 doses : 27 fr. 50.

Comprimés.

La boîte de 60 dragées : 26 fr. 50.

Apozème de **Biguignan**.

10 jours de traitement : 21 fr. 70.

### Principales indications :

*Albuminuries, Colibacillose, Bactériuries, Lithiase rénale, Pyélo-Néphrites, Mal de Bright, Cystites, Prostatites, Urétrites, Hypertrophie de la prostate, Affections gonococciques, Manifestations de l'Arthritisme et de l'Artério-Sclérose.*

*Absence de toxicité : Tolérance absolue, goût agréable.*

### Posologie :

**Granulé :** 2 cuillerées à café trois fois par jour en dilution dans un demi-verre d'eau (entre les repas).

**Comprimés :** 1 à 2 comprimés à chacun des trois repas.

**Apozème :** 1 cuillerée à dessert de plante pure dans 1 litre d'eau bouillante. Réduire au 1/2 litre. Prendre en trois fois 3/4 d'heure avant les repas.

Cette posologie peut être doublée selon avis du médecin (en particulier dans la *Colibacillose*).

**Laboratoires LECONTE  
et ALBU-COLI réunis**

**C. LECONTE**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

12, rue des Petits-Carreaux, PARIS (II<sup>e</sup>).  
(Tél. : Gut. 04-17.)

(1) H. Leclerc, *Presse Médicale*, 15 mai 1937; *Revue de Phytothérapie*, juillet 1937, février 1939.

## ALBURENOL

*Spécifique des maladies des Voies urinaires.*

**Composition.** — A base d'extrait de kawakawa, de Barbiflore, de Stigmates de maïs, de Douce-amère et de Saponaire.

**Indications.** — Albuminurie sous toutes ses formes, Œdèmes, Néphrite, Pyélonéphrite, Urémie, Mal de Bright, Cystite, Colibacillose, Prostatite, Lithiase, Albuminurie gravidique. *Ne contient pas de produits chimiques.*

**Aucune contre-indication.**

Liqueur agréable à absorber.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

**Laboratoire ALPHA  
MONTREUX-LE-CHATEAU  
(Territoire de Belfort).**

## ALCACHOL

Granulé effervescent.

### Composition :

Extrait d'Artichaut .....	5 gr.
Sulfate de Soude .....	8 gr.
Citrate de Soude .....	6 gr.
Phosphate de Soude .....	7 gr.
Bicarbonate de Soude .....	10 gr.
Granulé effervescent. Q. S. P.	100 gr.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Cholécystite, Ictère catarrhal, Intoxication alimentaire, Urticaire, Gastralgie, Hyperchloxydrie, Entérite.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café avant les deux principaux repas, ou deux cuillerées à café le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau. Ces doses sont variables et peuvent être modifiées par le Médecin traitant.

**Prix : 19 fr. 10.**

**Laboratoires COMBÉFREYROUX**  
134, avenue Parmentier.  
(Tél. : Ober. 51-10.)



## ALCACYL WANDER

**Composition.** — Acide acétylsalicylique 0,50, alcool 0,4 pour un comprimé.

Parfaitement toléré par les estomacs délicats.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications.** — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciaticques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée ; avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet. A répéter, si nécessaire, 3 à 4 fois dans les 24 heures.

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

**P. BASTIEN, Pharmacien**

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## ALCALINOSE

**Composition.** — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs, Bicarbonate de sodium saturé.

**Action.** — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée de transit gastrique.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées-mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées-mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.  
Traitement pour 15 jours.

**Indications.** — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pylorotomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : Poudre, 9 fr. 90 (10 jours).

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés Corbière, S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

## ALCALISALYL

Association de salicylate et de bicarbonate de soude.  
Granulé effervescent.

**Composition.** — Chaque mesure dissoute représente :

Salicylate de soude.....	1 gramme
Bicarbonate de soude.....	—
Comprimés glutinisés.	

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

Salicylate de soude.....	0 gr. 50
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 15

**Avantages.** — Antiacidosique grâce au bicarbonate et bien toléré par l'estomac.

**Mode d'emploi.** — Une mesure dissoute dans un demi-verre d'eau sucrée de 3 à 10 fois et plus par jour. Ou de 5 à 20 comprimés par jour.

**Prix** : La boîte de granulé = 31 mesures : 25 fr. 80.

L'étui de 60 comprimés : 23 fr. 50.

**Ampoules pour injection I. V.**

**Composition.** — Solution contenant 1 gramme de salicylate de soude dans 10 cc. de sérum glucosé à 10 p. 100.

**Avantages.** — Avec cette solution, dont le pH constant est très voisin du pH sanguin, la sclérose de l'endovéine ne se produit pratiquement pas.

**Indications.** — Maladie de Bouilland, Rhumatismes infectieux et chroniques. Encéphalites et séquelles. Chorée. Sclérose en plaques, etc.

Prix {	La boîte de 3 ampoules de 10 cc.....	13 fr. 50.
	— 6 ampoules de 10 cc.....	22 fr. 90
	— 3 ampoules de 20 cc.....	17 francs.
	— 6 ampoules de 20 cc.....	29 fr. 40

**Laboratoires GATEL-LÉGER**

85 et 37, rue du Maréchal-Pétain — LAVAL (Mayenne).

## ALDINE

(Contre toutes algies.)

Calmant efficace de la douleur, effet immédiat. Stimulant du système nerveux dans les états dépressifs.

**Présentation.** — Sous forme rationnelle d'un élixir agréable à prendre, sans pouvoir offensif sur l'estomac, l'ALDINE est une ingénieuse composition fondée sur les sédatifs les plus fidèlement victorieux de l'élément douleur associés à un stimulant général.

**Indications.** — Gripes, migraines, toutes névralgies, règles douloureuses, etc.

**Posologie.** — Médicament destiné aux adultes. Une cuillerée à soupe pure ou dans un peu d'eau. Par jour : de 2 à 4 cuillerées.

Prix : 14 fr. 70 le flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le numéro 339-6.

La situation économique actuelle ne permettant pas l'approvisionnement régulier en matières premières, la vente de l'Aldine est momentanément suspendue.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 12-63.)

## ALEPSAL (Comprimés)

Calmant non déprimant.

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladone et caféine, l'ALEPSAL (0,10) supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

**3 Dosages :** 1° Comprimés à 10 cgt. de Phényléthylmalonylurée.  
2° Comprimés à 5 cgt. de Phényléthylmalonylurée.  
3° Comprimés à 1 cgt. 1/2 ou doses fractionnées.

**Indications.** — (Comp. à 0,10): Epilepsie, Insomnies rebelles. — (Petits dosages): Etats anxieux, Troubles neuro-cardiaques, Angine de poitrine, Troubles nerveux chez les enfants, Coqueluche, Incontinence d'urine.

**Posologie.** — Epilepsie, Adultes : Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0,10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions, et qu'en cas de diminution dans les doses on devra procéder très lentement et par paliers successifs. Doses maxima des comprimés à 1 cgt. 1/2. Enfants : 6 mois : 2 comp. — 1 an : 3 comp. par 24 h.; — 5 à 6 ans : 7 comprimés ; — Espacer les doses.

**Bibliographie.** — Communication à la Société Médico-Psychologique de Paris (1921). Thèse Dr Labarthe (1926). — Dr Rodiet, Médecin-chef des Asiles (Traitement de l'Epilepsie 1927). Professeur de Pathologie G. Ferrua de Turin. Précis Clinique de l'Epilepsie (1931).

Prix : 11 fr. et 9 fr. 80.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché, à NEUILLY (SEINE). (Tél. Mal. 17-77.)

## ALGÉON

Comprimés anti-rhumatismaux. Antalgiques.

**Composition.** — Chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de Phénylsemicarbazidé et d'Acide acétylsalicylique et 0 gr. 05 d'Amide acétique du para-amino-phénol.

**Propriétés.** — Efficacité remarquable contre les syndromes douloureux de toutes sortes, et notamment contre les algies rhumatismales. Soulagement appréciable et rapide.

**Indications.** — Rhumatismes, Sciatique, Douleurs musculaires ou articulaires, Goutte.

Névralgies intercostales, lombaires, oculaires, auriculaires, cervicales, faciales, maxillaires, etc...

Courbature fébrile, Grippe, Migraines rebelles, et chaque fois qu'il faut calmer un phénomène douloureux sans recourir aux héroïques.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 6 comprimés par 24 heures, au début des repas. Puis diminuer.

Prix : 22 francs.

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoire ÉON  
à DINAN (Côtes-du-Nord).

## ALGIPAN MIDY

Boîte de 6 ampoules pour Injections Intradermiques.

Composition :

Bichlorhydrate d'Histamine..... 0 gr. 000125

Monochlorhydrate d'Histidine ..... 0 gr. 040

Pour une ampoule de 1 cc. en équilibre ionique stabilisé.

ASSOCIATION ANTIALGIQUE RÉVULSIVE  
NEUROTROPE

**Dose et mode d'emploi.** — Infiltration intradermique dans la zone de projection cutanée de la douleur, une séance tous les jours ou tous les 2 jours.

**Indications.** — Névralgies, Myalgies, Arthralgies, Algies viscérales, Douleurs de l'angine de poitrine, Crises solaires, Coliques hépatiques, Coliques néphrétiques, Douleurs d'origine ulcéreuse, Spasmes douloureux des artérites, Maladie de Raynaud, Etats anaphylactiques (asthme, urticaire, œdème de Quincke, rhume des foies).

Chaque boîte contient une aiguille spéciale pour injection intradermique.

Prix : 30 francs. Durée du traitement : 8 à 15 jours

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, — PARIS (XVII°).

(Tél. : Wagram 51-10 + lignes groupées.

## ALGOCRATINE

(Phénylamidoxanthine.)

**Présentation.** — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation rapide). Boîtes de 8 et de 25 cachets.

Suppositoires : même dosage que les cachets.

Produit de prescription médicale.

Ne contient aucun hypnotique.

**Indications thérapeutiques.** — Migraines, névralgies, sciatiques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les règles douloureuses.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

**Posologie.** — Un cachet dès l'apparition des douleurs, un second une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Suppositoires : Même posologie que les cachets.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III  
PARIS (VIII°). — (Tél. : Élysées 17-46.)

## ALGOÏL DU D<sup>r</sup> GUIRAUD

Liniment Histaminé.  
(Excipient spécial.)

**Indications.** — Toutes manifestations douloureuses articulaires, musculaires ou nerveuses. Cellulite.

Favorise la résolution rapide des fluxions et œdèmes, notamment dans les rhumatismes.

**Action thérapeutique.** — L'excipient spécial d'Algoil, solvant les lipides, permet de faire pénétrer rapidement dans le derme des substances telles que l'histamine, dont les propriétés antalgiques ou vaso-actives réalisent *loco dolenti* une thérapeutique des plus active de l'influx douloureux.

**Composition.** — Histamine, trichlorométhane, ester amylsalicyllique, terpènes, capsaïcine, hydrocarbures oléo-schisteux.

**Mode d'emploi.** — Étendre Algoil sur la région douloureuse, faire une légère friction et recouvrir d'un pansement ouaté.

Prix : 18 fr. 90.

Laboratoires CHAMBON  
place Francheville — PERIGUEUX.  
(Tél. : 4-43.)

## ALGOPHAGINE

Ovoïdes glutinisés contenant 1/10 de milligramme de colchicine dans l'essence de Gaulthéria pure associée à : iodure de lithium et formine.

### Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

### Posologie :

Trois ovoïdes le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnés d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy), ou hypominéralisée (Vittel, Evian). Prix : 24 fr. 20.

Compléter le traitement avec le Baume *Algotha*.

Laboratoires UNIS-SPÈS  
14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ALGOSÉDINE

Calmant puissant des douleurs viscérales type colique, Antispasmodique.

**Composition.** — Chlorhydrate d'amyléine, belladone, jusquiame, valériane, Teinture thébaïque, etc.

**Indications.** — Ulcères, cancers, douleurs stomacales, intestinales. Douleurs périodiques, Spasmes viscéraux. Guérison des dyspepsies hyperchlorhydriques ou nerveuses. Vomissements.

**Posologie.** — X à XXX gouttes 4 fois par jour chez l'adulte. Éviter l'emploi chez les enfants.

Laboratoires DORDIN  
HARNES (Pas-de-Calais).  
Distribution assurée.

## ALIBOURINE B. E. A.

### Forme :

**Pommade** en tube de 50 grammes environ.

### Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-vaseline. (*La Lano-vaseline est provisoirement remplacée par un autre excipient.*)

### Indications :

Eczémas suintants, *Impétigo*, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Érysipèle, Brûlures, Engelures.

Laboratoires B. E. A.  
Ch. BEHA, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
BELFORT.

## ALIMENTS DE SANTÉ BENEDICTUS

De goûts agréables et variés.  
Facilement digestibles.

**NOURRISSENT ET FORTIFIENT**  
**ENFANTS**  
**ANÉMIÉS**  
**DIABÉTIQUES**  
**DYSPEPTIQUES**  
**HÉPATIQUES**

**S. A. R. L. Les Aliments de Santé**  
**BENEDICTUS**  
**ANGERS** **SAVENNIÈRES**

## ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY

Aliments composés farineux de composition nettement définie (*aucun succédané*), soumis au rationnement des farines composées.

Obtenus des meilleures matières premières spécialement préparées et convenablement dosées d'après leur composition exacte de manière à être admirablement tolérées par les voies digestives les plus délicates.

**ALIMAVÈNA.** Au Cacao spécial : Admirablement toléré par nombreux hépatiques. Ne constipe pas. Aliment de l'enfance. Le plus parfait des petits déjeuners des Enfants, Vieillards, Convalescents, Nourrices, Amaigris, Nerveux, etc. En usage dans les Hôpitaux.

**SUPRAVÈNA.** Vanillé : Parfait aliment du 1<sup>er</sup> âge. Antidiarrhéique sans blocage, notamment des Nourrissons à partir du 8<sup>e</sup> mois. Augmente rapidement la tolérance de l'organisme dyspeptique pour le lait. En usage dans les Hôpitaux.

**BOVAVÈNA.** Carné : Exquis potage à la Poudre de Vlande, apéritif, digestif, tonique. En usage dans les Hôpitaux. *Fabrication suspendue par manque de Poudre de Vlande de Bœuf.*

### ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY

**BOURG-LA-REINE (Seine).** Tél. : ROBINSON 06-32.

## ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Médication calcico-magnésienne, dont la présentation agréable, en bouillies ou entremets, en facilite l'administration aux sujets affaiblis et atteints d'inappétence.

### Composition :

Carbonate de chaux .	0,33	Lactose .....	1,50.
Phosphate de chaux .	0,20	Arrow-Root .....	3,80.
Glycéroph. de chaux .	0,06	Sucre .....	14,60.
Magnésie .....	0,05	Cacao .....	11,60.
Eléments complets céréalo-légumineux.	1,50		

Pour 2 mesures.

**Posologie.** — Enfants : 1 à 2 mesures par jour.

Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

**Indications.** — Dégénérescence infantile, Scrofule.

Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Sous réserve des possibilités de fabrication.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris,  
17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)



## ALLERGANTYL MILUC

Modificateur du terrain humoral.

**SOLUTION INTERNE.** — Rate, Bardane.

**Indications thérapeutiques.** — Rétablit l'équilibre normal du système endocrino-sympathique : Furunculose, Eczémas (adultes et nourrissons), Allergies cutanées, etc.

**Furunculose.** — *Fortes doses indispensables* : 3 cuillerées à soupe par jour et plus, suivant les cas.

**Dermatoses.** — *Doses faibles, mais prolongées* : 2 cuillerées à dessert par jour (20 jours par mois).  
Demi-dose pour enfants.

### POSOLOGIE SPÉCIALE POUR NOURRISSONS

2 fois vingt (20) gouttes pour les nourrissons de 2 mois.  
2 fois quatre-vingts (80) gouttes pour les nourrissons à partir de 4 mois.

Quatre-vingts (80) gouttes = une demi-cuillerée à café.  
Chaque cuillerée sera diluée dans un 1/2 verre d'eau et sera prise un quart d'heure avant le repas (Adultes) ou avant la tétée ou le biberon (Nourrissons).

Ne jamais donner pure l'**ALLERGANTYL INTERNE** en raison de sa grande concentration.

Pendant la période des restrictions, gardez la Solution pour les enfants et les nourrissons.

**PRESCRIVEZ** aux adultes  
**ALLERGANTYL COMPRIMÉS.**

4 comprimés = 1 cuillerée à soupe Solution.

**Furunculose.** — *Fortes doses* : 12 comprimés par jour (4 avant chaque repas).

**Dermatose.** — *Doses faibles, mais prolongées* : 6 comprimés par jour (2 avant chaque repas).

Pour les traitements prolongés, prescrire la triple boîte, plus économique pour les malades.

**POMMADE.** — Noyer, Consoude, Allantoïne.  
Cicatrisant : Plaies, Brûlures.

Pour la Furunculose et les Dermatoses, le traitement par la pommade est à utiliser quelques jours après le début de la cure interne et tout en continuant l'Allergantyl solution ou l'Allergantyl comprimés.

**Laboratoires MILUC, L. Ragoucy, Pharmacien**  
2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
Tél. : Odéon 02-53.)

## ALLISATINE

Principes actifs stabilisés et inodores  
de l'*Allium Sativum* frais, fixés à  
un charbon activé.

*Fabrication provisoirement suspendue.*

## PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## ALLIUM COIRRE

(Marque Stasima)

**Composition.** — Préparation stabilisée, contenant tous les principes de l'ail cru.

Deux formes : Alcoolature et Pilules (une pilule correspond à environ X gouttes d'alcoolature).

**Action.** — Au point de vue circulatoire :

Abaisse la tension artérielle en augmentant l'indice oscillométrique ; l'allium est de plus cardiotonique (XXX gouttes en 2 fois).

Dans l'*Hypertension* : 2 jours de traitements, 2 jours de repos et ainsi de suite pendant 15 jours.

Au point de vue antiseptique :

Antiseptique pulmonaire (alcoolature), 50 gouttes P. J. en 2 fois. Antiseptique intestinal (pilules), 4 à 8 pilules P. J. en 2 fois.

Au point de vue général :

Reconstituant général et antiscleureux, 4 à 8 P. J. en 2 fois.

Prix : 19 fr. 50.

### COIRRE

5, boulevard Montparnasse — PARIS.  
(Tél. : Ségur 02-79.)

## ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

**Constitution.** — (Chlorhydrate de paramino-benzoyl-diéthyl-amino-éthanol.)

Les solutions allocaïne-adréraline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérables. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

**Propriétés.** — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacte les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale; fonctions intellectuelles).

**Indications.** — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.

Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.

Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.

Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a.

à 2 cc.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

L'or en combinaison sulfo-organique  
par la voie intramusculaire.

Adoptée par l'Assistance publique, inscrite au tarif de l'A. G.

**L'Allochryssine Lumière** (thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium) est un composé dans lequel le métal est lié directement au soufre et dont la deuxième valence est occupée par un radical organique.

30 p. 100 d'or métallique.

Cette préparation (solution aqueuse), injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement. Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie.

Pas de contre-indications formelles; cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales, les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule d'Emgé Lumière en évite le retour.

**Indications :**

**Tuberculose** (pulmonaire et externe), **Rhumatisme** chronique infectieux, **Syndromes infectieux divers.**

**Formuler :**

Une boîte d'Allochryssine Lumière, contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution :

Une ampoule de 2 cc. d'Allochryssine Lumière,

Une ampoule de 8 cc. de sérum artificiel.

Il existe trois dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

Bien spécifier le dosage désiré.

**Mode d'emploi :**

**Tuberculose.** — Débuter, pour tâter la susceptibilité du malade, par une ampoule de 0 gr. 05; continuer par injections de 0 gr. 10, puis 0 gr. 20. Une à deux injections par semaine jusqu'à dose totale, moyenne de 3 à 5 grammes.

**Rhumatisme.** — Débuter, pour tâter la susceptibilité, par 0 gr. 05, une injection tous les cinq jours; continuer par une injection tous les 5 jours à 0 gr. 10, jusqu'à imprégnation moyenne de 3 gr. Employer, dans quelques cas, la dose de 0 gr. 20, à raison de une par semaine.

**Laboratoires LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## ALLONAL « ROCHE »

### ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

**Action thérapeutique.** — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine; il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique.

**Indications thérapeutiques.** — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie; agitation, excitation, délires, etc.

**Avantages.** — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

### Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0 g. 16 d'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane,  $\frac{1}{2}$  h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-5.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 91-10)

## ALLOPHA-QUINA

### Le cachet analgésique rationnel.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle .....	10 gr.
Diméthylaminoantipyrine .....	30 —
Poudre de quinquina .....	10 —

**Mécanisme d'action.** — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois, sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

**Toutes les algies.** — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

### Fièvre-Grippe.

3 cachets à répartir dans les 24 heures.

Tube de 8 cachets : 10 fr. 30.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 10-36.)

## ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

### Aloïne Houdé

Glucoside cristallisé de l'aloès des Barbades.

### Indications :

Dyspepsies atoniques ou hypotoniques.

**Constipation** droite ou gauche.

Syndrome entéro-hépatique, *leiasthénie*.

### Doses et mode d'emploi :

*Comme stomachique :*

1 granule par jour.

*Comme laxatif :*

1 à 2 granules le soir au repas.

*Comme purgatif :*

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu, PARIS (X°) — (Tél. : Nord 40-58.)

## ALOPLASTINE

**La première pâte à l'eau spéolalisée.**

Pâte poreuse, stable, non grasse.

Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras ou de vaseline souvent mal tolérés.

Ne tache pas le linge.

S'enlève facilement.

Répond à une classique formule de l'Hôpital Saint-Louis.

**Indications.** — Érythèmes fessiers des nourrissons, érythèmes intertrigo, rougeurs. Eczémas aigus et subaigus, eczémas suintants, coups de soleil, engelures, prévention des escarres, eczématisation des plaies, prurit, etc. Dermite irritables, dermites artificielles, eczémas des blanchisseuses et des laveuses, etc.

**Mode d'emploi.** — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Il existe également une poudre d'*Aloplastine*.

## ALOPLASTINE ICHTHYOLÉE

**Pâte à l'eau renfermant 5 p. 100 d'Ichthylol.**

Présente les avantages de l'*Aloplastine* simple (absence de vaseline et de corps gras, pâte poreuse, facile à enlever), à laquelle s'ajoute l'action réductrice et kératoplastique de l'Ichthylol.

**Indications.** — Toutes celles de l'Ichthylol : Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermato-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures, Ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

**Laboratoires Biologiques de l'ILE-DE-FRANCE**

**A. DÉTROIS, Pharmacien**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV°)

## ALUCOL WANDER

*Hydrate d'alumine colloïdal (Procédé Wander).*

**Pansement gastrique.**

**Mode d'action :**

Fixe par adsorption (colloïdisation) l'excès d'HCl en formant un gel qui tapisse et isole la muqueuse.

Effet double, régulier et durable :

1° Effet sédatif, par parfaite adhérence du gel formé qui isole et protège la muqueuse ;

2° Élimination d'HCl en excès par un processus physique de colloïdisation, donc sans chimisme secondaire.

Normalise le pH gastrique ; n'entrave pas la digestion peptique.

**Indications :**

Traitement de l'hyperchlorhydrie. Gastrites chroniques et médicamenteuses. Gastralgies. Ulcères peptiques et du duodénum. Colites.

Antiseptique intestinal par entraînement des toxines microbiennes.

**Forme :**

Paquets (3 gr.). Granulé (Gastralucol : 60 % Alucol) Comprimés (0 gr. 50). Belladoné (Cachets : Alucol 0 gr. 50, Teinture de belladone V gouttes, Paraminobenzoate d'éthyle 0 gr. 04).

**Mode d'emploi :**

1 heure avant les repas ou 2 heures après.

En cas de crise, 1 à 2 cachets belladonés et selon prescription médicale.

**Autres spécialités :**

Alcacyl : analgésique.

Héparéguline : cholérétique, cholagogue.

Pepso-Pancré-Malt : auxiliaire de la digestion.

**P. BASTIEN, Pharmacien**

Spécialités Wander.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine à l'état gélatineux.

Tolérance parfaite.

### Indications:

**Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhées des nourrissons.**

### Posologie:

**Adultes:** 2 à 10 comprimés ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

**Enfants:** 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

### Prix de vente:

Comprimés à 0 g. 50 (tube de 20). 5 fr. 90

Granulés à 25 % (fl. de 90 gr. env.) 16 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPEOIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél.: Balzac 22-94.)

## ALZINE

**Composition.** — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

**Forme.** — Pilules enrobées au gluten F1-de 40.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

**Doses.** — Cas aigus: 4 à 6 pilules par jour. Après la crise: 2 à 3 pilules par jour.

**Dose préventive.** — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 j. et reprendre.

Flacon: 40 pilules. — Prix: 20 fr.

Compte chèques postaux, Lyon n° 134-34.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON.

(Tél.: Parmentier 31-20.)

## AMBOCURINE

Granulé.

### Composition:

Kaolin.....	10 gr.
Bromure de potassium .....	7 gr.
Carbonate de chaux.....	13 gr.
Magnésie lourde .....	5 gr.
Extrait de Belladone .....	0, 06
Extrait de Fève de Calabar .....	0, 04

Pour 100 Grammes.

**Indications.** — Toutes gastralgies sans exception, qu'elles soient conditionnées par une vago ou une sympathicotomie.

**Aérophagie. Vomissements de la grossesse.**

### Doses:

**Adultes:** 2 à 3 cuillerées à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

**Enfants au-dessus de 16 ans:** 1 cuillerée à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

Prix: 21 fr. 60.

### Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél.: Gut. 04-17.)

## AMBRINE


Pansement aseptique, analgésique, hyperthermique et sédatif, non adhérent, permet la cicatrisation sans-trace apparente et sans rétraction.

**Indications.** — Brûlures, ulcères, plaies, engelures, plaies atones, algies, rhumatismes, arthrites, névrites, phlébites, goutte.

**Mode d'emploi.** — Allumer les mèches et laisser tomber les gouttes en fusion sur la surface à soigner. Recouvrir d'une mince couche de coton hydrophile, d'une deuxième couche d'AMBRINE et d'une deuxième couche de coton hydrophile. Maintenir par une bande.

### Laboratoires de l'AMBRINE

84, boulevard Garibaldi — PARIS (XV<sup>e</sup>).





## AMIBIASINE

Extrait de *Garolnia* composé.

Fournisseur des Ministères des Colonies et de la Guerre.  
Non toxique. Sans contre-indication.

### Présentation :

**Liquide.** — Solution brune stabilisée, de saveur amère, en flacon de 60 cc. (12 cuillerées à café titrées à 0 gr. 10 de principes actifs par cuillerée).

**Comprimés.** — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 05 de principes actifs, en étui de 2 tubes : 40 comprimés.

**Suppositoires.** (Voir à *Suppositoire Amibiasine*.)

**Propriétés.** — Désinfectant et antiparasitaire puissant, anti-diarrhéique énergique sans action constipante, calmant des douleurs abdominales et du ténésme sans opiacés. Cicatrise la muqueuse intestinale et rétablit l'intégrité fonctionnelle du foie.

**Indications.** — Toutes parasitoses intestinales : Amibe, *Lambli*a, *Trichomonas*, *Schistosomum* *Mansoni*, *Ankylostomes*, *Dysenteries* et diarrhées de toutes natures et origines, aiguës et chroniques. Diarrhée symptomatique des tuberculeux, des appendicites chroniques, des typhoïdes, Hémorragies intestinales, *Melæna*, Entérites chroniques, muco-membraneuses, entérocolites, Fermentations intestinales, fétidité des selles, Colibacillose, eczéma.

Diarrhées infantiles (voir *BIOENTÉRIASE*).

**Posologie.** — En faisant prendre l'AMIBIASINE dans de l'eau sucrée ou, mieux, du café noir sucré, on lui enlève toute amertume. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans être croqués.

**Formes aiguës :** 6 à 9 cuillerées à café ou 8 à 12 comprimés par jour.

**Formes chroniques :** 3 à 6 cuillerées à café ou 4 à 8 comprimés par jour.

Administer le médicament à ces doses et dès amendement des symptômes ramener les doses à 3 cuillerées à café ou 4 comprimés par jour, pendant une huitaine de jours.

**Cure d'entretien :** 2 cuillerées ou 4 comprimés par jour, 10 jours par mois pendant 1 à 3 mois.

**Régime habituel des entériques** en notant de s'abstenir du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Boissons : thé léger, eau sucrée ou eau rouge.

**Diarrhée infantile.** — Formule AMIBIASINE BB : 1 à 3 cuillerées à café par jour jusqu'à disparition de la diarrhée.

Prix du flacon :

Solution : 19 fr. 60. — Comprimés : 14 fr. 70.

(Taxe d'armement comprise.)

Laboratoire de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII). (Tél. : Dorian 75-52.)

## AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

**Forme.** — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

**Indications.** — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

**Mode d'emploi.** — Deux à 4 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre : 17 fr. 60.

(Boîte aluminium).

La boîte, Comprimés, Cachets : 24 fr. 60.

Le flacon de Dragées : 22 fr. 90

Le tube de Comprimés : 11 fr. 70.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

### Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## AMIDO-SEPTINE

### CACHETS

**Composition.** — Para-amino-phényl-sulfamide et catalase compensatrice : l'Amido-Septine emprunte à la Sulfamide ses remarquables propriétés bactéricides tout en neutralisant sa toxicité.

**Mode d'action.** — Bactériocide puissant administrable *per os*, agissant par voie sanguine et détruisant l'agent pathogène au lieu même de l'infection.

Atoxique, sans danger pour le malade grâce à son activateur d'oxydo-réductions intracellulaires.

Préparation qui permet une large utilisation des propriétés bactéricides de la Sulfamide.

**Indications.** — Préventive et curative, l'« Amido-Septine » paraît être la « Therapia Sterilisans Magna » de tous les états infectieux, et en particulier des infections à : Streptocoques, Méningocoques, Pneumocoques, Gonocoques, Colibacilles, Météocoques.

Infections polymicrobiennes des plus bénignes (grippe) aux plus graves (septiciémies).

Activité spécialement nette en Urologie.

**Posologie.** — Selon la nature de la maladie, son évolution et l'état du malade.

Adultes : 6 à 12 cachets par 24 heures.

Enfants : 2 à 8 cachets par 24 heures.

À forte dose (10 à 12 cachets par 24 heures), traiter 4 à 5 jours, laisser reposer 3 jours, puis reprendre si nécessaire.

Prix : Boîte de 40 cachets, 32 fr. 15.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1337-3.

Laboratoire de Pharmacologie appliquée.

Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUH (B.-du-R.). — (Tél. 29.)

## AMIDOSOL

**Composition.** — Solution concentrée (à 25 %) de paraminophénylsulfamide 1162 F pour aérosols.

### Formule :

Septoplix ..... 1 gr. 25  
Acétate de monoéthylacétamide ... 3 gr. 75

Pour 1 ampoule de 5 cc.

**Propriétés.** — Bactériostatique polyvalent.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires aiguës ou chroniques (thérapeutique sulfamidée locale).

**Mode d'emploi.** — L'AMIDOSOL peut être utilisé dans n'importe quel appareil producteur d'aérosols ou au moyen de l'atomiseur Théraplix.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## AMIFLORINE

### Gouttes.

**Présentation.** — En flacon-compte-gouttes (22 fr. 25.).

**Principes actifs.** — Extrait de marrons d'Inde, d'Hamamelis virginica, de Gui, de Viburnum, d'Hydrastis canadensis.

**Indications.** — Troubles de la circulation, maladies des vaisseaux, varices, phlébites, accidents de retour d'âge.

**Mode d'emploi.** — XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, 3 fois par jour.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-16.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## AMINASE

Chlorure de magnésium stabilisé et dissimulé en vue du traitement du **CANCER** en clientèle.

**Composition.** — Chaque comprimé contient 0 gr. 60 de chlorure de magnésium pur et sec.

**Propriétés.** — Tonique général et nervin, régulateur des fonctions digestive et hépatique, prophylaxie et traitement du **CANCER** ainsi que de toutes lésions type néoplasique.

**Acidifiant.**

**Indications.** — 1° Principales : Néoplasmes, *Alcalose*.

2° Secondaires : Déficience de l'état général (asthénie, neurasthénie, surmenage, déséquilibre vago-sympathique, dermatoses diverses, hypertrophie de la prostate, troubles digestifs et hépatiques, constipation, colibacillose).

**Présentation.** — En tube de 30 comprimés.

**Posologie et mode d'emploi.** — Un comprimé dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage au commencement des deux principaux repas. Cette dose peut être doublée si l'état pathologique réclame une action rapide.

**N. B.** — Ni sur l'étiquette du tube délivré au public, ni dans le prospectus, ni dans la formule exigée par le fisc, ne paraissent les mots : Cancer, Néoplasme, Tumeur, Chlorure de magnésium, susceptibles d'inquiéter le malade et son entourage.

Prix : 13 fr. 10 le tube de 30 comprimés.

**Laboratoires du SAPOLINOL**  
38-40, cours Richard-Vitton — LYON.

## AMINOPHYLLINE CARÉNA

(Théophylline-éthylène-diamine synthétique française.)

**Démonstration expérimentale.** — La ligature d'une artère coronaire chez le chien provoque, sur l'électrocardiogramme, l'onde en dôme caractéristique de l'obstruction coronarienne. La théophylline éthylène-diamine amène le retour du tracé à la normale.

(Communication Société française de cardiologie, 23 mai 1937.)

Henri Morel, Thèse de Toulouse, 1938.

**Indications cliniques :**

*Antalgique cardiaque* (angine de poitrine, infarctus du myocarde).

*Toni cardiaque* (insuffisance ventriculaire gauche, arythmies).

*Diurétique sans toxicité* (oliguries, ascite, œdèmes).

*Eupnéique* (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

**Présentations :**

Comprimés, gouttes, suppositoires, ampoules intramusculaires, ampoules intraveineuses : voir **CARÉNA**.

**Associations :**

*Ouabaine* : voir **Caréna-Ouabaine**.

*Papavérine* : voir **Sédo-Caréna**.

*Trinitrine* : voir **Trinitrine-Caréna**.

**SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES**

39, bd de La Tour-Maubourg - PARIS (VII<sup>e</sup>). (Inv. 43-60, 43-61, 43-62.)

## AMINO-VIT « ROCHE »

3 vitamines essentielles : B<sub>1</sub>, C et D.

+ 3 acides aminés indispensables : tryptophane, histidine, lysine.

**Action thérapeutique.** — L'Amino-Vit « Roche » réunit tous les facteurs importants de l'équilibre alimentaire : les trois grandes vitamines essentielles B<sub>1</sub>, C et D combinées aux trois grands acides aminés : tryptophane, histidine et lysine. Il représente donc un aliment, facteur d'économie nutritive ; il permet d'équilibrer et de rendre rationnelle toute alimentation carencée. C'est aussi un médicament qui régularise les fonctions hormonales, les oxydations intracellulaires, qui active toutes les fonctions organiques et combat les troubles du métabolisme phospho-calcique.

L'Amino-Vit « Roche » est eutrophique : il donne à l'organisme du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et du vieillard, les moyens de lutter contre toute insuffisance alimentaire, contre toute infection, car, de par sa composition rigoureusement établie, il assure le fonctionnement complet de l'anabolisme général.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les hypovitaminoses (arrêt de croissance, anorexie, asthénie, diminution de la résistance générale aux infections et intoxications, petites manifestations de rachitisme, hémophilie, débilité, dépression, etc.). Toutes les convalescences, toutes les infections. Surmenage et fatigue de toute origine. Troubles du système nerveux, algies, névrites, rhumatismes, etc. Apport alimentaire insuffisant. Alimentation mal réglée chez les nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes et les vieillards.

**Avantages.** — L'Amino-Vit « Roche » réunit, en quantités scientifiquement contrôlées et évaluées, sous la forme de comprimés agréables à croquer et toujours très bien tolérés, toutes les possibilités de l'acidaminothérapie et de la B<sub>1</sub>, C et D vitaminothérapie : il apporte aux organismes carencés tous les principes indispensables à leur fonctionnement harmonieux. C'est un bio-dynamogène total.

### Posologie et mode d'emploi :

**Nourrissons :** 1 comprimé par jour délayé dans du lait.

**Enfants :** 1 à 2 comprimés par jour à croquer après les repas.

**Adultes :** 2 à 4 comprimés par jour à croquer après les repas.

AMINO-VIT « ROCHE ». Comprimés (tube de 20).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 504-92.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## AMIPHÉDRINE

Synergie médicamenteuse d'une efficacité constante, atoxique et toujours bien tolérée.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement synergique de l'asthme essentiel. Emphysème. Rhume des foins. Rhinites. Grippe.

**Composition.** — Chl. éphédrine, véronal, dionine, thiocol, aspirine, cola.

**Traitement d'attaque :** 3 cachets par jour avant les repas.

**Période d'état :** 1 cachet matin et soir.

**Prix :** La boîte de 8 cachets : 12 fr. 20.

### Laboratoires de L'AMIPHÉDRINE

6, place Jean-Jaurès — MONTROUGE.

(Tél. : Alésia 18-85.)

## AMIPHÈNE CARRON

Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse.

**Le plus puissant antiseptique intestinal.**

Ne fatigue pas l'estomac. Combat les fermentations et les putréfactions intestinales. Parfaitement toléré chez l'homme même à hautes doses. Action très rapide. Pas d'iodisme.

**Indications.** — Toutes les diarrhées, aiguës ou chroniques, quelle qu'en soit l'étiologie. Entérites muco-membraneuses. Diarrhées des pays chauds, suites de dysenterie.

**Présentation.** — Cachets dosés à 25 mgr. : 2 à 8 cachets par jour, au début des repas (alcaliniser l'intestin en cas d'acidité).

Communication à l'Académie de médecine (1929) et aux Sociétés de gastro-entérologie (1929) et de pathologie exotique (1929 et 1931).

Cachets : 25 fr. 80.

### Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

## AMPHOMUTH

Bismuth métallique colloïdal en extrême dispersion huileuse amicroscopique.

Ampoules de 2 cc., dosées à 0 gr. 040 de bismuth métal par cent. cube. Antisiphilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien.

Ses avantages sont : assimilation facile, toxicité faible, absence de douleur, grande activité.

**Posologie et mode d'emploi.** — L'AMPHOMUTH est habituellement administré par séries de 12 injections musculaires fessières de 2 cc., deux fois par semaine, avec un repos de trois semaines avant la série suivante. Mais le médecin est seul juge des doses, de la durée de traitement et de l'intervalle à laisser entre chaque série.

**Adultes :** environ 2 centimètres cubes d'AMPHOMUTH.

**Enfants :** jusqu'à 3 mois : 1/10 à 2/10 de centimètre cube.

De 3 mois à 1 an : 2/10 à 4/10 de centimètre cube.

De 1 an à 8 ans : 4/10 de centimètre cube à 1 centimètre cube.

De 8 ans à 16 ans : 1 centimètre cube à 2 centimètres cubes.

En boîte de 12 ampoules injectables de 2 cc.

### LABORATOIRES RONCHÈSE DE THÉRAPEUTIQUE

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris, 62, rue Charlot (III<sup>e</sup>). — Tél. : Turbigo 72-34.

## AMPHOPROPHYL

### T. A. B. RONCHÈSE

à ingérer.

Vaccin antitypho-paratyphique Préventif.

**Composition.** — Suspension de corps microbiens de bacilles typhiques et paratyphiques A. et B. avec addition des lysats correspondants.

**Indications.** — L'Amphoprophyl T. A. B. à ingérer est un agent préventif des affections à bacilles d'Eberth et à bacilles paratyphiques A. ou B.

**Posologie.** — **Adultes et adolescents :** Pendant 6 jours consécutifs, avaler le matin à jeun (au moins une heure avant le petit déjeuner) une pilule de bile et, un quart d'heure après, absorber le contenu d'une ampoule de vaccin dilué dans un peu d'eau.

**Enfants :** demi-dose.

Innocuité absolue ; Aucune réaction ; Peut être appliqué à tous les âges.

Cette vaccination doit être renouvelée chaque année.

En boîte de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile.

### Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III<sup>e</sup>). — Tél. : Tur. 72-34.

## AMPHOSTABYL

Comprimés.

Médication stabilisatrice et équilibrante des dystonies vago-sympathiques et méso-sympathiques.

Tonicardiaque, Sédatif, Régulateur des systèmes neuro-végétatifs et autonomes périphériques

**Formules.** — Ess. marjolaine, 0,066. — Ext. de ballote, 0,01. — Ext. anémone, 0,01. — Ext. passillore, 0,02. — Ext. oratacus, 0,04. — Ext. de boldo, 0,01. — Ext. valériane, 0,05. — Peptones polyvalentes, 0,03. — Ext. de jusquiame, 0,01. — Phényl-éthyl-urimido-propane-diméthyl-aminophényl-diméthyl-pyrazolone, 0,05

Comprimés.

**Doses.** — 3 à 6 comprimés par jour par séries séparées.

**Diffusion.** — Strictement médicale.

1° **Troubles cardiaques :** tachycardie, palpitations, éréthisme, angine de poitrine, spasmes vasculaires, hypertension artérielle.

2° **Troubles digestifs** d'origine nerveuse : dyspepsies nerveuses, spasmes digestifs.

3° **Troubles respiratoires :** asthme, dyspnée, coryza spasmodique,

4° **Troubles nerveux :** nervosisme ; états anxieux, névralgies, migraines, insomnies, psychasthénie, émotivité, surmenage nerveux, mal de mer.

5° **Troubles endocriniens :** hyperthyroïdie, Basedow, dysménorrhée, règles douloureuses, ménopause, tétanie.

Laboratoires M. DE RIVE

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux, 11 bis et 13, rue Levert, PARIS (XX<sup>e</sup>).

## AMPHO-STOMATOGE RONCHÈSE

**Composition.** — Gelée-vaccin adhérente, contenant une très forte proportion (75 %) de bouillon-vaccin polymicrobien, polyvalent (Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Coccobacilles de Pfeiffer, Staphylocoques).

**Avantages.** — Éminemment absorbable par les muqueuses, il adhère parfaitement aux tissus humides de la cavité buccale. Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Pansement des alvéoles enflammées, des clapiers pyorrhéiques, des fistules dentaires, des plaies gingivales, etc.

**Mode d'emploi.** — Introduire la gelée-vaccin dans la cavité (alvéole, clavier pyorrhéique, fistule, etc.) ou la déposer sur la partie à traiter en se servant d'une gaze, d'un coton ou d'une mèche. De plus, ce produit peut être employé en massage léger et fréquent des gencives, dans le cas particulier de pyorrhée alvéolaire.

**Public :** tubes de 20 gr. environ (modèle A).

**Pour le cabinet :** tubes de 40 gr. environ avec l'ALVÉOLO-CANULE (nécessaire pour pansement des alvéoles) (modèle B). Tubes de 40 gr. environ (modèle C).

### Laboratoires des AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie,

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III<sup>e</sup>). — (Tél. : Tur. 72-34.)

## AMPHOSYNTHYL

Polonovski et Nitzberg.

Association de Salicylate de Génésérine et de Génatropine.

**Formes.** — Granules au 1/2 mgr. de Génésérine et 1/4 de mgr. de Génatropine. Gouttes : 1 cc. = XXX gouttes, soit : 1 mgr. de Génésérine et 1/2 mgr. de Génatropine.

**Indications.** — Aérophagie, Troubles dyspeptiques complexes, Troubles dyspeptiques des vésiculaires, Mal de Mer, Troubles complexes du rythme cardiaque.

**Mode d'emploi.** — Deux Granules, XXX Gouttes trois fois par jour.

**Prix au public :**

Le flacon Granules ou Gouttes : 29 fr. 30.

Chaque flacon correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-Vaccin rhino-pharyngien.

**Composition.** — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles* de Friedländer, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles* de Pfeiffer, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

**Indications.** — Véritable gargarisme sec aux antiviruses. Immunisant et curatif. — Traitement des angines, irritations de la gorge, toutes les infections buccales : gingivo-stomatites, pyorrhée alvéolaire, accidents de dents de sagesse, etc... — Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

**Doses. Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

En flacon de 70 comprimés.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III°). — Tél. : Turbigo 72 34

## AMPHOTONYL

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

**Composition :**

Phényl-éthyl-malonyl-urée ( <i>gardénal</i> )...	0,02
Extrait de belladone .....	0,002
Para-acéphététidine ( <i>phénacétine</i> ) .....	0,10
Extrait fluide d'aubépine .....	0,05
pour un comprimé.	

**Forme pharmaceutique.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications thérapeutiques.** — Analgésique. Sédatif général. S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques. Spasmes douloureux, Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

**Action très efficace. Aucune contre-indication.**

**Doses.** — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 23 fr. 20.

**Échantillons, littérature :**

Laboratoires INGÉ

14, rue Maubland, PARIS (XV°). (Tél. Vaugirard 88 90.)

## AMPOULES ANTI-H

(H = symbole de l'acidité).  
Médication stomacale.

**Présentation.** — 14 ampoules buvables.

**Composition.** — Suspension colloïdale de silicate d'alumine et de sodium.

**Action.** — Action non pas chimique, par neutralisation, mais physique par formation en présence de l'acidité stomacale d'une bouillie gélatineuse à la fois fixatrice d'acide (hyperchlorhydrie), modératrice (hypermotricité et spasme du pylore) et protectrice (pansement physiologique de l'ulcère).

**Indications.** — Traitement héroïque et d'une incontestable absolue des gastralgies, dyspepsies, hyperchlorhydrie, hypermotricité et spasme du pylore, ulcères, aérophagie.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule dans un peu d'eau après les 2 repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 25 fr. 80.

Laboratoires REYGAQUE

160, avenue d'Italie — PARIS. (Tél. : Gobelins 90-00.)

## AMPOULES AUTO-INSTILLABLES NADER

Instillations endo-nasales.

Centro-réflexothérapie.

Sollicitations des réactions bulbaires.

Aucune contre-indication.

Asphyxie des nouveau-nés.

### Laboratoires NADER

6, rue de l'École — VERSAILLES  
(Seine-et-Oise).

## AMPOULES BOISSY

pour Inhalations.

### AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des  
Médicaments sous le n° 218-12.

**Indications.** — Angines de poitrine, Hémoptysies,  
Syncope, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer,  
Migraines, etc.

### AMPOULES BOISSY D'IODURE D'ÉTHYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des  
Médicaments sous le n° 218-13

**Indications.** — Asthme, Emphyseme, Coqueluche,  
Dyspnées de toute nature.

**Mode d'emploi.** — Chaque ampoule est renfermée  
dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas  
retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant  
l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui  
s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.  
Durée d'utilisation : suivant fréquence des crises.

Prix : 19 francs la boîte de 12 ampoules.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV°).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

## AMPOULES FERRUGINEUSES FRAISSE

### Composition :

Glycérophosphate de Soude ..... 0 gr. 10  
Cacodylate de Strychnine ..... 1/2 milligr.  
Cacodylate de fer ..... 0 gr. 01  
Eau distillée ..... 1 cc.

**Indications.** — Anémies, Chlorose.

**Forme.** — En ampoules de 1 cc. (boîte de 12 ampoules).

**Posologie.** — Une ampoule tous les jours dans le  
tissu musculaire.

**Prix :** boîte de 12 ampoules : 22 fr. 90 (12 jours de  
traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-8.

Laboratoire FRAISSE Père et Fils  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES FRAISSE

### Composition :

Glycérophosphate de Soude ..... 0 gr. 10  
Cacodylate de Strychnine ..... 1/2 mill.  
pour 1 cc. d'eau distillée.

**Indications.** — Dynamogénique puissant.  
Asthénie, Neurasthénie.

**Forme.** — En ampoules de 1 cc. (boîte de 12 ampoules).

**Posologie.** — 1 ampoule tous les jours.

**Prix :** boîte de 12 ampoules : 22 fr. 90 (12 jours de  
traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-7.

Laboratoires FRAISSE, Père et Fils  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## AMPOULES REIPAR

**Composition.** — Solution d'acide salicylique injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu. Toutes les algies rhumatismales. Sciatique. Lumbago.

**Aucune contre-indication.**

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées ou intramusculaires *loco dolenti*. Le Reipar porte l'acide salicylique là même où il doit agir.

Pour la voie intraveineuse : Intra-Reipar (*Voir ce mot*).

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 21 fr. 10.

Pris spéciaux pour pharmaciens, cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques.

Échantillons et littérature sur demande.

**LES LABORATOIRES DRAPIER**  
RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

## AMPOULES SCLÉROSANTES FRAISSE

**Formule :**

Chlorhydrate de Quinine.....	0 gr. 40
Uréthane.....	0 gr. 20
Eau distillée.....	3 cc.

**Indication.** — Pour la sclérose des varices.

**Prix :** Boîte de 6 ampoules, 23 fr. 45.

## AMPOULES SCLÉRO - HÉMORROÏDIQUES FRAISSE

**Formule :**

Chlorhydrate de Quinine et Urée.....	0 gr. 25
Eau distillée.....	5 cc.

**Indication.** — Pour la sclérose des hémorroïdes.

**Prix :** Boîte de 6 ampoules : 23 fr. 45.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## AMPOULES « VIGOR »

**Composition :**

Cinnamate de Benzyle.....	0,050
Cholestérine.....	0,125
Camphre.....	0,150
Lécithine.....	0,050
Lécithines D.....	500 Unités Internationales.
Huile d'Olive stérilisée, Q. S.....	pour une ampoule de 5 cc.

**Propriétés.** — Puissement reconstituant, non toxique, à effet durable renforcé par la présence des Vitamines D, en solution huileuse. Son emploi nouveau en injections intramusculaires contrôlé par de multiples essais en clientèle et en milieu hospitalier se révèle avec cette voie directe comme présentant le maximum d'efficacité.

**Indications.** — Convalescence de maladies infectieuses ; Convalescence à la suite d'interventions chirurgicales ; Anémies sans origine bien déterminée ; Pré-tuberculeux ; Tuberculoses en évolutions (même fébriles) ; Lymphatismes ; Tous les états asthéniques.

**Contre-indication.** — Aucune.

**Posologie et Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 jours dans les cas moyens. — Une ampoule tous les jours dans les cas où un résultat rapide est recherché.

**Important.** — A employer uniquement par la voie *intramusculaire*.

**Nota.** — Boîtes de 10 ampoules pour un traitement de 20 jours.

**Prix au public :** 34 fr. 20. (Autorisation ministérielle du 6 février 1942.)

**Laboratoires VIGOR**

26, Chaussée de la Madeleine. — NANTES (Loire-Inférieure).

(Tél. 149-78.)

## AMYBDINE

**Composition.** — A base d'acide 7-Iodo-8-oxyquino-léine-5-sulfonique solubilisé par addition d'une proportion titrée de bicarbonate de sodium. Ainsi solubilisé, cet acide contient 27 p. 100 d'iode environ.

**Indications.** — Traitement spécifique des dysenteries amibiennes et bacillaires.

Traitement de certaines maladies infectieuses des voies urinaires et biliaires.

**Forme :**

1<sup>o</sup> Pilules dosées à 0 gr. 25 (bicarbonate de soude compris).

En flacon de 25 et 50 pilules.

2<sup>o</sup> Poudre solubilisée.

En flacon de 10 gr., 25 gr., 50 gr.

**Laboratoire de l'AMYBDINE**

**E. RUEYRES, Pharmacien**

44, avenue Pasteur — COURBEVOIE-PARIS  
(Seine).

(Tél. : Défense 02-02.)

## AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance des Céréales germées.

**Formes.** — Comprimés et Sirop.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés ou deux cuill. à soupe de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiasse ou une cuillerée à soupe de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop 21 fr. 90 ;  
La boîte de comprimés : 17 fr. 20.

Laboratoire des Ferments  
du Docteur A. THÉPÉNIER

10, rue Clapeyron — PARIS.  
(Tél. : Europe 58-97.) — C. 150.854.

## ANACLASINE INFANTILE

États digestifs et cutanés. — Anaphylaxie

**Composition.** — Hyposulfite de soude et de magnésium associés à des polypeptides spécifiques.

**Indications :**

**Troubles digestifs :** Etat saburral, inappétence, nausées, déficience hépatique, intoxication alimentaire, troubles de l'assimilation.

**Dermatoses :** Urticaire, eczéma, prurit, œdème de Quincke, éruptions.

**Phénomènes neuro-endocriniens et diathésiques :** Migraines, Insomnies, Vaso-dilatation et Vaso-contraction périphériques, Accidents sériques.

**Posologie.** — *Granulé :* Jusqu'à 3 ans : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Au delà de 3 ans : 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, de lait ou à croquer.

Prix : 21 fr. 90.

Laboratoires A. RANSON  
Docteur en pharmacie

96, rue Orfila — PARIS (XX<sup>e</sup> Arr<sup>e</sup>).  
(Tél. : Mémilmontant 62-81, 62-82.)

## ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Cytophylaxie.

L'Anaclasine Ranson (ἀνά — contre; χλασις — choc) est une préparation anti-anaphylactique, polyvalente et cytophylactique.

**Forme.** — Comprimés et Granulé.

**Action.** — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépato-biliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension.

**Composition.** — L'Anaclasine comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et, d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques (20 peptones différentes).

**Indications.** — Anaphylaxie alimentaire, états hépatiques, intolérance digestive, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foies, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes.

**Doses journalières.** — *Adultes :* 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

*Enfants,* au dessus de 10 ans : de 1 à 3 comprimés par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Anaclasine infantile (Voir ci-contre la notice).

Durée du traitement : minimum 15 jours.

Prix : Granulé : 22 fr. 60. — Comprimés : 20 fr. 10.

Laboratoires de L'OPOCALCIUM  
A. RANSON, Docteur en Pharmacie.  
96, rue Orfila — PARIS.  
(Tél. : Mémilmontant 62-81 et 62-82.)

## ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A. solution, B. cachets.

**A. Solution.**

Une cuillerée à soupe contient :

Pyramidon .....	0 gr. 30
Antipyrine .....	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 10
Caféine .....	0 gr. 05

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café pleine d'eau chaude et très sucrée. Il est important de sucrer largement.

**B. Cachets.**

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon

**Indications.** — Migraines, Névralgies. Sciatique, Paludisme

Sous réserve des possibilités de fabrication.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris,  
17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## ANALGÉSIQUE KAFA

Combinaison de phénacétyl, amidopyrine et caféine, suractivés par un catalyseur végétal.

**Indications.** — Contre toutes algies.

Tolérance absolue à l'égard de l'estomac et des reins. Élimination totale en 2 à 3 heures. Spécialement indiqué pour traitements prolongés. Antithermique. Antispasmodique. Fébrifuge.

**Mode d'emploi.** — 1 à 5 paquets par jour. Présentation en paquets dosés et en cachets.

### Laboratoires MÉDIAL

8, chemin de Montbrillant — LYON (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Moncey 42-89.)

## ANALGÉSOL MARCEL LOGEAI

**Présentation.** — Pommade pour usage externe.

**Composition.** — Menthol, Salicylate de gaïacol, Excipient.

### Indications :

**Curatif :** Névralgies intercostales, Névralgies faciales, Névrites, Rhumatismes, Sciatiques.

**Préventif :** Angine, Otite, Oreillons.

### Posologie :

**Névralgies intercostales :** 3 applications à 1/2 heure d'intervalle, en onction locale, continuer 3 applications par jour, pendant 4 à 5 jours.

**Névralgies :** faciales, dentaires, etc., 2 à 3 applications à 1/4 d'heure d'intervalle. Névrites, Rhumatisme, Sciatique, Lumbago, 3 applications par jour, pendant 5 à 6 jours.

**Préventif :** une application matin et soir sur les régions parotidiennes et sous-maxillaires.

**Contre-indications.** — Ne jamais appliquer sur les muqueuses.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS (V<sup>e</sup>).  
Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## ANAPYOL

Pommade antiseptique cicatrisante.

(Formule expérimentée à l'hôpital Saint-Louis.)

**Composition.** — Oxyde jaune de Hg, Acide salicylique, Ichtyol, Oxyde de zinc, Lano-vaseline, Essences antiseptiques et aromatiques.

**Indications.** — Topique d'une efficacité reconnue dans toutes les lésions suppurées et infectées de la peau, ANAPYOL est d'un emploi courant dans la clientèle où il peut être prescrit pour les affections suivantes : Eczémas chroniques et Eczémas aigus infectés, Ulcères variqueux et Ulcérations de toutes natures, Pyodermites, Impétigos, Gourme, Acné, Séborrhée, Dartres, Blépharites.

Laboratoire de l'Angiolympe du D<sup>r</sup> ROUS  
D. SEVENS, Pharmacien

9, rue Soyier — NEUILLY (Paris).

## ANAQUINTINE LESCÈNE

**Composition.** — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

**Forme.** — Liquide rosé pour usage externe, entièrement miscible à l'eau (inhalations froides, compresses, gargarismes).

**Indications.** — Rhumes, Sinusites, Grippe, Toux spasmodiques, Coqueluche. Prophylaxie des contagions, Angines.

**Mode d'emploi.** — *Pure :* pulvérisations ou aspersions dans les pièces, sur vêtements, draps, linge, mouchoirs. (Toux, Rhumes, Grippe, etc.)  
Inhalations froides sur mouchoir et dans les mains.

*Diluée* (Toux, grippe, coqueluche) : compresses sur la gorge et la poitrine. Diluer dans 4 parties d'eau chaude. Recouvrir de coton cardé ou d'une étoffe de laine. Laisser en place toute la nuit. *Gargarisme :* angines, adénoïdites, 1/2 cuillerée à café d'Anaquintine, plus une cuillerée à café de Borate de Soude dans un verre d'eau chaude.

Anaquintine gouttes nasal.-s.

(Voir RHINAQUINTINE.)

### Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## ANATENSYL

### Composition :

Nitrite de soude.....	0,05
Trinitrine (sol. 1 %).....	1 goutte 1/2
Bromure de sodium.....	0,25
Sulf. spartéine .....	0,01
Urotéine ( $C_7H_7NaN_4O_2$ , $C_7H_5O_2 Li$ ) .....	0,15
Extrait gui .....	0,02
Excipient.....	Q. S. p. XXV gouttes. (Unité de prise.)

**Indication.** — Hypertension.

**Présentation.** — Gouttes.

**Posologie.** — XXV gouttes trois fois par jour.

**Laboratoire d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**  
20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## ANAUURAL

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Phényl-éthyl-malonylurée, phényl-méthyl-malonylurée, borotartrate de calcium.

**Indications.** — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

**Doses.** — 2 à 3 comprimés par jour.

**Prix :** 25 fr. 70 (20 jours de traitement).

**Laboratoires BARTHÉLEMY**

1, place Forbin  
AIX-EN-PROVENCE  
(Tél. : 1-70.)

## ANAXÉRYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-25.

**Forme.** — Pommade (tube).

**Composition.** — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thiéolaidinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Antiparasitaire, Antipsoriasique.

**Indications.** — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

**Mode d'emploi.** — Appliquer l'ANAXÉRYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate. Éviter le contact de l'Anaxéryl avec les muqueuses.

Prix en France : 16 fr. 30.

**Laboratoires A. BAILLY**

(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30).

## ANDROCALCION

### Forme H

**Composition.** — Calcium, Magnésium, Phosphore, associés à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Ménopause masculine, Préventif des troubles de la Cinquantaine, Traitement de ses accidents.

Troubles endocriniens, nervosité chez la femme non mariée.

**Propriétés.** — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

**Doses.** — Trois à quatre dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

### Forme E

**Composition.** — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, hormone gonadotrope. Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

**Présentation et Doses.** — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 à 4 dragées trois fois par jour. 12 jours par mois.

Prix : 29 fr. 30.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS.  
(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

## ANDRO-GOUTTES

**Opothérapie orchitique renforcée.**

Fractions lipo-soluble et hydro-soluble de la glande.  
Glande interstitielle + glande spermatogénétique.

**1 cc. = 50 gr. de testicule frais de taureau.**

**Indications.** — *Chez l'enfant:* Troubles du développement génital; *Chez l'adulte:* Asthénie sexuelle, Sénilité précoce, Adiposité (par diminution du métabolisme), Surmenage; *Chez le vieillard:* Adénome de la prostate.

*Chez la femme:* Troubles de la puberté et ménopause, Carence sexuelle, Troubles nerveux.

**Posologie.** — XV à XX gouttes par jour en deux prises dans un peu d'eau, à jeun. (On peut augmenter ces doses sans inconvénient.)

**Opothérapie complémentaire chez la femme:** aux mêmes doses dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

**Laboratoire ISOVESCO**

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 04-39.)

## ANDROSTHÉNOL

Complexe d'extraits androïque et thymique, désalbuminé et délipidé.

**Indications.** — *Chez l'enfant et à la puberté:* traitement de la cryptorchidie, retard de la puberté, syndrome adipo-génital, intelligence tardive, inattention.

*Chez l'adulte:* asthénie musculaire ou intellectuelle, hypogénitalisme, accidents urinaires dus à l'hypertrophie de la prostate.

**Posologie.** — *Enfants:* 1 ampoule buvable ou 5 dragées par jour.

*Adultes:* 2 ampoules buvables ou 10 dragées par jour. A prendre à jeun ou très loin des repas.

**Présentation :**

Boîte de 10 ampoules buvables : 33 fr.  
Étui de 40 dragées : 17 fr. 10.

**Laboratoires du Docteur F. DEBAT**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## ANDROSTINE

**CIBA**

**EXTRAIT ORCHITIQUE HYDROSOLUBLE.**

**Action physiologique.** — *Chez la femme:* Équilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. (Peut se formuler en association avec Agomessine ou Sistomessine suivant le cas.) *Chez l'homme:* Activateur de la spermatogénèse. — *Dans les deux sexes:* Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

**Indications.** — *Chez la femme:* Troubles de la ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme:* Asthénie post-infectieuse, Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes:* Obésité, engelures, acrocyanose, diabète.

Comprimés.

**Doses.** — 3 à 9 comp. par jour.

**Formuler.** — Flacon de 40 comprimés.

(Voir PERANDRONE.)

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## ANDROTESTONE

L'Hormone mâle est préparée sous 2 formes :

*Androtestone propionate :* Propionate de Testostérone.

*Androtestone acétate :* Acétate de Testostérone.

**Indications :** 1<sup>o</sup> *Androtestone propionate* est surtout indiqué chez l'homme.

*Chez le jeune garçon :* infantilisme génital, cryptorchidie, syndrome adipo-génital.

*Chez l'homme âgé :* asthénie génitale, Prostatisme, hypertrophie de la prostate.

2<sup>o</sup> *Androtestone acétate :* *Chez l'homme :* Adénome prostatique.

*Chez la femme :* Mastopathies prémenstruelles, Métrorragies, Troubles dus à l'hyperfolliculinaire.

**Présentations :**

1<sup>o</sup> *Androtestone acétate.*

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 10 mgr. 75 francs.

— 1 — 1 cc. — 40 mgr. 60 —  
— 5 — 1 cc. — 275 —

2<sup>o</sup> *Androtestone propionate.*

Boîte de 4 ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr. 45 francs.

— 1 — 1 cc. — 10 mgr. 75 —  
— 2 — 1 cc. — 25 mgr. 75 —

**Mode d'emploi :** Injections intramusculaires.

**Posologie** variable à fixer par le médecin. A titre d'indication.

*Hypertrophie prostatique.* Androtestone propionate : 10 injections à 40 mgr. à raison de 2 injections par semaine.

*Chez la femme :* Les mastopathies nécessitent des cures de 200 à 250 mgr. d'Androtestone cétate (injections tous les deux jours).

**Laboratoire pour la diffusion des produits synthétiques**

Léonce GODEAU, pharmacien

73, rue Dutot — PARIS (XV<sup>e</sup>)

## ANDROVAR

(Gouttes.)

Traitement de choix des troubles ovariens.

**Composition :** { Orchitine (discrète).  
Gouttes à base { Thyroïde (dose réduite).  
d'extraits { Hypophyse (lobe antérieur).

**Indications.** — Tous les troubles de la fonction ovarienne : Puberté, Aménorrhée, Dysménorrhée, Nervosisme, Carence sexuelle (célibataires et veuves de fait et de « principe »), Ménopause, Obésité.

**Présentation :**

Gouttes : Flacon compte-gouttes de 20 cc. = soit 600 gouttes environ.

Demi-flacon compte-gouttes de 10 cc. = soit 300 gouttes environ.

**Posologie :**

XXX à LX gouttes *pro die* en deux ou trois fois, loin des repas si possible (sinon, faire absorber avant le repas, dans un peu d'eau).

**Laboratoires ANDROVAR**

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).  
(Tél. : Entrepôt 13-97.)

## ANDROVULES

(Ovules.)

Traitement de choix des affections gynécologiques liées ou non à une insuffisance ovarienne. (Opothérapie complémentaire par voie naturelle.) Antiseptique, Décongestif.

**Composition.** — Orchitine (absolument discrète), Sulfate neutre d'oxyquinoléine, Glycérine solidifiée.

**Indications.** — D'une part, toutes les affections gynécologiques (métrites, salpingites, annexites, etc.) et, d'autre part, tous les troubles de la fonction ovarienne (aménorrhée, dysménorrhée, nervosisme, carence sexuelle, etc.). (Voir également Androvar.)

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules.

**Posologie.** — 1 ovule le soir au coucher (faire garnir la malade).

Le traitement de 20 jours par mois pour les cas rebelles sera très utilement complété par l'Androvar.

Les Androvules ne tachent pas.

**Laboratoires ANDROVAR**

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).  
(Tél. : Entrepôt 13-97.)

## ANÉGRINE

**Composition :**

Acide quinoléique carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

**Action :**

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

**Indications :**

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

**Mode d'emploi :**

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en 2 ou 3 fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

Prix : Comprimés et Cachets : 23 fr. 20.

**Laboratoires RIVIER**

10, passage Merel — MONTROUGE (Seine).  
(Tél. : + Alésia 22-46.)

## ANEXOL

**Principe actif.** — Sel sod. acid. sulfam. toluène monochl. (chloramine T.)

**Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.**

**Principe de la javellisation, sans ses inconvénients.**

**Doses.** — Pour 1 litre d'eau chaude :

Sterilisation de l'eau ..... 1 comprimé.  
Gargarismes..... 1 à 2 comprimés.  
Urologie et gynécologie. 2 à 4 comprimés.  
Pansement des plaies... 4 à 6 comprimés.

**Prix :**

19 fr. 50 la double boîte de 80 comprimés.  
12 fr. 50 la boîte de 40 comprimés.

**Laboratoires DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.



## ANGÉIOL

(Gouttes.)

**Composition.** — Extraits sélectionnés de : Citronnelle, Fleurs d'orangers, Tilleul, Uva-Ursi, Prêle, Genêt.

**Doses.** — XV gouttes une à trois fois par jour, loin des repas, 20 jours par mois, arrêt 10 jours, et reprise à la même cadence. En cas de réapparition des troubles et des maux pendant la période de repos, reprendre immédiatement le traitement, et le continuer par la suite.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif nervein, absolument atoxique, remplace avantageusement les malonylurés, barbituriques. Faible hypotenseur.

**Applications.** — Déséquilibre vago-sympathique, états anxieux, émotivité, éréthisme nerveux même d'origine toxique, éthyliisme. Pléthoriques, spasmes vasculaires, troubles labyrinthiques, algies précordiales.

**Prix :** le flacon, 25 fr. 50.

Demandez échantillons à **Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques**, 10, rue Pont-aux-Chèvres, à Fontenay-le-Comte (Vendée). Dépôt : O. C. P., 43, rue des Francs-Bourgeois, à Paris, et Établissements Darrasse Frères, 13, rue Pavée, à Paris.

**Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques**

10, rue Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE (Vendée).

## ANGIHORMOL

du Docteur P. BOURGGRAFF

**Composition:**

Pancréas (Extrait total) .....	} 0,05
Ovarine .....	
Orchitine .....	
Hypophysine (glande totale) .....	
Prostatine .....	} aa 0,02
Placentine .....	
Parathyroïdine .....	0,001

**Propriétés.** — L'Angihormol, grâce aux propriétés énergiques des glandes endocrines, agit tout particulièrement sur les veines et sur les varices en stimulant les contractions du muscle veineux, atone.

**Indications.** — Porteurs d'Ulcères Jambiers des deux sexes, Varices, hémorroïdes, périphlébites (déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux).

**Remarques.** — L'emploi de l'Angihormol doit être suspendu pendant la période de menstruation.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas.

Demandez les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF.

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

**Laboratoires du PRATICIEN**

HUIGNY GODBRANCE (Meurthe-et-Moselle).

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## ANGIOLYMPHE

du Docteur ROUS

Extrait végétal d'Orchidées (*Orchis mascula*).

Profond modificateur du terrain, dont il exalte les réactions de défense  
**AUCUNEMENT TOXIQUE.**

Ne provoque aucune réaction générale ou de foyer.

**Indications.** — Prétuberculose, tuberculose. États déficients.

*Dans les formes pulmonaires :*

EUPHORIE manifeste. BAISSSE de la température. DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs et autres symptômes.

AUGMENTATION de l'Appétit, du Poids, des Forces. AMÉLIORATION rapide de l'état général.

AMELIORATION des signes stéthoscopiques. DIMINUTION et DÉGÉNÉRESCENCE des Bacilles de Koch.

Dans les formes ganglionnaires osseuses, etc. AMÉLIORATION rapide de tous les symptômes.

**Posologie.** — 2 à 5 cc. en une injection intramusculaire quotidienne par séries de 8 à 12. Repos d'une dizaine de jours et reprise. Compresses dans les manifestations chirurgicales (fistules, etc.).

Prix : 34 fr. 50 la boîte de 6 ampoules.

**Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE du D<sup>r</sup> ROUS.**

9, rue Sayer — NEUILLY (Paris)

D. SEVENS, Pharmacien

## ANGIOXYL

**Composition.** — Extrait pancréatique désinsuliné.

**Propriétés.** — Action trophique vasculaire, vago-tonisante et hypotensive.

**Indications.** — Angine de poitrine, Artérites, Spasmes vasculaires, Artériosclérose, Ulcères trophiques, Hypertension.

**Présentations.** — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. Sirop, flacon de 150 cc.

**Posologie.** — Ampoules : 2 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire, par séries de 10 à 20 jours.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à dessert, par jour.

Prix au public :

Ampoules : 31 fr. 70. — Sirop : 24 fr. 60.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxystases.

S. A. au capital de 1 000 000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 68-22.)

## ANGORAL

Antispasmodique complet.

Régulateur du système neuro-végétatif.

**Indications principales.** — Tachycardies, palpitations, extra-systoles, angoisses cardiaques, angine de poitrine, asthme, insomnies, mal de mer. Déséquilibre du système vaso-sympathique cardiaque, notamment ceux de la ménopause et de la maladie de Basedow.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés non glutinisés.

**Composition.** — Un comprimé contient :

Extr. stabilisé de fleurs de Cratægus ....	0 gr. 03
Extr. stabilisé de Valériane .....	0 gr. 03
Extr. stabilisé de Passiflore .....	0 gr. 01
Sulf. de Spartéine (du Genêt) .....	0 gr. 015
Phényléthylmalonylurée .....	0 gr. 018

**Posologie.** — Dose moyenne : 1 ou 2 comprimés au début des deux principaux repas, jusqu'à sédation des phénomènes pathologiques. Suspendre quelques jours et reprendre la médication s'il est besoin.

Prix : 20 fr. 10 le tube (8 à 15 jours de traitement).

Non soumis à la Réglementation des substances vénéneuses.

**Laboratoires CHAMBON**

Place Francheville — PÉRIGUEUX.

(Tél. : 4-43.)

## ANGUSTURYL PORCHER

Gouttes.

A base d'écorce d'Angusture (*Galipea Cusparia*) en association synergique avec Gentiane, Centaurée, Écorce de Cascarille (*Croton Eluteria*).

**Amer aromatique** d'action gastrique triple :

Provoque l'afflux du « Suc d'appétit » réflexe.

Détermine une intense sécrétion chlorhydrique suivie de leucopédèse.

Exalte la motricité gastrique.

**Médicament type de l'inappétence**  
sous toutes ses formes.

**Mode d'emploi.** — 10 minutes avant chaque repas dans un peu d'eau sucrée.

**Adultes :** XX à XXX gouttes.

**Enfants :** de 5 à 8 ans : VI à X gouttes;  
de 9 à 12 ans : de XII à XV gouttes.

**Laboratoires PORCHER**

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 69-03.)

## ANIODOL EXTERNE

Le plus puissant antiseptique externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformalglycérine  
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

**Formes.** — Solution normale, dose pour 20 litres ; solution concentrée, dose pour 30 litres ; comprimés, boîte de 30 doubles comprimés pour 60 litres ; poudre ; ovules, boîte de 6 ovules ; pommade.

**Indications.** — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

**Mode d'emploi et doses.** — Normale : 1 cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) : 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Pommade : plaies, accouchements, rhinologie.

**Poudre :** — L. N. C. 804-8.

**Comprimés :** — L. N. C. 804-9.

**Solution externe :** L. N. C. 804-4 et 5.

Prix : 11 fr. 50.

**Ovules :** L. N. C. 804-7.

Prix : 16 fr. 40

**Pommade :** L. N. C. 804-6.

Prix : 3 fr. 50.

**Laboratoires de l'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE

(Tél. : Longchamp 07-26.)

## ANIODOL INTERNE

Le plus puissant antiseptique interne, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

**Forme.** — Gouttes, flacon de 50 cc.

**Indications.** — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, grippe, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

**Mode d'emploi et doses :**

*Nourrissons :* III à V gouttes à chaque tétée.

*Enfants :* XX à L gouttes.

*Adultes :* XXX à CC gouttes.

Par jour, dans une tasse de liquide quelconque, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

Prix : 19 fr. 60

Enr. au L. N. C. sous le N° 804-3.

**Laboratoires de l'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).  
(Téléphone : Longchamp 07-26.)

## ANKYLOSYL

**Composition.** — L'*Ankylosyl* est une préparation à base d'Iodure de Strontium additionnée de produits qui évitent l'iodisme : l'hyposulfite de sodium et des extraits de levure sélectionnés.

L'*Ankylosyl* est présenté en pilules glutinisées.

**Indications.** — Rhumatisme chronique, Raideurs et Ankyloses rhumatismales, Rhumatisme vertébral.

*L'Ankylosyl chasse le calcium.*

**Mode d'emploi. Doses.** — La dose moyenne est variable selon les maladies et l'intensité du processus pathologique.

Chaque pilule contient 0 gr. 20 d'Iodure de Strontium. La majorité des auteurs ont obtenu des améliorations remarquables en donnant de 2 à 10 pilules d'*Ankylosyl* par jour. C'est la dose efficace ordinaire.

**Présentation.** — Flacon de 40 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro 590-28.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes, rectites, prostatites.  
Suppositoires, Pommade.

**Formule simple.** — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

**Formule composée.** — Même composition que formule simple mais en plus : Adrenaline huileuse, Stovaine basique, Menthol

**Administration.** — *Crises aiguës :* Suppositoires Anodo, formule simple. *Cas habituels :* Suppositoires Anodo, formule composée. Pommade Anodo.

La caractéristique des suppositoires Anodo est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

**Mode d'emploi.** — *Suppositoires :* Un le soir en se couchant. *Crises aiguës :* Un matin et soir.

*Pommade :* Application locale, matin et soir. } Traitement pour 10 jours.

**Laboratoire LACHARTRE.**

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (V°).

(Tél. : G. B. 77-81.)

## ANOREXYL

**Composition :**

Condurango, Badiane, Colombo, associés à une Vitamine B et à la Génésérine.

**Propriétés thérapeutiques :**

Provoque l'appétit, stimulant gastrique, régularise les fonctions de l'estomac, calme les troubles du système nerveux sympathique et du plexus solaire.

**Indications :**

Toutes les inappétences, insuffisances gastriques, Gastropathies douloureuses, Troubles nerveux des fonctions digestives. Pas de contre-indications.

**Doses :**

*Chez l'adulte :* XXX à L gouttes, un quart d'heure avant le repas dans un peu d'eau.

*Chez l'enfant :* au delà d'un an, XII à XV gouttes deux fois par jour un quart d'heure avant le repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 20 francs.

**Laboratoire ARMORIL**

7 rue de l'Armorique — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 53-70.)

## ANTALEX (Liniment)

L'Antalex, présenté sous forme d'émulsion, est un médicament recommandé en médecine infantile dans le traitement de : Bronchites, Toux, Congestion pulmonaire, Pleurésie, Grippe, Douleurs intercostales et toutes affections des voies respiratoires.

### Formule :

Eucalyptol, 0, 50 ; Terpinol, 0, 50 ; Huile volatile de Térébenthine, 1,50 ; Huile de Vaseline, 0,50 ; Alcool camphré, 2,50 ; Teinture de Benjoin, 0,50 ; Teinture hydro-alcoolique de Capsicum, 94,00. Pour 100 gr.

### Indications :

Remplace avec avantage : cataplasmes, sinapismes, etc., dans le traitement des affections des voies respiratoires.

### Mode d'emploi :

En friction, badigeonnage, ou léger massage à l'endroit des points douloureux.

Prix : 8 fr. 90.

Laboratoires DISALQYL S. A. R. L.

62, rue Beaubourg — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 38-33.)

## ANTALGOL DALLOZ

**Composition.** — Quino-Salicylate de pyramidon.

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés.** — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

**Indications.** — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

**Dose.** — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 24 fr. 50.

Laboratoires DALLOZ

13, boulevard de La Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ANTALQYL

### Trois présentations :

1<sup>o</sup> **Antalqyl Cachets.** — Spécifique radical de toute douleur, apaisant neuro-végétatif. Inocuité absolue pour la muqueuse stomacale et l'épithélium rénal. Euphorie rapide.

**Formule.** — Éther diéthylique de l'urmidopropane (1,3), en combinaison avec la diméthylaminophényl-diméthyl-pyrzalone (1,23), 0gr. 40 par cachet. (Excipient inerte magnésie hydratée Q. S.)

**Indications.** — Migraines, névralgies, rhumatismes, lumbagos, sciatiques, menstrualgies, coliques hépatiques et néphrétiques, algies post-opératoires. Un cachet d'Antalqyl épargne souvent une piqûre de morphine.

Pas d'accoutumance, pas de contre-indications.

**Dose.** — 1 à 4 cachets par jour. — Prix : 15 fr. 80 la boîte de 12 cachets.

2<sup>o</sup> **Antalqyl Baume.** — A salicylate de Méthyle dissimulé et à odeur agréable. Révulsif.

**Indications.** — Rhumatisme, points de côté, sciatiques, névrites, névralgies, rhume négligé, pleurites, lumbagos, gouttes, torticolis, entorse, foulures.

**Formule.** — Acide salicylique, 2 gr. Camphre du Japon, 5 gr. Salicylate de méthyle, 10 gr. Ess. de citronnelle, 5 gr. Ess. lavande spicata, 2 gr. Méthane trichloré, 5 gr. Oxyde d'éthyle, 5 gr. Teinture térébenthinée de capsicum, 40 gr. p. 100 cc.

**Mode d'emploi.** — Frictions légères 3 à 4 fois par jour. Ne pas employer en compresses.

Prix : le Flacon 16 fr. 20.

3<sup>o</sup> **Antalqyl suppositoire.** — Enfants et nourrissons. 1 à 4 par jour selon l'âge.

Prix : 17 fr. 90.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoires M. DE IVE

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS.

## ANTASTHÈNE CARRION

**Composition.** — Association de glycérophosphates  $\alpha$  et  $\beta$  à un extrait cérébral et spinal.

**Formes.** — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

**Indications.** — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

### Posologie et mode d'emploi :

**Enfants :** 1 injection tous les 2 jours. 2 comprimés par jour aux repas.

**Adultes :** 1 injection par jour. 4 comprimés par jour aux repas.

**Présentation et prix.** — Boîtes de 12 ampoules ou de 50 comprimés : la boîte, 26 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. n<sup>os</sup> 514-3 et 4.

### Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Anjou 36-45 2 lignes groupées.)

## ANTÉLOBINE

**Composition.** — Hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse, physiologiquement titrée. Pour injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitant de l'ovaire et du testicule, agit par leur intermédiaire sur l'ensemble du tractus génital.

**Indications et posologie.** — 1° Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien : aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la formation. Prescrire, alors, 1 ampoule quotidienne de 100 unités, 6 jours par mois, de préférence dans la première moitié de la période intermenstruelle ; 2° dans les ménométorrhagies, injecter 100 unités quotidiennes dans la semaine précédant la date presumée des règles ; une fois les règles déclenchées, injecter 250 à 500 unités par jour ; 3° Cryptorchidie, infantilisme masculin, impuissance : pratiquer des séries de 15 à 20 injections de 100 unités, séparées par des périodes de repos de 8 à 10 jours ; 4° Alopécie séborrhéique : 2 à 3 injections de 500 unités par semaine.

**Présentation.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. à 100 unités-rat.  
Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. à 500 unités-rat.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 08-11.)

## ANTÉPARSINE GRÉMY

**Composition.** — Mélange d'extrait antéhypophysaire et d'hormones gonadotropes urinaires humaines (Gonadotrophines chorales), titré biologiquement à 2 Unités Lapin Grémy par ampoule.

**Propriétés.** — Stimulant de l'ovaire et du testicule.

**Indications générales.** — Toutes les déficiences antéhypophysaires.

### Posologie :

#### I. — Chez l'homme.

*Ectopies testiculaires* : 10 injections, 1 tous les 2 jours.

Repos 1 mois et recommencer une nouvelle série. En cas d'insuccès après 2 séries d'injections, envisager l'intervention chirurgicale.

*Impuissance, Infantilisme, Azoospermie, Atrophie testiculaire, Sénilité précoce* : séries de 10 injections, 1 par jour. Repos de 8 jours entre 2 séries d'injections.

#### II. — Chez la femme.

*Retards de puberté, Aménorrhées de la formation* : 10 injections, 1 tous les 2 jours. Repos 10 jours et recommencer une nouvelle série. Dans les cas rebelles, les injections peuvent être quotidiennes.

*Aménorrhées secondaires, Oligoménorrhées, Hypoménorrhées, Stérilité* : 1 injection par jour du 6<sup>e</sup> au 13<sup>e</sup> jour après les règles.

*Ménorrhagies, Métorrhagies* : 1 injection par jour pendant les 8 jours qui précèdent les règles.

*Ménopause naturelle* : 1 injection par jour du 6<sup>e</sup> au 13<sup>e</sup> jour, tant que l'ovaire est susceptible d'excitation.

Prix : Boîte de 3 ampoules : 28 fr. 15.

Boîte de 5 ampoules : 42 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 608-70.

Laboratoires GRÉMY

J. ROY et Cie, Pharmaciens

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 48-43.)

## ANTHÉLOX

**Présentation.** — Capsules à base de Géraniol et Allium cepa.

**Propriétés.** — Chassent, détruisent et parfois dissolvent les parasites intestinaux : Oxyures, Ascaris, Tricocéphales, etc., et les *Tænia*s.

En outre, agissent comme désinfectantes de l'intestin dans de nombreux cas souvent mal définis.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 4 capsules par jour aux repas. Les donner comme vermifuges, de préférence aux périodes lunaires.

Comme ténicides : 3 capsules toutes les 1/2 heures.

**Présentation.** — En tube de 24 capsules.

Laboratoire G. LESOURD

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique des D<sup>rs</sup> Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

**Indications.** — Hémorragies et États hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase préopératoire.

**Présentation.** — Boîtes de 1 ampoule de 10 cm<sup>3</sup>.

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cm<sup>3</sup>, à renouveler au besoin après quelques heures.

Prix de vente :

L'ampoule ..... 34 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## ANTHIOMALINE

(Antimonio-thiomalate de lithium).

Composé organique titrant 16 % d'antimoine, contenant du soufre dans sa molécule.

**Indications.** — Lymphogranulomatose inguinale subaiguë (maladie de Nicolas et Favre), Rétrecissement du rectum, Leishmanioses, Kala-Azar, Bouton d'Orient, Bilharzioses vésicale, intestinale, hépatique.

**Présentations.** — Boîtes de 5 ampoules de 1, 2, 3 et 4 cm d'une solution à 6 % de sel.

Boîtes contenant une série de 10 ampoules à doses croissantes (1 cm<sup>3</sup> à 4 cm<sup>3</sup>).

**Posologie.** — Injections intramusculaires parfaitement tolérées. Séries de 12 à 20 injections (2 ou 3 par semaine).

**Adulte :** débiter à 0 g. 03 de sel en augmentant chaque fois de 0 g. 03 jusqu'à 0 g. 18 ou 0 g. 24.

**Enfant :** Selon l'âge et le poids, réduire les doses de 2 à 5 fois.

Prix de vente :

La boîte d'amp. de 1 cm<sup>3</sup> : 16 francs ; 2 cm<sup>3</sup> : 20 fr. 70 ; 3 cm<sup>3</sup> : 24 fr. ; 4 cm<sup>3</sup> : 27 fr. 60.

Nécessaire contenant 10 ampoules variées : 40 fr. 20 ;

Société Parisienne d'Expansion Chimique « SPECIA »  
Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## ANTHRACALCINE

Granulé friable.

**Composition.** — Charbon animal rigoureusement décyanuré, Benzonaphtol, Urotropine.

**Indications thérapeutiques.** — Dilatation d'estomac, Pyrosis, Flatulences, États préulcéreux, Fermentations intestinales, Ptose abdominale, Aérophagie, Entérite, Affections de la vessie, Auto-intoxications, Dermatoses.

**Mode d'emploi.** — Une ou deux cuillerées à café après chacun des deux principaux repas.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL-PARIS.



## ANTHRAXIVORE

Suc de bardane, extrait de la racine fraîche au moment le plus favorable et stabilisé par procédé spécial (préservation des vitamines).

**Indications thérapeutiques.** — Furunculose, furunculose des diabétiques, anthrax, phlegmons, abcès, panaris, acnés, eczémas, psoriasis, plaies purulentes, ulcères variqueux, et toutes staphylococcies.

**Furunculose.** — Traitement d'attaque : 6 cuillerées à soupe par jour : deux matin, midi et soir immédiatement avant les repas, pendant quatre à six jours. Ensuite, pendant une semaine, une cuillerée à soupe, trois fois par jour.

**Dermatose.** — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir avant les repas, prolonger le traitement suivant la gravité des cas.

**Enfants :** par demi-cuillerées à soupe.

**Nourrissons :** par cuillerées à café.

L'*anthraxivore* se prend dilué dans un peu d'eau.

La composition uniquement végétale de l'*anthraxivore* le rend d'une innocuité absolue.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1959-3.

Echantillons sur demande.

Laboratoires PICOT

14, rue du Temple, CALAIS.

## ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Colchicine en solution idosalicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique .....	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode .....	1 gr.

Excipient. Q. S. pour 100 cc.

**Dose et mode d'emploi.** — *Accès :* Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique :* Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

**Indications thérapeutiques.** — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciaticque, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

Enregistré au L. N. C. n° 1395-1.

LABORATOIRES DE LA PHARMACIE  
DE LA PLACE ROYALE

4, rue Colbert — REIMS (Tél. : Reims 48-34).  
Compte Postal Paris 182-35. R. C. Reims 14101.

## ANTI-ASTHÉNIE LAURIAT (Ex-Lauriatol)

**Propriétés.** — Reconstituant général, accroît le dynamisme des cellules nerveuses, accélère les échanges nutritifs.

**Indications.** — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, prééclampsie, tuberculose, croissance.

**Composition.** — Pour un comprimé :

Nucléinate de Manganèse .....	0, 025
Extrait sec de Noix vomique.....	0, 0025
Salicine cristallisée.....	0, 05
Quassia amara .....	0, 05
Condurango .....	0, 05
Glycérophosphate de magnésie.....	0, 05
Phosphate tricalcique .....	0, 20
Excipient (Talc, Gomme).....	0, 20

**Forme et Avantages.** — Comprimés dragéifiés inaltérables, pratiques à emporter, aucune saveur désagréable.  
Conservation indéfinie.

**Posologie :**

**Adultes :** 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

**Enfants :** au-dessus de 8 ans : 1/2 dose. Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 16 francs la boîte de 60 comprimés.

Laboratoires LAURIAT.

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).  
(Tél. : Charlebourg 23-78.)

## ANTI-ASTHME BENGALAI

Poudre fumigatoire à base de  
solanées nitrées, digitale et menthol.

Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.

Calme la toux.

**Mode d'emploi.** — Faire brûler la valeur d'une demi-cuiller à café sur une soucoupe et aspirer doucement la fumée de préférence par les narines.

**Indications.** — Crises d'Asthme, Emphyseme, Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes, Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais  
aux mêmes principes.

Prix de l'étui (poudre) : 12 fr. 80.  
La boîte de cigarettes : 6 fr. 40.

L. N. C. n° 474-1 et 2.

Laboratoire FAGARD

LONS-LE-SAUNIER (Jura).

## ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A chaque variété d'asthme, son traitement approprié.

**Médication de fond :**

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobélie, Belladone.

**Médication complémentaire :**

particulière à chaque variété d'asthme.

*Anti-Asthme A Iodurée.* Asthme sec. Emphysème.

Catégorie provisoirement supprimée.

*Anti-Asthme B.* Balsamiques, expectorants : asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

*Anti-Asthme C.* Iodure-caféine : asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

Catégorie provisoirement supprimée.

*Anti-Asthme E.* Éphédrine naturelle à donner de demi-

heure en demi-heure dès le début de la crise.

L'Anti-Asthme E prévient et juggle la crise.

**Posologie :**

*Comprimés : Adultes :* 2 à 3 par 24 heures.

*Enfants :* demi-dose.

La forme *Sirop* est provisoirement supprimée.

**Laboratoire DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## ANTI-DIABÈTE H

Antidiabétique nouveau sans produits chimiques et sans produits toxiques. Puissant régulateur glycémique. Supprime la glycosurie.

**Composition.** — A base de *Myrtille*, de *Fabiana* et de *Galéga*.

**Indications.** — Diabète et toutes ses manifestations et complications : Gangrène, Ulcères, Phlegmons, Asthénie génitale diabétique, Incontinence urinaire, Furunculose, Acné.

Diabète infantile, Diabète des vieillards, Diabète réfractaire à l'insuline, Grossesse diabétique.

Peut s'associer à la médication insulinaire.

Aucune contre-indication. Sans intolérance.

Dispense de régime après 6 semaines de traitement.

**Présentation.** — Une boîte de 20 cm. x 10 cm. pour un traitement de 8 à 15 jours.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

*Traitement très facile à suivre.*

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

**Laboratoire ALPHA**

MONTREUX-LE-CHATEAU (T<sup>re</sup> de Belfort).

## ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

**Indications thérapeutiques.** — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante et lutte contre l'amalgrissement causé par l'excès de désassimilation.

**Composition et Mode d'emploi :**

*Elisir* contenant { 0 gr. 30 extrait de kola par verre à  
liqueur.  
0 gr. 021 saccharine par verre à  
liqueur

1 à 2 verres d'**elisir** après chaque repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Prix public : 25 fr. 10.

**Produits GONNON**

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

## ANTIDIABÉTIQUE REQUIS

Extrait concentré glyciné, inaltérable, de Vitamines B et de Diastases végétales.

**Composition.** — Feuilles de Noyer, Feuilles de Géranium Robert Myrtille des Vosges, Boldo, Artichaut, Gui, Combretum R, Noix vomique, Arnérial.

**Propriétés.** — Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Acétonurie, Acétonémie, Hyperglycémie, Vertiges, Troubles de la vue, Plaies et dermatoses d'origine diabétique, etc.

Dans les diabètes graves : *Auxiliaire précieux de l'insuline à laquelle il convient de l'associer à la dose de 6 cuillerées à café par jour.*

**Posologie.** — *Adultes :* 3 cuillerées à café par jour aux repas soit pur, soit additionné d'eau fraîche aromatisée au citron, à l'orange, à la menthe, etc.

*Enfants :* 1 cuillerée et demie à café au-dessous de 10 ans diluée dans 3 cuillerées à soupe d'eau fraîche ou de lait, à prendre en 3 fois avant les repas du matin, de midi et du soir.

Durée des flacons de vente, à la dose normale de 3 cuillerées à café : 16 à 17 jours.

**Laboratoire GERDA**

F. GERIN, pharmacien,

10, rue Jacquard — LYON (B 87-18),

## ANTIGÉNINES

**Vaccins par voie buccale.**

50 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes de bouillon-lysate.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 30 francs.

### Antigénine C. E.

*Colibacilles-Entérocoques* : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

### Antigénine C.

*Colibacilles polyvalents* : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

### Antigénine S.

*Staphylocoques polyvalents* : Anthrax, Furunculose, Staphylococcies.

### Antigénine E. P. S.

*Entéro-Pneumo-Streptocoques* : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

### Antigénine T. A. B.

*Bacilles typhiques, Para A et Para B* : Fièvres typhoïde et paratyphoïde.

**Posologie.** — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

**Aux nouveau-nés et enfants** : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

**Bouillon-Antigénine** pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 30 francs.

### Rhino-Antigénine

pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 18 francs.

### Ovules-Antigénines :

métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 20 francs.

### Laboratoires des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).  
(Anciennement 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

## ANTIGRIPPINE MIDY

**Cachets**

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dower, phénaétoïne et pyramidon, caféine, codéine (1 centigr. par cachet).

**Doses et mode d'emploi.** — GRIPPE, aux premiers frissons, prescrire de préférence : 1 cachet vers 17 heures ; 1 cachet vers 21 heures ; 1 cachet le lendemain matin ; 1 cachet le lendemain soir, si besoin est, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

Pour les adultes seulement.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antithermique, Analgésique.

**Indications.** — État grippal et fébrile, Courbature, Maux de tête. Névralgies, Influenza et complications.

Boîte de 6 cachets. Prix : 9 fr. 20.

Durée du traitement : 3 jours.

### Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 51-10 + lignes groupées.)

## ANTIPHI

**Puissant reconstituant et hématopoïétique.**

**Composition.** — As organique, Phosphore nucléinique, glycérophosphate, aliments d'épargne.

**Indications.** — Convalescences, Asthénie, Enfants chétifs, Anémie, Dépressions, Surmenage, Pré-tuberculeux et tuberculeux apyrétiques.

### Formes et Posologie :

*Elixir au goût délicieux* : après les repas, dans un petit verre à liqueur.

*Solution (sans sucre)* : au milieu du repas.

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* { 8 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour  
4 à 8 ans : 2 cuillerées à café par jour.

*Ampoules injectables indolores* 2 cc.

Mêmes principes + 0,04 Histidine (Chl) 1 par jour.

**Prix** : Élixir et solution : 19 fr. 70.

Boîte de 10 ampoules : 34 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 2025-2.

### Laboratoires ANTIPHI

RON-DES-LANDES

## ANTIPHLOGISTINE

**Composition.** — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria. Eucalyptus).

**Propriétés.** — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloûtit.

**Indications.** — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

**Particularités.** — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifestée et soins rendus faciles.

	0, 150 grammes :	11 fr. 90
Formats	I, 300 —	22 fr. 60
	II, 450 —	33 fr. 60
et Prix	III, 900 —	56 fr. 10
	IV, 2 kg. 300	109 fr. 70
	Antiphlogistine gynécologique	35 fr.
	Boîte gazes préparées.....	13 fr. 50

Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE  
B. TILLIER, Pharmacien.

11, rue Collange — LEVALLOIS (Seine.) — (Tél. : Péreire 06-77.)  
N° 57 du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

## ANTIPHYMIQUE VADAM

Ampoules injectables de 2 cc.

**Composition.** — Cholestérine en sursaturation, eucalyptol, essence de niaouli, gaulthéria, cinnamate de benzyle, iode organique, huile arachide : Q. S. P. 2 cc.

**Présentation.** — Boîte de 12 ampoules de 2 cc.  
Prix : 27 francs.

**Indications.** — Chimiothérapie anti-infectieuse pulmonaire, Suppurations bronchiques, Toux, Gripes, Tuberculoses.

**Posologie.** — 1 injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les 2 jours.

Avant l'injection, il est nécessaire de faire baigner l'ampoule pendant 2 à 3 minutes dans de l'eau bien chaude, afin de dissoudre la cholestérine en sursaturation.

Laboratoires DIDRY  
JANVILLE (Eure-et-Loir).

## ANTIPIOL

**Vaccin filtrat antipyrogène polyvalent.**  
Immunsation locale suivant la méthode de Besredka.

### Quatre formes :

- 1° Pommade pour pansements non adhérents.
- 2° Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3° Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino et oculistique.
- 4° Ovules pour gynécologie.

**Indications.** — Furoncles, Phlegmons, Abscesses, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gerçures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau, Affections gynécologiques.

### Prix :

Pommade, amp. de 10 cc. et amp. de 1 cc. 17 fr. 25  
Ovules..... 25 fr. 80

Laboratoire de Biologie Médicale  
et de Dermothérapie.

8, avenue Walkanaer — NICE.

## ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum.  
Myagrium, Laurinum, Spirea, etc.

**Indications.** — Traitement des hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oublier, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer es SUPPOSITO-CONES ANTIRRHOÏDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde, doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 31 fr. 70 — Le demi-flacon : 18 fr. 20.

La boîte de supposito-cônes : 14 fr. 70.

Laboratoires BELIÈRES  
19, rue Drouot — PARIS (IX°)

## ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

**Indications.** — Traitement étiologique du *Rhumatisme chronique* de la *Sciaticque*, du *Lambago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

**Composition.** — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium, calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

**Forme.** — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

**Mode d'emploi très important.** — Sept petits paquets par jour d'heure en heure, ou de demi-heure en demi-heure, sans discontinuer, malgré les repas ; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (5 jours de traitement)..... 18 fr. 30

Triple boîte (12 jour. de traitement)..... 42 fr. 70

Boîte cure (21 jours de traitement)..... 63 fr.

La triple boîte et la boîte-cure renferment de gros paquets, spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans ces boîtes : le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau et absorbera toutes les heures pendant 7 heures, ou toutes les demi-heures pendant 3 heures et demie, une cuillerée à soupe de cette solution.

**Laboratoires CHAMBON**

place Francheville — PERIGUEUX

(Tél. : 4-43.)

## ANTISEPTOMA

Spécifique des affections gastro-intestinales, complétant le pouvoir absorbant du *Charbon activé*, par l'adjonction de *Salicylate d'Urotropine* et de *Benzonaphtol*.

**Forme.** — Granulé sucré et anisé.

**Indications.** — Fermentations intestinales, dilatation d'estomac, aérophagie, ptose abdominale, pyrosis, États préulcéreux, insuffisance biliaire, cholécystite, colibacillose, intoxications.

**Doses :**

1 à 3 cuillerées à café après le repas.

Prix : 16 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1403-1.

**L. ROBERT, Pharmacien.**

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 70)

## ANTISPA

Médication Équilibrante et Stabilisatrice  
du Système Vago-Sympathique.

Vagotonie - Sympathicotonie.

Amphotonie.

**Indications.** — États nerveux, Anxieux, Sommeil capricieux, Crampes, Tremblements, Vertiges, Asthmes, Hoquet, Spasmes divers, Aérophagie, Troubles vasomoteurs, Troubles nerveux de la ménopause, Sueurs nocturnes, Sueurs des tuberculeux, Migraines avec état nauséux.

**Forme.** — Dragées à enrobage spécial breveté.

**Composition :**

Atropine (sulfate neutre)..... 1/4 mgr.

Éphédrine (chl.)..... 0,015

Extrait de Lobélie..... 0,002

Extrait de Jusquiame..... 0,01

**Posologie.** — Avaler sans croquer une dragée 10 minutes avant les principaux repas.

Dans les états nerveux généraux : une dragée au petit déjeuner, une dragée au coucher.

**Contre-indications.** — Mal de Bright, cardiopathie avancée, états hypertensifs.

Enregistré au L. N. C. M. n° 2025-3.

Prix : 20 fr. 90.

Laboratoire ANTIPHI — RION-DES-LANDES.

## ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques antimicrobiens.

**Antivirus colibacillaire.** — **Antivirus staphylococcique.** — **Antivirus streptococcique.** — **Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).**

**Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).**

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 14 fr. 70.

— de 12 — 4 cc. — 24 fr. 40.

— de 6 — 4 cc. — 12 fr. 20.

**Antivirus puerpéral (streptococcique).**

En boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 24 fr. 40.

**Antivirus gonococcique (Gonolyt).**

En boîtes de 6 ampoules 10 cc. 29 francs.

**Antivirus typhique.** { 1 boîte de 1 ampoule rectale de 125 cc. : 24 fr. 40.

{ 1 boîte de 2 ampoules buccales de 50 cc. : 24 fr. 40.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

**Antivirus mixte en pommade (Arapal) :**

12 fr. 20 et 6 fr. 10.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

Produits de « La BIOTHÉRAPIE »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Vaug. 11-23.)

## ANURIQUE DUPLEX

### Composition :

$\text{CCl}^1\text{CHO} - \text{C}^{11}\text{H}^{12}\text{N}^2\text{O} - \text{KBr} - \text{C}^{11}\text{H}^{12}\text{NO}^1.$

**Indications.** — Incontinence d'urine infantile, Chorée, Sommeils agités et Tics nerveux de l'enfance.

### Mode d'emploi :

De 3 à 5 ans : 1 petite cuillerée à café à 4 h. 1/2 et 1 à 6 h. 1/2.

De 5 à 7 ans : 1 cuillerée à café à 4 h. 1/2 et 1 à 6 h. 1/2.

De 7 à 9 ans : 1 cuillerée à dessert plus ou moins pleine à 4 h. 1/2 et 1 à 6 h. 1/2.

De 9 à 15 ans : 1 cuillerée à soupe plus ou moins pleine à 4 h. 1/2 et 1 à 6 h. 1/2.

La cuillerée de 6 h. 1/2 sera donnée en même temps que le potage du soir, ce qui permettra à l'enfant de dîner à 7 h. 1/2-8 heures avec ses parents, mais sans potage et sans boisson.

Prix : 35 fr.

Durée d'une unité : environ 8 jours.

**Laboratoires DREYER-DUFER**

NOGENT-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 0.17.)

Échantillon sur demande.

## ANUSOL

**Composition.** — Suppositoires et pommade anti-hémorroidaires à l'iodorésorcinosulfonate de bismuth.

**Indications.** — Traitement rationnel, efficace et sans danger des hémorroïdes, rectites, fissures, érosions et états inflammatoires de la muqueuse anale, prostatites, congestion de la prostate. L'Anusol calme les douleurs, arrête le saignement, décongestionne et cicatrise.

**Mode d'emploi.** — Cas aigus : un suppositoire matin et soir ; applications de pommade sur les muqueuses anales externes.

Traitement d'entretien : un suppositoire tous les soirs, puis tous les deux soirs à garder pendant la nuit.

**Prix** : 21 fr. 60 la boîte de suppositoires.

21 fr. 60 le tube de pommade.

Enregistrés au L. N. S. O. sous les n° 150-5 et 150-6. Littérature et échantillonnage médical sur demande.

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. Guérout, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

En Belgique : **LABORATOIRES SUBSTANTIA**

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

## ANXIOL (comprimés)

### Forme pharmaceutique et composition :

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0.01	Extrait d'Euphorbia.....	0.02
Hypophyse.....	0.02	— de Cratægus .....	0.02
Belladone stabilisée .....	0.01	— de Scille .....	0.005
Phényléthylmalonylurée .....			0.01

pour 1 comprimé. (Flacon de 30 comprimés.)

**Propriétés et avantages.** — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'Équilibre humoral par une action simultanée, légèrement excitante sur le Sympathique et inhibitrice sur le Pneumogastrique. L'association éphédrine-hypophyse a l'avantage d'une action rapide et durable par la voie buccale.

**Indications thérapeutiques.** — Asthme bronchique, Emphysème, Dyspnées asthmatiformes. Rhume des foins. Vertiges. Migraine. Hypotension avec état dépressif. Spasmes viscéraux. Dysménorrhée. Petit mal des rayons X. Allergies diverses.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun le matin, 2 le soir et 2 en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée.

**Prescription** (strictement médicale) — I étui comprimés *Anxiol Faloy*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris, 40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## APAROXAL

**Traitement de choix de l'Épilepsie**  
adopté par les asiles.

Phényléthylmalonylurée-hyoscyamine.

Boîtes de 20 cachets, en 3 dosages :

*Aparoxal* formule E, pour enfants, à 0 gr. 05 ;

*Aparoxal* formule A, pour adultes, à 0 gr. 10 ;

*Aparoxal* formule M, dose massive, à 0 gr. 17.

**Indications.** — Toutes les épilepsies.

**Posologie.** — Régulièrement et sans interruption, 3 à 4 cachets par jour, bien répartis dans la journée. Réduire la quantité d'eau et de sel alimentaires. Six mois après la dernière crise, commencer une diminution de 5 cgr. par semestre.

Documentation et littérature au

**Laboratoire de l'APAROXAL**

7, allée du Midi — COURBEVOIE (Seine).

## APHLOÏNE

**Teinture glycéro-alcoolique contenant en totalité les principes actifs de : Aphloia, Piscidia, Hamamelis, Viburnum et Extrait stabilisé de Marron d'Inde.**

**Indications.** — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté, des troubles circulatoires (Varices, Hémorroïdes). Sédatif utéro-ovarien (anti-hémorragique).

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Prix : 21 fr. 20.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## APIOLINE DE CHAPOTEAU

**Composition.** — L'Apioline est le principe actif des graines de l'Apium petroselinum. Sa préparation rationnelle ainsi que sa pureté en font un produit efficace et sans danger.

**Propriétés.** — Emménagogue, régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

**Indications.** — Dysménorrhée, aménorrhée, troubles de la puberté et de la ménopause.

**Présentation.** — Capsules dosées à 20 cgr. d'Apioline.

**Posologie.** — 2 à 3 capsules par jour à prendre au moment des repas, 4 à 5 jours avant l'apparition des règles. Continuer cette dose pendant la durée de l'écoulement mensuel.

Effectuer une cure de consolidation le mois suivant et le troisième mois si nécessaire.

Prix : 22 francs le tube de 20 capsules.

**Laboratoires GRIMAULT**

Fondés en 1856  
51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Bal. 20-70.)

## APIOL TANIT

**Composition.** — Capsules d'Apiol pur, dosées à 0 gr. 25.

**Indications thérapeutiques et mode d'emploi :**

1<sup>o</sup> *Aménorrhée de la jeune fille* : prescrire, pendant 8 jours par mois, 1 capsule avant chacun des principaux repas.

2<sup>o</sup> *Oligoménorrhée, Hypoménorrhée* : prescrire 3 capsules par jour, pendant les 4 jours qui précèdent la date présumée des règles.

3<sup>o</sup> *Dysménorrhée, Menstruation douloureuse* : prescrire, au moment de la crise douloureuse, 2 capsules avant chacun des 3 repas.

Prix : 23 francs la boîte de 16 capsules.

**Produits TANIT**

ROUANET, Pharmacien,

ANTIBES (Alpes-Maritimes).

Littérature et échantillons envoyés sur simple demande de MM. les Médecins.

## APIVÈNE

**Composition.** — *Solution injectable de venin d'abeilles désalbuminée et titrée.*

**Présentation.** — Boîte de 5 ampoules de 1 cc. titrées à 1,5 US et 1 ampoule titrée à 0,15 US (ampoule jaune).

**Propriétés thérapeutiques.** — Action antalgique due à une « neurotoxine ». Action antirhumatismale.

**Indications.** — Sciatiques, radiculites, névralgies, névrites rebelles, zonas, etc. Rhumatismes chroniques ou déformants, lumbagos.

**Mode d'emploi.** — Pratiquer l'injection en totalité de l'ampoule jaune (ampoule à 0,15 US). Puis tous les 3 jours pratiquer une injection intramusculaire ou sous-cutanée (autant que possible *in loco dolenti*) en commençant par 1/4 et augmentant la dose par 1/4 jusqu'à 1 cc.

Il faut en général 6 injections pour une sciatique et 12 pour les rhumatismes chroniques.

**Apivène Onguent.** — (Association des salicyliques et de l'Apivène.) Traitement des Algies et des Rhumatismes par voie externe.

Prix : 15 fr. 30 le tube de 35 grammes.

**Préparé par les LABORATOIRES FORSIN**

39, rue Claude-Bernard — PARIS (V<sup>e</sup>). Tél. : Gob. 80-34.



## APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille.

Saveur agréable (framboise).

**Donne de l'appétit. — Aide la digestion.**

**Favorise l'assimilation des médicaments.**

Ne contient ni AS ni P.

### Posologie :

Flacon contenant 1.000 gouttes. 1/4 d'heure avant les repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée.

**Adultes :** XX à XXX gouttes.

**Enfants :** à partir de 1 an : I à 2 gouttes par année d'âge.

Aucune contre-indication.

Prix : 19 fr. 30.

**Laboratoires de l'APPETYL**

## APSOPHOL

**Composition.** — Agents nervins, antispasmodiques et sédatifs, à l'exclusion des iodures et de tout alcaloïde stupéfiant.

**Indications.** — Spécifique contre les bourdonnements d'oreilles, sifflements, battements et tous bruits subjectifs d'oreilles, avec ou sans vertiges.

**Mode d'emploi.** — Uniquement chez l'adulte. XXX gouttes matin et soir dans un peu d'eau ou de tisane 1/4 d'heure avant les repas. Après 8 jours de traitement, prendre XL gouttes matin et soir. Cure de 15 jours environ.

*Échantillon sur demande.*

Prix : 22 fr. 10.

**Laboratoire de l'EDISTOL.**

H. DUFOUR, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,  
40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret).

## AQUINTOL

**Forme gouttes à base de chloro-bromo-fluor.**

Sans aucune toxicité, sans contre-indications.

Spécifique de la Coqueluche et de la Toux sous toutes ses formes (Toux de la Grippe, de la Bronchite aiguë, de la Bronchite chronique, des Emphysémateux, des Asthmatiques, des Gazés, des Tuberculeux).

### Posologie et mode d'emploi :

#### Doses par 24 heures.

De 6 mois à 2 ans : XV gouttes 2 à 3 fois par jour.

De 2 ans à 5 ans : XV gouttes 3 à 8 fois par jour.

De 5 ans à 15 ans : XXV gouttes 4 à 8 fois par jour.

**Adultes :** L gouttes 4 à 8 fois par jour.

*Ces gouttes devront toujours être prises dans une cuillerée à soupe d'eau.*

**Prix :** 18 fr. 40, le flacon contenant 30 cc.

Méfiez-vous des contrefaçons.

Exigez bien la marque **Aquintol**, appréciée depuis 1909.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1315-8.

### Laboratoires de l'AÉROCID

R. DERAMBURE, Pharmacien

20, rue de Péetrograd — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Eur. 52-99.)

## ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*.

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies infectées, Brûlures, etc.

**Présentation.** — En tubes.

Grand modèle : 12 fr. 20.

Petit modèle : 6 fr. 10.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**  
5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

## ARCICA

**Composition.** — Ampoules buvables renfermant par dose cinq cgr. de méthylarsinate de sodium associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et du condurango.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

**Indications.** — Nutrition défailante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

**Nota bene.** — L'Arcica est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liquoreux ou d'eau sucrée.

**Dose journalière.** — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

Prix : 27 fr. 50 la boîte de 10 ampoules.

Laboratoire du **DELTA**

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 45-18)

Préparateur des SUPPOGLANDINES

## ARG-EPH (GOUTTES)

Gouttes nasales.

**Composition :**

Argyrol de Barnes ..... 3 gr. 33 } pour 100 grammes.  
Chlorhydrate d'éphédrine naturelle . 0 gr. 25 }

**Présentation.** — Solution. En flacon de 10 grammes.

**Indications.** — Coryza aigu et chronique, Sinusite, Catarrhe du rhino-pharynx, Rhume des Foins, Céphalées d'origine nasale, Surdité par catarrhe du rhino-pharynx. Congestion des trompes d'Eustache et dans tous les cas où une désinfection nasale s'impose.

**Posologie.** — En gouttes.

Comme préventif. *Adultes* : IV gouttes. *Enfants* : II gouttes dans chaque narine, matin et soir.

Comme curatif. *Adultes* : IV gouttes. *Enfants* : II gouttes dans chaque narine, 4 fois par jour.

**En pulvérisations.** — 4 fois par jour avec pulvérisateur de modèle ordinaire.

**Autres indications.** — Toutes affections oculaires : Conjonctivites, Blépharites, Kératites, etc., 1 goutte dans chaque œil 2 à 4 fois par jour.

Prix : 18 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 783-3.

R. CUNIASSE, Pharmacien,

6, place des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 39-93.)

## ARGINCOLOR

**Composition.** — Solution colloïdale de Nucléinate d'Argent *incolor*. Simple ou Éphédriné (solution faible et solution forte).

**Indications.** — Toutes propriétés thérapeutiques de l'argent colloïdal ordinaire ou associé à l'éphédrine.

**Présentation.** — Se vend :

1° En ampoule accompagnée d'un flacon compte-gouttes.

2° En ampoules de rechange.

Prix : Boîte ampoule et compte-gouttes.

Simple ..... 18 fr. 40

Éphédriné ..... 20 fr. 70

Boîte d'ampoules de rechange :

Simple ..... 31 fr.

Éphédriné ..... 34 fr. 50

L. E. V. A. — L. GAILLARD, Pharmacien

26, rue Pétreille — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ARGOCARBINE

### Formule :

**Charbon de hêtre activé recouvert d'argent métal insoluble. Très différent des préparations colloïdales, donc pas de possibilité d'accidents de mélanodermie.**

Pour un cachet : Charbon activé 0 gr. 35 et Argent métal 0 gr. 00875.

### Propriétés :

#### 1° ACTION :

**Le couple électrique Argent-Carbone** émet des ions argent bactéricides. Application du pouvoir oligodynamique de l'argent métal recouvrant la surface immense du charbon activé, ionisant, par toute cette surface, le liquide stomacal avec lequel il est en contact.

#### 2° ATOXICITÉ :

**Des doses considérables ingérées cliniquement et expérimentalement n'ont jamais produit le moindre trouble.**

Les organes d'animaux sacrifiés ne contenaient pas d'argent fixé chimiquement décelable.

### Indications :

**L'ARGOCARBINE**, se montrant presque spécifiquement destructrice du colibacille et de la flore intestinale de putréfaction, se révèle efficace dans les colibacillozes, les entérites, putréfactions et fermentations intestinales. Son pouvoir absorbant amène une sédation rapide des flatulences et de l'aérophagie. Son action sur les infections urinaires est manifeste au cours des colibacilluries, pyélonéphrites surtout graves, syndromes antérorénaux.

### Posologie :

3 cachets par jour aux repas.

### Présentation :

Boîte de 30 cachets.

### Laboratoires AXOS

**André BOUNIOL, Pharmacien directeur**  
1 et 3, rue Sarrette — PARIS (XIV°).

## ARGYBIL

**Composition.** — Complexe d'Argyrol de Barnes (Vitellinate d'argent) et de bile.

**Présentation.** — Liquide.

**Indications.** — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

**Mode d'emploi.** — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

**LANCOSME, 71, Av. Victor-Emmanuel-III.**

**PARIS (VIII°). (Tél. : Élysées 17-46.)**

## ARGYCUPROL

**des Docteurs ROUS et de MONTBY**

Association stable d'argent colloïdal 10 p. 100  
et de cuivre colloïdal 0,1 p. 100.

Puissante Activité. Tolérance parfaite. Indolore.

**Forme.** — Boîte de 6 ampoules instillations.

### Mode d'action :

**L'Argent :** Spécifique du Gonocoque.

**Le Cuivre :** attaque les microbes associés que n'atteint pas l'argent.

**Avantages.** — Action polyvalente. Aucune causticité. Ne provoque pas de rétrécissement en raison de son action kératolytique sur l'Épithélium de la muqueuse.

### Indications :

**Chez l'homme :** Blennorrhagie aiguë (traitement abortif). Guérison très rapide. Blennorrhagie chronique et ses complications. (Instillations uréthrales, grands lavages.)

**Chez la femme :** Blennorrhagie aiguë ou chronique. Affections gynécologiques (gonococciques ou simples) : Métrites, vulvo-vaginites, salpingites, etc.. (Injections-Tampons.) Ophtalmologie Dermatologie.

Prix : 30 fr. 20 la boîte de 6 ampoules instillations.

**Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE du D<sup>r</sup> ROUS**

9, rue Soyier — NEUILLY (Paris)

**D. SEVENS, Pharmacien**

## ARGYRESCINE MARS (dite VEINOMARS)

Tire son nom de l'Argyrescine, l'alcaloïde le plus actif du marron d'Inde.

**Composition.** — Extrait physiologique de Marron d'Inde, extrait d'hamamelis, de noix vomique, etc...

**Indications.** — Toutes affections ayant pour origine une mauvaise circulation et l'inflammation des veines.

**Mode d'emploi.** — Dose normale, X gouttes deux fois par jour aux repas. Dans le cas de crise aiguë d'hémorroïde, donner XV gouttes toutes les dix minutes jusqu'à cessation de la douleur, puis continuer à la dose normale. Chez la femme enceinte, X gouttes deux fois par jour en cas de varices, hémorroïdes, lourdeurs des jambes.

**Résultat.** — Disparition en quelques heures de tous ces troubles.

**Contre-indications.** — Néant.

**Remarque.** — Dans tous les cas, faire prendre l'ARGYRESCINE MARS en gouttes, la pommade ne servant qu'à hâter la guérison des ulcères et des hémorroïdes, si elle est employée en même temps. La pommade n'est empl. vée seule que pour les engel. re et les brûlures.

Echantillons sur demande.

Le flacon contient 600 gouttes environ.

Enregistré au L. N. C. sous les n°s 1649-1 et 1649-2.

Laboratoire MARS — GUERANDE (Loire-Inf.)

et Condest — LA ROCHE BERNARD (Morbihan).

Chez tous les grossistes.

## ARGYROPHÉDRINE

Gouttes nasales.

**Composition.** — Argylol, Éphédrine naturelle, en solution isotonique stabilisée par procédé spécial.

**Présentation.** — 3 dosages. Ephédrine. Argylol.

Solution faible..... 1/2 p. 100 1 p. 100.

— normale ..... 1 — 1 —

— forte ..... 3 — 1 —

**Indications.** — Rhinites aiguës, rhinites chroniques, asthme, rhume des foins et tous les cas nécessitant une désinfection nasale parfaite.

**Posologie.** — En pulvérisations, cinq fois au moins par jour, avec tout pulvérisateur ou vaporisateur ordinaire.

En gouttes, le contenu d'un demi-compte-gouttes dans chaque narine, 5 fois par jour.

Prix : 21 fr. 50.

COIRRE

15, boulevard du Montparnasse — PARIS.

(Tél. : Ségur 02-79.)

## ARGYSEPTINE

Granulé.

Affections gastro-intestinales et biliaires.

**Indications.** — Infection gastro-intestinale ; toutes intoxications ; Diarrhées ; Flatulences ; Intoxication alimentaire ; Affections gastriques ; Dyspepsies ; Dilatation d'Estomac ; Aérophagie ; Infection biliaire ; Lithiase biliaire ; Hépatisme ; Cholécystite ; Eczémas ; Prurits.

**Formule :**

Argent colloïdal .....	0,30
Charbon activé .....	5
Charbon animal .....	5
Urotropine .....	1,50
Extrait de belladone .....	0,025
Soufre colloïdal .....	1
Magnésie calcinée .....	2
pour 100 gr. granulé.	

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café au moment des repas. A croquer ou à délayer dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix : 21 fr. 75.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX

## ARHÉMAPECTINE GALLIER

Hémostatique « per os » et Injectable.

Admis dans les hôpitaux de Paris. Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante, de *Pectine* associée à son coferment minéral (calcium).

La *Pectine*, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, *C. R. Ac. Méd.*, 4 nov. 1924).

### Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix. 29 fr. 30.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — . 17 fr. 60.

**Indications.** — Toutes hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métorrhagies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc., et à titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

**Posologie.** — *Chirurgie* : 1 à 4 ampoules, dans un peu d'eau sucrée ou aromatisée, durant les 10 heures qui précèdent l'opération, et, après l'opération, 1 à 3 ampoules en 2 heures.

*Médecine* : dans les hémorragies faibles, 1 à 4 ampoules en 24 heures à 2 heures d'intervalle ; dans les hémorragies prononcées, 1, 2 ou 3 ampoules à 20 minutes d'intervalle et une 4<sup>e</sup> ampoule 1 heure après l'ingestion de la précédente.

Dans les cas d'urgence : en injections intramusculaires ou intraveineuses, à raison de 5 cc. S'emploie aussi par voie rectale.

*Petite chirurgie, stomatologie* : en application locale.

Ne présente aucune contre-indication.

### Laboratoire R. GALLIER

1 bis, pl. du Président-Mithouard, PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## ARHÉOL

C<sup>11</sup> H<sup>14</sup> O

Principe actif de l'essence de Santal.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections gonococciques des voies urinaires. Produit chimiquement pur, n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal. Aucune toxicité.

**Indications.** — Blennorrhagie et blennorrhée, cystite, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Employé comme complément des sulfamides au début : facilite l'attaque par les sulfamides.

A la fin de la cure : décongestionne, assèche et tonifie les muqueuses.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> 40 capsules à 0 gr. 18 — 10 à 12 par jour en trois fois. Le flacon : 23 fr. 30.

2<sup>o</sup> Flacon de 40 capsules de 0 gr. 50 pour la cure à haute dose associée aux lavages : 12 capsules par jour en trois fois et trois heures avant ou après les repas. Le flacon : 46 fr. 10.

### Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

## ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacéol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

**Indications.** — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du coryza, des rhinites et rhinopharyngites.

**Mode d'emploi.** — On l'utilise soit en insufflations, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boricuée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les coryzas, rhinites, maux de gorge.

Prix : 23 fr. 75.

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.**  
à PRÉMERY (Nièvre).

## ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal.

### Propriétés :

Antiseptique, décongestionnant, cicatrisant, résolutif, non caustique.

### Formes :

**Ovules à 1 % :** Métrites, vaginites, inflammations.

**Poudre à 1 % :** Alcaline, pour injections gynécologiques et lavage des muqueuses : yeux, gorge, nez.

Prix de vente au public : 18 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. n°s 33-4, 33-5.

**Laboratoire GALBRUN**

10 et 12, rue Guynemer, — SAINT-MANDÉ  
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

## ARISTOPLASTIC

Aristoplast élastique.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 540-15.

**Composition.** — Pansement instantané, antiseptique, élastique. Agents antiseptiques : Biiiodure de mercure, Sulfonaphtalène Azonaphtol disulfonate de Sodium.

**Avantages.** — Facilite la formation du tissu cicatriciel. En effet, grâce à un procédé couvert par des brevets que la Maison Vigier a pris en France et à l'étranger, ce pansement instantané combine l'indépendance absolue de la compresse médicamenteuse recouvrant la plaie, au maximum d'élasticité du tissu élastique qui supporte la compresse. L'aération de la peau saine, au voisinage de la plaie, se fait librement. Antiseptique de puissance extrême, sans contre-indication.

**Indications.** — Pansements au voisinage des articulations.

Fabrication très réduite actuellement (1942) faute de matières premières.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie  
Jean HUERRE et Cie

9, r. de la Gare — LEVALLOIS-PERRET (Per. 57-41.)

## ARKÉBIOS

**Composition.** — Soluté concentré, stabilisé, d'ACIDE PHOSPHORIQUE et de phosphates de : Calcium, Magnésium, Potassium et Sodium.

Cette préparation correspond au tiers de son poids d'Acide Phosphorique total en un mélange équilibré de 1/5 à l'état libre et 4/5 sous forme de combinaisons monométalliques.

Ne contient ni Fer, ni Manganèse, qui sont de puissants antixateurs du Calcium.

**Indications.** — Puissant régénérateur polyvalent des forces vitales, Reminéralisant, Recalcifiant. Toutes dépressions morales et physiques, Anémies, Anémies nerveuse, somatique, musculaire. Surmenages, Nervosisme, Spasmes nerveux, Convalescence, Rachitisme, États préneoplasiques, Colibacilloses, Aérophagie.

**Présentation.** — Gouttes, en un flacon de 40 centicubes.

**Mode d'emploi et doses.** — Adultes : XL gouttes dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas ; ou bien LXXX gouttes en une fois, le matin à jeun. Ces doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

**Enfants :** Il gouttes par année d'âge, dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Flacon de 40 cc. Prix : 21 f. 65.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## ARMANITE

Manganite d'Argent

Bactéricide non toxique kérotoplastique.

**Armanite colloïdal.** Solution fluide 1 p. 100. Flacon de 100 gr.

Abortif et curatif des Urétrites gonococciques.

**Armanite colloïdal.** Solution fluide 0,5 p. 100. Flacon de 100 gr.

Urétrites, Gynécologie, etc.

**Armanite Ovules-Suppositoires.** Boîte de 10.

Métrites, Cervicites, Rectites, Hémorroïdes.

**Armanite Pommade.** Tube de 25 gr.

Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies atones. Engelures.

**Armanite Poudre.**

Chirurgie. Pulvérisation vaginale, utérine et rectale.

**Armanite Injections préparées.**

Tubes à canule de 4 cc. Boîte de 5 tubes.

**Armanite Prophylaxie.**

Tubes à canule de 2 cc. Boîte de 3 tubes.

Laboratoires de l'ARMANITE

J.-C. PERROTIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.  
3, avenue Daumesnil — PARIS (XII<sup>e</sup>). Tél. : Did. 00-53.

## ARQUÉRITOL LESURE

1° Huile injectable d'amalgame d'argent à 40 p. 100 de mercure.

**Mode d'emploi.** — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

**Indications.** — Toutes manifestations syphilitiques.

**Avantages.** — Injection non douloureuse, tolérance parfaite grâce à l'action de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique.

Flacon de 5 gr. pour une série de 6 à 8 piqûres.

Prix : 30 fr. 50.

Se fait aussi au titre de 16 p. 100.

2° Suppositoires d'Arquéritol.

**Pharmacie VIGIER-LESURE**

70, rue du Bac — PARIS. Tél. : Littré 99-74.

## ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

**Composition.** — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

**Propriétés.** — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

**Indications.** — Toutes les anémies et les asthénies, le surmenage des écoliers et les convalescences.

**Mode d'emploi.** — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

**A. MEOHIN, pharmacien,**

FOUSSAIS (Vendée), Lauréat Faculté de Paris.

## ARSAMINOL

**Composition.** — Solution stérilisée, à la concentration de 26, 13 p. 100 de « 3-acétylamino-4-oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol » titrée à 0 gr. 05 d'arsenic par centimètre cube.

**Propriétés.** — Produit arsenical pentavalent, injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire, à des doses réellement tréponémicides. Grâce à la technique de sa préparation, qui permet d'obtenir un corps à l'état de pureté parfaite, débarrassé de tous les isomères toxiques et grâce à la présence d'un groupement amino-alcool, qui favorise la très large tolérance de l'organisme pour le produit, l'Arsaminol n'a aucun des inconvénients des arsénobenzènes ou des autres arsenicaux pentavalents.

Injectations indolores.

**Indications.** — Syphilis dans toutes ses manifestations, spirochétoses, amibiases, trypanosomiasés, paludisme.

**Posologie.** — Consulter notices spéciales.

**Formes.** — Ampoules de 3 cc. (0 gr. 15 d'As.) et de 5 cc. (0 gr. 25 d'As.).

*Pour les Enfants :* Arsaminol infantile, solution dosée à 13,06 p. 100 en ampoules de 1 cc. 5 (1 cc. correspond à 0 gr. 025 d'arsenic).

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V°)

## ARSÉNAMIDE

Collutoire polyvalent à base d'Arsénobenzol et de Sulfamide.

Médication spirillicide et bactéricide.

**Indications.** — Toutes les angines. Angines de Vincent. Bacilles et Cocci. Amygdalites. Stomatites simples et médicamenteuses. Gingivites, pyorrhée, ulcérations. Vulvite et vaginite.

**Mode d'emploi.** — En badigeonnages légers et répétés. Gargarismes et bains de bouche.

Flacon de 30 cc. : 22 fr. 70.

**R. COUDERT, Pharmacien PLESSIS-ROBINSON**

**Laboratoire G. FERMÉ**

22, rue de Turin — PARIS (VIII°).

(Tél. : Europe 49-50.)

**Z. N. O. : PETRIER, 30, rue Créqui — LYON.**

## ARSÉNIODE BURIAT

**Forme gouttes.** — Solution inaltérable de triiodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

**Action.** — Modificateur de terrain. Accélérateur des échanges intracellulaires. Stimulant des tissus lymphoïdes. Favorise l'hématopoïèse.

**Indications.** — Dans toutes les manifestations du *lymphatisme*, dans les adénopathies chroniques, les bronchites à répétition, les anémies secondaires, l'*asthénie*. Écoute les *convalescences*.

Modificateur de terrain dans l'emphysème pulmonaire et dans l'asthme.

**Posologie.** — Doses moyennes :

*Enfants* : II gouttes par 24 heures et par année d'âge.

*Adultes* : X à XX gouttes, 2 fois par jour.

Durée moyenne : *Enfants* : 15 à 20 jours.

### Laboratoire BURIAT

37, rue Spontini — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Passy 64-23.)

## ARSÉNOMYL

Nouvel arsénobenzol.

Très puissant tréponémicide  
indolore en injection intramusculaire.

**Indications.** — Syphilis; Paludisme, Fièvre de Malte, Pian.

**Formes.** — Ampoules de poudre pour injections intramusculaires, de conservation indéfinie.

**Posologie.** — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 0 gr. 90, 1 gr. 05, suivant les malades.

*Chez l'enfant* les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20.

### Établissements MOUNEYRAT

#### Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine,  
Docteur en sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
12, rue du Chemin-Vert  
VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).  
(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## ARSÈNOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux.

Sérum glucosé avec addition de Galacal et de Chloroforme acétone pour injections hypodermiques et intramusculaires de Sulfarsénol.

— Indolores —

**Présentation.** — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Boîte de 1 ampoule : 1 fr. 90.

Boîte de 6 ampoules : 9 fr. 40.

Boîte de 12 ampoules : 17 fr. 50.

Voir *Sulfarsénol*.

**Mode d'emploi.** — Utiliser :

1 ampoule jusqu'à 30 cg.

2 ampoules de 30 à 60 cg.

3 ampoules au delà de 60 cg.

Laboratoires de Blochimie Médicale.

CH. DESGREZ, Docteur en Pharmacie

19-21, rue Van-Loo. — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

## ARTÉRIOCRINOL

Chimiothérapie et opothérapie associées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, Hypotenseur, Vaso-dilatateur et régulateur tensionnel, Antiscérosant.

**Indications.** — A *titre préventif* : tout sujet présentant soit une tension ascendante, soit de la sclérose artérielle débutante, soit des spasmes viscéraux ou périphériques.

A *titre curatif* : chez tout malade présentant des manifestations rattachées aux trois mécanismes déjà cités ou à leur réunion. A *titre indicatif* : artérite des membres, Angine de poitrine, Manifestations nerveuses ou sensorielles, Phénomènes rénaux, digestifs, respiratoires, des hypertendus, etc.

**Composition.** — Trinitrine, silicate de soude, phényl-éthylmalonylurée, extraits de gui, hépatique et musculaire, complexe de vitamines B hydrosoluble.

**Forme.** — Dragées à noyau mou.

**Posologie.** — 4 dragées par 24 heures espacées, en dehors des repas, à croquer.

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoires Docteur DEMASLES

8, rue du Musée — VIENNE (Isère). (Tél. : 9-71.)



## ARTÉRIOLEX OU MINÉRALOGÈNE

**Spécifique de l'Artério-Sclérose.**  
Silicate de Soude titré soluble, assimilable.

Poudre : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Comprimés : 4 à 8.

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café.

Dissoudre avant d'absorber.

### Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

## ARTÉRIO-VEININE

**Composition.** — *Crataegus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamelis* (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

**Indications.** — Troubles de la ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

**Forme.** — Gouttes (Conservation indéfinie).

**Doses.** — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 20 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1197-1.

### Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen-PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Marcadet 22-32.)

## ARTHRILYSE

Granulé effervescent.

**Composition.** — Acide phénylcinchoninique, Pipérazine, Urotropine, Salicylate de lithine, Phosphate de soude, Citrate de soude, Boldine.

**Propriétés.** — Dissolvant et éliminateur puissant de l'acide urique. Chologogue. Eupeptique. Antivisqueux. Décongestif.

**Indications.** — Arthritisme. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte aiguë et chronique. Gravelle et Lithiase rénale. Coliques néphrétiques. Artériosclérose. Troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires. Auto-intoxication. Dyspepsies. Hyperviscosité sanguine.

**Posologie.** — Traitement d'attaque : de 3 à 5 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau. Traitement d'entretien : de 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 26 fr. 75.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

9, impasse Thoréton — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ARTICHOLINE

Drainage biliaire.

**Composition :**

Sels de magnésium et extrait total d'artichaut en granulé.

**Dose :**

2 à 4 cuillerées à café dans 3/4 de verre d'eau chaude le matin à jeun. 15 jours par mois.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## ARTOBYL

**Forme.** — Dragées.

### Composition :

Boldine.....	0,001
Extrait spécial superconcentré de feuilles d'artichaut obtenu par procédé professeur Quirin et Dagannot.....	0,20
Cascara pulvérisé.....	0,05
Pour une dragée.	

**Indications.** — Lithiase biliaire, Insuffisances hépatique et biliaire, Cholémie, Constipation chronique.

**Doses.** — 1 à 3 dragées (dose normale : 2 dragées) à la fin de chacun des deux repas.

**Prix :** 22 fr. 60 la boîte pour une durée de 30 jours environ.

Durée moyenne de traitement : 3 mois.

**Laboratoires DAGONNOT  
CANNES**

## ARTROCOLCHINE « C »

Goutte, Rhumatisme, Arthritisme.

### Composition :

Acide Acétyltriméthylcolchicinique.....	0,0027
Résine de Galac.....	0,33
Hexaméthylentétramine.....	0,65
Iodure de Potassium.....	2
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.

**Propriétés.** — Analgésique par la Colchicine ; Antiseptique urinaire par l'Hexaméthylentétramine, diurétique et diaphorétique par la Résine de Galac ; Modificateur de la nutrition par l'Iodure de Potassium.

**Indications.** — Spécifique de la goutte aiguë ou chronique, du rhumatisme, de la sciatique, des névralgies, des névrites et des myalgies d'origine goutteuse et rhumatismale.

**Avantages.** — L'ensemble de l'association à base de Colchicine donne une action synergique très nette sans toxicité appréciable et sans les dangers de la Colchicine. Il n'y a donc à craindre, en principe, ni diarrhées ni vomissements.

### Posologie Forme et Mode d'emploi :

Sirop à prendre *loin des repas* à la dose de une cuillerée à bouche une ou deux fois par jour dans un demi-verre d'eau.  
Se conformer aux indications du médecin.

**Produits POLYPHARMA**

**Concess<sup>rs</sup>. L. BRUN, pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XII<sup>e</sup>).**

## ARVENSYL

### Formule :

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCCQ).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

**Indications.** — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

**Laboratoires GERDA  
F. GERIN, pharmacien,  
10, rue Jacquard — LYON.**

## ASCABIOL

Lotion antiprurique Specia.

### Formule :

Benzoate de benzyle.....	30 gr.
Excipient hydroalcoolique savonneux.....	
Q. S. P.....	100 cm <sup>3</sup>

L'Ascabiol permet un traitement rapide et efficace de la gale. C'est le traitement de ville par excellence. (Convient également aux gales infectées, aux gales des sujets à peau fragile.)

**Présentation.** — Flacons de 125 cm<sup>3</sup> (quantité nécessaire pour un traitement).

**Mode d'emploi.** — Après friction savonneuse dans le bain ou sous la douche, pratiquer sur la peau encore humide un brossage à l'aide d'un pinceau plat en soies demi-molles imbibé d'Ascabiol, en insistant sur les régions atteintes : plis génitaux et articulaires. Laisser sécher. Pratiquer deux brossages semblables à un quart d'heure d'intervalle. La moitié du contenu du flacon sera utilisée pour chaque opération.  
Changer de linge. Étuyer les vêtements.

Prix de vente : 20 fr.

Société parisienne d'Expansion chimique.

« SPECIA »

**Marques Poulen Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## ASCÉINE

**Acide acétyl-salicylique. Para-acétyl-phénétidine  
Caféine**

**ANALGÉSIQUE, SÉDATIF, ANTIRHUMATISMAL.**

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur et des clochers thermiques.

**Indications.** — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc..., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour ;

*Enfants* : 1/2 à 2 comprimés.

**Formuler.** — Tube de 20 comprimés.

**Laboratoires O. ROLLAND**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## ASCIATINE

**Diméthylamino-phényl-diméthyl-pyrazolone-  
butylchloral.**

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

*Action élective dans le domaine du trijumeau.*

**Indications.** — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

**Présentation et posologie.** — Comprimés à 0 g. 25, 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

**Prix de vente :** { Les ach. de 2 comprimés : 1 fr. 60  
La boîte de 12 comprimés : 7 fr. 60  
— 24 — 13 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipode hépatique phosphoré et iodé. Elle renferme les vitamines A et C, la vitamine D à l'état naturel, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

**Indications.** — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, pré tuberculose.

**Deux formes.** — *Solution huileuse gouttes* : X à XL gouttes par jour suivant l'âge.

Prix : 23 fr. 20.

**Granulés** : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Prix : 23 fr. 20.

Toutes pharmacies, ou à défaut chez :

**Laboratoires RIVIER**

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : + Alésia 22-46.)

## ASEPTAMIDE

(Sulfamide-Dakin.)

Comprimés déliquescents et bougies urétrales à base de p. Dichlorsulfamide-benzoate de soude.

**Mode d'action.** — Au contact de l'eau ou des sécrétions, l'ASEPTAMIDE libère deux fonctions qui lui donnent sa puissance effective :

- 1° Une fonction sulfamidique ( $\text{SO}^2\text{NH}^2$ ), accolée en « para » au benzoate de soude ;
- 2° De l'acide hypochloreux qui se décompose à son tour en oxygène naissant et chlore actif.

**Avantages.** — Entièrement et rapidement soluble. Dénué de toute toxicité. Non irritant. Non caustique. Ne tache pas. Actif à faible dose.

**Indications.** — Traitement des plaies, brûlures, furoncles, anthrax, phlegmons, artérites suppurées, pleurésies purulentes, affections gynécologiques, leucorrhée, métrite, blennorrhagie, cystite, accouchement, infections des voies urinaires, conjonctivite, oxyures, soins de la bouche et des dents, désinfection de l'eau de boisson, aseptie de l'eau pour usages médicaux et chirurgicaux, désinfection des instruments de chirurgie, etc.

**Mode d'emploi.** — *Comprimés.* En pansements ou lavages : 1 à 3 comprimés par litre. Eau bouillie : emploi immédiat. Eau non bouillie : 1 heure après.

Prix : 39 fr. 50 le tube de quinze.

*Bougies urétrales* souples, fusibles : 1 bougie par 24 heures.

Prix : 44 fr. 90 la boîte de six.

**Laboratoires MERMINOD (Fondés en 1890).**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Pro. 30-23.)

## ASEPTARGOL

**Composition.** — Sulfosalicylate d'Oxyquinoléine, Oxyquinoléine Argent, Oxyquinoléine Bismuth.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique intestinal biostatique, non toxique, à action curative et préventive.

**Indications.** — Intoxications intestinales de toute origine (alimentaires, parasitaires, microbiennes) et leurs complications hépato-rénales. Action préventive sur les troubles causés par l'ingestion d'aliments suspects.

**Présentation.** — En tube de 40 globoides.

**Posologie.** — *Dose préventive* : 2 ou 4 globoides avant ou après les repas.

*Dose curative* : 4 à 6 globoides par jour au début, diminuer progressivement.

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix : Le tube, 23 fr. 20.

**Laboratoires SITSA**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grés. 37-34.)

## ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

**Indications.** — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

**Mode d'emploi.** — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour. Prix : 17 fr. 50 (pour 20 jours de traitement).

Dépôt général :

**Laboratoire ASEPTOR**

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12<sup>e</sup>).

**AS. I. P.****Arsenic. Iode. Phosphore.****Médication** asthénique et card o-vasculaire.**Indications.** — Asthénie de la cinquantaine : hypotendus, hypertendus, après régime.**Composition :**

Iodure de potassium.....	8 %
Extrait mou de Scille .....	2,5 %
Extrait mou de feuilles d'artichaut .....	2 %
Arséniate de soude .....	0,2 %
Glycérophosphates (Na et Mg) .....	25 %

**Avantages.** — Stimulant, diurétique, cardio-vasculaire.**Posologie.** — 30 à 50 gouttes à chaque repas dans la boisson habituelle ou dans du lait (soit 0 gr. 15 d'iodure par jour).**Présentation.** — Flacon de 50 cc. avec compte-gouttes pour 15 à 20 jours de traitement.

Enregistré au L. N. C. M. 1170-61.

**Prix :** 22 francs.

**Laboratoire de L'OLIPHÉDROL**  
25, bd Edgar-Quinet — COLOMBES  
(Tél. : Cha. 27-86.)

**ASMOCRINE****(Dragées)****Composition.** — Médication oposérothérapique à base de plasma sanguin de jeunes taureaux et d'organes frais de jeunes animaux.**Propriétés.** — Désensibilisation, libération des émonctoires, brassage endocrinien.**Indications.** — Asthme, Coryza, Rhume des foins.**Présentation et posologie.** — Flacon de 70 comprimés à prendre à raison de 7 comprimés par jour pendant dix jours, au moins une heure avant chaque repas.**Prix :** 24 fr.**Forme infantile :** PEDIASMA (granulés).

**Laboratoire biologique VALTRY**  
122, Champs-Élysées — PARIS.  
(Tél. : Élysées 28-12.)

**ASPÉCA****Cachets antidouleur.**

Le cachet des Névralgies dentaires.

Névralgies, Migraines, Grippe, Courbature, Fièvre, Douleurs rhumatismales.

Pas de contre-indications.

Doses : 3 à 6 cachets par jour.

**Laboratoires DORDIN****HARNES (Pas-de-Calais).**

Distribution assurée.

**ASTHMASÉDINE****Respiratoire, Décongestif, Cardio-tonique, Diurétique.****Composition.** — Pour 1 cuillerée à café:

Chl. d'Ephédrine .....	0,015	Iodure de potassium.....	0,20
Phényléthylmalonylurée..	0,015	Teinture de belladone .....	0,25
Caféine .....	0,10	Teinture de lobélie .....	0,50
Benzoate de soude .....	0,10	Excipient spécial .....	Q. S.

Traitement de la Crise d'Asthme et du Terrain Asthmatique. **Asthme.**  
**Emphysème.** Dyspnées. Troubles Cardio-Vasculaires.

**Doses moyennes :** Pour éviter les crises d'asthme : Prendre entre les accès une cuillerée à café au début des 2 repas, pendant 2 jours. Puis 2 matin et soir au début des repas pendant 10 jours. Cesser 4 ou 5 jours et refaire une cure semblable.

**Pendant les crises :** 2 cuillerées à café au début des 3 repas, soit 6 par jour dans un peu d'eau sucrée.

**En cas de crise subite et seulement en dehors des périodes de traitement :**  
1 cuillerée à café toutes les heures pendant 4 heures.

Demi-dose pour les Enfants à partir de 10 ans

**Prix :** 26 francs.

**Laboratoires HENRI SCHÉHADE**  
Pharmacien de la Faculté de Paris.  
9, impasse Thoréton — PARIS (XV).

## ASTHMÉDRINE

### Composition :

Liquide :		Comprimés :	
Ephédrine Chl* .....	0,10	Ephédrine Chl* .....	0,005
Caféine .....	0,75	Caféine .....	0,04
Iodure de sodium .....	3	Peptone iodée à 10 p 100 ..	0,10
Eau laurier-cerise .....	10	Extrait belladone .....	0,005
Sirop morphine .....	20	Extrait datura .....	0,015
Ether sulfurique .....	0,50	Extrait Euphorbia piluli-	
Chloroforme .....	0,50	fera .....	0,01
Teint. Euphorbia piluli-			
fera .....	1		
Teint. belladone .....	1,30		
Teint. datura .....	1,50		
Véhic. pour 100 grammes.		Par comprimé.	

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Oppressions, Toux rebelles, Intoxications par les gaz et toutes dyspnées.

**Posologie.** — *Liquide* : 1 cuillerée à dessert au lever ; 1 au coucher. Diluer dans un peu d'eau ; prendre ensuite lait ou tisane.

*Enfants* (10 ans) et *vieillards* : 1/2 doses.

*Comprimés* : 2 comprimés le matin et 2 le soir.

*Enfants* (10 ans) et *vieillards* : 1/2 doses.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n° 1063-2 et 4.

Laboratoires ÉTIENNE

19, avenue Secrétan — PARIS. (Tél. : Nord 89-34.)

## ASTHMO-ACTINE

**Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.**  
Le plus fort Elixir antiasthmatique connu.

**Composition.** — Synergie totale : Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : Iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. etc.

... et Nouveauté. — Ext. Actæa 0,05. Ext. nat. surrénale au 1.1000. Ogr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

**Indications.** — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés. Catarrheux, Intoxiques, etc...

Action rapide curative et préventive.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait.

Enfants : à partir de 6 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 22 fr.

Laboratoire G. BERTHON, Pharmacien, (J)

Zone occ. : DORNES (Nièvre) — (Tél. : 25.)

Z. lib. : 28, rte de Limoges, LA MADELEINE (Allier).  
Vente réduite (composants rares : Caféine, Iode...)

## ASTHMO-HÉPATINE LEBROT

Synthèse antichoc, désensibilisatrice et antistoculante.

Renforceur hépato-cardio-rénal.

**Indications.** — Asthme vrai et syndrome asthmatique, Rhume des foins, Dyspnées, Emphysème, Gazés de guerre, toutes Insuffisances respiratoires.

**Propriétés.** — Active la ventilation pulmonaire, supprime le spasme des muscles inspirateurs et bronchiques. Renforce le rôle antitoxique et protéopexique du foie. Augmente la perméabilité rénale et la diurèse. Décuple le pouvoir solubilisant du sang vis-à-vis des toxines. Facilite le travail du cœur. Diminue l'instabilité du système neuro-glandulaire et corrige le déséquilibre vago-sympathique. Calme la crise, améliore le terrain.

**Formule.** — Opothérapie hépatique associée à Iodéthylurotropine, Ipéca, Théobromine caféino-éphédrinée, Strophantine, Papavérine.

**Mode d'emploi.** — Crise : 1 à 3 comprimés à la fois. Préventif : 1 comprimé matin et soir, par périodes, suivies de repos.

Boîte de 40 comprimés : Prix : 23 fr. 10.

Laboratoire de Contrôle N° 2008-1.

Les Laboratoires BIO-BOURGOGNE

Dr J. LEBROT, pharmacien,

24, avenue Albert-1<sup>er</sup> — DIJON. (Tél. : 21-06.)

## ASTHMOLYSIN

(Nom déposé.)

Contre l'asthme bronchique et le rhume des foins.

**Composition.** — Solution stérile du principe actif de la surrénale préparé selon la méthode du Dr Weiss.

**Propriétés.** — Ne contient aucun narcotique. Aucun effet secondaire nuisible. Injections indolores. Effet rapide et puissant.

**Indications.** — Asthme bronchique, Rhume des foins, Angine de poitrine, Collapsus cardiaque et vasculaire, Pneumonies.

**Présentation.** — Boîtes de 5 et de 10 ampoules de 1 cc. 1 cc. contient 8/10 de mmgr. de produit actif.

**Posologie.** — Au-dessous de 3 ans : 1/4 d'ampoule.  
De 3 à 8 ans : 1/2 ampoule.  
De 8 à 15 ans : 3/4 d'ampoule.

Injections sous-cutanées ou à la rigueur intramusculaires.  
Jamais d'injections intraveineuses.

Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## ASTHMOSINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-cardiaque, Diurétique.

**Composition.** — Heureuse association de substances non toxiques, à action synergique, absolument inoffensives.

Un cachet contient :

Acide valérianique .....	0,007	Acide acétylsalicylique ...	0,24
Théobromine (essai physiologique) .....	0,10	Valériane pulvérisée .....	0,10
Caféine .....	0,043	Scille .....	0,02

(Procédé spécial de préparation.)

**Indications.** — Médication héroïque contre l'Asthme dit essentiel ou asthme nerveux. Soulage immédiatement les crises aiguës. Efficace aussi dans les cas d'emphysème aigu ou chronique dans les bronchites, dans la dyspnée brigitique ou cardiaque. Bons résultats chez les gazés.

Action rapide, curative et préventive.

**Posologie.** — *Crise aiguë.* Dès le début de la crise un cachet dans une infusion de tilleul, camomille ou feuilles d'oranger. Si nécessaire un deuxième cachet deux heures après et au besoin, exceptionnellement, un troisième 4 heures après le second.

*Etat chronique.* — Un cachet le soir dans une infusion.

Pour les enfants, leur donner, une seule fois par 24 heures, un des cachets spécialement préparés à leur usage. S'il n'est pas possible de le leur faire absorber, il conviendrait de mettre le contenu dans de la confiture ou de la crème et de faire suivre d'une boisson chaude.

La boîte de 12 cachets. *Adultes* : 16 fr. 60. *Enfants* : 11 fr. 20.

Laboratoires L. TATTEVIN, Docteur en Pharmacie  
3, rue Émile-Burgault — VANNES.

## ASYGMATHOL

**Composition.** — Pilules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin.

Doses rigoureusement stables.

Chaque pilule contenant :

Bi-iodure de Hg .....	0,01
KI .....	0,02

**Indications.** — Syphilis. Complément indispensable des traitements par piqûres. Traitement de consolidation dans la période secondaire chez les sujets à B. W. négatifs. Puis, traitement d'assurance indiqué dans les accidents tertiaires cutanés ou cardio-vasculaires.

Hérédito-syphilis. Traitement d'entretien et de consolidation.

**Présentation et prix.** — Flacon de 60 pilules : 36 francs

**Posologie.** — *Adultes* : 2 pilules par jour pendant un mois. Repos même durée, puis reprendre.

Laboratoire F. PARAT

SAINT-LEU-LA-FORÊT (Seine-et-Oise.)

## ATALANTE

Pâte cicatrisante.

Non grasse, soluble à l'eau, ne tachant pas le linge.

**Formule.** — Allantoïne, 0 gr. 295 ; Résorcine, 0 gr. 200 ; Excipient non gras, Q. S. p. 100.

**Mode d'action.** — L'allantoïne est un constituant normal des noyaux cellulaires. Les travaux de M. Robinson en Amérique ont montré le grand pouvoir cicatrisant de l'Allantoïne dans les plaies post-opératoires, les brûlures, les ulcères variqueux, les furoncles et les anthrax.

L'Allantoïne agit en favorisant les granulations du tissu sain et en éliminant les éléments infectés.

**Indications.** — Plaies, Brûlures, Ulcères variqueux, Dermatoses, Erythèmes des nouveau-nés, Crevasses du sein, Furoncles, Anthrax, Escarres, Engelures ulcérées.

**Mode d'emploi.** — Sur les ulcères, les brûlures et les plaies, appliquer la pâte en couches épaisses.

Prix : 13 fr. 90.

Laboratoires BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 61-61.)

## ATENS

Hypotenseur.

**Composition.** — Pour une pilule :

Tétranitratre d'Erythrol .....	0,003
Diméthylxanthine (Théobromine) .....	0,128
Phosphate de Calcium .....	0,022
Extrait de Viscum Album .....	0,060
Phényléthylmalonylurée .....	0,010
Extrait de Belladone .....	0,0025

**Propriétés.** — Régulateur du travail du cœur. Hypotenseur. Vaso-dilatateur, diurétique.

**Indications.** — Association médicamenteuse à doses faibles, qui constitue un traitement complet, actif et sans danger, de l'Hypertension et de ses dérivés.

**Forme et mode d'emploi.** — Pilules rouges à prendre accompagnées d'un verre d'eau au milieu des repas.

**Posologie.** — 2 à 3 pilules par jour.

Se conformer toujours aux indications du médecin.

Prix de la boîte de 25 pilules : 19 fr. 50.

N. B. — Le traitement par l'ATENS peut être heureusement complété par l'emploi du NESAL, sédatif nerveux par excellence.

Produits POLYPHARMA

Concess<sup>rs</sup> L. BRUN, Pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## ATOMINE

**Composition.** — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

**Indications.** — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciaticques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

**Doses.** — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre.

**Cas chroniques ou atténués :** 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 18 fr.

Absorber avec tisane sucrée.

Compte chèques postaux LYON, n° 134-34.

**Laboratoires L. Boize et G. Allict,**  
9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON.  
(Tél. : Parmentier 31-29.)

## ATOPHAN CRUET

Remède spécifique des rhumatismes et de la goutte

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Acide phénylquinoléine carbonique chimiquement pur.

L'ATOPHAN exerce une action étiologique sur le rhumatisme aigu et chronique et sur la goutte aiguë et chronique ; cette action est due à ses propriétés pharmacologiques remarquables : très grand pouvoir d'élimination de l'acide urique, action anti-inflammatoire extraordinaire, effet analgésique et antipyrétique. Il est inoffensif pour le cœur et n'occasionne pas les troubles secondaires que provoquent les salicylates.

**Posologie.** — 1 cachet ou 1 comprimé 3 à 4 fois par jour après le repas avec un peu d'eau alcaline pendant 4 à 5 jours consécutifs. Au besoin, répéter la cure après un arrêt de 3 à 4 jours (cure à intervalles). Le régime sera riche en hydrates de carbone et pauvre en protéines et condiments.

### Présentations :

Boîte de 20 cachets dosés à 0 gr. 40 : 21 fr. 80  
Tube de 20 compr. dosés à 0 gr. 40 : 21 fr. 80

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais  
PARIS (VII<sup>e</sup>).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie  
(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE  
87, avenue de Saxe — LYON



## ATOQUINOL

Phényloinochinolate d'allyle.

OIBA

SPÉCIFIQUE ANTIGOUTTEUX.

Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

**Indications.** — Diathèse urique en général : Goutte, rhumatisme goutteux, dermatoses d'origine arthritique, algies, migraines et toutes manifestations uricémiques.

**Doses.** — États aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.  
États chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

**Formuler.** — Boîte de 20 cachets:

Flacon de granulé.

(Voir SANOQUINOL.)

**Laboratoires OIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26)

## ATOSPIRINE

Association d'Acide acétylsalicylique, d'acide phénylcinchoninique, de caféine et de phénylacétamide, constituant le type parfait de la *Synergie médicamenteuse renforceuse*.  
Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1134-10.

**Indications.** — Diathèse arthritique, Goutte, toutes Algies, États grippaux et leurs complications.

**Présentation.** — Boîte de 20 cachets de 0,50 centigr. ou de 20 comprimés de 0 cgr. 50.

**Posologie.** — 2 à 4 cachets ou comprimés par jour.

Prix : 19 francs.

**Laboratoire A. LUCIEN**

19, rue du Bac — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Littre 55-03.)

## ATOSULFASE

Cachets.

**Formule.** — Hyposulfite de soude pur et anhydre, 2 parties ; Acide phényl-2-quinoléine carbonique-4, 1 partie ; Acétyl para-aminosalol, 1 partie. Pour un cachet de 0 gr. 80.

**Indications thérapeutiques :**

Troubles hépatiques et leurs conséquences : nausées, vertiges, migraines, etc.

Troubles de la crase sanguine et leurs manifestations cutanées : urticaire, eczéma.

États urémiques et infectieux : goutte, rhumatismes, sciaticque, zona.

**Posologie.** — 2 à 3 cachets par jour, 1/2 heure avant les repas, suivis d'un 1/2 verre d'eau.

Prix de la boîte de 30 cachets : 25 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1689-15.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> J. LEFÈVRE**

Docteur en médecine, Pharmacien,

Ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Paris.

200, faubourg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 01-09.)

## ATROBYL

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Formule.** — Extrait de Belladone, Séné, Bile, Cascara, Bourdaine, Aloïne, Purgène, Excipient spécial.

**Propriétés.** — Laxatif très doux et absolument efficace, stimulant des sécrétions hépatiques.

**Indications.** — Toutes constipations, Intoxications intestinales, Insuffisances hépatiques. Pas de contre-indications.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

Prix : 17 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1177-2.

**Laboratoires SAUDEMONT**

GRENAY (Pas-de-Calais).

## ATURAL

**Supprime l'intolérance pour le lait.**

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

**Composition.** — Poudre à base d'un principe anti-présurant absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum de cheval.

**Action.** — Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale. Facilite aussi la digestion des aliments en permettant les contractions et l'évacuation de l'estomac.

**Indications.** — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte avec ses conséquences : Diarrhée verte, Vomissements, Gastro-entérite des nourrissons, Troubles digestifs chez l'adulte après les repas.

**Mode d'emploi.** — Une mesure pour 100 gr. de lait. Dans l'alimentation ordinaire, 2 mesures dans un peu d'eau après les repas.

**Prix :** 20 francs.

**Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique**  
10, rue de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Nord 46-14.)

## AUBÉLIODE

**Gouttes.**

Combinaison stabilisée et équilibrée de :

Iode Peptone.....	25 cc.
Aubépine.....	12 —
Hamamelis-Marron d'Inde.....	37 —
Passiflore-saule.....	13 —
Q. S. P.....	100 —

En un flacon normal de 45 cc. = 1.500 gouttes.

**Prix :** 24 fr. 85 (pour 15 jours de traitement).

Toutes taxes comprises. Ar. 2099 du 6-2-42.

Il existe un double flacon de 90 cc. = 3.000 gouttes.

**Prix :** 45 fr. (économie).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-1.

**Indications.** — *Vaisseaux* : Ménopause, Dysménorrhée, Artériosclérose, Hypertension, Phlébites, Varices, Hémorroïdes, Pléthore, Cyanose, Asthme, Emphysème, Bronchites, Bourdonnements d'oreilles.

**Nutrition** : Arthritisme, Goutte, Rhumatisme chronique, Lymphatisme, Obésité.

**Système nerveux** : Éréthisme cardiaque, Anxiété, Insomnies.

**Posologie.** — 100 gouttes d'AUBÉLIODE : 25 gouttes de Peptone iodée ; 12 gouttes d'Aubépine ; 37 gouttes d'Hamamelis-Marron d'Inde ; 13 gouttes de Passiflore-Saule.

**Doses.** — 100 à 160 gouttes par jour, en deux fois, aux repas.

**Action.** — Active circulation et diminue viscosité et tension. Accélère nutrition, échanges, hémato-  
tose. Équilibre système nerveux et vago-sympathique.

### Composants et propriétés :

*Iode* (Peptone) : Fluidifiant, Vaso-dilatateur, Hypotenseur, Oxydant, Antiseptique, Stimulant.

*Hamamelis* : Décongestionnant, Hémostatique, Tonique et Trophique veineux.

*Aubépine, Passiflore* : Sédatifs, Antispasmodiques, Cardiotoniques et Hypotenseurs.

**Laboratoires OPOS-TOULOUSE**

HOMPS, Pharmacien,

13 et 13 bis, rue Matabiau.

(Tél. 253-97.)

## AUDIGÉNINE

**Forme.** — Comprimés.

**Composition.** — Di-iodo-antipyrine (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

**Indications.** — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdité. Vertiges. Bourdonnements.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit être interrompu 10 jours chaque mois.)

*Littérature et échantillons :*

**Laboratoires DEFRESNE**

19, rue Jacob — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## AURIXEMA (Dermoczéma)

Pommade anti-eczémateuse semi-fluide.

### Composition :

Para-aminobenzoate de butyle normal (Paraforme).....	0 gr. 25
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifiée.....	1 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Protochlorure de Mercure par voie humide.....	3 gr.
Sulfate de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	10 gr.
Métadioryphénol.....	1 gr.
Camphre.....	1 gr.

Pour 100 grammes.

**Propriétés.** — Analgésique, antiseptique, kératoplastique.

**Indications.** — Traitement des eczémas et impétigos de l'oreille, des narines et en général de toutes lésions eczémateuses ou impétigineuses infectées.

**Présentation.** — Tube avec long embout spécial.

Prix : 14 fr. 80.

**Laboratoires M. DE RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## AXYOL

du Docteur P. Bourgraff.

**Composition.** — Iodo-amido-féculose dépourvu de toute trace d'iode libre.

**Propriétés.** — Grâce à ses propriétés biologiques, l'Axyol active l'apparition des bourgeons charnus et aseptise les plaies.

**Indications.** — Plaies atones, ulcères, ulcères des jambes, plaies infectées, fistules.

**Mode d'emploi.** — Se rapporter aux différents opuscules publiés par le Laboratoire du Praticien.

**Présentation.** — Poudre noire, en flacon.

Prix : 27 fr. 50.

L'Axyol étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

*Littérature sur demande aux*

**Laboratoires du Praticien,**

HUSSIGNY-GOUBRANGE (M.-et-M.)

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).  
(Pendant toute la durée de la guerre.)

## AZAMA

(Gouttes)

**Présentation.** — En flacon compte-gouttes (19 fr. 50).

**Principes actifs.** — Teinture de Lobélie, Chlorhydrate d'Ephédrine.

**Indications.** — Asthme, Rhume des foins, Hoquet, Mal de mer.

**Mode d'emploi.** — XX gouttes de la solution dans un peu d'eau sucrée, quatre fois par jour et au moment des accès.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-17.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## AZIGOL THÉVENOT

Orléans convulsives. États nerveux.

**Composition.** — Tartrate Borico-Calciq, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsénium et de Piscidia.

**Forme.** — Dragées.

**Indications.** — Toutes crises nerveuses, Épilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité, Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Phényl-éthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

**Dose.** — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

**Enfants :** 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 23 fr. 70.

Laboratoires **THÉVENOT** — DIJON.

## AZOTYL

**Composition.** — Extrait biliaire, cholestérine, goménol, camphre.

**Forme.** — Ampoules et pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — États de dénutrition et de carence. Anémies. Infections broncho-pulmonaires.

**Doses et mode d'emploi :**

A. *Ampoules.* — Injections sous-cutanées et mieux intramusculaires (tous les jours ou tous les 2 jours).

B. *Pilules glutinisées.* — 6 par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Laboratoires **LOBICA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## AZUFROL

*Soufre colloïdal.*

**Description.** — 1° *Capsules* glutinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes de 45 grammes (usage externe).

**Action thérapeutique.** — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du colloïde par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

**Indications.** — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de Sulfurion (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Prix : 33 fr. 50 pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires **Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

**Présentation.** — Poudre.

**Composition.** — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommode. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

**Indications.** — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 19 fr. 60.

La boîte contient 30 cuillerées à café environ. Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

Laboratoire **PARET**

28, rue Guibal — MARSEILLE.

## BABEURRE NESTLÉ EN POUDRE ÉLÉDON

Babeurre demi-gras, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs et à l'alimentation mixte.

Pureté absolue, composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.

Deux formules :

*Simple* : sans sucre ni farine (en boîtes de 250 gr.).

*Complet* : avec sucre et farine (en boîtes de 500 gr.).

**Indications.** — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson. Alimentation des intolérants au lait, des prématurés et des enfants menacés par des troubles digestifs (colonies).

Vente libre.

Prix : au cours.

**Société NESTLÉ**

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

## BABEURRE NUTRICIA

**Composition.** — Lait écrémé ensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

**Présentation.** — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré, babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment. Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

**Mode d'emploi.** — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

**Léon CLAEYS**

1, boulevard Saint-Martin — PARIS (III<sup>e</sup>).

Tél. : Turbigo 92-60.

## BABEURES « LA FAYE »

Pour enfants et adultes.

Préparés avec du lait frais à la ferme de « La Faye », à Marlies (Loire).

**Les Babeures La Faye** sont le résultat d'une fermentation lactique spéciale sur du lait très frais privé de sa matière grasse et non le résidu de la fabrication de beurre, d'où leur goût agréable.

Ils sont *liquides* afin de conserver toutes leurs propriétés (lactosérum, caséine modifiée). D'une conservation parfaite, d'une digestibilité incomparable, ils sont constants, sûrs et efficaces, et ne demandent aucune manipulation. Ils sont présentés sous trois formes :

**Babeurre léger** (étiquette bleue) pur, sans farine, 498 calories au litre, acidité 3 grammes, 35 grs. de sucre au litre. Indiqué pour les prématurés, débiles, vomisseurs et pour les hépatiques.

**Babeurre soupe** (étiquette blanche). Mélange de farines 3% 764 calories, acidité 7 grammes, 75 grs. de sucre au litre. Aussi nourrissant que le lait. *Le plus employé* à cause de son pouvoir calorique et thérapeutique et de sa grande facilité d'assimilation. Indiqué dans tous les troubles digestifs même légers, intoxications, dermatoses, intolérance lactée, et aussi comme complément du sein et pour éviter les troubles du sevrage.

**Babeurre gras** (étiquette rouge). Même composition que le Babeurre soupe ordinaire avec 35 grammes de matières grasses, 1 072 calories, 75 gr. de sucre au litre. Suralimentation des convalescents (particulièrement après typhoïde, colibacillose), pré-tuberculeux, enfants aux intestins délicats, anorexiques. Bien supérieur au yoghourt.

**Posologie.** — Ces trois babeures, présentés en boîtes de 430 grammes, s'emploient de la même façon et quantités que le lait naturel en tenant compte de leurs indications particulières. En cas de troubles graves, multiplier au début le nombre des repas en diminuant les doses.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Fournisseurs des Hôpitaux et des Municipalités de Lyon et de Saint-Étienne depuis 30 ans.

**Ferme de LA FAYE**

MARLIES (Loire),

## BABEURES MOLARD

employés dans les Hôpitaux.

Babeurre, farine et sucre.

Présentés sous trois formes :

**1° BABEURRE LÉGER** : liquide, vendu en boîtes de 500 gr., 6 fr. conservation parfaite, acidité 4 gr., farine 0,5 p. 100, sucré — 500 calories par litre.

**Indications.** — Vomissements, troubles digestifs graves, alimentation des prématurés.

**2° BABEURRE NORMAL** : liquide, vendu en boîtes de 1 kg. et 500 gr., acidité 5 gr., farine, sucré, 750 calories par litre.

**Indications.** — Gastro-entérites, eczéma, intolérance lactée, débilité congénitale, athrèpie, troubles du sevrage ; 9 fr. 50 la boîte de 1 litre.

**3° BABEURRE GRAS** : même composition que le Babeurre normal, mais addition de 30 gr. de matière grasse, donnant ainsi 1050 calories par litre.

**Indications** — Anorexiques, hypotrophiques, hypothrepsiques.

**Prix** : 8 fr. 50 la boîte de 500 gr.

**Doses.** — Mêmes doses que le lait.

*Durée de l'alimentation au Babeurre : de 1 à 10 mois.*

Echantillons sur demande.

Lait **MOLARD**

25, Cours Lafayette — LYON (VI°).

Tél. : L. 20-71.

## BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie. Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation.

**Formes.** — Ampoules injectables de 1 cc., ampoules *Buvables* de 5 cc., cachets, dragées.

**Indication.** — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

**Mode d'emploi.** — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours, ou prescrire une à deux ampoules *Buvables* tous les deux jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 32 fr. 20.

La boîte de cachets ou de dragées : 21 fr. 10.

La boîte de 18 ampoules *Buvables* : 25 fr. 80.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière.

**LABORATOIRE AMIDO**

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°). (Tél. : Archives 41-65.)

## BACTÉ-INTESTI-PHAGE BACTÉ-COLI-PHAGE (1)

**Composition.** — *Bacté-Intesti-Phage* : Mélange de Bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

*Bacté-Coli-Phage* : Mélange de Bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou Paracoli.

**Propriétés.** — Le Bactériophage de d'Hérèlle est un principe qui détruit et dissout les bactéries, qui se régénère au cours de la lyse, dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

**Avantages.** — Action puissante et rapide, Innocuité absolue, pas de contre-indication.

**Indications.** — *Bacté-Intesti-Phage* : Entérites, Colites, Diarrhées infantiles. *Bacté-Coli-Phage* : Colibacilluries, Pyérites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

**Forme.** — *Bacté-Intesti-Phage* : ampoule de 2 cc. *Bacté-Coli-Phage* : ampoules de 2 cc. et 10 cc.

**Posologie.** — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cc. d'eau alcaline (voir notice explicative).

En outre, pour le *Bacté-Coli-Phage* : instillations vésicales (voir notice explicative).

**Prix.** — 10 ampoules de 2 cc. .... 37 fr. 50  
5 ampoules de 10 cc. (B. Coli) .... 75 fr. 10

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII°). (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparés par le Laboratoire du Bactériophage.

## BACTÉ-PYO-PHAGE BACTÉ-STAPHY-PHAGE (1)

**Composition.** — *Bacté-PYO-Phage* : Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.). *Bacté-STAPHY-Phage* : Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de staphylocoques (*Aureus-Citrus-Albus*).

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées, Infections urinaires à staphylocoques.

**Avantages.** — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc., 5 cc., 10 cc.

**Posologie.** — A. Injection *In situ* (méthode Raiga) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu. B. En pansements locaux. C. En ingestions buccales.

**Prix** : 4 ampoules 2 cc. : 22 fr. 50 ; 10 ampoules 2 cc. : 37 fr. 50.  
5 — 5 cc. : 43 fr. 70 ; 5 — 10 cc. : 75 fr. 10.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII°). (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparés par le Laboratoire du Bactériophage.

## BACTÉRAMIDE

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 363-58.

**Forme.** — Comprimés.

**Composition.** — Dosés à 0 gr. 50 de para-amino-phényl-sulfamide purissime et à 0 gr. 12 de bicarbonate de soude par comprimé.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Chimiothérapie des affections provoquées ou aggravées par les streptocoques, pneumocoques, gonocoques, méningocoques et colibacilles.

**Mode d'emploi.** — Selon les indications particulières de l'affection.

**Prix :** En étui de 20 comprimés : 21 francs.

**Laboratoires A. BAILLY**  
(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher, PARIS (8<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30.)

## BACTÉ-RHINO-PHAGE (1)

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx. (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.)

**Propriétés.** — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

Qui détruit et dissout les bactéries ;  
Qui se régénère au cours de la lyse ;  
Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

**Avantages.** — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

**Indications.** — Grippe, Coryza, Rhino-Pharyngites, Otites, Sinusites.

**Forme.** — Boîtes de 4 et 10 ampoules de 2 cc.

**Posologie.** — A. En instillations au moyen de la tétine de caoutchouc contenue dans la boîte.

B. En pulvérisations au moyen du Pulvolyseur Ercé.  
Une ou plusieurs ampoules, suivant la gravité des cas, plusieurs fois par jour.

**Prix :** 4 ampoules 2 cc. : 22 fr. 50

10 ampoules 2 cc. : 37 fr. 50

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

1, av. de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparé par le Laboratoire du Bactériophage.

## BACTÉ-RICYL

**Antiseptique physique**

agissant par sa Tension-Négativité.

Puissant bactéricide. Non toxique. Non irritant.  
(Odeur et goût agréables — Ne tache pas le linge.)

**Composition.** — Solution stable, concentrée de ricinoléate de triéthanolamine à 30 p. 100.

**Indications.** — Désinfection de la cavité bucco-pharyngienne. Angines, Amygdalites, Stomatites, Gingivites. Prévention des maladies infectieuses à point de départ pharyngé : Gripes, Fièvres éruptives, Maladies épidémiques. Soins gynécologiques et obstétricaux : Leucorrhées, Vaginites (blennorragiques ou autres). Ulcérations de toute nature, etc.

**Mode d'emploi.**

Gargarismes, lavages buccaux, pulvérisations :  
1 mesure de la pipette jaugée pour un grand verre d'eau.

Lavages gynécologiques et chirurgicaux :  
1 à 3 mesures de la pipette jaugée pour 1 litre d'eau.

**Prix :** 13 fr. 90.

**Laboratoires A. WELCKER et C<sup>ie</sup>**  
22, rue de l'Est — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : Molitor 03-39.)

## BACTURYL

**Comprimés.**

**Formule :**

Hexaméthylène-tétramine. ....	0,15
Acide Benzoïque. ....	0,15
Salol. ....	0,20
Bleu de Méthylène. ....	0,015

Pour 1 comprimé dragéifié.

50 comprimés. **Prix :** 22 fr. 35.

**Indications :**

Pyuries, Bactériuries, Colibacillooses, Pyérites et Pyélo-néphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites.

**Dose moyenne :**

2 comprimés avant chacun des 3 repas.

**Laboratoire de la SULFO-THIORINE**

**J. DEDIEU, Pharmacien.**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.  
(Tél. : 820-04.)

## BAIN BAGNOR RADIOACTIF

Le seul approuvé et autorisé par l'établissement thermal de

**Bagnoles-de-l'Orne.**

Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de Bagnoles-de-l'Orne, suractivé par le bromure de radium. Prépare et prolonge la cure de Bagnoles-de-l'Orne.

**Indications thérapeutiques.** — Troubles circulatoires de toutes natures. Phlébites, varices, stase veineuse. Rhumatismes chroniques, névralgies et toutes affections douloureuses.

**Forme.** — En paquet pour bain de 200 litres. Faire dissoudre au moment de l'emploi.

**Posologie.** — Cure intensive : 3 bains par semaine pendant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine. Repos couché après le bain.

Prix du bain : 11 fr. 80.

Fabrication assurée.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

**Composition.** — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

**Indications.** — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatismes, arthritisme.

*Enfants* : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

**Gynécologie** : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 boîte par bain.

*Enfants* : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Élysées 17-46.)

## BAIN DE BOUCHE A LA DUNA-CAÏNE

Bain de bouche anesthésique.

**Indications.** — *Stomatologie* : douleurs post-opératoires, stomatites, ulcérations gingivales, prises d'empreintes, pointes de feu, galvano-cautérisations.

*O.-R.-L.* : Angines, processus phlegmasiques, abcès de l'amygdale, ulcérations diverses, dysphagie d'origine cancéreuse ou tuberculeuse.

**Présentation.** — Flacon de 40 cc. avec mesure graduée de 5 cc.

**Mode d'emploi.** — En gargarismes, bain de bouche, ou tamponnement local. On dilue le contenu d'une mesure de bain de bouche dans un quart, un demi ou un verre d'eau, réalisant une solution de 1 p. 100, 1 p. 200 ou 1 p. 400, suivant l'intensité d'action désirée.

Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>

Docteurs en Pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Élysées 61-46.)

## BAIN FLÉVAR

Minéral. Synthétique, Radifère.

Traitement à domicile des : Phlébites, Varices, Hémorroides et des Troubles de la Circulation veineuse.

Le « FLÉVAR » se présente sous la forme d'une poudre qui, par ses analogies chimiques avec les eaux les plus réputées des Sources thermales azotées et chloro-sulfatées calciques et par ses propriétés radio-actives *contrôlables*, donne à l'eau du bain, pris chez soi, les mêmes propriétés thérapeutiques.

LE BAIN FLÉVAR produit 250 millimicrocuries d'émanation du Radium (Radon) par bain de 200 litres d'eau.

Il ne se recommande d'aucune station. — Il convient à toutes.

Prix de la boîte pour un bain : 12 fr. 50.

Fabrication et dépôt général :

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.



## BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

**Composition.** — Silicate de magnésie hydraté, bicarbonate de sodium, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

**Présentation.** — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

**Indications.** — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

**Posologie.** — Un bain à la température d'environ 37° pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuiller à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 207 fr. 90 ;  
au Corps Médical : 120 francs.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

**Pilules Salvia :** Traitement interne des stases veineuses, varices hémorroides, ménopause, puberté, par l'extrait mou de Teskra. Une pilule avant les 2 principaux repas.

L'étui de 30 pilules : 17 francs.

**Laboratoires VENOT,** Docteur en pharmacie.

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV°). — (Tél. : Sulfren 68 20.)

## BALDISEDAN

**Thérapeutique Génito-Urinaire**

*Pilules. Suppositoires. Ovules.*

**Composition.** — Acide camphorique, hexaméthylène-tétramine, térébenthine de Venise, extrait mou d'uva-ursi, salol, benzo-naphtol.

**Indications.** — Colibacilluries, Cystites, Prostatites, Néphrites, Pyélo-néphrites, Métrites, Salpingites.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique sédatif génito-urinaire. Aseptise et clarifie les urines par modification du pH urinaire.

**Posologie :**

*Pilules :* 3 à 4 avant chaque repas.

*Suppositoires :* 1 à 3 par jour.

*Ovules :* 1 le soir au coucher.

Enregistré au L. N. C. M.

**Laboratoires Robert COLAS**

Docteur en Pharmacie,  
133, rue Lecourbe — PARIS.  
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

## BALLOTYL

Agent le plus efficace de la Phytothérapie Antispasmodique. Sédatif du Grand Sympathique.

**Composition.** — Ballote stabilisée contenant entre autres constituants de la *Choline*, antispasmodique vasculaire et puissant hypotenseur.

**Formes pharmaceutiques.** — Liquide ; Dragées ; Suppositoires.

**Indications.** — Insomnie, Vertiges, Tous états névropathiques, sympathicotoniques ou vagotoniques.

**Posologie :** 4 prises de XXX à LX gouttes ou 4 dragées par jour (avant les 3 repas et le soir au coucher) ; 1 suppositoire le soir au coucher.

**Laboratoire de Phytothérapie de Paris**

**M. GUILLON,** pharmacien

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI°).

Tél. : Roquette 70-76.

## BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

**Forme pharmaceutique.** — Tablettes comprimées effervescentes.

**Composition.** — Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

**Action.** — Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

**Indications.** — Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

**Mode d'emploi.** — Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 8 fr. 20.

**Laboratoires LEES**

Directeur : **Docteur Pierre ROLLAND**  
Dépôt : 127, Bd Saint-Michel — PARIS (V°).  
(Tél. : Odéon 22-01.)

## BALSAFORMINE

(Dragées de).

### Formule :

Anhydrométhylène citrate d'hexaméthylène-tétramine pure.....	0 gr. 25
Térébenthine de Venise purifiée.....	0 gr. 15
Par dragée.	

**Mode d'action.** — Agit comme antiseptique et calmant des organes génito-urinaires et désinfectant général. Inutile acidifier l'organisme.

**Indications.** — Infections du tractus génito-urinaire et des voies biliaires. Pyérites et Pyélonéphrites. Colibacillose urinaire. Bactériurie. Cystites et Catarrhes vésicaux. Urétrites. Prostatites. Vésiculites. Lithiase et Calculose urinaires. Coliques hépatiques et néphrétiques. Gripes.

Prix : le flacon de 50 dragées : 24 fr. 70 (10 jours de traitement).

### Laboratoire ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 francs.

Louis FERRAND, Ex-Interne Laureat des Hôpitaux de Paris, Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, av. Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (T. : Ély. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON (Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies

## BALSAMOL LESCÈNE

**Combinaison** à base de Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoates, Aldéhyde benzylïque.

**Formes.** — Sirop, Comprimés.

**Caractéristiques.** — Produit non toxique. Chez les enfants, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

**Antiseptique** des voies respiratoires. Expectorant, Diurétique, Toni-Cardiaque.

**Indications.** — TOUX, COQUELUCHE, BRONCHITES, GRIPPE, toux émetisante des tuberculeux, asthme, toux des vieillards, Insomnies.

**Doses.** — Enfants de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour. Insomnies : adultes et enfants, 1 cuillerée à soupe le soir au coucher ou pendant la nuit.

### Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## BALSAMORHINOL

**Définition.** — Huile balsamique, antiseptique, décongestionnante, cicatrisante ; d'odeur agréable ; non irritante.

**A base :** 1<sup>o</sup> d'essences végétales (en particulier d'essences de zestes de fruits) dont l'action est bien établie contre les divers microbes qui hantent habituellement les muqueuses des voies aériennes supérieures, et dont la vertu cicatrisante a été éprouvée ; 2<sup>o</sup> de principes décongestionnants, calmants, qui soulagent d'emblée. (Ces principes actifs sont ceux-là mêmes qui entrent dans la composition de nos comprimés *Inhalantyl*.)

**Indications.** — Le Balsamorhinol vise avant tout la désinfection efficace du nez et du rhino-pharynx. Des travaux récents ont montré l'importance capitale de ce dernier comme porte d'entrée d'infections non seulement régionales mais aussi broncho-pulmonaires, méningées, sanguines. Pratiquement, et en bref, les indications sont les suivantes :

*Coryzas* aigus et chroniques ; *rhinites* torpides ou spasmodiques ; *rhume des foins* (*hay fever*) avec ou sans *asthme* ; *sinusites* ; *rhino-pharyngites* ; *laryngites* ; *trachéites* ; *bronchites* ; *injections grippales* ; *toutes injections à point de départ rhinopharyngé*.

**Présentation.** — Flacon avec bouchon compte-gouttes très pratique.

### Mode d'emploi :

De 2 à 4 fois par jour. Soit en *instillations*, à la dose de III à IV gouttes dans chacune des fosses nasales ; soit en *pulvérisations* (3 ou 4 jets du pulvérisateur à l'entrée des narines, pendant qu'on inspire largement) ; soit (de préférence) à la fois en *instillations* et en *pulvérisations*.

Prix : Flacon de 20 cc., 18 fr. 60.

### Laboratoire FIDES

R. VOUZELLAUD, Docteur en Pharmacie

14, rue de la Comète — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 64-13.)

## BALSAQUINTINE LESCÈNE

Nouvelle combinaison terpino-bromoformique suractivée avec camphogalacolate de pilocarpine, de strychnine et d'atropine en milieu d'essences balsamiques.

**Présentation.** — Ampoules injectables indolores de 1 cc. et 2 cc. Sirop Suppositoires.

**Contrôle de tolérance.** — Séries d'injections au cobaye.

**Propriétés.** — Sédatif. Désinfectant pulmonaire. Diurétique. Tonocardiaque. Anti-infectieux. Antithermique. Fluidifie les sécrétions. Préviens les complications des maladies contagieuses.

**Indications.** — Affections pulmonaires aiguës et chroniques, Bronchites, Grippe, Coqueluche, Asthme, Laryngites, Maladies infectieuses. Faux croup.

**Mode d'emploi.** — **INJECTIONS :** Enfants en dessous de 2 ans : 1 cc. tous les 2 jours ; de 2 à 8 ans : 1 cc. par jour ; au-dessus de 8 ans : 2 cc. par jour. **Adultes :** 2 cc. 1 ou 2 fois par jour. Injections intratrachéales, 2 cc. en une fois.

**SIROP :** Enfants : 1 à 5 cuillerées à dessert par jour dans de l'eau.

**Adultes :** 1 à 5 cuillerées à soupe par jour dans de l'eau ou de la tisane.

**SUPPOSITOIRES :** Enfants : 1 à 2 par jour.

**Adultes :** 1 à 4 par jour.

Laboratoires LESCÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS (Tél. Vaugirard 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## BALSOFORME

Mélange de Schleich additionné de Gomenol Prevet.

(Formule du Dr Siauve-Evaussy.)

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

**Indications.** — Anesthésie générale, Prévention des complications pulmonaires post-anesthésiques.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules compte-gouttes de 60 grammes. S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombredanne. Une ampoule suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Prix de vente :

L'ampoule..... 12 fr. 40

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## BANDE DU PRATICIEN

**Présentation.** — Bande élastique, marquée à ses deux extrémités. Double enrobage assurant le coefficient optimum de contention.

Longueur..... 3 m. Largeur..... 0m.08

**Indications.** — Ulcères variqueux et plaies atones. Varices. Œdèmes de fractures. Œdèmes post-phlébitiques. Séquelles de phlébités.

Pour les malades hypersensibles, prescrire de préférence la

## LASTO-BANDE DU PRATICIEN

modèle plus souple et plus mince.

Ce dernier modèle pour le moment fait défaut.

## BANDE DU PRATICIEN

### MODÈLE LUXE

Provisoirement, unique modèle en fabrication.

Prix : 75 francs.

La *Bande du Praticien* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,

HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## « BANDE GILTEX »

Bande élastique pour le traitement ambulatoire des ulcères variqueux, grosses varices, suites de phlébités, œdèmes, etc.

La bande Giltex, longue de 3 m., large de 8 cm., est garantie tissée avec des gommages de latex inattaquables au lavage.

Elle est présentée dans une coquette boîte de carton, entourée de cellophane et livrée avec deux agrafes de fixation supprimant l'épingle anglaise qui détériore le tissu élastique. Prix : 92 fr. 50.

« **GILTEX LÉGÈRE.** » Bande en 7 cm. et 10 cm. pour les petites varices et petites articulations.

« **BAS A VARICES GILTEX.** » Invisible sous les bas de dames. Jarret, jarret montant, cuisse. Tailles : 1, 2, 3. Pendant les hostilités et jusqu'à leur cessation, seule disponible à l'O. C. P. en quantités réduites :

**BANDE « GILTEX-STANDARD »**. Prix : 70 fr. Spéciale pour le traitement ambulatoire des ulcères de jambes.

Dépôt général : O. C. P.

Production BOURVIS-ORTHOPÉDIE

28, cours Gambetta — LYON (Rhône).

(Tél. : Parmentier 33-61.)

## BANDE MÉRINOS « BÉBÉ »

*Bande Rationnelle du premier âge.*

*Extensible, chaude, lavable.*

**Composition.** — Fils crêpe (sans caoutchouc) et laines mérinos, 1<sup>er</sup> choix.

**Indications.** — Pour soutenir les organes fragiles du bébé jusqu'à 18 mois.

Maintient sans comprimer.

Entretient la chaleur autour du ventre.

Poreuse : Laisse respirer l'épiderme.

### Présentation :

Bande n° 1 (9 cm.) jusqu'à 6 mois.

Bande n° 2 (14 cm.) de 6 à 18 mois.

*Fabricants :*

**Pansements PRIMA**

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## BANDE PLATRÉE « PRESTO »

*Brevetée à prise rapide.*

**Constitution.** — Bande de tarlatane sur laquelle le plâtre est fixé par un fourreau hydrophile. Elle comporte en son centre un dispositif spécial breveté, permettant au cœur et à la périphérie de la bande de s'imbiber simultanément.

**Indications.** — Confection facile et rapide d'appareils immobilisateurs plâtrés particulièrement légers.

**Mode d'emploi.** — Immerger verticalement la bande dans l'eau pendant 30 secondes environ. La dérouler en commençant par l'indicateur de départ, qui peut sans inconvénient rester dans l'appareil.

Prix de vente en p<sup>ble</sup> (mai 1941) : la bande de 2 mètres :

5 cm. 7 cm. 10 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm.

5 fr. 70 7 fr. 10 9 fr. 25 10 fr. 50 14 fr. 17 fr. 50

**Laboratoires des Pansements RUBY**

M. PACCARD, Docteur en Pharmacie,  
VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

## BARYTOL

**Examen radiologique du tube digestif.**

Sulfate de baryum poudre, chimiquement pur, inaltérable, d'une innocuité absolue, très opaque. Préparation facile, rapide et de goût agréable.

**Mode d'emploi.** — Verser dans un grand bol contenant 200 à 250 gr. d'eau froide ou chaude, agiter constamment jusqu'à émulsion complète. Le lait de baryum ainsi préparé reste homogène et assure des contrastes remarquables.

### Posologie :

Estomac : *Barytol PM* (200 gr.) : 13 francs.

Transit : *Barytol GM* (400 gr.) : 24 francs.

Conditions médicales et vente en vrac aux hôpitaux, cliniques.

*Émulsionneur et mesure. Prix médical :* 30 francs.

**Laboratoires SAPOREX S. A R. L.**

184, route de Genas — LYON (III<sup>e</sup>).

(Tél. : V. 93-88. Ch. Px : Lyon 96-04.)

## BARYX COLLOÏDAL

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Poudre colloïdale dosée à 84 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1143-2.

**Avantages.** — Facile à diluer. Donne une émulsion très stable. Conservation parfaite.

Examen des contours. Étude du relief des muqueuses. Lavements barytés.

### Posologie :

Estomac : 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 fois.

Région cæco-appendiculaire : 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit : 300 gr. dans 450 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Lavement baryté : 5 à 600 gr. dans 1 l. 1/2 d'eau.

**Présentation.** — Boîte de 150 gr. Prix : 15 francs.

Conditionnement spécial réservé au Corps médical et aux Hôpitaux. 4 kg. — 8 kg. — 18 kg. — 50 kg.

**Laboratoires G.-L. BLIN.**

12, rue Alph.-Braut — CHOISY-LE-ROI (Seine.)

Tél. : BEL. 06-25.

## BARYXINE

Pansement gastro-intestinal.

**Composition.** — Sulfate de baryum chimiquement pur, Kaolin colloïdal, Hydrate d'alumine colloïdal.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1143-3.

**Action.** — Recouvre la muqueuse d'une couche protectrice très adhérente; l'hydrate d'alumine colloïdal forme avec l'acide en excès une masse mucilagineuse qui l'enrobe pendant son parcours intestinal jusqu'à l'expulsion.

**Indications.** — Ulcères, hyperchlorhydrie, gastralgie, dyspepsie, entéro-colite, etc.

**Posologie.** — Dose moyenne : 4 à 6 paquets par jour délayés dans un peu d'eau. En raison de l'innocuité absolue de la Baryxine, ces doses peuvent être dépassées largement.

**Présentation.** — Boîtes de 30 sachets de 5 gr. Prix : 20 francs.

Laboratoires G.-L. BLIN.

12, rue Alph.-Brault — CHOISY-LE-ROI (Seine.)  
Tél. : BEL. 06-25.

## BASEDOWINE

**Indications.** — Maladie de Basedow fruste et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienne. TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE et RÉGLES DOULOUREUSES.

**Composition.** — Extrait thyroïdien, Ovarine et Hormone Ovariennne lipoidique céto-soluble, un dérivé bromé en très faible dose.

**Particularités.** — Médication parfaitement inoffensive.

Traitement d'essai de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

**Posologie.** — 1 à 4 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Prix : 26 fr. 40.

Laboratoires R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## BASMYL

Composition par dragée :

Castoréum .....	0,025
Bromure de Codéine .....	0,01
Dionine .....	0,005
Extraits d'Aconit .....	0,004
De Belladone.....	0,004
D'Ipéca.....	0,005
D'Erisimum et de Grindelia .....	aa 0,05
Thiocol .....	0,10

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Toux spasmodiques, Affections pulmonaires, Emphyseme, Spécifique du spasme dans toutes les affections trachéo-bronchiques.

**Doses.** — 4 à 6 dragées par jour, à distance des repas.  
**Prix :** 17 francs la boîte de 20 dragées. Durée de la boîte : 6 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1206-1.

A. BOUCHAND, Pharmacien  
à MELLE (Deux-Sèvres).  
(Tél. : 46.)

## BAUME ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, *Galacal*, Menthol, Chloroforme.

**Action thérapeutique.** — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle. *Action précieuse dans les affections bronchiques et pulmonaires (Galacal).*

**Indications.** — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

**Mode d'emploi.** — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires ADOL

G. VIENNOIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
50, rue des Rancy — LYON. (Tél. : Moncey 59-77.)

## BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

**Composition et forme.** — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques .....	6	Salicylate d'amyle .....	4
Beurre de muscade .....	2	Acide salicylique .....	3
Vaseline .....	60		

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique et résolatif puissant. Révulsif pulmonaire. Odeur agréable.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

**Mode d'emploi.** — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration, recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Prix : 12 fr. 90 (pour 10 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). — Tél. : Passy 51-12.  
A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

## BAUME du Dr BAISSADE

adopté par les hôpitaux de Paris (Saint-Louis) et de province ; par les Ministères des Colonies et de la Marine.

**Composition.** — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

**Action.** — Antiprurigineux et analgésique, supprime immédiatement les démangeaisons et la douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

**Indications.** — Eczémas suintants, secs aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furonculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

**Mode d'emploi.** — En onctions douces (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Laboratoire du Baume du Dr BAISSADE

Saint-Loup — MARSEILLE.

## BAUME BENGUÉ

**Composition.** — Menthol, Salicylate de méthyle, Lanoline et **Topique Bengué**, Baume sans odeur au Salicylate de Glycol.

**Propriétés et Indications.** — *Analgesique externe* : Rhumatismes aigus ou chroniques, Goutte, Névralgies diverses : faciales, intercostales (points de côté), lombaires (lumbago), ovariennes, sciatiques. Douleurs de l'ataxie locomotrice, Hyperesthésies diverses, Coliques de plomb, Coliques néphrétiques, Péritonite, Gastralgie, Torticolis, Zona.

**Forme.** — Pommade en étui d'étain.

**Posologie.** — Onctions douces et persistantes deux fois par jour; enveloppements d'ouate, serviette ou flanelle.

**Prix** : 11 francs. — L. N. C. M., n° 516-4.

**Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,**  
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trin. 85-60.)

## BAUME DELACOUR

*Gercures et Crevasses des Seins*  
*Gercures en général.*

**Baume benzo-tannique.**

**Mode d'emploi.** — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

**Prix du flacon avec deux bouts de sein** :  
9 fr. 80.

**Laboratoires Henry ROGIER**

56, boulevard Péreire — PARIS  
(Tél. : Wagram 33-70.)

## BAUME HEPTALGINE

Chimiothérapie élective de l'infection cutanée et de la douleur sur les surfaces cutanéo-muqueuses.

**Composition.** — Résorcine, 2 % - Oxyde de zinc, 10 % - associés aux éthers aminobenzoïques dans un excipient gras et neutre spécial, entièrement absorbé.

*Présentation en tube métall.*

**Indications.** — Traitement nouveau et particulièrement efficace de toutes affections cutanées.

**Suppression immédiate de la douleur ou démangeaison.** Aucune contre-indication. Aucune toxicité même chez les nourrissons. Aliment biologique de la peau, agissant en profondeur, il calme, adoucit et rend à la peau un aspect net, lisse et sain.

Pansement anesthésique permettant une antiseptie élective et prolongée, sans nécrose des tissus. Stérilisation et cicatrisation parfaite des téguments.

Eczéma, démangeaisons, plaies, ulcères, brûlures, engelures, gercures, crevasses, toutes lésions et irritations de la peau.

**Mode d'emploi.** — Présenté en tube ou en pot, le Baume Heptalgine est appliqué, *loco dolenti*, selon les indications du médecin. Matin et soir, étendre sur la partie malade une couche épaisse de BAUME HEPTALGINE, qu'on recouvre de gaze propre, s'il y a lieu.

**Prix au public** : 17 fr. 50.

**Laboratoires J. BERTHOUMEYROUX**  
Docteur en Pharmacie — SOULLAC (Lot).  
Echantillons gratuits. Littérature sur demande.

## BAUME KAMOL

Calmant de toutes douleurs articulaires ou musculaires.

A base de Capsicine, camphre de menthe, chloroforme, huile de camphre, éther méthyl-salicylique, incorporés à un excipient non gras.

**Propriétés.** — Le Baume Kamol, à la fois révulsif, antinévralgique, anesthésique et anti-rhumatismal, est un calmant de toutes douleurs articulaires ou musculaires, contre rhumatismes, arthritisme, sciatique, courbature, lumbago, torticolis, crampes, entorses.

Chez les sportifs, réchauffe et assouplit les muscles avant l'exercice, et dissipe la fatigue après l'effort.

Traitement externe des bronchites en application matin et soir. Fabriqué sans corps gras, ne tache pas le linge, ne graisse pas la peau.

**Emploi.** — A utiliser en frictions ou en applications avec enveloppement de gaze ou de coton. Pour les douleurs musculaires ou articulaires, enduire la partie malade de Baume Kamol. Pour le traitement externe des bronchites, faire une large application sur la région pectorale ou dorsale, puis un enveloppement.

**Prix** : 11 fr. 80.

Enreg. au L. N. C. M. sous le n° 610-2.

**Laboratoires SECO G. COGNÉ, Pharmacien.**  
6, rue Adolphe-Ja-Lyre — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## BAUME LARTIGOL

A base de chloral, camphre, acide salicylique et menthol. Odeur agréable, incolore.

**Mode d'emploi.** — Étendre avec les doigts sur la région douloureuse, et faire des frictions douces pendant 5 minutes.

**Indications.** — Contre les névralgies et douleurs de toute nature, assouplissement des articulations avant ou après les exercices sportifs.

Prix, le tube : 16 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente :  
de 2 à 4 semaines.

### ÉTABLISSEMENTS FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58).

## BAUME DE LA MATERNITÉ

### Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique.....	2 gr.
Dermatol.....	0,50
Baume du Pérou.....	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.
pour un tube.	

**Propriétés thérapeutiques.** — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

**Indications.** — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**  
7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## BAUME OBERLIN

**Sédatif des algies justiciables de la médication salicylée.**

Douleurs névralgiques  
(sciatique, névrites, etc.).

Rhumatismes, Lumbago, Goutte.

**Formule.** — Pour 100 gr.

Ulmarene..... 17 gr. 25

Menthol..... 3 gr. 45

Chloroforme..... 3 gr. 80

Lanoline-Vaseline. Q. S.

En tubes de 35 gr.

*A employer en frictions ou en applications.*  
Sous réserve des possibilités de fabrication.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris

17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>)

(Tél. : Trudaine 14-73.)

## BAUME-PANTHÉSINE

Analgésique externe et antiprurigineux  
non révulsif, à base de Panthésine,  
anesthésique local.

*Fabrication provisoirement suspendue.*

## PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal  
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.  
Ne tache pas le linge.

### Indication :

**Traitement externe des douleurs rhumatismales et des névralgies.**

### Présentation :

Solution aromatisée à 33 % de Salicylate de Glycol.  
Flacon de 45 gr. environ.

**Mode d'emploi :** Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté non compressif. Éviter de frictionner.

Le flacon : 13 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## BAUME ROBUR

Toutes douleurs Rhumatismales, Névralgies et Musculaires.

### Formule :

Extrait de belladone .....	0 gr. 30
Salicylate d'Amyle .....	5 gr.
Campbre .....	4 gr.
Menthol .....	2 gr.
Chloroforme .....	3 gr.
Teint. de Capsicum .....	4 gr.
Ess. de lavande .....	1 gr.
Ess. de Cèdre .....	3 gr.

Lanovaseline pour 100 grammes.

En tube de 90 grammes.

**Mode d'emploi.** — En massages et applications.

Le remarquable pouvoir de pénétration et d'entraînement dans les tissus de l'essence de Cèdre triple l'efficacité du Baume Robur.

Prix : 18 fr. 50.

Échantillon et Littérature :

Laboratoire ABARNOU  
72, avenue Thiers — LE MANS  
(Tél. : 15-56.)

## BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

**Propriétés thérapeutiques.** — Il en est quatre principales :

Le Baume Sélénia est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*,

**Indications.** — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermies*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

**Mode d'emploi.** — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 17 fr. 60.

Préparé par **C. DAVID** et ses fils

Pharmaciens, 49, rue de Bitche — COURBEVOIE  
(Seine). (Tél. : Défense 28-46.)

## BAUME THOMAS

### Formule :

Scuroforme .....	5
Borate de soude .....	4
Excipient insoluble, Q. S. pour 100 gr.	

**Présentation.** — Pâte de goût et d'odeur agréables.

**Indication.** — Douleurs de la dentition chez les nourrissons.

**Avantages.** — Ne fond pas dans la bouche. Malgré les suctions de l'enfant, reste en contact avec la gencive pendant toute la durée de la friction et assure ainsi rapidement une anesthésie prolongée. Absolument inoffensif. Nombreuses attestations médicales.

**Posologie et mode d'emploi.** — Effectuer avec le doigt recouvert d'un peu de Baume Thomas des frictions sur les gencives douloureuses aussi souvent que nécessaire.

Enregistré au Lab. N<sup>o</sup> de Contrôle sous le n<sup>o</sup> 650-2.

Laboratoires THOMAS

2, rue Sainte-Cécile — 31, fg Poissonnière — PARIS (IX<sup>e</sup>)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

**Forme.** — Liquide de fluorescence verte.

**Composition.** — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Essence de pin 40,00 pour 100 gr.

**Indications.** — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

**Posologie.** — Une à deux cuill. à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de 3 bains...	8 fr. 10
		— de 15 — ...	32 fr. 90
		— de 50 — ...	86 fr. 30
		— de 100 — ...	155 fr. 10

Enregistré au L. N. C. des M. sous n° 659-1.

Laboratoires **FISCH** et C<sup>ie</sup> S. à r. l.  
VIBRAYE (Sarthe).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.  
(Tél. : Trudaine 92-52.)

## BBDERM MARS

Pommade adhésive contre toutes les dermatites simples et particulièrement contre celles des nourrissons. Recouverte d'une simple couche de poudre de talc, elle forme à elle seule un véritable pansement qui protège la peau.

**Formule.** — Oxyde de zinc pur, sous-gallate de bismuth, lanoline, vaseline.

**Mode d'emploi.** — Étendre une couche bien homogène sur toutes les parties atteintes et poudrer. Renouveler ce pansement au moins une fois par jour, après avoir enlevé la vieille pommade à l'aide d'un tampon d'ouate imbibé d'huile.

**Indications.** — Dermites, prurits, etc. C'est le préservatif et le curatif par excellence de tous les érythèmes des nourrissons. Dans les dermatoses suintantes et impétigo, employer le **BBDERM ECZÉMA** après lavages à l'eau Sanuorolée. (Voir à l'article SANUBROL MARS.)

2 sortes de Bbderm Mars :

*Bbderm simple* : toutes dermatites des nourrissons.

*Bbderm Eczéma* : impétigo, eczéma et toutes dermatites suintantes.

Prix : 13 fr. 50 le tube.

Échantillons sur demande.

Enregistré au L. N. C. sous les n° 1649-3 et 1649-4.

Laboratoire **MARS** — GUÉRANDE (Loire-Inf.)  
et Condest — LA ROCHE BERNARD (Morbihan).

## BÉATOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif nerveux. Hypnotique.

**Indications.** — Insomnies, Affections nerveuses ou mentales, Douleurs d'ordre toxique, psychique ou réflexe.

**Composition.** — A base de Diéthylmalonylurée, de jusquiame et de valériane.

**Formes.** — Comprimés, Liquide et Ampoules.

**Doses et mode d'emploi :**

1° *Liquide ou Comprimés* : A prendre dans ou avec une infusion de tilleul, de fleurs d'oranger ou d'eau sucrée : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés dans les 24 heures, de préférence au repas du soir, au coucher ou dans la nuit.

2° *Ampoules* : Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée, ou mieux intramusculaire, le soir au coucher ou suivant prescription médicale.

Laboratoires **LOBICA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## BÉBÉ-POUDRE composée DELABARRE

**Composition.** — Oxyde de Titane, Oxyde de Zinc, Silicate de Magnésie hydraté, Acide Borique, Sous-Nitrate de Bismuth.

**Indications.** — Érythèmes, Irritations, Rougeurs des Nourrissons, Dermatoses, etc.

**Présentation.** — Tube-pulvérisateur.

**Mode d'emploi.** — Projection sur l'épiderme par pulvérisation.

Prix : 14 fr. 70.

Établissements **FUMOUBE**

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.  
(Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

## BÉCÉDINE

**Reconstituant général. Aliment des enfants. Granulé sucré vitaminé en vitamines B<sup>1</sup> et C, associées à des sels'calciques et phospho-calcomagnésiens assimilables, ainsi qu'à des sels de métaux éminemment catalyseurs.**

### Composition:

Vitamine B <sup>1</sup> ou aneurine.....	2.680 Q. I.	ou	0 gr. 008
Vitamine C ou acide ascorbique.....	3.000 U. I.	ou	0 gr. 50
Glucosate de chaux.....			5 gr. 051
Inosito-hexaphosphate mixte de calcium et de magnésium.....			3 gr. 030
Citrate ferro-ammoniacal.....			0 gr. 101
Hydroxyde de manganèse.....			0 gr. 010
Sulfate de cuivre.....			0 gr. 0005
Excipient sucré aromatisé, Q. S. pour.....			100 grammes.

**Indications.** — Hypovitaminoses B<sup>1</sup> et C: Asthénie. Manque d'appétit. Amaigrissement. Constipation. États hémorragiques. Grossesse. Allaitement. Débilité infantile. Croissance difficile. Dépression nerveuse. États de moindre résistance aux infections microbiennes.

**Posologie.** — *Adultes*: 2 cuillerées à café par jour.

*Enfants*: 1 cuillerée à café par jour.

*Nourrissons*: 1/2 cuillerée à café par jour.

A prendre 15 jours à 3 semaines par mois.

**Emploi.** — De préférence à la fin des repas.

Pour les nourrissons, dissoudre dans un peu de lait ou d'eau.

Prix: 26 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 610-13.

**Laboratoires SEGLO — G. COGNE, Pharmacien**  
6, rue Adolphe-Ia-Lyre, COURBEVOIE (Seine).

## BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

**Composition.** — A base de vieux vin de liqueur, le *Beef Lavoix* contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

**Indications.** — Convalescence; Inappétence; Tuberculose; Anémie; Épuisement; Grossesse; Allaitement.

**Posologie.** — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

**Prix:** le flacon: 44 fr.; le 1/2 flacon: 25 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. n° 759-1.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> PILLET**  
222, boulevard Pereire — PARIS.

## BELCARMINE

**Association de Belladone, Jusquiamine, Formine, Charbon animal et végétal.**

**Formule.** — Une cuillerée à café de granulé contient: Teinture de Belladone, teinture de Jusquiamine: à 5 gouttes. Formine 0 gr. 15. Charbon animal 0 gr. 50. Charbon végétal 1 gr.

**Présentation.** — Granulé fondant. Cachets. Dragées.

**Indications:** — *Troubles digestifs vagotoniques.* Entérocrites, cholécystites chroniques, angicholites, fermentations intestinales, constipation chronique, aérophagie.

### Mode d'emploi:

*Adultes*: 2 à 3 cuillerées à café ou cachets après les repas.

*Enfants*: 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour.

**Prix:** Boîte modèle courant: 17 francs. (Durée moyenne, 7 jours.)

Flacon Cure: 37 fr. 80.

**Laboratoire R. THIRODE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie.

33, Grande-Rue — BESANÇON. (Tél.: 30-37.)

## BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval,  
Sérum hématopoïétique.

**Indications.** — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux: plaies, ulcères variqueux, brûlures.

**Mode d'emploi.** — Par voie buccale: 1 à 2 ampoules par jour.

**Prix public:** 22 francs la boîte de 6 ampoules.

Compléter le traitement par l'usage de la  
**SANQUIPLASMINÉ**

Granulé préparé avec le Caillot sanguin:  
Hémoglobine, 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public: 15 francs le flacon.

Littérature et échantillons sur demande:

**Laboratoire de Sérothérapie**

**H. AMMANN, Pharmacien**, Licencié ès sciences,  
Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT.

(Tél. Volitor 01-90.)

**FABRICATION SUSPENDUE;**  
**REPRENDRA APRÈS LES ÉVÉNEMENTS**

## BELLADÉNAL

Association de Bellafoline ( $\frac{1}{4}$  de mgr.) et de Phényl-éthyl-malonylurée (5 centigr.).

Sédatif nervin général et des cas résistants.

**Indications spéciales.** — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse, énurésie. Mal de mer.

**Posologie.** — *Comprimés* : 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour. *Enfants* : 1 à 4 demi-comprimés. *Suppositoires* : 1 à 2 par jour.

*Belladénal injectable* : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BELLAFOLINE

Alcaloïdes totaux de la Belladone.

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

### Posologie :

*Comprimés* : 1 à 2, trois fois par jour.

*Gouttes* : X à XX, trois fois par jour.

*Ampoules* : 1/2 à 2 par jour (injections sous-cutanées, intramusculaires et endoveineuses).

*Sirop* : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

*Suppositoires* : 1 à 3 par jour.

### Naupathie :

*Bellafoline* : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

*Belladénal* : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BELLERGAL

Modérateur de l'éréthisme nerveux. Traitement du terrain névropathique et de l'émotivité. Régulateur des dystonies neurovégétatives. Traitement préventif du mal de mer.

**Composition.** — Comprimés dragéifiés renfermant : Tartrate d'ergotamine (Gynergène) : 0 mgr. 3.

Alcaloïdes totaux de la belladone (Bellafoline), 0 mgr. 1.

Phényl-éthyl-malonylurée : 2 cgr.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 4 dragées par jour, et jusqu'à 6 s'il y a lieu.

*Enfants* : 1 à 3 dragées par jour à partir de 5 ans.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BELLINGUOL

Traitement du diabète par amélioration progressive des fonctions glandulaires.

*Organothérapie Bellas*

**Présentation.** — En boîtes de 50 comprimés : 46 fr. 90.

**Composition.** — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Extrait de rate, Poudre de bile.

**Indications.** — Toutes formes de diabète après l'âge de 40 ans. Particulièrement indiqué dans les cas de plaies diabétiques ou plaies accidentelles chez les diabétiques.

**Posologie.** — 3 à 9 comprimés par jour à prendre 1/2 heure avant les repas, matin, midi et soir.

Dans les cas de glycosurie persistante chez des malades impatients et habitués à ne reconnaître une amélioration de leur état que dans la diminution immédiate du taux de sucre dans l'urine, ce résultat peut être obtenu en administrant des doses massives, soit 9 comprimés par jour. Toutefois à cette dose le Bellinguol provoque parfois des troubles intestinaux (diarrhée) ne présentant aucun danger, mais souvent pénibles. Il vaut donc mieux faire patienter le malade et persister avec des doses moyennes pour arriver normalement au même résultat.

**Régime.** — Le régime habituel, mais moins rigoureux, est à suivre. Enreg. au Labor. nat. de Contrôle des médicaments. N° 167-16.

Laboratoires ABADIE-TANZI

**B. Abadie, Pharmacien**, 3, place Intérieure-St-Michel - TOULOUSE (Tél. 213-06.)

## BEMAX

Le produit naturel le plus riche connu en **Vitamines B**.

Constitué de germes de blé sélectionnés et stabilisés, contient en outre des vitamines A et E en quantité notable. Teneur en phosphore 2,66 p. 100 en P 2 O<sub>5</sub>.

**Indications.** — Toutes déficiences en vitamines B, et spécialement : Traitement curatif de la constipation et de l'atonie gastrique.

Grossesse et allaitement (dans ce cas, tripler ou quadrupler la dose, un minimum de 500 unités par jour étant nécessaire).

Enfants sous-alimentés, débilités ou simplement de constitution délicate ; rachitisme.

Convalescences, **Suites de grippe**.

Diabète (augmente la tolérance des hydrocarbures).

**Doses.** — Le traitement doit être prolongé au moins un mois. 1 cuiller par jour : à soupe pour les adultes ; à café ou à dessert pour les enfants.

Se prend dans du potage, du café, des compotes, etc.

Prix : 26 fr. 40 (durée : 6/8 semaines).

Laboratoire CANAT

4 ter, rue Barbès — COURBEVOIE.

(Tél. : Défense 69-35.)

## BÉNÉVERA « ROCHE »

**Composition.** — Vitamine B<sub>1</sub> (aneurine cristallisée).

**Propriétés.** — Régulation des oxydo-réductions intracellulaires.

Élimination rapide des déchets toxiques du métabolisme des sucres.

Aucune toxicité, aucun danger d'hypervitaminose.

**Indications.** — Béri-béri, Polynévrites alcoolique et nicotinique, Polynévrite des diabétiques, Sciatique, Névroses intestinales, Vomissements incoercibles de la grossesse, Auto-intoxications des nourrissons, Furunculose, Cardiopathies carencielles, Traitements neurologiques, Bourdonnements d'oreille post-grippaux, Surmenage, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — *Comprimés* dosés à 1 mgr. — *Ampoules* de 1 cm<sup>3</sup> de dosage normal (2 mg.) — *Ampoules* de 1 cm<sup>3</sup> de dosage fort (10 mg.) — 1 à 2 comprimés par jour ; 1 ampoule de 1 cm<sup>3</sup> à 2 mg. tous les jours, 1 ampoule de 1 cm<sup>3</sup> à 10 mg. tous les deux ou trois jours selon les cas.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N<sup>os</sup> 504-81 (ampoules normales), 504-83 (comprimés), 504-84 (ampoules fortes).

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Arch. 91-10)

## BENSAMINE

**Composition.** — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

**Indications.** — **Voies urinaires :** urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. **Syndrôme entéro-rénal.** Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

**État général :** Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

**Formes :**

1<sup>o</sup> Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous).

2<sup>o</sup> Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 1444-6.

Laboratoires **BEAUXIS-LAGRAVE**

72, quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Botzaris 38-78.)



## BENZÉTHOL

**Calme la toux.**

**Tarît l'expectoration.**

**Relève l'état général.**

**Composition et présentations.** — Benzoate de diéthanolamine : Ampoules intraveineuses de 10 cc., solution à 20 p. 100.

**Indications.** — Suppurations pulmonaires, Absès du poumon, Bronchite chronique, Dilatation des bronches, Broncho-pneumonies, Bacilliose pulmonaire.

**Posologie.** — Une injection par jour. L'injection intraveineuse doit être poussée très lentement pour éviter les petits incidents : bouffées de chaleur, rougeur de la face, sensations douloureuses fugaces au creux épigastrique, impression de voile noir.

**Contre-indications.** — Hépatiques et rénaux.

**Prix :** La boîte de 6 ampoules : 52 fr. 80.

Vrac sur demande.

**Laboratoires M. BORNE**

Fournisseurs des Hôpitaux, des Ministères des Colonies et de la Marine.

24, rue des Ursulines — SAINT-DENIS (Seine)  
(Tél. : Plaine 24-30.)

## BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisymphilitique énergique.)

*Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux*

**Indolores. — NI abcès. — NI enkystement.**

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacydylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15, ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzo-bismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant, pour 5 injections.

**Laboratoires MILLOT**

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## BENZOCARBINE

**Formes.** — Granulés. Cachets.

**Composition.** — Charbon, Benzonaphtol, Hexaméthylène-tétramine.

**Indications.** — Affections intestinales.

**Posologie.**

**Granulés:** 1 à 3 cuillerées à café après le repas.

**Cachets:** 3 cachets par jour au moment des repas.

Laboratoire de

Thérapeutique Générale du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien,

RIVE-DE-GIER.

## BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

**Composition :**

Benzoate de benzyle et dériv. benzylés. 10

Extr. fluide valériane fraîché stabil. . . 1 000

Alcoolature de Passiflora Incarn. . . . . 1 000

Teinture de Cratægus oxyacantha . . . 1 000

**Indications.** — Tous les états spasmodiques,

Insomnies, Angoisses, Vertiges, Éréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

**Posologie.** — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés.

Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 16 fr. 20.

Comprimés, 18 fr. 50. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie  
105, rue de Rennes — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 80-76.)

## BENZO-GYNCESTRYL

Benzoate d'œstradiol.

**Composition.** — Hormone folliculaire estérifiée, cristallisée, chimiquement pure.

**Indications.** — Toutes les déficiences ovariennes : Hypoménorrhées, Dysménorrhées, Ménopause.

**Présentation.** — Solution huileuse injectable de benzoate de di-hydro-folliculine en ampoules de 1 cc. dosées à 1 mgr.

**Posologie.** — Si la fonction ovarienne n'est pas abolie : 1 à 6 injections entre les 5<sup>e</sup> et 16<sup>e</sup> jours du cycle menstruel.

Si la carence est totale : 6 injections par mois.

Prix au public : La boîte de 2 ampoules : 31 francs. (Consulter les « Schémas d'Utilisation des hormones ovariennes », édités par le « Département Scientifique » des Laboratoires Roussel.)

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 58-43.)

## BENZO-GYNCESTRYL 5

Benzoate d'œstradiol.

**Composition.** — Benzoate de di-hydro-folliculine cristallisée, chimiquement pure.

**Indications.** — Déficiences graves de la fonction ovarienne : Aplasie utérine, Aménorrhées, Troubles de la ménopause ou de la castration, Troubles trophiques, Prurit vulvaire.

**Présentation.** — Solution huileuse injectable en ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr. (50 000 Unités internationales).

**Posologie.** — Si la malade est encore réglée : 1 à 4 injections entre les 5<sup>e</sup> et les 16<sup>e</sup> jours du cycle menstruel. Si la malade ne l'est pas : 1 à 4 injections par mois, selon le but à obtenir.

(Consulter les « Schémas d'utilisation des hormones ovariennes », édités par le « Département scientifique » des Laboratoires Roussel.)

Prix au public :

La boîte de 1 ampoule dosée à 5 mgr. (50 000 U. I.) 49 fr.

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL

LABORATOIRES FRANÇAIS

DE CHIMIOTHÉRAPIE

S. A. au cap. de 10 000 000. — R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 58-43.)

## BÉTUL-OL MIDY

**Composition.** — Menthol et chloral, en solution dans le salicylate de méthyle.

**Propriétés.** — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

**Indications.** — Lumbagos, Sciatiques, Douleurs des articulations, Névralgies, Névrites, points de côté, douleurs thoraciques, courbatures.

**Forme.** — Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

**Posologie et mode d'emploi.** — Le BÉTUL-OL MIDY peut être employé, soit sous forme d'onctions et de frictions, soit sous forme d'enveloppements.

**1° Onctions et frictions:** Enduire la région douloureuse avec une pièce de flanelle imbibée de BÉTUL-OL. Frictionner doucement et longtemps. Recouvrir avec la flanelle, puis avec un taffetas gommé imperméable et une couche de coton.

**2° Enveloppements:** Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé puis de coton. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour.

L'absorption du BÉTUL-OL se fait si rapidement par la peau que, 10 minutes après, on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prix : 22 fr. 50 Durée du traitement : 10 jours.  
Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Wagram 51-10 + lignes groupées).

## BEVITINE

Vitamine B1 cristallisée.

Vitamine B1 cristallisée, antinévritique. Comprimés et solution injectable.

Vente limitée à la France, Colonies Françaises, Pays de protectorat et sous mandat français.

**Indications.** — Bériberi, troubles du métabolisme, de la nutrition des nerfs, névrites, polynevrites (toxiques, infectieuses, gravidiques, diabétiques), névralgies, funiculites, myéloses, chorée, sclérose en plaques, diabète, anorexie du jeune âge.

**Présentations et posologie.**

Comprimés dosés à 0 g. 005 (tubes de 20). 1/2 à 1 comprimé par jour suivant l'âge. Le tube : 36 fr. 60.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 g. 002 de Vit. B1 — 30 fr. 50.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 g. 01 de Vit. B1 — 85 francs.

Injectons sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses (0 g. 002 à 0 g. 01 *pro die* suivant la gravité des cas. Séries de 10 à 12 injections).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

Marques Pouleno Frères et Usines du Rhône ]  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## BEXININE

Sirop anticoquelucheux.

**Composition.** — Association d'essences aromatiques antiseptiques des bronches (eucalyptol, niaoull, cyprès, serpolet, etc.) et d'antispasmodiques (bromoforme, benzoate de benzyle, droséra et grindélia).

**Indications.** — Efficacité remarquable dans le traitement de la *coqueluche*, toux spasmodiques, toux rebelles, catarrhe bronchique.

**Posologie.** — Peut être prescrit depuis l'âge de deux mois : X à XXX gouttes en 3 fois par 24 heures.

Enfants de 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

Enfants de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Prix du flacon : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments, n° 1463-1.

Laboratoires de la Bexinine — L. COLIN  
19, rue Saint-Jean — CAEN (Calvados).

## BI-AS AGUETTANT

Caodylate de Bismuth injectable.

Solution aqueuse stable.

Injectons intramusculaires indolores.

**Indications.** — Traitement de la Syphilis à ses différentes périodes.

Grâce à son absorption rapide, le Bi-As permet de blanchir rapidement les malades porteurs d'accidents apparents.

**Posologie.** — 1 ampoule tous les deux ou trois jours, par voie intramusculaire.

Les injections sont faciles, indolores et ne laissent aucun tatouage.

La solution est stable, limpide et incolore.

Prix : La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 26 francs.

Le Bi-As paru en 1939 apporte un nouvel élément utile à la thérapeutique bismuthique ; notre documentation est à la disposition des médecins.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 130-13.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)



## BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

**Présentation.** — Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 035 de bismuth métal par cent. cube.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydrosolubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

**Posologie.** — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série par 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 35 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, Place Lucien-Herr — PARIS (V\*).

(anciennement 43, rue Tournesort). (Gobelins 26-21.)

## BI-CITROL MARINIER

**L'Agent rationnel de la Médication citratée.**

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

**Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux, Décongestif.**

*Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :*

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau chaude, au cours du repas ou au moment des malaises.

*Insuffisance hépatique, Arthritisme :*

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée à café avant chaque repas.

*Hyperviscosité sanguine :*

(Pléthore, Hypertension, États congestifs, Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau trois fois par jour avant les repas.

*Pneumonie :*

Une cuillerée à café toutes les 2 ou 3 heures.

*Enfants :* 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Prix du flacon : 22 fr. 80.

### AVIS IMPORTANT

Les circonstances nous ont amenés à mettre en vente en plus de la forme normale un

“ **BI-CITROL CONCENTRÉ** ” modèle triple.

Ce dernier contient trois fois plus de principes actifs. En conséquence, le mode d'emploi ci dessus s'applique en remplaçant la mention « une cuillerée à café » par une « mesure » (jointe au flacon).

**Prix** du « BI-CITROL CONCENTRÉ » modèle triple (représentant la durée de traitement de 3 « BI-CITROL » normaux) : 56 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n° 48-1 et 48-2.

**Laboratoires G. MARINIER**

23, rue Ballu, PARIS

## BIÈRE DES NURSES

En DOSES-REPAS ou en LITRES

La Bière du Corps Médical (42<sup>e</sup> année)  
En usage dans les Etablissements médicaux

*Non Alcoolisée quoique très riche en malt sans colorant, de conservation garantie car très pure, de saveur identique aux bières supérieures du Commerce, cette Véritable Bière de Santé, très appréciée des amateurs de bière fine, est la boisson parfaite des Alcooliques, Amaigris, Convalescents, Enfants, Nerveux, Nourrices, Vieillards, etc.*

**N.-B. —** La fabrication de la Bière et du Concentré des Nurses est suspendue par manque de matières premières.

La Bière des Nurses

à BOURG-LA-REINE (Seine).

Tél. : ROBINSON 06-32.

## BIFIDIGÈNE

Bouillon de culture antiputride du Dr Henry Tissier  
(ex-interne des Hôpitaux de Paris).

**Composition.** — Symbiose de *Bacillus Bifidus* et de *Bacillus Acid-Paralactici*.

**Présentation.** Amp. buvables de 5 cc. Flacons de 1 litre.

**Mode d'action.** — Rétablit la flore intestinale physiologique. Le *Bacillus Bifidus* s'acclimata et pullule très rapidement dans le tube digestif.

**Indications.** — *Per os* : Putréfactions intestinales ; Entérites, Diarrhées de l'adulte et du nourrisson, Auto-intoxication digestive, Appendicite chronique, Syndrome entéro-rénal, États typhiques et paratyphiques, Colibacilloses.

**En pansements** : gynécologiques et chirurgicaux dans les plaies infectées.

Aucune contre-indication.

**Posologie :**

**Ampoules** : une ampoule 10 minutes avant chacun  
**Liquide** : un verre à madère des deux premiers repas.

Agiter avant l'emploi.

Dans les Entérites graves du nourrisson, on peut sans inconvénient alimenter l'enfant uniquement au Bifidigène.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1807-2.

**Laboratoires ÉTIENNE**

19, av. Secrétan — PARIS (XIX<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 89-34.)

## BILAXYL

Le laxatif des Hépatiques.

**Composition :**

Aloès.....	0 gr. 08
Fécule.....	0 gr. 03
Extrait de Belladone.....	0 gr. 005 (cinq milligr.)
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 01 (un centigr.)
Podophyllin .....	0 gr. 005
Bile pulv. ....	0 gr. 05

Excipient : Q. S. P. 1 comprimé à 0 gr. 50

Pour 1 comprimé dragéifié.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Propriétés.** — Laxatif cholagogue, rééducateur intestinal.

**Doses.** — 1 à 2 comprimés au début du repas du soir.

Prix au public : 14 fr. 90 les 40 comprimés.

**Laboratoires LÉONTE**

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Gut. 04-17.)

## BILEYL

**Sels biliaires dépigmentés  
et décholestérinés.**

**Forme.** — Globules kératinisés (chaque globule contient 0 gr. 20 d'extraits biliaires). 4 à 8 globules par jour après les repas.

**Indications.** — Les Stases biliaires, Ictères, Constipation, Insuffisance biliaire, Cholémie familiale.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

## BILIBOLDO

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Composition.** — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

**Indications.** — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiase biliaire, Ictères, Constipation.

**Doses.** — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 16 fr. 60 les 60 pilules.  
(30 jours de traitement.)

**Laboratoires BARTHÉLEMY**

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.  
(Tél. : 1-70.)

## BILICRINOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication cholagogue et anti-anaphylactique.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Congestion du foie, Lithiase biliaire, Ictère, Cholécystite, Troubles anaphylactiques, Migraines, Dermatoses, Urticaire, Constipation par insuffisance hépatique, Troubles digestifs d'ordre hépatique, Anorexie, Vertiges, Nausées, etc...

**Composition.** — Peptones, bile dépigmentée et décholestérinée, sulfate de magnésie, sulfate de soude.

**Forme.** — Granulé.

**Posologie.** — Le matin à jeun ou demi-heure avant les repas, dans un quart ou un demi-verre d'eau.

**Adultes** : 2 à 4 cuillerées à café.

**Enfants** : 3 ans, 1/2 cuillerée à café.

8 ans, 1 cuillerée à café.

Prix : 21 fr. 30.

**Laboratoires Docteur DEMASLES**

8, rue du Musée — VIENNE (Isère). (Tél. : 9-71.)

## BILIDRAININE

**Forme.** — Granulé soluble, aromatisé à la menthe anglaise, n'écœurant pas.

**Composition.** — Peptone de fibrine, de viande, de poissons et d'œufs (Peptones d'une pureté absolue) + Sulfate de magnésie desséché + Hyposulfite de soude (ion soufre) + Extrait d'Artichaut + Extrait de vrai Boldo du Chili.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires. Tous les troubles d'origine hépato-biliaire.

**Posologie.** — *Cure cholagogue* : 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun, dans 1/2 verre d'eau chaude.

*Cure désensibilisante* : 1/2 cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

*Cure d'entretien* : 1/2 cuillerée à café le matin à jeun, pendant 3 à 4 jours tous les 15 jours.

Prix : 22 fr. 80.

**Laboratoire MALAVAL**

Ch. MALAVAL, B. et J. ROUSSELIN, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe,  
8, rue Fleury, — LYON-OUILLINS.

## BILIVACCIN

1<sup>o</sup> *Antityphique.*

2<sup>o</sup> *Antidysentérique.* — 3<sup>o</sup> *Anticholérique.*

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para-A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication. Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun trois matins de suite une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, un comprimé de vaccin.

*Vaccination annuelle et revaccination en cas d'épidémie.*

Prix : Dose pour adultes : 12 fr. 20.

Dose pour enfants (moins de 7 ans) : 9 fr. 70.

**H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Vaugirard 11-23.

## BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs, une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 24 fr. 40 la dose.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**  
**Produits de « La Biothérapie »**  
5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

## BILORDYL

Complexe végétal.

Aunée — Iris — Curcuma Xanthorriza.

**Indications thérapeutiques.** — Affections de la vésicule biliaire. Insuffisance hépatique.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules : 1 ou 2 à chacun des deux principaux repas. Dans certains cas, la dose peut être portée à 8 pilules par jour : 4 pilules le matin à jeun avec une infusion chaude, 2 pilules à chacun des deux principaux repas.

Prix de vente au public : 23 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## BINOXOL

Bismutho-8-oxyquinoléine.

**Propriétés.** — Produit synthétique, défini et pur. Antiseptique gastro-intestinal dépourvu de toute toxicité et dont l'oxyquinoléine s'élimine par les voies urinaires. Inaltérable.

**Indications.** — Affections intestinales microbiennes, diarrhées saisonnières, entérites et colites spasmodiques bactériennes, entérites chroniques et rebelles. Particulièrement efficace dans le traitement des diarrhées des tuberculeux. Antisepsie urinaire. Traitement de l'Oxyurose.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cachets à 0 gr. 50 par jour avant les repas. Exceptionnellement jusqu'à 8 par jour.

*Enfants* : 6 mois-1 an : 1 paquet à 0 gr. 25 par jour en 2 fois ;

1 an-2 ans : 2 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Au-dessus de 2 ans : 3 paquets à 0 gr. 25 par jour.

**Présentation :**

*Adultes* : { Tube de 12 cachets ou 15 comprimés à 0 gr. 50.

{ Boîte de 100 cachets à 0 gr. 50.....

*Enfants et* { Boîte de 12 paq. ou tube de 15 compr. à 0 gr. 25.

*Nourrissons* : { Boîte de 100 paquets à 0 gr. 25.....

**Marque R. A. L.**

**Produits spécialisés des E<sup>ts</sup> KUHLMANN**  
**S. THIERY, Pharmacien** — 19, rue Franklin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Service commercial : 15, rue de La Baume — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Élysées 99-51.)

## BIOCALCIUM

Composition :

*Biocalcium arséné* : Gluconate de chaux cacodylate de soude. 

*Biocalcium non arséné* : Gluconate de chaux pur.

**Indications :**

Chaque fois qu'il est nécessaire de :

1° Obtenir un relèvement rapide de l'état général ;

2° Stimuler les réactions de défense et les centres de production globale ;

3° Augmenter le taux du calcium sanguin et rétablir l'équilibre glycémico-cholestérolémie.

Notamment dans les états tuberculeux et pré-tuberculeux (parfaitement toléré même dans les tuberculoses évolutives), anémies, paludisme, les chocs traumatiques (fractures), interventions opératoires, hémorragies. Traitement préparatoire avant les opérations. Tétanie, spasmodophilie déséquilibrée du système neuro-végétatif.

**Posologie :**

*Adultes* : une ampoule de 5 cc. ou de 10 cc. en injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours. — *Enfants* : une ampoule de 2 cc.

L'injection est indolore. Si besoin, faire sentir 1 ampoule.

**Laboratoires DEHAUSSY**  
50, rue Nationale — LIL<sup>e</sup>.

## BIOCEANE OLIVIÉRO

Eau de mer intégrale 100 p. 100 ionisée, stabilisée.

Véritable *Lymph* marine. Sérum marin.

Ampoules buvables et injectables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

**Action thérapeutique.** — *Athrepsies, Diarrhées et vomissements* des nourrissons, Colibacillurie.

Toutes *Phosphaturies*, le pH urinaire est abaissé à 6-5 1/2.

Toutes *déchéances, Fatigues, Surmenages*, Précaner.

**Doses.** — *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.

*Adultes* : 2 à 4 ampoules par jour.

**Prix** : 27 fr. 30.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : Molitor 34-16.)

## BIOCHOLINE

**Composition.** — Chlorhydrate de Choline R et C chimiquement pur  
Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique.

**Propriétés.** — Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de cholestérol sanguin. Régularisation de la glycémie. Action génératrice sur les globules sanguins et la moelle osseuse. Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

**Avantages.** — Innocuité complète ; Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

**Indications.** — Tuberculoses externes ou viscérales, même évolutives, à tous degrés et tous âges. Anémies et conséquences. Insuffisances pancréatiques. Asthénies, anorexies, etc.

**Forme.** — Ampoule 1 cc. = 2 gr. Boîte de 10 ampoules (type normal). Boîtes de 25 et 50 ampoules (cures prolongées). *Suppositoires*, boîte de 10 (1 suppositoire = 2 gr.).

**Posologie.** — Ampoules : 1 injection sous-cutanée tous les 2 jours d'une façon continue et sans interruption.

*Suppositoires* : 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

**Prix** : 10 ampoules : 37 fr. 50 — 25 ampoules : 59 fr. 80

50 ampoules : 114 fr. 90 — 100 suppositoires : 43 fr. 10

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE,**

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 20-60.)

## BIOCRINA

Ampoules buvables (tubes scellés) de 5 cc.  
(Méthode de Whipple).

Association d'Extrait de foie de cheval, de Plasma sanguin désbriné de cheval et de Nucléinate de fer soluble. (Procédé Alf. Daniel-Brunet et Oliviéro.)

**Indications.** — Anémies, Hypoglobulie, Hypohémoglobulinémie, Consommation, Atonicité, Convalescences.

**Dose et mode d'emploi.** — Une ampoule dans un peu d'eau : eau sucrée, — eau gazeuse, — infusion froide, — à prendre 1/4 d'heure environ avant les deux principaux repas.

*Enfants* : à partir de 5 ans : 1 ampoule par jour avant l'un des repas.

*Adultes* : 2 ampoules par jour.

**Prix.** La boîte de 12 ampoules : 35 fr. 20.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Molitor 34-16.

## BIODARCINE

**Elixir.**

Puissant tonique, régénérateur, accélérateur de la nutrition et stimulant des fonctions vitales.

**Composition :**

Teinture de ténugrec désodorisé .....	6,25
— de cacao .....	5
— de coca .....	34
— de gentiane .....	5
Acide phosphorique .....	4
Glycéro-phosphate de soude liquide 40 p. 100 .....	2,90
Phosphate de soude .....	3,70
Teinture de noix vomique .....	15
Excipient liquide aromatisé .....	O. S. P. 1 000 cc.

**Indications.** — Convalescence, surmenage, états anémiques, neurasthénie, dépressions nerveuses, suites opératoires, pré-tuberculose, tuberculose, lithiase, faiblesse etc...

**Ne contient pas d'arsenic.** — donc pas de risque d'hémoptysie chez les bacillaires.

**Présentation.** — Flacon.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à café. — *Adolescents* 1 cuil. à soupe.

— *Adultes* : 1 verre à liqueur avant les principaux repas.

**Prix au public** 24 fr. 20

**Laboratoires M. RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## BIODYNAMINE

**Indications générales.** — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

### 1° Ampoules :

pour 1 cc. :

Sulfate de strychnine .....	1 milligr.
Cacodylate de soude .....	5 egr.
Glycérophosphate de soude .....	0 gr. 04
Sérum isotonique camphré .....	1 cc.
par ampoule de 1 cc. 1/3.	

(1 ou 2 ampoules par 24 heures.)

**2° Gouttes concentrées** (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine ..	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

**3° Elixir :** Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude .....	0 gr. 080
Acide phosphorique officinal .....	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique .....	0 gr. 012
Sulfate de strychnine .....	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

**Sous réserve des possibilités de fabrication.**

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris.  
17, rue Cadet — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## BIODYNOL

**Tonique général.**

**Formes.** — Elixir. Granulés. Concentré.

**Composition.** — Manganèse, Noix vomique, Quina, Kola.

**Posologie :**

**Elixir :** 1 verre à liqueur avant chaque repas.

**Granulés :** 2 à 3 cuillerées à café avant les deux repas.

**Concentré :** 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau sucrée.

**Laboratoire de  
Thérapeutique générale du S. E.**

**A. FOUCHÈRE**, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER

## BIOÉLIXIR

**Reconstituant complet.**

**Composition.** — Formule complète réalisant sous une forme euphorique (excipient = vins liquoreux de muscat) :

1° Une médication substitutive : Phosphore (acide phosphorique et phosphate de sodium), Arsenic (Méthylarsinate de sodium).

2° Une medication énergétique, comprenant :

- Un amer hérotique (noix vomique).
- Un amer exotique : (feuilles Yerba Santa).
- Un stimulant nervin aromatique (écorce de Winter).
- Un amer stomachique (condurango).

**Indications.** — Les convalescences médicales et chirurgicales, les anémies, l'asthénie, l'amaigrissement, les déchéances organiques.

**Formes :**

P. M. : 27 francs.  
G. M. : 45 fr. 80.

**Mode d'emploi.** — **Adultes :** Une cuillerée à bouche avant les deux repas.

**Laboratoires REYGAGNE**  
160, avenue d'Italie — PARIS.  
(Tél. : Gobelins 90-00.)

## BIOENTERASE

Admis à l'achat par le Ministère des Colonies.

Ampoules buvables.

Non toxique Sans contre-indication.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pomiferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

**Indications.** — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons, Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocolite dysentérique, colibacillose, eczéma, dermo-épidermite, *Athrepsie*.

**Propriétés.** — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés. Préviend ou fait disparaître l'*Athrepsie*.

**Doses.** — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTERASE s'emploie de la naissance à deux ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à leur sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'*Athrepsie*.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou de l'eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables 22 fr. 50.

— 3 — 12 fr. 20.

(Taxe d'armement comprise.)

Littérature et Échantillons :

69, rue de Wattignies — PARIS (XII<sup>e</sup>). (Tél. : Dorian 75-52.)

## BIOFERRINE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Hémoglobine et extrait hépatique.

**Propriétés et Indications.** — Tonique, stimulant de l'appétit, de la nutrition et de l'hématopoïèse, contenant le fer organique de l'hémoglobine.

Anémies hypochromes, Anorexie, Convalescences. Particulièrement indiqué chez les enfants.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.

Par jour, à prendre avant ou pendant les repas.

**Présentation.** — Flacon de 200 cc. (Forme sirop.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

### THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## BIOGAZE BOTTU

**Composition.** — Pansement à base d'huiles de poissons sélectionnées et de chlorophylle.

**Propriétés.** — Cicatrisant biologique des plaies et blessures récentes aseptiques. Revitalisant énergique des plaies et ulcérations anciennes atones.

**Indications.** — Toutes plaies contuses récentes suturées ou non après épiluchage sérieux.

Toutes plaies atones (larges débridements, séquelles des grandes brûlures, ulcères variqueux).

Pansement après petites interventions chirurgicales (ongle incarné, fissures et fistules anales, périnéorraphie) et radiothérapiques.

Traitement curatif des engelures ulcérées.

**Mode d'emploi.** — Après nettoyage périphérique de la plaie à l'éther et application de BIOGAZE, recouvrir de coton. Renouvellement quotidien si suintement abondant. Tous les 2 ou 3 jours, dans les autres cas.

Nitrater en cas de prolifération épithéliale trop importante.

Prix : La boîte de 15 compresses (6 x 12)..... 17 fr. 30

### Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>)

## BIOGÉNOL GRANULÉ

**Composition.** — Association de méthylarsinate de soude, phosphate de chaux, chlorure de magnésium, complexe hydrosoluble de Vitamine B (autolysat de levure de bière).

**Indications.** — Reconstituant général, Accélérateur de la nutrition, Tonique de la cellule nerveuse, Anémies, Convalescences, Carences alimentaires et vitaminées.

**Forme.** — Granulé agréable au goût.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Prix : 20 fr. 10.

### Laboratoires Docteur DEMASLES

8, rue du Musée — VIENNE (Isère).

(Tél. : 9-71.)

## BIOGÉNOL LIQUIDE

**Composition.** — Association de Méthylarsinate de soude, Sulfate de strychnine, Sulfate de spartéine, Kola, Coca, Quinquina.

**Indications.** — Reconstituant général, accélérateur de la nutrition, tonique de la cellule nerveuse, stimulant de l'appétit. Anémies, Convalescences, toutes déficiences de l'organisme, Surmenage physique et intellectuel, Anorexie, Asthénie.

**Formes.** — Liquide, Gouttes, Ampoules.

**Posologie.** — Liquide : un verre à liqueur avant les deux principaux repas.

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas.  
Ampoules : injection sous-cutanée, une ou deux par jour.

Prix : liquide : 20 fr. 10 ; Gouttes : 17 fr. 50 ; Ampoules : 15 fr. (15 jours de traitement).

**Laboratoires Docteur DEMASLES**

8, rue du Musée — VIENNE (Isère). (Tél. : 9-71.)

## BIOLACTYL

**Ferments lactiques sélectionnés.**

**Forme liquide :** En boîtes de 2, 6 et 10 flacons. Boîtes de 6 tubes pour le caillage du lait.

**Forme sèche :** En comprimés. Tubes de poudre pour le caillage du lait.

**Indications :**

Usage médical : Infections et auto-intoxications gastro-intestinales, Entérites, Diarrhées, etc.

**Posologie :**

Comprimés : 6 à 8 comprimés avant les repas.

**Culture liquide :** 1 flacon par jour en 2 fois avant les repas (dans de l'eau sucrée).

**Usage chirurgical :** Pansements gynécologiques, Bouillie lactique (par mélange de poudre de lactose et biolactyl) pour pansements des périnées, Plaies infectées, Affections nasales et laryngées.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).  
(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

## BIOLIPASE « ROCHE »

**Composition.** — Extrait fermentaire lipolytique de foie.

**Indications thérapeutiques.** — Cirrhoses avec ascite et œdèmes, ictères aigus ou prolongés par hépatite, états post-opératoires chez les sujets atteints d'insuffisance hépatique.

**Contre-indications.** — Cirrhoses avec ictère grave, ictères rétentionnels néoplasiques ou calculeux.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une ampoule de 5 cm<sup>3</sup> par jour (10 Unités Butyrase par cm<sup>3</sup>) par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 6 jours. Deux jours de repos. Nouvelle série de 6 ampoules.

Selon gravité des cas : 3 à 6 séries.

Les injections de Biolipase « Roche » n'ont aucune action nocive sur les principaux appareils et sont toujours très bien supportées par les malades.

**Recommandations très importantes.** — Pendant la cure, faire observer au malade un repos absolu au lit, le soumettre à une alimentation lacto-végétarienne peu salée et n'appliquer aucun autre traitement. Ne pas faire d'injections de Biolipase « Roche » dans les 15 jours qui suivent une injection diurétique à base d'un dérivé mercuriel.

Ampoules de 5 cm<sup>3</sup> : boîte de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-76.

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 91-10)



## BIOMUCINE

**Composition.** — Mucine pure, neutre et stérile, obtenue à partir des muqueuses d'estomac et adaptée à la thérapeutique des affections gastriques.

**Propriétés.** — Protecteur naturel de la muqueuse stomacale contre les irritations des particules alimentaires et contre toute attaque chlorhydropeptique ; Anti-acide idéal assurant l'intégrité et le bon fonctionnement de l'estomac.

**Avantages.** — La BIOMUCINE est supérieure : a. aux alcalins qui saturent toute l'acidité ; la mucine ne fixe que les acides en excès ; b. aux poudres absorbantes ; la mucine se laisse pénétrer par la pepsine, elle ne constipe pas ; c. aux mucilages ; la mucine est indigestible.

**Indications.** — Hyperacidité et toutes affections douloureuses qui en découlent. Ulcères gastriques et duodénaux. Ulcères peptiques post-opératoires.

**Posologie.** — 1° Hyperacidité : 2 cachets avant les 2 principaux repas ; 2° Ulcères : 2 cachets, 10 minutes avant toute prise de nourriture, la poudre délayée dans un 1/2 verre d'eau froide.

**Prix :** La boîte de 36 cachets..... 38 fr. 60  
La boîte de 100 cachets..... 90 fr. 20

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars, — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 20-60.)

## BIO-ORGANIC

Granulés.

**Reconstituant-type** des enfants et des adultes délicats. A la fois reconstituant général par une médication phospho-calcique énergique et protection pulmonaire par le tétragaïacolate de calcium.

Formule :

Tétragaïacolate de calcium..... 0 gr. 10  
Inosito-héxaphosphate de calcium et  
de magnésium ..... 1 gr.  
Gluconate de calcium ..... 4 gr.

Pour 100 gr.

**Indications.** — Troubles de la croissance, Déminéralisation, Faiblesse de constitution, Affections broncho-pulmonaires, Adénopathie, Lymphatisme, Convalescences.

**Mode d'emploi :**

**Nourrissons et jusqu'à 6 ans :** 1 à 2 cuillerées à café par jour.

**Enfants :** 1 cuillerée à dessert avant les 2 repas.

**Adolescents ou adultes délicats :** 1 cuillerée à bouche avant les 2 repas.

**Prix :** 22 fr. 40.

Laboratoires P. REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS. — (Tél. : Gobelins 90-00.)

## BIOPHÈNE

**Composition.** — Chlorophylle, Carotène, Extrait de foie concentré et stabilisé, Extrait de rate concentré et stabilisé, Rumex crispus, Prêle, Carragaheen, Gluconates Chaux, Ammonium, Magnésie, Manganèse, Plasma marin synthétique.

**Indications.** — Décalcification en général, tuberculose sous toutes ses formes, déséquilibre du système nerveux végétatif, Anaphylaxie, Hyperacidité gastrique, tous les états anémiques, Chlorose, surmenage, Insomnie.

**Mode d'emploi.** — Un cachet au milieu des 3 repas.

La boîte : 19 fr. 50.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BIOPHORINE GIRARD

Granulé.

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

**Propriétés thérapeutiques :**

Régulateur cardiaque, reminéralisant, apéritif, tonique, nerveux et musculaire.

**Indications :**

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Toutes convalescences, Surmenage physique et intellectuel.

**Dose et mode d'emploi :**

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque. **Enfants :** 1/2 doses.

**Prix :** 17 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire national sous le n° 405-1.

## BIORÉGINE

Combinaison iodotannique phosphatée éminemment active.

**Composition.** — Iodotannique phosphaté à base de noyer.

**Forme.** — Élixir citronné au goût très savoureux.

**Particularité.** — Pas d'astringence, pas d'arrière-goût d'iode. Tolérance parfaite été comme hiver.

**Indications.** — Anorexie, Convalescence, Lymphatisme, Troubles de la croissance, Surmenage physique et intellectuel des scolaires en particulier.

**Posologie.** — *Adultes et adolescents* : 1 cuillerée à soupe.

*Enfants* : 1 cuillerée à dessert à 10 ans ; 1 cuillerée à café à 5 ans, avant les repas.

**Prix.** 222 fr. 50 le grand flacon. Traitement de 1 mois.

**Laboratoires CHAMBRON**  
PORTES (Drôme).

## BIORGAN

**Composition.** — Association de : Catalyseurs métalliques (uranium, cuivre, or, étain, manganèse) et Opothérapie (pancréas, foie, moelle osseuse rouge, rate, surrénale).

(En ampoules buvables de 10 cc.)

**Mode d'action.** — Par ses métaux catalyseurs, BIORGAN active la vitalité cellulaire en excitant les oxydations, en détruisant les déchets et en augmentant la leucocytose.

Par son action reminéralisante, BIORGAN apporte à la cellule les principaux éléments indispensables à son fonctionnement.

Par son action opothérapique, BIORGAN développe au maximum les propriétés antibactériennes, antitoxiques et antilytiques de l'organisme.

**Indications.** — Anémies, chlorose, décalcification, rachitisme, convalescences, croissance, tuberculose, allaitement, grossesse et tous les états de déchéance organique.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée, au milieu du repas.

**Laboratoires Raoul BONNAY**

Pharmacien biologiste

78, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 22-94.)

**BIOSE D****Granulé.****Composition :**

Extrait lipoïdique de foie de morue, Extrait lipoïdique de foie de porc, Phosphate tricalcique, Iode, Tannin.

**Indications :**

Rachitisme, État cachectique, Lymphatisme, Croissance difficile, Tuberculose pulmonaire.

**Posologie :**

Une cuillerée à café de granulé sur la langue, puis avaler un peu d'eau, 2 à 3 fois par jour.

**Laboratoires Ch. SEQUIN**

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

**BIOSEDRA****Ampoules buvables.**

Extrait musculaire de bœuf, de foie de veau, de rate de veau, extrait orchitique.

Toutes anémies, convalescence, surmenage, dépression nerveuse, troubles de la puberté et du retour d'âge.

6 ampoules buvables de 10 cc. : 35. fr.  
Une ou 2 ampoules par jour.

**Laboratoire BIOSEDRA****C. MAHOUT, Pharmacien.**

60, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Laborde 19-13, 19-14.)

**BIOSÉRINE**

Le manque de verrerie a contraint l'Institut biologique Mérieux à présenter son sérum hémopoïétique en comprimés.

**Composition.** — Comprimés de sang hémopoïétique total.

**Posologie.** — 2 à 5 comprimés à chaque repas par voie buccale, sans être croqués.

**Indications.** — Anémies, gripes et toutes déficiences organiques.

**Laboratoires des  
Produits Biologiques I. M.**

**S. SAVIGNEUX,**  
Pharmacien concessionnaire,  
17, rue Bourgelat — LYON.

**BIOSÉRONE DE BROWN****Soluté reconstituant injectable.**

**Présentation.** — Par Boîtes de 10 ampoules de 5 cc. (27 fr. 85.)

**Principes actifs.** — Cacodylate de soude, Arrhénal, Glycérophosphate de soude, Nucléinate de soude, Sulfate de strychnine, Soluté physiologique glucosé.

**Indications.** — Anémies de toutes origines, Anémies de croissance, Anémies graves idiopathiques ou consécutives aux infections, en particulier chez les paludéens, les convalescents de fièvres graves, typhoïdes, typhiques, Méliococcie, les Asthénies de causes diverses, Chlorose, Surmenage.

**Mode d'emploi.** — Les ampoules de 5 cc. peuvent être employées : a. par la bouche ; b. en injections sous-cutanées ; c. en injections intraveineuses, à la dose de 1 ampoule par jour chez les adultes.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-40.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## BIOSINE LE PERDRIEL

Glycérophosphate double de Chaux et de Fer effervescent. Ni intolérance, ni constipation, ni coloration des dents. Reconstituant énergique.

**Indications.** — Anémie, chlorose, rachitisme, croissance, convalescence, surmenage, neurasthénie, suite de fractures, hémorragies.

**Doses.** — 1<sup>re</sup> mesure (0,30 de glycérophosphate) à 4 mesures par jour au repas dans de l'eau pure ou sucrée.

**Laboratoires LE PERDRIEL**  
11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 08-73.)

## BIOSTABYL

Dépresseurs physiologiques et psychiques.

**Composition et propriétés thérapeutiques :**

1<sup>o</sup> *Excitation du tonus :*

Sulfate de phényl-amino- propane :	Tuteur du mésocéphale.
Poudre de noix vomiques :	Excitant léger du cortex.
Extrait spécial de Glumelles d'Avena Sativa :	Tonique vitaminé du couple neuro-musculaire.
Phosphate de Manganèse :	Aliment de la cellule nerveuse.

2 *Entretien de l'équilibre humoral :*

Gluconate de calcium :	Reminéralisant calcique.
Oxalate de fer :	Régénérateur de l'Hémoglobine
Sulfate de cuivre :	action catalytique.

3<sup>o</sup> *Rôle antitoxique et antisensibilisant :*

Choléate de soude :	Antitoxique, cholagogue.
Hyposulfite de soude :	Anti-anaphylactique.

**Indications.** — Surmenage physique et cérébral, Apathie, Convalescences, Action immédiate et sans à-coups.

**Présentation et posologie.** — 2 comprimés le matin à jeun.  
(Enfants : UN comprimé.)

(L'absorption au cours de la journée pourrait gêner le sommeil.)  
Prix : 20 fr. 10.

**Laboratoire MONIN**  
49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trudaine 37-45.)

## BIOSULFOL DUCATTE

**Nouveau laxatif scientifique (à base de soufre).**

**Une forme :** Flacon de 50 dragées de 0 gr. 40.

**Indications.** — Contre la constipation, les affections du foie et de l'intestin et leurs complications sur la peau.

Le *Biosulfol* a été réalisé par l'union des extraits biliaires et du soufre. C'est un laxatif à la fois doux et antiseptique.

Par ses extraits biliaires, le *Biosulfol* produit au même titre que la bile normale les mouvements péristaltiques de l'intestin. Par le soufre qu'il contient, le *Biosulfol* réalise l'antisepsie intestinale.

**Posologie et Mode d'emploi.** — 1 à 4 dragées par jour.

Prix : 15 fr. 10.  
Enreg. au L. N. C. M. n° 240-14.

**Laboratoires DUCATTE**, 191, rue Saint-Honoré, Paris.  
(Tél. : Opéra 68-80.)

## BIOSURGON

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Formule classique : Inosito hexaphosphate de chaux et magnésie, Bioxyde de Manganèse purifié, Protosalate de fer, Arrhénal, Noix vomique, Silicate, Carbonate et Fluorure de calcium.

**Indications.** — Phosphaturies, Anémies, Asthénies, Amaigrissements, Faiblesse générale, Surmenage, Convalescence, Croissance, Rachitisme, Scoliose, Grossesse, Allaitement, Modification du terrain chez le bronchitique chronique, Pré-tuberculose, etc.

**Posologie.** — 1 à 3 cachets par jour. La cure comprend plusieurs boîtes.

**Prix :** La boîte de 36 cachets : 29 fr. 50.  
Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1177-3.

**Laboratoires SAUDEMONT**  
GRENAY (Pas-de-Calais).

## BIOTÉOL

**Composition.** — Ferments lactiques : 4 milliards pour 100 grammes.

**Propriétés.** — On fait subir au *Biotéol* un traitement pour l'imprégner d'éléments biologiques tyndallisés qui lui confèrent une action anti-fermentescible remarquable.

**Indications.** — Soins et hygiène de la peau : enfants et adultes, toilette des nouveau-nés, transpiration, soins des pieds, massage, feu du rasoir.

**Présentation.** — Poudre.

**Mode d'emploi.** — Saupoudrer de produit la partie à traiter à l'aide de la boîte poudreuse.

Laboratoire du Dr BOUOARD

30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## BIO-TITANE « PRIMA »

*Poudre médicale pour les soins de l'épiderme du bébé et des adultes.*

**Composition.** — Oxyde de Titane, Ferments lactiques, Stéarate de zinc, Acide borique, Silicate de magnésie.

**Indications.** — Irritations et rougeurs des bébés, Démangeaisons, Varicelle, Impétigo, Urticaires, Erythèmes fessiers, Escarres des vieillards, Eczéma.

**Forme.** — Boîte saupoudreuse.  
Enregistrée au L. N. C. M. n° 1 229-2.

**Docteur P. BROTHIER, pharmacien**

*Dépôt général :*

**Laboratoires HERBEL**

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## BIOTONE

(Ampoules buvables vitaminées)

**Composition.** — Acide orthophosphorique, inositolphosphate de calcium et de magnésium, phosphate de manganèse, noix de Kola fraîche stabilisée, foie frais adréaliné, acide ascorbique (Vitamine C), en milieu glycérolé aromatisé.

**Mode d'action.** — Reconstituant général agréable au goût et extrêmement actif, présenté en coffret de 10 ampoules stériles. — Immédiatement tonique et euphoriant par sa noix de Kola fraîche stabilisée, enrichie en Vitamine C, anti-hémorragique.

Reminéralisant par ses phosphates calciques, magnésiens et manganéux, d'assimilation rapide et complète, régénérateur du système nerveux par sa haute teneur en acide orthophosphorique. Stimulant de la cellule hépatique et de la fonction anti-toxique du foie, par l'extrait de foie frais adréaliné.

**Indications thérapeutiques.** — Fortifiant des systèmes nerveux, musculaire et osseux :

Surmenage physique et intellectuel.

Anémies et asthénies passagères ou persistantes.

Convalescences. Suites de maladies infectieuses.

Neurasthénie. Inappétence. Amaigrissement.

Grossesse. Allaitement et toutes déminéralisations.

**Doses et mode d'emploi :** Adultes et enfants au-dessus de 12 ans :

Une ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à la fin de chacun des deux principaux repas.

Enfants de moins de 12 ans : demi-dose.

**Cure normale.** — Deux coffrets séparés par un repos de quatre jours.

**Prix :** Le coffret de 10 ampoules de 10 cc. : 35 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1337-2.

Laboratoire de Pharmacologie appliquée

Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-R.) (Tél. 29.)

## BIOTRIGON

### Composition :

*Élixir formule A.* — Extrait fluide de fenu-grec désodorisé, Arrhéna, Manganèse.

*Élixir formule C.* — Extrait fluide de fenu-grec désodorisé, Chlorure de Calcium.

*Dragées.* — Extrait sec de fenugrec, Arrhéna, Glycérophosphate de chaux.

### Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

### INDICATIONS

*Élixir formule A.* — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

*Élixir formule C.* — Mêmes indications et malades présentant des lésions pulmonaires évolutives.

*Dragées.* — Mêmes indications.

### Mode d'emploi :

*Adultes :* 1 cuillerée à soupe ou 2 dragées au moment des repas.

*Enfants :* 1 cuillerée à café ou 1 dragée au moment des repas.

## BIOTRIGON HÉPATIQUE

(Voir CARBOTRIGON)

Laboratoire Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

## BIOXYOL

du Dr P. Bourgraff.

**Composition.** — Anhydride titanique. — Diatomées stérilisées calibrées. — Peroxyde de zinc (titré 50). — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

**Propriétés.** — La pâte *Bioxyol* a une action très active sur les trois stades de la cicatrisation. Stimule la poussée vasculaire, active la poussée fibreuse, accélère et régularise l'épidermisation. Les cicatrices ainsi obtenues sont souples, non adhérentes aux plans profonds, à peine perceptibles.

**Indications.** — Plaies de toutes natures, post-opératoires, atoniques, pertes de substances, ulcères phagédéniques, ulcères variqueux, etc., brûlures, radiodermes, chirurgie esthétique, varicelle.

**Mode d'emploi.** — S'en référer à l'opuscule édité par le Laboratoire du Praticien, qui le tient à la disposition des médecins.

**Présentation.** — Pâte blanche en pot :

Grand modèle ..... 37 fr. 50

Petit modèle ..... 21 fr. 20

Le *Bioxyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

« Laboratoires du Praticien »,

HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## BIPHEDRINE

Vaso-Constricteurs + Antiseptiques.

### BIPHEDRINE HUILEUSE

<i>Ephédrine naturelle pure</i> .....	0 gr. 50
<i>Camphre du Japon</i> .....	0 gr. 35
<i>Eucalyptol</i> .....	0 gr. 75
<i>Essence de Menthe privée de Menthol</i> .....	0 gr. 60
<i>Essence de Violette</i> .....	0 gr. 60
<i>Essence de Citron</i> .....	0 gr. 75
<i>Essence d'Anis</i> .....	0 gr. 90
<i>Huile végétale rigoureusement neutre et stérilisée</i> .....	95 gr. 55

États subaigus et chroniques. — Rhumes, Coryzas, Rhino-Pharyngites, Injections trachéales, Désinfection post-opératoire.

### BIPHEDRINE AQUEUSE

<i>Chlorhydrate d'éphédrine naturelle pure</i> ....	1 gr.
<i>Solution au millième d'adrénaline</i> .....	4 gr.
<i>Novocaïne</i> .....	1 gr.
<i>Chlorotone</i> .....	0 gr. 125
<i>Eau de Laurier-Cerise</i> .....	1 gr.
<i>Excipient parfumé</i> .....	92 gr. 875

États aigus. — Coryzas, Rhinites, Rhumes de cerveau, Rhumes des foin, Sinusites, Asthme.

Particularité. — Un procédé spécial nous permet d'obtenir de l'éphédrine absolument pure, dénuée de propriétés irritantes, à action lente et prolongée. Notre huile végétale, rigoureusement neutre et stérile, ne rancit pas et ne laisse dans la gorge aucun goût âcre ou désagréable.

Mode d'emploi. — Instillations ou mieux pulvérisations. Nous avons créé un pulvérisateur permettant d'atomiser indifféremment les solutions Huileuse ou Aqueuse. Il est vendu dans un coffret accompagné d'un flacon de BIPHEDRINE Huileuse, sous le nom de :

### PULVO-BIPHEDRINE HUILEUSE

ou d'un flacon de BIPHEDRINE Aqueuse, sous le nom de :

### PULVO-BIPHEDRINE AQUEUSE

BIPHEDRINE Aqueuse ou Huileuse, le flacon

Prix : 18 fr. 30.

PULVO-BIPHEDRINE AQUEUSE ou HUILEUSE :

(Pulvérisateur + flacon de Biphédrine).

Prix : 34 fr. 90.

Laboratoires CHARPENTIER-RODIET

Pharmacien,

Anclen Interne des Hôpitaux de Paris

47, rue de Bretagne — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 94-65.)

## BIS-HYD

Bismuth-Hydrargyre.

Ampoules de 2 et 3 cc. dosées à 0.024 de Bi-métal par centimètre cube. Suspension huileuse d'éléments chimiques : Iodo-bismuthate de quinine ; traces de Hg et Cu (Catalyseurs) et d'éléments biologiques : Lipoides cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une thérapeutique antisiphilitique complète.

« Il accroît par catarse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. S. humacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action :

1<sup>o</sup> Spécifique vis-à-vis du spirochète par l'ensemble de ses composants chimiques ;

2<sup>o</sup> Non spécifique mais immunisante de l'organisme par ses composants biologiques : lipoides cérébraux et testiculaires.

Posologie. — Traitement d'attaque : 2 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine.

Traitement d'entretien : 1 à 2 ampoules de 2 cc. par semaine.

Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier) Thèse du Dr H. Nusem. Paris 1938.

Prix :

6 amp. 2 cc. : 24 fr. 40 ; 12 amp. 2 cc. : 43 fr. 90 ; 6 amp. 3 cc. : 26 fr. 80.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine) (Tél. : Mai. 17-77.)

## BIS-KA-MA

### POUDRE MICELLAIRE

**Composition.** — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, édulcorant vanillé.

**Action.** — Réalise le pansement par « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

**Indications.** — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux trois repas au moment de : maux ou des douleurs  
Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun dans un verre d'eau.

Le flacon. Prix : 28 fr. 70.

### DRAGÉES

**Composition.** — La même que BIS-KA-MA « poudre ».

**Indications.** — Spécialement destinées aux hyperchlorhydriques qui, en dehors de chez eux, ont à calmer les crises de pyrosis si fréquentes dans l'intervalle des repas. Complète en dehors des repas, l'action du BIS-KA-MA « poudre ».

Sucer lentement 1 à 4 dragées au moment des douleurs.

Prix :

L'étui pour la poche : 20 fr. 10.

### SUPPOSITOIRES

**Composition.** — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxidibromofluorescéine, Oxyde de Bismuth, Ephédrine, Jusquiame, Ciguë, Hédobutyl, Hypalène, Mucilage de Guimaube, Kaolin colloïdal.

**Indications.** — Hémorroïdes, Fissures anales, Ulcérations, Sphinctéralgies.

Au-dessus de 12 ans : 1 suppositoire après l'évacuation des selles ■ 1 suppositoire le soir au coucher.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 suppositoire.

Prix :

La boîte de 6 suppositoires : 19 fr. 50.

### PANSEMENT RECTO-COLIQUE

(Granulé à émettre en solution dans l'eau pour lavement)

**Composition.** — Oxyquinoléine, Sous-Gallate de Bismuth, Ciguë, Mucilage de Guimaube, Hypalène, Kaolin colloïdal, Oxyde de Zinc

**Indications.** — Colites, Rectites, Sigmoidites, Séquelles de dysenteries, Infections génito-urinaires, Salpingites.

Au-dessus de 12 ans : A) Lésions sphinctériennes ou génito-urinaires : 1 mesure de granulé dans 5 cuill. à soupe d'eau tiède.

B) Lésions des côlons sigmoïde et iliaque : 2 mesures dans 10 cuill. à soupe d'eau tiède.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix :

La boîte : 25 fr. 30.

### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

## BISMOKAOL

### Pansement gastrique.

**Action.** — Associe l'action cicatrisante du bismuth et du kaolin à l'action sédative et analgésique de la belladone et de la codéine. (Ne constipe pas.)

**Indications.** — Ulcères, Hyperchlorhydrie, Gastralgie, etc.

### Formule :

Kaolin colloïdal .....	72,5
Carbonate de bismuth léger.....	5
Magnésie hydratée .....	12,5
Codéine .....	0,10
Belladone pulvérisée .....	0,10
Pour 100 grammes.	

**Posologie.** — De 2 à 4 paquets par jour, avant ou après les repas, de préférence le matin à jeun.

**Présentation.** — Poudre en sachets de 5 grs.

Prix : 20 francs.

### Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon 04-61.)

## BISMU-CONES

Nouveau traitement des angines par le Bismuth.

(Travaux de Marinho et Montelro.)

**Composition.** — Suppositoires à base de succinate de bismuth, libérant chacun 0 gr. 05 de Bi-métal dans l'économie.

Le succinate de bismuth est un des rares sels liposolubles de bismuth : cette propriété rend possible son absorption rapide au niveau de la muqueuse intestinale.

**Indications.** — Toutes angines sauf les angines diphtériques : angines banales, angines de Vincent ; adjuvant au traitement du phlegmon de l'amygdale, préparation et suites opératoires.

**Toutes infections justiciables de la chimiothérapie bismuthique :** certaines otites, sinusites, stomatites, etc.

**Syphilis :** enfants et malades ne supportant pas les piqures.

**Posologie.** — Les BISMU-CONES, d'administration facile, évitent toute autre thérapeutique « loco dolenti ».

Adultes : 3 à 4 suppositoires par 24 heures. Enfants : 2 suppositoires par 24 heures, jusqu'à disparition des symptômes.

**Oxyurose :** désinfection de la partie terminale de l'intestin : 1-BISMU-CONE le soir au coucher.

— Pour cure complète, associer le NÉO-PANSEMENT TULASNE QUINOLÉ à la dose de 2 sachets par jour pour les adultes, 1 pour les enfants.

Prix : Boîte de 6 suppos. : 20 fr. 70. — (L. N. C. M. n° 91-3.)

### Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01.)



## BISMULLIUM

Non constipant.

Sous-nitrate de Bismuth chimiquement pur et Mucyllium.

Médication de choix des affections gastro-intestinales. — Calme la douleur, Désinfecte l'intestin, Panse et cicatrise l'Ulçère gastro-duodénal et les ulcérations coliques.

Antidiarrhéique à la faible dose; à haute dose, traitement de la constipation.

Traitement de choix des parasitoses intestinales.

1 cuillerée à soupe de BISMULLIUM contient 1 cuillerée à café de Sous-Nitrate de Bismuth.

Cures alternées de BISMULLIUM et de MUCYLLIUM contre la constipation.

Doses. — Adultes : 1 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, avant les repas, dans un peu d'eau.

Enfants, au-dessous de 10 ans : 1 cuillerée à café dans les mêmes conditions.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 914-2.

Laboratoires **BERNARD GARCIN**  
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (Vaucluse).  
Eugène GRAS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.  
Ex-interne des hôpitaux.

## BISMUTH B-3

Fabrication momentanément suspendue,  
remplacé par

### PANSEMENT GASTRIQUE B-3

#### Composition :

Salicylate Bismuth .....	1,5
Silicate alumine colloïdal.....	30
Carbonate de magnésie .....	5
Carbonate de chaux léger.....	10
Mucilage aromatisé spécial. Q. S. p.	300 cc.

Indications. — Toutes les affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin, ulcères, colites, etc. Rectites (en lavement à garder).

Posologie. — Affections gastriques et intestinales : 1 à 3 cuillerées à soupe avant les repas ou à jeun. Rectocolites : 2 à 5 cuillerées à soupe en lavement à garder toute la nuit.

Présentation : seulement en flacon de 300 cc.

Laboratoires **C. BORNET**  
Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences.  
5, boulevard des Brotteaux — LYON.

## BISMUTH DESLEAUX

Pansement Gastro-Intestinal Idéal.

Au carbonate basique de bismuth amorphe.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène et uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate.

Indications. — États inflammatoires et affections organiques du tube digestif : Ulcus, ulcérations gastriques ou duodénales, hyperchlorhydrie, gastrites, aérophagie, suites d'opérations gastriques, entéro-colites, oxyurose.

Présentation. — Poudre impalpable, formant avec l'eau un lait homogène, de goût agréable. Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit.

Posologie. — Pansement gastro-intestinal : 1 à 3 mesures 2 à 3 fois par j., prises à jeun, matin, midi et soir, 1/2 h. avant les repas dans un 1/2 verre d'eau.

Aérophagie, Vomissements : 2 mesures dans 1 verre d'eau pris en plusieurs fois dans la journée.

Oxyures : Adultes, 5 mesures ; enfants, 3 mesures ; petits, 2 mesures par j. le matin à jeun. 2 à 3 cures de 7 j. suivies d'une légère purgation et espacées de 7 j. de repos.

Voir Kaosyl Desleaux.)

**E. LANCOSME**

71, av. Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Élysées 17-46.)

## CRÈME DE BISMUTH

du Docteur QUESNEVILLE

Nouvelle dénomination : **MA-BIS-CAL**

Composition. — Hydrate de bismuth à l'état de précipité gélatineux ; Phosphate de chaux, élément essentiel de l'ancien « Apozème blanc de Sydenham » anti-diarrhéique.

Les deux précipités formant crème en suspension dans solution contenant le Chlorure de Magnésium.

Indications. — Toutes celles du Bismuth et en particulier Entérites, Colites chroniques ou infectieuses.

Application à la cure de la colibacilliose. — Médication cicatrisant les lésions intestinales, parfois méconues, qui livrent le passage à l'invasion colibacillaire, dont l'infiltration dans le courant circulatoire est à l'origine de ses localisations vésicales et autres.

Doses : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau à prendre 2 à 6 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 422-3<sup>e</sup>.

**P. CLÉMENT COLLESSON**

Pharmacien de la Faculté de Paris  
11, rue Léon-Giraud — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## BISMUTH INSOLUBLE INJECTABLE

Deux formes :

1° Iodo-bismuthate de quinine

à 0 gr. 20 pour 4 cc.

2° Ampoules oxybismuthiques

à 0 gr. 15 pour 2 cc.

et à 0 gr. 30 pour 3 cc.

**Indications.** — Traitement de la syphilis.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**

Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS.

## BISMUTHION

**Description.** — Le Bismuthion est un complexe colloïdal isotonique de Bismuth et or dans l'eau distillée, obtenu par procédé électrique et destiné au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

**Action thérapeutique.** — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

**Indications.** — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement: syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Prix : 40 fr. 30 pour 6 à 18 jours de traitement.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal à grains fins.

**Ampoules.**

De 2 cc. titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Steriles.

Solution aqueuse.

**Indications.**

Spirillicide. Coqueluche.

Syphilis. Angines aiguës.

Toutes maladies à protozoaires.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

## BISMUTH TULASNE ,

### Composition:

Sous-nitrate de bismuth spécial..... 65 grammes  
Kaolin lavé et gomme blanche..... 35 —

**Propriétés.** — Pureté chimique contrôlée, degré d'acidité bien au point et constant garantissant une innocuité absolue même aux plus hautes doses. Action sédatrice, cicatrisante et antiseptique puissante et rapide. Forme avec l'eau un mélange homogène, facile à boire, adhérent fortement à la muqueuse et insoluble dans les sucs digestifs. Supérieur au carbonate de bismuth et aux sous-nitrates dits « légers ». Action laxative à fortes doses (15 à 20 gr.), constipante à faibles doses (5 gr.).

**Présentation.** — Boîtes de 10 et 30 sachets de 10 grammes.

N° de contrôle n° 91-I.

**Indications et Posologie** (Chaque prise dans 2/3 de verre d'eau environ).

*Estomac:* Ulcères, Gastrites : 1 à 3 sachets (10 à 30 gr.) soit en une seule fois le matin à jeun, soit en 2 ou 3 prises, au réveil et une demi-heure avant les repas.

*Dyspepsies :* 1 sachet (10 gr.) en se mettant à table.  
*Vomissements, Aérophagie :* 1 sachet dans un verre d'eau en 3 ou 4 fois dans la journée.

Le produit peut se prendre également après les repas.

*Intestin:* Entérorrhées, Troubles fonctionnels (diarrhée, constipation), Fermentations, Ballonnements, Intoxications, Troubles circulatoires, nerveux (migraines), psychiques (angoisses), d'origine intestinale.

Avec diarrhée prédominante : 1 demi-sachet (5 gr. environ) une demi-heure avant les deux repas. Avec constipation : 2 sachets (20 gr.) le matin à jeun. Si cette dose occasionne une diarrhée anormale, on la fera diviser en deux prises, un sachet avant les deux repas.

*Colibacilliose :* 1 sachet (10 gr.) une demi-heure avant les 2 repas.

*Oxyurose. Adultes :* 1 sachet le matin à jeun et 1 sachet une demi-heure avant le repas du soir. *Enfants :* de 3 à 7 ans : 1 demi-sachet (5 gr. environ); de 7 à 12 ans : 1 sachet (10 gr.). En une seule fois le matin à jeun ou en deux prises égales dans la journée comme ci-dessus. Cures de 5 jours espacées par 6 jours de repos. Purgation entre chaque cure. Les lavements d'eau salée sont bien indiqués concurremment.

## SOUS-NITRATE DE BISMUTH TULASNE

Pur

**Composition.** — Sous-nitrate de bismuth polybasique absolument pur

**Propriétés, Indications, Posologie.** — Mêmes propriétés, mêmes indications et même posologie que le *Bismuth Tulasne*.

**Présentation.** — Boîtes de 10 sachets de 10 grammes.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01.)

La fabrication et la vente de ces deux produits ne peuvent être garanties durant la guerre et dépendent de l'approvisionnement en bismuth.

## BISSYL

**Composition.** — Silicate de Bismuth chimiquement pur et alumine hydratée colloïdale.

Le premier obtenu synthétiquement et se décomposant sous l'action du suc gastrique en acide silicique et oxychlorure de bismuth à l'état de division moléculaire.

**Propriétés.** — Réunit les propriétés de l'acide silicique et du bismuth.

Dénué de toxicité, anti-infectieux, anti-acide, cicatrisant. — Traitement gastrique et intestinal, efficace sous faibles doses. — Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës ou chroniques du tractus gastro-intestinal : crampes, brûlures, dyspepsies hyper et hypo-acides. Leurs complications : gastralgie et gastrite, gastro-entérite, entérite, entérocolite, ulcère de l'estomac et du duodénum.

**Présentation et prix.** — La boîte de 20 cachets Bissyl ou la boîte de Poudre Bissyl : 23 fr 10.

**Posologie.** — Un cachet ou une cuillerée à café avant les repas. De même, après les repas, en cas de douleurs.

Laboratoire du BISSYL

117 ter, rue Ordener — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Mont. 23-54.)

## BIVATOL

**Formule.** — Carboxéthyl méthyl nonatoe basique de bismuth. Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

**Indications.** — Syphilis. Traitement d'attaque et d'entretien. Hérédo-syphilis, Syphilis de la femme enceinte.

**Présentation.** — Ampoules huileuses.

*Adultes :* 12 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 07 de bismuth métal.

*Enfants :* 10 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal.

Chaque boîte constitue une cure.

**Posologie :**

*Adultes :* 12 injections de 1 cc. intramusculaires, à raison d'une tous les 2 jours pendant la première semaine, puis 2 par semaine.

*Enfants :* 1/10 de cc. par semaine jusqu'à 3 ans ; 1/2 cc. par semaine de 3 à 5 ans ; 1 cc. par semaine à 10 ans.

**Prix au public :**

La boîte de 12 ampoules de 1 cc. (adultes) ..... 31 fr.

La boîte de 10 ampoules de 1 cc. (enfants)..... 25 fr.

Les Laboratoires du Dr ROUSSEL

LABORATOIRES FRANÇAIS

DE CHIMIOTHÉRAPIE

S.A. au cap. de 10 000 000. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, r. du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél. : Lit. 58-43.)

## BLAGNY

Dans toutes les *toux* de toutes origines, s'administre facilement grâce à ses trois formes :

**Gouttes, Dragées, Sirop.**

**Sa formule.** — *Éthylmorphine, Codéine, Bromoforme, Éphédrine, Drosera, Aconit, Eau de Laurier-Cerise.*

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : L gouttes = 1 cc., correspondant à 2 dragées et à 1 cuillerée de sirop, 4 à 5 fois par jour.

*Enfants* : de X à XXX gouttes suivant l'âge, 4 à 5 fois par jour. — 1 à 2 dragées par jour à partir de 10 ans.

**Laboratoire du VITARSENIC**  
**René PAMÉLA, Pharmacien**  
 85, rue Turbigo — PARIS (III<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Archives 12-39.)

## BLÉDINE JACQUEMAIRE

**Composition.** — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

**Propriétés.** — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

**Indications.** — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

**Particularités.** — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée, et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

**Doses.** — Du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> mois : 1 gramme par mois d'âge dans chaque biberon. Du 5<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> mois : 1 1/2 à 2 cuillerées par biberon. A partir du 7<sup>e</sup> mois : 1 cuillerée à soupe par repas, 1 1/2 à 2 pour les adultes.

Prix : La boîte de 350 grs. : 10 fr. 70.

**Nota.** — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

**BLÉCAO.** — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le *Blécao*, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle. Prix : La boîte de 250 grs. : 7 fr. 90.

**Établissements JACQUEMAIRE**

Société Anonyme au Capital de 12.800.000 fr.  
 VILLEFRANCHE (Rhône).

## BLEU DE MÉTHYLÈNE. DUNA-CAÏNÉ

Anesthésique et antiseptique urinaire.

**Composition.** — Solution isotonique à 1 p. 100 de bleu de méthylène et 2 p. 100 de Duna-Caïne.

**Propriétés.** — L'addition de Duna-Caïne, qui rend indolore l'instillation du bleu de méthylène, en augmente l'action tout en gardant une toxicité très inférieure à celle de la solution de bleu cocaïne. La tolérance vésicale est augmentée, tandis que la fréquence des mictions diminue rapidement.

**Indications.** — Tuberculose rénale. Néoplasme de la vessie. Cystites à flore microbienne banale.

**Présentation.** — Ampoules de 15 cc. en boîtes de 5.

**Mode d'emploi.** — 1 instillation par jour pendant 3 jours, puis 1 instillation tous les 2 jours.

De préférence tiédifier au préalable le contenu de l'ampoule.

**Les Laboratoires BRUNEAU et Cie**

Docteurs en Pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Élysées 61-46.)

## BLUMÉOL

Extrait hydro-alcoolique du *Blumea Balsamifera*, petite composée de la région javanaise.

**Composition.** — Le *Blumea Balsamifera* ne contient pas d'alcaloïde, mais renferme du Bornéol, un tanin et un complexe glucosidique qui a été isolé.

Le Bluméol n'est pas toxique.

**Action.** — Le Bluméol possède une action hypotensive, due principalement, sinon exclusivement, à son action vaso-dilatatrice d'origine périphérique.

**Indications.** — Affections artérielles et veineuses périphériques, Affections vasculaires générales, Hypertension artérielle, Affections spasmodiques, Insomnie nerveuse, Éréthisme cardiaque.

**Posologie.** — Dose moyenne : 4 comprimés par jour, 2 avant chaque repas.

**Prix.** — La boîte de 40 comprimés : 23 francs.

**Laboratoire CORBIÈRE**  
et Pansements brevetés Corbière S. A.  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

**Boldine Houdé**

Alcaloïdes totaux du Boldo.

**Emplois thérapeutiques :**

Toutes les *insuffisances hépatiques*. Cirrhoses hypertrophiques, Cholécystites chroniques, Lithiase biliaire, Congestion du foie. Constipation chronique.

**Mode d'emploi :**

De 2 à 6 granules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu, (PARIS X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 40-58.)

## BOLDOCRINOL

**Anciennement : Boldobiline Jammes**

**Boldo et Opothérapie biliaire.**

Le BOLDOCRINOL est le plus physiologique des cholérétiques. Rééducateur idéal du foie et de l'intestin, il réalise un drainage biliaire sans brutalité, évitant surtout la violente chasse biliaire des sels magnésiens et sodiques.

Constipation, Hépatisme, Infections intestinales, Coliques hépatiques, etc.

6 à 8 comprimés par jour.

La boîte de 60 comprimés : 19 fr. 50.

N<sup>o</sup> d'enregistrement 603-5.

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — Paris (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 51-85.)

## BOLDOLAXINE

**Laxatif à base de feuilles fraîches de boldo.**

**Indications.** — Constipation sous toutes ses formes.

**Avantages.** — Laxatif physiologique. Action douce et certaine, assurant des selles naturelles. Dépourvu d'accoutumance.

**Posologie et mode d'emploi.** — Un comprimé avant le repas du soir.

**Enfants :** demi-comprimé.

**Présentation et prix.** — 15 fr. 80 la boîte de 25 comprimés.

**Laboratoire Émile CHARPENTIER**

7, r. du Bois-de-Boulogne — PARIS (Tél. : Pas. 55-46.)

## BOLDOLIVE

**Composition.** — Huile d'Olive vierge ultra-filtrée et neutre combinée à froid avec les principes actifs lipo-solubles de Boldo.

**Propriétés.** — Excite la sécrétion biliaire. Draine la bile. Réduque la fonction intestinale. Constitue un pansement de la muqueuse.

**Indications.** — Angio-cholecystites, cholecystatonie, lithiase biliaire, typhlo-cholecystite, syndromes entéro-hépatiques, colites, stase intestinale droite, icères et suites d'icères.

**Produit actif de présentant aucune toxicité.**

**Toujours bien toléré.**

**Présentation et posologie :**

1° *En solution :* De préférence une ou deux cuillerées à soupe le matin à jeun ou 20 minutes avant chaque repas.

2° *En capsules :* 2 capsules de 2 grammes ou 3 capsules de 1 gramme 20 minutes avant le repas de midi.

3° *En suppositoires* (adultes ou enfants), 1 ou 2 suppositoires à quelques minutes d'intervalle le soir au coucher.

Enreg. au L. N. C. n° 1679.

**Les Laboratoires du PUGETOL**

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30.)

**ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.**

(Voir Suppologie, Dermolive et Sulfolive.)

## BOLDOMUCYL

**Mucilage granulé.**

**Produit français.** Créé et expérimenté avec succès à Plombières-les-Bains.

**Composition :** Mucilage gommeux Normucyl. 45 gr.  
Charbon végétal activé ..... 10 —  
Extrait d'artichaut..... 1 —  
Extrait de boldo ..... 1 —  
Excipient non sucré. Q. S. pour 100 —

**Mode d'action.** — Accroît et accélère la sécrétion biliaire. Possède une action absorbante, antiseptique et antitoxique. Assure l'évacuation normale de l'intestin sans l'irriter grâce au mucilage réducteur Normucyl. Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation en particulier chez les phtosés, les hépatiques (syndrome entéro-hépatique). Intoxications intestinales. Insuffisance biliaire. Fermentations. Aérocolie.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café à chacun des deux principaux repas. Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

**Prix :** 25 fr. 60 la boîte de 200 gr. (15 à 20 jours de traitement). Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1232-2.

**Laboratoires M. CHATRON, Docteur en Pharmacie,**  
146-150, rue de la République — MONTLUÇON (Allier).

## BOLDO VERNE

**Le cholagogue sûr et régulier.**

**Composition.** — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

**Posologie.** — L à C gouttes par jour.

**Prix :** 20 fr. 50 ; le triple flacon : 52 francs,

**Laboratoire VERNE**

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

Téléphone : 19-84.

## BOLÉASE MONAL

Médication spécifique des maladies du foie et de l'intestin

**Forme.** — Globules glutinifiés.

**Composition.** { Extrait de Boldo ..... 0,05  
— de Bile..... 0,10  
Calomel..... 0,005

**Propriétés.** — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

**Indications.** — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestion, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérite muco-membraneuse, constipation, auto-intoxications.

**Doses.** — 4 à 6 globules par jour.

Le flacon de 50 globules : 19 fr. 90.

**Laboratoires MONAL**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 52-73.)

## BOLÈNE

*Désinfection des voies hépato-biliaires.  
Normalisation des fonctions intestinales.*

**Composition.** — Sels biliaires, Poudre de muqueuse intestinale, Hexaméthylène-tétramine, Rhamnus frangula, Agar-agar.

**Mode d'action.** — Rééducation et désinfection de l'intestin par l'association de l'opothérapie biliaire et intestinale à l'hexaméthylène-tétramine.

**Indications.** — Constipation, insuffisance hépato-biliaire, dermatoses.

**Action douce et régulière. Pas d'accoutumance.**

**Présentation.** — Comprimés dragéifiés de 0 gr. 50.

**Doses et mode d'emploi.** — Commencer par 2 comprimés avant le repas du soir. Augmenter ou diminuer la dose suivant les résultats obtenus.

**Laboratoires DEROL**

34, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Passy 18-80.)

## BORICINE MEISSONNIER

Tétraborate de sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composés par :

1<sup>o</sup> Sa pureté. — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2<sup>o</sup> Sa solubilité. — 16 p. 100 à froid  
75 p. 100 à l'ébullition dans l'eau.

Parties égales dans la glycérine.

3<sup>o</sup> Son pouvoir bactéricide. — Stérilisant à 6 p. 100.

4<sup>o</sup> Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.

**Indications.** — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antisepsie générale de la peau et des muqueuses, conjonctivites, otites, ozènes, stomatites, dermatoses, vésicules urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

**Mode d'emploi.** — En poudre : insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. Boricine.

**Laboratoires Jacques LOGEAS**

71, avenue de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX.

(Tél. : Michelet 07-60 et 51.)

## BORINHALANT

Comprimés pour inhalations et gargarismes. Pas d'alcool, très peu de Menthol, donc pas d'irritation ni d'intolérance.

**Indications.** — Borinate, adjuvant indispensable de la désinfection des voies respiratoires supérieures. Rhumes de cerveau, rhinites, sinusites, congestives ou suppurées et, en général, toutes infections nasales (angines, amygdalites, pharyngites, laryngites, enrouement, trachéites).

**Posologie et mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> *Inhalations* : 1 ou 2 comprimés dans un bol d'eau très chaude, recouvert d'un entonnoir ou d'un cornet, ou encore dans un inhalateur. Aspirer la vapeur par le nez et l'expirer par la bouche. Laisser la tête droite et non baissée ; ceci est extrêmement important. L'aspiration doit se prolonger pendant 10 minutes ; la dissolution progressive des comprimés de BORINHALANT dans l'eau rend son action constante.

2<sup>o</sup> *Gargarisme* : 1 comprimé dans 1/2 verre d'eau tiède.

**Laboratoire STOULS**

G. TRONCIN, Pharmacien.

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

(Tél. : Passy 68-14.)

## BORNÉOSOL

**Composition.** — Solution aqueuse de Camphre de Bornéo.

**Action.** — Tonicardiaque, antiseptique.

**Avantages.** — Atoxicité complète. Absorption facile. Injection indolore.

Solution directe de Bornéol, sans sulfonation.

Pouvoir antiseptique et tonocardiaque plus élevé que celui du Camphre japonais.

**Indications.** — Toutes celles du camphre : défaillance cardiaque, infections, préventions des complications post-opératoires.

### Présentation et prix :

Bornéosol simple, 8 ampoules de 2 cc.	18 fr. 70
— 8 ampoules de 5 cc.	23 fr. 50
— Gouttes. Flac. 30 cc.	17 fr. 20
Bornéosol sparteiné, 8 amp. de 2 cc.	21 fr. 10
— 8 amp. de 5 cc.	28 fr. 20

### Laboratoires du BORNÉOSOL

DEROME-PINAUD, Pharmaciens,  
143 bis, rue Ordener — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 07-76.)

## BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique des Affections nerveuses de toute nature.

**Constitution.** — Solution aqueuse de Tartrate boriosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

**Propriétés.** — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

**Indications.** — Agitation, insomnies, délirés, hystéries, névrose, chorée et incontinence nocturne d'urine des a normaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

**Mode d'emploi.** — Adultes : Administrer à doses progressives de 2 à 10 grammes par jour, mais, en raison de sa parfaite innocuité et de sa très faible toxicité, cette limite peut être, dans certains cas notablement dépassée sans aucun inconvénient.

Demi à 2 cuillerées à café de solution en deux fois dans un demi-verre d'eau sucrée, à la fin des principaux repas.

Enfants	1 à 2 ans :	Demi à 1 cuillerée à café	} de SIROP par jour.
	3 à 4 ans :	1 à 2 cuillerées à café	
	5 à 7 ans :	2 à 4 cuillerées à café	
	8 à 14 ans :	4 à 6 cuillerées à café	

**Formuler.** — Adultes : Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE  
Enfants : Flacon de SIROP de BOROSODINE LUMIÈRE.

### LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

## BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances cutanées ou muqueuses.

**Composition et présentation.** — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; 3° Huile ; 4° Ovules à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

**Indications.** — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piquûres, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 13 fr. 80 ; tube, 12 fr. 50. Huile, 25 francs ; ovules, 22 fr. 50.

### Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Passy 51-12.  
A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien  
4, avenue Orban.

## BOUES RADIOACTIVES RHEMDA

L'activité permanente des Boues Rhemda est due à la présence de corps actifs tels que l'ionium, l'actinium, le polonium, l'uranium, séparés au cours de la fabrication du Radium et du Mésorhodium.

De même essence que les Boues naturelles (Dax, etc.), mais 50 fois plus actives, elles conservent indéfiniment leurs propriétés.

Elles peuvent être utilisées pour les Rhumatismes divers, les Lumbagos, la Goutte, la Sciatique, les Maladies cutanées, les Ulcères variqueux et comme stimulantes sous forme de lotions, de bains, de cataplasmes ou d'emplâtres.

**Mode d'emploi.** — Pour un bain complet, délayer de 250 à 300 grammes de Boue dans l'eau du bain. Pour les bains locaux délayer de 10 à 20 grammes par litre d'eau.

Prix au public : 2 kg., 51 fr. ; 1 kg., 38 fr. 75 ; 1/2 kg., 23 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 466-7.

### Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-89, 18-41. — R. C. 255-068 B.



## BOULES QUIES

Dormir et travailler au milieu des bruits.

Boules plastiques adoptant exactement la forme du conduit auditif, point de fusion plus élevé que la température maximum du corps. Antivibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

**Indications.** — Accessoire précieux de la thérapeutique, permettant d'assurer le repos. Contre les bruits de la rue, de l'usine, de l'hôtel, etc...

Permettent aux aviateurs d'atténuer à volonté les bruits des moteurs ou la déflagration des mitrailleuses.

Indispensables aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans les oreilles.

(Boîte de 10 boules — long usage.)

Echantillons sur demande :

**Laboratoires : QUIES ,**

8, rue Auguste-Chabrières — PARIS (XV°).

(Tél. : Lecourbe 85-68.)

## BOVCARDIAC LEFRANCQ

(Organozomothérapie cardiaque).

**Composition.** — Le *Bovcardiac* renferme par ampoule tous les ferments et principes solubles contenus dans 25 gr. de fibre musculaire de cœur de bœuf frais, concentrée à froid et dans le vide.

**Propriétés.** — Renforce la contractibilité du myocarde. Complète toutes les médications cardiaques.

**Indications.** — Asthénie cardiaque, irritabilité et instabilité, tachycardie, myocardite, asystolie, troubles cardio-pulmonaires, angine de poitrine, asthme cardiaque.

**Présentation et posologie.** — 10 ampoules buvables de 10 cc.; 2 à 3 ampoules buvables par 24 heures dans 1/2 verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse, pendant 10 jours.

**Cures d'entretien :** Même posologie, 3 fois par semaine. **Enfants :** demi-dose.

**Laboratoires LEFRANCQ**

36 à 46, av. de Metz. — ROMAINVILLE (Seine). (Tél. : Nord 19-52.)

## BOVHÉPATIC LEFRANCQ

**Composition.** — Extrait Hépatique intégral et soluble sauvegardant le principe antitoxique du Foie.

**Indications.** — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.

b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses auto-toxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques.

c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie, purpura.

d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.

e. Intolérances médicamenteuses.

**Présentation et posologie.** — 10 ampoules buvables de 10 cc. — 2 à 4 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau froide naturelle ou gazeuse. Demi-dose pour les enfants.

**Laboratoires LEFRANCQ**

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

## BOVSTROL LEFRANCQ

Complexe organochimique.

Auxothérapie.

**Composition :**

Sulfate de Strychnine .....	1/2 mgr.
Glycérophosphate de Na .....	0,25
Suc Musculaire de bœuf cru à haute concentration, glyciné et sucré .....	13 gr.

**Propriétés.** — Tonique musculaire et nervin, aliment de la cellule nerveuse, mais non excitant, reminéralisant.

**Indications.** — Asthénie, surmenage, convalescence, rachitisme, lymphatisme, neurasthénie, tuberculose, anémies de toutes natures, grossesse.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

**Posologie.** — 2 ou 3 ampoules par jour pendant 10 jours, arrêter 10 à 20 jours entre 2 cures. Demi-dose pour les enfants à partir de 7 ans.

**Nota.** — Diluer chaque ampoule dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, vin de liqueur etc...)

**Laboratoires LEFRANCQ**

36 à 46, avenue de Metz — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

## BRADYGASTRINE DUCLOY

Modérateur de la sécrétion gastrique.

**Formes.** — Granulé. — Comprimés.

**Composition.** — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate trialcloïque-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Antinauseuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Modératrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépouilles d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 5%.

**Indications.** — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

**Contre-indications.** — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardiaques.

**Posologie.** — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à seo ou mieux avec une gorgée de liquide, ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

*Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate ; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est passagère.*

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 25 fr. 40.

Laboratoires DUCLOY et C<sup>ie</sup>  
ARQUES (Pas-de-Calais).

## BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine).

**Propriétés.** — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

**Indications.** — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

**Formes pharmaceutiques.** — Ampoules dosées 0,02 cgr, 22 fr. 90. — Pilules : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 18 fr. 20. Strop : 0,03. par cuillerée à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 22 fr. 90. — Gouttes : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 22 fr. 90.

Laboratoires MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6<sup>e</sup>)

(Tél. : Suf. 36-59.)

## BROMÉSÉRINE

Thérapeutique sédative des troubles fonctionnels digestifs cardio-vasculaires et neuro-glandulaires.

**Composition.** — La Bromésérine associe les bromures de Na et Ca, à dose réduite, au salicylate d'ésérine, médicament des sympathicotonies.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés, stables, dosés à 0 mmgr. 165 de salicylate d'ésérine par dragée.

**Indications.** — La Bromésérine exerce son action sédative, d'une façon constante, remarquable et rapide, dans :

*Syndromes digestifs :* ballonnement gastrique, somnolence, érythrose et constriction postprandiales ; dyspepsies nerveuses ; colites spasmodiques ; ptoses gastriques ;

*Syndromes cardio-vasculaires :* solarites, battements aortiques, éréthisme, tachycardies, sympathoses pulsatiles ; troubles du rythme ;

*Syndromes neuro-glandulaires :* maladie de Basedow, hyperthyroïdie, anxiété, émotivité, irritabilité ; dysménorrhées.

**Posologie.** — 2 comprimés au milieu de chacun des trois repas.

Le tube de 60 comprimés : 23 fr. 20.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE  
Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 88-70.)

## BROMIASE

**Description.** — Capsules glutinisées contenant

Bromure de potassium ..... 0 gr. 30

Bromure d'ammonium ..... 0 gr. 20

Leurine extractive ..... 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

**Action thérapeutique.** — La même que celle des bromures, mais sans bromisme, grâce à l'action spécifique de la leurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux de conservation indéfinie et ne répugnant pas au malade.

**Indications.** — 2 à 12 capsules par jour ; dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, le vomissements de la grossesse.

Prix : 40 fr. 30 pour 8 à 25 jours de traitement.

Laboratoires Oh. OOUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## BROMICAL

### Composition :

Bromure de calcium.....	0 gr. 50
Gluconate de calcium.....	0 gr. 30
Sérum glucose hypertonique (pH 5,7);	
Q. S. p. 1 ampoule de 10 cc.	

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. pour injections intra-veineuses.

**Propriétés.** — Action désensibilisante et anti-prurigineuse du bromure de calcium, action anti-spasmodique du calcium.

**Indications.** — *Désensibilisant* : eczéma, urticaire, intolérances médicamenteuses et alimentaires, accidents sériques, asthme, rhume des foies, migraines.

*Antiprurigineux* : tous prurits généralisés et localisés, eczéma, névrodermites, maladies de Duhring.

*Antispasmodique* : tous spasmes du tube digestif, coliques utérines.

*Régulateur du système neuro-végétatif* : insomnies, convulsions, épilepsies.

**Posologie.** — *Adultes* : série de 10 à 12 ampoules de 10 cc. Une injection intra-veineuse tous les jours ou tous les deux jours. — *Enfants*, de 5 à 15 ans : 3 à 5 cc. en injections.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## BROMOCARBONE

Bromure de calcium.....	0,12
Charbon activé.....	0,15
Extrait de cratægus.....	0,01
Sucre amisé.....	Q. S. pour une tablette.

### Propriétés :

*Du charbon activé* : absorbe l'air dégluti et les gaz de fermentation. Fixe les toxines circulant dans le milieu digestif.

*Du bromure de calcium et du Cratægus* : sédatif nervin anti-spasmodique.

**Indications.** — **AÉROPHAGIE**, dyspepsies nerveuses. Troubles intestinaux secondaires à un mauvais fonctionnement de l'estomac.

**Posologie.** — 3 à 6 tablettes par jour, croquées ou dissoutes dans un liquide.

**Présentation.** — 18 à 20 tablettes par tube.

La boîte de 3 tubes : 20 francs.

**Laboratoire LEURQUIN**  
**DREUX**

## BROMOCARPINE

**Composition.** — Association bromures-pilocarpine provoquant l'élimination réelle des toxines et assurant la tolérance absolue des bromures.

*Sirap glycéринé* contenant par cuillerée à café :

Bromures alcalins.....	0 gr. 50
Bromhydrate de pilocarpine.....	0 gr. 0002

### Posologie.

*Enfants* de 3 à 7 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour ;  
de 7 à 15 ans : 1 à 6 cuill. à café par jour.

*Adultes* : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

A prendre avant les repas.

**Indications.** — Affections nerveuses à tous les degrés. Hyperexcitabilité, Surmenage, Insomnies, Troubles psychiques, Hystérie, Épilepsie, Chorée.

### Laboratoires ROCHER

32, rue de Grenelle — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 334-4.

## BROMOGASTRINE VERGELOT

Sédatif et antispasmodique du système nerveux de l'adulte.

### Composition :

Bromure de sodium.....	0 gr. 50
Extrait de belladone.....	0 gr. 01
Phényl-éthyl-malonylurée.....	0 gr. 005
pour une cuillerée à café.	

**Propriétés.** — Antispasmodique et sédatif de l'éréthisme nerveux. — Hypnotique et calmant des affections douloureuses. Pas de bromisme.

**Indications.** — Troubles gastriques, douloureux des nerfs, Sténoses pyloriques, Pré-ulcères, Ulcères, Aérophagie douloureuse, Insomnies consécutives, Vomissements incoercibles de la grossesse.

**Présentation et mode d'emploi.** — Granulés effervescents, n'irritent pas l'estomac.

*Affections chroniques* : une cuillerée à café dans de l'eau au milieu des deux grands repas.

*Crises aiguës* : une cuillerée à café ou deux dans une infusion de tilleul. Ne pas l'employer chez les enfants.

Prix : 22 fr. 90 la boîte.

**Laboratoires Ch. VERGELOT**, Docteur en Pharmacie.  
163, rue de Flandre — PARIS (19<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 48-22.)

Enregistré au Lab. de Contrôle sous le n° 1236-2.

## BROMO-MAGNÉSIUM

Du Dr J.-P. CLARY.

**Composition.** —  $MgBr^2$  chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau.

**Indications.** — Toutes celles des composés bromurés halogénés et bromés organiques. Mieux toléré et plus actif à cause de l'action antispasmodique spécifique du magnésium.

**Posologie.** — 1° Ampoules injectables intraveineuses. Une ampoule = 1 gr.  $MgBr^2$ .

2° Gouttes (à fractionner suivant avis du médecin).

*Adultes* : 30 à 180 gouttes par 24 heures.

*Enfants* de 5 à 12 ans : demi-dose par 24 heures.

*Enfants* de 1 à 5 ans : 5 gouttes par année d'âge, 2 ou 3 fois par jour.

*Nourrissons* : 2 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

Faire prendre les gouttes dans un peu d'eau sucrée ou non.

**Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY**

72, avenue Kléber — PARIS.

## BROMOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement végétale, sans aucune autre association médicamenteuse.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

**Posologie.** — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Prix : 19 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

**Établissements SOUDAN**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV).

Enregistré au Laboratoire national sous le n° 218-I.

(Tél. : Gobelines 06-89.)

## BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone trypsique.

**Gouttes** : XL gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

**Propriétés thérapeutiques.** — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

**Indications.** — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

**Posologie.** — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS  
(Tél. : Anjou 09-83.)

## BRONCHASMINE

Nébulisations buccales.

*Spécifique préventif et abortif de la crise d'asthme. Résultat immédiat garanti, pas de contre-indication.*

**Composition.** — Extrait pur de glandes surrénales stabilisé selon technique spéciale en liquide physiologique; ne contient ni alcaloïde, ni toxique, ni stupéfiant.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 pulvérisations dans la gorge dès les premiers symptômes d'oppression suppriment radicalement et en quelques secondes la sensation d'étouffement.

Voir également *Garéphédrine, Diuréphédrine, Éphédrasmine.*

*Prix :*

Appareil avec liquide ..... 58 fr. 60  
Flacon de rechange (pour plusieurs mois). 18 fr. 70  
Remise médicale 50 p. 100.

**Laboratoires SAUGIER-THORAL**  
DOLE (Jura).

## BRONCHIAL LUNA

**Composition.** — Gaïacol, Iodoforme, Camphre et Huile offic. Ampoules de 1 cc. et 5 cc. (Enfants et adultes.)

**Indications.** — Toutes les affections aiguës et chroniques des voies respiratoires. Grippe et ses suites.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour, en injections ou en lavements.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Laboratoire du QUINA BOURCET**

7, avenue du Doyenné — LYON  
(Tél. : 25-35.)

## BRONCHO du Dr H. FERRÉ

**Sirap actif, agréable.**

**Toux, grippes, bronchites.**

Par cuillerée à soupe :

Ephédrine .....	0,01
Sulfogalacolate de K.....	0,40
Teinture Aconit.....	0,15
Teinture Drosera.....	0,15
Teinture Belladone .....	0,10
Eau laurier-cerise.....	0,20
Sirap Thébaïque.....	6
Elixir Garus.....	3
Excipient Q. S. pour .....	15 cc.

*Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.*

*Enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café.*

**Littérature et échantillons :**

**Laboratoire Docteur H. FERRÉ**

M. AUZOUX, Pharmacien.

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## BRONCHO-LACTOL

**Composition.** — Narcéine; Teintures : Aconit et Datúra, Drosera et Grindelia; Tolu et Benjoin en nature, en suspension colloïdale.

**Propriétés.** — Balsamique énergique, calmant et diurétique remarquable.

**Indications.** — Toutes affections des voies respiratoires; Bronchites aiguës et chroniques, Tuberculose pulmonaire, Coqueluche, etc...

**Présentation.** — Émulsion pectorale de goût agréable d'Orgeat.

Deux formes { a. Simple : Affections aiguës des voies respiratoires.  
b. Gaïacolé à 0,30 %; suppuration chronique du poulmon.

Aucune intolérance.

**Posologie.** — *Adultes : 4 à 5 cuillerées à potage par jour. Enfants : par cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou pour sucrer lait ou infusion.*

L. N. C. M. n° 338-6.

**Laboratoire du BRONCHO-LACTOL**

6, place de l'Académie — ANGERS.

## BRONCHOPHILOS

Sirop pulmonaire.

Particulièrement actif dans l'état grip-pal. Neutralise les crachats muco-puru-lents.

**Posologie :**

*Adultes :* 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* 10 à 15 ans, 3 cuillerées à dessert.

*Enfants :* 4 à 10 ans, 3 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1111-3.

**Laboratoires M. BOURILLOT**

6, rue Berbisey — DIJON.

## BRONCHOPNEUMOL

Le *Bronchopneumol* est un sirop pectoral pour enfants, renfermant : Benzoate de soude, Bromure de sodium, Citrate de soude, Eau distillée de laurier-cerise, Extrait d'Aunée Dausse, Extrait de Bourrache Dausse, Extrait de Capillaire Dausse, Extrait de Châtaignier Dausse, Teinture de Drosera Dausse, Sirop d'Eucalyptus, Sirop de Désessartz, Sirop de Tolu.

**Indications.** — Médicament de choix des affections des voies respiratoires des *enfants*, de la bronchite, de la coqueluche, de la laryngite, de la toux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le succès du *Bronchopneumol* vient de l'introduction dans sa composition, outre les produits classiques, de :

a. Extrait d'Aunée, qui diminue l'hyperexcitabilité laryngo-pharyngienne et par conséquent la fréquence de la toux ;

b. Extrait de Bourrache, sudorifique et diurétique ;

c. Citrate de soude, dont l'action antiviscosante réduit la tendance à l'hépatisation.

**Posologie.** — *Nourrissons :* 1 à 2 cuillerées à café ; de 2 à 4 ans : 3 à 5 cuillerées à café ; de 5 à 8 ans : 3 à 5 cuillerées à dessert ; de 9 à 12 ans : 3 à 4 cuillerées à soupe.

**Laboratoires DOLADILLE**

L. DOLADILLE, Docteur en Pharmacie

NOYERS-SUR-CHER (Loir-et-Cher), Z. O.

et SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher), Z. N. O.

(Tél. : 69.)

## BRONCHOSÉDOL

**Forme.** — Solution aromatisée à l'Élixir de Garus.

**Formule.** — Chaque cuillerée à soupe contient :

Galacol.....	0,105
Terpine.....	0,26
Benzoate de Na.....	0,05
Codéine.....	0,0075
Acide salicylique.....	0,015
Biphosphate de Chaux.....	0,15

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique et sédatif puissant des affections broncho-pulmonaires. Cicatrisant, récalcifiant.

**Indications.** — Grippe, Rhumes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhes, Tuberculose et toutes affections broncho-pulmonaires.

**Mode d'emploi.** — De 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, pur ou dans un peu d'infusion.

*Pour les enfants :* par cuillerée à café ou à dessert suivant l'âge.

**Prix :** 13 fr. 50. — Durée du traitement : 4 à 5 jours.

**Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône**

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

## BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration ; fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

**Indications cliniques.** — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, toux des tuberculeux, gazés de guerre.

**Composition.** — Chaque comprimé reforme :

Poudre de Dover codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01).....	0,10
Bromol (Tribromophenol).....	0,02
Extrait d'Aconit (titré Codex).....	0,0025
Extrait de Belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de soude.....	0,10
Enrobage au gluten et au baume de tolu.....	0,33

**Forme et avantages.** — Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin, pratiques à emporter. Dose uniforme. Volume réduit. Aucune saveur désagréable. Absence de sucre, donc recommandée aux diabétiques. Conservation indéfinie.

**Mode d'emploi.** — *Adultes :* 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

*Enfants :* au-dessus de 8 ans : demi-dose.

Avaler sans sucer, ni croquer.

**Prix :** 17 fr. 60.

**Laboratoires LAURIAT**

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

## BRONCHO-SÉRUM CONNAT

Forme. — SIROP.

Indications. — Bronchites, catarrhe, coqueluche, toutes les affections pulmonaires.

Formule :

Codéine.....	0,025
Sulfoglucoate de potasse.....	2,50
Lactophosphate de chaux.....	1,05
Teinture aconit.....	0,35
Stovaine.....	0,008

Pour 100 grammes.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Préparation de goût très agréable.

Prix : 14 francs.

Forme. — DRAGÉES.

Formule. — Extrait de datura, aconit, belladone, jusquiame, codéine, 55 0,005 milligrammes.

Terpine, baume de Tolu, baume du Pérou, extrait de matrube, 55 0,05 centigrammes.

Bromoforme, 0,02 centigrammes.

Indications. — Sédatif des toux spasmodiques et rebelles.

Posologie. — Adultes : 5 comprimés par jour.

Enfants au dessus de 10 ans : 2 à 3 comprimés.

Laboratoires M. FOLLINET  
RUMILLY (Haute-Savoie).

## BRONCHO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur Duchon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — Enfants, adultes, vieillards : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN.)

Présentation. — En boîtes de 8 ampoules de 1 cc. (8 jours.)  
Prix : 50 fr. 60.

La demi-boîte : Prix : 31 fr. 60.

Laboratoire OORBIÈRE  
et Pansements brevetés Corbière, S. A.  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## BRONCUROL

Dragées glutinées.

Composition. — Chaque dragée contient :

Créosote .....	0 gr. 05
Gluconate de chaux.....	0 gr. 10
Terpine .....	0 gr. 03
Extrait de grindelia .....	0 gr. 02
Extrait de drosera .....	0 gr. 01
Extrait de lobélie .....	0 gr. 002

Action. — Anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante par la créosote ; tonique et récalcifiant par le gluconate de chaux ; antispasmodique et expectorante par drosera, grindelia, lobélie ; sédatif des sécrétions bronchiques par terpine.

L'enveloppe de gluten se dissolvant seulement dans l'intestin en présence du liquide pancréatique, la créosote ne se trouve pas en contact avec la muqueuse stomacale.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires ; toux, catarrhes, bronchites chroniques, grippe.

Posologie. — Adultes : 4 à 6 dragées par jour de préférence aux repas.  
Enfants au-dessus de 6 ans : 1 dragée matin et soir.

Prix du flacon : 17 fr. 40 (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII<sup>e</sup>). — (Tél. : Lab. 26-47.)

## BRONPHELIA

Sirop éphédro-benzothiocolé.

Antiseptique - Cicatrisant - Calmant.

Indications. — Trachéo-bronchite, Catarrhes, Coqueluche, Laryngite, Pharyngite, Asthme, Toux nerveuses, Coryza aigu.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Enfants de 8 à 15 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert par 24 heures.

Enregistré au Lab. Nat. Contr. n° 1111-11.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbissey — DIJON.

## BROSEYL

Médication antinerveuse.

**Forme pharmaceutique et composition.** — Dragées à base de brome colloïdal associé aux *Ethers du Bornéol* et suc frais de Valériane. (Flacon de 60 dragées.)

**Propriétés et avantages.** — Calme les douleurs sans déprimer, régît et discipline le système nerveux. Tonique et non toxique, le BROSEYL n'a aucun des inconvénients et additionne tous les avantages des bromures, valériانات et albumines bromées.

**Indications.** — Neurasthénie, épilepsie, insomnie nerveuse, névralgies, palpitations cardiaques, asthme nerveux, troubles de la puberté et de la ménopause, etc.

**Mode d'emploi.** — 1° *Sédatif*, 6 dragées par jour dans le courant de la journée.

2° *Contre l'insomnie*, 4 à 6 dragées en une seule fois, avec une infusion avant de se coucher.

Dragées à avaler sans croquer.

**Prescription** — Un flacon BROSEYL FALVY.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires FALVY

Licenciés en Sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## BRUZARINE

Farine alimentaire pour b  b  s,  
convalescents, vieillards.

Go  t exquis sans cacao.

**Caract  ristiques.** — Aliment biologiquement complet, contenant tous les   l  ments n  cessaires au d  veloppement normal et progressif des enfants, sp  cialement   tudi   au point de vue des vitamines de croissance et d'utilisation nutritive.

**Propri  t  s.** — Entirement digestive et assimilable d  s le Premier Age, augmente la valeur nutritive du lait. Favorise la dentition, pr  pare et facilite le sevrage.

Ne constipe pas. R  gularise les selles.

**Indications.** — Aliment de choix des enfants d  s l'  ge de six mois, aliment de r  gime dans : sous-alimentation, retard de croissance, constipation. Aliment de R  gime des adultes.

Suraliment des vieillards et des convalescents.

**Particularit  s.** — Par sa pr  paration sp  ciale d  riv  e d'un biscuitage pr  alable dans des fours appropri  s, BRUZARINE subit, dans sa constitution, un commencement de transformation qui la rend   minemment digestible et en fait un aliment parfait.

**Prescriptions.** — Habituer progressivement l'enfant    une nouvelle alimentation, commencer par une cuiller  e de BRUZARINE par jour, et progresser peu    peu pour arriver    la quantit   indiqu  e sur le mode d'emploi imprim   sur la bo  te.

**Mode d'emploi.** — BRUZARINE se pr  pare    l'eau, au lait frais, sec ou condens  .

En cas d'intol  rance lact  e, BRUZARINE se pr  pare    l'eau, au bouillon de l  gumes ou de c  r  ales.

**Prix :** La bo  te de 325 grammes : 10 fr. 60.

  tablissements LATOUR-BRUZARINE  
TERRASSON (Dordogne).



## BUCCASEPTYL

Bain de bouche, Gargarisme, Solution inaltérable.

**Composition.** — Hydrocinnamate de Stovaine (brevet français n° 789-156 du 2 avril 1935), Chloral-Antipyrine-Phénosaly-Chloroforme-Borate de soude-Glycérine-Essence de menthe spéciale.

**Indications thérapeutiques.** — Fumeurs, Haleine fétide, Pharyngites, Angines de toutes natures, Abcès de l'amygdale, Ozène, Stomatites simples ou ulcéreuses, Aphtes, Muguet, Gingivites, Pyorrhée, Carie dentaire, Périostite, Abcès dentaires, Accidents de la dent de sagesse, Soins post-opératoires et pré-opératoires.

### Posologie:

**Hygiène buccale:** 1 cuillerée à café pour un verre d'eau bouillie chaude.

**Bains de bouche. Gargarismes:** Action antiseptique: 1 à 2 cuillerées à café pour un verre d'eau bouillie chaude.

Action sédative et anesthésique: doubler les doses.

**Grands lavages:** 3 à 4 cuillerées à soupe pour un litre d'eau bouillie.

**Topique local:** Solution employée pure pour toucher les ulcérations.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix au public: 14 fr. 10.

Laboratoires du BUCCASEPTYL et du PURGAREX

R. WALTER, pharmacien, ex-chef de laboratoire de la F. M.

10, avenue du Colifichet, CROISSY-SUR-SEINE (Seine-et-Oise).

## BUCCO-PROGONE

Pastilles d'une grande efficacité et d'un goût très agréable utilisant les propriétés antiseptiques polyvalentes du Brun d'Acridine (Brunacrine du Progone) pour la désinfection de la bouche et du rhino-pharynx.

**Présentation.** — Boîtes de 50 pastilles dosées à 3 milligrammes de Brun d'Acridine par pastille.

**Indications.** — Prévention des infections à porte d'entrée bucco-pharyngée: grippe, scarlatine, rougeole; oreillons, diphtérie; traitement des angines, amygdalites, rhinopharyngites, stomatites, aphtes, gingivites et des diverses plaies infectées ou non de la bouche et de la langue.

**Posologie.** — Hygiène préventive: une pastille toutes les 2 heures (6 à 8 par 24 heures).

Traitement des affections buccales et rhinopharyngées: une pastille toutes les heures (15 à 20 par 24 heures).

Prix: la boîte de 50 pastilles, 6 fr. 70.

Laboratoires SFEAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél.: PLaine 13-31.)

## BUCHOBLEU

Antiseptique et sédatif urinaire.

**Composition.** — Bleu de méthylène ..... 0,05  
Bromure de camphre ..... 0,03  
Extrait de Buchu ..... 0,02  
Extrait de Boldo ..... 0,02

**Propriétés.** — Antiseptique urinaire par excellence grâce au bleu de méthylène, dont l'action antinévralgique est complétée par les propriétés sédatives du Bromure de camphre et du Buchu. Le Boldo intervient heureusement sur le foie, dont la déficience est fréquente chez les urinaires.

**Indications.** — Tuberculose urinaire, Blennorrhagie, Pyérites, Cystites, Prostatites. Il est recommandé de faire alterner les cures de Buchobléu et d'Uroclorol.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour.

Boîte de 30 comprimés: 23 fr.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1480-3.

Laboratoires PRUVOST

117, rue Victor-Hugo — HOUPLINES (Nord).

(Tél.: 11.)

## BUCCINE

**Composition.** — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine, extrait d'Orthosiphon stamineus.

**Formes et doses.** — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0 gr. 50, 2 à 4 par jour.

**Indications.** — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix: 19 fr. 80.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS. (Aut. 71-98.)

## BUFOX

**Composition.** — Solution de venin de crapaud.

### Indications :

*Hémostatique* local et général.

*Adynamie.* Par action toni-cardiaque.

- hémostatique.
- analgésique.
- de régulation endocrinienne.

**Bufox rétablit la force médicatrice naturelle** dans les :  
Grandes dépressions ; Déséquilibres endocriniens ;  
Néoplasies ; États infectieux.

### Posologie :

**Bufox injectable.** Adynamie : 1/2 ampoule chaque jour.  
Hémorragies : jusqu'à 4 ampoules en une seule injection.

**Bufox buvable :** 1 ampoule chaque jour.

**Bufox comprimés :** 2 le matin et 2 le soir.

### Présentation :

Injectable, 8 ampoules : 86 fr. 25.

Buvable, 12 ampoules : 36 fr. 80.

Comprimés, 60 comprimés : 30 francs.

### Les Laboratoires du BUFOX

21, rue de la Grange-aux-Belles — PARIS.  
(Tél. : Nord 16-06.)

## BULGARINE THÉPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

**Formes.** — Bouillon, comprimés et gouttes.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale). Dysenterie, Dermatoses, Furunculose, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra. Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

**Modes d'emploi.** — *Adultes :* Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon ou prendre 20 gouttes dans un peu d'eau sucrée, 4 fois par jour, 1/2 heure avant le repas.

*Enfants :* Demi-dose.

**Prix :** La boîte ou flacon : 15 fr. 70.

Le flacon de gouttes : 20 fr. 10.

Laboratoire des Ferments  
du Docteur A. THÉPÉNIER

10, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150-854. — (Tél. : Europe 58-97.)

## BULGATROPINE-BULGADONE

### Cure Bulgare pratique

du parkinsonisme postencéphalitique,  
par les alcaloïdes totaux de la racine de belladone  
exotique, bien tolérée et très efficace.

**Composition.** — *Bulगतropine :* vin bulgare stable,  
à 5 p. 100 de racine de belladone exotique.

*Bulgadone :* solution rigoureusement titrée à 0,50  
p. 100 des alcaloïdes de cette racine.

**Indication majeure.** — *Parkinsonisme* post-  
encéphalitique, à tout âge et à tout degré, sauf  
déficience excrétoire rénale (hyperazotémie, etc.).

**Mode d'emploi.** — Cesser toute autre médication  
belladonnée ou similaire. Administrer, en progres-  
sion lente et régulière, loin des repas, XL, L,  
LX gouttes et jusqu'à 3 cuillerées à soupe par  
jour de *Bulगतropine*, ou bien IV, V, VI et jusqu'à  
LX gouttes par jour de *Bulgadone*.

**Prix.** — *Bulगतropine* normale à 5 p. 100 :

Petit flacon de 125 cc ..... 17 fr.

Flacon de 250 cc ..... 28 fr. 50

(Ce flacon dure un mois pour un malade d'atteinte  
moyenne.)

*Bulgadone*, gouttes concentrées (*Bulगतropine* 100 p.  
100) :

Flacon de 15 cc. (représentant 300 cc.

*Bulगतropine*) ..... 28 fr. 50

Flacon de 60 cc. (représentant 1200 cc.

*Bulगतropine*) ..... 69 fr.

Les gouttes *Bulgadone* présentent les avantages  
suivants :

Titre rigoureux ;

Peu de gouttes à compter pour l'administration des  
prises ;

Transport peu onéreux ;

Economie importante.

Produits enregistrés au L. N. C. M.

sous les nos 1643-1 et 1643-3.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur ROURE-GUIOT

23, rue Louis-Astruc — MARSEILLE.

(Tél. : Gar. 55-28.)

## BUXEMA

*Pour le traitement des Affections de la peau.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Action calmante et cautérisante. Supprime les démangeaisons. Fait disparaître rougeurs et croûtes. Reconstitue l'épiderme. Convient à tous les cas d'irritation de la peau.

**Composition.** — Baume du Pérou, Goudron de Houille lavé, Oxydes de Zinc et de Titane, Menthol, Peroxyde de Zinc, Acide Orthoxybenzoïque, Essence de Thym, Excipient gras.

**Indications.** — Chez le nourrisson : Eczéma, Rougeurs, Erythème fessier.

Chez l'enfant et l'adolescent : Dartres, Impétigo, Boutons.

Chez l'adulte : Eczémas professionnels ou accidentels, Toutes Dermatoses, y compris Ulcères.

**Mode d'emploi.** — Etendre une couche de BUXEMA sur la lésion et recouvrir de gaze hydrophile. Renouveler le pansement chaque jour. Enlever la pommade avec un tampon de coton imbibé d'huile d'amandes douces.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1687-I.

Prix : Le tube : 11 fr. 50.

**Laboratoire du BUXEMA**

J. AVRIL, Pharmacien,

18, rue Thiers — MANTES-GASSICOURT (Seine-et-Oise).

## C. 40

**Principes actifs.** — Ampoules : oléates doubles de Cu et Mg ; Comprimés : Silicates sod., pot. et Mg.

**Indications.** — Cancers et tumeurs malignes.

**Formes :**

C. 40 *Injectable*. — Boîtes de 10 ampoules 10 cc. et 2 ampoules de début 5 cc.

C. 40 *Comprimés*. — Flacons de 120.

**Doses :**

*Ampoules.* — 3 à 5 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour. Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy.

*Comprimés.* — 2 comprimés midi et soir, pris en mangeant.

Traitement renouvelable dans le courant de l'année.

**Prix :** 71 francs la boîte d'ampoules,

31 fr. 40 le flacon de comprimés.

**Laboratoires DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## CACHETS CHARVOZ

*Digestifs.*

**Composition.** — Noix vomique, Colombo, Badiane, Gentiane, Rhubarbe, Aloès, Carbonate de chaux lavé, Bicarbonate de soude.

**Indications.** — Troubles des fonctions stomacales : Dyspepsies, Gastrites, Gastralgies. Régulateur des sécrétions, également actif dans les hyperchlorhydries et les hypochlorhydries. Aérophagie.

**Posologie.** — Un cachet avant ou après chaque repas, suivant prédominance des symptômes hypoacides ou hyperacides.

Prix : La boîte de 30 cachets : 18 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 80-1.

**Laboratoires S. COUDERC**

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 02-64.)

En Z. N. O. : 2, place Croix-Paquet — LYON.

(Tél. : B. 09-83.)

## CACHETS PACHAUT

(Oachets de santé.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatifs, cholagogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhéiques. Rééduquent l'intestin.

### Composition :

#### Alpha :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude.....	0,15

#### Gamma :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude.....	0,15
Belladone.....	1 centigramme.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 4 cachets par jour à prendre de préférence au début du repas du soir.

### Laboratoires THOMAS

2, r. Ste-Cécile — 31, fbg Poissonnière — PARIS (IX<sup>e</sup>)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## CACHETS SPÉVIN

### Cure rationnelle d'amalgrissement.

Ni iode, ni produits opothérapiques. Aucun produit chimique nocif.

**Indications.** — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites : arthritiques (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

**Composition.** — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

**Présentation.** — Cachets. Plusieurs numéros :

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap).

**Mode d'emploi.** — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : La boîte de 15 cachets : 34 fr.

— La boîte de 50 cachets : 94 fr.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-1.

**Laboratoires des produits L. CHAUVIN**

3, rue de Vouillé — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Vaug. 21-10.)

## CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

### Présentation et composition :

**Sirop :** Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel)..... 18 fr. 70

Prix  
public.

**Vin :** 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse..... 19 fr.

**Granules :** 2 cgr. de Cacodylate de soude..... 11 fr. 70

**Ampoules :** 10 cgr. par cc..... 12 fr. 30

**Gouttes :** 1 cgr. par V gouttes.... 11 fr. 70

**Propriétés thérapeutiques.** — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

**Indications.** — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

### Posologie :

**Sirop :** 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

**Vin :** 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

**Granules :** 3 à 6 par jour.

**Gouttes :** V à XV gouttes par jour.

**Ampoules :** 1 par jour.

Durée moyenne d'une unité de vente :

**Sirop :** 5 jours. — **Vin :** 8 jours.

**Granules :** 25 jours. — **Gouttes :** 45 jours.

**Ampoules :** 10 jours.

### Produits GONNON

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

## CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

*Enfants* : Cacodyline A. 10 cgr. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgr. Cacodylate de soude (2 cc.).

*Adultes* : Cacodyline C, 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.).  
Magnésio-Cacodyline, Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).  
Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

**Indications.** — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis, Maladies de la peau.

Prix public : 30 fr. 50.

N<sup>os</sup> d'enregistrement : Cacodyline A. B. C., n° 603 1-1 ; D, n° 603 1-2 ; E, n° 603 1-3. Magnésio-Cacodyline, n° 603-4.

### Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>). AUT. 51-85.

## CADIOR

du Dr E. MAIGRE

**Composition.** — Mélange, dépourvu de soufre, de sels complexes organo-métalliques, dans lequel l'or ajoute son action antibacillaire et antiseptique à celle de l'iode catalysé par le cadmium. Tolérance parfaite, assurée par la présence de strontium et de calcium. Deux solutions, l'une pour injections intraveineuses, l'autre pour injections intramusculaires.

**Présentation.** — Boîtes de 6 ampoules (5 cc.) et boîtes de 50 ampoules, réservées aux dispensaires et aux hôpitaux.

### Indications :

*Maladies aiguës* : Grippe, Complications broncho-pulmonaires des infections non staphylococciques.

*Maladies chroniques* : Tuberculoses, Mycoses, Rhumatismes, Lèpre, Emphysème, Asthme, Lupus non exedens, Convalescences traitantes, Amaigrissements de cause indéterminée.

**Mode d'emploi.** — Deux injections intraveineuses ou intramusculaires par semaine.

Pour technique du traitement, voir la notice, qui sera adressée sur demande.

### Laboratoire du CADIOR

19, rue Clapeyron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## CAFÉDRINE

A la caféine iodurée et au chlorhydrate d'éphédrine.

**Forme.** — Élixir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiasthma-tique, Tonicardiaque, Diurétique.

**Indications.** — Asthme essentiel ou réflexe, Emphysème, Oppressions, Rhume des foin, Rhinites, Bronchites aiguës ou chroniques, Insuffisances cardiaques, Néphrites chroniques avec mal de Bright, Rétentions chlorurée et uréique.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

### Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL-PARIS.

## CAFÉINE GRANULÉE HOUDÉ

Granulé titré à 2 p. 100.

10 cgr. de caféine pure par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Tonique nervin et musculaire. Diurétique énergique (sans céphalées). Tonicardiaque, action vaso-dilatatrice sur les artères coronaires. Eupnéique puissant.

**Indications.** — Efforts intellectuels et sportifs, Névralgies, Dyspnées pulmonaires, Anorexie, Convalescence. Tonicardiaque d'appoint. A associer aux barbituriques dans l'épilepsie.

**Posologie.** — 2 cuillerées à café par jour (maximum 4), matin et midi. (Pas le soir, pour éviter l'insomnie.)

N. B. — La Caféine pure, ainsi d'ailleurs que le sucre, sont rationnés, ce qui oblige les Laboratoires Houdé à restreindre les livraisons de Caféine granulée.

### Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Nord 40-58.)

## CALCIBRONAT

Bromo-galactogluconate de Calcium.

Combinaison bromo-calcique associant en un seul médicament les effets sédatifs du Br et du Ca à dose efficace. Agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. Bien toléré; à dose normale, n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

**Indications.** — Indications de la médication Bromée et Bromurée.

### Formes et Posologie :

*Comprimés effervescent* dosés à 0,45 de Brome: 1 à 4 p. j. *Granulé* dosé à 0,45 de Brome par cuillerée à soupe: 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

*Ampoules* de 10 cc. (renfermant par ampoule 0 gr. 186 de Brome) et de 5 cc. (dose de Br. moitié moindre): 1 ampoule de 10 cc. tous les 2 jours, 1 amp. de 5 cc. tous les jours. Voie intraveineuse ou intramusculaire.

## PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CALCIGÉNOL

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale (avec mouvements browniens).

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 cuillerées à potage.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 21 fr. 30 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

## CALCIGÉNOL IRRADIÉ

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale (avec mouvements browniens) et « Vitamine D » cristallisée.

(450 unités internationales par cuillerée à potage).

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 cuillerées à potage.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 25 fr. 10 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis  
COURBEVOIE-PARIS (Seine).  
(Tél. : Défense 02-69.)

## CALCIGLANDINE

Effet complexe de régulation  
sur les fonctions de croissance.

**Composition.** — La dose quotidienne unique comporte, pour 1 cuillerée à dessert de poudre aromatisée, stabilisée : 2 cgr. de Thyroïde (dose régulatrice) ; 1 gr. de Gluconate de Calcium auxquels sont associés, à doses actives *per os* : Hypophyse (0,10), Surrénale (0,10), Thymus (0,50).

**Indications.** — Retard et troubles du développement physiologique et psychique de l'enfant, Rachitisme Lymphatique, Spasmodie, Cryptorchidie, Déficience intellectuelle, Nervosisme, Enurésie.

**Mode d'emploi.** — Quel que soit l'âge de l'enfant, la dose unique, nécessaire et suffisante, est de :

**1 cuillerée à dessert arasée par jour,**  
loin d'un repas, délayée dans un peu de liquide.

Traitement à suivre 10 à 20 jours par mois.

Prix : 43 fr. 70.

### — LABORA —

F. ARNAL, Docteur en pharmacie,  
et H. THÉVENIN, Ex-Interne des hôpitaux de Paris,  
Place de la Poissonnerie — TOULON.

## CALCILÈVE

(Carbonate de chaux Lancosme)

**Présentation.** — Boîte métal renfermant du Carbonate de chaux *précipité à froid, de très faible densité* et de saveur très agréable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Neutralisant de l'acidité gastro-intestinale, anti-acide et adsorbant.

**Indications.** — Entéro-colite acide, diarrhée de fermentations, diarrhée saisonnière et des pays chauds. Médicament de choix complémentaire du traitement spécifique des amibiases chroniques intestinales, troubles digestifs des gros mangeurs, fétidité des selles, déviations du péristaltisme intestinal, hyperkinésie gastrique, régurgitations, pyrosis.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Sauf prescription spéciale du médecin* : Mettre 2 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau ou une tasse de tisane, attendre 7 à 8 minutes en agitant de temps en temps et absorber une heure avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Le CALCILÈVE (Carbonate de chaux Lancosme) est d'une innocuité absolue, il n'y a aucun inconvénient à doubler les doses ci-dessus indiquées.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Élysées 17-46.)

## CALCILINE

Forme. — Comprimés, granulé.

### PURE

Phosph. de chaux tric.....	0,35	Phosph. de chaux tric.....	0,35
Carbonate de chaux léger..	0,07	Carbonate de chaux léger.	0,07
Fluorure de calcium.....	0,005	Fluorure de calcium.....	0,005
		4 gouttes solut. Adréal. au 1 000°.	

Par comprimé ou demi-mesure de granulé.

### IRRADIÉE

Os frais épiphysaire....	0,05	Lait sec irradié.....	0,10
Vitamine D cristallisée...	0,0005	Levure de bière pulv.....	0,10

Par mesure de granulé.

**Indications.** — Anémie, Lymphatisme, Maladies des os, Croissance, Convalescence, Grossesse, Carie dentaire.

**Doses.** — *Calciline pure et calciline adrénalinée* : 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois. *Calciline irradiée* : Enfants : 1 à 2 mesures de granulé à croquer par jour. Adultes : 4 mesures.

### Anciens Laboratoires ODINOT

Robert COLAS, Docteur en Pharmacie

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Vau. 48-10.)

Laboratoires : 21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 69-13.)

## CALCIOCHOLINE

**Composition.** — Chlorhydrate de choline, Gluconate de calcium.

**Indications.** — *Tuberculose* dans toutes ses manifestations cliniques et sous toutes ses formes. *Prétuberculose* où la *Calciocholine* donne des résultats constants.

**Présentation.** — Discrète (le mot tuberculose ne figurant pas sur les conditionnements), en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

**Posologie.** — Une ampoule intramusculaire profonde tous les jours ou tous les deux jours. Peut être faite aussi en injections intraveineuses sans avoir aucun choc à redouter et sous-cutanées (ces dernières parfois douloureuses). Aucune contre-indication.

La boîte, prix au public : 32 francs.

### Laboratoires BERTRAND

M. BERTRAND, Pharmacien  
NOMEXY (Vosges).

## CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 cg. de  $\text{CaCl}_2$  naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

**Indications.** — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmodiques, tétanies, décalcifications, asthénies).

### Doses :

**Comprimés** : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

**Ampoules** : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Boîtes de 6 amp. ou de 60 compr. Prix : 20 francs.

### Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — PARIS.)

## CALCIPAÏNE

Cachets digestifs.

**Indications.** — *Toutes dyspepsies.*

Atonie gastrique. Ptose gastrique. Gastralgie.

Hyper et Hypochlorhydrie.

### Formule :

Charbon suractivé.....	0,15
Bicarbonate de Soude.....	0,15
Magnésie hydratée.....	0,15
Fluorure de Calcium.....	0,03
Papaïne extractive.....	0,20
Poudre Noix Vomique.....	0,10

pour un cachet

**Posologie.** — Un cachet à la fin des deux principaux repas avec une tasse d'infusion chaude.

Prix : 21 fr. 70.

### Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

## CALCIUM CORBIÈRE

### Composition :

Solution de gluconate de calcium à 10 p. 100.

### Présentation :

En ampoules de 5 cc. par boîte de 12 et 24 ampoules.

En ampoules de 10 cc. par boîte de 6 et 12 ampoules.

En ampoules de 2 cc. (infantile), boîte de 12 ampoules.

**Propriétés.** — Tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, Rachitisme, Rhumatismes, Fractures, Hémoptysies, Hémorragies gastriques, intestinales, rénales, Pleurésies, Ascite, Diarrhée des tuberculeux. Associé au traitement par l'or, le Calcium Corbière atténue les accidents d'intolérance.

**Emploi.** — Indifféremment en injections intraveineuses ou intramusculaires, indolores.

Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Pas de contre-indication à l'emploi.

Prix de la boîte : 26 fr. 40 et 41 fr. 10.

**CALCIUM CORBIÈRE en tablettes effervescentes**

Chaque tablette renferme 0 gr. 27 de Ca pur. 1 tablette trois fois par jour, matin, midi et soir.

Enfants : 1/2 tablette trois fois par jour.

Prix : la boîte de 28 tablettes : 26 francs.

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés **CORBIÈRE S. A.**

27, rue. Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

## CALCIUM INJECTABLE FRAISSE

### Formule :

Gluconate de Calcium .....	0 gr. 50
Soluté isotonique.....	5 cc.

**Indications.** — Médication recalcififiante par activation des diastases oxydantes. Précieuse dans les affections pulmonaires, chroniques, la tuberculose, les affections cardio-rénales, les hémoptysies. S'injecte indifféremment par voie intramusculaire ou voie intraveineuse.

**Forme.** — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

**Posologie.** — Une injection tous les deux jours et plus si c'est nécessaire.

Prix : 22 fr. 90 la boîte.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI°).

## CALCIUM FRANÇAIS J. B.

**Composition.** — Gluconate de Calcium pur, sans adjuvant.

**Caractéristiques.** — Assimilation directe. Permet une recalcifification intensive.

Tolérance parfaite par voie endoveineuse, intramusculaire ou *per os*. Pas de choc. Aucune toxicité.

Les contrôles scientifiques rigoureux, notamment le contrôle du pH par ionométrie et injections aux animaux, dont le Calcium français J. B. est l'objet, sont pour le praticien des **garanties de sécurité** et d'efficacité absolues.

**Indications.** — Toute la calcithérapie.

**Posologie.** — **Adultes :** Doses normales de 5 à 10 cc. en injections endoveineuses ou intramusculaires profondes.

**Doses massives :** de 10 à 50 cc. en injections endoveineuses.

Par voie buccale : 1 à 4 ampoules par jour ou 1 à 4 cachets de 1 gramme au milieu des repas.

Enfants : 1/2 dose, voie intramusculaire. Voie buccale : 3 cuillerées à dessert par jour de granulé.

**Nourrissons :** 2 cc. dans le biberon tous les jours.  
Cas graves : 2 cc. intramusculaire.

### Trois formes :

**Ampoules** (solution à 10 %) :

#### a. Injectables :

Boîtes de 5 et 10 ampoules de 5 cc.  
Boîtes de 5 et 10 ampoules de 10 cc.  
Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (infantile).

#### b. Exclusivement buvables :

Coffrets de 20 ampoules de 5 cc.  
Coffrets de 20 ampoules de 10 cc.  
**Cachets :** boîtes de 20 cachets de 1 gr. de gluconate de calcium.

**Granulés :** 10 grammes = 1 cachet.

**Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE**

LAURENÇON et Cie

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Zone occupée : 1, rue Benoît-Sourigues  
BAYONNE (Basses-Pyrénées).



## CALCIUM-PLÉ

**Composition.** — Gluconate de Calcium pur en solution aqueuse, stable, à 10 p. 100, suractivé par le Magnésium glycérophosphorique (2 p. 100) et par le Manganèse glycérophosphorique (0,02 cgr. p. 100).

**Indications.** — Anti-choc et spasmodiatif, Récalcifiant, Diurétique, Tonique neuro-musculaire, Auro et Arséno-solvant.

**Formes.** — Ampoules (de 5 cc. ou de 10 cc.) injectables par voie endo-veineuse ou intramusculaire (indolore sans anesthésique). Poudre (goût agréable).

**Posologie.** — Une injection tous les 2 jours ou chaque jour. 2 cuill. à café de poudre par 24 heures.

**Prix :** La boîte de 10 ampoules de 5 cc. ou bien de 5 ampoules de 10 cc. : 30 fr. 20. Poudre : 18 fr. 50.

**Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).  
(Tél. : Archives 83-52.)

## CALCIUM ROSSO

Ex-Glucobicalcium Rosso.

**Solution Isotonique à 10 p. 100 de Gluconate de Calcium.**

*Par injections intraveineuses et intramusculaires.*  
Le Calcium Rosso est un sel organique de l'Acide Gluconique qui possède toutes les propriétés de l'ion Ca et contient 9,3 de Calcium correspondant à 12,80 de CaO. Ce sel permet l'administration de fortes doses de Calcium sans intolérance ni réactions locales ou générales.

Le métabolisme du Calcium a été, dans ces dernières années, l'objet de profondes études scientifiques, et tous les auteurs sont unanimes à proclamer, d'une façon formelle, la nette supériorité du Gluconate de Calcium sur les Chlorures et tous les sels de Calcium avec anion inorganique.

L'excellente action physiologique du Gluconate de Calcium, démontrée par une longue série d'expériences bien conduites, a porté très rapidement à une vaste application thérapeutique dans le système neuro-végétatif, maladies anaphylactiques, tuberculose, dans l'action hémostatique, récalcifiante et corroborante (inflammation et certaines maladies infectieuses).

Par voie veineuse, hypodermique et per os, l'administration du Gluconate de Calcium est suivie d'une augmentation du Calcium sanguin. Ce fait démontre que le Ca est directement assimilé et constitue une source d'ions calciques apte à une parfaite nutrition de la cellule. La solution physiologique contenant du Gluconate de Calcium remet en activité le cœur des grenouilles arrêté par le moyen calcique.

**Posologie.** — *Traitement d'attaque, à dose massive :* de 1 à 3 ampoules de 10 cc. tous les jours, par injections intraveineuses ou intramusculaires.

*Traitement d'entretien :* 1 ampoule de 10 cc. tous les jours, en injections intraveineuses ou intramusculaires.

*Enfants :* de 2 à 5 cc. tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours.

**Présentation et prix :**

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. pour les enfants : 22 fr. 25.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 25 fr.

Pour Sanatorium, Hôpitaux et Cliniques, conditionnement en vrac en boîtes de 50 ou 100 ampoules de 2, 5, 10 et 20 cc.

Per os, deux formes : *Granulé* : 25 fr. ; *Sirop* : 22 fr. 25. Agréé par le Conseil supérieur de santé du ministère de la Marine.

Expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

**Laboratoires CLEVENOT ET ROSSO**

P. CLEVENOT, pharmacien

3, rue Lamblardie — PARIS (XII°).

(Tél. : Dor. 56-38.)

## « CALCIUM-SANDOZ »

**Composition et propriétés.** — *Glucono-galacto-gluconate de Calcium* pour les ampoules, les comprimés eff., le sirop ; *gluconate de Ca* pour les autres formes.

Injection intraveineuse sans inconvénients. Injection intramusculaire profonde indolore.

**Formes.** — Ampoules à 10 et 20 p. 100 ; Poudre granulée (sans sucre). Comprimés effervescents ; Tablettes chocolatées ; Sirop.

### Posologie :

**Adultes :** 1 ampoule de 5 ou de 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

**Voie gastrique :** par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou trois fois 2 tablettes chocolatées, ou encore deux fois 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuillerée à soupe deux à trois fois par jour.

**Enfants :** 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

**Voie gastrique :** par jour, 2 à 3 cuillerées à café de poudre granulée ou trois fois 1/2 à 1 tablette chocolatée, ou bien deux fois 1/3 à 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuillerée à café ou à dessert deux à trois fois par jour selon l'âge.

### PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie  
20, rue Vernier — PARIS (XVII\*).

## CALCIVITAM

**Composition.** — Solution de Chlorure de calcium dans des jus de fruits naturels (1 gr. par cuillerée à soupe).

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes celles du chlorure de calcium, suractivées par les jus de fruits. Tonicardiaque, reconstituant, anti-hémorragique, stimulant de l'appétit, déchlorurant, adjuvant précieux dans l'accouchement.

**Indications.** — Hypocalcémie, chlorurémie, prévention d'hémorragie, d'inertie utérine, de fléchissement cardiaque.

**Mode d'emploi.** — Se recommande par son goût agréable qui le fait accepter facilement.

De 1 à 4 cuillerées à soupe par jour suivant les cas.

Prix : 22 fr. 40, flacon 240 cc.

Laboratoire des **ABATILLES**  
Route du Mouleau — ARCACHON.

## CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue concentrée et solidifiée, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Avitaminoses, assimilation déficiente du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

**Forme.** — En dragées glutinisées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés très friables pour les enfants de tous âges.

**Dose et mode d'emploi.** — **Adultes :** 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

**Enfants :** Moitié de ces doses.

Prix au public *Dragées*, 21 fr. *Granulés*, 21 fr. 10.

Pour 10 jours de traitement.

Fabrication assurée.

Laboratoires des Produits **SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

21, rue Chaptal — PARIS (IX\*).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyseptique, neutralisant stomacal.

**Indications.** — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

**Emploi et doses.** — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 17 fr. 60.

Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique  
appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

## CALGLUQUINE

**Antioennement « QUININE-CALCIUM-SANDOZ »**

Combinaison de Gluconate de quinine et de « Calcium-Sandoz ».

**Indications.** — Pneumopathies aiguës, grippe, rhumatisme, pyrexies. Accès paludéens.

En obstétrique, comme ocytocique. Fièvre puerpérale.

En chirurgie : prophylactique des affections respiratoires.

**Posologie.** — Moyenne : *Adultes* (voie intramusculaire ou endoveineuse) : 1 ampoule de 10 cc. par jour.

Par voie veineuse, il convient de tâter la susceptibilité du malade avec de faibles doses avant de recourir à la posologie normale.

En obstétrique, comme ocytocique : 2 à 4 cc. à la fois. Si nécessaire, après une à deux heures, injecter de nouveau 2 cc., une à deux fois, par la voie intramusculaire.

*Enfants* (voie intramusculaire) : jusqu'à 3 ans, 1 cc. par jour.

De 3 à 6 ans, 2 à 3 cc. par jour. Au-dessus de 6 ans, 5 cc. par jour.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc., 5 cc. et 10 cc. pour injections intramusculaires et endoveineuses. Une ampoule de 10 cc. contient 0 gr. 60 de gluconate de quinine (corresp. à 0 gr. 37 de quinine basique anhydre) et une solution de « Calcium-Sandoz » à 10 p. 100.

### PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CAL-MAG-NA

**Forme.** — Poudre neutralisante de l'hyperacidité gastrique, légèrement aromatisée.

**Composition.** — Sous-gallate et Sous-carbonate de Bismuth, Carbonate de Magnésium, Bicarbonate de Soude, Carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal, Trisilicate de Magnésium.

**Action thérapeutique.** — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques qui en résultent. Action rapide et prolongée, sans formation d'acidité secondaire ni de gaz. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, dyspepsie, gastralgies, pyrosis, aigreurs, flatulence, atonie gastrique, aérophagie, ulcus gastrique et duodénal, vomissements et nausées de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

**Prix :** 21 fr. 80 la boîte.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 150-4.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

### LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Dr en Pharm., 13, rue Pagès — SURESNES (Seine)

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

Dépôt pour la Belgique :

### LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

## CALM-ASMINE

(ancien<sup>t</sup> Kalm-Asthmine).

Médication spécifique de : l'ASTHME, de l'EMPHYSEME et des manifestations dyspnéiques et asthmatiformes au cours de toutes les affections chroniques des voies respiratoires.

**Composition.** — Association de sédatifs du système nerveux (Éphédrine, Lobélie, Phénacétine, Antipyrine) avec des toniques cardio-vasculaires (Caféine, Digitale, Strophantus, Acide benzoïque, Iode organique).

**Forme.** — Comprimés. Par boîte de 20 comprimés.

**Mode d'emploi.** — Crises aiguës : 2 à 3 comprimés pris par 1 de 5 en 5 minutes.

États chroniques : 2 comprimés par jour, 1 au réveil et le second 1/2 heure avant de se mettre au lit, en observant un repos de 4 jours après 10 jours de traitement.

Enregistré au Lab. Nat. de Contr. des Méd. sous le n° 2262-1.

### Laboratoire Charles ROUX

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).

(Tél. : Alésia 12-55.)

## CALMOCARDINE LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Comprimés dragéifiés à base de :

Sulfate de quinine.....	0,05
Phényléthylmalonylurée.....	0,005
Sulfate de sparteine.....	0,01
Bromure de camphre.....	0,025
Extr. mou de cratège.....	0,15
Extr. mou de passiflora.....	0,015
Extr. mou de valériane.....	0,015

**Actions thérapeutiques.** — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

**Spécifique des palpitations.**

**Indications.** — Palpitations de cœur de toutes origines, Éréthisme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

**Mode d'emploi.** — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 23 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

### Laboratoire LAGOUTTE

85, cours A.-Thomas — LYON (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Moncey 14-35).

## CALMOPELVINE

### Suppositoires.

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-urogénitale.

**Composition.** — Extraits d'opium et de belladone associés à la novocaïne et à l'onguent mercuriel double. Camphre et thiosulfonate de sodium.

**Propriétés.** — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

**Indications.** — Blennorragies, prostatites, cystites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

### Dragées.

Antiseptique, sédatif et décongestif pour toutes affections de la sphère génito-urinaire.

**Composition.** — Extraits mous de bruyère cendrée et de kawa-kawa, extrait stabilisé de marron d'Inde. Urotropine. Camphre monobromé.

**Indications.** — Chez les deux sexes : Pyélonéphrites, cystites. Chez la femme : Vaginites, métrites, salpingites. Chez l'homme : Uréthrites, orchépididymites, prostatites, vésiculites.

Laboratoires de **MÉDECINE MODERNE**

81, rue Réaumur — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Central 37-91.)

## CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Extrait Belladone, Jusquiame, Piscidia, Analgésine. Insomnies, Convulsions, Hémorroïdes, Prostatites, Règles douloureuses, Coliques hépatiques, néphrétiques, Ante et post-partum, etc. 1 à 3 par 24 heures.

3 dosages :

Bébés (1 à 5 ans) — Enfants — Adultes (au-dessus de 15 ans)

Boîte de 6.

## CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

3 dosages	Bébés jusq. 5 ans	Enfants 5 à 15 ans.	Adultes
Bromhydrate de quinine ..	0 gr. 035	0 gr. 07	0 gr. 10
Sulfate de quinine .....	0 gr. 065	0 gr. 13	0 gr. 20
Pyramidon .....	0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénacétine.....	0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Caféine .....	0 gr. 005	0 gr. 02	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

Tous les états fébriles, un matin et soir.

Boîte de 6 :

Enregistrés au Lab. de Cont. des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Échant. : Laboratoires des **CALMOSUPPOS**  
MONTGUYON (Charente-Inférieure).

## CALMOVARINE

### Suppositoires.

Suppositoires analgésiques et sédatifs.

**Composition.** — Extraits d'opium et de belladone associés à la novocaïne et à l'onguent mercurel double. Extraits de viburnum et d'armoise.

**Propriétés.** — Pouvoir anesthésique presque immédiat. Aucune toxicité, puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

**Indications.** — Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la femme, métrites, salpingites, dysménorrhées, règles douloureuses, ovaires sclérokystiques, adhérences douloureuses.

### Cachets.

Sédatif et analgésique pelvien.

**Composition.** — Amidopyrine, lactophénine, théobromine, poudre de Dower. Poudre de Guarana et d'Anémone.

**Indications.** — Sédation des phénomènes douloureux de la sphère pelvi-génitale et en particulier des dysménorrhées. Employé également avec succès comme antithermique dans les gripes, migraines, courbatures fébriles et névralgies.

**Laboratoires de MÉDECINE MODERNE**

81, rue Réaumur — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Central 37-91.)

## CALOMEL SOLENS

**Forme.** — Comprimés fondants dosés à 0 gr. 05, 0 gr. 02, 0 gr. 01 et 0 gr. 005.

Ces comprimés, rigoureusement dosés, se délitent rapidement dans la bouche. L'assimilation du principe actif est complète.

**Mode d'emploi.** — Le matin, à jeun de préférence, laisser fondre le comprimé dans la bouche et avaler ensuite une gorgée d'eau.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## CALSÉDINE

### Comprimés. Granulé.

**Composition.** — Produit à base de Ca, Mg et Phosphore.

**Action.** — Hypnotique ou sédative suivant les doses et le mode d'emploi. Elle calme, en ne faisant intervenir que les ions minéraux de l'organisme.

**Doses.** — *Sédation nerveuse* : 1 à 2 compr. 2 ou 3 fois par j. aux repas, ou une cuill. à café de granulé pour un compr. *Sommeil* : 4 compr. à la fois (1 compr. par 17 kg. de poids du sujet) 20 minutes environ avant l'heure habituelle du sommeil, dilués dans un peu d'eau ou de liquide légèrement alcoolisé, bière, eau rouge, etc.

**Indications.** — Tous les états d'irritabilité nerveuse, toutes les insomnies dites nerveuses ; surmenage cérébral, génital ; excitations émotives, inquiétudes, angoisses ; excitation due au thé, café, tabac, alcool, etc.

Spasmes avec prédominance de l'élément névropathique.

Entéronévrose spasmodique, cœlialgies ; pollakiuries ou prédominant facteurs nerveux ou réflexes.

Dans les prurits d'origine nerveuse, les bouffées congestives de la ménopause ; dans les poussées hypertensives de l'hypertonie artérielle ; dans certains spasmes rythmiques du sommeil. D'une façon passagère, la *Calsédine* diminue la fréquence du pouls et abaisse les deux tensions maxima et minima.

**Laboratoire GERDA**

F. GERIN, Pharmacien, 10, rue Jacquard — LYON.

## CALYPTOL

Dispersion aqueuse d'eucalyptol à 20 %.

**Propriétés.** — L'*Eucalyptol* agit comme antiputride, anticatarrhal, antispasmodique, fébrifuge et stimulant.

La *dispersion*, en exaltant son pouvoir ozonisant, accroît ses propriétés bactéricides et antitoxiques et active les échanges.

L'*excipient* aqueux permet une résorption et une diffusion rapides sans incident.

**Présentation et posologie.** — Ampoules de 2 cc. et 5 cc. (1 gr. et 0 gr. 40 d'eucalyptol pur par ampoule). Injections strictement intramusculaires : 1 à 3 ampoules par jour ;

Lavements (1 ampoule 5 cc. dans 30 à 50 cc. d'eau tiède). Pulvérisations intratrachéales.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 21 fr. 10.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 60.

**Suppositoires :** Adultes : 1 gr. d'eucalyptol pur.

Enfants : 0 gr. 50 d'eucalyptol pur.

Nourrissons : 0 gr. 25 d'eucalyptol pur.

1 à 3 suppositoires par jour.

La boîte de 10 suppositoires :

Adultes : 21 fr. 10 ;

Enfants : 17 fr. 60 ;

Nourrissons : 17 fr. 60.

**Sirop** (1 gr. 30 p. 100 d'eucalyptol pur).

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Le flacon : 17 fr. 60.

**Indications.** — Affections pulmonaires ; Pneumonies et Bronchopneumonies, Absès du poulmon, Gangrène pulmonaire, Dilatation des bronches, Bronchites, Trachéites, Grippe, Rougeole, Coqueluche et toutes maladies infectieuses à complications respiratoires ; Asthme, Emphysème.

### Laboratoires ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 francs.

Louis FERRAND,

Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris,  
Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, avenue Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Élys. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON  
(Vaucluse). (Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

## CALYPTOPHÉDRYL

**Forme.** — Sirop.

### Composition :

Camphosulfonate d'éphédrine naturelle.	0 gr. 07
Camphosulfonate de soude.....	0 gr. 15
Essence d'eucalyptus déterpénée.....	0 gr. 05
Essence de menthe déterpénée.....	0 gr. 025
Racine aconit.....	0 gr. 10
Drosera.....	0 gr. 50
Grindelia.....	0 gr. 50
Sulfo-gaïcolate de potasse.....	2 gr. 50
Propanone.....	2 gr. 50
Benzoate de soude.....	1 gr.

Sirop de sucre. Q. S. pour 100 cc.

**Posologie.** — *Enfants* : 3 cuill. à café (à partir de 3 ans).

*Adolescents* : 3 cuillerées à dessert.

*Adultes* : 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Prix au public : 22 fr. 20.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

### Composition :

Propanone, 0,02 ; Extrait sec aconit, 0,015 ; Extrait de belladone, 0,003 ; Benzoate de soude, 0,10 ; Thiocol, 0,10 ; Teinture de grindelia, 0,01 ; Extrait sec de drosera, 0,006 ; Camphosulfonate de soude, 0,05 ; Chlorhydrate d'éphédrine, 0,005 ; Codéine, 0,01. Pour 1 comprimé.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 4 comprimés par 24 heures.

*Adolescents* : 2 à 3 comprimés. Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Prix au public : 22 fr. 20.

**Indications.** — Asthme, coqueluche, emphysème, grippe, bronchite aiguë et chronique, pneumonie, toux spasmodiques et toutes les affections des voies respiratoires.

### Laboratoires M. DE RIVE

A. de RIVE, pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert  
PARIS (XX<sup>e</sup>).

## CAMFORMINE

(Camphosulfonate d'Hexaméthylène-Tétramine.)

**Composition.** — Résulte de la combinaison d'une molécule d'acide camphosulfonique avec une molécule d'Hexaméthylène tétramine.

Corps chimiquement défini, cristallisable, soluble dans l'eau, solution à 10 p. 100.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant tonique du cœur, action diurétique, anti-infectieuse, rétablit la tension, règle les mouvements intestinaux.

**Indications.** — Spécifique de toutes défaillances cardiaques : choc nerveux ou opératoire, syncopes, infections, hémorragies, cardiopathies, fléchissement sénile.

Est particulièrement indiquée dans les endocardites infectieuses, gripes, infections puerpérales, typhoïdes, pneumonies, chocs quelle qu'en soit la cause.

**Présentation.** — Doses : Ampoules de 2 cc., de 5 cc. et de 10 cc. Injection intramusculaire ou intraveineuse de 2 et de 5 cc. et plus, suivant les indications. Pas de contre-indications. Pas d'intolérance. Action rapide et puissante.

**Solution à ingérer.** — Dans les affections chroniques, les convalescences, chez les vieillards : 100 à 120 gouttes en trois fois dans la journée.

**Prix :**

{	Ampoules de 2 cc., la boîte de 10 .....	18 fr. 75
{	Ampoules de 5 cc., la boîte de 10 .....	25 francs
{	Ampoules de 10 cc., la boîte de 4 .....	21 fr. 25
{	Gouttes, le flacon .....	18 fr. 75

Laboratoire ARMORIL

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Suffren 53-70.)

## CAMPHOCALYPTOL ECHEMAN

**Indications.** — Affections pulmonaires et maladies infectieuses. Grippe et complications, *Coqueluche*, Bronchites aiguës, chroniques, *abcès du poumon*, Pneumonie, Tuberculose, Accidents pulmonaires anesthésiques.

### I. CAMPHOCALYPTOL INJECTABLE

Ampoules de 2 cc. Ampoules de 5 cc.

*Camphocalyptol simple non gaïacolé.*

Une ampoule de 2 cc. contient :

Goménol, Eucalyptol .....	50 gr. 10
Camphre .....	0 gr. 20
Acide phénique .....	0 gr. 01
Excipient huileux spécial .....	Q. S.

*Camphocalyptol gaïacolé.*

Même formule avec, en plus, gaïacol, 0 gr. 10.

Une ampoule de 5 cc. contient :

Formule simple, formule gaïaculée : mêmes doses × 2,5.

**Emplol.** — En injections intramusculaires profondes ; par jour : 1 cc. à 5 cc. et plus selon âge et gravité. Le Camphocalyptol s'emploie aussi en lavements : une ampoule dans lait ou huile tièdes, ou eau de guimauve.

Boîte 10 ampoules de 2 cc. ou 6 de 5 cc. 22 fr. 50

— 6 ampoules de 2 cc. .... 15 francs

### II. CAPSULES DE CAMPHOCALYPTOL

A base de : codéine, éphédrine, eucalyptol camphré, terpinol. Capsules glutinisées : de 3 à 6 par jour *avant* les repas.

Le flacon pour 7 jours environ : 17 fr. 50.

### III. SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

*Adultes, Enfants, Nourrissons.*

La fabrication des Suppositoires de Camphocalyptol-Quinine est suspendue.

Voir à lettre S

Sous la rubrique : **Suppositoires de Camphocalyptol**

L. N. C. n° 314-38 et 39 ; 314-41 à 48.

Laboratoires ECHEMAN

6, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

**Excitations.** — Stimulant cardiaque dans l'adynamie et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

**Formes.** — Ampoules de 1 cc., 2 cc., 5 cc. et 10 cc., par voie hypodermique, intramusculaire ou intraveineuse.

**Gouttes:** dosées à 1 cgr. de Camphodausse par goutte. Tonicardiaque, anti-asthénique; très utile également comme traitement d'entretien dans l'intervalle des cures digitales.

### CAMPHODAUSSÉ CHOLESTÉRINÉ

Exclusivement en ampoules de 2 cc., contenant :

Par ampoule { 0 gr. 10 de Camphodausse ;  
                  { 0 gr. 02 de Cholestérine.

Plus particulièrement conseillé contre l'adynamie des tuberculeux.

### CAMPHODAUSSÉ CHOLESTÉRINÉ

ET STRYCHNINÉ (ampoules de 2 cc.).

La formule ci-dessus renfermant en plus 1/2 mgr. de sulfate de strychnine par ampoule.

Une ampoule tous les 2 ou 3 jours, excellent tonique.

### CAMPHODAUSSÉ SPARTÉINÉ

Tonicardiaque spécial à action cardiaque directe et extra-cardiaque, dont la toxicité est la moitié de celle de la spartéine.

Dose moyenne : 0 gr. 10 à 0 gr. 20 par jour.

Se délivre exclusivement en amp. de 2 cc. et de 5 cc. Ces dernières réservées principalement aux chirurgiens.

L'ampoule de 2 cc. renferme 0 gr. 20 de Camphodausse et 0 gr. 04 de sulfate de spartéine; l'ampoule de 5 cc. renferme 0 gr. 50 de Camphodausse et 0 gr. 10 de sulfate de spartéine.

## CAMPHODAUSSÉ SULFAMIDÉ

(Camphosulfonate de para-amino-benzène-sulfamide.)

Médicament de choix contre les streptococcies, la méningite, la pneumonie, la broncho-pneumonie et la colibacillose. Ce médicament ne *modifie* en aucune façon la formule sanguine (ni hémolyse, ni méthémoglobinurie). Possède les propriétés anti-infectieuses de la sulfamide et les effets cardiotoniques du camphre soluble; au surplus, se montre un *diurétique* puissant; n'est pas anti-génétique aux doses thérapeutiques.

Ampoules de 2 cc. : les plus souvent employées à la dose quotidienne de 2 à 4 ampoules.

Ampoules de 5 cc. : réservées aux cas les plus graves; on peut en administrer 2 avec un intervalle de 10 à 12 heures entre les deux injections.

### Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## CAMPHO-PNEUMINE

Antiseptique des voies respiratoires.

**Indications.** — Toutes les pneumopathies : Bronchites, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Gripes, Coqueluches, Congestion pulmonaire, etc.

La Campho-Pneumine apaise la toux, soulage la dyspnée, renforce la défense de la muqueuse bronchique et aseptise les sécrétions.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> **AMPOULES.**

Ampoules de 2 cc. pour intramusculaires.

Boîte de 6 : 20 fr. 50. — Boîte de 12 : 32 francs.

2<sup>o</sup> **SUPPOSITOIRES.**

Suppositoires enfants, suppositoires adultes.

Boîte de 10 : 20 fr. 50.

**Doses.** — Par jour : *Adultes* : 1 à 2 ampoules, 1 à 2 suppos. adultes.

*Enfants* : 1/2 à 1 ampoule, 1 à 2 suppos. enfants.

**Formule.** — Ampoules : Eucalyptol, Niaouli, Gaïacol (aa 0,10); Acide phénique, 0,02; Camphre, 0,20; Excipient huileux, Q. S. pour 2 cc.

Suppositoires :	Adultes.	Enfants.
Créosote .....	0,25	0,10
Eucalyptol.....	0,03	0,01
Camphre.....	0,10	0,03
Beurre de cacao.....	Q. S.	Q. S.

### Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.



## CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Comprimés.

**Composition.** — Chaque comprimé contient 10 cgr. de Campho-Sulfonate de Spartéine.

**Indications.** — Palpitations, insuffisances cardiaques, Asthénies cardio-vasculaires. Dyspnées d'origine cardiaque et respiratoire. Mal de montagne et mal d'avion.

**Forme.** — Comprimés.

**Posologie.** — 2 à 5 comprimés par 24 heures au début des repas ou au moment des malaises. Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer. Durée de traitement : 10 jours.

Prix : 18 fr. 05.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-13.

### Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

52, rue Montesquieu — ASNIÈRES.

(Tél. : Gré. 03-92.)

## CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Gouttes et ampoules

**Composition.** — Solution de Campho-sulfonate de Spartéine.

Trois formes :

1° *Simple*. 1 amp. et XX gouttes = Spartéine 0,04 — Camphre 0,06.

2° *Caféinée*. 1 amp. et XX gouttes = Form. simples + Caféine 0,05.

3° *Strychninée*. 1 amp. et XX gouttes = Form. simples + Strychnine 0,0005.

**Indications.** — 1° *Cures d'amorçage* dans les Asystolies, notamment dans celles se compliquant de dilatation auriculo-ventriculaire et d'insuffisance cardiaque ;

2° *Traitement d'urgence* dans les défaillances du myocarde et des orises hypotensives ;

3° *Cures d'entretien* des états hypostoliques et hyposphyxiques ;

4° *Cures alternées* avec les cardiotoniques usuels chez les cardio-rénaux.

**Formes.** — Gouttes et ampoules 2 cc.

**Posologie.** — *Gouttes* : XX à LX par 24 heures.

*Ampoules* : 1 à 4 par 24 heures (voie cutanée ou intramusculaire).

Leur injection est indolore.

Durée de la cure d'entretien (gouttes) : 3 semaines.

Prix : 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 238-3 et 238-4.

### Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

52, rue Montesquieu, ASNIÈRES. (Tél. : Gré. 03-92.)

## CAMPHOSTYL LACROIX

**Composition.** — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

**Avantages.** — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

**Indications.** — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

**Formes pharmaceutiques.** — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules.* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 ; 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 ; 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 100 ampoules

B. *Gouttes.* — XX à CXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné.* — A. *Ampoules.* Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,05 de Spartéine.

B. *Gouttes spartéinées.* — XX à LXXX gouttes par jour.

3° *Camphostyl strychniné.* — Ampoules uniquement. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,001 de Strychnine.

Echantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Nord 54-57.)

## CAMPHROLYSE

**Présentation.** — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 2 cc. et en flacons stilligouttes.

Camphrolyse simple, gouttes ou 6 amp. : 17 fr. 80 ; 12 amp. : 33 fr. 40 ;

— spartéine, — — — 20 fr. 05 — 36 fr. 75

— caféine, — — — 22 fr. 25 — 40 fr. 05

**Principes actifs.** — a. Camphrolyse simple : campho-sulfonate de soude liquide. — b. Camphrolyse spartéine : campho-sulfonate de soude liquide, spartéine. — c. Camphrolyse caféine : campho-sulfonate de soude liquide, caféine (benzoate de soude).

**Indications.** — Tous les états de faiblesse ou de collapsus cardiaque, Suite de choc traumatique ou chirurgical, Collapsus cardiaque, Imminence de collapsus dans les états infectieux, Gripes ou fièvres typhoïdes, etc., Pneumonies, Broncho-pneumonies grippales, Syncopes, Septicémie, Crises d'angine de poitrine et d'œdème pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — a. *Adultes* : 1 à 4 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 à 2 ampoules par jour en injections intraveineuses, ou XXV à C gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée. — b. *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 ampoule par jour en injection intraveineuse, ou X à L gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée.

Inscrit au L. N. C. sous les n°s 900-34 à 900-39.

Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## CAMPYRO SALLYL FRAISSE

### Composition :

Salicylate de Benzyle ....	0 gr. 50
Campyre.....	0 gr. 10
Huile d'olive pure.....	5 cc.

**Indications.** — Désensibilisateur des zones allergiques. Sciatique, Névrites aiguës ou chroniques.

**Forme.** — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

**Posologie.** — Une ampoule tous les 2 jours dans le tissu musculaire.

**Prix :** boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 25 fr. (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-1.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**  
**Pharmaciens**

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé du camphre naturel soluble dans l'eau (Camphocarboxylate d'ammonium), de diffusion rapide, sans réaction locale ni action secondaire, injections indolores.

**Indications.** — Les mêmes que celles des huiles camphrées (excitant du cœur et des centres nerveux, renforcé dans ses formes associées soit par la spartéine, soit par la spartéine et la stréchine : troubles cardiovasculaires, états de choc, crises respiratoires, collapsus, maladies infectieuses) et de l'alcool camphré (analgésique et antiseptique : angines, prurits, brûlures).

**Formes pharmaceutiques.** — A. *Camphydril simple*, à 5 % de principe actif, isotonisé.

1. Ampoules de 1, 2 et 5 cc. : 1 ou 2 par jour.  
2. Comprimés effervescents, à 0 gr. 10 : 2 à 4 par jour.  
Gargarismes : 1 ou 2 pour un verre d'eau.

B. *Camphydril spartéiné*.

1. Amp. de 2 cc. (0,03 spartéine base), 1 ou 2 par jour.  
2. Amp. de 5 cc. (0,05 spartéine base), 1 ou 2 par jour.

C. *Camphydril strychno-spartéiné*.

1. Amp. de 2 cc. (0,015 spartéine base et 0,001 strychnine).  
2. Amp. de 5 cc. (0,02 spartéine base et 0,002 strychnine).

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy. — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## CAMPOFERRONE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Campolon buvable additionné de fer et de cuivre.

(Une cuillerée à café correspond à l'activité de 10 gr. de foie frais ; elle contient 0 gr. 005 de fer et des traces de cuivre.)

**Propriétés et indications.** — Hématopolétique et stimulant de la fonction hépatique.

Anémies hypochromes, Anémies des nourrissons, Insuffisance hépatique, Convalescence, Paludisme. A titre d'adjuvant du Campolon, dans l'Anémie pernicieuse.

**Posologie.** — Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Présentation.** — Flacon de 100 cc.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## CAMPOLON

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Soluté injectable d'extraît de foie.

**Propriétés et indications.** — Provoque rapidement une crise réticulocytaire et une augmentation du taux de l'hémoglobine. Rétablit la production normale d'acide chlorhydrique, améliore les symptômes de myélome fuculaire. Anémie pernicieuse (maladie de Biermer), anémies cryptogénétiques, anémies secondaires (grossesse, parasitisme intestinal, rayons X, cancer, sprue, paludisme, intoxications par le plomb, le bismuth ou l'arsenic), insuffisance hépatique, certains états allergiques (asthme, urticaire).

**Posologie.** — Dans la maladie de Biermer, il ne faut pas hésiter à injecter d'emblée, par voie intramusculaire, 5 cc. par jour, pendant 8 à 10 jours, c'est-à-dire jusqu'à ce que le début de la crise réticulocytaire soit confirmé par l'examen hématologique. Le traitement sera ensuite poursuivi à la dose de 2 cc. par jour, qui représente également la posologie moyenne du CAMPOLON dans les anémies secondaires.

Cure d'entretien : de 5 à 10 cc. une fois par semaine.

**Présentation.** — Boîtes de 5 et 25 ampoules de 2 cc. Boîtes de 3 et 15 ampoules de 5 cc.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10 6 lignes groupées.)

## CANOL

**Composition.** — Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Lawsonia..... 0,35235 Aphloia ..... 0,005  
Chimaphila..... 0,1425 Lawsoniane .... 0,00015

Pour un cachet ou comprimé.

Absolument inoffensif, aucune contre-indication. Le Canol noircit les urines au début du traitement, ne s'accumule pas, peut être employé indéfiniment sans danger.

**Indications.** — Spécifique de l'Albuminurie. Infections des voies urinaires et rénales. Albuminurie gravidique, Néphrites, Pyélonéphrites, Lithiase rénale, Colibacillose, Cystites, Hématuries, Diabète rénal.

**Forme pharmaceutique.** — Boîte de 30 cachets de 0,50 environ.

**Posologie.** — Dose moyenne. — *Adultes* : 4 à 6 cachets par jour. *Enfants* : 1 à 3 cachets par jour.

On peut augmenter la dose jusqu'à 10 cachets par jour dans les cas graves ou compliqués.

**Prix de la boîte de 30 cachets ou 30 comprimés** : 17 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1426-1.

Correspondance et échantillonnage.

Laboratoire du CANOL

5, rue de Clamart — BOULOGNE-BILLANCOURT (S.).  
J. GAUDIN, Pharmacien. Dépôt général : O. C. P. Paris.

## CANTÉINE BOUTEILLE

**Forme.** — Élixir.

**Composition :**

Cratægus..... XXV gouttes.

Passiflore ..... 0 gr. 50

Hamamélis ..... XXX gouttes.

Salix Alba ..... 0 gr. 025

Excipient : Q. s. par cuillerée à café.

**Indications.** — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 22 fr. 30.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Marcadet 04-02.)

## CAPARLEM

**La thérapeutique protectrice du foie.**

Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

**I. Sa formule.** — *Huile de Haarlem d'origine, pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du Juniperus Oxycedrus, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-sécréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholecystokinétique.*

**II. — Ses indications thérapeutiques fondamentales.** — *a. Foie.* — Cholécyctites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non. Calculs de transit et calculs sédentaires. Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécyctectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lamblioses vésiculaires. Colibacillocholies.

*b. Reins.* — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

**III. — Sa posologie habituelle.** — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas.

**IV. — Ses avantages.** — Titrage rigoureux, Efficacité officiellement reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

Prix : 21 fr. 70.

Les Laboratoires Lorrains  
de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse).

(Tél. : 74) (Télégr. : Labodès-Étain).

## CAPSULES BRUEL

A l'Éther Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

**Doses.** — 3 à 10 capsules par jour.

Fabrication, vente en gros et échantillons.

**Laboratoires BRUEL**

ERNOUF, Pharmacien.

GRANVILLE (Manche).

## CAPSULES HENRY

Renfermant les principes actifs de la potion de Chopart.

Les **Capsules Henry** permettent au malade l'absorption facile de la potion de Chopart d'un goût particulièrement désagréable.

Elles sont le complément balsamique indispensable à tout traitement antigonococcique de la blennorrhagie, blennorrhée, cystite, quel que soit le traitement employé, lavages ou chimiothérapie.

9 à 12 capsules par jour.

La boîte de 50 capsules : 19 fr. 90.

**Produits du Dr Henri PHILIPPE**

36, quai Fulchiron — LYON.

## CAPSULES

### HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

Voir :

### HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly

**Laboratoires THOMAS**

2, rue Sainte-Cécile — 31, fbg Poissonnière

PARIS (IX<sup>e</sup>)

(Tél. : Provence 49-77.)

## CAPSULES KUCHNER

au Mécaptol

Affections bronchiques et pulmonaires.

**Composition.** — Héléline crist., Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

**Action thérapeutique.** — Calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration. Propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

**Indications.** — Bronchites simples et chroniques, Toux émetisante des tuberculeux. Toutes affections des voies respiratoires.

**Posologie.** — Trois à six capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 17 francs.

Numéro d'enregistrement au L. N. C. M. : 298-5.

**Laboratoire L. HINGLAIS**

ÉPERNAY (Marne).

(Tél. : 106.)

## CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (extr.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogaïacolate de potasse) 0,04, par capsule.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

**Indications.** — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

**Laboratoires H. NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1<sup>o</sup> Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2<sup>o</sup> Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyllique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

### Posologie :

**Sirup** : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

**Capsules** : 3 à 4 par jour : 10 ans : 1 à 2.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## CARBAGOL MARINIER

### Composition :

Charbon animal, Charbon végétal, Charbon activé (par procédé spécial évitant complètement toute impureté chimique : chlorure de zinc, arsenic, etc.). Argent colloïdal.

### Formes :

GRANULÉ friable légèrement aromatisé.  
CACHETS (exempts de sucre).

### Indications :

Tous les troubles gastro-intestinaux. Entérococolites banales ou muco-membraneuses et leurs conséquences. Toutes diarrhées. Irritations et infections intestinales. Colibacillose. Syndrome entéro-rénal. Intoxications alimentaires. Auto-intoxications.

### Posologie :

**Granulé** : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas avec un peu d'eau ou de tisane.

**Enfants** : 1/3 à 1/2 dose.

**Cachets** : 1 cachet = 1 cuillerée à café de granulé.

Prix du flacon de granulé ou de la boîte de 30 cachets : 22 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n<sup>os</sup> 48-2 et 48-3.

**Laboratoires G. MARINIER**

23, rue Ballu,  
PARIS.

## CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

**La Carbalopline.** — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 22 fr. 90.

**Le Carbarséno.** — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 22 fr. 90.

**La Carbémétine.** — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 34 fr. 50.

**Le Carbalga.** — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

**La Carbésérine.** — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 22 fr. 90.

**La Carbocarpino.** — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 22 fr. 90.

### Laboratoires MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6°).

(Tél. : Suf. 36-59.)

## CARBARGYRE

Charbon végétal activé et Argent associés en un complexe colloïdal.

Antiseptique intestinal puissant, absorbant, anti-toxique, anti-infectieux.

*Ne provoque jamais d'argyrie.*

Indications thérapeutiques. — Colibacillurie, Infections intestinales. Intoxications. Fermentations. Colites. Diarrhées.

### Deux formes :

Cachets : 1 cachet contient :  
Argent colloïdal . . . . . 0,02  
Charbon actif titré . . . . . 0,48

Granulé : 1 cuillerée à entremets contient :  
Argent colloïdal . . . . . 0,02  
Péroxyde de magnésium . . . . . 0,04  
Urotropine . . . . . 0,08  
Charbon actif titré . . . . . 1

Le Carbargyre se prend en général avant les repas.

**Fosologie.** — Dose moyenne par 24 heures :

Adultes : granulé : de 2 à 3 cuillerées à entremets ; cachets de 2 à 5 cachets.

Enfants : de 2 à 3 cuillerées à café.

— Cachets : la boîte de 30 cachets : 21 fr. 80.

Granulé : le flacon de 170 gr. : 21 fr. 80.

Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI°). (Tél. : Auteuil 03-04.)

## CARBATROPINE

Charbon activé (Carbosanis) atropiné.

**Composition.** — 1/2 mgr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de mgr. d'atropine par cuillerée à café.

**Indications.** — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

**Formes.** — Granulé dosé à 5 mgr. par 100 gr., soit 1/4 de mgr. par 5 gr. (cuillerée à café).

Poudre et cachets.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Dosage spécial pour enfants :**

1/10 de mgr. par cuillerée à café.

Prix : 22 fr. 90.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6°)

(Tél. : Suf. 36-59.)

## CARBABEL

Granulés au goût agréable.

**Deux formules.** — Boîte rouge : simple.

Boîte bleue : benzonaphtolé.

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur — hexaméthylène tétramine pur — citrate de magnésie, avec ou sans benzonaphtol.

**Indications.** — Gastrites, aigreurs, inflammations des voies intestinales, biliaires et urinaires.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à prendre comme dessert. (Si possible ne pas délayer dans un liquide.)

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## CARBO-COMBROSMOL

Médication végétale des infections gastro-intestinales et biliaires.

**Composition.** — Combretum, Buchu, Saponaire, Charbon végétal activé.

**Forme.** — Granulé fondant, aromatisé.

**Propriétés.** — Par le *Buchu* attaque l'élément infectieux hépatobiliaire ; par la *Saponaire* neutralise et élimine les toxines ; par le *Combretum* sollicite du foie un effort sécrétoire qui aide à l'élimination des éléments infectieux et toxiques ; par le *Charbon activé* adsorbe les bactéries et les toxines intestinales.

**Indications.** — Hépatites, icères infectieux, angcholites, cholécystites, colibacillose. Fermentations gastro-intestinales, auto-intoxication, états diarrhéiques, aérocolie, infections urinaires.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café, à chaque repas.  
Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires **STELVIA**

Georges **BLAQUE**,

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences,  
59, rue Boissière — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Kléber 88-70).

## CARBOGENASE

Granulé.

**Composition.** — Extrait de Belladone, Citrate de soude, Hexaméthylènetétramine, Lactose, Carbonate de magnésie, Charbon végétal, animal et activé dans excipient aromatisé.

**Indications.** — Aérophagie, Fermentations intestinales, Douleurs stomacales, Dermatoses par auto-intoxications, Affections urinaires.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café à la fin de chaque repas.  
Prix : 18 fr. 30.

Laboratoire **RICHER**, Docteur en Ph<sup>ie</sup>  
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.  
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de  
Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

## CARBOÏODURES FRAUDIN

**Composition.** — Iodure chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 33 d'iodure par cuiller à café.

Deux formes : 1. Carboïodure à l'iodure de potassium.

2. Carboïodure à l'iodure de sodium.

**Propriétés.** — L'iodure fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin).  
*La libération est intégrale, mais lente, ne causant ni intolérance stomacale, ni iodisme.*

**Indications.** — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Laboratoire des **CHARBONS FRAUDIN**

4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).  
(Tél. : Molitor 02-62.)

## CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale  
hépatique et rénale.

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon activé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

**Indications.** — Auto-intoxications gastro-intestinales, Colibacilloses, Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> Boîte de 30 cachets ;  
2<sup>o</sup> Poudre avec cuiller-mesure.  
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

**Doses.** — *Adultes* : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — *Enfants* : 2 à 6 mesures *pro die*.

Prix : 21 fr. 75.

## CARBOLACTYL BILIÉ

**Composition.** — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

**Indications.** — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite. Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabète par Dyshépatie, Colibacilloses, Artériosclérose par intoxication.

**Forme.** — Boîte de 30 cachets.  
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

**Doses.** — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Prix : 22 fr. 50.

Échantillons et Littérature sur demande :

**Laboratoire DENISOT**

19, rue de Fleurus — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## CARBOLAXINE

**Composition.** — Graines sélectionnées de Psyllium enrobées de charbon activé (ACTICARBONE pur) 25 p. 100 et poudre de Belladone 0 gr. 015 par cuillerée à soupe.

**Propriétés.** — Rééducatrice intestinal, désinfectant énergique, antispasmodique.

Forme une gelée épaisse, riche en ACTICARBONE, qui pansela muqueuse intestinale, s'oppose au dessèchement des selles et absorbe les toxines de fermentation.

**Indications.** — Coprostase et conséquences toxiques. Entérocrites. Spasmes de l'intestin, Diarrhée, Fermentations, Colibacillose, etc.

**Posologie :**

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas. 1 cuillerée dès amélioration. Puis : doses décroissantes. *Enfants* : par cuillerée à café.

Prix : 23 fr. 60.

**Laboratoire du MARUBOR**

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).  
(Tél. : 1-59.)

## C'ARBOLÉINE

Granulé à base de Citrate monosodique et trisodique, Charbon animal, Sulfate d'orthoxyquinoléine et de potasse.

Spécialement étudié pour combattre toutes les affections gastro-intestinales, intoxication alimentaire, infections d'origine microbienne (entérocrite muco-membraneuse, entérocrite colibacillose). Il réalise l'antisepsie totale du tube digestif. Son action sur le foie, l'intestin et le tube digestif se traduit par une amélioration rapide de l'état général.

**Indications.** — Intoxications gastro-intestinales, gastro-entérite, colite, entérite, diarrhée, entérocrite muco-membraneuse, colibacillose.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à croquer au milieu des repas, et 1 à 2 cuillerées à café pour les enfants.

Prix : 15 fr. 50.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).



## CARBOLIN MIDY

**Carbolin simple.** — Boîte verte : Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé.

**Carbolin composé.** — Boîte rouge : Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé, Extrait de bile, Ferments intestinaux, Diastase du Codex, Extrait Bourdaine spécial.

### Propriétés thérapeutiques :

**Carbolin simple.** — Régulateur physiologique de l'intestin, panse la muqueuse intestinale, absorbe les gaz, supprime les spasmes gastro-intestinaux.

**Carbolin composé.** — Stimulant physiologique de l'intestin, contrôle la digestion, assure la rééducation motrice des intestins paresseux.

### Indications :

**Carbolin simple.** — La Coprostase et toutes ses conséquences. Aucune contre-indication. S'associe à toute médication complémentaire.

**Carbolin composé.** — Constipation chronique, Atonie intestinale, une selle par jour, sans spasmes, sans diarrhée.

**Doses.** — 2 à 6 cuillerées à café avant les repas. Mettre les graines sèches dans la bouche et les avaler avec une gorgée de liquide, sans les croquer.

Prix : Carbolin simple (boîte verte) : 18 fr. 40

Carbolin composé (boîte rouge) : 19 fr. 60.

Durée du traitement : 10 jours.

### Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII\*).

(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

**Forme.** — Granulé dragéifié en grains très menus.

**Avantages.** — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

**Indications.** — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

**Emploi.** — Par cuillerée à café, (2 à 4 par jour.) à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avalier au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 16 fr. 30.

### Laboratoires NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien

201, rue de Grenelle, PARIS (VII\*). (Invalides 64-36.)

## CARBONAPHTINE FORMINÉE

**Forme.** — Granulé friable, très soluble, agréablement aromatisé à l'anis.

**Composition.** — Benzonaphthol + Salicylate d'alumine + Urotropine recristallisée dans l'alcool + Charbon animal pur en divisions extrêmes + Charbon végétal.

**Indications.** — Toutes infections gastro-intestinales. Infections biliaires et infections urinaires. Réalise l'antiseptie parfaite du tube digestif grâce à son pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

**En Radiologie.** — Pour obtenir l'absorption des gaz : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans les 48 heures qui précèdent l'examen.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas (1/2 cuillerée pour les enfants) à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Prix : 19 fr. 30.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL et J. ROUSSELIN

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe.

8, rue Fleury — LYON-OUILLINS.

## CARBONAPHTINE SÉDATIVE

**Forme.** — Granulé friable, soluble, agréablement aromatisé à l'anis.

### Composition :

Vitamine B<sup>1</sup>  
Extrait de Belladone  
Poudre de feuilles  
de Belladone stabilisée

*Action sédative très nette.*  
Modérateur de l'excitabilité du pneumogastrique.  
et des sécrétions digestives.

Bicarbonate de magnésium  
Citrate de soude  
Phosphate de soude  
Bicarbonate de soude

*Action neutralisante douce.*

Benzonaphtol à dose faible  
(non irritante)

*Antiseptique désodorisant.*

Charbon animal en divisions extrêmes  
Charbon végétal suractivé

*Action antiseptique.*  
= par absorption et adsorption.

Lactose

*Action diurétique.*

La **Carbonaphtine sédative** ne sera employée que sur les conseils du Médecin traitant, qui fixera lui-même les doses suivant les cas et les sujets, sachant qu'une cuillerée à café de granulé renferme un demi-centigramme d'Extrait de Belladone et autant de Poudre de Belladone stabilisée.

**Indications.** — Dyspepsies douloureuses, Gastrites, Gastralgies, Acidité, Brûlures, Aérophagies, Flatulence, Spasmes gastriques et pyloriques, Spasmes intestinaux, Colites, Ptoses, Fermentations intestinales, Angiocholites, Constipation.

**Posologie.** — *Doses courantes:* Une cuillerée à café un peu avant les repas, une à trois fois par jour. Ce granulé peut être absorbé soit dilué dans un peu d'eau, soit croqué comme un bonbon.

**Prix : 24 fr. 70.**

**Laboratoires MALAVAL**

Ch. MALAVAL et J. ROUSSELIN

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe.

8, rue Fleury — LYON-OUILLINS (Rhône).

## CARBONAPHTINE VITAMINÉE

**Forme.** — Granulé friable, soluble, agréablement aromatisé à l'anis.

**Composition.** — Benzonaphtol, 1 gr. Charbon animal, 5 gr. Charbon végétal suractivé, 10 gr. Vitamine C, 200 unités internationales. Vitamine B, 300 unités internationales. Vitamine A, 3 000 unités internationales. Sucre aromatisé, Q. S. p. 100 gr. de granulé.

**Indications.** — Traitement des infections gastro-intestinales : Fermentations intestinales, Aérophagie, Dilatations d'estomac, Ptose adominale et viscérale, Obésité, Flatulences, Pyrosis, États pré-ulcéreux, Appendicite chronique, Entérite, Colibacillose, Diarrhées, Empoisonnement, Dermatoses, Auto-intoxication.  
Précieux auxiliaire dans toutes les maladies infectieuses.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café à la fois, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau, le matin à jeun et à la fin des repas.

**Cure d'entretien.** — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun ou après un repas. *Enfants:* 1/4, 1/3 ou 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

**Prix : 24 fr. 70.**

**Laboratoires MALAVAL**

Ch. MALAVAL et J. ROUSSELIN, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe.

8, rue Fleury — LYON-OUILLINS (Rhône).

## CARBONÉSIE

**Cachets et Granulé**

**Composition.** — Charbon actif, charbon animal, charbon végétal, magnésie calcinée légère, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux.

**Indications.** — Gastro-entérites, fermentations intestinales, entérocrites, intoxications et auto-intoxications, diarrhées, colibacillose et ses conséquences.

### Avantages :

- 1° Activité maximum vis-à-vis de toutes les toxines grâce aux 3 charbons, à parties égales.
- 2° Ne constipe pas, grâce à la magnésie.
- 3° Ne contient aucun corps chimique irritant ni toxique.

### Posologie :

**Cachets :** Un ou deux après chaque repas.

**Granulé :** De goût très agréable : 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas.

**Prix :**

Boîte de 30 cachets ..... 20 fr. 20  
Boîte de 100 gr. de granulé..... 20 fr. 20

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Nord 76-85.)

## CARBONEX

**Indications.** — Insuffisance hépatique et constipation aiguë et chronique avec tous les troubles secondaires en résultant : arthritisme, migraines, obésité ; troubles vasculaires : artério-sclérose, hypertension artérielle ; troubles articulaires : rhumatismes chroniques ; accidents cutanés : eczéma, urticaire, furonculose, acné.

**Composition.** — Hydrate de magnésie et soufre lavé.

**Propriétés.** — Régularise les fonctions hépatiques et intestinales par son action cholagogue et laxative, *sans accoutumance*.

**Présentation.** — Poudre, en flacon de 125 gr.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café à la fin des 2 repas, ou 1 cuillerée à soupe le matin à jeun, ou le soir suivant l'effet recherché.

**Laboratoires BIOS**

10, rue Vineuse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CARBOREXYL

**Estomac-Intestin.**

**Principes actifs :**

Charbon de peuplier léger et poreux à l'état d'extrême division, simple ou associé à l'Urotropine, au Benzonaphtol ou à la Belladone.

**Composition :**

Pour répondre aux exigences de la thérapeutique nous mettons à la disposition du corps médical 4 formules :  
**Carborexyl « S »** (simple) chaque comprimé = 1 gr. de charbon.

**Carborexyl « F »** (forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine.

**Carborexyl « NF »** (naphto-forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine et 25 cgr. de Benzonaphtol.

**Carborexyl « B »** (Belladone) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 1 cgr. d'extrait et 1 cgr. de poudre de belladone.

**Forme :**

Comprimés friables, agréables au goût.

**Indications :**

Hyperacidité, Hypersécrétion, Dyspepsie, Aérocolie, Spasmes douloureux, Dilatation d'estomac, Syndrome entéro-rénal et entéro-hépatique, Colibacillose, Cholécystite, Diarrhée, Intoxication exogène et endogène.

**Remarque importante :**

Par sa composition, le *Carborexyl Belladone* trouve plus spécialement ses indications dans les cas de gastro-pathies douloureuses, spasmes du colon et la constipation qu'ils provoquent. Etant donné son pouvoir toxique, il ne devra être employé que sur ordonnance du médecin.

**Posologie :**

1 à 3 comprimés par jour, à diminuer ou à augmenter suivant les indications du médecin traitant.

**Mode d'emploi :**

Croquer ou, de préférence, laisser fondre le comprimé dans la bouche.

**Prix :**

Carborexyl S	} La boîte 17 fr. 50.
Carborexyl F	
Carborexyl NF	
Carborexyl B	: La boîte 18 fr. 70.

Enregistré au L. N. O. sous n° 1079.

**Laboratoires de l'HÉPATOMAGNÉSION**

S. A R. L. au capital de 125.000 francs.

A. COLLET-PIERRE, Pharmacien-Gérant.

30, rue de Créqui — LYON.

(Tél. : Lalande 41-81.)

## CARBOSANIS

### CHARBON ACTIVÉ A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

**Propriétés.** — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

**Indications.** — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocrites, Diarrhées intenses.

**Formes.** — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 22 fr. 90.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6<sup>e</sup>)

(Tél. : Suf. 36-59.)

## CARBOTRIGON

Synonyme Biotrigon Hépatique.

### Composition :

Charbon végétal activé,  
Extrait mou de fenugrec désodorisé,  
présentés en granulé friable.

### Propriétés :

Allie le pouvoir adsorbant et antitoxique du charbon activé aux propriétés stimulantes, nutritives et apéritives du fenugrec.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

## CARDIALGINE DUBOIS

Dragées et Gouttes.

**Composition.** — Pour une dragée ou XV gouttes :

Bromure de Sparteine .....	3 cgr.
Extrait de Strophantus gr.....	1 mgr.
Extrait d'Aubépine .....	10 cgr.
Extrait de Belladone titré .....	5 mgr.
Chlorhydrate de Papavérine .....	1 cgr.

**Propriétés.** — Association synergique chimico-végétale permettant de réaliser une médication cardiaque universelle, susceptible d'être employée sans arrière-pensée très efficacement dans tous les cas où l'on doit interrompre ou éviter l'emploi de la digitale ou de l'ouabaïne.

**Action.** — La Cardialgine Dubois agit de la façon suivante : par sa *Sparteine*, elle régularise le rythme cardiaque et remédie à l'insuffisance du myocarde ; par son radical *Brome*, elle corrige l'excitabilité anormale du système nerveux ; par le *Strophantus gratus*, elle agit sur les arythmies, les syndromes asystoliques. En outre le *Cratogeomys* lui confère ses effets modérateurs sur le système nerveux cardiaque et vasculaire, la Belladone la fait triompher des spasmes et algies. Le Chlorhydrate de Papavérine, enfin, fait cesser la vasoconstriction et baisser la tension.

**Indications.** — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, Insuffisance cardiaque, Spasmes vasculaires de l'hypertension, Arythmies, Tachycardies, Eréthisme neuro-cardiaque, Insuffisance du myocarde dans les maladies infectieuses (septicémies, fièvres éruptives, fièvres typhoïdes, grippe) et la pneumonie des vieillards. Cure d'entretien des états hyposystoliques et hypophysiques.

**Formes.** — Dragées et gouttes.

### Posologie :

#### Dragées :

**Adultes :** 1 à 3 dragées par jour.

**Enfants :** 3 à 6 ans 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans, 2 dragées par jour.

#### Gouttes :

**Adultes :** XXX à XLV gouttes par jour en ayant soin de ne pas prendre plus de XV gouttes (1/2 cc.) en une seule fois.

**Enfants :** 3 à 6 ans, XV gouttes par jour à raison de V gouttes 3 fois par jour ; 6 à 12 ans, XXX gouttes par jour à raison de X gouttes 3 fois par jour ; 12 à 16 ans : XXXV gouttes en plusieurs fois.

Prix : 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n° 238-1 et 238-19.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

52, rue Montesquieu, ASNIÈRES.

(Tél. : Gré. 03-92.)

## CARDIAZOL CRUET

Troubles circulatoires — États de collapsus — Intoxications

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Pentaméthylènetétrazol.

Le CARDIAZOL possède une extrême rapidité de résorption grâce à sa grande solubilité dans les milieux organiques. Bien que très différent du camphre par sa structure moléculaire, le CARDIAZOL s'en approche par certaines propriétés et par ses applications cliniques. L'innocuité absolue du CARDIAZOL permet d'étendre ses indications à la pédiatrie.

**Posologie.** — 1° *Par la bouche.*

Adultes : 1 comprimé ou XX gouttes 3 à 4 fois par 24 heures.

Enfants : 1/2 comprimé ou X gouttes 3 à 4 fois par 24 heures.

2° *En injection.*

Adultes : 1 ampoule renouvelée à 1 heure d'intervalle.

Enfants : 1 amp. suivant l'âge, plusieurs fois par jour si nécessaire.

**Présentations.** — Tube de 10 comprimés ..... 18 fr. 20  
Flacon de 10 gr. solution..... 18 fr. 20  
Boîte de 6 ampoules à 1 cc.... 22 fr. 30

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII°).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE, 87, avenue de Saxe — LYON

## CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

### Présentation et posologie :

1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1 000 (XXV gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : X à XXX gouttes par jour.

Doses moyennes : L à C gouttes par jour.

2° *Voie intraveineuse.* — Boîte de 8 ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/2 à 1 cc. p. injec.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques avec importante dilatation ventriculaire et rythme régulier. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaine**.

Échantillons et Littérature :

### Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV°). (Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : Agent général : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

## CARDIOFLORINE

(Dragées roses cardio-néphrotropes.)

**Priorité.** — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par nos soins en 1934.

**Composition.** — Barbiflore totale, Adonis vernalis et Scille.

**Propriétés.** — Diurétique cardiotonique. Désintoxicant et uréopoiétique de grande valeur. Remplace et continue l'action des digitaliques. Ne s'accumule pas.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques et cardio-vasculaires, Insuffisance rénale, Artériosclérose, Hypertension, Œdèmes de toute étiologie, Troubles valvulaires, Syndromes neuro-cardiaques, Essoufflement, Obésité, Oliguries, etc.

**Posologie.** — 1 à 6 dragées dans les intervalles des repas, en moyenne 3 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

### Laboratoire DE LA BARBIFLORE

H. ADAM, pharmacien

4, rue du Rocher, MONACO

## CARDIOPHYLLINE

### Composition :

Adénosine.....	0,001
Aminophylline.....	0,10
Extrait myocardique.....	0,05

**Propriétés.** — Les composants de la cardiophylline concourent à faire de ce produit le traitement de choix des angoissés du cœur et des cardio-rénaux grâce à leur action vaso-dilatatrice sur les coronaires, antalgique cardiaque et diurétique.

**Indications.** — Toutes les algies cardiaques ; Angine de poitrine ; Aortites ; Palpitations, spasmes vasculaires ; Dyspnées, Asthme ; Ascites ; Œdèmes.

**Présentation et posologie.** — Boîte de 30 globules (2 à 6 globules par jour).

La Cardiophylline ne s'accumulant pas dans l'organisme peut être prescrite longtemps sans inconvénient.

Elle n'a pas de contre-indications.

### Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. Nord 19-52).

## CARDIOR

Introduction de l'Or  
en thérapeutique cardio-vasculaire.

**Composition.** — Or métallique rendu soluble par photolyse; alcoolature de sumbul; alcoolature d'uva-ursi.

**Forme.** — Gouttes.

### Action :

- 1° Diminue la viscosité sanguine.
- 2° Apaise les spasmes artériels.
- 3° Dilate les artérioles.
- 4° Augmente la diurèse.

### Indications :

- 1° Hypertension et ses troubles fonctionnels.
- 2° Artériosclérose.
- 3° Signes de petit Brightisme chez les hypertendus.

**Posologie.** — X gouttes dans un peu d'eau pure, loin des repas. Traitement prolongé sans inconvénient.

Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1820-1.

**Laboratoires ROBIA**  
LILLE.

## CARDIOSTHÉNINE

Association de tonicardiaques et de sédatifs d'action synergique.

**Formule.** — Chaque capsule contient :

Extrait de Strophantus.....	0 gr. 0005
Sulfate de Sparteine.....	0 gr. 02
Extrait de Crataegus Oxyacantha.....	0 gr. 05
— stabilisé de Valériane.....	0 gr. 05

**Indications thérapeutiques.** — Traitement d'élection des formes moyennes et légères de l'insuffisance ventriculaire gauche, complément utile des injections intraveineuses d'ouabaine dans la grande insuffisance, quelle qu'en soit la cause: hypertension artérielle, aortite, accidents cardiaques des affections rénales.

Est également indiquée pour renforcer l'action de la digitaline, dont elle permet d'espacer les cures.

**Posologie.** — De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Prix: 20 fr. 30 le tube de 40 capsules.

**Laboratoires GRIMAULT**

Fondés en 1856

51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Bal. 20-70.)

## CARDIO-STREPTINE

Traitement de la maladie rhumatismale et prophylaxie de l'endocardite secondaire lente.

Corps microbiens + lysats + anatoxine.

**Posologie.** — 1 injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de  
1/4 de cmc.

1/2 cmc. — 1 cmc. — 1 cmc. 1/2.

Prix. Les 4 ampoules de 2 cmc. : 50 fr.

Enregistré au L. N. C. n° 514-6.

Littérature et échantillons aux

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS  
(Tél.: Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## CARDIRÈNE

**Composition par cachet.** — Digitale stabilisée 0,035, Seille 0,035, Buchu 0,22, Phosphate de soude 0,15, Théobromine recristallisée 0,30.

**Forme.** — Cachets.

**Indications.** — Tonique du cœur, Diurétique puissant, Maladies du Cœur et des Reins, Artériosclérose, Albuminurie, Hydropisie.

Action rapide et de longue durée sans fatigue de l'Estomac ni accoutumance.

**Doses.** — 2 à 3 pendant 5 jours, puis 1 pendant 10 jours. Cesser 10 jours et reprendre le traitement.

**Prix :** 21 fr. 80 la boîte de 24 cachets.

Durée de la boîte : 20 à 25 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle dans le n° 1403-2.

**L. ROBERT, Pharmacien**

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél.: 0-70.)

## CARDITONE

(Toni-cardiaque pur.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Cardiopathies valvulaires; Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie, Hypotension essentielle.

### Composition :

Extrait de Strophantus .....	0 gr. 001
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Muguet .....	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé de.....	0 gr. 35

**Mode d'emploi.** — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescription médicale.

**Laboratoires LOBICA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## CARÉNA

*L'aminophylline française.*

### THERAPEUTIQUE CARDIO-RÉNALE

**Composition.** — Aminophylline synthétique pure (théophylline-éthylène-diamine).

**Action pharmacologique.** (Voir *Aminophylline*.) Remplace la théobromine et la caféine dans leurs indications cardiaques et rénales.

**ANTALGIQUE CARDIAQUE, CARDIO-TONIQUE, DIURÉTIQUE ATOXIQUE, EUPNÉIQUE.**

*Dilate les vaisseaux coronaires, lève les spasmes coronariens, assure une meilleure nutrition du myocarde et accroît le débit systolique.*

*Augmente la diurèse. « Lève les barrages » et soulage le travail du cœur dans les syndromes cardio-rénaux.*

### Indications :

*Douleurs et oppressions des cardiaques.*

*Angine de poitrine. Infarctus du myocarde, Aortites, Arythmies, Dyspnées, Asthme, Cheyne-Stokes, Ascite, Œdèmes, Oligurie des maladies infectieuses. Cardio-névroses : voir Sédó-Caréna.*

### Posologie :

**Comprimés :** dosés à 0 gr. 10 d'aminophylline.  
1 ou 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour, à la fin des repas.

**Gouttes :**  
X à XXX gouttes dans un peu d'eau.  
3 à 4 fois par jour, après les repas.

**Suppositoires :** un ou deux suppositoires par jour.

**Ampoules :** Infarctus du myocarde, œdème aigu du poumon, anasarque des cardio-rénaux, dyspnées cardiaques, dyspnée des urémiques, oliguries infectieuses (*goutte à goutte intraveineux*).

**Caréna**  
**Intramusculaire.** { Ampoules à 0 gr. 50 dans 2 cc. ;  
injecter en plein muscle 1/2, 1 ou  
2 ampoules par jour.

**Caréna**  
**Intraveineux.** { Ampoules à 0 gr. 25 dans 10 cc. ;  
injecter très lentement, en 3 minutes environ.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)



## CARÉNA-CALCIUM

**Théophylline calcique française.**

La théophylline calcique possède toutes les propriétés et indications de la théophylline-éthylène-diamine (Voir *Aminophylline* et *Théophylline*) ; mais son absorption intestinale est plus lente et, si son action est moins rapide, ses effets sont plus persistants.

L'ion-calcium augmente les propriétés diurétiques et toni-cardiaques de la théophylline.

*Caréna-Calcium* est indiqué chez les malades dont le tube digestif est délicat et chez les hyperchlorhydriques.

### Présentations :

*Comprimés* : 3 à 8 comprimés par jour. (Tolérance gastrique absolue.)

*Ampoules intraveineuses* (10 cc.) : 1 ampoule par jour. (Injecter très lentement.)

## CARÉNA-OUABAÏNE

**Toutes les indications de l'Ouabaïne.**

**Propriétés.** — L'association Caréna-Ouabaïne augmente l'énergie du cœur, assure une meilleure nutrition du myocarde par la dilatation des coronaires, et évite le danger de syncope ouabaïnique. Caréna-Ouabaïne soulage la dyspnée et déclenche la diurèse.

**Indications.** — Toutes les formes d'insuffisance cardiaque.

Asystolie des aortiques. Œdème aigu du poumon.

Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Cœur des vieillards : traitement d'entretien.

**Posologie.** — *Comprimés* contenant 5 centigrammes de Caréna et 1 milligramme d'Ouabaïne. 4 à 10 comprimés par jour.

*Ampoules intraveineuses* contenant 10 centigrammes de Caréna et un quart de milligramme d'Ouabaïne.

Injecter une demi à 2 ampoules, lentement, dans la veine, en suivant toutes les directives des traitements par l'Ouabaïne.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## CARNINE LEFRANCO

**Composition.** — Suc Musculaire de viande de bœuf crue concentré à froid sans addition de sang. Contient tous les ferments, vitamines et anti-toxines, de la viande fraîche.

**Propriétés.** — Reconstituant énergétique reminéralisant, recalcifiant.

**Indications.** — Toutes les anémies, *tuberculose*, convalescence, troubles de la croissance, rachitisme, lymphatisme.

**Présentation et posologie.** — Carnine concentrée en ampoules, 10 ampoules buvables de 10 cc., 2 à 4 ampoules par jour dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, lait, bouillon, etc.).

**Remarque.** — La Carnine Lefrancq peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait tiède, à la dose de deux cuillerées à café ou une ampoule.

**Laboratoires LEFRANCO**

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

## CASCARA MIDY

**A base de *Cascara Sagrada* naturel.**

**Pilules dosées à :**

0 gr. 10 d'extraît hydro-alcoolique codex de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

0 gr. 20 de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

**Doses et mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix : 11 fr. 50.

Durée du traitement : un mois.

**Laboratoires MIDY**

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)



## CASCARINE LEPRINCE

$C^{12}H^{10}O^5$ .

**Indications thérapeutiques.** — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue, puis copragogue de tout premier ordre (spécifique des causes et des conséquences de la constipation).

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis cinquante ans.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 pilules le soir au début du repas.

Prix de vente au public : 11 fr. 90.

**Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## CASOL

**Présentation.** — Sirop.

(Voir LUDIN.)

**Laboratoires REY**

DIJON.

(Tél. : 22-12.)

## CASTANOL

**Ooqueluche. Toux des ganglionnaires.**

**Toux quinteuses rebelles.**

**Composition.** — Extraits de feuilles de châtaignier *iodé*, de Drosera, d'Anémone, de Grindelia, de Balotte.

Aucun produit chimique,

Aucun toxique.

Délicieux au goût.

*Fortifiant iodotannique de choix.*

**Posologie :**

**Enfants :** au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

— de 1 à 2 ans : 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 ans : 4 — à café —

— de 4 à 8 ans : 4 — à dessert —

— de 8 à 12 ans : 3 — à soupe —

**Adultes :** 4 cuillerées à soupe.

Prix : 16 fr. 50.

**Pierre LAOHAISE, Docteur en Pharmacie**

9, av. du Maréchal-Pétain — TULLE (Corrèze.)

## CATHACIDE

(AMPOULES)

Curatif des États acidotiques.

Fixateur (par voie indirecte) des sels de calcium.

Propriété thérapeutique :

Neutralise l'acidose humorale pathologique, cause de la déminéralisation et des différentes manifestations liées à une rupture (vers l'acidose) de l'équilibre général acido-basique.

Composition

Solution injectable de citrate neutre de soude pur, en milieu aqueux (5 %), convenablement stérilisé.

Mode d'action :

Le Cathacide, introduit dans l'organisme, soit par voie hypodermique, soit par voie intraveineuse, se transforme par oxydation de la partie organique (ion citrique) en *carbonate de sodium*, développant ainsi dans l'intimité des tissus la faible alcalinité suffisante pour neutraliser, d'une manière efficace, progressive et durable, l'acidité pathologique. A noter que la plupart des manifestations acidotiques s'accompagnent des symptômes de *déminéralisation*. En effet, aussi longtemps que le terrain demeure acidotique, aucune fixation de sels de chaux ne peut se produire. Cette constatation, qui explique l'échec des traitements habituels, montre qu'il convient avant tout de neutraliser l'acidose pathologique. La fixation des différents sels (que l'alimentation normale suffit largement à fournir) se produira ensuite normalement.

Indications :

**États légers d'Acidose.** Carence minérale, rachitisme et déminéralisation, eczéma infantile, gourme, retard de dentition, carie dentaire, troubles de la puberté, lymphatisme, surmenages intellectuels et physiques, convalescences.

**États chroniques d'Acidose.** Ulcères gastriques et duodénaux, états allergiques en général, urticaire, maladie de Recklinghausen, déficience calcaïque, ostéomalacie, ostéophytes, vomissements de la grossesse, états prétyphoïdiques, etc...

**États graves d'Acidose.** États anaphylactiques, syndromes hémorragiques, anémies graves, néphrites aiguës, choc post-opératoire, brûlures étendues, coma diabétique, etc...

Posologie :

**États légers** (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ou 2 ampoules hypodermiques de 2 cc. par 24 heures.

**États chroniques** (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ampoule intraveineuse de 5 cc. (ou 2 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

**États graves** 2 ampoules intraveineuses 5 cc. (ou 4 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

Nota :

Dans tous les cas, le traitement doit être prolongé jusqu'à complète satisfaction confirmée.

L'efficacité et la rapidité d'action dépendent du stade d'acidose au cours duquel le traitement est instauré.

En général, la cure de Cathacide se traduit, au début, par une période de légère lassitude (1<sup>re</sup> décade) suivie d'améliorations sensibles qui ne cessent de s'accroître (vitalité accrue, euphorie, augmentation de poids, raffermissement des tissus, etc...) ; ces résultats sont faciles à contrôler par les moyens habituels : pesées périodiques, analyses d'urines, taux de viscosité sanguine, etc...

Avantages :

L'injection est indolore. Ni réaction locale ou générale, ni contre-indication, ni accoutumance.

Prix et Formes :

Coffret 20 ampoules hypodermiques de 2 cc.	Frs. 31 -
Boîte 10 -	22 -
— 5 -	14,60
— 5 -	22 -

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-2.

Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL

G. BERTIN, Pharmacien

95, rue de Prony — PARIS (17<sup>e</sup>). (Tél. : Carnot 03-80.)

## CAVEFORM

Simple ou benzonaphtholé.

Granulé ou cachet.

Composition :

	Granulé par cuiller à café.	Cachet
Charbons :		
Animal exempt de cyanogène.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Végétal activé.....	0 gr. 50	0 gr. 25
FORMol naissant.....	0 gr. 20	0 gr. 10

(Héxaméthylène-tétramine.)

Avec ou sans Benzonaphthol..... 0 gr. 20 0 gr. 10

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique interne. Très puissant adsorbant des alcaloïdes, bactéries, toxines, gaz, poisons minéraux.

**Indications.** — Infections intestinales, urinaires et biliaires. Auto-intoxications. Colibacillose. Cystite. Diarrhée. Entérites. Empoisonnements aigus alimentaires. Fermentations intestinales. Mauvaise haleine. Urticaire.

**Mode d'emploi.** — Après chaque repas : 1 cuillerée à café de granulé ou 1 à 2 cachets.

Présentation pharmaceutique et prix :

Granulé friable : 13 francs le flacon.

Cachets : 15 francs la boîte de 30.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur,

Licencié ès sciences.

114, rue Solferino — LILLE.

## CEBION MERCK

Composition. — Vitamine C (acide-L-ascorbique cristallisé).

**Propriétés.** — Vitamine antiscorbutique, dépourvue de toxicité.

**Indications.** — Scorbut, états pré-scorbutiques, régimes pauvres en vitamine C (dyspepsies, ulcères), hémorragies, troubles de la grossesse, parodontose, pyorrhée alvéolaire, maladies infectieuses, pigmentations pathologiques, etc.

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 05. Boîtes de 10 ampoules à 0 gr. 05 dans 1 cc. Boîtes de 5 ampoules à 0 gr. 10 dans 2 cc. (pour inject. sous-cut., intram. et intravein.).

**CEBION fort** : boîtes de 3 ampoules à 0 gr. 50 (pour inject. intramusculaires ou intraveineuses seulement).

**Posologie.** — A titre prophylactique : 1 compr. par jour. A titre thérapeutique : 1 à 2 compr. par jour ; ou, dans les cas graves et urgents : 1 à 2 amp. par voie intrav., intramusc. ou hypoderm. Dans les maladies infectieuses (pneumonie, diphtérie notamment), injecter, si possible le premier jour, 1 ou 2 amp. de CEBION fort, par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## CÉDILANIDE

Lanatoside C.

**Composition.** — Le Cédilanide est l'un des glucosides initiaux du *Digitalis lanata*. Il lui est particulier et n'a été isolé jusqu'ici que de cette seule espèce de digitale. La digitale pourprée notamment ne contient aucun glucoside correspondant au Lanatoside C.

**Propriétés et avantages.** — Très grande rapidité d'action qui se traduit en moins de 24 heures par une amélioration des symptômes subjectifs et notamment de la dyspnée, par le ralentissement du pouls et un effet diurétique intense.

Tolérance excellente quel que soit le mode d'administration, voie gastrique ou parentérale, d'où possibilité de doses élevées atteignant d'emblée le seuil thérapeutique utile.

Marge thérapeutique étendue assurant une désintoxication rapide en cas de surdosage, ce qui permet de prolonger et de répéter les cures.

Pouvoir diurétique considérable.

En raison de ces différentes propriétés, le Cédilanide peut, dans une certaine mesure, être comparé à une strophantine dont les effets seraient durables et qui serait active par voie gastrique.

**Indications.** — Toutes celles de la digitale, et en particulier les asystolies avec oligurie marquée, anasarque et arythmie complète, exigeant une intervention rapide et puissante.

**Formes.** — Gouttes : VIII gouttes = 1/4 de mgr.

Dragées : 1 dragée = 1/4 de mgr.

**Posologie.** — La posologie doit être adaptée à la gravité des symptômes que l'on veut combattre. La marge thérapeutique étendue du Cédilanide et sa bonne tolérance permettent d'atteindre immédiatement les doses efficaces. Chez les malades ayant subi préalablement une cure digitale, et chez les sujets particulièrement sensibles à la digitale, on commence avec de faibles doses qui sont augmentées progressivement.

**Voie gastrique :** asystolies bénignes, traitements d'entretien.

Dragées : 1 à 2, 3 fois par jour, pendant 8 à 10 jours consécutifs et davantage.

Gouttes : VIII à XV, 3 fois par jour, pendant 8 à 10 jours consécutifs et davantage.

**Voie intraveineuse :** grandes asystolies.

2 à 4 cc. par jour, pendant 4 ou 5 jours consécutifs. Commencer par une première injection de 2 cc. pour vérifier la susceptibilité du malade.

### PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CELLARGOS

Antiseptique intestinal.

**Composition.** — Cellocarbone (charbon spécial de coton activé). Argent colloïdal et Bismuthate d'oxybenzopyridine.

Antiseptique, absorbant, sans toxicité.

**Indications.** — Infections intestinales, Diarrhées estivales, Syndrome entéro-rénal, Colibacilloses. Fermentations, Entérites, Colites.

**Posologie.** — Prendre 1 ou 2 cachets avant ou après chaque repas principal.

**Présentation.** — En boîte de 30 cachets pour un traitement de 10 à 15 jours.

Prix : 15 fr. 80.

Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél : Carnot 78-11.)

## Bande plâtrée CELLONA

(Bande Platrix à prise rapide.)

**Forme.** — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale.) Atelle plâtrée pour membres inférieurs (genre Deibet) fournie sur demande.

### Avantages :

- 1<sup>o</sup> Transport des bandes : Encombrement réduit, légèreté.
- 2<sup>o</sup> Confection du plâtre : Propreté ; à l'immersion, la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes ; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
- 3<sup>o</sup> Masse constituée : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où : légèreté des appareils constitués, poids et encombrement réduits de moitié.

En fin, aspect extérieur lisse et brillant.

**Mode d'emploi.** — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en lisant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. A cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

**Indications.** — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques.

Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup> S. à r. l.

VIBRAYE (Sarthe).

Agence à PARIS : 104, Fg Poissonnière (X<sup>e</sup>) — (Tél. : Trudaine 92-52.)

## CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique extrait du globule rouge.

**Tonique général.**

**Indications.** — Toutes les anémies, Déficiences organiques, aucune contre-indication.

**Présentation.** — Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif.

**Posologie.** — 3 dragées ou plus par jour suivant indication du médecin.

**Prix.** — La boîte de 30 dragées : 23 fr. 50.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Vaug. 11-23.)

## CELLULAX

Laxatif antitoxémique physiologique à base de celluloses végétales : de présentation agréable.

**Composition.** — Ni drastiques, ni cathartiques.

*Son de blé 20 p. 100* : Laxatif sélectionné, stabilisé, déshydraté, désamidonné. (Travaux du prof. Fiessinger.)

*Lactose 20 p. 100* : Antitoxique, antifermentescible. (Travaux des auteurs américains.)

*Gélose pure 6 p. 100* : Emollient, absorbe quinze fois son poids d'eau. Aucune autre substance médicamenteuse.

**Indications.** — Constipation chronique et rebelle ; atonie intestinale, dystonie gastrique, ptoses, aérocolie ; colites membranueuses, entérocolites, colibacillose, dermatoses, migraines, mauvaise haleine, grippe à forme intestinale.

**Présentation.** — Granulés sans odeur et de goût délicat.

**Posologie :**

*Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café, à la fin des repas.

*Enfants* : au-dessous de 10 ans, une cuill. à café après le repas du soir  
Cure de dix jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 733-7.

**Laboratoire LAFFORT**

JOUÉ-LÈS-TOURS (Indre-et-Loire).

## CÉRÉBRINE FOURNIER

(Produit non opothérapique.)

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

**Cérébrine simple.** — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

**Cérébrine bromée.** — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles et les tranchées utérines.

**Cérébrine bromo-iodée.** — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciaticques.

**Cérébrine iodée.** — Névralgies rhumatismales.

**Cérébrine quiniée.** — Courbature, grippe infectieuse.

**Dose.** — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

**Prix.** — 18 fr. 40 le flacon.

**Lab<sup>o</sup> de la Cérébrine Fournier**

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 50-57.)

## CÉRÉBRO-LIPASE

**Comprimés.**

Médication reconstituante opothérapique.

**Composition.** — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiamine. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

**Indications.** — Etats pré-tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

**Action.** — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.  
*Enfants* : (à partir de 10 ans seulement) 1 comprimé tous les deux jours.

**Échantillons et Littérature :**

**Laboratoires H. YVRARD**

17, rue Soufflot — PARIS.

(Tél. : Odéon 56-87.)

## CÉRÉBRON

Antitoxine cérébrale.

Traitement des états neurasthéniques et des maladies nerveuses. Lécithine et cholestérine en solution huileuse.

**Deux formes.** — Boîte de 8 Ampoules de 2 cc. par injections sous-cutanées, boîte de 50 Capsules pour médication interne.

### Action thérapeutique et usages:

Le *Cérébron* apporte aux cellules nerveuses les éléments de défense utiles pour lutter contre les toxines; c'est, de plus, un excellent tonique du système nerveux. Prescrit surtout dans la neurasthénie quelle qu'en soit la cause, chez les personnes dont l'état physique est affaibli en même temps que leur résistance nerveuse; l'anémie cérébrale, les troubles de la mémoire, l'affaiblissement intellectuel consécutif même à certaines lésions du système nerveux.

**Posologie, mode d'emploi.** — Une ou deux ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

*Capsules*, 6 par jour, 2 capsules avant chacun des trois repas.

Prix : 34 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. n° 240-3.

**Laboratoires DUCATTE**

191, rue Saint-Honoré, Paris. (Tél. : Opéra 68-80.)

## CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple)

Reconstituant physiologique.  
Minéralisateur complet.

**Os frais :** Os longs d'animaux en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. Vitamines D naturelles).

**Phytophosphine :** dosée à 21 % de phosphore organique extrait des graines de céréales.

**Sels minéraux :** Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

**Extrait parathyroïdien :** Fixateur des sels minéraux.

**Aucune contre-indication :** ni Adrénaline ni Surrénale.

### Indications :

États pré-tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescences, Surmenage.

### Posologie :

**Comprimés :** Adultes, 2 à 3 par jour. Enfants 1/2 dose.

**Poudre :** Adultes, 2 cuill. à café. Enfants, 1 cuill. à café. Nourrissons, 1/2 cuill. à café.

**Granulé fondant :** Adultes, 4 cuillerées à café. Enfants, 2 cuill. à café. Nourrissons, 1 cuill. à café.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE



## CÉRÉOSSINE SURVITAMINÉE

(Céréossine irradiée.)

Vitamine D titrée biologiquement.

Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».

Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique.

### Indications :

Rachitisme, Pré-rachitisme, Croissance, Tuberculose, Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et la nourrice, Fractures, Chirurgie osseuse.

### Posologie :

*Comprimés.*

Chaque comprimé contient une quantité de Vitamine D pure correspondant à 2 600 unités internationales.

*Adultes :* 2 à 3 par jour.

*Enfants :* 1 par jour.

*Granulé fondant.*

Cent grammes de granulé fondant contiennent une quantité de Vitamine D pure correspondant à 40 000 unités internationales.

*Adultes :* 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants :* 2 cuillerées. *Nourrissons :* 1 cuillerée à café par jour.

## CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

Par cachet : 0,020 de méthylarsinate de soude.

**Posologie.** — *Adultes :* 2 cachets.

*Enfants :* 1 cachet.

## CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

**Posologie.** — *Adultes :* 2 cachets.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## CERINIL

Neutro-toxine des Terres Rares.

**Composition.** — Chlorure de cérium, chlorure de sodium, bromure de radium (traces), eau bidistillée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agglutine le B. de Koch, neutralise les toxines, provoque l'oxydase permanente du sang. Augmente dans des proportions considérables le pouvoir défensif de l'organisme.

**Indications.** — Tuberculoses : pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, cutanée, Pré-tuberculose. Anémie, scrofule, chlorose.

**Posologie.** — Voie buccale, dose progressive de VI à XXX gouttes par jour avant les repas.

**Prix :** 36 fr. 50 le flacon de 40 cc. environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1201-5.

**Laboratoires DECHATRE-LEBAS, Ph<sup>1er</sup>**

11, rue de Flandre, Paris-19<sup>e</sup> (Nord 59-64).

## CÉTHOCAL

Formules du Dr LEMAY, pour l'emploi d'un complexe Cerium-Thorium-Calcium, dans le traitement des dermatoses.

### POUDRE ET PÂTE CÉTHOCAL

Dermatoses, Eczémas, Lupus, etc.

Hygiène des Bébés et de la peau.

*Incolores, Inodores et sans Corps Gras.*

### GOUTTES CÉTHOCAL

Adjuvant interne de tout traitement des dermatoses. XV à XX gouttes au début des repas.

### AMPOULES CÉTHOCAL

Psoriasis, Désensibilisation, Asthmes, etc.

### OVULES CÉTHOCAL

Ulcérations du Col, Métrites.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## CHARBONS FRAUDIN

**Composition.** — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés doués d'un grand pouvoir absorbant, avec :  
1° le Naphtol B.

### CHARBON FRAUDIN NAPHTOLÉ

Granulés sphériques aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme, contenant 0 gr. 10 de Naphtol B par cuiller à café.

Pouvoir désinfectant considérable.

**Indications thérapeutiques.** — Gastro-entérites, Grippe intestinale, Intoxications de toute nature.

2° la Belladone.

### CHARBON FRAUDIN BELLADONÉ

Granulés vermicellés fondants aromatisés à la menthe, contenant un centigramme d'extrait mou de Belladone Codex par cuiller à café. Sédatif, Antispasmodique, Modérateur des sécrétions.

Toutes les indications de la Belladone. Particulièrement dans les troubles intestinaux toxi-infectieux avec constipation. Tolérance absolue.

3° Sans principe médicamenteux.

### CHARBON FRAUDIN SIMPLE

**Granulés :** D'un grand pouvoir absorbant, contiennent 3 grammes de charbon végétal par cuiller à café. Aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme.

**Indications thérapeutiques.** — Dyspepsies flatulentes, Aérophagie.

**Comprimés :** 0 gr. 75 de charbon sans sucre par comprimé. Recommandé aux diabétiques.

### Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).  
(Tél. : Molitor 02-62.)

## CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

Trois formes :

Anisés simples — Anisés Naphtolés — Anisés Magnésiens.

**Forme.** — Granulé sphérique de charbon de peuplier aggloméré au gluten aromatisé à l'anis. La forme naphtolée est obtenue par une très légère addition de benzoate de naphtol. La forme granulée est la meilleure au point de vue administration et est en même temps la plus agréable.

**Indications.** — Dyspepsie, gastralgie, flatulence, digestions difficiles, embarras et fermentations intestinales.

**Dose.** — 1 cuillerée à café après chaque repas ou le soir en se couchant. Avaler comme des graines de lin, avec une gorgée d'eau ou de tisane. Peut être ordonné à tous les âges et dans tous les états.

### Laboratoires du Docteur G. TISSOT

C. COMBE, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS.

(Tél. : Montmartre 01-91.)

## CHARBON VEHEM

FORMO-NAPHTOLÉ

Charbon suractif.....	70
Naphtol B.....	0,50
Hexaméthylènetétramine.....	1,50
Phosphate de chaux.....	3
Sucre et excipient.....	Q. S. pour 100

**Mode d'action.** — Antiséptique gastro-intestinal, agissant par adsorption et absorption par le charbon suractif, chimiquement par le naphtol B et l'hexaméthylènetétramine.

**Avantages.** — Ne constipe, pas grâce à l'hexaméthylènetétramine et au naphtol B, qui provoquent une chasse biliaire importante.

**Indications.** — Gastro-entérites, diarrhées, fermentations et putréfactions intestinales, fétidité de l'haleine, ballonnements, flatulences, aérophagie.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Un tiers ou demi-dose chez les enfants.

Prix : 22 francs.

### Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en Pharmacie

33, rue Capitaine-Ferber — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : Ménil 52-83.)

## CHARCOLINA

*Médication cholagogue et anti-anaphylactique.*

**Composition.** — Peptone de poisson et de fibrine :  $\text{à}$  0,01 ; Peptone de viande : 0,05 ; Extrait mou de *Cynara scolymus* : 0,02 ; Hyposulfite de magnésium : 0,02 ; Benzoate de soude : 0,20 ; Charbon animal : 0,05 ; pour un comprimé.

**Action thérapeutique.** — Active la sécrétion biliaire, provoque le drainage de la vésicule, régularise la fonction hépatique.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, ictère, lithiase biliaire, cholécystites, manifestations anaphylactiques.

**Posologie.** — 4 à 6 compr. par jour, le matin à jeun, 1/2 heure avant le repas. — *Adolescents* : de 1 à 3 compr. par jour. — *Enfants* (à partir de 2 ans) : 1 compr. par jour, ou tous les 2 jours. Cure d'une semaine, à renouveler chaque mois si nécessaire. CHARCOLINA ne doit être employé que prudemment au début des cholécystites aiguës, en cas de diarrhée et chez les lithiasiques en imminence de crise aiguë ou en relevant.

Prix : 17 fr. 30 le flacon de 30 comprimés dragéifiés.

**Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETREFA »**

Administr. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## CHELICYNE

*Médicament des Troubles hépato-vésiculaires.*

### Composition :

Borate de soude.....	2 gr.
Chelidoïne, Ext. fl.....	5 —
Combretum, Ext. fl.....	15 —
<i>Cynara scolymus</i> , Ext. fl.....	15 —
<i>Ononis Spinosa</i> , Ext. fl.....	15 —
Excip. Glycériné aromatisé.....	Q. S. P. 100 cc.

**Indications.** — Toutes les maladies du Foie et de la Vésicule : Hépatites, Insuffisance hépatique, Diabètes, Cirrhoses avec ou sans ascite, Anasarque, Lithiase biliaire, Angiocholécystites, Ictères, etc...

**Forme.** — Solution concentrée. Le flacon : 125 cc. environ : 21 fr. 95.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans une infusion chaude (fumeterre de préférence), à prendre 3 fois par jour, avant les repas matin, midi et soir, ou deux heures après.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Dépôt général :

**Laboratoires BORDELAIS,**  
47, rue Maleret — BORDEAUX.

## CHÉLOÏDINE

Pommade résolutive et calmante  
à base de Thiosinamine, salicylate de soude  
et chlorhydrate d'amylène.

Dépourvue de toute toxicité.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

**Mode d'emploi.** — Deux fois par jour, appliquer gros comme une noisette sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 14-12.)

## CHÉNANTHOL

Essence pure américaine de Chénopode, en capsules, réalisant toutes les conditions établies par les travaux de l'Institution Rockefeller : 1<sup>o</sup> gélatine dure ; 2<sup>o</sup> dosage en volume et non en poids (1/4 de cc. par capsule) ; 3<sup>o</sup> essence de Chénopode hors de pair, d'origine constante, contrôlée et redistillée.

**Indications.** — Vers intestinaux : Ascaris, ankylostomes, oxyures, tricocephales, etc.

**Posologie et mode d'emploi.** — Ordonner une capsule par trois années d'âge. Maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purgé saline une heure et demie après la dernière. Pas de régime préparatoire. *Diète absolue* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge. Renouveler le traitement au bout de 10 jours, si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 21 fr. 10.

N<sup>o</sup> d'enregistrement au L. N. C. M. : 298-2.

**Laboratoire L. HINGLAIS**  
ÉPERNAY (Marne).



## CHIBROMERCUROBROME

Dérivé Bromé de la Fluorescéine Mercurique. Puissant antiseptique (50 fois plus que l'Argrol à 5 p. 100).

Pour l'Ophtalmologie :

En pommade, à 1 p. 100.

En collyre, à 1 p. 100 (adultes) (en instillations ou en biquotidiennes).  
En collyre, à 1 p. 100 (nouveau-nés) (deux gouttes dans l'œil de l'enfant à la naissance).

Pour Chirurgie :

En solution, à 2 p. 100 aqueuse et alcoolisée (flacon de 30 grammes) (pour badigeonnages, comme puissant désinfectant du champ opératoire).  
Pour plaies infectées, plaies suppurées (abcès, furoncle, flegmon, anthrax). Pour les lavages chirurgicaux, diminuer plus ou moins la dose d'eau.

Pour Gynécologie :

En solution, 2 p. 100 pour désinfection préventive de l'accouchement, badigeonnage externe et interne, ovules, ampoules, collyre pour nouveau-nés.

Pour médecine générale

Examen dans toutes les maladies des femmes, en badigeonnage.

Solution 2 %, flacon de 30 grammes. Ovules, boîte de 6.

En injections vaginales par ampoules, 1 % 1 cc., boîte de 12.

Maladies des voies urinaires, pour hémorragies, en désinfection du canal de l'urètre. Solution 2 %, 1 cc. et 5 cc.

En ampoules injectables 1 cc. 1 p. 100, par voie veineuse, pour infections généralisées, Septicémie, etc.

En colliroie pour gorge et oreilles.

En pommade pour dermatologie.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 1471-1 à 1471-6.

Laboratoire H. CHIBRET, 5, rue St-Hérem, Clermont-Fd (P.-de-F.)  
Voir à Collyres CHIBRET et à Pommades CHIBRET.

## CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Toni-sédatif nervin d'innocuité longuement éprouvée.

Ni accoutumance, ni anaphylaxie.

Aucun des inconvénients des uréides, barbituriques et opiacés.

Activité, même à doses faibles, grâce à la synergie.  
Tous les mérites des médicaments présentés à l'état liquide.

Composition :

Solution saccharosée représentant 0 gr. 40 chloral, 0 gr. 60 bromure par cuiller à soupe, en milieu dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas les muqueuses (procédé du Dr Dubois), extemporanément non réalisable.

Posologie :

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à soupe ou à café suivant l'âge.  
Névralgies, névroses, psychoses, malaises des hypertendus, tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux : chorée, épilepsie, coqueluche, dysménorrhée, etc. : 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café selon l'âge, dans les 24 heures.

Prix : Flacon, grand modèle, 28 fr. 80 ;  
petit modèle, 17 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-3.

DURIEZ, 20, place des Vosges — PARIS.

## CHLORALOSANE

( $\alpha$ -Chloralose pur, exempt de parachloralose.)

Propriétés. — Hypnotique non toxique, inaltérable. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Pas d'action nocive sur le cœur, le rein, les voies digestives. Peut être prescrit aux femmes pendant la grossesse, aux vieillards, aux enfants.

Indications. — Insomnies nerveuses, de fatigue, de surmenage. Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques, des neurasthéniques.

Auxiliaire des anesthésies générales. Adjuvant aux cures de désintoxication (alcoolisme, morphinomanie).

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant le coucher et au moins 1 heure 1/2 après le repas. Avant l'anesthésie générale : 2 comprimés la veille, ou 2 heures avant à la place de la piqure de morphine-scopolamine. Après l'opération : 2 comprimés.

Présentation : Flacon de 20 comprimés à 0 gr. 15.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des É<sup>ts</sup> KUHLMANN

8. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin, PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Service commercial :

15, rue de La Baume - PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Élys. 99-51.)

## CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine.

Forme. — Pilules à enrobage de gluten, inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T, 0 gr. 05 ; Charbon de peuplier pulvérisé, 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent réellement de réaliser la désinfection de l'intestin (Fétilidité des selles, etc.), sans porter atteinte à aucune de ses fonctions digestives.

Posologie. — États chroniques : 4 à 8 pilules pro die, aux repas.

États aigus : le 1<sup>er</sup> jour : 12 pilules en 3 fois.

le 2<sup>e</sup> jour : 9 — —

le 3<sup>e</sup> jour : 6 — —

les jours suivants : 3 — —

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

## CHLORAMMONIC

0 gr. 50 de chlorure d'ammonium par dragée glutinisée.

Seule forme pratique du plus énergique acidifiant.

### Indications. — Toutes alcaloses.

Collibacillose, Infections urinaires, Lithiases rénales, Phosphaturie, Arthritisme, Rhumatismes diathésiques, Asthénies, Insomnies, Convulsions, Epilepsie, Tics, Psychonévroses anxieuses, Mélancoïe, Dermatoses, Asthme, etc.

Évite les accidents d'alcalose des régimes végétariens ou des restrictions alimentaires hypocaloriques. Permet de réduire aisément une ALCALOSE, sans recourir à un régime céto-gène souvent irréalisable. Par son acidification, renforce l'action de certains médicaments, comme le Novurit, etc.

3 à 4 dragées à chacun des trois principaux repas.

Enfants : 1 à 6 dragées par jour, selon l'âge.

*Avaler les dragées sans sucer ni croquer.*

Boîtes de 50 dragées.

### Laboratoire M. LEFEBVRE

25, boulevard de La Tour-Maubourg — Paris (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 60-77.)

## CHLORANGIL

Traitement interne des angines.

**Composition.** — Solution stabilisée de chlorate de potassium chimiquement pur, titrée à 0 gr. 60 par cuillerée à soupe.

**Propriétés.** — Élimination extrêmement rapide (quelques minutes) au niveau des glandes salivaires et de la muqueuse bucco-pharyngée, et, par voie de conséquence, désinfection locale énergique.

Exaltation du pouvoir anti-infectieux de l'organisme par libération d'oxygène, absorbé par les hématies.

**Présentation et avantages.** — Solution inaltérable en flacon de 125 cc. suffisant pour un traitement d'attaque.

**Indications.** — Angines aiguës, érythémateuses, pultacées, herpétiques; laryngites, pharyngites.

**Posologie.** — Adultes : Traitement d'attaque : une cuillerée à soupe de Chlorangil tous les quarts d'heure pendant la première heure. Ensuite, une cuillerée à soupe toutes les deux heures, loin des repas, jusqu'à nette amélioration des symptômes locaux et généraux.

Les deux jours suivants, prendre 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures. Enfants de 1 à 5 ans : remplacer la cuillerée à soupe par la cuillerée à café.

Enfants de 5 à 12 ans : remplacer la cuillerée à café par la cuillerée à dessert.

**Dose préventive.** — Une seule cuillerée le soir au coucher.

Laboratoires du COMPTOIR GÉNÉRAL PHARMACEUTIQUE  
J. MAUNAND, Docteur en Pharmacie,

146, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 15-85.)

## CHLORÉTHYLE BENGUÉ

**Composition.** — Chlorure d'éthyle pur.

**Propriétés et indications.** — Anesthésie locale, névralgies, art dentaire, anesthésie générale.

**Formes.** — Flacons verre : 10 gr., à vis ; 15, 30, 50 gr., à vis et à clapet.

Fermeture à clapet très pratique. — Flacons métal : 50 et 100 gr. fermeture à vis et à clapet ; appareils automatiques pour l'art dentaire.

— Appareils jets variables, capillaires et pulvérisateurs. — Bidons de remplissage 500 gr., 1 et 2 kg.

**Anestile Bengué.** — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°. Anesthésies locales, névralgies.

**Narcotile Bengué.** — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale. Flacons verre 50 gr. gradués, à gros jet, fermeture à clapet. Ampoules scellées de 1, 2, 3 et 5 cc., pour anesthésies générales.

**Chlorure de méthyle pur.** — Siphons de 250 gr., 500 gr. et 1 kg. Utilisation par pulvérisations au jet.

**Indications.** — Sciatiques rebelles. Lumbagos rebelles, Douleurs ataxiques.

**Particularité.** — Liquides inflammables.

**Prix.** — Suivant nature des récipients.

L. N. C. M., n° 516-1.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,

Pharmaciens,

16, rue Ballu, PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 85-60.)

## CHLORICAL

**Forme.** — Solution aromatisée au suc de fruits.

**Composition.** — Solution titrée de façon que LXXXVIII gouttes (1/2 cuillerée à café) correspondent à 1 gr. de chlorure de calcium cristallisé chimiquement pur, stabilisé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hémostatique, Déchlorurant, Recalcifiant.

**Indications.** — Traitement préventif des Hémorragies post-opératoires, Epistaxis, Hémoptysies, Hématémèses, toutes Hémorragies (pulmonaires, capillaires, cérébrales, etc.), Métorrhagies, Œdèmes, Néphrites, Pleurésies, Albuminuries, Tuberculoses, Grossesses, Allaitement, Croissance, Caries dentaires, Accidents sériques.

**Mode d'emploi.** — Aux repas, dans un peu d'eau sucrée. Enfants au-dessous de 12 ans : V gouttes par année d'âge.

Adultes : de LX gouttes à 2 cuillerées à café et demie. Suspendre la médication pendant 8 jours après traitement de 3 semaines.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS

## CHLORIDIA

Pepsine — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

**Indications.** — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

**Forme et dose.** — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, quel'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Prix : 21 fr. 50

L. N. C. n° 437-1

**Laboratoires des PRODUITS DANNEO'H  
MARTINEAU, Pharmacien.**

64, rue des Tournelles — PARIS (11<sup>e</sup>). Tél. : Arch. 87-44.

R. du C. Seine 218-670.

## CHLORYPEPSINE

Comprimés.

**Combinaison stable de HCl « ionisé » et pepsine.**

**Formule.** — Chaque comprimé correspond à

HCl dilué officinal.....	VIII gouttes.
Pepsine titre 100.....	0 gr. 25

**Action physiologique.** — La Chloripepsine agit selon le moment de son absorption :

*Avant ou au début du repas :* stimule la sécrétion gastrique (HCl libre), complète et assure la digestion pepsique (HCl + pepsine), régularise le réflexe pylorique, agit sur les fermentations.

*Après le repas, dans l'hyperchlorhydrie,* son HCl libre déclenche une sécrétion de mucine qui protège la muqueuse et supprime la sensation de brûlures.

**Indications thérapeutiques.** — Insuffisances gastriques, Dyspepsies hypopeptiques, Hypo et anachlorhydrie, Pyrosis, Fermentations.

**Posologie.** — *Adultes :* de 1/2 à 3 comprimés généralement avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou coupée de vin.

*Nourrissons :* commencer par 1/2 comprimé.

Prix. Le tube de 22 comprimés : 17 fr. 20.

**Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN**

110, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Auteuil 03-04.)

## CHLORO-CALCION

**Forme :** Solution.

**Composition :**

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr.  $\text{CaCl}^a$ .

**Indications :**

*Recalcifiant :* Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

*Hémostatique :* Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

*Diurétique déchlorurant :* Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite, Œdèmes.

**Mode d'emploi et Doses :**

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

*Chez les enfants* au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;

L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

*Chez les adultes :*

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique*

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

**Laboratoires MICHELS**

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

## CHLORO-MAGNÉSION

**Composition.** — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes — 1 gr. 20  $MgCl^2$  — 0 gr. 50  $CaCl^2$ .

**Indications.** — Asthénie, Régularisation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillomes, Cancer), Tremblements.

**Emploi.** — Dix jours sur quinze :

*Adultes* : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

*Enfants* : 3 fois V gouttes.

*Nourrissons* : 3 fois III gouttes.

**Accidents Sériques.** — **Urticaires** : G gouttes en 4 ou 5 fois dans la journée pendant 3 à 5 jours.

*Enfants* : LX gouttes.

Enreg. au L. N. C. n° 27-1.

Prix : 17 fr. 10.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS. (Tél. : Roq. 49-22.)

**DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,  
Docteur en Pharmacie.**

## CHLOROSANE

(Dragées.)

Reconstituant sanguin. Association de composés organo-métalliques sous leurs formes les plus assimilables permettant à l'organisme de fixer les éléments plastiques et dynamiques nécessaires à la reconstitution de l'hémoglobine et des nucléo-protéides cellulaires.

**Principes actifs.** — Arséniate de fer, Phosphure de zinc, Phosphate de Manganèse, Glycérophosphate de Manganèse, Glycérophosphate de calcium, Iode.

**Indications.** — Tous les états anémiques, Chloro-anémies, Leucémies, Convalescence, Surmenage.

**Posologie.** — Avaler sans les croquer, deux fois par jour au moment des repas, 2 à 4 dragées (soit 4 à 8 par 24 heures).

*Enfant* : 1/2 dose.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

(Tél. : 31-10 et 42-06).

## CHLORUMAGÈNE

Formule du Dr Martin du Thell.

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Hydroxyde de magnésium pur Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

**Propriétés.** — Au contact du suc gastrique formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène (fluorure, bromure, iodure); de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.  
**Indications.** — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

**Doses habituelles.** — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

L. C. M. n° 563.

**Laboratoires LAOMBE et Oie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

## CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

**Comprimés glutinisés.**

**Composition.** — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

**Indications.** — Acidifiant urinaire énergétique, antilithiasique, adjuvant de la vaccinothérapie anticolibacillaire dans les manifestations urinaires.

**Posologie.** — 8 à 10 comprimés par jour. Avaler sans croquer à chacun des repas.

Prix du flacon : 18 fr. 85.

**LABORATOIRE D'ANALYSES  
BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

## CHOCOCHAUX

**Recalcifiant, Hémostatique.**

**Composition.** — Gluconate de Calcium enrobé dans un mélange de cacao et sucre.

**Présentation.** — Tablette de 16 divisions. Chaque division contient 1 gr. 50 de gluconate de calcium.

**Indications.** — Toutes les déficiences calciques de l'enfant et de l'adulte.

Médication adjuvante de la cure antinéoplasique par le Barcan.

**Posologie.** — 1 à 4 divisions par jour.

**Prix.** — Tablette de 16 divisions : 20 fr. 50.

**Laboratoires M. BORNE**

Fournisseurs des Hôpitaux, des Ministères des Colonies et de la Marine.

24, rue des Ursulines, à SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

## CHOCYNOL

**Comprimés chologogues et cholérétiques atoxiques.**

Association des extraits stabilisés d'Artichaut et de Boldo aux Extraits Biliaire purifié et Extrait Hépatique total : 5 centigrammes de chaque par comprimé glutinisé et dragéifié.

**Indications.** — Toutes insuffisances hépatiques. Troubles circulatoires s'y rattachant. Insuffisance cardiaque, Hypertension, Cirrhoses infectieuses, toxiques, etc.

**Troubles biliaires.** — Lithiases, Ictères, Coliques hépatiques, Prurits, Migraines, Asthmes, etc. Auto-intoxications, Arthritisme, Dyspepsie d'origine hépatique, Paludisme, Foie des Coloniaux.

**Présentation médicale.** — La boîte (48 comprimés glutinisés) : 20 fr. 70 (Soit 8 à 12 jours de traitement.)

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour répartis aux repas. Aucune toxicité.

Prix : 20 fr. 70. Arrêté n° 2099 du 3 février 1942.

**Laboratoires G. Jean HUYGHE**

4, boulevard de Port-Royal — PARIS (V°).

(Téléphone : PORT-Royal 21-34.)

Chez tous Droguistes habituels.

## CHOLAGOL

Insuffisance Hépatointestinale.

**Présentation.** — Granulé fondant d'un goût agréable (Cholagogue antiseptique et antitoxique).

**Formule :**

Calomel.....	0,05
Peptone de Witte.....	5,50
Sulfate de magnésie desséché.....	25 gr.

**Indications.** — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une exonération intestinale plus complète.

Ictères, Subictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépatointestino-rénale, Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

**Posologie.** — Une cuillerée à café, à dessert ou à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Prix : 22 fr. 60.

**Laboratoire REBOUL**

A. DELAUNEY, Pharmacien,

Ex-interne des Hôpitaux de Paris, Docteur en médecine,  
62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

(Tél.: Italie 12-24.)

## CHOLAL

Ampoules buvables.

**Traitement causal de la Lithiase biliaire. Préventif et curatif**

La Lithiase biliaire est provoquée par la floculation et la coagulation de la mucine, entraînant ensuite la cristallisation de la cholestérine. La cause déterminante de ce phénomène réside dans une tendance acidosique de l'ambiance hépatobiliaire.

**Composition et mode d'action.** — Les complexes ioniques minéraux de Cholal sont de vrais proto-colloïdes qui, par catalyse, corrigent le déséquilibre acido-basique par action sur le terrain humoral et tissulaire, et ramènent l'ambiance hépatobiliaire à la faible alcalose physiologique ; leur mécanisme d'action peut se comparer, par certains points, à celui d'une eau minérale prise à la source.

Sous cette action, l'ambiance, redevenue physiologique, s'oppose à la formation de concrétions nouvelles ; en même temps, on constate que les calculs existants se désagrègent lentement et sont ensuite éliminés. A la différence des cholagogues ou des cholérétiques habituels, Cholal est un modificateur du terrain et constitue de ce fait le traitement causal de la lithiase biliaire, aussi bien préventif que curatif.

**Indications.** — *Lithiase biliaire* : Congestion du foie. Coliques hépatiques. Ictère. Constipation d'origine hépatique. Troubles hépatobiliaires, etc...

**Posologie.** — L'efficacité de Cholal se traduit toujours dès la première quinzaine par différents symptômes qui rendent son traitement facile en clientèle (bien-être remarquable, éclaircissement du teint, atténuation et disparition des divers troubles).

Bien entendu, pour être vraiment curatif, ce traitement devra être prolongé. En pratique, la posologie optimale devra prévoir :

### 1° Traitement d'attaque :

a. *Cas général* : durant un mois au minimum, une ampoule Cholal par jour à prendre le matin à jeun dans un verre d'eau une demi-heure environ avant toute ingestion.

Au besoin, ce traitement sera prolongé (pas d'accoutumance). Exiger la persévérance.

b. *Cas particuliers* : il est exceptionnel que le traitement normal ne soit pas toléré de façon absolument parfaite. Toutefois, si le médecin traitant juge préférable d'instaurer d'abord un traitement atténué, il lui suffira de prescrire un jour de Cholal pour deux ou trois jours de repos.

Le praticien pourra ainsi tâter la sensibilité du sujet, s'assurer par avance de son état exact et fixer ensuite, en toute connaissance de cause, le moment où le traitement normal pourra être entrepris.

### 2° Traitement d'entretien :

Par la suite, prescrire un traitement d'entretien, avec décades alternées de cure et de repos.

Après satisfaction confirmée, on conseillera (pour éviter les récidives) une cure de printemps et une cure d'automne comportant au début de ces saisons 2 ou 3 décades de Cholal séparées par des repos équivalents.

N. B. — Pas de régime spécial. Une alimentation variée est à conseiller. Toutefois, faire usage du vin avec modération, proscrire l'alcool et en général éviter tous excès.

Pas de contre-indications permanentes, ni intolérance, ni accoutumance. Le Cholal est inoffensif et sans saveur.

### Présentation et Prix de Vente.

Coffret Cholal 30 ampoules buvables (modèle normal) pour un mois de traitement..... 42 fr. 80  
Boîte Cholal 15 ampoules buvables (petit modèle)..... 25 fr. 70

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-3.

**Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL**  
G. BERTIN, Pharmacien, 95, rue de Prony — PARIS (XVII°).  
(Tél.: Carnot 03-80.)

## CHOLAXOL

### Formule :

Extrait de pissenlit .....	0 gr. 005
Extrait de bourdaine .....	0 gr. 01
Extrait de cochlearia de Bretagne...	0 gr. 005
Bile décholestérinée.....	0 gr. 01
Extrait de navet.....	0 gr. 005
Gomme gutte.....	0 gr. 0005
Extrait d'artichaut.....	0 gr. 020
Orthosiphon.....	0 gr. 05

Pour une pilule.

### Propriétés :

**Cholérétique. Décongestionnant. Cholagogue. Désensibilisant. Antianaphylactique. Diurétique.**

### Indications :

**1° Affections du foie et de la vésicule biliaire :**

Congestions hépatiques et vésiculaires.  
Cholécystites et lithiases biliaires, Ictères.

**2° Troubles digestifs et généraux d'origine hépatobiliaire :**

Inappétence. Nausées et Constipation.  
Céphalées et vertiges. Migraines.  
Certaines dermatoses (prurit).

**3° Au cours des traitements par les Sulfamides, le Bismuth ou l'Arsenic :**

Action préventive ou décongestive très marquée dans le cas d'accidents hépatiques.

**Aucune contre-indication.**

### Posologie :

Dose moyenne : 2 à 6 pilules par jour, aux repas, selon indications du médecin.

### Présentation :

Tube de 60 pilules.

**Laboratoires AXOS**

**André BOUNIOL, Pharmacien directeur**  
1 et 3, rue Sarrette — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

**Forme.** — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

**Indications.** — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

**Doses.** — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

**VINCENT, pharmacien**

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

## CHOLÉFLUINE

**Forme.** — Granulé soluble, agréable au goût.

### Composition :

Sulfate de magnésie .....	28 gr.
Peptone de viande.....	3 gr.
Peptone de poisson.....	3 gr.
Peptone dite de Witte.....	3 gr.
<b>Hyposulfite de soude</b> .....	4 gr.
Extrait de Boldo .....	2 gr. 50
Sucre parfumé. Q. S. P....	100 gr.

**Indications.** — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

**Contre-Indication** (temporaire). — Cholécystites aiguës.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

### Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

- 1° Peptone de viande.
- 2° Peptone dite de Witte.
- 3° Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, **Action antifloculente et anti-anaphylactique par Hyposulfite de soude.**

Prix : 22 fr. 50

**Laboratoires LECONTE**

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).  
(Tél. : Gut. 04-17.)

## CHOLÉFLUINE

**Forme.** — Comprimés.

### Composition :

Sulfate de magnésie.....	0,20
Peptone de viande.....	0,03
Peptone de poisson.....	0,03
Peptone dite de Witte.....	0,03
<b>Hyposulfite de soude</b> .....	0,05
Extrait sec de boldo .....	0,01
Extrait sec d'artichaut .....	0,02
Excipient.....	Q. S. pour 1 comprimé.

Mêmes composants que le granulé, avec, en plus, *extrait d'artichaut.*

**Mêmes indications.** — *Traitement d'entretien après traitement d'attaque par la Choléfluine granulée, anti-anaphylactique.*

**Posologie.** — 2 matin, midi et soir avant manger.  
*Pour diabétiques : 9 comprimés pris le matin 1/2 heure avant manger remplacent 2 cuillerées à café de Choléfluine granulée.*

Prix : 22 fr. 50.

**Laboratoires LECONTE**

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).  
(Tél. : Gut. 04-17.)

## CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf, capsules dosées à 0 gr. 20.

**Dose et mode d'emplol.** — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Opothérapie biliaire. *Cholagogue total* : Cholérétique « sécrétion » ; Cholécystokinétique « excrétion ».

**Indications.** — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Prix : 17 fr. 60 (10 à 15 jours de traitement).

**Laboratoires DARRASSE**

Rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)



## CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

**Indications.** — Congestion du foie, Lithiase, Cholécystite, Acholie, Ictères, Hépatites, Cirrhoses, Cholémie, Phénomènes gastro-intestinaux, Constipation, Colite muco-membraneuse, Arthritisme.

Prix : 17 fr. 60 (10 à 15 jours de traitement).

**Laboratoires DARRASSE**

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

## CHOLÉLYSE

Médicament spécifique et préventif de la Colique hépatique et de la Lithiase biliaire, à base d'acide oléique pur, qui contribue à l'équilibre colloïdal de la bile d'après les études du D<sup>r</sup> ARTAULT DE VEVEY.

**Mode d'emploi.** — La CHOLÉLYSE, en capsules dosées à 0,50 d'acide oléique pur, se prend à jeun pendant 10 jours par mois, par mesure préventive dans le cas de coliques mensuelles ou, en cas de crises, 2 à 3 capsules d'un coup, dose que l'on peut renouveler un peu plus tard.

Prix : 23 fr. 20.

Préparé par :

**J. CARBOU, Pharmacien**

8, rue Jean-du-Bellay — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 39-09.)

## CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

**Composition.** — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

**Propriétés.** — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique, Eupéptique, Antitoxique, Laxatif.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

**Dose.** — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : 14 fr. 70.

Flac. : 15 jours de traitement environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n<sup>o</sup> 339-9.

**Laboratoires OAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 12-63.)

## CHOLÉO-FLUASE

**Composition :**

Sulfate de magnésie desséché .....	28 gr.
Peptone purifiée .....	5 gr.
Charbon activé .....	2 gr.
Surrénine .....	1 gr. 6
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

**Forme.** — Granulé fondant.

**Indications.** — Agent cholagogue énergique. Traitement des troubles digestifs spéciaux d'origine hépatique. Migraines, vertiges, nausées, Urticaire, etc.

**Doses :**

1 à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau tiède ou une infusion, 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au L. N./C. M. sous le n<sup>o</sup> 1107-2.

**E. VERDON**

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

## CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

**Doses et mode d'emploi.** — 6 dragées par jour en 3 doses égales, à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

**Propriétés thérapeutiques.** — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

**Indications.** — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 22 fr. 40.

### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

## CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

**Forme :** Comprimés. Formule nouvelle avec Boldo total.

### Composition :

Extraits Biliaires.....	0,10
Pancréatine Extr.....	0,10
Entérokinase.....	0,03
Boldo total.....	0,035
Évonymine.....	0,012
Poudre de Charbon activé.....	0,02

Pour un comprimé.

### Dose :

**Adultes :** 4 à 6 par jour, 1/2 heure avant les repas.  
**Enfants :** 1/2 dose. Avaler sans croquer.

**Indications.** — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Dermatoses.

Prix : 17 fr. 50.

Échantillons sur demande.

**Laboratoires DAGUIN, à SAINT-MAUR (Seine).**  
(Tél. : Gravelle 32-17.)

## CHOLÉOLAX COLAS

**Association des trois Cholagogues vrais.**

**Forme.** — Granulés friables, aromatisés à la vanille, agréables au goût.

**Composition.** — Huile d'olive vierge, Sulfate de magnésie desséché, Peptones.

**Propriétés thérapeutiques.** — Draine la vésicule biliaire, Décongestionne le foie, Combat la constipation et les fermentations, sans irriter l'intestin.

**Indications.** — Infection et stase vésiculaires, Cholécystites aiguës et chroniques, Atonie de la vésicule, Hépatisme, Congestions actives et passives du foie, Constipation chronique et ses complications.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun pur ou dans un peu d'eau. *Enfants :* 1/2 doses.

Enregistré au L. N. C. M.

### Laboratoires Robert COLAS

Docteur en Pharmacie.

133, rue Lecourbe — PARIS.  
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

## CHOLÉOPEPTINE MARCEL LOGEAS

Le plus actif des Cholagogues.

**Présentation.** — Granulé soluble.

**Composition.** — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

**Propriétés.** — Augmente de plus de 50 % la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère, Herpès, Migraines rebelles, Urticaire, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le zona.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

### Posologie :

**Adultes :** 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau, 10 jours par mois.

Dans le zona : faire prendre en plus 1 cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

**Enfants :** de 1/2 à 1 cuillerée à café le matin à jeun.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS (V°).  
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## CHOLÉO-ZYMATINE LESCÈNE

**Composition.** — Peptones associées (Viande, Poisson, Lait, Œuf, Gluten), Formine et sels de magnésie à faible dose. Artichaut, Zymatine.

**Propriétés.** — Décongestionnant hépatique, Pansement intestinal, Cholagogue alcalin, Laxatif doux, Antilémétique, Antichoc.

*Action douce et non irritante.*

**Indications.** — Affections hépato-biliaires, Anaphylaxies, Dermatoses, Troubles du sympathique.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau (chaude de préférence) ou une cuillerée à café avant les repas.

Une boîte contient 8 jours de Traitement à 3 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires LESCÈNE**

58, rue de Vouillé — PARIS (XV<sup>e</sup>) (Tél.: Vaug. 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## CHOLÉRÈNE (comprimés)

*Médication cholagogue.*

*Drainage des voies biliaires.*

*Solubilisation du Cholestérol de la bile.*

**Formule.** — 1 comprimé *glutinisé* contient :

Extrait de boldo .....	0,01
Extrait de Romarin .....	0,02
Extrait d'Artichaut .....	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée .....	0,05
Oléate de soude .....	0,20

**Indications thérapeutiques.** — Insuffisance hépatique. Ictère catarrhal. Etats congestifs du foie. Coliques hépatiques. *Lithiase biliaire*. Cholécystites.

**Posologie.** — De 2 à 4 comprimés par jour avant les repas.

Cure d'entretien : 2 comprimés le matin à jeun.

La boîte de 45 comprimés : 21 fr. 80.

**Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél.: Auteuil 03-04.)

## CHOLERGINE

*Médication Antitoxique,*

*Colloïdes et Lipoides. Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.*

*Décret n° 75 du 4 août 1933.*

Soc. de Thérapeutique (1911-1912). — Académie de Médecine (1911). — Soc. Inter. de la Tuberculose (1911). — Académie des Sciences (1912). — Soc. de Biologie (1911). — Congrès de l'Ass. Fr. p<sup>r</sup> l'Av. des Sciences (1911). — Soc. de Pathologie Comparée (1913-1914), etc... Deux formules : Chologergine simple, Chologergine camphrée.

**Forme.** — Ampoules injectables de 2 cc.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection.  
Injecter lentement.

**Propriétés.** — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 32 fr. 80.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél.: Molitor 34-16.)

## CHOPHYTOL-Gouttes. CHOPHYTOL-Dragées.

Le *Chophytol* est à base d'extrait de *Cynara frais* (Artichaut), préparé s. l. f. G.-E. Rosa (100 cc. de gouttes ou 200 dragées correspondant à 2 kilos de suc de *Cynara frais*). Stimulant de la cellule hépatique et de l'épithélium rénal, il exerce des actions cholérétique et diurétique, et modifie le métabolisme du cholestérol et de l'urée.

### ACTIONS et indications :

- a. Action toni-hépatique et cholérétique : Toutes les insuffisances hépatiques aiguës ou chroniques, Hépatonéphrites et Hépatites diverses, Ictères, Cirrhoses à leur début, Congestions active et passive du foie, Surmenage hépatique des pléthoriques et des coloniaux, Excès de bonne chère, Angiocholites et Cholécystites, Urticaire et Accidents sériques, et dans tous les cas où une maladie générale ou des états diathésiques ont un retentissement ou une étiologie hépatiques.
- b. Action sur le métabolisme du Cholestérol, par augmentation du pouvoir cholestérolitique du sérum, avec mobilisation et élimination des déchets tissulaires cholestériniques : Polysclérose artérielle, Athéromes et Artérites, Hypercholestérolémies de l'âge mûr et de la vieillesse, Précipitations oculaires cutanées, ou autres, États diathésiques à pouvoir cholestérolitique négatif.
- c. Action diurétique : Oliguries des néphrites aiguës ou chroniques, Oliguries des maladies fébriles, des Congestions pulmonaires et de tous les états infectieux à retentissement rénal, Oliguries au cours des infiltrations séreuses et tissulaires d'origine cardiaque, rénale ou autre (Edèmes, Ascites, Pleurésies, etc...).  
Oliguries et anuries des intoxiqués, des brûlés, des infectés, des opérés.
- d. Action sur le métabolisme des corps azotés toxiques, avec transformation en urée et élimination : Insuffisance rénale aiguë ou chronique, Rétention azotée, Azotémie d'alarme de Vidal et états préurémiques, Constante d'Ambard élevée, Dysfonctionnement uréogénique d'origine médicale ou chirurgicale, Néphrose lipidique et certaines albuminuries.

### Quelques indications particulières :

En pédiatrie : Troubles digestifs (vomissements de type acétonémique, digestions difficiles) ou cutanés (Prurigo strophulus, Urticaire, Eczéma), en rapport avec l'insuffisance fonctionnelle du foie.

En chirurgie : Traitement pré- et post-opératoire des insuffisances hépatiques et des rénaux à Constante d'Ambard et azotémie élevées. Évite les inconvénients de l'hyperazotémie et de l'oligurie ou l'anurie secondaires aux interventions.

Enfin, au cours de manifestations anaphylactiques ou diathésiques générales, où le rôle d'une déficience hépatique peut être incriminé.

**Posologie.** — X gouttes correspondent à 1 dragée.  
*Adultes* : 60 à 120 gouttes par jour en 2 ou 3 fois aux repas dans un peu de liquide sucré ou non ; 6 à 12 dragées par jour dans les mêmes conditions. Cure de 10 à 20 jours par mois.

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose suivant l'âge. Les dragées peuvent être écrasées et mélangées aux aliments (purée, confitures). Il est préférable de donner des gouttes.

*Nourrissons* : X à XX gouttes par jour.

Étant donnée l'absence de toxicité, ces doses peuvent être augmentées et modifiées suivant l'acuité des symptômes.

### Présentation :

1/2 flacon, flacon et triple flacon.

Étui de 60 dragées et triple étui de 180 dragées.

N. B. — La richesse en principe actif du *Chophytol*, sous toutes ses formes, permet au praticien d'obtenir toujours une action rapide et constante.

Les formes perorales (dragées et gouttes) peuvent être utilisées soit isolément soit parallèlement à la forme injectable.

Spécialités légales de prescription exclusivement médicale.

### Laboratoires ROSA

« La Feuille fraîche d'Artichaut  
en Thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 09-63.)

## CHOPHYTOL-ROSA

Cristallisé injectable.

Boîtes de 6, 12 et 25 ampoules de 5 cc.

Médication préventive et curative de la Rétention azotée, de la Polysclérose et de l'Oligurie, à base du principe actif cristallisé de *Cynara fralis* (artichaut), isolé par G.-E. ROSA en 1933.

**Propriétés.** — a. Stimule la cellule hépatique ; b. Stimule l'épithélium rénal (active l'élimination uréique et la diurèse).

**Indications.** — Troubles hépato-rénaux :

- 1° Dysfonctionnement et Insuffisance hépatique : Hépatites subaiguës et chroniques, Cirrhoses au début, Foie cardiaque, Congestion du foie et Hépatisme, Foie colonial, Ictères, etc.
- 2° Surcharge cholestérinique des tissus : Polysclérose artérielle et Athéromes, Artérites, Hypercholestérimie, Xanthélasma, Troubles oculaires, etc.
- 3° Dysfonctionnement et insuffisance du rein : Oliguries diverses (maladies infectieuses), Néphrites aiguës infectieuses ou toxiques, Manifestations du brighisme, Azotémie « d'alarme », Néphrites hypertensives, Infiltrations séreuses (Œdèmes, Ascites, Pleurésies, etc.).
- 4° Traitement pré-opératoire et post-opératoire, particulièrement chez les Hépatiques, les Insuffisants rénaux à azotémie et Constante d'Ambard élevées (Adénomes prostatiques, Tuberculose et Lithiase rénales, Fibromes utérins et Kystes ovariens).
- 5° Manifestations anaphylactiques de l'insuffisance hépatique (Urticaire, Intolérance médicamenteuse, Eczémas, Dermatoses prurigineuses ou non). — Dialhèse neuro-arthritique. Sert de complément à l'auto-hémothérapie.
- 6° En Pédiatrie : Intolérances alimentaire et médicamenteuse, Prurigos simplex et Strophulus, Vomissements acétonémiques, Asthme.

**Posologie et mode d'emploi.** — Traitement moyen de 12 à 25 injections intraveineuses, intramusculaires profondes ou hypodermiques (légère sensibilité par cette voie), à raison d'une à deux piqûres tous les jours

ou tous les deux jours. Les ampoules se prennent également *per os* et peuvent aussi être administrées en goutte à goutte rectal. Cure complémentaire de dragées ou de gouttes de Chophytol ou de dragées de Cynurol. 1/2 dose ou dose entière chez les enfants suivant l'âge.

N. B. — Les premières injections s'accompagnent souvent d'une légère élévation de l'azotémie *sans gravité* ; ce phénomène ne doit pas surprendre, car il traduit la transformation, en un produit azoté d'élimination facile (l'urée), des substances azotées en rétention tissulaire. D'ailleurs, simultanément, la diurèse augmente, le pouvoir concentrateur du rein s'améliore et le débit uréique s'élève parallèlement, ce qui ramène rapidement la Constante d'Ambard et l'Azotémie vers la normale.

En ce qui concerne la cholestérinémie, les phénomènes sont absolument superposables. La preuve de l'amélioration du métabolisme cholestérinique est fournie par l'augmentation, dans des proportions considérables, du *pouvoir cholestérolitique* du sérum. De ce fait, il s'effectue une véritable « mobilisation » (hypercholestérinémie transitoire) de la cholestérine tissulaire en surcharge, dont l'élimination est ainsi facilitée (*hypcholestérinémie secondaire, en fin de cure*).

S'abstenir dans les cas de lésions rénales incurables médicalement (Tuberculose rénale bilatérale, Cancer, Néphrite chronique, azotémique et hypertensive ou oedémateuse à la période terminale, Anurie calculeuse). Le Chophytol injectable n'agit que si le foie est encore capable d'être stimulé et si le pouvoir concentrateur du rein permet l'élimination uréique. C'est en effet une médication de stimulation et non de remplacement.

Réf. Sc. : *Gaz. Hôpitaux*, Soc. de Thérap., Soc. méd. des Hôpitaux, *Presse médicale*, *Archives Méd. Enfants* ; D<sup>r</sup> Monville, *Thèse Paris*, 1934 ; D<sup>r</sup> Picart, *Thèse Paris*, 1935 ; D<sup>r</sup> Albrecht, *Thèse Paris*, 1937 ; D<sup>r</sup> Blouet, *Thèse Paris*, 1937, etc.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

**Laboratoires ROSA**

« La Feuille fraîche d'Artichaut en Thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 09-63.)

## CHRYSEMINE

(Pyréthrines Carteret.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

**Indications.** — I. — Tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, trichocéphales, ténias, lamblias, amibes, etc.).

II. — Traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire: diarrhées à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, troubles nerveux dus aux toxines vermineuses, etc.

**Formes.** — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*). (Équation d'équivalence: 1 perle = XL gouttes.)

**Administration.** — Les perles se prennent les unes après les autres dans une gorgée de liquide; les gouttes dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits ou avec des confitures.

**Posologie.** — *Ascaris, Trichocéphales, tous Helminthes, Amibes, Lamblias, tous Protozoaires.* — *Adultes*: 5 perles. — *Enfants*: L à CL gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos d'une semaine.

*Oxyures.* — *Adultes*: 5 perles. *Enfants*: L à CL gouttes, suivant l'âge. (XL gouttes pour un an, augmenter progressivement à raison de X gouttes par année d'âge.) A prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysemine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

*Ténias.* — *Adultes*: 12 perles. *Enfants*: 200 à 300 gouttes suivant l'âge. A prendre le matin à jeun pendant deux jours consécutifs. Diète hydrique la veille et régime alimentaire réduit les 2 jours de cure. Purgation saline ou huileuse le second jour, 3 heures après la dernière dose.

Prix de vente au public: *Perles*: 27 francs.

*Gouttes* PM.: 16 fr. 40. GM.: 27 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, r. d'Argenteuil — PARIS (10<sup>e</sup>). (Tél.: Opéra 43-79).

## CIBALGINE

Diallylmalonylurée

Diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone.

ANALGÉSIQUE SÉDATIF.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif sans opium, sans aucune substance du tableau B. Atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

**Indications.** — Toutes les algies: Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciatique, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace aussi dans les douleurs dysménorrhéiques.

*Comprimés — Gouttes — Ampoules.*

**Doses.** — 1 à 4 comprimés, XX à C gouttes, 1 à 2 ampoules par 24 heures.

**Formuler.** — Flacon de 15 comprimés.

Flacon (gouttes).

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél.: Moncey 43-26.)

## CIMICIFUGA

### TROUETTE-PERRET

Teinture glycéro-alcoolique de  
« *Cimicifuga Racemosa* ».

(Dose: 2 gr. de plantes par 100 gr.).

**Indications.** — Action antispasmodique, antalgique et sédatrice dans tous les cas d'Hypertension artérielle et particulièrement dans les Bourdonnements d'oreilles.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix: 21 fr. 20.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél.: Roquette 87-34.)

## CINARASCOL

**Forme.** — A. Gouttes ; B. Pilules.

**Composition.** — Extrait fluide spécial de feuilles fraîches de Cynara Scolymus (artichaut) soluble, épuré, hyperconcentré (procédé du professeur Quirin et Dagonnot). XL gouttes = 1 pilule = 0 gr. 35 de cet extrait.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, lithiase biliaire, hépatite, cholécystite, ictère, hypercholestérinémie, dermatose, arthritisme, urémie.

**Drainage hépatique et rénal d'innocuité absolue.**

**Doses.** — A. Gouttes : XL à CXX gouttes (1 à 3 fois le contenu du compte-gouttes joint).

B. Pilules : 1 à 3 pilules à la fin de chacun des deux repas.

**Prix** : Pilules : 22 fr. 60. Gouttes : 24 fr. 40.

Chaque boîte pour une durée de 20 à 30 jours.

Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Laboratoires **DAGONNOT**  
CANNES.

## CINASCOL

Toutes affections du Foie et de l'Intestin.

**Composition.** — Pour 1 dragée :

Extrait de Bucchu ..... 0,03

Extrait de Boldo ..... 0,03

Ext. Scolym. Cinara sec ..... 0,07

Evonymine ..... 0,02

Bile dépigmentée et décholestérinée ... 0,07

Oléate de sodium ..... 0,07

**Forme.** — Dragée à noyau mou glutinisée.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, constipation, cholécystite, Entéro-colite muco-membraneuse, ictères, intoxications.

**Doses.** — 2 à 4 dragées par jour. Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Prix : 19 fr. 40.

Enregistré au L. N. de C. sous le n° 1081-1.

**G. BAETZ, Pharmacien.**  
**CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).**

(Tél. : 21.)

## CINEYL

**Composition.** — Association de silicate de calcium, magnésium, fer, manganèse et codéine.

**Indications.** — Médicament de défense antibacillaire, Affections pulmonaires chroniques, Bronchites récidivantes, Toux, Grippe.

**Présentation.** — Comprimés.

**Posologie.** — 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires **GRYSA**

**A. BOULANGER, Pharmacien**  
7, rue Saint-André — LE MANS.

## CINNOZYL

**Composition.** — Solution huileuse de :

Cinnamate de benzyle .....	0 gr. 05.
Cholestérine pure .....	0 gr. 10
Camphre .....	0 gr. 125
Huile d'olive pure .....	5 cc.

Pour une ampoule.

**Propriétés.** — Par les actions biochimiques de ses constituants, augmente la cholestérinémie et la résistance aux infections, notamment à l'infection tuberculeuse.

**Indications.** — Toutes les déficiences organiques, asthénies, anémies, convalescences.

Médication adjuvante dans tuberculoses pulmonaires, chirurgicales et extra-pulmonaires.  
Prétuberculeuse.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores : 5 à 10 cc. quotidiennement ; séries de 20 à 25 injections suivies de 15 jours de repos (enfants : 5 cc. tous les 2 jours).

Laboratoires **CLIN, COMAR et Cie**  
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V°)

## CINQUÉSINE HOUDÉ

Association Yohimbine-Hydrocinchonidine.

**Propriétés.** — Unit l'action sympatholytique, vasodilatatrice et hypotensive de la yohimbine à celle, toute semblable et bien démontrée par des expériences récentes, de l'hydrocinchonidine, un alcaloïde secondaire dérivé du quinquina, ces deux actions se renforçant mutuellement (R. HAMET).

**Indications.** — Hypertension en général, mais surtout hypertension essentielle. Amélioration rapide et durable des signes subjectifs.

**Présentation.** — Le granule de Cinquésine Houdé est composé de 4 milligrammes de chlorhydrate de yohimbine et de 8 milligrammes de chlorhydrate d'hydrocinchonidine.

**Posologie.** — 4 à 6 granules par jour, en 3 ou 4 fois (avant les repas), pendant 15 à 20 jours par mois.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 40-58. )

## CIPROMAROL

**Composition.** — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

**Indications.** — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

**Mode d'emploi.** — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

Prix : 14 fr. 90

**LANDRIN et C<sup>ie</sup>**

12, rue de la République  
PUTEAUX (Seine).

## CIRVOSE

**Forme pharmaceutique et composition.** — Comprimés à base d'extraits végétaux (marron d'Inde, berberis, piscidia, cyprès, hamamelis), d'extraits organiques (hypophyse, surrénale, thyroïde), de citrate de soude, et phényléthylmalonylurée.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur énergique, tonique et régulateur du système veineux et du système artériel collatéral, modificateur de la nutrition générale, fluidifiant du liquide sanguin et sédatif doux.

**Indications.** — Traitement des troubles de la circulation (bouffées de chaleur, lourdeurs de tête, troubles congestifs, fourmillements et refroidissements des extrémités, sensation de doigts morts, crampes, engelures, etc.). Retour d'âge chez la femme. Affections veineuses (varices, hémorroïdes, phlébites, accidents de la puberté et de la ménopause). Hypertension et hyperviscosité sanguine.

**Présentation.** — Boîte de 50 comprimés.

**Posologie.** — 2 à 3 comprimés avant les deux principaux repas. (Pour la femme, cesser 5 à 10 jours par mois au moment des règles.)

**Prescription.** — 1 boîte de comprimés *Cirvose Falvy*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Pharmacien licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 18-26.)

## CITRALIN

Granulé entièrement soluble.

**Composition :**

Sulfate de magnésie .....	21 gr. 40
Citrate de soude trisodique .....	18 gr. 60
Boldine .....	0 gr. 006
Excipient .....	Q. S. pour 100 gr.

Contenance de l'étui : 110 gr.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-8.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

**Indications.** — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats plethoriques, Pneumonie.

**Forme et mode d'emploi.** — Granulé : 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des repas.

Prix : 20 francs.

**Laboratoire JUIN-GUIRAUD**

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 94-28.)



## CITRA-QUINT

Granulé anticoquelucheux soluble.

### Formule :

Citrate de soude.....	8 gr.
Bromure de sodium.....	6 gr.
Extrait de drosera Dausse.....	0 gr. 08
Extrait de grindelia Dausse.....	0 gr. 04
Extrait de thym Dausse.....	0 gr. 025
Excipient.....	Q. S. p. 100 gr. de saccharure.

**Action.** — Antivomitif puissant, sédatif des quintes. Antiseptique bronchique.

**Indications.** — Coqueluche. Toux férine de la rougeole. Toux spasmodiques. Toux émetisantes.

**Mode d'emploi.** — 6 mois à 1 an : une demi-cuillerée à café 4 fois par jour.

A 4 ans : 1 cuillerée à café 6 fois par jour.

A 15 ans : 1 cuillerée à dessert 6 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. : sous le n° 1636-1.

**Laboratoires du CITRA-QUINT.**

**J. CORTEEL, pharmacien.**

74, rue de La Fère, SAINT-QUENTIN (Aisne).  
(Tél.: 37-29.)

## CITRATÆGUS

(Dragées).

**Composition.** — Citrate de Soude Mono et Trisodique, Citrægus, Hamamelis Virginica, teinture de Teskra, Viburnum Prunifolium.

**Indications.** — Hypertension, Etats congestifs, Insuffisances veineuses, Troubles de la circulation du sang.

**Avantages.** — Fluidificateur du sang, décongestif et tonique veineux, le *Citrægus* est également un cholagogue léger et un eupéptique. Toléré par les estomacs les plus délicats, il facilite même la digestion.

**Posologie.** — 1 à 2 dragées à chaque repas du matin, du midi et du soir, 20 jours par mois.

Prix : 23 fr. 50

**Laboratoire REBOUL**

A. DELAUNEY, Pharmacien,  
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,

Docteur en médecine.

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).  
(Tél.: Italie 12-24.)

## CITRILEX

Granulé.

**Hyperviscosité sanguine. Troubles de la Circulation. Arthritisme, Gastralgie.**

**Indications.** — Troubles circulatoires ; Hypertension ; Rhumatisme, Goutte ; Gastrite ; Dyspepsie ; Vomissements ; Hyper et Hypochlorhydrie ; Insuffisance Hépatique ; Constipation ; Migraines.

### Formule.

Citrate monosodique.....	10 gr.
Citrate trisodique.....	5 gr.
Oléate de soude.....	1 gr.
Urotropine.....	0 gr. 50
pour 100 gr. de granulé.	

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café, le matin à jeun ou 1 cuillerée avant les principaux repas.

*Enfants* : moitié de la dose.

Faire dissoudre dans 1/2 verre d'eau ou infusion tiède.

Prix : 21 fr. 75.

**Laboratoires DEXO**

7, rue de la République — PUTEAUX.

## CITRI-NA

**Forme.** — Granulé friable.

**Formule.** — Citrate monosodique, 8 gr. ; Citrate trisodique, 5 gr. ; Excipient sucré et parfumé, pour 100 gr.

**Indications thérapeutiques.** — Antidyspeptique, Modificateur de la viscosité sanguine (Hypertension et toutes affections du système nerveux), Troubles de la nutrition, Antiarthritique (Rhumatismes, Goutte).

**Posologie.** — 1° *Troubles digestifs ou hépatiques* : Faire dissoudre une cuillerée à café de CITRI-NA dans 1/2 verre d'eau chaude. A prendre au cours des repas ou au moment des crises douloureuses.

2° *Affections du système circulatoire* : Réitérer le traitement 2 à 4 fois par jour.

3° *Troubles gastriques des enfants* : 1/3 à 1/2 cuillerée à café selon l'âge, dans un peu d'eau bouillie, plusieurs fois par jour.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS

## CITROCARBINE

Antiseptie digestive.

**Composition.** — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :  
Citrate acide de soude, 10. — Charbon animal, 90.

**Action.** — Eupéptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

**Avantages.** — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

**Indications.** — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.  
Se fait aussi en comprimés.

Prix : 19 fr. 80.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Aut. 71-98.)

## CITROCHOLINE

Granulé de goût agréable.

Cholagogue. Décongestif.

**Composition.** — Citrate de soude 10, Hexaméthylène-tétramine 5, Sulfate de magnésie desséché 20, Lactose 30, Saccharose au citron, Q. S. p. 100.

**Indications.** — Affections hépatiques, Troubles digestifs, Lithiase, Affections urinaires, Hypertension, Viscosité sanguine, Varices, Phlébites, Arthritisme : Rhumatismes et Goutte.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin, dans un demi-verre d'eau tiède.

**Enfants** (à partir de 5 ans) 1/4 ou 1/2 cuillerée.

Le flacon : 22 fr. 70.

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59.)

## CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

**Forme.** — Granulés à saveur agréable.

Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique. Comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

**Dose.** — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

**Indications.** — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 19 fr. 80.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CITROLARGOL

Argent. sol. et Citrate de Soude.

**Action.** — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

**Indications.** — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CITRONEMA

Les applications des Citrates et du Magnésium. Granulé soluble, de goût agréable, contenant 10 p. 100 de bicitrate de Magnésium.

**Indications.** — Viscosité sanguine, Hypertension artérielle, Gastralgies, Vomissements, Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Goutte, Rhumatisme.

### Doses moyennes :

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

*Nourrissons* : 1/3 à 1/2 cuillerée à café par jour.

Prix au public : 20 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. n° 33-3.

### Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer. — SAINT-MANDÉ  
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

## CITROPAÏNE DU D<sup>r</sup> FONTAL

### Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal (ext. de carica papaya).

### Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

### Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, troubles digestifs du nourrisson, vomissements, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

### Forme et Posologie :

*Granulé* : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

*Comprimés* : de 6 à 9 par jour.

*Cachets* : de 2 à 3 par jour.

Enfants : 1/2 ou 1/4 des doses.

### Laboratoires JIOEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 14-89.)

## CITROPEPTOL

Poudre isotonisante du contenu stomacal.  
Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.  
Diurétique.

### Composition :

Citrate de soude .....	0,25
Phosphate de soude .....	0,15
Sulfate de soude anhydre .....	0,10
Sucre de lait pulvérisé .....	4,50
Huile volatile de citron .....	Q. S. pour 1 sachet.

**Indications.** — Digestions lentes, pénibles, Ballonnement, Somnolence après les repas, Gaz de fermentation, Aérophagie, Constipation.

**Posologie.** — *Doses moyennes* : 2 sachets par jour, aux repas.

### Échantillons :

### Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X°).

## CITROPHÉDRINE

**Composition.** — Huile antiseptique nasale, basée sur le pouvoir microbicide intense des essences d'Aurantiées rendues non caustiques par un procédé spécial. Éphédrinée à 0,50 %.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires supérieures.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes de 20 cc.

Prix au public : 18 francs.

### Laboratoires BARDIAUX

39, rue de Reims — VICHY (Allier).

## CITROSE-VICHY (Limonade)

Limonade purgative à base d'eau minérale de Vichy, parfumée avec les sucres de fruits (orange et citron).

**Composition.** — Cette limonade, préparée avec les sels de fruits associés au sel naturel de Vichy, constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cc., répond à la formule suivante :

Tartrate de soude.....	25 gr.
Acide citrique.....	0,22
Sucre.....	30,95
Essence de citron.....	} Q. S.
Essence d'orange.....	
Eau saturée de gaz naturel de source.....	Q. S. pour 200 cc.

**Mode d'emploi.** — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

**Dépôt : Laboratoires NOGUÈS**  
7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CITROSODINE LONGUET

Réalise la médication citratée sous 2 formes :

**Comprimés** à 0 gr. 25.

**Granulé** à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

**Hyperacidité gastrique et dyspepsie :** 3 ou 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 ou 3 fois par jour.

**Hypercoagulabilité sanguine :** États pléthoriques, Stases veineuses, Phlébites, Thromboses, Pneumonies, 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café, granulé 4 à 8 fois par jour suivant indications.

**Vomissements des nourrissons** (1 comprimé par biberon) et des femmes enceintes (4 à 6 comprimés 3 ou 4 fois par jour).

Le flacon de comprimés ou de granulé : 18 fr. 70.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## CLANGORYL

**Composition.** — Rhodanate de Potassium bicristallisé pur. Silicate de Soude strictement pur et neutre.

**Indications.** — Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Scléroses valvulaires et vasculaires, Athérome, Troubles cérébraux, Vertiges, troubles oculaires et auriculaires, Rhumatismes chroniques.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 goutte = 1/4 cgr. de Rhodanate de Potassium, 2 cgr. Silicate de Soude pur.

XV à XXV gouttes, 2 à 3 fois par jour, dans un verre d'eau gazeuse ou aromatisée, au début des repas.

Cure de 3 semaines, repos 8 jours.

Médication de base à suivre régulièrement.

**Prix : 20 francs.**

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle n° 756-2.

**Laboratoire du DIASCLÉROL**

**D. DONNAT, Pharmacien**

26, rue Norvins — Paris (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 78-36.)

## CLEAROL

**Pour Bains oculaires.**

**Composition.** — Hydrolat d'Hamamelis Borosalicylé adréphédriné non caustique.

**Propriétés.** — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et Tonique des conjonctives et des paupières.

**Indications.** — Toutes inflammations et infections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.

Tous états inflammatoires professionnels.

Hygiène oculaire.

**Mode d'emploi.** — Étendre le Clearol de moitié d'eau chaude en utilisant l'ocillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au Clearol calment, décongestionnent et soulagent toujours.

**Formuler :** Clearol, un flacon.

Prix : 19 fr. 40

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré  
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

**Composition.** — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

**Indications.** — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

**Posologie.** — *Usages médicaux* : 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

*Usages chirurgicaux* : 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Sterilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

**Avantages.** — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

**Comprimés** : tubes de 20 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

**Poudre** : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

*Échantillons médicaux sur demande :*

**Laboratoire Pharmaceutique  
DAUFRESNE**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

## COAGULÈNE ET HÉMO-COAGULÈNE

CIBA

HÉMOSTATIQUES PHYSIOLOGIQUES.

A base d'extrait hématique total, renfermant les substances coagulantes du sang, et particulièrement des plaquettes sanguines. Accélérateur la coagulation, ils permettent de juguler les hémorragies inaccessibles, de tarir les hémorragies en nappe et de corriger les déficiences sanguines des diathèses hémorragiques.

**Deux formes : Hémocoagulène et Coagulène :**  
**Hémocoagulène, forme injectable**, en ampoules de 5 cc. (Injection intramusculaire, intraveineuse en cas d'urgence).

**Coagulène, forme buvable**, en flacons-ampoules de 20 cc. (Voie buccale et applications locales).

**Indications.** — Hémorragies en général. Hémoptysies, Hématémèse, Méléna, Métorrhagies, Purpura, etc. Traitement de l'Hémophilie, de l'Hémogénie et des états hémorragiques. Prévention des hémorragies opératoires et post-opératoires, en particulier lors des amygdalectomies, prostatectomies, avulsions dentaires.

**Doses :**

**Hémocoagulène (Injectable) :** Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours. En cas d'hémorragie grave, injecter de 1 à 4 ampoules par jour. Chez les enfants, posologie proportionnée à l'âge : 1/4 ou moitié de celle ci-dessus.

**Coagulène (buvable) : Adultes :** 2 à 5 flacons-ampoules par 24 heures. **Enfants :** 1 à 4 flacons-ampoules par 24 heures. — Le contenu des flacons-ampoules est absorbé avec un peu d'eau ou une tasse de bouillon, suivant le goût du malade.

**Poudre de Coagulène**, pour préparation extemporanée de solutions, stérilisables par ébullition, qu'on utilise localement en tamponnements ou pulvérisations.

**Formuler :**

Boîte de 6 ampoules Hémocoagulène.

— de 5 ampoules buvables Coagulène.

— de 2 — — —

Flacons de 2 et 5 gr. poudre de Coagulène.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

Forme. — Émulsion de Coaltar.

**Propriété.** — Antiseptique, cicatrisant, désinfectant.

**Indications.** — Hygiène de la bouche, pansement des brûlures, furoncles, anthrax, plaies, traitement de la leucorrhée.

**Doses.** — *Leucorrhée*: 1 cuillerée à soupe par litre d'eau. *Pansement*: parties égales eau et Coaltar saponiné.

**Laboratoire LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 08-73.)

## COBRALLYRE

**Composition**: Suspension colloïdale stable et stérile de toxine de Cobra (venin purifié et désalbuminé) titrée à 2 U. S. par cc. (non injectable).

### Indications:

*Affections des yeux*: Conjonctivites, hypertension, hémorragies, traumatismes, kératites et kératalgies, iridocyclites, migraine et zona ophtalmiques, etc.

*Affections du rhino-pharynx*: Sinusites, ozènes, impétigo, états congestifs, irritations pharyngées, spasmes, asthme d'origine nasale, rhume des foins, coryza et rhinites.

### Posologie et mode d'emploi:

*Affections oculaires*: Instiller 1 à 2 gouttes dans l'œil malade, matin et soir. Dans certains cas assez rares, l'application du cobrallyre devient douloureuse; il faut alors diminuer la fréquence des instillations.

*Affections rhino-pharyngées*: Instiller dans chaque narine, en renversant le plus possible la tête en arrière, 2 à 3 gouttes, 3 à 6 fois par 24 heures. Le liquide dégluti par les fosses nasales est sans inconvénient, au contraire.

**Présentation**: En flacon-collire à deux tubulures formant compte-gouttes calibré.

Prix: 23 fr. 50.

**COBRATOXINE**

(voir KATOX-INTRA).

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>). — (Tél. : Carnot 78-11.)

## COCAÏNE MIDY

Pastilles de Cocaïne chloroborates.

Chaque pastille contient:

Stovaine .....	0 gr. 001
Chlorhydrate de cocaïne .....	0 gr. 001
Biborate de soude .....	0 gr. 025
Chlorate de potasse .....	0 gr. 075

**Doses et mode d'emploi.** — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

**Indications.** — Affections de la bouche, gorge, larynx: Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

Prix: 12 fr. 60.

Durée du traitement: 10 jours.

**Laboratoires MIDY**

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## CODÉPHRYL DUFOUR

**Traitement des affections des voies respiratoires:**

**A base de**: Terpène, Bromhydrate de codéine, Baume du Pérou, Chlorure d'ammonium, Emétine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Seigle ergoté.

**Propriétés.** — Fluidifiant et expectorant par la Terpène, le Benzoate de soude, l'Emétine, l'Ergot du seigle. Calmant par le Bromhydrate de codéine.

Antiseptique par le Baume du Pérou et le Chlorure d'ammonium.

Vagotonique par le Chlorhydrate d'Ephédrine.

**Indications.** — Toux, Bronchites, Asthme et toutes affections des voies respiratoires.

### Posologie:

Toux, bronchites sèches: 2 à 6 comprimés par jour.

Toux avec expectoration: 4 à 8 comprimés par jour.

Echantillon sur demande.

Le tube de 30 dragées: 18 fr. 70.

**Laboratoire de L'ÉDISTOL**

**H. DUFOUR**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). (Tél. : 21-28.)

## CODÉRIX

**Composition.** — Chaque comprimé renferme : Codéine, 2 cgr. Terpène et Sucres résineux pulvérisés de Styra Benzoin, aa 0,10.

**Forme.** — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques ; conservation indéfinie.

**Indications.** — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

**Insomnies.** : 2 comprimés au coucher.

**Maladies d'estomac.** : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans sucer ni croquer.

**Dose.** — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

La boîte de 20 comprimés : 13 fr. 50.

**Laboratoire COIRIER**

69, avenue du Maine — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 86-76.)

## CODÉTHYLNE BORNE

**Composition et présentation.** — Dragées que l'on peut sucer, croquer ou avaler (légère amertume), dosées chacune à 1/2 cgr. de Méthyl Codéine ou Codéthylne, chimiquement pure. Sans accoutumance. Tableau A, toxicité très faible.

**Rémède spécifique symptomatique de toutes les Toux.**  
**Analgesique, Antispasmodique, Hypnotique très doux.**

**Posologie.** — Adultes : Selon le Codex.

Doses maxima pour 24 heures : 20 cgr. (40 dragées).

Doses maxima pour une prise : 5 cgr. (10 dragées).

Faire prendre les dragées 2 par 2, trois à six fois par jour selon l'effet désiré.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, diminuer les doses de moitié.

Prix : 18 fr. 70 la boîte de 40 dragées.

**Laboratoires M. BORNE**

Fournisseurs des Hôpitaux et des Ministères des Colonies et de la Marine.

SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

## CODÉTHYLNE HOUDÉ

(Chlorhydrate d'éthyl-morphine.)

Granules titrés à 5 milligrammes.

*Le nom de Codéthylne a remplacé définitivement la dénomination Dionine, au Codex 1937.*

**Propriétés.** — Essentiellement sédatif de la toux. Analgésique et hypnotique léger.

**Indications.** — Bronchite, emphyseme, asthme, coqueluche, pneumonie, tuberculose pulmonaire et laryngée. Névralgies, gastralgies (ulcère et cancer).

**Doses.** — 3 à 20 granules par jour, en moyenne 5 à 8. Enfants : 1 à 5 granules par jour suivant l'âge, à partir de 5 ans.

**N. B.** — Le rationnement sévère appliqué aux alcaloïdes de l'opium oblige les Laboratoires Houdé à restreindre leurs livraisons de granules de Codéthylne Houdé.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 40-58.)

## CODOFORME BOTTU

**Composition.** — Comprimés enrobés constitués par une composition bromoformique spéciale avec codéine, aconit et belladone ne se dissolvant que dans l'intestin sans fatiguer l'estomac.

Un comprimé de CODOFORME représente :

Codéine .....	0 gr. 01
Bromoforme .....	IV gouttes.
Teintures d'aconit et belladone. aa	V gouttes.

**Propriétés.** — Spécifique par excellence de la toux inutile, quinteuse, fatigante. *La première potion sèche présentée au Corps Médical.*

**Indications.** — Sédatif puissant des trachéites rebelles, des toux quinteuses et spasmodiques (post-grippales en particulier). Modérateur actif de la toux émetisante des tuberculeux, de la toux fatigante des cardiaques et des cancéreux, de la toux des diabétiques et des fumeurs. Calmant remarquable de la toux des opérés abdominaux, urinaires, pulmonaires et craniens.

**Posologie.** — Dose usuelle : 4 à 6 comprimés par 24 heures. Chez les enfants, à partir de 5 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 15 fr. 80 l'étui de 20 comprimés pour 4 à 5 jours de traitement, représentant la valeur de deux préparations liquides (potions ou sirops).

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## COLARSÉNOL

Pommade nasale.

### Composition :

Novarsénobenzol .....	1 gramme.
Ch <sup>ate</sup> d'éphédrine .....	1 —
Essences de Pin, de Cèdre, de Géranium. <sup>an</sup> .....	1 —
Excipient Q. S. P. ....	100 grammes.

**Indications.** — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Désinfection du Rhino-Pharynx des porteurs de germes diphtériques.

**Mode d'emploi.** — Introduire gros comme un pois dans chaque narine plusieurs fois par jour.

Prix : 15 fr. 80.

**Laboratoires René CARLIER**

43, rue de Créteil — JOINVILLE-LE-PONT  
(Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

## COLARSÉNOL

Collutoire Inaltérable au Novarsénobenzol.

### Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphtéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

**Mode d'emploi.** — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Prix : { Le flacon de 30 cc ..... 19 fr. 40  
Le flacon de 20 cc ..... 12 fr. 90

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-1.

Échantillons et Littérature :

**Laboratoires René CARLIER**

43, rue de Créteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).  
(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59).

## COLAVÉ

Extrait spécial de Kola suractivé par addition de 1 p. 100 de caféine pure.

**Forme.** — Granulé fondant.

**Indication.** — Stimulant musculaire et nerveux, Tonique général, Régulateur du cœur, Convalescence, Dépression physique.

**Doses.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 12 à 15 jours.

Prix : 19 francs.

Enregistré au laboratoire national de contrôle sous le n° 1107.

**E. VERDON**

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

## COLCHICINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

La Colchicine pure cristallisée a été découverte par A. Houdé (1887).

**Propriétés.** — Augmente fortement les sécrétions. Excitant du sympathique. Modérateur des échanges nutritifs.

**Indications.** — *Spécifique de la goutte* : Accès aigu ou manifestations subaiguës ou larvées (rhumatismes gouteux).

### Posologie :

Accès aigu : 3 granules le premier jour en 3 fois (1 à 2 heures d'intervalle).

2 granules le deuxième jour et jours suivants.

Traitement en 4 jours environ (ne pas dépasser 7). Cesser dès sédation, ou en cas de diarrhée.

*Manifestations subaiguës* (ou comme préventif) : 1 à 2 granules par jour.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 40-58.)



## COLCHI-SAL MIDY

**Composition.** — Chaque capsule contient : 1/4 de mmg. de colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 d'Essence de Wintergreen (obtenue par fermentation et distillation de l'écorce de Gaultheria procumbens).

**Propriétés.** — Le COLCHI-SAL MIDY réunit dans une seule médication :

1° Les propriétés thérapeutiques de l'Essence de Wintergreen : *Anal-gésique, Antinévralgique, Antirhumatismale.*

2° Les propriétés thérapeutiques de la Colchicine : Spécifique de l'accès de goutte articulaire aiguë, et de toutes les manifestations douloureuses de la goutte typique et larvée.

**Indications.** — Accès de goutte, Rhumatisme goutteux, toutes névralgies, névrites et myalgies d'origine goutteuse. Lumbagos et sciatiques. Le COLCHI-SAL MIDY doit être essayé dans tous les cas de sciatique rebelle ; il réussit souvent là où tout a échoué.

**Forme.** — Capsules.

**Posologie et mode d'emploi.** — 4 à 16 capsules par jour, par prises fractionnées (2 à 3 capsules par prise).

Prix : 25 francs.

Durée du traitement : 8 à 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

Z. N. O. : 4, rue Besse, VICHY (Allier)

## COLIBYL

Granulé

Syndrome Entéro-Uro-Hépatique

**Composition.** — Peptone (lait, viande, végétaux), Magnésie (hyposulfite, salicylate, sulfate), Charbon (activé), Magnésium (peroxyde), Lithium (benzoate), Formin (citrate), Plantes (artichaut, boldo, camomille, romarin).

**Propriété.** — Le caractère original et essentiel du Granulé COLIBYL réside dans son action proprement désensibilisante et antiseptique de la muqueuse duodénale et intestinale en dehors et à côté de son action obolagogue et antianaphylactique.

**Indications.** — Toutes affections du foie et de l'intestin (cholécystites, colite, lithiase biliaire, ictère, congestions et insuffisances hépatiques et vésiculaires), Entérites, Cystites. Toutes infections. Toutes anaphylaxies.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, soit le matin à jeun, soit une demi-heure avant le repas de midi et du soir.

**Enfants :** Demi-dose.

Croquer et avaler à la suite un demi-verre d'eau, ou encore délayer le granulé préalablement dans l'eau.

Prix : 23 fr. 70. Taxe d'armement comprise.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1307-7.

Laboratoires OPOS-TOULOUSE

Pharmacien HOMPS,

13 et 13 bis, rue Matabiau (Tél. 253-97.)

## COLISEL

**Traitement des Infections intestinales, biliaires et urinaires.** Pansement intestinal, antiseptique, adsorbant et sédatif, d'une innocuité absolue.

**Composition.** — Charbon (animal et végétal, par parties égales), Carbonate de chaux, Chlorure de magnésium, Poudre de belladone titrée (à la dose très faible de 0 gr. 10 par 100 gr. de granulé ou poudre).

**Indications.** — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant, Entérites, Entérites infantiles, Entéro-colites, Intoxications, Fermentations, Ballonnements, Dysenteries et Entérites coloniales, Colibacillose, Cholécystite, Insuffisance hépatique, États pré-ulcéreux, Appendicite chronique.

**Présentation.** — Deux formes : granule et poudre. Produit très agréable à prendre ; préparation homogène.

**Doses.** — 1 cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau, matin, midi et soir, après les repas.

**Enfants :** demi-dose.

La boîte de vente contient un traitement de trois semaines.

Prix de la boîte : 19 fr. 40.

LABORATOIRES DU FÉMINADÈNE

1 bis, rue Carcel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## COLISEPTINE

Granulé.

**Composition.** — Charbon (activé), Magnésium (sels), Lithium (Benzoate), Formine, Aubépine, Belladone, Passiflore.

**Indications.** — Infections gastro-intestinales, biliaires, urinaires, Syndrome gastro-entéro-rénal, Spasmes gastriques, pyloriques et intestinaux, hyperacidité, aéro-phagie, ulcères, gastralgies, ptoses, fermentations, flatulences, colites, colibacillose, dilatation de l'estomac, cystite, colibacillurie, intoxications alimentaires, dyspepsies douloureuses.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café après chacun des principaux repas. Croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Prix : 19 fr. Taxe d'armement comprise.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-05.

Laboratoires OPOS-TOULOUSE

Pharmacien HOMPS,

13 et 13 bis, rue Matabiau

(Tél. : 253-97.)

## COLITIQUE

Vaccin curatif anticolibacillaire.

Adopté par le Ministère des Colonies  
et par les Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le colibacille.

**Double action** par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

**Formes :** *Buvable, la plus active.* Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré. *Injectable* (ampoules de 1 cc.).

*Filtrat*, pour applications locales (amp. de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 31 fr. 40 : 5 ampoules, 16 fr. 40. *Filtrat* : 6 ampoules, 37 fr. 60.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du **D<sup>r</sup> P. ASTIER**

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52.)

## COLI-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur Duchon.

2 formes : Injectable, buvable.

**Composition.** — Lysat de Colibacilles (souches variées).

**Indications.** — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

**Posologie.** — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.) :

1<sup>re</sup> injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les 2 jours. *Coli voie buccale* (non injectable), ampoules de 3 cc. 1<sup>er</sup> jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée ; 2<sup>e</sup> jour : 3/4 d'ampoule ; ensuite une ampoule par jour pendant 8 à 10 jours.

**Présentation.** — 1<sup>o</sup> Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2<sup>o</sup> Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 31 fr. 60.

Laboratoire **CORBIÈRE**

et Pansements brevetés **CORBIÈRE S. A.**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 78-11.)

## COLIZYL

Toutes Colibacilloses. Antisepsie constante des voies intestinales, urinaires et biliaires, quelle que soit la réaction du milieu.

### Composition :

Tétraminoquinol (sulfate double d'orthoxyquinoléine et d'hexaméthylène-tétramine).....	0,12
Hexaméthylène-tétramine libre.....	0,08
Extrait de chimaphila.....	0,02
— de boldo.....	0,01
Excipient.....	Q. S. pour un comprimé.

### Indications :

Diarrhées, Colites, Dysenteries, Parasites intestinaux, Pyélonéphrites, Pyuries, Cystites, Antisepsie vésicale, Complications infectieuses de la lithiase rénale, Dysurie, Angiocholites, Cholécystites, etc.

### Posologie :

3 à 6 comprimés par jour, avant les repas.

Laboratoire du **COLIZYL**

R. FAURE, pharmacien,

83, boulevard de la Villette — PARIS (X<sup>e</sup>).

## COLLARGOPHÉDRINE

Solution d'éphédrine naturelle associée aux sels d'argent indolores.

### Composition :

Sulfate d'éphédrine naturelle.....	0 gr. 50
Nuclargyl (protéose argentine indolore à 20 p. 100 d'argent).....	0 gr. 45
Nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminoéthanol (Nitrate de novocaïnium).....	0 gr. 20
Argent colloïdal (Collargolum).....	0 gr. 15
Camphre.....	0 gr. 01
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifiée.....	0 gr. 015
Pour 100 grammes.	

**Présentation.** — En flacon compte-gouttes nasal.

**Action.** — Décongestion, antisepsie de la muqueuse nasale, sans irritation ni douleur, anesthésique, excitant de la rénovation cellulaire,

**Indications.** — La Collargophédrine est indiquée dans toutes les affections nasales : catarrhe nasopharyngien, coryza spasmodique, coryza, sinusite, rhinite, rhume des foies, végétations, céphalée, rhino-pharyngite, œdème du pharynx et de l'épiglotte, états asthmiques et dans les maladies infectieuses : état grippal, rougeole, scarlatine, angine, érysipèle, oreillons et toutes fièvres éruptives.

**Mode d'emploi.** — En instillation ou en pulvérisation :

*Enfants* : 1 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.  
*Adultes* : 5 à 10 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Prix : 21 fr. 60.

En pulvérisation : 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires **M. DE RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## COLLARMAN

Solution colloïdale chimique de Permanganate d'argent 1 p. 100.

Action bactéricide puissante. Tolérance parfaite, grande fluidité, pénétration du système muqueux.

**Oto-Rhinologie.** — Rhinites, Sinusites, Otites mastoïdites (adjuvant précieux des interventions).

**Ophthalmologie.** — Blépharites, Conjonctivites, etc. Ophtalmie blennorragique (adultes, nouveau-nés).

**Vulvo-vaginites** des petites filles (instillation).  
Présentation en flacons compte-gouttes de 15 gr.

### Laboratoires de l'ARMANITE

**J.-C. PERROTIN**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
3, avenue Daumesnil — PARIS (XII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Diderot 00-53.)

## COLLOIDINE LALEUF

**Composition.** — Extrait total pluriglandulaire associé à l'Iodalbumine.

**Propriétés et Indications.** — Remède à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'Iodalbumine, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dues à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justiciables du traitement à la COLLOIDINE.

**Formes.** — Comprimés dragéifiés.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 2 à 4 dragées par jour, suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

**Durée moyenne des unités de vente :** 30 à 50 jours.

Prix de vente au public :

Étuel de 100 dragées : 31 fr. 70.

### Laboratoires LALEUF

**Georges DUGUÉ**, Docteur en pharmacie  
51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Trocadéro : 62-24.)

## COLLOÏDOGÉNINE

du Docteur BAYLE

*Opothérapie splénique intégrale.*

**Nature.** — Extrait total de rate.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> Colloïdogénine injectable (amp. de 5 cc.) ;  
2<sup>o</sup> Colloïdogénine sirop ;

3<sup>o</sup> Colloïdogénine (flacons-amp. pour voie buccale), remplaçant actuellement la forme sirop.

**Indications.** — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

*Anémies*, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.  
*Convalescences*, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation.

**Action.** — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes. — Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100). Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

**Emploi et doses.** — Séries de 12 inject. (intramuscul. dans la fesse ou sous-cut. abdominales) en 22 j. Après chaque série, 8 j. de repos. Prendre 1 amp. buvable à chaque repas pendant la durée du traitement.

**Doses chez l'enfant.** — Au-dessus de 5 ans, inj. 5 cc. Au-dessous de 5 ans, inj. 1 cc. par an. d'âge.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 722-1, 722-2, 722-3.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## COLLO-IODE DUBOIS

Dragées.

**Composition.** — Chaque dragée représente 2 cgr. d'iode combinés à 2 cgr. de Caféine et à 8 cgr. de Théobromine pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

**Indications.** — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

Asthme, Emphysème, Artériosclérose, Affections du cœur et des vaisseaux, Troubles de l'hypertension. Troubles vasculaires de la ménopause. Maladies infectieuses et intoxications, Hydropysies, etc...

**Forme.** — Dragées Théobromo-caféinées.

**Posologie.** — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

**Durée du traitement :** 10 jours.

Prix : 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 238-14.

Laboratoires DUBOIS

**R. DUBOIS**, Docteur en Pharmacie  
52, rue Montesquieu — ASNIÈRES.  
(Tél. : Gré. 03-92.)

## COLLO-IODE DUBOIS

Gouttes.

**Composition.** — Solution titrée d'iodhydrides acides aminés à 5 p. 100 d'iode pur.

**Indications.** — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'Artériosclérose et les affections du cœur, l'Obésité, l'Asthme, la Goutte et les Rhumatismes, la Syphilis, l'Hyperthyroïdisme, la Tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les Mycoses, les Etats infectieux, etc.

**Forme.** — Gouttes.

**Posologie.** — *Adultes* : de XX à C gouttes par jour, suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

*Enfants* : de V à L. gouttes par jour.

Durée du traitement : 3 semaines.

Prix : 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-2.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie,  
52, rue Montesquieu — ASNIÈRES.  
(Tél. : Gré. 03-92.)

## COLLOSOUFRE

**Composition.** — Soufre colloïdal vrai et stable à gros grains amicroniques, à réaction neutre et à charge électrique forte.

**Propriétés.** — Complément naturel des cures thermales et hydrominérales sulfureuses.

**Indications.** — Anémie pernicieuse, bacillooses, rhumatisme chronique, diabète, artériosclérose, néphrites aiguës et chroniques, icères infectieux, cirrhoses, auto-intoxications, dermatoses d'origine interne, pneumonies, pharyngites, laryngites, bronchites chroniques, coryza.

**Présentation et prix :**

**Ampoules :** Injections intraveineuses ou intramusculaires. La boîte : 23 fr. 20.

**Cachets :** 31 francs, la boîte de 24 cachets.

**Granulé :** 18 fr. 60, le flacon de 150 grammes.

**Posologie.** — 1 cachet midi et soir, ou trois cuillerées à café de granulé par jour.

**Ampoules :** Tous les jours ou tous les deux jours.

**Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

## COLLO-TEX

Colloïdothérapie externe.

**Formule :**

Silice d'alumine colloïdale.....	0,70
Polysilicate de cuivre colloïdal...	0,15
Polysilicate de zinc colloïdal....	0,15

Pour 100 grammes.

**Propriétés :**

Antiparasitaire, Antiprurigineuse, Antimicrobienne.

**Présentation :**

Poudre colloïdale dans une boîte soufflante.

Prix : 13 fr. 50.

Fournisseur des Ministères de la Santé et de la Justice.

Laboratoire Biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.  
(Tél. : Élysées 28-12.)

## COLLUBIAZOL

Solution hydro-glycérinée de Rubiazol.

Traitement des infections provoquées par le streptocoque ou d'autres éléments microbiens associés au niveau des muqueuses.

**Indications.** — Angines, Amygdalites, Pharyngites et Rhino-pharyngites, Gingivites et Stomatites infectieuses, Vulvites et Vaginites, Exo- et Endocervicites.

**Mode d'emploi.** — A utiliser :

En collutoire,  
En gargarismes,  
En instillations nasales,  
En injections vaginales.

Prix au public : Le flacon : 19 fr. 50.

Les Laboratoires du Dr ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

## COLLUCROMEX

**Collutoire au cristal violet, au vert lumière et à l'arsénobenzol stable.**  
Chimiothérapie intensive par mordantage et par colorants éleclifs.  
Panvalent contre tous les germes infectant le cavum.  
Sédatif de l'élément douloureux : adjuvant anesthésique.

### Formule.

Vert lumière.....	0 gr. 50
Cristal violet.....	0 gr. 50
4 Oxy-3 acétyl-amino-phényl-arsinate de Na.....	1 gr.
Chl. de para-amino-benzoyl-diéthyl-amino-éthanol.....	0 gr. 50
Paraminophényl sulfamide.....	0 gr. 10
Citronellol.....	0 gr. 10
Camphre de menthe.....	0 gr. 10
Alcool phényl-éthylrique.....	0 gr. 10
Excipient spécial : pour 100 gr.	

**Indications.** — *Oto-rhino-laryngologie* : Toutes affections mono et polymicrobiennes du rhino-pharynx, angines de Vincent et diverses, stomatites, gingivites, pyorrhées, stérilisation des porteurs de germes diphtériques.

**Dermatologie** : Traitement des plaies infectées, suppurantes et à cicatrisation retardée, ulcères variqueux, infections cutanées à pyosques.

**Mode d'emploi** : Badigeonnages, gargarismes, bains de bouche-applications locales. Adultes, enfants, nourrissons.

Prix : 20 fr. 20.  
Diffusion strictement médicale.

Laboratoires M. de RIVE.  
A. de Rive, Pharmacien.

Services Commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS (XXe).

## COLLUNOVAR

**Collutoire au Novarsénobenzol.**

**Affections du Rhino-Pharynx.**

**Indications.** — Médication préventive et curative de toutes les angines. Angine de Vincent. Affections amygdaliennes. Pyorrhée alvéolo-dentaire, Stomatites, Gingivites. Affections nasales.

### Formule :

Novarsénobenzol.....	1 gr.
Citrate sodique.....	5 gr.
Niéraline 1/1 000.....	0,50

Pour 100 cc.

**Posologie.** — En badigeonnage léger sur les amygdales ou sur les gencives.

En gargarisme ou bain de bouche, à la dose d'une 1/2 cuillerée à café par verre d'eau tiède.

En gouttes nasales : 5 à 6 gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).  
(Tél : Longchamp 04-61.)

## COLLUSULFAR

**Collutoire au Sulfarsénol.**

### Formule :

Sulfarsénol.....	5 gr.
Excipient, Q. S. pour.....	100 cc.

**Solution stabilisée de Sulfarsénol de forte concentration**  
qui lui assure une grande puissance antiseptique et une action antimicrobienne remarquablement polyvalente.

**Indications.** — Angine aiguë. Angine de Vincent, Stomatites, Gingivites, Aphthes, Muguet, Prophylaxie de la diphtérie, Porteurs de germes.

**Mode d'emploi.** — En badigeonnages : 4 par jour.

En bains de bouche : 1/2 cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède.

### Formes :

Flacons. Grand modèle de 30 cc. Petit modèle de 15 cc.

Prix de vente au public :

Grand modèle : 18 fr. 70. Petit modèle : 10 francs.

Laboratoires de Biochimie médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

19 21, rue Van-Looy — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

## COLLUTOIRE V.-E. DOUMER

### Formule:

Bleu de méthylène V.-E.	
Doumer.....	1 gr.
Résorcine.....	0 gr. 20
Excipient glyciné. Q. S.	
pour.....	100 gr.

**Indications.** — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

## COLLUTOIRE TRÉPALLIX

**Composition.** — Solution stabilisée de lactate de mercure à 0 gr. 60 pour 100 grammes.

**Action.** — Celle résultant de la composition même du lactate de mercure (acide lactique et mercure).

Cette préparation, tout en utilisant au maximum les puissantes propriétés anti-infectieuses et désinfectantes du lactate de mercure, réalise le double avantage : de conserver indéfiniment cette qualité sans subir aucune altération ; de n'entraîner à l'usage aucun accident toxique local ou d'ordre digestif.

**Indications.** — *Toutes les angines aiguës non-diphthériques* : angines érythémateuses simples, angines érythémato-pultacées, angines herpétiques, angines du fuso-spirillaire de Vincent, etc., stomatites toxiques ou infectieuses, gingivites.

**Posologie.** — Se prescrire en badigeonnages, attouchements, gargarismes, bains de bouche.

*Angines aiguës* : 2 à 4 badigeonnages par 24 heures ou 2 à 3 gargarismes par jour (40 à 50 gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie).

*Stomatites* : 2 ou 3 attouchements légers sur le pourtour des gencives et au contact même des lésions.

*Enfants* : La moitié des doses ci-dessus indiquées.

**Laboratoires SYNTHESIS**

45, avenue Trudaine — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 57-72.)

## COLLYRE ROSE

**Formule :**

Camphre .....	0 gr. 01
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	0 gr. 02
Sulfate de zinc .....	0 gr. 04
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000..	0 gr. 50
Eau distillée.....	10 gr.
Safranine, Q. S. pour colorer.	

**Indications.** — Larmoiement, Blépharites, Cils collés, Conjonctivites des vieillards et des enfants, Herpès de la cornée.

**Posologie.** — II à III gouttes, trois fois par jour.

## COLLYRE BLEU

**Formule :**

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Stovaine .....	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

**Indications.** — Toutes conjonctivites, Blépharites, Kératites, Ulcérations de la cornée.

**Posologie.** — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

## COLLYRE BLEU IRRADIÉ

**Formule :**

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 004
Stovaine .....	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

**Indications.** — Toutes celles du Collyre bleu. Mais son efficacité est renforcée par l'application des Rayons ultra-violet et l'action tonifiante exercée sur les tissus, surtout dans les cas de *Blépharites par avitaminoses*.

Spécifique de la kératoconjonctivite phlycténulaire.

**Posologie.** — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

*Flacons-ampoules compte-gouttes de 15 cc.*

**Laboratoires LAITER**

**P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie**

52, rue Heurtaut — AUBERVILLIERS

(Tél. : Flandre 00-55.)

## COLLYRES CHIBRET

(Chibrocollyres)

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 1471-7 à 1471-21. En ampoules compte-gouttes, contenant 10 cc. de liquide, pouvant se maintenir aseptique, ne modifiant pas la tension oculaire ni l'accommodation.

Chibroargyrol, Chibrocollargol, Chibrocoocaïne, Chibroprotargol, Chibroargent (Azotate), Chibrobleu (spécial), Chibroatropine, Chibroatropine et Cocaïne, Chibrohomatropine, Chibronovocaïne, Chibropilocarpine, Chibropilocarpine-Adrénaline, Chibrocuivre, Chibrozinc, Chibrozinc et Novocaïne, Chibroésérine, Chibroésérine et Adrénaline, Chibrofluorescéine, Chibroborate de Soude et Adrénaline, Chibroiodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Chibrocyanure de Mercure, Chibromercurobrome.

**Collyres en ampoules de 1 cc.** (pour nouveau-nés). Chibromereurobrome, Azotate, Argyrol.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à

**Laboratoire CHIBRET**

5, rue Saint-Hérem, CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-36.)

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

Marque déposée « Optima ».

Voir à *Chibromereurobrome* le libellé spécial.)

## COLTÈNE

**Composition.** — A base de Coaltar solubilisé, chloralé, mentholé et aromatisé.

**Propriétés et Indications.** — Antiseptique et anesthésique pour soins de la bouche, de la gorge et du nez.

**Posologie et mode d'emploi.** — Le Coltène s'emploie à la dose de XX gouttes par verre d'eau chaude, en bains de bouche, en gargarismes ou en pulvérisations.

Dans tous les soins dentaires post-opératoires, après les extractions, dans les abcès, les fluxions dentaires et les plaies de la bouche, les gingivites, les stomatites, les angines, les amygdalites, les pharyngites et tout autre état inflammatoire de la muqueuse bucco-pharyngée.

Comme dentifrice, quelques gouttes dans un demi-verre d'eau froide.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt et vente en gros :

**J. BLANCHARD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
PONT-DE-VAUX (Ain).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 1195-2.

## COLUVAL

Collyre polyvalent.

Neutralisant, antiseptique, angiotonique et astringent.

**Composition.** — A base d'eaux distillées d'Hamelis Virginica, de Fenouil, de Rose, de Sureau ; d'acide borique et de borate de Soude.

**Indications.** — Toutes les infections de l'œil : conjonctivite, orgelets, blépharite, chalazions, kératite et kérato-conjonctivite, iritis, kératiritis, irido-cyclite, dacryocystite.

Le Coluval présente un pH = 8,5.

**Mode d'emploi.** — Bains oculaires, instillations compresses.

Prix : Le flacon avec œillère (200 cc. env.) : 17 fr. 60.

Le double flacon sans œillère (400 cc. env.) : 27 fr. 60.

**Laboratoire PHYGIÈNE**

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

## COMBRETINE

BOCQUILLON-LIMOUSIN

Extrait fluide de Combretum Rambautii H.

« Le plus actif des cholagogues. »

Professeur ROBIN.

**Indications.** — Coliques hépatiques, Congestion du foie et de la Vésicule biliaire, Crises douloureuses du foie, Insuffisance hépatique, Ictère et Cholémie.

Dyspepsies réflexes, Migraines, } d'origine hépatique.  
Vertiges, Prurit, Constipation, }

**Forme.** — Extrait fluide.

**Posologie.** — XXX à LXXX gouttes par jour, à prendre en 3 fois au début des repas.

**Avantages.** — Action douce, constante et rapide sur les diverses fonctions du foie. Jamais toxique. Cholagogue d'une remarquable activité. Agit plus sûrement que le boldo et sans déterminer d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n<sup>o</sup> 199-4.

**Laboratoire BROCHON**

202 bis, rue de Paris — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

## COMITOL

**Formules.** — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

**Indications.** — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor pectoris, Angoisses.

**Avantages.** — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

**Doses.** — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

*Enfants* : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITOL.

Prix.	Formule faible.	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	15 fr. 30	20 fr. 40	22 fr. 90
— 30 —	38 fr. 20	51 fr. 00	63 fr. 80

**Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments**  
sous les n<sup>os</sup> 309-1 309-2, 309-3, 309-4.

**Pharmacie GRORICHARD**  
12, place de la Révolution — BESANCON.

## COMPRAL

**Composition.** — Trichloréthyl-uréthane-diméthyl-amino-phényl-diméthyl-pyrazolone.

**Propriétés et indications.** — Analgésique d'action rapide et sans effets secondaires, ne contenant ni toxiques, ni stupéfiants, ni alcaloïdes.

Migraines, Céphalées, Névralgies, Douleurs dentaires, Douleurs menstruelles.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés dans un peu d'eau, plusieurs fois par jour si besoin.

**Présentation.** — Boîte de 10 comprimés à 0 gr. 50.

**Produits « BAYER »**

S. A. R. L.

16, rue d'Artois — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Élysées 79-93.)

## COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

N<sup>o</sup> 1. Bébé, la boîte de 1 : 11 francs.

N<sup>o</sup> 2. Enfants, la boîte de 1 : 13 fr. 50.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**  
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

## COMPRIMÉS D'ALIBOUR

**Composition.** — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre dans les mêmes proportions que dans la formule d'Eau d'Alibour faible. 1 comprimé dissous dans 100 gr. d'eau donne l'Eau d'Alibour.

**Indications.** — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des fleurs blanches, impétigo, ecthyma.

**Action.** — Antiseptique d'usage courant, prophylactique, hygiénique, anticatarrhal.

**Dose.** — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, et en lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 15 fr. 50 la boîte de 36 comprimés.

**Laboratoires SITSA**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)



## COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique.

Antiseptique gastro-intestinal.

Gastro-Entérites infantiles,

Infections Gastro-Intestinales, Dermatoses.

Chaque flacon porte UNE ETIQUETTE PRECISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DUREE D'ACTIVITE REELLE ET INCONTESTABLE DU MEDICAMENT.

*Adultes* : 2 à 3 comprimés ; *Enfants* : 1 à 2 comprimés.  
Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 12 fr. 90.

Prix du flacon de 20 comprimés : 5 fr. 30.

**Laboratoires LAMBERT**

Place du Châtelet — ORLÉANS.

(Tél. : 34-50.)

## COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

**Composition.** — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

**Propriétés.** — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

**Indications.** — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, fleurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

## COMPRIMÉS NICAN

Par comprimé :

*Chlorhydrate d'Ethylmorphine* (Dionine N. D.), 0 gr. 01.

*Benzoate de soude* 0 gr. 25, Extraits Serpolet et Coquelicot (du sirop de Desessart), Extraits Aunée et Marrube.

*Sédatif* de toutes les toux, *fluidifiant* et *expectorant*.

Complément pratique des **Gouttes Nican**, pour le traitement ambulatoire.

Bronchites saisonnières, Toux persistantes, Séquelles de Rhumes, Trachéites irritatives, Mucosités bronchiques.

Quand le rhume « traîne » et contre l'habitude de tousser.

**Posologie.** — *Adultes et adolescents* :

2 à 4 comprimés par jour dans les formes aiguës.

1 à 2 comprimés par jour, ou le soir au coucher, dans les formes chroniques.

Tube de 20 comprimés pour 5 à 10 jours de traitement

Voir **Gouttes Nican** à base de Codéine et Bromoforme.

**Laboratoires CANTIN**

PALAISEAU (Seine-et-Oise).

## COMPRIMÉS PROBIOS ANTIPYOGÈNE

### Comprimés.

**Formule.** — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques, 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspondant à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Streptococciques, Staphylococciques et pyocyaniques.

**Indications thérapeutiques.** — Abcès, Phlegmons, Anthrax, Panaris, Furoncles, Sycosis, Orgelets, Pyodermites, Impétigo, Intertrigo, toutes les affections à germes Pyogènes.

**Présentation.** — En boîte de 36 comprimés, 26 fr. 15.  
**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

## PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

### Comprimés.

**Formule.** — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Voies Respiratoires 0,05, Excipient Q. S. pour 1 comprimé de 0,50.

Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage. Voies Respiratoires.

**Présentation.** — En boîte de 36 comprimés, 26 fr. 15.

**Indications thérapeutiques.** — Coryza, Rhinites, Sinusites, Angine, Bronchites, Broncho-pneumonies, Grippe.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

## PROBIOS INTESTINAL

### Comprimés.

**Formule.** — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal.

**Indications thérapeutiques.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases, Dysenteries bacillaires et tous états toxi-infectieux intestinaux.

**Présentation.** — En boîte de 36 comprimés, 26 fr. 15.  
**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-7.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## COMPRIMÉS PURGOS

Les **Comprimés Purgos**, aux sels concentrés de Vichy, de magnésie et de soude, ont été créés pour remplacer l'Eau Minérale de PURGOS dans tous les cas où il est difficile et même impossible de se la procurer, par exemple au cours d'un voyage, en excursions, et dans les pays lointains.

**Composition.** — Les **Comprimés Purgos**, dissous dans un peu d'eau minérale de Vichy, offrent toutes les qualités de l'eau minérale purgative et reproduisent exactement tous ses principes actifs.

Chaque comprimé représente en sels cristallisés :

Sulfate de soude .....	4 gr. 248
Sulfate de magnésie .....	0 gr. 747

**Propriétés.** — Les **Comprimés Purgos** ont une action toute particulière sur les voies digestives.

**Indications.** — Ils sont indiqués dans tous les cas d'atonie des voies digestives, dyspepsies, embarras gastriques, constipation chronique, maladies du foie, etc.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés } le matin à jeun.  
Dose laxative : 2 à 3 comprimés

En tubes de 24 comprimés : dans toutes Pharmacies.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS ROY

**Composition.** — Comprimés de lactate mercurique, obtenu chimiquement pur par un procédé spécial, en union colloïdale avec les principes essentiels du lait.

Deux dosages : à 0,005 pour *Adultes* ; à 0,001 pour *Enfants*.

**Propriétés.** — Absorption facile, tolérance parfaite, maximum d'action, pas de saveur métallique, conservation indéfinie.

**Indications.** — Traitement mercuriel de la Syphilis (de cure et d'entretien).

### Doses moyennes par jour :

*Adultes* : 4 comprimés de 0 gr. 005 (1 tube) en 2 ou 3 fois. Les casser et les avaler avec un peu d'eau ou de lait.

*Enfants* : par comprimés de 0 gr. 001 (correspondant à XX gouttes de la solution à 1 %, ou par 1/2 comprimé).

### Laboratoires A. ROY.

Transférés au Laboratoire LACHARTRE,  
26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (V<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS SULFUREUX DE LUCHON

**Forme.** — Comprimés solubles dans l'eau.

**Formule.** — Sulfure de Calcium, 0,125; Soufre précipité, 0,125; Essence de Serpolet, 0,005; Essence de Niaouli rectifiée et désaldéhydée, 0,01; Essence d'Eucalyptus, 0,01; Terpinol, 0,015; Menthol, 0,00015; Oliban, 0,125; Poudre d'Eucalyptus, 0,48 pour un comprimé.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, Coryza, Rhinites.

**Posologie.** — Un comprimé dans un verre d'eau à 38° pour Gargarismes et Pulvérisations, à 56° pour Inhalations.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents.

Médication Alcaline Pratique et Économique.

**Mode de présentation.** — Les « Comprimés Vichy-État », préparés à l'aide de sels provenant de l'évaporation des Eaux de Vichy, permettent d'obtenir par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

**Indications.** — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

**Posologie.** — 3 à 4 « Comprimés-Vichy État » pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Le flacon contient 100 Comprimés Vichy-État.

**A. CHASSAING, R. LE COQ et Cie**

4, rue de la Coutellerie — PARIS

(Tél.: Arc. 00-35.)

et Pharmacies.

## CONTINOL

**Composition.** — Association d'Ergot de Seigle, de Rhus aromatica et de Quinquina rouge.

Comprimés contenant 10 centigrammes d'extrait fluide d'Ergot, 10 cgr. d'extrait fluide de Rhus et 40 cgr. de poudre de quinquina rouge.

**Propriétés.** — Modificateur du système neuro-végétatif par l'Ergot et la Rhus. Tonique de l'état général par le Quinquina.

**Indications.** — Incontinence d'urine diurne ou nocturne.

**Présentation.** — Boîte contenant 45 comprimés, suffisante pour 1 mois de traitement.

**Posologie.** — Dose moyenne 2 à 4 comprimés par jour suivant l'âge.

Prix : 21 fr. 10.

**Laboratoires H. MASSON**

44, rue Alexandre-Dumas — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél.: Roq. 37-04.)

## CONTRACIDE NORGAN

**Constitution.** — Mucilage finement divisé, en association avec une faible proportion de citrate de chaux.

**Indications.** — Tous les troubles de l'estomac provoqués par une acidité excessive de ses sécrétions ou de son contenu, depuis hyperchlorhydrie légère jusqu'aux ulcères constitués.

**Mode d'action.** — N'est pas un saturant chimique. Agit par fixation de l'acide, à la manière de la Mucine, mais d'une façon plus marquée

**Avantages.** — Le Contracide retient l'acide fixé dans l'estomac et ne le restitue pas dans l'intestin. Il exerce ainsi un véritable drainage et l'acide peut être retrouvé dans les selles.

Par ses propriétés physiques, il réalise le meilleur pansement de la muqueuse.

Son action rapide contre l'élément douleur.

**Emploi.** — *Troubles légers*: 1/2 ou 1 cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.

*Ulcères*: 1/2 ou 1 cuillerée toutes les heures. Faire prendre le Contracide sec en conseillant de l'avaler à l'aide d'un peu de liquide.

Prix : 21 fr. 10.

**Laboratoires NORGAN.**

P. ALEXANDRE, Pharmacien,

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél.: Invalides 64-36.)

## CONTREXURIQUE

(ex-Anti-urique de Contrexeville).

Citrate sodique de Pipérazine.. 4 p. 100  
 Héxaméthylène-tétramine ..... 1 —  
 Benzoate de soude ..... 5 —

**Indications.** — Lithiase, Gravelle, Goutte, Obésité, Artériosclérose, Rhumatisme déformant et chronique.

**Forme.** — Granulés.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures dans un verre d'eau immédiatement avant les repas.

**Prix :** 17 fr. 60 (8 à 10 jours de traitement).

**Laboratoires du Dr PILLET**  
 222, boulevard Pereire — PARIS.

## CONVALBAÏNE

**Toni-cardiaque.**

**Composition.** — Association de Convallamarine (glucoside du muguet) et d'Ouabaine.

Comprimés contenant 1/2 cgr. de Convallamarine et 1 mgr. d'Ouabaine.

**Propriétés.** — **Toni-cardiaque.** Stimule d'autant plus puissamment le tonus du myocarde que les actions synergiques, de la Convallamarine et de l'Ouabaine se renforcent.

**Indications.** — Toutes les déficiences du myocarde : Grande asystolie, Insuffisance ventriculaire gauche, Petite insuffisance cardiaque, Insuffisance cardiaque des myocardites chroniques, Insuffisance ventriculaire droite, Myocardites des maladies infectieuses aiguës, Arythmie extra-systolique, Tachycardies.

**Présentation.** — Boîte contenant 36 comprimés, suffisante pour un mois de traitement.

**Posologie.** — Dose moyenne 2 à 3 comprimés par jour.

**Prix :** 30 francs.

**Laboratoire FERRIER**  
 12, rue Henner — PARIS (IX°)  
 (Tél. : Trinité 51-03.)

## COPHED

**Sirop calmant non hypnotique.**

Asepsie des bronches.

Traitement spécifique des Voies respiratoires.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 451-26.

**Composition.** — Association : Codéine, Ephédrine, Dionine, Belladone, Drosera, Sulfogalacolate de Potassium.

**Indications.** — Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Grippe, Laryngites, Pharyngites, Trachéite, Emphysème, Asthme, Coqueluche, Rhume des foins, Rhinites spasmodiques.

**Posologie.** — Le *Sirop Cophed* est d'un goût très agréable qui le fait accepter par les estomacs les plus délicats ; il peut être pris pur ou dans une infusion pectorale.

Les doses moyennes, sauf prescription spéciale du médecin traitant, sont les suivantes :

*Adultes :* 3 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures.

*Enfants* (au-dessus de 6 ans) : 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

**G. ROUSSEAU pharmacien.**

47, rue Bokanowski — ASNIERES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

## COPREX (Dragées de)

*Laxatif très doux, (garanti sans phénolphtaléine) et cholagogue prudent.*

**Composition.** — Son de grains d'orge, Sulfate de magnésie (à cette dose, il agit en provoquant un léger flux de bile), Chlorure de magnésium (principe rééducatrice des eaux de Châtel-Guyon), Extrait spécial de Cascara.

**Deux formes :**

**1° Coprex : dragées ordinaires :** une ou deux dragées, 1/2 heure de préférence *avant* l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

**2° Coprex : dragées demi-dose :** (représentant la moitié des dragées ordinaires), particulièrement recommandé aux personnes âgées, délicates, aux enfants, convalescents, opérés, accouchées. Prendre une dragée *à la fois* ou deux si l'effet est insuffisant.

La boîte vente pour un traitement de cinq semaines.

**Prix :** 14 fr. 90.

**Laboratoires du FÉMINADÈNE**  
 1 bis, rue Carcel — PARIS (XV°).

## COQUELICÔNES

Suppositoires contre la toux.

Extrait de coquelicot, eucalyptol ozonisé, droséra.

**AVANTAGES.** — Evitent fatigue de l'estomac et perte de l'appétit. Fluidifiants, antiputrides et antiseptiques, Exempts d'héroïne, de morphine, d'extrait thébaïque, de dionine, de bromoforme, ils ne provoquent pas de torpeur. Effet rapide, tolérance parfaite, aucune toxicité.

**INDICATIONS.** — La toux, quelle qu'en soit la cause, depuis le simple rhume ; maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires, toux émétisantes, toux nerveuses, coqueluche, toux chez les diabétiques, *sédatif par excellence de la toux des tuberculeux.*

**Formes.** — Trois formes : Coquelicônes pour adultes, Coquelicônes pour enfants, Coquelicônes pour bébés.

**Posologie.** — Coquelicônes pour adultes, pour enfants ou pour bébés : 1 à 4 par jour (l'absence de toxicité permettrait de doubler cette dose).

Prix : 21 francs la boîte de 12.

Pharmacie DUO

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Etolfe 11-96.)

## COQUELUCHYL

Traitement de la coqueluche et de ses complications et des toux spasmodiques.

### COQUELUCHYL GOUTTES

Exclusivement végétales.

Euphorba helioscopia, Ephedra, Grindelia Robusta, Drosera, Crataegus, Passiflore, Coquelicot, Serpolet, Saule blanc.

Le Coqueluchyl, non toxique, non irritant pour les voies digestives, n'a pas de contre-indication et peut être prescrit aux nourrissons.

**Dose habituelle dans les 24 heures.** — Jusqu'à 1 an : 4 fois X gouttes

De 1 an à 3 ans : 4 à 6 fois XV gouttes.

De 3 ans à 12 ans : 4 à 5 fois XXX gouttes.

Au-dessus : 4 à 6 fois XL gouttes.

### COQUELUCHYL BAUME

aux essences pénétrantes de Cyprès, Serpolet, Eucalyptus, Melaleuca, Pin et Camphre, véritable bain balsamique anti-infectieux, tonique, eupnéique. Application pratique de la méthode de Milne.

**Mode d'emploi.** — A tous les âges, larges applications sur le thorax main et soir, recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Spécialités inscrites au L. N. C. M. sous les n<sup>o</sup> 1244-8 et 1244-7.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,  
38, rue du Louvre — PARIS (1<sup>er</sup>).

(Tél. : Central 01-35.)

## CORAMINE

Diéthylamide de l'acide pyridine- $\beta$ -carbonique.

CIBA

CARDIO-TONIQUE EUPNÉIQUE.

Tonique du cœur, stimulant de la respiration et de la circulation.

Préparation aqueuse, très fluide. S'injecte facilement, n'est pas douloureuse et se résorbe rapidement. Action prompte et énergique. Bien tolérée par la voie buccale, elle permet d'instituer une médication cardio-tonique intercalaire entre les cures de digitale ou de strophantus. Aucune toxicité.

Possibilité de traitements très prolongés.

**Indications.** — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

**Gouttes.** — **Ampoules.**

**Doses.** — Voie buccale XX à C gouttes par 24 heures.

— parentérale 1 à 8 cc.

**Formuler.** — Flacon (gouttes)

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 5.

— de 20 — de 1 cc. 5.

— de 5 — de 3 cc.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Bd de la Part-Dieu — LYON. (Tél. : Muccey 43-26.)



## CORÉINE

Mucilage pur, sans adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal. Rien de commun avec les gommes.

La Coréine est un mucilage pur, indigestible, indestructible.

Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

**Indications.** — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

**Formes.** — Granulé, Paillettes, Semoule.

### Doses :

*Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Prix :** { Granulé, 25 fr. 80. Grand mod., 120 fr. 80.  
Paillettes, 23 fr. 50. — 109 francs.  
Semoule, 21 francs.

La Coréine est admise par l'Assistance publique.

### Pour absorber la Coréine.

**Paillettes.** — Le matin, mettre dans un bol la quantité de Coréine en paillettes prescrite, et verser dessus un peu de lait... ou de café au lait à raison de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.

Mélanger vivement et absorber de suite comme un potage.

A midi et le soir, mélanger la paillette avec quelques cuillerées de purée de légumes, de compote, de potage.

**Granulé et Semoule.** — Se prennent comme tous les granulés.

### Pansements Intestinaux Coréinés.

3 à 4 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillante en battant continuellement avec un agitateur en verre pendant quelques minutes. Laisser reposer 1/4 d'heure. Ajouter eau bouillie chaude pour obtenir émulsion semi-liquide. Introduire dans l'intestin avec tube d'écoulement large. Régler le débit avec une pince au lieu de robinet.

### Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès  
BOULOGNE-SUR-SEINE  
Tél. : Molitor 34-16.)

## COROSÉDINE

**Médication de la douleur cardiaque.**

**Forme.** — Comprimés dragéifiés et Ampoules injectables.

### Composition :

Aminophylline .....	0,075
(Vaso-dilatateur des artères du cœur et des reins).	
Chlorhydrate de papavérine. 0,01	
(Antispasmodique.)	
Phényléthylmalonylurée.....	0,01
(Sédatif du système nerveux.)	
Aminopyrine .....	0,10
(Analgésique.)	

### Propriétés thérapeutiques :

*Calme les douleurs cardiaques*, en empêchant l'ischémie du myocarde, par vaso-dilatation des coronaires.

*Tonifie le muscle cardiaque* par une meilleure irrigation.

*Augmente la diurèse* par vaso-dilatation des vaisseaux du rein.

*Calme la dyspnée*, par action sur le centre respiratoire et par action toni-cardiaque.

### Indications :

**Douleurs cardiaques :**

*Syndromes coronariens* : Angine de poitrine, Infarctus du myocarde.

*Insuffisance cardiaque douloureuse* (Cœur sénile, cœur de l'hypertension, cœur de l'artério-sclérose).

*Palpitations réflexes et névrosiques* (Extrasystoles, Tachycardie, Tachycardie paroxystique, cœur irritable, cœur Basedowien, etc.)

**Douleurs aortiques. Algies précordiales.**

### Posologie :

a) Deux comprimés 2 ou 3 fois par jour, au début des repas.

b) une ampoule en injection intramusculaire 1 ou 2 fois par jour.

Les cures prolongées constituent le meilleur traitement préventif des crises douloureuses.

**Prix :** Comprimés, 25 fr. 80. — Ampoules, 40 fr. 20.

### MONAL

**Docteur en Pharmacie.**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Invalides 52-73.)

## CORSIVERA

Médication anthelminthique.

**Composition.** — Ac. acétylamino-oxyphénylarsinique: 0,005; Extrait de mousse de Corse: 0,015; Extrait de petite absinthe: 0,025; Extrait de rhubarbe: 0,010; Extrait de séné: 0,010; Extrait de bourdaine: 0,015; Santonine: 0,005; Calomel: 0,015; pour 1 comprimé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit puissamment sur les protozoaires parasites de l'homme; relève en outre l'état général et le tonus nerveux grâce à la présence d'arsenic.

**Indications.** — CORSIVERA peut être employé avec succès contre le trichocéphale, mais ses indications électorales sont les oxyures et les ascaris.

**Posologie.** — 10 à 12 compr. par jour, pendant 3 jours consécutifs. **Adolescents:** 9 compr. pendant 2 jours consécutifs. **Enfants:** 6 à 9 compr. par jour, une fois par semaine, pendant 3 semaines.

Dans tous les cas, absorber les comprimés le matin à jeun avec une gorgée d'eau, ou écrasés dans un peu de miel ou de confiture.

Recommencer la cure après 3 semaines de repos.

Prix: 19 fr. 60 le flacon de 30 comprimés dragifiés.

**Laboratoires d'Études et de Réalisations**

**Pharmaceutiques de Paris « ETREFA »**

Administr.: 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)

Agence en zone libre: LE RAYOL (Var). (Tél.: 24.)

## CORTÉNIL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Hormone cortico-surrénale préparée par synthèse. (Acétate de désoxycorticostérone en solution huileuse).

**Propriétés et indications.** — Maladie d'Addison, Insuffisance cortico-surrénale. Infections graves ou chroniques. Brûlures étendues, états de choc et de collapsus, vomissements incoercibles de la grossesse. Asthénies. Hypotension artérielle.

**Posologie.** — Injecter par voie intramusculaire, selon la gravité de l'affection, de 1 ampoule par semaine à 2 ou 3 ampoules par jour.

**Présentation.** — Boîte de 3 ampoules à 5 mgr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél.: Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

**Composition.** — Association d'Iodaseptine (42 p. 100 d'iode) et d'Iodure de sodium (84,6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur, dont il régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

**Indications.** — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiopathies rhumatismales, Cardiosclérose, Œdème, Emphyseme, Mycoses. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

**Présentation.** — **Posologie:**

**Ampoules** de 5 cc. (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

**Solution à ingérer.** — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

**Dose.** — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Séries de 12 jours par mois.

**Prix:** La boîte de 10 ampoules 5 cc., 35 fr. 20.

Le flacon, 24 fr. 60.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél.: Suffren 53-70 et 53-71.)

## CORYDRANE

### Comprimés.

Nouvelle substance synthétique (corps U. C. B. 22) cristallisée et chimiquement définie :

**acétyl-salicylate de noréphédrane**

↓ analgésique antipyrétique ↓ décongestif tonique

*Analgésique.* — Calme les algies sans déprimer le malade.

*Antipyrétique.* — Par sédation de l'hyper-sensibilité des centres thermo-régulateurs.

*Décongestif.* — Action décongestive rapide et prolongée intéressant particulièrement les muqueuses nasale et bronchique.

*Tonique.* — Relève le tonus, combat la dépression, excite le système ortho-sympathique et soutient la résistance de l'organisme.

**Avantages.** — Action plus prolongée que celle de l'aspirine. Action tonique sans équivalent, corrigeant la somnolence et l'hébétéude et augmentant l'activité intellectuelle. *Corydrane* ne renferme ni caféine, ni pyramidon, ni barbituriques.

**Prenez plutôt un comprimé de CORYDRANE l'aspirine qui remonte.**

**Indications.** — *Courbatures fébriles*, Grippe, Coryza et leurs complications voir Rhinaiator). Algies, Névralgies, Migraines, Malaises menstruels, Douleurs et Malaises post-opératoires, Asthénie, Surmenage physique et intellectuel.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés, le matin et à midi.

**SOCIÉTÉ D'APPLICATION  
PHARMACODYNAMIQUES**

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°).  
(Tél. : Inv. 43-60, 43-61, 43-62.)

## CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicyllique (0 g. 50) et de Sanédrine (0 g. 015) pour un comprimé.

**Indications.** — Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu, Rhume des foins, Trachéo-bronchite grippale ou non, Névralgies post-opératoires.

**Présentation.** — Tubes de 20 comprimés.

**Posologie et mode d'emploi :**

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans un demi-verre d'eau.

Prix de vente :

Le tube de 20 comprimés.... 8 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## CRATÆGINE

La CRATÆGINE renferme la totalité des principes actifs des fleurs d'aubépine, qui doivent être, à cet effet, récoltées récemment, mondées avec soin et complètement épuisées par un procédé spécial, après avoir été stabilisées par le procédé Perrot et Goris.

**Indications thérapeutiques.** — Éréthisme cardiaque de tout ordre des affections fonctionnelles comme des affections organiques du cœur. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause, palpitations, bouffées de chaleurs, bourdonnements d'oreilles, irritabilité. Tachycardie paroxysmique essentielle. Goitre exophtalmique.

**Mode d'emploi et posologie.** — XV à XX gouttes, deux ou trois fois par jour, avec un peu d'eau sucrée, 1 heure avant ou 2 heures après les repas, suivant l'avis du médecin traitant.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire BOUSQUET**

20, rue Grémont — ELBEUF (Seine-Inférieure).



## CRATÆGOL BOULET

**Composition.** — Extrait total de *Cratægus oxyacantha*. Contient le complexus chimique intégral de la plante, sous sa forme la plus assimilable, la plus stable, la plus concentrée. Ne doit pas être confondu avec la teinture, ni avec l'extrait fluide d'aubépine.

### Indications. Posologie.

1° *Régulateur du système vago-sympathique.* — (CLÉMENT, REILLY, L. RÉNON, etc.)

a) États nerveux de la ménopause. } 5 fois XX gouttes par jour.

b) Petits états anxieux. ....

c) Insomnies, énurésie. :

Adultes : LXXX gouttes le soir.

Enfants : V gouttes le soir par année d'âge.

2° *Toni-cardiaque.* — (HUCHARD, H. LECLERC.)

S'utilise comme adjuvant ou intercalaire des cures digitales 3 fois XXX gouttes par jour.

3° *Troubles circulatoires.* — (LAUDER-BRUNTON, H. LECLERC, REYNAUD.)

a) Éréthisme cardio-vasculaire : 3 fois XXX gouttes par jour.

b) Hypertension artérielle } 5 fois XX gouttes par jour.

c) Algies veineuses. ....

Sans accoutumance, ni toxicité, CRATÆGOL permet un usage prolongé, même chez les enfants.

**Laboratoire G. BOULET**

14, rue Eugène-Delaurois — PARIS (XVI\*).

## CRAYON TERMOSAN

### Composition :

Oleorésine de Capsicum.....	0,75
Menthol.....	1,50
Salicylate de Méthyle.....	2,00
Camphre.....	2,00
Acide Salicylique.....	0,50
Essence de Térébenthine.....	2,00
Essence de Lavande.....	1,50
Essence de Thym.....	1,50
Essence d'Eucalyptus.....	2,50

pour 1 crayon.

**Propriétés :** Grâce à ses composants, il possède une puissante action thermogène, anesthésique, antiseptique, désinflammatoire, décongestive et stimulante de la circulation. Il pénètre facilement à travers les tissus.

**Indications :** Refroidissements, fatigue musculaire et articulaire, névralgies, rhumatismes, sciaticques, angines, crampes et coups.

**Présentation :** Révulsif solide en bâton, dans un tube à glissière.

**Mode d'emploi :** Frotter légèrement la partie affectée pendant quelques secondes. Pour intensifier l'action, couvrir avec coton ou linge de laine.

Si l'intensité de la maladie nécessite plusieurs applications, il est recommandé de nettoyer la région avec de l'alcool avant chaque application, afin de faciliter la pénétration des essences.

**Laboratoire du Docteur BOUCARD**

30, rue Singer — PARIS. (XVI\*.)

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## CRÉAGÉNOL

Médication reconstituante et tonique

**Composition.** — Inositolphosphate de chaux et de magnésie. Gluconate de chaux, en granulé sucré.

**Indications.** — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme, Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

### Mode d'emploi :

Adultes : une à deux cuillerées à café, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : une cuillerée à café, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût agréable.

Prix : 21 fr. 10.

**Laboratoire OORBIÈRE**

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII\*.)

(Tél. : Carnot 78-11.)

## CRÉDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

Communication à l'Acad. des Sciences du 1 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 3 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France du 24 janvier 1930.

### Indications :

Algies : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Aigles cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

États infectieux : Grippe, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

Nervosisme : Insomnie, Agitation, Anxiété.

### Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE

## CRÈME RÉSOLUTIVE RAP

**Composition.** — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à actions fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Marron d'Inde, Noix vomique, Arnica, etc.)

**Propriétés.** — Calme la Phlébaldgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

**Indications.** — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

**Mode d'emploi.** — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en vaporisation.

**Prix :** 15 fr. 70 et 21 fr. 40.

Enregistré L. N. C. M. n° 20-6.

Laboratoires du Dr R. OAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

## CRÉOFRUITS

**Composition.** — Créosote associée au Thio-col et au chlorure de Calcium, dissous dans des jus de fruits naturels pour améliorer le goût et la digestibilité.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes les propriétés de la Créosote; désinfecte l'arbre pulmonaire, stimule l'état général, désinfecte le sang. Désinfection des voies aériennes.

**Indications.** — Adénopathie trachéobronchique, Adénite, Adénoïdite, Rachitisme.

**Mode d'emploi.** — 1 à 4 cuillères à soupe par jour.

**Prix :** 18 fr. 10, flacon 210 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Mouleau — ARCACHON.

## CRÉOSITOIRES

Méthode d'imprégnation créosotée par voie rectale à base de Créosote de hêtre pure et éteinte.

Suppositoires actifs et non catartiques.

### Composition :

Créosote de hêtre	Adultes (athébaïques).	Infantiles.
pure éteinte.	0 gr. 50 (XX g <sup>tes</sup> )	0 gr. 125 (V g <sup>tes</sup> )
	P. 1 suppositoire adulte.	P. 1 supposit. enfant.

(La forme opiacée est provisoirement supprimée.)

**Indications.** — Toutes les affections pulmonaires aiguës ou chroniques de l'adulte et de l'enfant, Bronchites, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Absès du poulmon. Prophylaxie des complications pulmonaires grippales, rubéoliques et des accidents anesthésiques. Destruction des oxyures.

**Prix** (la boîte de 8) : Adultes : 18 fr. 60. Infantiles : 14 fr. 90.

**Posologie.** — 1 à 3 par jour suivant avis médical.

Laboratoires MARGEX

Docteur P. LAURENT, Pharmacien,

13, rue Mélingue — PARIS (XIX<sup>e</sup>). (Tél. : Botz. 56-44.)

## CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène-Créosote. Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (96 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieure à l'Iodoforme dans tous ses emplois.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

**Indications.** — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

**Mode d'emploi.** — Existe sous quatre formes :

- 1° Créosoforme-Poudre, pour saupoudrage des plaies.
- 2° Créosoforme-Onguent, présenté en tubes d'étain.
- 3° Créosoforme-Ovules, pour pansements gynécologiques.
- 4° Créosoforme-Suppositoires, 1 ou 2 par jour.

**Prix :** Poudre, ovules, suppositoires : 23 fr. 75 ; Onguent : 14 fr. 40.

Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.  
à PRÉMERY (Nièvre).

## CRÉO-SUPPO-CAMPBRE

Traitement des affections bronchiques.  
Imprégnation créosotée par voie rectale.

### Formule :

<b>Adultes :</b> Créosote pure. XV gouttes .....	0 gr. 40
Camphre .....	0 gr. 05
Véhicule spécial .....	Q. S. pour 1 suppositoire.
<b>Enfants :</b> Créosote pure. VIII gouttes .....	0 gr. 20
Camphre .....	0 gr. 03
Véhicule spécial .....	Q. S.
<b>Nourrissons :</b> Créosote pure III gouttes .....	0 gr. 075
Camphre .....	0 gr. 015
Véhicule spécial .....	Q. S.

**Indications.** — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agit de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.

Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après toute infection, Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Rougeole.

**Laboratoire REBOUL** — A. DELAUNEY, Pharmacien.  
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, Docteur en médecine.

62, av. de Paris — VILLEJUIF (Seine). (Tél. : Italie 12-24.)

## CRÉSENTYL

Le CRÉSENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminthique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRÉSENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (Lambli, Balantidium, etc.). Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRÉSENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

**MODE D'EMPLOI.** — Désinfection intestinale ; 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

**Vermifuge :** Adultes, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de Crésentyl à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de Crésentyl à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 15 francs.

### Laboratoires des ANTIQÉNINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr  
PARIS (V°).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI°).

## CRÉSOLARGOL

### Suppositoires.

Médication créosotée par voie rectale.

	Adultes.	Enfants.
Créosote de Hêtre purifiée.....	0,50	0,25
Argent colloïdal.....	0,02	0,01

par suppositoire.

**Indications.** — Traitement et protection des Voies respiratoires : grippe, bronchite, états fébriles, toutes affections pulmonaires. Sans intolérance et sans contre-indication ni causticité.

### Présentation :

En boîtes de 8 suppositoires : 20 fr. 20.

### Doses :

1 à 2 suppositoires par jour.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403.

### ASSOCIATION TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE

T. VINCENT, Pharmacien.  
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## CRINAMINE

Traitement des affections de la gorge et de la bouche.

### Composition :

Chlorométhylate neutre de Diaminoacridine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Rhodanate de calcium, Stovaine.

### Acte on thérapeutique :

Antiseptique et bactéricide remarquable convenant à tous les états infectieux.

Vaso-constricteur décongestionnant la muqueuse irritée.

Balsamique et cicatrisant.

Anesthésique.

### Indications :

Toutes les affections de la bouche et de la gorge : Aphtes, Palatites, Stomatites, Gingivites, Enrouement, Angine pseudo-membraneuse, Angine de Vincent, Trachéite, Laryngite, etc.

### Doses :

Une à deux pastilles toutes les heures à laisser fondre lentement dans la bouche.

Laboratoires FOURNIER et Cie

DIJON

J. LE LOUS, pharmacien.

## CRINEX

### Dragées - Gouttes - Ampoules.

**Composition.** — Extrait ovarien total standardisé (procédé Biosymplex).

**Dragées à croquer :** 1 dragée = 5 gouttes.

**Gouttes :** Solution hydroalcoolique. 1 cc. (45 gouttes) correspond à 0 gr. 30 de glande.

**Ampoules injectables :** Solution aqueuse isotonique, indolore, 10 unités Doisy-Curtis par cc.

**Indications.** — Insuffisances ovariennes, Dysménorrhées, Oligoménorrhées, certaines Aménorrhées, Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale, Affections générales par insuffisance ovarienne, Obésité, Eczémas, Prurits, etc., certaines Stérilités.

**Avantages.** — Actif par voie buccale à faibles doses. Contient toutes les hormones de l'ovaire. Provient exclusivement d'ovaires d'animaux jeunes.

Contrairement aux folliculines, *Crinex* agit en stimulant l'ovaire ou en remplaçant *intégralement* sa sécrétion (castration).

**Posologie.** — Pendant les 20 jours qui suivent les règles ou leur époque présumée, ou pendant les 10 jours qui les précèdent (dans certaines oligoménorrhées, dysménorrhées), prescrire :

Dose moyenne : 3 à 6 dragées ou 15 à 30 gouttes par jour en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas.

Suivant le résultat : maintenir la dose initiale, l'augmenter progressivement jusqu'à 9, 10, 14 dragées ou 45, 50, 70 gouttes.

Ou, au contraire, la ramener à 1, 2 dragées ou 5 à 10 gouttes.

*Croquer soigneusement les dragées.*

Prendre les gouttes dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre que la malade laissera fondre lentement dans la bouche (absorption *per linguam*).

**Ampoules injectables :** Tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter 1 ampoule seule ou associée à l'autohémothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-1.

### Prix :

80 dragées.....	24 francs.
Le flacon (12 à 25 jours).....	24 francs.
Le double flacon.....	44 francs.
La boîte de 6 ampoules.....	26 fr. 50

### Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Alésia 28-51.)

## CRINHÉMOL

**Composition.** — Association endocrino-médicamenteuse. Extraits hépatique, orchitique, splénique. Fer. Arsenic. Acide phosphorique. Manganèse. Magnésium.

**Indications.** — Tonique général et nerveux. Hématopoïétique. Anémies de toute nature (médication pathogénique n'excluant pas les indications étiologiques). Asthénies. Convalescences. Anorexies. Déficiences fonctionnelles. Etats alcalésiques.

**Forme.** — Ampoules buvables.

**Posologie.** — Deux ampoules par jour. Doses spéciales pour enfants et adultes. Préparation spéciale pour les tuberculeux (*Crinhémol T* sans fer ni arsenic). Prise quotidienne pendant 8 à 10 jours. Intervalles de même durée entre chaque cure. Prix : 38 fr. 80 et 23 fr. 40 pour adultes (10 à 15 jours de traitement); 33 fr. et 18 fr. 10 pour enfants (10 à 15 jours de traitement).

**Laboratoires Docteur DEMASIES**

8, rue du Musée — VIENNE (Isère). (Tél. : 9-71.)

## CRINOCARDINE LALEUF

**Composition.** — Crinocardine simple

Extraits concentrés spéciaux de :

Myocarde, Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

Associations diverses :

Crinocardine Digitalique.

— Strophantique.

— Digitalo-Strophantique.

— Scillitique.

— Apocynique.

— Spartéinée.

### Propriétés et Indications.

Troubles cardio-vasculaires de toute origine, Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes, Spasmes, Angines de poitrine, etc.

Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences, Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

### Formes.

Ampoules buvables et comprimés dragéifiés.

### Posologie et mode d'emploi.

1 ampoule (ou 5 comprimés) le matin, à jeun, dans un peu d'eau, pendant 10 jours consécutifs. Si nécessaire une seconde ampoule (ou 5 comprimés) au cours de la journée.

### Durée moyenne des unités de vente.

10 jours.

Prix de vente au public :

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. (simple ou composée): 40 francs.

Étui de 50 comprimés (simple ou composée) : 26 fr. 50.

**Laboratoires LALEUF**

**Georges DUQUÉ, Docteur en pharmacie**

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## CRINOFLUX

Complexe **Ovaro-végétal** stabilisé renfermant :

Suc total d'ovaires frais **Byla**

Intrait de marrons d'Inde **Dausse** { —

Alcoolatures d'Anémone, Arnica et Noix vomique.

Extraits américains de Cypres, Viburnum Hamamelis virginica, Bourse à pasteur. Q. S.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Tous les troubles de la circulation du sang et leurs multiples conséquences ; puissant antihémorroïdal, Varices, Phlébites, Puberté. Ménopause. Maladies de l'utérus et de ses annexes.

**Doses.** — *Moyennes* : XX gouttes 2 fois par jour avant les repas.

*Cas aigus* : XXX gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 22 fr. 50 (pour 20 jours de traitement).

L. N. C. 1364-6.

Laboratoires à **LYON** (Rhône)

52, rue Germain.

Tél. : Lal. 32-40.

## CRINO-MENSTRYL

Régulateur des fonctions ovariennes.

**Formes :**

1° **Comprimés** : Ovaire-Folliculine-Lobe antérieur d'hypophyse.

2° à 6 comprimés par jour, pendant les 15 jours de la période intermenstruelle.

2° **Injectable** :

2 ampoules d'hormone gonadotrope ;

2 ampoules de solvant ;

2 ampoules de folliculine à 5 000 U. I.

En principe, le rythme des injections doit s'entendre :

Pour l'hormone gonadotrope, les 5° et 10° jours après la fin des règles ;

Pour la folliculine, les 15° et 20° jours.

**Indications.** — Toutes les insuffisances ovariennes, Aménorrhées, Oligoménorrhées, Dysménorrhées, Puberté, Ménopause, Obésité, Stérilité, Leucorrhée.

Laboratoires **FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).

(Tél. : Diderot 86-4° es groupées.)

## CRINOPANCRINE

Synergie endocrino-végétale, hypotensive et antispasmodique.

**Forme.** — Dragées.

**Action.** — Traitement de l'hypertension artérielle et de ses conséquences. Médication d'action constante et sûre favorisant l'équilibre du système vago-sympathique.

**Composants.** — Extrait de Pancréas désinsuliné (correspondant à 125 de son poids de substance fraîche), Chlorophyllé, Nitrite de Sodium, Extrait sec de Scille (abaissement progressif du taux de l'Urée), Extrait sec d'Aubépine, Extrait mou de Belladone (0 gr. 0013 par dragée) (aucune adjonction de barbiturique).

**Indications.** — Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Spasmes vasculaires, Troubles visuels, Vertiges, Excitabilité, Angoisse, Emotivité, Insomnie nerveuse.

**Posologie.** — 3 à 6 dragées par jour avant les repas. — Traitement d'attaque : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des grandes hypertensions : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des hypertensions moyennes : 3 dragées par jour. Troubles névropathiques : 3 à 6 dragées par jour. — D'une innocuité absolue, les cures de CRINOPANCRINE peuvent être prolongées sans inconvénient.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 586-16.

(Littérature et échantillons.)

Laboratoires **DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°). — (Tél. : Roquette 14-12.)

## CRINO-SÉRUM

dénommé { **CRINO-ENFANT** (de 0 à 10 ans)  
**CRINO-ADULTE** (à partir de 10 ans.)

**Le CRINO-ENFANT** réalise l'opothérapie infantile pluri-glandulaire de la première enfance. Il est le régulateur par excellence du développement physique et mental des nouveau-nés et des enfants.

L'activité reconnue de ce produit est due, en dehors des extraits endocriniens qu'il contient, à l'adjonction de *duodénium* qui influence favorablement le tube digestif des nourrissons et des enfants (vomissements, dyspepsies, entérites, eczémas).

**Mode d'emploi :**

De 0 à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 3 à 6 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 40.

**Le CRINO-ADULTE** s'emploie à partir de 10 ans. C'est un régulateur nerveux et circulatoire de l'adolescence et de l'âge critique des deux sexes. Sa composition très complète avec extraits cérébraux et médullaires permet de l'utiliser avec succès dans la déficience cérébrale et dans le surmenage intellectuel.

**Doses.** — 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 24 fr. 90.

L. N. C. M. : **Crino-Enfant**, n° 1606-4. **Crino-Adulte**, n° 1606-5

Laboratoire **MOURE** (P. COTARD, Pharmacien).

5 bis, bd des Italiens, passage des Princes — PARIS (II°).

## CRINO-STHÉNYL

**Complexe endocrinien des « glandes de l'énergie ».**

Surrénale, Hypophyse, Glandes génitales, Foie, Parathyroïde, Thyroïde.

### Formes :

*Comprimés* : 3 à 6 comp. par jour au milieu des repas.

*Sirop* : 1 cuillerée à dessert = 2 comprimés.

*Ampoules inj.* : 1 ampoule par jour.

**Indications.** — Asthénies, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences, Enfants instables, Inattention scolaire.

**Laboratoires FOURNIER Frères,**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

## CRINO-TENSYL

*Régulateur de la tension artérielle,  
de la circulation et de la nutrition générale.*

*Une seule forme : comprimés.*

Parenchyme rénal ..	0,15	Phényléthylmalony-	
Pancréas désinsuliné.	0,10	lurée .....	0,005
Glandes génitales ....	0,30	Papavérine .....	0,003
Iode organique.....	0,01	Aminophylline ....	0,02

**Posologie.** — *Cure normale* : 2 comprimés au début de chacun des 3 repas, pendant 3 semaines.

*Cure d'entretien* : 1 comprimé au début de chacun des 3 repas, 15 jours par mois.

**Indications.** — Hypertension artérielle. Artério-sclérose et Pré-sclérose. Troubles circulatoires et Spasmes vasculaires. Pléthorisme et Obésité. Troubles de la Ménopause et de la cinquantaine.

**Laboratoires FOURNIER Frères,**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

## CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

**Indications :**

**Tuberculose pulmonaire.**

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses, Asthme.

**Présentations.** — Ampoules contenant 0 g. 02, 0 g. 05, 0 g. 10, 0 g. 15, 0 g. 20, 0 g. 25, 0 g. 35, 0 g. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bidistillée est jointe à chaque dose.

**Posologie et mode d'emploi.** — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 g. 05 ou 0 g. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Asthme et arthrites 0 g. 02 à 0 g. 05. Prix de vente (suivant dosage et conditionnement).

Société Parisienne l'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## CRUXOL

Adjuvant complet de croissance des Enfants  
Médication polyglandulaire et polyvitaminique  
des Adultes et Personnes âgées.

**Composition.** — Hormone du lobe antérieur de l'Hypophyse agissant en corrélation avec les extraits endocriniens : Thymus, Thyroïde, Orchitique, Surrénal, agissant à doses conjuguées.

Les 4 vitamines (unités actives).

Les sels minéraux de croissance.

L'extrait de Boldo (insuffisance hépatique).

### Présentation :

Trois préparations suivant l'âge.

#### 1° Cruxol Bébé :

En neige fondante pour les nourrissons, agissant en milieu neutre.

Préparation vitaminée avec sels minéraux lab ferment et papaine destinée aux nourrissons et jusqu'à 2 ans.

**Prescrire.** — Ne pas donner de jus de fruits acides. Mettre dans la bouche du bébé ou faire dissoudre dans quelques gouttes d'eau et donner au bébé avant chaque tété ou biberon une dizaine de petits granules neige fondante. Augmenter suivant le nombre de mois, la dose à utiliser dans les 24 heures allant de  $\frac{1}{2}$  à 2 cuillerées à café.

La boîte : 26 fr. 30.

#### 2° Cruxol granulé ou Cruxol comprimés :

Pour les enfants de 2 ans à 7 ans, en boîte métallique.

**Prescrire.** — Une cuillère à café de granulé à croquer avant chacun des 2 principaux repas, ou 2 comprimés. Traitement à suivre pendant 20 jours de suite par mois, puis repos de 10 jours et reprendre le traitement (quelques mois).

La boîte : 28 fr. 70.

**3° Cruxol (ampoules buvables),** en boîte de 2 séries de 6 ampoules, à partir de 7 ans.

Prendre dans  $\frac{1}{4}$  de verre d'eau sucrée le contenu d'une petite ampoule avant le repas de midi, et le contenu d'une grande ampoule avant le repas du soir.

Traitement à suivre pendant quelques mois : au début, trois semaines de suite sans interruption ; puis une semaine sur deux, sauf autres indications médicales.

La boîte : 32 fr. 20.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle, n° 696.

Laboratoire MONIN

Bureaux et Correspondance.

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX°). (Tél. : Trudaine 37-45.)

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Adoptée par les Ministères de la Guerre, de la Marine et par l'Assistance publique.

La **Cryogénine Lumière** représente le médicament antipyrétique-analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux de toute origine.

La **Grippe** ne résiste pas à l'administration, à doses suffisantes, de **Cryogénine Lumière**.

Elle permet d'éviter les bains froids dans la **Fièvre typhoïde**.

Contre le symptôme douleur, la **Cryogénine Lumière** exerce une action nette, rapide, durable.

Aucune accoutumance ni accumulation.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Il n'existe aucune contre-indication.

Son innocuité absolue en fait le médicament de choix chez les enfants.

### Indications :

Fièvre, Grippe, Douleurs, Névralgies, Dysménorrhée

### Formuler :

Un tube de comprimés à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Une boîte de cachets à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

### Doses :

**Adultes :** 1 à 6 comprimés ou cachets à 0 gr. 50 par jour et davantage en cas de besoin.

**Enfants (doses moyennes) :**

De la naissance à 15 mois, 0 gr. 10.

De 15 mois à 3 ans, 0 gr. 15 à 0 gr. 25.

De 3 ans à 5 ans, 0 gr. 25 à 0 gr. 40.

De 5 ans à 15 ans, 0 gr. 40 à 0 gr. 75.

A partir de 15 ans, 0 gr. 75 à 2 gr.

Ces doses peuvent être dépassées.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.



## CRYOSAN

**Composition.** — Soufre combiné et dissimulé, térébenthine du pin purifiée, huile pyrogénée du *Juniperus oxycedrus*.

**Propriétés.** — Antiseptique, cytophylactique, antiprurigineux désodorisant, cicatrisant.

**Indications.** — Eczéma sous toutes ses formes, psoriasis, lichens, mycoses diverses, herpès, urticaire et toutes dermatoses prurigineuses.

**Présentation et prix.** — 18 fr. 60 le flacon de 15 grammes.

**Mode d'emploi.** — Faire trois applications par jour à l'aide du pinceau joint au flacon.

**Les Laboratoires Lorrains  
de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

## CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

**Constitution.** — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent, sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrie. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

**Indications.** — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas.) Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antiseptique générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTHALMOLOGIE

**Formuler :** Usage interne : Encls de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophtalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE :** 45, rue Villon — LYON.

## CRYPTOSOTE

Ancien Cryptosote Néda.

**Composition :**

Association : Créosote, Eucalyptol, etc.

**Propriétés thérapeutiques :**

Tonique et Antiseptique pulmonaire, Sédatif de la toux et Antithermique.

**Indications :**

Affections pulmonaires : Suppurations broncho-pulmonaires, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Bronchites aiguës et chroniques, Congestions pulmonaires, Complications pulmonaires de la grippe, rougeole, scarlatine, Complications pulmonaires post-opératoires.

**Présentations :**

Dragées à noyau mou, avec enveloppe spéciale glutinisée insoluble dans l'estomac, soluble dans l'intestin, pour protéger l'estomac de l'action irritante de la créosote.

2 modèles : boîte normale 60 dragées ;  
triple boîte 180 dragées.

**Suppositoires.** Forme torpille qui facilite leur introduction.

3 dosages : adultes, enfants, bébés.

**Formules.**

*Dragées :*

Créosote .....	0,05
Eucalyptol .....	0,01
Tannin .....	0,05
Benjoin .....	0,05
Excipient .....	Q. S.

*Suppositoires :*

	Adultes.	Enf.	Bébés.
Créosote .....	0,50	0,25	0,05
Eucalyptol .....	0,10	0,05	0,01
Tannin .....	0,25	0,25	0,05
Benjoin .....	0,25	0,25	0,05
Excipient .....	Q. S.	Q. S.	Q. S.

par unité.

**Posologie :**

**Dragées.** { Adultes : 6 à 12 dragées par 24 heures.  
              { Enfants : 2 à 6 — — — — —

**Suppositoires :** 2 suppositoires par 24 heures.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les nos 784-3, 4, 5, 6,

**Laboratoires DANEY**

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 27-10.

## CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

**Indications.** — Pré-tuberculose et tuberculose.

**Présentation.** — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

- 1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;
- 2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.)

**Doses et mode d'emploi.** — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

**Prix** { intraveineux, 36 fr. 60 la boîte de 6 amp.  
intramusculaire, 30 fr. 50 la boîte de 6 amp.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmacien.**  
5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

## CUPRANINE

Préparation à base de sulfate de cuivre.

**Pommade forte** : Furoncle, anthrax, mycoses, eczéma, plaies, chancres mous.

Prix : 14 fr. 70.

**Pommade faible** : Acné, sycosis, eczéma, brûlures, plaies, ulcères, gale, zona.

Prix : 14 fr. 70.

**Poudre** : Plaies, brûlures, eczéma.

Prix : 11 fr. 40.

**Pilules** : Grippe, furonculose, infections intestinales, tuberculose, suppurations pulmonaires.

Prix : 13 fr. 40.

**Comprimés** : Grippe (en lavements), lotions, hygiène.

Prix : 11 fr. 40.

**Ampoules** : Suppurations profondes, lymphangites, furonculose, anthrax, streptococcies, fièvre puerpérale.

Prix : 29 fr. 70.

**Établissements P.-V. LÉGER,**

17, avenue Thermale — VICHY (Allier)

## CUPRASE

du Docteur GAUBE du GERS contre le cancer.

Cuivre colloïdal albumosique. Guérit souvent, arrête toujours l'évolution du cancer. Une forme : Boîte de 8 ampoules de 5 cc. pour injections sous-cutanées.

**Action thérapeutique et Usages.** — Préconisée pour la décanérisation dans toutes les formes. La Cuprase possède de remarquables propriétés contre les néoplasies anciennes ou récentes, ulcérées, quel qu'en soit le siège.

Elle arrête le développement des tumeurs malignes ; elle est capable de supprimer avec le temps les tumeurs et les ulcères malins.

**Posologie et Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, une ampoule de 5 cc. tous les 4 jours d'abord, puis, après la 4<sup>e</sup> injection, une ampoule tous les 5, 6 ou 7 jours suivant tolérance. Le Cuprase n'est point toxique. Prix : 69 fr. 60.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-2.

**Laboratoires DUCATTE**  
191, rue Saint-Honoré, Paris — (Tél. : Opéra 68-80.)

## CUPRAZUROL

**Composition.** — Collyre à base de :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Stovaine.....	0 gr. 05
Chlorhydrate d'Éthylhydrocupréine (optochin).....	0 gr. 10
Eau distillée.....	10 gr.

**Indications.** — Conjonctivites granuleuses, Trachomes, Kératites granuleuses, Catarrhe printanier, Larmoiement.

*Instillations indolores.*

Disparition rapide de la douleur due aux granulations.

**Mode d'emploi.** — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour. Dans les milieux contaminés, continuer longtemps le traitement contre la conjonctivite ou la kératite granuleuses, si tenaces, et sujettes à rechutes.

1 flacon-ampoule compte-gouttes de 15 cc.

**Laboratoires LAITER**

**P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie**  
52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS.  
(Tél. : Flandre 00-55.)

## CUPRÉMONE

 Médication des troubles de la circulation sanguine et des déficiences endocriniennes.

### 1<sup>o</sup> CUPRÉMONE SIMPLE

**Composition.** — Extraits de : cupressus, anémone, hamamélis, marron d'Inde, viburnum, sénéçon, condurango et cratégus, teinture de noix vomique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Extraits fluides préparés dans le vide, action toujours égale et constante. *Régularise et stimule la circulation sanguine.*

**Indications.** — *Varices, Phlébites, Œdèmes des jambes, Hémorroïdes; toutes maladies du système veineux.*

**Posologie.** — XX à XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau, sucrée si possible.

Cette dose peut être portée à L gouttes en cas de crise hémorroïdaire; Le traitement doit être arrêté pendant la période menstruelle; la grossesse n'est pas une contre-indication.

Prix : 18 fr. 80 le flacon pour un traitement d'un mois environ.

### 2<sup>o</sup> CUPRÉMONE « F ».

**Composition.** — *Folliculine purifiée rigoureusement titrée (2 500 unités physiologiques pour 100 cc. de préparation) associée au complexe végétal « Cuprémone ».*

(II gouttes égalent une unité physiologique de folliculine.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de choix, par voie buccale, des désordres génitaux et des troubles circulatoires. Activité nettement supérieure à celle de la folliculine cristallisée.

**Indications.** — *Puberté, Dysménorrhées, Ménopause (naturelle ou artificielle), Insuffisance ovarienne et toutes affections veineuses consécutives (inflammations, dilatations, œdèmes, ulcères, etc.).*

**Posologie.** — XX à XL gouttes 2 fois par jour, dans le courant de la matinée ou de l'après-midi, dans un peu d'eau, sucrée si possible. 3 semaines par mois, en dehors des règles.

Prix : 24 fr. 80 le flacon pour un traitement d'une semaine environ.

### 3<sup>o</sup> CUPRÉMONE « M ».

**Composition.** — *Extraits glandulaires : orchitique, surrénalien, hypophysaire et thyroïdien associés au complexe végétal « Cuprémone ».*

**Propriétés thérapeutiques.** — Action régulatrice et tonique sur le système veineux, correctrice des déséquilibres organiques dus aux déficiences endocriniennes.

**Indications.** — *Tous les troubles du système veineux chez l'homme (varices, hémorroïdes, ulcères variqueux, phlébites, œdèmes post-phlébitiques, etc.).*

*Déséquilibres endocriniens de la cinquantaine et du vieillard.*

La *Cuprémone M* peut être employée chez la femme, seule ou en association avec la *Cuprémone F* (médication orchitique).

**Posologie.** — XX à XL gouttes avant chacun des 2 principaux repas, dans un peu d'eau, sucrée si possible.

Prix : 25 fr. 80 le flacon pour un traitement d'une semaine environ.

**Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETRÉFA »**

R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZUY, Pharmaciens.  
Administr. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)  
Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## CUPRESSIODE

### Gouttes.

Spécifique des maladies de la cinquantaine chez l'homme.

### Formule :

Iode assimilable.....	1 gr. 50
Ext. fl. Cupressus stabilisé...	5 gr.
— Marron d'Inde stabilisé.	5 gr.
— Gui stabilisé.....	10 gr.
— Aubépine stabilisé.....	2 gr. 50
— Genêt stabilisé.....	2 gr. 50
Alcoolature d'anémone.....	2 gr. 50

Excipient : Q. S. pour 100 gr.

**Indications.** — Troubles fonctionnels cardio-vasculaires. — Hypertension. — Artério-sclérose. — Angine de poitrine. — Spasmes divers.

### Posologie :

XX à XXX gouttes à la fin des 2 repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

M. AUZOUX, Pharmacien.

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## CUPROBALT

**Composition.** — Association de Silicates de manganèse, fer, cuivre, nickel et cobalt.

**Indications.** — Diabète sous toutes ses formes. Toutes ses complications. Pas d'intolérance, ni d'incompatibilités.

**Présentation.** — Dragées.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 dragées avant chacun des 2 repas principaux. Dans les cas graves, cette dose peut être doublée.

**Laboratoire GRYSA**

A. BOULANGER, Pharmacien

7, rue Saint-André — LE MANS.

## CUPRO-SALYL

du D<sup>r</sup> QUESNEVILLE

Solution concentrée à diluer avant l'emploi.  
Traitement local des *Hémorroïdes* et *Lésions anales*  
par lotions, tamponnements, compresses.

Médication propre, sans odeur, sans corps gras.

**Composition.** — Différente des formules usuelles.

1° Action sédative et antispasmodique par composé **acéto-salicylé de cuivre** en solution stabilisée.

2° Action décongestive par un choix de **sels ammoniacaux neutres**.

3° Action anti-infectieuse par **oxycyanure Hg associé au chloral**.

L'emploi en soins hygiéniques calme les crises aiguës, diminue la fréquence des poussées congestives. A utiliser aussi après les interventions locales.

**Dose.** — 1 cuillerée à café dans un verre d'eau.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 422-2.

**P. CLÉMENT-COLLESSON**

Pharmacien de la Faculté de Paris

11, rue Léon-Giraud — PARIS (XIX<sup>e</sup>)

## CUPROXIL

Désinfectant gynécologique et urinaire.

**Composition.** — 100 grammes contiennent :

Boro-saucylate de soude.....	53,39
Sulfate de cuivre desséché.....	12,51
Chlorate de potassium.....	34,100

**Propriétés.** — Désinfectant gynécologique, Microbicide, Décongestionnant, Désodorisant.

**Indications.** — 1° Hygiène intime quotidienne.

2° Traitement des Leucorrhées en général, des Vaginites, Vulvites, Vulvo Vaginites, Métrites, Salpingites, Salpingo-ovaires, etc.

3° Blennorrhagie.

**Avantages.** — Antiseptique puissant, non caustique, ne tache pas le linge, d'odeur agréable (parfumé à l'eau de Cologne). Action décongestionnante et sédative. Sensation de bien-être.

**Forme.** — Poudre blanche, entièrement et rapidement soluble dans l'eau tiède, à laquelle elle communique une légère teinte vert clair.

**Mode d'emploi.** — Lavages, injections et irrigations tièdes (y compris la période des règles). Faire dissoudre le contenu d'une mesure dans 2 litres d'eau.

**Emploi général.** — Désinfectant général en lavages externes, notamment en gargarismes.

Flacon d'environ 50 doses.

**Produits POLYPHARMA**

Concess<sup>rs</sup> L. BRUN, Ph<sup>cs</sup> — 92, rue Bobillot — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## CURAMIDA CHAPPELLIER

**Composition.** — Sirop de sucres frais de géraniums, Rudbeckias, Troscelon M, fleurs de Marronniers d'Inde iodés, Phosphate monocalcique, Iodure de Calcium, Sirop Antiscorbutique et Chicorée Cposée.

**Mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour (3 ans, 5 ans, 10 ans).

**Indications.** — Puissant tonique déterminant la fonte des **grosses amygdales** et la disparition des **végétations adénoïdes** des enfants.

**Cure complète:** 2 flacons de 3 à 7 ans.

3 flacons au-dessus de 7 ans.

Prix du flacon 450 cc. : 35 fr. 20.

**Laboratoire A. CHAPPELLIER**

SAINT-AIGULIN (Charente-Maritime).

## CURASME

**Composition.** — Solution adrénalinée et éphédrinée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Soulagement immédiat des crises d'asthme et dyspnées.

**Forme.** — Solution en ampoules.

**Mode d'emploi.** — A employer en pulvérisations dans la gorge à l'aide du Pulvérisateur Curasme.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

**Composition.** — Association rationnelle de : Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

**Indications.** — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

**Posologie.** — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Enregistrée au L. N. C. M. sous le N° 32-1.

Laboratoire  
de la **CURATINE BRUNET**

23, rue des Écouffes — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 35-17.)

## CURIOSAN

Mercurérythrosine.

Sel nouveau ayant fait l'objet d'une thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris (6 juillet 1926) et d'une communication à l'Académie de médecine (27 novembre 1928).

**Présentation.** — Solution à 2 p. 100.

**Indications.** — Affections des voies génito-urinaires, Prurits, Métrites, Affections des yeux et des oreilles, Affections buccales, Plaies infectées, Dermatoses.

**Mode d'emploi.** — En attouchements, en instillations intracervicales, en applications sur la peau, lavages en solution à 1 p. 1 000.

Prix :

36 fr. 80 le flacon de 180 grammes ;

12 fr. 65 le flacon de 45 grammes.

Laboratoires **MARONNEAU-MOREL**

107, boulevard de la Mission-Marchand,  
COURBEVOIE (Seine).

## CUROGÈNE

*Élixir* antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

**Indications.** — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Dysménorrhée, Douleurs post-partum, Grippe, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

*Enfants* au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 20 francs.

Le flacon de poche : 7 francs.

L. N. C. M. n° 515-6.

Laboratoire du Curogène

Docteur **J. GALIMARD**, O. S. P. D.

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

## CUROZÉMA

Médication opo-sérothérapique rationnelle des dermatoses chroniques et récidivantes et des états arthritiques.

**Composition.** — Plasma sanguin et organes frais de jeunes animaux.

**Indications.** — Eczéma et eczématides, Prurits localisés ou généralisés, Prurigo, Urticaires, Maladie de Quinck, Psoriasis, Impetigo, Acné, Certaines formes de Névrodermites et de Sclérodermes, Lichen.

**Présentation.** — Dragées en flacon de 90 (le grand flacon), de 40 (le flacon).

**Mode d'emploi et doses :**

*Traitement d'attaque.* — 9 dragées par jour prises par 3, à jeun, une heure avant le repas, pendant 10 jours.

*Traitement d'entretien.* — 4 dragées par jour, pendant 10 jours.

**Prix :** Le grand flacon : 30 fr. — le flacon : 18 fr.

Laboratoire biologique **VALTRY**

122, Champs-Élysées — PARIS (Tél. : Élysées 28-12.)

## CUSCUTINE FOULON

**Indications.** — Laxatif doux, sans accoutumance. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine ne détermine jamais de coliques et peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

**Composition.** — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscute, Séné, Aloïne, etc.

**Posologie.** — Une à 2 pilules au repas du soir.

L'étui de 40 pilules : 8 fr. 20.

**Laboratoires FOULON**

12, boulevard Saint-Martin — Paris (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 76-85.)

## CUTAMINOL

Pommade à base de Vitamines A et D et de Sulfamide.

**Cicatrisante — Antiseptique.**

**Formule.** — *Huile de flétan*, huile de foie de morue, carotène, ergostérol, *paraminobenzène sulfamide*, oxyde de titane, oxyde de zinc.

**Indications.** — *Plaies de toutes natures* : ulcères, engelures, brûlures. *Ulcères variqueux*. *Dermatoses par carence*. *Lésions muqueuses* : ulcérations, métrites, vaginites, vulvites, etc.

**Mode d'emploi.** — Après nettoyage, application de pommade une à deux fois par jour.

**Laboratoires FOURNIER et Cie**  
DIJON.

J. LE LOUS, pharmacien.

## CUTIGÉNOL

**Pommade cicatrisante.**

**Composition.** — Huile de foie de Flétan, hormones, insuline.

**Indications.** — Traitement des plaies atones ou torpides, escarres, ulcères variqueux, retards de cicatrisation.

**Mode d'emploi.** — Appliquer à l'aide d'un pansement qui restera en place au moins 24 heures. Le premier sera même laissé 48 ou 72 heures, selon la gravité du cas, ou le degré d'infection.

**Présentation.** — Le tube : 22 francs.

**Laboratoires du Dr F. DEBAT**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## CUTIPHILE

**Poudre antiseptique, adoucissante et isolante.**

**Composition.** — Poudre exclusivement minérale à base de sels de bismuth, acide borique et oxyde de zinc.

**Propriétés.** — Laisse sur la peau une mince couche isolante (grain très fin), infermenescible et inaltérable.

**Indications.** — Hygiène des nourrissons et des alités, irritation due aux appareils orthopédiques, érythèmes fessiers, intertrigo, eschares.

**Les Laboratoires BRUNEAU et Cie**

Docteurs en pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 61-46.)

## CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques  
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

### Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur) ..... 0 gr. 01 cgr.  
Sérum isotonique ..... 2 cc.

### Propriétés :

La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.

### Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 14 fr. 10.

Laboratoire National de Contrôle n° 339-5.

### Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).  
(Tél. : Suffren 12-63.)

## CYANOVAÏNE

Indolore.

**Composition et forme.** — Association de cyanure de mercure et de stovaine, en ampoules injectables de 1 cc. Une ampoule contient douze mgr. de cyanure de mercure, correspondant à 0 gr. 01 de mercure et 0 gr. 01 de chlorhydrate d'amyléine (stovaine), dans 1 gr. d'eau.

**Indications.** — Syphilis, acquise ou héréditaire à toutes les périodes. Septicémies, furonculose, infections, Oliguries, Ascite, cirrhose,

**Avantages.** — Peut être utilisé indifféremment, par voie intra-musculaire ou intra-veineuse.

**Posologie.** — 10 injections consécutives tous les deux jours. Injections quotidiennes pour traitement rapide et intensif.

Prix : 19 fr. 30 la boîte de 10 ampoules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 74-2.

### Laboratoires LOISEAU

LOISEAU, Pharmacien

119, rue Cardinet — PARIS (XVII°).  
(Tél. : Wag. 08-16.)

## CYANURE ISOTONIQUE FRAISSE

### Formule :

Cyanure d'Hydrargyre ..... 0 gr. 01  
Soluté calcique isotonique ..... 2 cc.

**Indications.** — Ces ampoules étant indolores peuvent s'injecter indifféremment par voie intramusculaire ou intraveineuse. Elles ne sont pas sclérosantes, ce qui a une grande importance. On les emploie comme cure d'entretien dans la syphilis.

**Forme.** — En boîte de 12 ampoules.

**Posologie.** — Une injection tous les deux jours.

**Prix :** 23 fr. 45 la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI°).

## CYCLITON « ROCHE »

Analeptique central et stimulant de la circulation sanguine.

**Composition.** — Diéthyl-amide de l'acide 3,5 diméthylisoxazol-4-carbonique.

**Propriétés.** — Action analogue à celle du camphre, bien qu'étant d'une constitution tout à fait différente.

**Indications.** — Insuffisances circulatoires, Affections aiguës de l'appareil respiratoire. Intoxications par les narcotiques, Collapsus, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — 1 à 2 ampoules de 2 cm<sup>3</sup> et plus toutes les 2 heures par voie sous-cutanée, intramusculaire ou endoveineuse, XX à XL gouttes (1 à 2 cm<sup>3</sup> par voie buccale ou 2 à 5 comprimés.)

**Présentation.** — Le Cycliton « Roche » est présenté sous trois formes : Ampoules de 2 cm<sup>3</sup> dosées à 25 p. 100. — Solution dosée à 25 p. 100. — Comprimés dosés à 0 g. 10.

Ampoules (boîte de 6) ; comprimés (flacon de 20) ; solution (flacon 15 cm<sup>3</sup>).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 504-86 (ampoules), 504-87 (solution), 504-88 (comprimés).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV°). (Tél. : Arch. 91-10.)

## CYNABILINE

Médication végétale et opothérapique associées destinée au traitement des déficiences entéro-hépatiques.

**Composition.** — Principes actifs de l'artichaut frais (plante fraîche stabilisée), du Kinkéliba, du Romarin et du Boldo. — Extrait désaluminé et délipoidé de foie frais. — Extrait de bile. — Citrate de soude.

**Propriétés thérapeutiques.** — Stimule la cellule hépatique, la sécrétion et l'excrétion biliaire, supplée par ses extraits d'organe aux déficiences momentanées. — Régularise la fonction hépatique par l'artichaut. — Analgésique et tonique par le Kinkéliba et le Romarin. — Décongestif vésiculaire par le citrate de soude.

**Indications.** — Insuffisance hépatique et biliaire. — Ictères. — Lithiases. — Hépatisme tropical. — Constipation. — Intoxications. — Hépatites. — Hépatomégalie. — Cirrhoses diverses. — Hypotonies entériques. — Prurits. — Asthénies.

**Présentation.** — Liquide sirupeux aromatique de saveur agréable. Le flacon : 23 fr. 30.

**Posologie.** — Une à cinq cuillerées à café par 24 heures dans un peu d'eau ou de vin avant les repas.

Enregistré au L. N. C. sous e n° 1337-1.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE APPLIQUÉE  
rue Frédéric-Chevillon — ALLAUH (B.-du-Rh.). (Tél. 29.)

## CYNHÉPATIL

Essore le foie, draine la bile, active la diurèse.

Association d'extrait de feuilles d'artichaut, poudre de foie stabilisée.

*Il essore le foie hypertrophié* de façon si manifeste qu'on peut en percevoir de jour en jour la diminution de volume et le retour à la normale.

*Il draine la bile* au point de faire disparaître en quelques jours un ictère aigu.

*Il provoque une véritable débâcle urinaire*, éliminant ainsi toxines et composés xanthiques qui encrassent le foie et entravent le fonctionnement du filtre rénal.

Le *Cynhépatil* rend au foie son activité en tonifiant la cellule hépatique.

### Mode d'emploi :

6 à 10 comprimés par jour. Ces doses peuvent être augmentées. Pas de contre-indications.

Le flacon de 60 comprimés : 23 fr. 30 au public.

Laboratoires BENDERITTER

VENDOME (Loir-et-Cher).

## CYNUROL-ROSA (DRAGÉES)

Antiuurique, antiseptique et diurétique.

Spécifique des diathèses précipitantes et des infections des appareils hépato-biliaire et urinaire et des troubles humoraux complémentaires.

**Forme.** — Dragées inaltérables et très assimilables.

**Composition.** — Extrait de feuilles fraîches d'artichaut (Cynara), Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phényle-Pipérazine.

**Indications.** — a. *Maladies diathésiques* : Rhumatisme, Arthritisme. Urémie, Uricémie et Goutte, Polysclérose, Lithiase biliaire et urinaire, etc.

b. *Affections vésico-rénales* : Cystite, Urétrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, Prostatite, Oligurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : Grippe, Fièvres diverses, etc.

d. Et toutes les fois où il faut réaliser une action antiuricémique, antiseptique ou diurétique (complément de la cure hydrominérale).

**Posologie.** — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose). **Etui** de 60 dragées. Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA,

« La Feuille fraîche d'Artichaut en thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 09-63.)

## CYPROVEINOL

Millefeuille-Ficaire-Cupressus

**Indications.** — Congestions prostatiques, Congestions veineuses ; Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

Deux formes :

*Gouttes* : 30 gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau bien sucrée.

Le flacon (traitement 25 jours) : 19 fr. 20.

*Suppositoires* : 1 à 3 par jour.

La boîte de 12 suppo. : 19 fr. 20.

Laboratoires du CYPROVEINOL

12, rue du Dragon — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 78-81.)



## CYRÈNE « B » FORT

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Dipropionate de diéthylidioxystilbène.

**Propriétés et indications.** — Œstrogène de synthèse doué des propriétés expérimentales et cliniques de la folliculine. Action prolongée obtenue par l'estérification du diéthylidioxystilbène. Bonne tolérance.

Le CYRÈNE B FORT possède les mêmes indications que la folliculine.

**Posologie.** — L'expérimentation ayant démontré que le CYRÈNE B FORT est environ deux fois plus actif que le benzoate d'œstradiol, on peut admettre qu'un comprimé de 0 mgr. 5 correspond à 1 mgr., soit 10.000 unités de folliculine, et une ampoule de 2 mgr. 5 à 5 mgr., soit 50.000 unités de folliculine.

**Présentation.** — Flacon de 20 comprimés à 0 mgr. 5. Boîte de 5 ampoules à 2 mgr. 5. (Solution huileuse pour injections intramusculaires.)

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## CYSTITOL

Comprimés.

Antiseptique urinaire. — Non toxique.

### Formule :

Bleu de méthylène.....	0,02
Hexaméthylènetétramine....	0,15
Benzoate de soude.....	0,10
Salol.....	0,03

**Indications.** — Cystite, Néphrites, Pyélonéphrites, Urétrites, Colibacillose.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

**Laboratoires DURANT-MONGE**

151, avenue d'Orléans — ANTONY (Seine).

## CYSTOCONE

Suppositoires.

**Composition.** — Association de l'Acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine et la Belladone totale.

**Action.** — Antalgique. Antispasmodique. Décongestionnant des organes du petit bassin. Rend indolore l'exploration des voies urinaires et ses suites.

**Indications.** — Traitement des algies et des spasmes douloureux de l'appareil génito-urinaire. Médication idéale du prostatique et du vésical : calme, décongestionne et assure le repos nocturne. Chez l'homme : Cystites, Prostatites, Urétrites aiguës et chroniques. — Assure le repos nocturne du prostatique.

Chez la femme : organes génito-urinaires, Angoisse et douleurs pré et post-opératoires de l'appareil urogénital.

**Posologie :**

**Adultes :** 1 à 2 suppositoires CYSTOCONE par 24 heures, de préférence le matin au réveil et le soir au coucher, autant que possible après l'évacuation de l'intestin.

**Adolescents :** au-dessus de 15 ans : 1 suppositoire CYSTOCONE le soir au coucher.

Prix : La boîte de 6 CYSTOCONE : 70 fr. 70.

**Laboratoires SITSA**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

## CYSTOCURE

DRAGÉES.

### Composition :

Salol, bétol aa.....	0,02
Utropine, Benzoate de soude aa...	0,05
Bromure de camphre .....	0,03
Rénine, Bleu de méthylène aa....	0,01
Pour 1 dragée glutinisée.	

**SULFAMIDE.**

### Composition :

Bromure de camphre .....	0,03
Urotropine.....	0,05
Rénine.....	0,01
Bleu de méthylène.....	0,01
Para-amino-phényl-sulfamide.....	0,10
Pour 1 dragée glutinisée.	

**Indications.** — Affections génitales urinaires.

**Posologie.** — 6 à 8 dragées par 24 heures.

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## CYSTOFLORINE

(Dragées bleues néphro-pyélotropes.)

**Priorité.** — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par nos soins en 1934.

**Composition.** — Barbiflore totale. Hexaméthylène-tétramine. Chlorure de tétraméthylthionine. Camphre monobromé.

**Propriétés.** — Diurétique antiseptique et sédatif, *médication spécifique des affections génito-urinaires*. Décongestif des organes pelviens. Antisepsieux chromothérapique (colore l'urine en vert). Désintoxiquant général.

**Indications.** — Cystites, Néphrites, Pyélo-néphrites, Bactériurie et Pyurie, Colibacillose, Oligurie, Urétrites, Hémorroïdes, Prostatisme, Métrites et Annexites, Écoulements muqueux ou muco-purulents, etc. *Chez l'enfant* : Enurèse, Rougeole, Scarlatine, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : 5 à 10 dragées par jour avant les repas. *Enfants* : depuis 1 dragée (tolérance parfaite).

Etui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

Laboratoire DE LA BARBIFLORE

H. ADAM, pharmacien

4, rue du Rocher, MONACO

## CYTOBAUME

**Composition.** — Pommade halogénée magnésienne au stéarate d'ammonium.

**Propriétés.** — Possède : 1° une action cytophyllactique sur les cellules normales de l'ectoderme s'exerçant en milieu acide, à un pH constant voisin de celui de la peau ; 2° une action frénatrice sur la croissance des cellules atypiques à développement excessif ou anarchique.

**Indications.** — Érythèmes de toute nature, engelures, coups de soleil, piqûres d'insectes, eczéma. Psoriasis, hyperkératoses, crasses séniles, radio- et radiumdermites.

Le Cytobaume a aussi une action prurigineuse qui s'exerce aussi bien sur les dermatoses prurigineuses que sur les prurits *sine materia*.

**Mode d'emploi.** — En applications fréquentes par léger massage sur la région à traiter, en particulier le soir au coucher. (Le Cytobaume ne tache ni le linge ni les draps.)

Prix : 18 fr. 70 le pot.

Laboratoires GRIMAULT

Fondés en 1856

51, rue François-1<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Bal. 20-70.)

## CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue.  
(Vitamines A et D.)

**Formes :**

1° *Gouttes* : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)

2° *Granulé* : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

**Indications.** — Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

**Posologie :**

*Gouttes. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

*Gouttes. Adultes :*

XXX à XL gouttes. À prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

*Granulé. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

*Granulé. Adultes :* 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix. *Gouttes* : 16 fr. 50.

*Granulé* : 18 fr. 60. } Traitement pour 8 à 10 j.

Laboratoires MARTIN

25-27, rue du Commandant-Rivière,  
COLOMBES (Seine). (Tél. : Charlebourg 03-62.)

## CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arsénée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

**Indications.** — Dérminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

**Dose.** — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les 2 jours pour les *adultes* ; une ampoule de 2 centicubes pour les *enfants*. Traitement pour 18 jours.

**Présentation :**

*Cyto-manganol pour adultes.*

Bolte de 12 ampoules de 5 cc. : Prix : 28 fr. 70.

*Cyto-manganol infantile.*

Bolte de 12 ampoules de 2 cc. : Prix : 20 fr. 10.

Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 78-11.)

## CYTOPAN

**Forme.** — Élixir de goût agréable.

### Composition :

**CYTOPAN Simple :** Acide phosphorique, teinture de noix vomique, kola.

**CYTOPAN F :** même composition que CYTOPAN Simple, avec extrait fluide spécial désodorisé de Fenugrec.

**Indications.** — Toutes décalcifications, pré-tuberculose, faiblesse générale, asthénies de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

**CYTOPAN F :** celles du CYTOPAN Simple et plus spécialement amaigrissement, anémies grosses, lactation, faiblesse générale.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir, avant les repas. Enfants au-dessus de 8 ans 1 cuillerée à café.

Prix : 21 fr. 10.

**Laboratoires J. LAROZE**

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).  
(Tél. : Ent. 01-41.)

## CYTOPEPSAL

### Composition :

Pepsine .....	0 gr. 10
Sulfate neutre d'atropine .....	0 gr. 00125
Eau bi-distillée .....	1 cc.

Ampoules de 2 cc.

**Indications.** — Ulcères gastriques et duodénaux, Dyspepsies douloureuses hyperacides.

**Posologie.** — S'emploie par série de 12 injections intramusculaires profondes, 3 la première semaine, 1/4 d'ampoule, 1/2 ampoule et 3/4 d'ampoule. Continuer à raison de 3 injections d'une ampoule de 2 cc. par semaine.

La boîte de 12 ampoules pour 4 semaines de traitement.

Prix : 23 fr. 50.

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés **CORBIÈRE S. A.**  
27, rue Desrenaudes — PARIS.  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## CYTOSAL

**Composition.** — Plasma Organo-Polyminéralisé contenant tous les éléments minéraux normalement contenus dans le Séro-Plasma.

Ph, Ca, Mg, Na, H, Cl, Fe, S, I, Zn, Mn.

**Indications.** — Troubles de la nutrition, de la croissance infantile, Dépression physique, Impuissance, Cachexie, Convalescence, Phosphaturie, Anémies tropicales et les maladies par carence (Paludisme, Pellagre).

**Mode d'emploi.** — 25 à 30 gouttes avant ou pendant chacun des deux repas, toujours dans un verre de vin ou d'eau sucrée ou non.

Enfants de 5 à 10 ans : 1/2 dose.

Enfants de 1 à 5 ans : le quart des doses prescrites aux adultes.

Enregistré au L. N. C. M. ° n498-1.

Prix du flacon de gouttes : 21 francs.

**Laboratoires TACHOT et VIGAN**

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trinité 04-49.)

## CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

### Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine .....</i>	<i>Un milligramme.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré .....</i>	<i>Cinq centicubes.</i>

**Mode d'emploi.** — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Action.** — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

**Indications.** — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Convalescences.

**Présentation.** — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 27 francs.

**HEMO-CYTO-SÉRUM CORBIÈRE**

Cyto-sérum ferrugineux.

La boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 28 fr. 70.

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés **CORBIÈRE S. A.**  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII°).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## DABOINE

**Hémostatique local** (Usage Externe).  
Solution stérile en eau distillée de venin de vipère Daboia.

**Indications.** — Toutes les hémorragies et tous les saignements du domaine de la petite chirurgie, de l'oto-rhino-laryngologie et de la stomatologie. Tous saignements en nappe.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

### Présentation :

Boîte de 2 ampoules de 2 cc.....	27 fr. 55
Boîte de 4 ampoules de 2 cc.....	32 fr. 15
Flacon compte-gouttes de 20 cc. .	61 fr. 10

### Laboratoire R. GALLIER

1 bis, pl. du Présid<sup>t</sup>-Mithouard, PARIS (VIIe).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## DACOLAN

*Cholagogue et Laxatif.*

### Présentation en 2 tubes :

1 Tube de	1 Tube de
CACHETS BLEUS	CACHETS ROSES
(laxatifs),	(cholagogues),
à prendre le soir.	à prendre le matin.

### Indications :

Troubles hépato-biliaires — Constipation,  
Lithiase biliaire — Ictère,  
Migraine — Inappétence.

### Par son soufre colloïdal

le *Dacolan* est, en outre, la médication spécifique des Rhumatismes, Dermatoses et de l'Arthritisme.

### Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## DAGÉNAN

(Corps 693)

« (p.-amino-benzène-sulfamido) pyridine.

*Antibactérien polyvalent, actif sur les infections à : gonocoques, pneumocoques, méningocoques, streptocoques, staphylocoques, B. de Pfeiffer, colibacilles, anaérobies.*

**Indications.** — Urétrites gonococciques aiguës ou chroniques, blennorrhagie chez la femme, pneumonies, infections grippales, méningites et méningococcies, infections chirurgicales, kératites, dacryocystites, otites, névralgies, dysenteries, rhumatismes.

**Présentation.** — Comprimés à 0 g. 50 (tubes de 20).  
Solution injectable : voir à *Soludagénan*.

**Posologie.** — Dose moyenne de début : 3 g. (pour adulte); diminuer ensuite progressivement les doses, qui seront toujours fractionnées par 0 g. 50.  
*Enfants* : par 1/4 de comprimé : 1 g. à 2 g. suivant l'âge.  
Prix de vente : 29 fr. 30.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## DAMICOL

*Le petit déjeuner de l'hépatique.*

### Composition :

Peptone de foie.....	0,18
Sulfate de magnésie anhydre.....	0,63
Extrait de bouillon aromatisé. Q. S. p.	1,80

**Indications.** — Congestion hépatique, Ictère, Lithiase biliaire, Cholécystites, Insuffisances hépatiques, Cholémie, Dyspepsies réflexes, Constipation, Migraines, etc.

**Présentation.** — Boîte de 20 comprimés pour 10 jours de traitement.

**Posologie et mode d'emploi.** — Faire dissoudre 1 ou 2 comprimés de DAMICOL dans une tasse d'eau bouillante. Absorber le consommé ainsi obtenu le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : La boîte : 18 fr. 70.

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.

INSTITUT

DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOIÉTIQUE

S. A. au capital de 15 000 000 de francs.

R. C. Seine 12.384.

97, r. de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Litré 68-22.)

## DÉCHOLESTROL CHOLAGOQUE DOUX

Cure de décholestérolisation.

**Composition.** — Sels alcalins anhydres, sulfate de magnésie desséchée, à faible dose, hexaméthylène-tétramine 1 p. 100.

**Propriétés.** — Stimule et draine le foie, augmente le pouvoir cholostérolytique du sérum sanguin, aide à la résorption des scléroses.

**Indications.** — *Toutes les manifestations de l'Hépatisme* (cholémie, lithiase, insuffisance hépatique, migraines, urticaire, prurit, eczéma, dyspepsie hépatique).

*Toutes les manifestations de l'arthritisme.* Hypertension artérielle, diabète, goutte, obésité, artériosclérose ; surdité et troubles oculaires des scléreux, xanthome, xanthélasma des paupières, arc sénile, cataracte.

**Mode d'emploi.** — Un paquet matin et soir, 1/4 d'heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau ordinaire ou minérale tiède, de préférence, pendant 12 jours par mois. (Vichy, Vals, Vittel, Evian, Châtel-guyon, etc.)

Prix : 20 francs.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Ent. 01-41).

## DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, in fermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

**Action.** — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypocalémiques. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

**Indications.** — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques. Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir

Prix : 22 fr. 40

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

201, rue de Grenelle — PARIS (VII<sup>e</sup>)

(Tél. : Invalides 64-36.)

## DELBIASE

Méthode cytophy lactique  
du professeur Pierre Delbet.

**Composition :**

Chlorure de Magnésium anhydre. 0 gr. 379  
Bromure de Magnésium anhydre. 0 gr. 012  
Iodure de Magnésium anhydre. 0 gr. 000 072  
Fluorure de Magnésium anhydre. 0 gr. 000 9

Pour un comprimé.

**Propriétés et indications.** — 1° En réalisant une surminéralisation magnésienne, elle constitue un stimulant général et un reconstituant rationnel (*usure physiologique, surmenage, asthénies, dépressions physiques et intellectuelles, états de sénescence*) ;

2° Régularisant la sécrétion biliaire et les fonctions digestives, elle est indiquée dans les *affections hépatiques, la constipation, certaines entérites* ;

3° Elle accroît l'activité des cellules normales des épithéliums (action cytophy lactique utile dans la plupart des *dermatoses*) ; elle freine au contraire la multiplication des cellules atypiques à développement excessif ou anarchoïque et, par ses effets acidifiants, abaisse et normalise le pH, dont l'élévation est favorable au développement des lésions précancéreuses et cancéreuses (*hyperkératoses, psoriasis, crasses séniles, radio et radiumdermites, mammites chroniques, adénomes prostatiques, lésions précancéreuses*).

**Posologie.** — Deux comprimés chaque matin à jeun, dans un demi-verre d'eau, aussitôt avant le petit déjeuner ; 3 à 6 comprimés pour un traitement intensif.

**Prix** : 21 fr. 80 la boîte de 48 comprimés ;  
37 fr. 40 la boîte de 96 comprimés.

Laboratoires GRIMAULT

Fondés en 1856.

51, rue François-I<sup>er</sup>, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Bal. 20-70.)

## DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne droite.

Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréochimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

**Emploi.** — Anesthésie locale, régionale. Anesthésie par instillations, par contact. Endoscopies (bronchoscopies, gastroscopies).

**Forme.** — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 %, en ampoules de 1, 2, 5, 10, 50, 100 cc. pour anesthésie locale, régionale. Ampoules spéciales pour l'anesthésie buccale et laryngopharyngée : Delcaïne « 838 ».

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr., tube de 0 gr. 50.

Les ampoules de Delcaïne ne contiennent pas d'Adrénaline.

Laboratoires J.-R. ROQUES, pharmacien

36, rue Sainte-Croix-de-la-Brettonnerie

PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Turbigo 62-00, 62-01.)

## DEMANYL

**Composition.** — Pâte dermatologique, acide, vitaminée, au Septoplax (1162 F ou paraminophénylsulfamide), au cholate de zinc et à la chlorophylle.

### Formule :

Paraminophénylsulfamide (Septoplax) .....	10 gr.
Cholate de zinc .....	10 gr.
Chlorophylle de soude .....	0 gr. 02
Huile de germe de blé .....	5 gr.
Excipient cholestérol .....	Q. S. p. 100 gr.

**Présentation.** — Tube de 30 grammes.

**Propriétés.** — Bactéricide, cicatrisant, anti-prurigineux, lysant et nutritif.

**Indications.** — Plaies récentes (brûlures, écorchures, coupures, régularisation et épilage des plaies, électro-coagulation). Lésions infectées (plaies, furoncles, pyodermites, brûlures). Plaies atones (ulcères variqueux, maux perforants, engelures ulcérées, etc.). Eczémas parasitaires, microbiens, mycosiques, impétiginisés.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une fois par jour une couche épaisse de Demanyl et recouvrir d'un pansement sec sans caoutchouc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>)

(Tél. : Ségur 13-10.)

## DÉMORPHÈNE

Désintoxication rapide par les émulsions de lipides végétaux des morphinomanes, cocaïnomanes, opiomanes et tous intoxiqués (Procédé de MM. elaville et R. Dupouy, Ac. de Médecine. 25 mars 1934).

Admis par le Service de la Santé de la Marine. Autorisation Ministérielle du 26 octobre 1936 par le Ministère des Colonies et par l'Assistance Publique.

### Durée du traitement :

4 à 6 jours suivant le degré d'intoxication.

Disparition, au cours de la cure, de l'état de besoin si pénible et si redouté des malades.

### Caractéristiques :

La morphine ou ses succédanés étant liposolubles (travaux d'Overton) se fixent rapidement sur la substance nerveuse riche en matières grasses et s'y intègrent en remplacement d'un des constituants normaux de cette substance.

Le Démorphène qui est une émulsion huileuse composée d'huile d'olives ricinée et lécithinée met en liberté le toxique fixé sur le système nerveux, le dissout et prend sa place dans la substance nerveuse.

### Mode d'emploi :

Le Démorphène s'administre en injections intramusculaires, à raison de 25 cc. pro die, chaque injection étant de 5 cc. Avoir soin de bien agiter chaque ampoule avant usage. A ces injections on associera deux injections quotidiennes d'insuline de 15 unités chacune (augmentation des échanges nutritifs) deux injections de 2 cc. d'huile camphrée sparteinée. Aux vagotoniques on fera prendre 0,05 à 0,06 cgr. d'éphédrine par jour et on leur injectera avant les deux principaux repas une ampoule d'hypophyse et d'adrénaline. Chez les sympathicotoniques on remplacera l'éphédrine par de la gènesérine (L à XC gouttes par jour) et l'hypophyse adrénalinée par des sels de calcium. Pour favoriser le repos du malade on donnera des sédatifs du système nerveux (Eunéryl) à petites doses matin et soir. Une bonne évacuation intestinale sera assurée par des pilules laxatives et diaphorétiques (cascara, évonimine, podophyllin, pilocarpine).

Chaque boîte d'ampoules est accompagnée d'un schéma indiquant de façon précise la marche à suivre. La boîte de 10 ampoules de 5 cc. : 174 francs.

Laboratoire BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (Anjou 61-61)

## DENISOLINE

Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

**Indications.** — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéiques, Pityriasis.

**Mode d'emploi.** — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET et Cie, Pharmaciens**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## DENTAMIDE

**Composition :**

Dentifrice tensio-négatif au Septoplax (1162 F ou paraminophénylsulfamide) de pH 7.

**Formule :**

Paraminophénylsulfamide.....	5 gr.
Ricinoléate de soude .....	2 —
Sulfuricinolate de soude.....	4 —
Excipient sans sels calcaires, Q. s. p.	100 —

**Propriétés :**

- 1° Préviend la formation du tartre par son pH neutre et son absence de sels calcaires.
- 2° Dissout le tartre déjà formé grâce au sulfuricinolate.
- 3° Aseptise la cavité buccale par le 1162 F et le ricinoléate de soude qui exercent une action bactéricide élective sur les microbes buccaux et pénètrent dans toutes les anfractuosités dentaires.

**Indications.** — Hygiène quotidienne de la bouche. Traitement complémentaire indispensable de la carie, des stomatites, de la pyorrhée alvéolo-dentaire, des gingivites.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**  
98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## DENTOCHRYSYNE LUMIÈRE

Traitement aurothérapique curatif de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (Parodontose), des stomatites ulcéreuses, des gingivites expansives et des infections buccales en général.

La Dento-chrysyne Lumière est constituée par une pâte à laquelle est incorporé un composé aurique spécial (aurothiopropanol sulfonate de Calcium) composé, qui possède un index thérapeutique des plus élevés, capable d'exercer une action remarquable, aussi bien sur l'infection locale que sur les processus métaboliques tissulaires.

L'absorption d'un composé aurique de cette nature, au niveau des gingives et des alvéoles dentaires, telle qu'elle est obtenue avec la Dento-chrysyne Lumière, dont le taux de solubilité a été spécialement réglé à cet effet, complète heureusement la destruction des germes « in situ » par une imprégnation profonde, qui favorise la défense de l'organisme et la restauration des tissus mortifiés.

La Dento-chrysyne Lumière réalise donc pour la première fois le traitement complet, à la fois local et général, de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (maladie paradontostique), affection organique, liée à un état général défectueux.

**Mode d'emploi.** — Prendre la pâte Dento-chrysyne Lumière sur la pulpe de l'index et masser la gencive doucement, jusqu'à absorption. Les applications en nombre variable (plusieurs fois par jour, selon la gravité) doivent être quotidiennes. Dans les cas simples, le traitement est continué pendant un mois environ. En cas de suppurations importantes ou chroniques, le nombre des applications consécutives peut être porté à 70 ou 80.

**Laboratoires LUMIÈRE**  
45, rue Villon — LYON.

## DENTOMA

**Pâte Dentifrice**

Spirillicide par son sel arsenical stable, Microbicide par le chlorénone, Neutralise l'acidité buccale génératrice des caries, par la magnésie.

Exempte de pierre ponce. L'abrasif utilisé est de l'alumine qui ne raye pas l'émail mais blanchit admirablement les dents.

**Indications.** — Pyorrhées, gingivites, stomatites. Hygiène quotidienne de la bouche et des dents, Préviend la carie dentaire.

Le tube : 8 fr. 80.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Nord 76-85.)

## « DEP »

Ferments lactiques garantis  
à l'ÉTAT DE VIE LATENTE

**Troubles intestinaux :** Cachets.  
Comprimés.  
Ampoules.  
Poudre insoluble.

**Plaies :** Poudre insoluble.  
Ampoules.

**Gynécologie :** Ovules.  
Poudre insoluble.

**G. JIOFFREDY, Pharmacien**

13, rue Florestine — MONACO.

(Tél. : 017-18.)

## DÉPURATIF CHAUVIN

(aux hyposulfites)

**Principes actifs.** — Hyposulfites de soude et de magnésie, extraits de badiane et d'anis vert. (Solution glycinée ne contenant ni iode, ni iodures, ni substances végétales dites à tort dépuratives.)

**Action.** — Réducteur, modificateur du tissu humoral, antianaphylactique, désensibilisant, antitoxique.

**Mode d'emploi et posologie.** — Adultes : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, 2 fois par jour, avant chacun des deux principaux repas. Enfants : de 5 à 7 ans, 1/3 de la dose ; de 7 à 14 ans, 1/2 dose ; à partir de 15 ans, dose normale.

**Indications.** — Affections cutanées, Eczémas, Furonculose, Urticaires, Intoxications du foie y compris intoxications thérapeutiques (comme préventif et comme curatif), Facilité la chrysothérapie et les traitements antisyphilitiques, qu'il rend inoffensifs. Ne fatigue pas l'estomac comme cela se produit pour les hyposulfites en cachets ou en comprimés.

**Prescription.** — Peut être prescrit aux diabétiques. Prescrire ainsi : un Dépuratif Chauvin. (Les médecins qui n'aiment pas le mot « dépuratif » peuvent prescrire cette spécialité sous la dénomination : *Désensibilisant Chauvin*.)

Prix : 19 fr. 55.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 624-139,

Établissements Alfred CHAUVIN

(Laboratoire des Tubes Blache)

AUBENAS (Ardèche).

## DÉPURIODE DRAGÉES

du Dr Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré.

2 dragées = 0 gr. 25 d'iodure de potassium.

**Formule.** — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : aa 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 0 gr. 25. Pour 2 dragées.

**Indications.** — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses. Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciaticque, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

**Mode d'emploi et posologie.** — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

**Adultes** (dose moyenne) : 2 dragées. Contre artériosclérose et hypertension : 1 dragée.

**Enfants** : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 dragée.

## DÉPURIODE LIQUIDE

(préparation suspendue)

Prix : 23 francs.

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Danton 92-73.)



## DÉPUROGÈNE

**Composition.** — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et de Citrate de Soude.

**Propriétés.** — Épurative et Décongestive, selon la méthode du D<sup>r</sup> A. Chaix, de Vichy. Puissant agent de décongestion et d'élimination de l'Urée et de la Cholestérine du sang.

**Indications.** — États pléthoriques, variqueux, hémorroïdaires, hypertendus.

Urémie, Diabète, Goutte, Rhumatismes, Artério-sclérose.

**Mode d'emploi.** — 4 à 6 pilules par jour.

Tube : 60 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-23.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## DÉPUROGÈNE « T »

**Composition.** — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et d'extrait hépatique spécial.

**Propriétés.** — Épuratif et décongestif de l'organisme féminin, selon la méthode du D<sup>r</sup> A. Chaix, de Vichy.

**Indications.** — Traitement par excellence de tous les troubles de la ménopause et des troubles congestifs dus à la stase veineuse et à l'intoxication du sang.

**Mode d'emploi.** — 4 à 6 pilules par jour.

Boîte 60 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-27.

**Laboratoires de LA LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## DERCUSAN

Chloramine T 1,50 p. 100 en véhicule hydrocarburé.

**Antiseptique cicatrisant.**

**Propriétés.** — Antiseptique, cicatrisant, désodorisant des sécrétions fétides, épidermisant, antiparasitaire.

**Indications.** — Abscesses, adénites suppurées, blessures, brûlures, crevasses, chancres, désinfection des plaies, ecthyma, leucorrhée, parasites cutanés, processus septiques, suppurations, tumeurs de la peau, ulcères de toutes sortes et variqueux.

Facilité d'application. Action antiseptique constante Non-adhérence des pansements. Non irritant quoique puissant bactéricide.

Prix au public :

Grand tube..... 14 fr. 60

Tube clinique..... 36 fr. 50

Canule Dercusan pour l'injection de l'antiseptique dans les cavités..... 21 fr. 80

**Laboratoires SASSE**

32, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## DERMACIDE PORCHER

Substitut Acide du Savon.

pH 3,6.

L'acidité naturelle de la peau (pH 4,5), du vagin (pH 5,6) les protège contre la pullulation microbienne et l'action des agents physiques. L'alcalinité constante de tous les savons, l'abus des lavages, des injections alcalines, la prédominance dans les plis cutanés de glandes à sécrétion alcaline diminuent cette acidité normale, rendant ces organes facilement infectables.

D'autre part, l'action des acides calme les démangeaisons, tandis que les alcalins les exacerbent (DARIER).

**DERMACIDE conserve et restitue à la peau, au vagin, leur acidité naturelle.**

**FORMULE.** — Acides : Benzoïque 0 gr. 10, Salicylique 0 gr. 20, Tartrique 0 gr. 70, Acétique 0 gr. 30, pour 100 grammes.

**CARACTÉRISTIQUES.** — 1° Une acidité thérapeutique pH 3,6, proche de l'acidité normale de la peau pH 4,5;

2° Une acidité acétique et tartrique. Rénovation moderne et scientifique d'une thérapeutique centenaire (vin et vinaigre aromatiques, vinaigres de toilette);

3° Une action kératolytique, obtenue par de faibles doses d'acide salicylique et benzoïque suractives;

4° Une action microbicide importante, effectuée par simple modification du pH du milieu, sans lyse, ni nécrose des tissus;

5° Une action détersive très marquée. Il s'emploie et moussé comme le savon.

**INDICATIONS.** — Préventif et curatif des :

Infections microbiennes et mycosiques de la peau : Épi-dermo-mycoses, Impétigos, Pyodermites.

Prurits : Prurits anal, vulvaires, Urticaire, etc.

Affections séborrhéiques : Acnés, Séborrhées grasses.

Dermatoses allergiques et professionnelles : Eczémas, professionnels, Intolérances au savon, à l'eau, Dermites artificielles, Dysidroses.

Dermatoses provoquées par agents physiques : Engelures, Crevasses, Gercures, Ampoules, Intertrigos des plis, Vaginites, Métrites.

**TRAITEMENT GÉNÉRAL.** — Supprimer complètement l'usage des savons, l'alcalinité constante de ceux-ci étant antagoniste de DERMACIDE. Sur les peaux sèches (dépourvues de graisse), faire suivre l'usage de DERMACIDE d'onctions de corps gras (VITA-DERMACIDE, pâte vitaminée acide sans Flétan).

Voir page suivante l'emploi des 3 formes.

## DERMACIDE LIQUIDE

Fortement tamponné, les solutions aqueuses de DERMACIDE Liquide conservent, même à de fortes dilutions, une acidité thérapeutique.

**AGENT DE NETTOYAGE.** — 2 ou 3 lavages par jour avec DERMACIDE Liquide pur ou coupé d'eau.

Eczéma professionnel. Intolérances au savon, à l'eau. Crevasses. Engelures. Dermites artificielles. Bromidrose.

**LOTIONS ÉPIDERMiques.** — 2 ou 3 fois par jour avec un tampon de coton imbibé de la solution au 1/3. 1 cuil. à bouche DERMACIDE Liq. + 2 cuil. à bouche d'eau.

Séborrhées grasses de la face, du tronc. Acnés juvénile, rosacée. Mycoses. Prurits sous ses différentes formes. Hyperidrose plantaire. Intertrigos. Dysidrose.

**PANSEMENT.** — Avec la solution au 1/3 ci-dessus. Modificateur de la réaction du milieu, DERMACIDE ne nécrose pas les tissus. Acidifiant les régions avoisinantes, il prévient les essaimage microbienne, d'où son emploi en pansements humides.

Pyodermites. Furoncles. Folliculites. Anthrax, Impétigos. **CUIR CHEVELU.** — Lavages avec 2 cuil. à bouche pour 1/4 de litre d'eau tiède.

Préventif : 3 lavages par mois. Curatif : 3 lavages par semaine.

Séborrhées grasses, Pityriasis, Eczématides du cuir chevelu. Croûtes de lait.

**INJECTIONS VAGINALES.** — Préventif : 1 à 2 cuil. à café pour 1 litre d'eau, 1 fois par jour.

Curatif : 1 à 2 cuil. à bouche pour 1 litre d'eau, 2 fois par jour.

Tamponnement vaginal ou pulvérisation du col avec la solution au 1/3.

Vaginites. Métrites. Prurits vulvaires.

### DERMACIDE PAIN

S'emploie comme un pain de savon.

**AGENT PROPHYLACTIQUE** dont l'usage constant conserve l'acidité épidermique et prévient l'apparition des affections cutanées microbiennes, allergiques, prurigineuses, séborrhéiques, de l'Hyperidrose, de la Bromidrose (désodorisant), ainsi que des Intertrigos, Engelures, Crevasses et Gercures.

3 à 4 lavages par jour, à l'exclusion de tout savon dont l'alcalinité constante est antagoniste.

### VITA-DERMACIDE pH 4,5

Pâte acide grasse, soluble à l'eau. Absorbée rapidement par la peau, permettant ainsi l'introduction des Vitamines hydrosolubles (B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup>, B<sup>6</sup>, C) de la levure et du jus de citron. Malgré sa haute teneur en graisse, ne tache pas.

Sur les peaux sèches, complément du DERMACIDE dans toutes ses indications ainsi que Plaies, Brûlures, Engelures, Radiodermites, etc.

Laboratoire PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV<sup>e</sup>),

(Tél. : Arc. 69-03.)

## DERMALIBUT

### POMMADE NOVALIBUT

Pommade biologique vitaminée pour pansements,  
à base d'huile pure d'hippoglossus-hippoglossus L. à hautes concentrations de vitamines A et D naturelles et naturellement associées.

NOVALIBUT (*Voir ce mot*)

**Caractéristiques.** — 500 000 U. I. vitamine A et 62 500 U. I. vitamine D par 100 grammes.

**Propriétés.** — Anti-infectieuse, antiphlogistique, cytophylactique, antalgique.

**Indications.** — Toutes plaies, brûlures, ulcérations, escarres, dermatoses, inflammations, suppurations (cutanées, muqueuses, osseuses).

**Emploi.** — Médecine, pédiatrie, chirurgie, dermatologie, otorhinolaryngologie, gynécologie, stomatologie, ophtalmologie.

*Fabrication et vente suspendues provisoirement, faute de matière première de qualité.*

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 689-40.

Laboratoire DU GLEFINA  
348, rue Saint-Honoré — PARIS (1<sup>er</sup>).

## DERMAMIDE MERMINOD

Nous recommandons à MM. les Docteurs de spécifier : **DERMAMIDE MERMINOD**, afin d'éviter toute confusion avec une spécialité en pommade ayant un nom similaire.

Pommade à base de vitamines de l'huile de foie de morue, p. Dichlorsulfamide-benzoate de soude (Sulfamide-Dakin, Kawa-Kawa, Goudron de bois, etc.).

**Mode d'action.** — Antiseptique, cicatrisante, non irritante, non caustique.

**Indications.** — Plaies, brûlures, dermatoses, dermites, ulcères variqueux, morsures de serpents et piqûres d'insectes, hémorroïdes externes, prurits diabétiques et post-galeux, etc.  
En pansements.

Prix : 20 fr. 20 le tube.

Laboratoires MERMINOD (Fondés en 1890).  
49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Pro. 30-32.)

## DERMASULINE

(Ex-Pommade FORNET à l'Insuline.)

Cicatrisant parfait.

Principe actif :

Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des îlots de Langerhans véhiculé par un excipient spécial, à pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications :

*Ulcères variqueux.* — Prurits et hémorroïdes.

*Cancroïdes et cancers* ulcérés de la peau.

Orgelets récidivants, Blépharites, Ulcères de la cornée.

*Radiodermites.* — Brûlures, Gelures et toutes plaies.

La *Dermasuline* (ex-Pommade Fornet à l'Insuline) est utilisée dans tous les hôpitaux de Paris.

Prix : 19 fr. 50.

L. N. C. 353-5.

Laboratoires THAIDELMO  
45, avenue Mozart — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 01-46.)

## DERMATHORIUM

Pommade se composant de terres radioactives à activité uranique : I, terres rares (titane, lantane, néodyme, etc.), produits organiques (acide salicylique, résorcine, huile de cade), produits minéraux (soufre, oxyde de zinc).

Le Dermathorium est un complexe jouissant de propriétés antiseptiques (acide salicylique, soufre), kératoplastiques (résorcine, titane), analgésiques et sédatives (acide salicylique), qui convient à toutes les manifestations cutanées morbides.

**Indications.** — Le Dermathorium est utilisé dans toutes les affections de la peau : Eczéma, Acné, Prurits divers, Psoriasis, Intertrigo, Ichthyoses, Lichens, Ulcères, Epithéliomas cutanés.

**Mode d'emploi.** — Enduire chaque soir, après nettoyage soigné, les parties atteintes d'une couche assez épaisse de Dermathorium Rhemda, protégé ou non par un pansement.

Prix au public : 1 tube : 14 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 468-5.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

S. MOGAN, Pharmacien,  
51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-89, 18-41. — R. C. Seine 255-068 B.)

## DERMODULCIS LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : à p. e.

**Actions thérapeutiques.** — Isolante, adoucissante, astringente, siccatrice. S'étend facilement et s'enlève aisément.

**Indications.** — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermites aiguës de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée, Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

**Mode d'emploi.** — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 12 fr. 50.

Son efficacité est heureusement complétée par la **DERMODULCIS** (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 9 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

**Laboratoire LAGOUTTE**

85, cours Albert-Thomas — LYON (III<sup>e</sup>).  
(Tél. : Moncey 14-35.)

## DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.  
(Extr. de hêtre et Vitamines A et D).

**Propriétés.** — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

**Indications.** — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres) ; du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards, verrues plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circiné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 13 fr. 50.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (chologogue et diurétique), le *Raiforyl* (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires de la DERMOFAGINE**

p, 151, Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER  
(Pas-de-Calais.) (Tél. : 537.)

## DERMOLIVE

**Composition.** — Pommade à base du support actif : *Oléostat* (nom déposé), Huile d'olive *Vierge* solidifiée et saturée par procédé catalytique associé synergiquement aux acides benzoïque et borique, Kérosène et essences.

**Propriétés.** — L'Huile d'olive, support actif, garde ses qualités naturelles et agit par sa vertu extraordinaire de pénétration et sa richesse en vitamines.

**Indications.** — Toutes les dermatoses (eczéma, zona, acné, furonculose). Cicatrisation de toutes les plaies (brûlures, engelures).

**Mode d'emploi.** — Bien nettoyer la partie malade. Appliquer *Dermolive* qui fond aussitôt et imprègne profondément le tissu atteint. Recouvrir d'une compresse stérilisée de préférence. Renouveler matin et soir.

Grand tube. — Petit tube.

Enreg. au L. N. C. n° 1679-1.

**Les Laboratoires du PUGETOL**

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.  
19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30).

**ARNOUX-BERENQUIER, Pharmacien.**

(Voir *Boldolive*, *Supplive* et *Sulfolive*.)

## DERMO-PLASTOL

**Composition.** — Pâte poreuse additionnée de : Acide orthoxybenzoïque, huiles essentielles végétales, huile pyrogénée, tûménol.

**Propriétés.** — Réductrice, antiprurigineuse, kératoplastique. Assure à la peau son fonctionnement normal.

**Indications.** — Eczémas et dermatoses analogues.

**Forme.** — Présentation en tube. Deux modèles.

**Posologie.** — Application matin et soir en couche épaisse. Suivre les indications du prospectus.

Dans la période subaiguë des dermatoses et chez les enfants : *Cremo-Plastol* (antiphlogistique, antiprurigineux).

Pansement de jour : *Solu-Plastol* (soluble à l'eau).  
Dermatoses rebelles : *Zebo-Plastol*.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, rue du Plâtre — PARIS

## DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

**Composition.** — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

**Propriétés.** — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques par radioactivité induite.

**Le DERMORADOL calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.**

**Indications.** — Aché, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

**Établissements LABORADIUM**

25, rue Friant — PARIS.

(Tél. : Vau. 25-07.)

## DERMO-REIPAR

**Médication salicylée par voie transcutanée.**

**Composition.** — Crème à l'éther benzyl salicylique (6,6 p. 100 d'acide salicylique).

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Sciatique, Lumbago, Arthralgies, Névralgies. Complément toujours utile de la médication salicylée.

**Avantages.** — Crème s'étalant facilement. *Odeur agréable.* Absorption rapide du fait de son excipient spécial. *Action calmante rapide.*

**Présentation.** — Tube de 35 gr. environ.

**Prix : 17 fr. 60.**

Échantillons et littérature.

**Laboratoires DRAPIER**

RETHEL (Ardennes).

(Tél. : 0-19.)

## DERMOSEPTAZINE

Pommade à 5 % de *p*-amino-benzène sulfamide (1162 F.).

*Application des propriétés antistreptococciques et bactéricides du noyau actif de la Septazine à la désinfection locale.*

**Indications.** — Streptococcies cutanées. Impétigo, ecthyma, eczémas infectés, pyodermites, érythèmes fessiers. Dermo-mycoses, retard de cicatrisation des plaies liés à l'infection.

**Présentation et mode d'emploi.** — Tubes de 30 g. environ. Applications locales recouvertes ou non de pansements, à renouveler 1 à 2 fois par jour, après nettoyage de la région.

Prix de vente : 15 francs.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## DERMOSPLÉNINE

**Extrait désalbuminé aqueux de rate.**

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

**Eczémas suintants en poussée aiguë. Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.**

Ampoules de 2 centicubes correspondant à 25 gr. de rate fraîche.

**Mode d'emploi.** — *Injection intramusculaire.* — Commencer le traitement par l'injection de 2, 3, 4 ou même 5 ampoules à la fois selon la gravité du cas traité ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à 1, 2 ou 3 ampoules, également tous les 2 jours.

*Références cliniques et échantillons :*

**Liposplénine du Dr Groc.**

**J. OLIVE, pharmacien**

14, rue des Minimes, PARIS (III<sup>e</sup>) Tél. : Arch. 03-94.  
Et provisoirement : 9, avenue Frizac, TOULOUSE.

## DERMO-SULFURYL

Médication sulfurée.

Forme. — Pommade.

### Composition :

Soufre précipité.....	2
Para-amino-phényl-sulfamide.....	1
Pour 100 gr.	

**Indications.** — Affections de la peau et du cuir chevelu, Acné, Séborrhéides, Psoriasis, Eczéma, Urticaire, Maladies des Ongles et des Cheveux (Pityriasis, Séborrhée), Gale.

**Posologie.** — Appliquer matin et soir une couche de DERMOSULFURYL sur la région malade. Recouvrir d'une gaze et d'une bande.

Prix : 18 fr. 70.

### MONAL

Docteur en Pharmacie,  
13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Inv. 52-73.)

## DÉSARTYL

Hypotenseur végétopolyhormoniel.

**Composition.** — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

**Dose.** — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle. — Les symptômes alarmants sont immédiatement amendés.

**Indications.** — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées : 23 francs.

Laboratoire du DÉSARTYL

CURTIL, pharmacien.

8, avenue Walkanaer — NICE.

## DESCHLÉRO-SEL

Traitement de la Cholestérolémie et de ses conséquences.

**Composition.** — Boldine à 0 gr. 05 ; Formine, 2 gr. pour 100 gr. de Sulfate de Soude et de Magnésie, Benzoate, Citrate, Phosphate et Bicarbonate de Soude.

**Indications.** — Artério-Sclérose vraie, Scléroses organiques, Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Cataracte, Tophi des Goutteux, Arthritisme, Urticaire, etc.

**Propriétés.** — Facilite la fonction hépatique. Intensifie la sécrétion des sels biliaires qui sont les agents de dissolution du Cholestérol.

**Présentation et dose.** — Boîte de 20 paquets de 2 gr. Un paquet matin et soir, avant les repas, dans une infusion de Boldo.

Enregistré au L. N. C. n° 388-3.

Laboratoire E. BEZIE, Pharmacien  
6, place de l'Académie — ANGERS.

## DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du Dr Paul Cantonnet).

**Traitement principal d'attaque :**

1° Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium laborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 48 fr. 80.

**Traitements adjuvants et de maintien :**

2° Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : recharge : 30 fr. 50.

Trachéol : Le flacon : 24 fr. 40.

Seringue spéciale pour injections trachéales : 100 fr.

Pilochlorine : Pilules, le flacon : 30 fr. 50.

**Traitement forme bronchitique :**

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 48 fr. 80.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DÉSINTEX

**Médication hyposulfite rationnelle.**  
**Désintoxicant. Désensibilisant. Correcteur**  
**humoral. Générateur de glutathion.**

**COMPRIMÉS** glutinisés et dragéifiés d'hyposulfite de magnésium et de sodium chimiquement purs.

Inattaquables par le suc gastrique, les comprimés ne sont décomposés qu'en milieu intestinal, où ils sont absorbés en libérant des ions S instables à l'état naissant et actifs.

Maximum d'efficacité, aucune intolérance gastrique.

**Posologie.** — Avaler, sans sucer ni croquer, 2 ou 3 dragées avant les principaux repas.

Durée du flacon : 10 jours en moyenne.

**AMPOULES** de 5 cc. en injection intramusculaire quotidienne. Aucune réaction locale ou générale.

**Indications.** — *Vecteur du soufre*: toutes dermatoses, acné, séborrhée, eczéma, herpès, etc.

**Maladies de la nutrition**: Affections articulaires et péri-articulaires, rhumatismes chroniques, goutte, diathèse arthritique. Affections hépatiques : insuffisance, ictères.

**Désensibilisant**: Dermatoses de sensibilisation, accidents sériques, urticaire, prurits. Manifestations anaphylactiques diverses (migraines, chocs, asthme), etc.

**Désintoxicant**: Intoxications alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Facilite la fonction rénale et hépatique au cours des traitements par les sels d'or, de Bi, Hg, As et évite les incidents.

Troubles psychiques, angoisse, instabilité émotionnelle, déséquilibre du vague.

**Laboratoire M. RICHARD**

AUBENAS (Ardèche).

## DESITIN

**Pâte vitaminée.**

Huile de foie de morue contenant un maximum de vitamines A et D.....	15 gr.
Oxyde de zinc.....	38 gr.
Lanoline hydratée.....	10 gr.
Talc.....	4 gr.
Essences aromatiques, excipient, Q. S. P.	100 gr.

Tube de 55 grammes : 22 francs.

**Indications.** — Toutes lésions et affections de la peau : *Plaies, Brûlures, Ulcères, Eczéma, Impétigo, Hémorroïdes, Acné, Intertrigo, Coups de soleil, Érythèmes des nouveau-nés, Engélures, Crevasses, Prurits*, etc.

## DÉSITINOL

**Crème vitaminée (semi-fluide)**

Huile de foie de morue contenant un maximum de vitamines A et D....	40 gr.
Lanoline hydratée.....	17 gr. 50
Excipient, Q. S. P.....	100 gr.

Tube de 38 grammes : 15 francs.

**Indications.** — Toutes plaies profondes et brûlures étendues. Toutes lésions et irritations de la peau.

**Laboratoire G. CANAT**

22, rue Lalande — PARIS (XIV<sup>e</sup>). (Tél.: Suffren 71-02.)

## DEXOPLASMA

Opothérapie anti-anémique.

**Association Hépaté-Mangano-Cuprique.**

Extrait de foie.....	0 gr. 03
Extrait de rate.....	0 gr. 03
Extrait de groseille.....	0 gr. 01
Nucléinate de manganèse.....	0 gr. 015
Nucléinate de cuivre.....	0 gr. 0025
Sérum, hémoglobine, glycérine. Q. S. p.....	5 cc.

**Indications.** — Anémies de toutes natures (médicales et chirurgicales), Chlorose, Asthénie, Surmenage, Convalescence, tous états dépressifs.

**Présentation.**

**Ampoules buvables** de 5 cc. Boîte de 12 ampoules : 28 fr. 20.

**Sirop** : 23 fr. 20. — Coffret de 25 — 42 fr. 50.

**Posologie :**

**Ampoules buvables** : 1 à 3 ampoules par jour selon âge.

**Sirop** : Adultes : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

— Enfants : 5 cuillerées à café par jour.

(Peut être pris pur ou dilué dans un peu d'eau ; goût agréable.)

**Laboratoires DEXO**

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).  
 (Tél.: Lon 04-61.)

## DEXTROSOL

**Indications.** — Toutes les indications du glucose, et notamment tous états d'hypoglycémie et d'acidose ; insuffisance hépatique, cirrhose, lithiase et affections allergiques (asthme, prurigo, etc...) ; myocardites, angine de poitrine ; maladies infectieuses (diphthérie, coqueluche, encéphalite, pneumonie, typhoïde), intoxications (alimentaire, barbiturique, etc...), toxémies gravidiques, morphinisme ; ulcères gastriques et duodénaux ; néphrite et pyurie ; surmenage. Sucre de choix dans l'alimentation des enfants. Administration pré et post-opératoire. Cures d'engraissement.

**Mode d'emploi.** — A incorporer aux boissons (eau, thé, café, lait, jus de fruits) et aux plats.

**Adultes :** 50 à 400 gr. par jour.

Tolérance parfaite de quantités importantes, en raison du faible pouvoir sucrant.

**Nourrissons :** 1 cuillerée à café par biberon de 100 gr. Sucrer les aliments avec 5 à 10 p. 100 de Dextrosol.

**Enfants :** 10 à 20 gr. par kilogramme du poids.

**Société des PRODUITS DU MAÏS**

29, rue de Berri — PARIS. (Tél. : Élysées 72-06.)

## DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'anti-pyrine, de nitrate d'urane et de santonine. Médication complémentaire de l'Insuline.

**Doses.** — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours ; diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

**Prix au public :** 32 fr. 30, pour 10 jours de traitement.

**Fabrication assurée.**

**Laboratoire des Produits SOIENTIA**

**Dr E. PERRAUDIN**, pharmacien.

21, rue Chaptal — Paris (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## DIABÉTOSAN

**Comprimés.**

Insulinoïde végétal obtenu par dialyse de germes d'une espèce sélectivement cultivée d'orge, et dont la germination est conduite dans des conditions de temps et de température rigoureusement déterminées, sans aucune autre association chimique ou organique (C. R. Académie des Sciences).

**Propriétés thérapeutiques.** — Action hypoglycémiante constante et prolongée. Diminution parallèle des taux de sucre sanguin et urinaire.

**Indications.** — Diabète moyens et légers. Hyperglycémie. Polydipsie, Polyurie. Meilleure utilisation des substances hydrocarbonées. Dermatoses. Cures d'engraissement. Adjuvant de l'insuline dans les diabètes graves permettant le remplacement d'un quart ou d'un tiers environ des unités d'insuline.

**Posologie.** — **Adultes :** 8 à 12 comprimés par jour, en trois fois au cours des repas.

**Enfants :** demi-doses.

**Prix :** 19 francs. Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 218-19.

**Établissements SOUDAN**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 06-89.)



## DIADERMINE

Crème.

Exciplent pour pommade. Crème de toilette.

**Définition.** — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

**Indications.** — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure*. Touchers, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

*Massages, Soins de la peau.* Brûlures, Engelures, Gercures du sein. Erythème fessier du nouveau-né.

### DIADERMINE U. V.

Crème.

Empêche la photo-sensibilisation de la peau par les rayons ultra-violet.

**Indications.** — *Évite, supprime les coups de soleil* (supprime la douleur en quelques minutes. Fait disparaître l'érythème en 24 heures).

*Protection de la peau au cours des traitements par rayons ultra-violet ou rayons X* (empêche la radiodermite).

**Mode d'emploi.** — *Avant.* Enduire la partie à protéger d'une légère couche de Diadermine U. V.

*Après.* — Mettre sur l'érythème une couche épaisse de Diadermine U. V. Panser sous gaze stérilisée.

### DIADERMINE B. B.

Poudre.

Poudre minérale hygiénique stérilisée à 125° (complément de la crème Diadermine pour les soins de la peau).

**Présentation.** — 1° Boîte poudreuse hermétique (en aluminium) stérilisée.

2° Boîte carton permettant la recharge dans la boîte poudreuse, en conservant la stérilisation du produit.

**Indications.** — Toilette des nouveau-nés; érythème fessier. *Adultes*: toutes irritations de la peau, intertrigo, dermatoses. *Feu du rasoir*, transpiration.

Conditions spéciales au Corps Médical.

Remise 33 p. 100.

Echantillons sur demande à :

**BONETTI Frères**

60, rue Étienne-Dolet — MALAKOFF (Seine).  
(Tél. : Alésia 24-01 et 24-02.)

## DIAGNOTHORINE

Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.

**Indications.** — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenue par l'emploi de la GELOBARINE (Voir Gélobarine). La DIAGNOTHORINE révèle les plis de la muqueuse dans tous leurs détails.

**Présentation.** — Flacons de 60 et 300 cm<sup>3</sup>.

**Posologie et mode d'emploi.** — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé pendant les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également être administrée par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Prix de vente : Le flacon de 60 cm<sup>3</sup> : 18 fr. 70.  
— de 300 cm<sup>3</sup> : 81 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## DIAL

Diallylmalonylurée

CIBA

HYPNOTIQUE ANTINERVEUX.

Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébété. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

**Indications.** — Insomnie nerveuse en général : agités, émotifs, surmenés. Etats d'excitation psychique et de nervosisme. Agitation dementielle.

**Doses.** — 1/2 à 2 comprimés (au coucher pour les insomnies du soir ; au réveil pour celles du cours de la nuit).

**Formuler.** — Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## DIAPÉDINA

Traitement des affections gastro-intestinales.

Composition : Salicylate de bismuth.....	0,05
Benzonaphtol .....	0,10
Bicarbonate de soude.....	0,10
Cachou pulvérisé.....	0,05
pour un comprimé.	

**Action thérapeutique.** — Supprime les putréfactions intestinales et les fermentations anormales, astringent grâce au cachou.

**Indications.** — *Entérites, diarrhées, colibacillose, auto-intoxications, gastro-entérite des nourrissons.*

**Posologie.** — 6 à 8 comprimés par jour.

**Enfants :** 3 à 5 par jour. **Nourrissons :** 2 à 3 par jour. Avalés avec une gorgée d'eau ou délités dans un peu de liqueur.

**Prix :** 17 fr. 30 le flacon de 30 comprimés friables.

Laboratoires d'Études et de Réalisations

Pharmaceutiques de Paris « E.TREFA ».

R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZUY, Pharmaciens.

Ad<sup>on</sup> : 5 bis, rue de Berri — (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## DIAPROS LUMIÈRE

Traitement antigénique  
des IMPRÉGNATIONS BACILLAIRES en général  
et de l'ASTHME en particulier.

Le Diapros-Lumière est essentiellement constitué par le mélange à un excipient pâteux de corps bacillaires dégraissés, broyés, débarrassés de leurs exotoxines (Tuberculose en particulier).

Le Diapros Lumière est indiqué dans tous les cas d'Asthme généralement dit « essentiel », et, plus spécialement encore, dans les cas où l'épine irritative consiste en lésions de sclérose bronchique ou péri-bronchique résultant d'une affection bacillaire.

Le Rhumatisme de l'oncet relève des indications du Diapros Lumière, et d'une manière générale le Diapros Lumière peut être employé avec succès dans nombre d'affections qui dépendent d'une imprégnation bacillaire latente.

### RÉSULTATS

Parfois, dès la première scarification, les résultats sont manifestes : *le nombre et l'intensité des crises diminuent, et peut-être surtout les accès nocturnes.*

Dès la troisième ou quatrième scarification, on constate une amélioration très nette, parfois une guérison absolue des crises asthmatiques. Il faut quelquefois, pour que les résultats se manifestent, qu'une dizaine de scarifications aient été pratiquées.

**Formuler :** Une boîte Diapros Lumière contenant 6 cupules.

Innocuité du Diapros Lumière

L'innocuité de ce vaccin est démontrée par l'absence totale d'accidents ou d'incidents au cours d'une très longue expérimentation réalisée chez des *sujets de tous âges* et sans nulle observation de quelque contre-indication tirée de l'état de santé actuel ou des antécédents.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON

## DIASCLÉROL

du Docteur GUERSANT

**Composition.** — Association Sédobenzyl (C<sup>6</sup>H<sup>5</sup> CH<sup>2</sup>SO<sup>2</sup>K) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylentétramine pur (Dose faible) en milieu citraté.

**Indications.** — Diathèse urique, Hypertension, Artériosclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité.

**Dose et mode d'emploi.** — Granulé effervescent, 2 à 6 cuillerées à café par jour, dans un peu d'eau, vingt minutes avant les repas.

Le DIASCLÉROL n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

Prix : 18 fr. 80.

Enregistré au Lab. National de Contrôle sous le n° 756-1.

Laboratoire du DIASCLÉROL

D. DONNAT, Pharmacien

26, rue Norvins — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 78-36.)

## DIASES

**Composition.** — Farines fraîches diastasées non stérilisées renfermant toutes leurs vitamines.

**Propriétés.** — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber.

Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité. Elles assurent une alimentation rationnelle, sans aucun surmenage des organes digestifs.

*Les repas de Diases, prédigérés pendant leur cuisson, conviennent aux organismes les plus délicats.*

### Variétés :

**Diasé Cacao :** Diasé de gourmandise pour déjeuner et goûters.

**Diasé Céréale :** Donne des bouillies très fluides pour l'alimentation au biberon. Convient à tous les estomacs délicats. Ne contenant aucun condiment, elle est naturellement fade et doit être accommodée selon le goût du consommateur.

**Diasé légumineuse :** Permet de préparer instantanément des potages excellents dont la condimentation peut être complétée suivant le goût de chacun.

Boîtes  
de  
300 grs net,  
1 kilo  
net,  
et  
3 kilos  
net.

### Indications :

*Bébé :* au moment du sevrage.

*Enfants :* pendant la période de croissance.

*Adultes :* tous régimes.

**Mode d'emploi.** — Délayer parfaitement et à froid 3 fortes cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diasé dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à feu très doux, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit : elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

Laboratoires à RIS-ORANGIS (S.-et-O.).

Établissements JACQUEMAIRE,

Sté An. au capital de 12.800.000 fr.

68, rue de Thizy

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

## DIASTOGÈNE DEHAUSSY

### Reconstituant intensif.

*Permet au convalescent, au déprimé, au surmené, de récupérer la plénitude de ses moyens.*

**Diastogène F** (Cachets, Comprimés).

Complexe Diastogène (Arsines, nucléine manganésifère, kola fraîche) plus Fenugrec total, inclus en un comprimé glutinisé parfaitement toléré.

*Adultes :* 2 à 3 cachets par jour, au milieu des repas ; 4 à 6 comprimés par jour, au milieu des repas.

**Indications.** — Convalescences, asthénies avec amaigrissement, diabète.

Il existe une forme Diastogène F cachet, non arsénié.

**Diastogène granulé hépato-splénique.**

Application pratique de la méthode de Whipple : extrait titré de foie frais et de rate fraîche, caséinate ferro-cuivrique associés au complexe Diastogène (non arsénié) renforcé par addition de phosphore organique extrait des graines de céréales.

*Adultes :* 4 cuill. à café par jour.

*Enfants :* 10 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; 5 ans : 1 à 2 cuill. à café ; 1 an : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

**Indications.** — Anémies et Convalescence de l'enfant. Anorexie, Asthénies.

Le Diastogène élixir est provisoirement supprimé.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

## DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).  
Contiennent toutes les vitamines  
et hormones des glandes friches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diaslase*, tiennent de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisses, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du *foie*, du *pancréas* et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

**Doses.** — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

**Prix :** Taxe d'état comprise.

Elixir : 21 fr. 10. — Pilules : 16 fr. 90.

Laboratoires du Docteur TISSOT

C. COMBE, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

## DIATOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

**Composition.** — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Pulvis Diatomei lavée, stérilisée, calibrée, anhydre, Talcum.

**Propriétés.** — Le *Diatol*, pâte neutre très poreuse active le « *restitutio ad integrum* ».

**Indications.** — Eczémas suintants, prurigineux des membres inférieurs pré ou post-ulcéreux. Toutes dermatoses irritées.

**Mode d'emploi.** — Après déterision à l'éther, appliquer en couche de un demi-centimètre d'épaisseur sur toute la surface des lésions. Le pansement doit être fait en évitant l'emploi du coton.

Demandez les brochures

des Docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczéma pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATIOIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## DIAVITASE

Préparation concentrée renfermant les principes actifs du GERME DE BLÉ : sels minéraux, vitamines, levures.

Excipient liquide assurant une conservation indéfinie.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café, soit pure, soit diluée dans un peu d'eau ou de lait, 2 fois par jour.

**Indications.** — Convalescence, surmenage, fatigue physique et intellectuelle, sous-alimentation.

Laboratoire GERDA

F. GÉRIN, Pharmacien,

10, rue Jacquard — LYON.

## DIBROMOTYROSINE « ROCHE »

**Composition.** — Dérivé bromé de la tyrosine dont l'action sédative complète et consolide l'action en quelque sorte spécifique de la diiodotyrosine. Ne provoque aux doses thérapeutiques aucun phénomène de bromisme.

**Indications thérapeutiques.** — Renforce la diiodotyrosine contre les symptômes nerveux du Basedow. Remplace les bromures dans toutes leurs indications.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés par jour.  
Tube de 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-79.

Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

4 p. 100 d'iode total.

Dont 3 p. 100 d'iode libre.

### Avantages :

1<sup>o</sup> *Toxicité abaissée* : des lapins de 2 kg. tolèrent 20 cc. par jour.

2<sup>o</sup> *Causticité supprimée*, car l'iode est adsorbé. Phénomène comparable à l'action du charbon sur les toxines intestinales.

3<sup>o</sup> *Activité augmentée* du fait de la division colloïdale.

Le Dicaliode est l'iodique des *petites doses*, parce que *très actif*.

Le Dicaliode est l'iodique des *hautes doses*, parce que très actif et *facilement toléré*.

**Mode d'emploi.** — Se prescrit en cc. ou par gouttes dans du lait, avant ou pendant les repas. 1 cc. = XXXVI gouttes.

**Indications.** — Dicaliode à petites doses : 1 à 2 cc. par jour. Gstre. Enfants : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. *Hypertension*. Affections du cœur et des vaisseaux, de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). Affections de la peau : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 5 à 10 cc. et plus par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Prix : 23 fr. 20.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, pl. V.-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Passy 51-12.

Bruxelles :

**LE MARINEL, pharmacien**

4, Avenue Orban.

## DICODÉINE LAFRAN

**Indications.** — Toux rebelles et toutes affections broncho-pulmonaires. Efficacité rapide.

**Composition.** — Codéinéméthylcodéine : 0,013 ; Aconit : 0,01 ; Belladone : 0,02 ; Terpene : 0,055 ; Benzoate de soude : 0,08 ; Glycyrrhizine et Excipient : Q. S. p. 1 comprimé dragéifié.

**Posologie.** — Doses pour 24 heures :

*Adultes* : de 5 à 6 dragées.

*Enfants* : de 10 à 15 ans : 4 dragées ; 5 à 10 ans : 2 à 3 dragées. A prendre entre les repas avec un peu d'eau ou une tisane.

On peut également les sucer.

Littérature et Échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 18 fr. 50.

**Laboratoires LAFRAN**

8, rue de Prague — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 36-78.)

## DIDIAL

Diallylmalonylurée et éthylmorphine.

CIBA

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE.

*N'est pas au tableau B.*

Un comprimé contient : Diallylmalonylurée, 0 gr. 11 ; Ethylmorphine, 0 gr. 015.

Pouvoir narcotique prononcé et action nettement analgésique, d'où indication lorsque l'insomnie est sous la dépendance de la douleur ou de l'anxiété.

**Indications.** — Toutes les insomnies relevant de la douleur ou de l'anxiété : Algies, Traumatismes, Tabes, Cancer. Agitation maniaque, Excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas, dans les autres cas.

**Formuler.** — Tube de 12 comprimés.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

## DIEMENAL

**Indications.** — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinoïdique.

**Composition.** — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

**Forme.** — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinoïdique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

**Prix de la boîte de 6 ampoules :** 20 francs (en France).

**Laboratoire DEPRUNEAUX**

23, rue du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).  
(Tél. : Tremblay 12-04.)

## DIÉNOL

**Indications.** — Rougeole, Bronchite, Broncho-pneumonie, Grippe, Tous états fébriles ou toxico-infectieux médicaux et chirurgicaux de l'enfant et de l'adulte.

**Composition.** — Métaux colloïdaux, Fe-Mn, obtenus par électrolyse.

### Forme I

1° *Pour injections hypodermiques :* Ampoules de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules ;

2° *Pour emploi par voie rectale :* Tubes-doses de 40 cc. en boîtes de 6 tubes, ou par tube isolé.

### Mode d'emploi :

*En injection hypodermique* ou intraveineuse : une ampoule toutes les 12 heures environ.

*Par la voie rectale*, on donnera par 24 heures :

*Adultes et enfants* au-dessus de 5 ans : 3 tubes-doses (à 6 heures d'intervalle environ).

*Enfants* de 2 à 5 ans : 2 tubes-doses (à 10 heures d'intervalle environ).

*Enfants* de 0 à 2 ans : 1 tube-dose.

Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois, le tube à donner dans les 24 heures sera administré en deux fois (1/2 tube chaque fois) à 7 ou 8 heures d'intervalle, en se servant d'une poire.

Il n'y a absolument aucun inconvénient à augmenter ces quantités. La réduction des doses, suivant l'âge, est uniquement indiquée pour ne pas administrer un volume de liquide disproportionné avec la capacité intestinale du jeune malade.

**Prix de la boîte de 6 ampoules injectables :** 17 fr. 60.

**Prix de la boîte de 6 tubes-doses (voie rectale) :** 34 fr. 20.

**Prix de la boîte de 1 tube isolé (voie rectale) :** 5 fr. 50.

**Prix d'un nécessaire d'accessoires (voie rectale) :** 6 fr. 90.

**Laboratoire DEPRUNEAUX**

23, r. du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).  
(Tél. : Tremblay 12-04.)

## DIFOLLISTÉROL

Benzoate de di-hydro-folliculine obtenu par synthèse.

**Indications.** — *Chez la femme :*

Retard du développement de l'appareil génital ; Certaines stérilités ; Dysménorrhées, hyperménorrhées, aménorrhées ; Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.

*Dans les deux sexes :* Artérites oblitérantes.

**Présentations.** — *En solution huileuse :*

Boîte de 2 ampoules de 1 cc. dosées à 10.000 unités intern. benz. Prix : 31 francs.

Boîte de 1 ampoule de 1 cc. dosée à 50.000 unités intern. benz. Prix : 49 francs.

*En comprimés :* mêmes indic. que solution injectable.

**Mode d'emploi.** — En injections intramusculaires.

**Posologie.** — Doses à fixer par le médecin : faire les injections dans la première moitié de la période intermenstruelle.

**DIFOLLISTÉROL (Comprimés).**

Prix. — Flacon de 40 comprimés à 0,050.... 25 francs.

Flacon de 80 comprimés à 0,050.... 45 francs.

Laboratoire pour la Diffusion des Produits synthétiques,

Léonce GODEAU, Pharmacien,  
73, rue Dutot — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## DIGASTRINE

(Cachets)

**Composition.** — Benzoate de naphтол, Pepsine, Charbon spécial, Poudre de belladone stabilisée.

**Mode d'action.** — Sédatif, absorbant, antiseptique ; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

**Indications.** — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas. Prix : 17 fr. 50.

Laboratoire de la DIGASTRINE

M. DELORME, pharmacien

11, r. St-Agricol, AVIGNON (Vaucluse). (Tél. : 1-00.)

## DIGEX

Antigastralgique, réalisant la saturation totale de l'acidité stomacale.

**Composition.** — Carbonates de chaux, soude et magnésie, Kaolin pur lavé, Magnésie hydratée, Phosphate tricalcique, crème de tartre, peroxyde de magnésie, condurango, fenouil, acide acétyl-salicylique. Sucre de lait.

**Forme.** — Paquets.

**Indications.** — Dyspepsies, aigreurs, brûlures d'estomac, ballonnements, nausées, vertiges, crampes, ulcères gastriques et duodénaux.

**Doses :**

Un à deux paquets après les repas. Durée du traitement : quinze jours.

Prix : 19 francs.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403-7.

**ASSOCIATION TECHNIQUE  
PHARMACEUTIQUE**

T. VINCENT, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## DIGIBAÏNE

Complexe tonocardiaque.  
Association digitaline-ouabaïne.

**Présentation et posologie.** — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Boîte de 8 ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours).

**Indications.** — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonocardiaques ont échoué.

**Remarques importantes.** — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris, 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

### Laboratoires DEGLAUDE

*Médicaments cardiaques spécialisés.*

(Cardibaïne, Spasmosédine, Théoxanthine, 15, boulevard Pasteur — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

## DIGIFOLINE

### CIBA

#### PRÉPARATION DIGITALIQUE TOTALE.

Extrait digitalique contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

*Stable, d'action constante. toujours bien tolérée.  
Rigoureusement dosée.*

**Indications.** — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement en cas d'hépatomégalie (ampoules), et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

**Posologie.** — Celle de la poudre de feuille de digitale.

#### Présentation :

Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles.  
Ampoules de 1 cc. = 10 cgr. poudre de feuilles.

**Formuler.** — Tube de 25 comprimés.  
Boîte de 5 ampoules.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIGI-LANATINE OU LANATINE

Soluté au millième du Totum Digitalique de Digitalis Lanata.

Cinquante gouttes = Un milligramme = 1 cc.

Remplace avantageusement et plus sûrement la poudre et l'infusé de la feuille de Digitale.

Soluble dans l'eau, d'où élimination plus rapide et accumulation moindre. Action rapide, Constante, Durable, Action physiologique constante et continuellement contrôlée, Ralentit, Renforce, Régularise le cœur, Provoque la diurèse, Réduit les œdèmes, Insuffisance cardiaque, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux, Médication spécifique du Cœur gauche.

#### Posologie :

Cardiotonique : V à X gouttes par 24 heures.

Sédatif : X à XX gouttes par 24 heures.

Antiasystolique : jusqu'à C gouttes par 24 heures.

A haute dose : 2 mgr. par 24 heures (X gouttes toutes les heures).  
Diurétique puissant.

Conservation indéfinie.

Flacon de 6 cc. Prix : 18 fr. 40.

Ampoules au 1/4 de milligramme intraveineuse et intramusculaire.  
L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°). (Tél. : Richelieu 35-10.)



## DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé.

Complexe cristallisé isomorphe des glucosides initiaux (A, B, C) du *Digitalis lanata*.

**Avantages.** — Toutes les propriétés d'une macération de feuilles fraîches de digitale qui serait parfaitement préparée, toujours identique, d'activité constante.

Le Digilanide est remarquablement toléré par la voie gastrique, les voies intraveineuse, intramusculaire et rectale. Son action est plus rapide que celle des autres digitaliques et ses effets diurétiques plus nets. Sa posologie est plus maniable, son élimination plus facile en cas de surdosage.

**Indications.** — Toutes les insuffisances cardiaques.

**Dosage.** — 1 mgr. = 400 unités grenouille = 3 unités chat.

**Formes.** — *Gouttes* : 1 cc. = un demi-milligr. = XL gouttes du compte-gouttes normal. *Dragées* dosées à un quart de milligr. *Suppositoires* dosés à un demi-milligr. *Ampoules* de 2 et de 4 cc. : 1 cc. = 0 mgr. 2.

### Posologie :

**Voie gastrique.** — *Solution.* Dose forte : 3/4 de cc. ou XXX gouttes, 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Reprendre si nécessaire au bout de 8 à 10 jours.

*Dose moyenne* : 1/2 cc. ou XX gouttes, 3 fois par jour pendant 8 à 10 jours.

*Dose faible* (dose d'entretien cardiotonique) : 1/4 de cc. ou X gouttes, 3 fois par jour.

*Dragées* : dosées chacune à 1/4 de milligr. — 2 dragées correspondent à XL gouttes ou 1 cc. de la solution gastrique.

*Dose moyenne* : une dragée, 3 fois par jour.

**Voie rectale.** — *Suppositoires* : un à deux par jour.

**Voie veineuse.** — Une ampoule de 4 cc. par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler, s'il y a lieu, après 5 à 8 jours ou remplacer par l'administration gastrique ou rectale.

**Voie intramusculaire.** — Une ampoule de 2 cc., 1 à 2 fois par jour.

## PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## DIGISTABILINE

**Gouttes - Pilules au 1/10<sup>e</sup> mg. et au 1/4 mg.**

Ne peut être prise que sur prescription et sous contrôle médical.

**Indications.** — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires.

**Composition.** — La *Digistabiline* en « gouttes » et en « pilules » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

**Mode d'emploi.** — La préparation liquide est logée en compte-gouttes. Elle peut être facilement dosée. — VII gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline crist.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## DIGITALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de pureté chimique et d'activité constante.

**Action.** — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

**Indications.** — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

**Formes.** — Granules roses au 1/10<sup>e</sup> de milligr.; flacons de 50.

Solution au 1/1000<sup>e</sup>, flacons de 10 et 5 cc.

**Pharmacie Centrale de France**

379, avenue Président-Wilson,  
La Plaine-Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 16-70.)

## DIGITALINE-MIALHE

Soluté au millième de Digitaline Cristallisée Petit-Mialhe.  
Cinquante gouttes = 1 milligramme.

Supériorité incontestable sur toutes les préparations de  
*Digitalis Purpurea*.

Action rapide, Constante, Durable.

Pureté chimique, Action physiologique constante et  
continuellement contrôlée. Effets thérapeutiques  
toujours identiques à eux-mêmes (employée dans les  
hôpitaux depuis 1839).

Préparée uniquement par les Laboratoires Mialhe.  
Ralentit, renforce, régularise le cœur. Provoque la  
diurèse. Réduit les œdèmes, insuffisance cardiaque,  
endocardite, myocardite, péricardite. Soutient admi-  
rablement le cœur dans tous les états infectieux.  
Médication spécifique du cœur gauche.

### Doses :

Cardiotonique : III à IV gouttes par jour.

Sédatif : V à X gouttes par jour.

Antiasystolique : jusqu'à I gouttes dans les 24 heures.  
Conservation indéfinie.

Flacon de 6 cc. Prix : 18 fr. 40.

Ampoules au 1/10 de milligramme.

L. N. C. M. n° 417.

**Laboratoires MIALHE**

8, rue Favart — PARIS (2°). (Tél. : Richelieu 35-10.)

## DIGITALINE NATIVELLE

*Principe actif pur, cristallisé et invariable  
de la digitale pourprée.*

Prix Orfila (1872), Prix Desportes (1904),  
de l'Académie de Médecine de Paris.

**Propriétés.** — Ralentit, renforce et régula-  
rise le cœur, provoque la diurèse et réduit  
les œdèmes.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques,  
notamment quand le pouls est rapide et  
irrégulier. — Cardiopathies valvulaires —  
Myocardites — Asthénie cardiaque (mala-  
dies infectieuses et opérations) — Ary-  
thmies — Fibrillation et Flutter auricu-  
laires.

**Formes.** — *Solution* au 1/1.000 (50 gouttes  
= 1 mg.). — *Comprimés* au 1/10 de mg. —  
*Ampoules* au 1/4 de mg. (intramusculaires)  
et au 1/5 de mg. (intraveineuses).

### Doses.

*Per os* : Dose faible (d'entretien) : 1/10 de  
mg. par jour.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mg. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mg. 1/2 à 3 mg.  
en 10 jours (jusqu'à saturation).

*Injectons* : 1 cc. d'une ampoule matin et  
soir le premier jour, puis 1 cc. d'une am-  
poule par jour les 3 ou 4 jours suivants.

### Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

## DI-HYDAN

**Formule.** — 5-5-di-phényl-hydantoïne libre, 0 gr. 10 par comprimé.

**Indications.** — Traitement, *sans effet hypnotique*, de l'ÉPILEPSIE (grand mal, petit mal, équivalents).

**Caractère distinctif.** — Le Di-Hydant est constitué par la di-phényl-hydantoïne libre non salifiée, composé neutre, insipide et inaltérable.

**Posologie et mode d'emploi.** — Chez l'adulte, la dose la plus courante, à modifier suivant les cas, est de 3 comprimés par 24 heures, en 3 prises; celle de 5 comprimés ne sera jamais dépassée. — Chez l'enfant de plus de 6 ans, commencer par 2 comprimés; au-dessous de cet âge, la dose de début est de 1/3 environ de comprimé 2 fois par jour.

**Prescription très importante.** — La substitution à un barbiturique doit toujours être *progressive et lentement conduite* par paliers, en plusieurs semaines. Il y a lieu parfois de laisser subsister une faible dose de barbiturique.

Si l'on observe des signes d'*intolérance* (nausées, vertiges, confusion, érythème), rares aux doses indiquées, il suffira le plus souvent de réduire la dose administrée.

**Présentation et prix.** — Boîte de 60 compr. : 25 francs.

### Produits CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## DI-iodo-TYROSINE BYLA

**Composition.** — Di-Iodo-tyrosine = acide aminé iodé contenant 58 p. 100 de son poids d'iode organique.

**Indications thérapeutiques.** — Tous états d'hyperthyroïdisme, notamment maladie de Basedow et certains troubles de la ménopause (bouffées de chaleur, métrorragies, etc...) liés à une suractivité de la thyroïde.

Nous attirons également l'attention sur la **Di-Bromo-Tyrosine Byla** (acide aminé bromé, contenant 47 p. 100 de son poids de brome organique) qui remplace avantageusement, parce que plus assimilable, les bromures dans toutes leurs indications. La **Di-Bromo-Tyrosine Byla** s'associe à la **Di-Iodo-Tyrosine Byla** contre les troubles nerveux du Basedow.

**Présentation, Posologie.** — Comprimés de Di-Iodo-Tyrosine Byla à 0,10. Comprimés de Di-Bromo-Tyrosine Byla à 0,25. Boîtes de 20 comprimés; un à trois comprimés par jour.

### Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

### ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 08-11.)

## DIiodoTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états hyperthyroïdiens; tous les symptômes basedowiens.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés dosés à 0 g. 10 par jour. (Tube de 20 comprimés.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-59.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## DIMITENSYL

### Composition :

Sulf. n. Spartéine .....	0 gr. 015
Scille.....	0 gr. 02
Peptone iodée à 10 p. 100.....	0 gr. 05
Silicate de sodium .....	0 gr. 05
Extrait de Gui .....	0 gr. 03
— de Cratægus.....	0 gr. 05
— de Convallaria .....	0 gr. 02
— d'OLIVIER .....	0 gr. 05

Par comprimé.

**Indications.** — Hypotenseur, Diurétique, Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.

**Posologie.** — 3 à 6 comprimés par jour, avant les repas, dans un peu d'eau ou de tisane (ortie blanche).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1063-3.

### Laboratoires ÉTIENNE

19, avenue Secrétan — PARIS.

(Tél. : Nord 89-34.)

## DINITRA

*Animateur des combustions cellulaires.*

**Dinitrophényl-lysidine pure.**

*Moins toxique que la thyroxine.*

*Plus actif que l'opothérapie.*

*Permet des traitements prolongés.*

*Dinitra* active l'oxydation des réserves, élève le métabolisme basal, favorise l'élimination des déchets organiques, sans action secondaire sur aucun organe.

Communication à l'Académie de Médecine : Professeur Pouchet (18 février 1936.)

Thèses : E. Rivierez, « Contribution à l'étude de l'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4. » (Paris 1935).

P. Rothea, « L'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4, accélérateur des combustibles cellulaires » (Paris 1935).

Jacques Bell, « La thérapeutique dinitrée ». (Paris 1937).

## OBÉSITÉ

*Dinitra* est le médicament des obésités d'origine exogène (sédentarité, polyphagie), *Opo-Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine endogène (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause, syndrome adipo-génital). Voir *Opo-Dinitra*.

*Posologie classique.* — 1 comprimé par 10 kilos de poids (dose à atteindre progressivement).

Dose maxima : 10 comprimés par jour.

## RALENTISSEMENTS DE LA NUTRITION ARTHRITISME

Hypothermies. Hyposphyxies. États dépressifs.

*A faible dose* : 2 à 4 comprimés par jour.

(Dose non amaigrissante).

## TOLÉRANCE REMARQUABLE

*Dinitra* respecte le cœur, le foie et les reins.

Prudence chez les albuminuriques et diabétiques.

Comprimés dosés à 0 gr. 036. (Boîtes de 60 et 300 comp.)

Ampoules injectables de 5 cc. (1/2 cc. = 1 comprimé).

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**  
39, bd de La Tour-Maubourg, PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## DIOCAMPHINE BORNE

Association synergique Codéthyline-Camphre.

**Sédatif analgésique tonocardiaque  
à prédominance sympathique**

Dyspnée, Toux rebelles, Angor, Eréthisme cardiaque, Spasmes, Vomissements incoercibles, Algies, Distonies douloureuses vago-sympathiques, Insomnies, Anxiété, Agitation. /

## Formes :

*Diocamphine* Gouttes (X gouttes = 1 centigr. *Codéthyline*) ;

*Diocamphine* Comprimés (1 comprimé = 1 centigr. *Codéthyline*) ;

*Diocamphine* Suppositoires (1 suppositoire = 3 centigr. *Codéthyline*) ;

*Diocamphine* Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 2 centigr. *Codéthyline*, 20 centigr. Camphre soluble) ;

*Diocamphine chirurgicale*, Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 4 centigr. *Codéthyline*, 20 centigr. Camphre soluble ; 2/10 mmgr. Scopolamine HBr.)

## Doses :

*Faibles* : X gouttes, 1 comprimé, 1/2 ampoule.

*Moyennes* : XX gouttes, 2 comprimés, 1 ampoule, 1 suppositoire.

*Fortes* : XL Gouttes, 4 comprimés, 2 ampoules ou, mieux, 1 ampoule chirurgicale concentr. double.

Une, deux ou trois fois par jour si besoin.

## Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux  
et des Ministères des Colonies et de la Marine.  
24, rue des Ursulines. — SAINT-DENIS (Seine).  
(Tél. : l'aine 24-30.)

## DIO-QUINT

**Composition.** — Chlorhydrate d'Éthylmorphine, Extrait mou de Drosera, Extrait mou de Grindelia, Extrait mou de Thym, Bromoforme, Terpene, Benzoate de Soude.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés renfermant un noyau de bromoforme qui, grâce à une technique spéciale, permet de faire ingérer ce médicament sans le moindre inconvénient.

**Indications.** — Toutes les toux : toux spasmodiques, toux coqueluchoïdes, toux des tuberculeux, toux rebelles.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 dragées 3 fois par jour, entre les repas.

*De 14 à 18 ans* : 3 dragées par jour.

Avaler les dragées sans sucrer ni croquer, avec une gorgée d'eau ou de tisane.

Prix public : 20 francs la boîte de 30 dragées.

Enreg. au L. N. C. M.

Laboratoires du **CITRA-QUINT**

J. CORTEEL, pharmacien,

74, rue de La Fère — SAINT-QUENTIN (Aisne).  
(Tél. : 37-29.)

## DIORINE

(Granulés.)

**Présentation.** — En boîte métal (23 fr. 35).

**Principes actifs.** — Pipérazine, Benzoate de soude, Carbonate de lithium, Urotropine, Bicarbonate de soude, Acide tartrique.

**Indications.** — Dissolvant de l'acide urique, antiseptique urinaire et biliaire, arthritisme, obésité, rhumatismes gouteux.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cuillerées par jour.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-10.

Laboratoires **PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## DIPÉGYL

Vitamine P-P.

**Composition** — Nicotinamide.

**Présentation.** — Comprimés de 0,05 et ampoules de 2 cc. à 0,05 par cc.

**Indications.** — Pellagre et accidents pellagroïdes. Carence en protéines animales. Troubles digestifs : stomatite, gastrite, colite, rectite. Engorgements, aphtes, eczémas. États dépressifs. Anémies, porphyrinuries. Intolérance aux sulfamides. Maladies des rayons X et du radium. Intolérance aux U-V.

**Posologie.** — *Comprimés* : Chez l'adulte, thérapeutique intensive : 8 à 10 par jour ; thérapeutique de fond : 4 à 8 par jour.

*Chez l'enfant*, thérapeutique intensive : 1 à 4 par jour ; thérapeutique de fond : 1/2 à 2 par jour.

Répartir les prises dans le courant de la journée.

*Ampoules* : 1 à 3 ampoules par jour, en injections intramusculaires de préférence.

Médication dépourvue de toxicité et sans contre-indication.

**Prix au public.** — Comprimés, Ampoules : 27 fr. 50.

Les Laboratoires du Docteur **ROUSSEL**

Laboratoires Gobey.

S. A. au capital de 880 000 francs. — R. C. Seine 223.195 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Littré 58-43.)

## .DISALGYL (Baume)

Traitement par voie cutanée des *affections rhumatismales et des douleurs*.

**Formule.** — Méthyle Salicylate, 3,30 ; Sodium Borate, 3,50 ; Capsicum résine, 1,50 ; Diiodo-hydroxypropane, 0,10 ; Ether méthoxyméthyl-lique de l'acide salicylique, 1,00 ; Alcool, 7,00 ; Camphre du Japon, 2,00 ; Excipient, Q. S. pour 100 grammes.

**Indications.** — Traitement externe du *Rhumatisme* dans toutes ses formes.

**Mode d'emploi.** — En frictions ou massages toutes les 24 heures. (Masser légèrement jusqu'à absorption totale du produit.)

Prix : 14 fr. 65.

Laboratoires du **DISALGYL S. A. R. L.**

62, rue Beaubourg — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 38-33.)

## DISMINE FAVROT

**Capsules glutinisées — Granulé.**

**Composition.** — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma crenata*) } aa 0gr, 05  
et Salicylate de Phényle.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — *Antiseptique urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

### MODE D'EMPLOI

**Forme capsule.** — Prescrite à la dose de 6 à 9 capsules par jour prises dans une gorgée d'eau à raison de 3 au lever, 3 au déjeuner et 3 au coucher.

**Forme granulé.** — De préférence avant les repas, prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour, et absorber ensuite un peu d'eau.

La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Littérature et Échantillons :

**Laboratoire Docteur H. FERRÉ**

**M. AUZOUX, Pharmacien.**

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## DISONYL

**Composition.** — Extrait pancréatique désinsuliné, Phényl-éthyl-malonylurée, Trinitrine.

**Propriétés.** — Médication régulatrice du système neuro-végétatif et sédatif.

**Indications.** — Anxiété, Insomnies, Vertiges, Céphalées, Tachycardies, Extrasystoles, Douleurs précordiales, États spasmodiques, Aérophagie.

**Présentation.** — Boîte de 60 dragées pour un traitement de 10 à 20 jours.

**Posologie.** — 2 à 6 dragées par jour à prendre un quart d'heure avant les repas.

Prix au public : La boîte de 60 dragées : 22 francs.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxystases.

S. A. au capital de 1.000.000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 68-22.)

## DISTILBÈNE

Cœstrogène de synthèse.

Supérieur à la Folliculine par deux gros avantages :

1° Actif « per os ».

2° Peu coûteux.

Le di-éthyl-stilbène (4-4' di-hydroxy-di-éthyl-stilbène), DISTILBÈNE, est le chef de file de cette série d'œstrogènes synthétiques qui, dépourvus de noyau phénanthrénique et présentant une structure stéréochimique bien différente des folliculines, en possèdent schématiquement la plupart des propriétés expérimentales et cliniques. De plus, le DISTILBÈNE agit à des doses inférieures à celles de la folliculine (œstrone), et son activité reste inaltérée lors de son administration par voie buccale. *Per os*, il est 20 à 25 fois plus actif.

*Expérimentalement*, des doses minimes de DISTILBÈNE produisent :

La croissance du tractus génital ;

La maturation sexuelle des animaux impubères (kératinisation et ouverture du vagin, croissance utérine et mammaire) ;

Le rut chez les animaux castrés ;

La régression des troubles variés dus à la castration.

Le mode d'action du DISTILBÈNE est double :

D'une part, il agit directement sur le tractus génital (croissance utérine, kératinisation du vagin, maturation de la vulve) ;

D'autre part, ses effets se produisent par l'intermédiaire du relais hypophysaire (suppression des cellules de castration, inhibition de l'hyperprolanémie).

**En clinique.** — Les principales indications du DISTILBÈNE sont certaines aménorrhées, les oligoménorrhées et les dysménorrhées par infantilisme génital, et enfin les troubles de la phase hypofolliculinique de la ménopause (troubles fonctionnels ou trophiques).

Les aménorrhées secondaires répondent le mieux au traitement à la condition de retrouver la cyclicité normale et de prescrire le DISTILBÈNE du dixième au vingtième jour du cycle présumé.

**La posologie du DISTILBÈNE** est très variable :

Habituellement, 2 milligrammes par jour pendant dix jours dans l'intervalle des règles. Parfois, l'on est obligé de réduire ou d'augmenter ces doses.

Dans certaines oligoménorrhées et dysménorrhées, on prescrit 5 milligrammes par jour pendant les trois jours qui précèdent les règles.

En fait, le DISTILBÈNE est une thérapeutique très commode et fort maniable. Elle possède en outre l'avantage d'être peu coûteuse, ce qui en permet un usage étendu.

Cependant, avant de prescrire le DISTILBÈNE, le diagnostic d'Hyperfolliculinie doit être bien précisé, afin d'éviter échecs ou intolérance.

**Contre-indications.** — D'abord ce sont les hyperfolliculiniques : il est évident que ces malades, déjà en surcharge de folliculine, supporteront très mal un nouvel apport d'œstrogène.

Puis, les hépatiques et les gastro-intestinaux.

Enfin le vagotonisme constitutionnel favorisera les troubles, car le DISTILBÈNE est inhibiteur du sympathique.

Hors de ces contre-indications, d'ailleurs parfaitement logiques, le DISTILBÈNE est très bien supporté par les malades.

### Présentations :

DISTILBÈNE 1. Boîte de 25 dragées à 1 mgr.  
Prix : 20 fr. 70.

DISTILBÈNE 5. Boîte de 25 dragées à 5 mgr.  
Prix : 46 francs.

En dépôt chez tous les grossistes de France et des Colonies.

### Laboratoires M. BORNE

24, rue des Ursulines — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

## DITHIORAL

**Dithiosalicylate de magnésie R. A. L.**

**Propriétés.** — Antirhumatismal, analgésique, antitoxinique.

En un seul composé chimiquement défini, réalise simultanément les médications *salicylée* et *soufrée*.

Le Dithioral est très bien supporté par l'estomac. Pas d'intolérance, pas d'action secondaire.

**Indications.** — Rhumatismes aigus, chroniques, déformants.

*Sciatiques, Lumbagos.*

*Néuralgies* : dentaires, faciales.

*Migraines.*

**Mode d'emploi.** — Dose usuelle : 1 à 2 comprimés par jour.

Dose d'attaque : 2 à 6 comprimés espacés dans la journée, accompagnés d'un peu de liquide.

**Présentation.** — Boîte de 20 comprimés à 0 gr. 50.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des **E. KUHLMANN**

**S. THIERY, Pharmacien** — 19, rue Franklin, PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Service commercial :

15, rue de La Baume - PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Élys. 99-51.)

## DIURÈNE

— Extrait total d'*Adonis vernalis*. —

**Formes.** — Liquide ("Solution" et "Concentré"). Pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. — Agit rapidement sans accumulation. — Non toxique. — Prolonge l'action digitalique. — Provoque une diurèse abondante.

Contient tous les principes actifs de l'*Adonis*.

**Indications.** — Arythmie complète. Insuffisances ventriculaires. — Scléroses artérielles. — Néphrites chroniques. — Œdèmes.

**Posologie :**

Diurène ordinaire : 2 à 6 cuill. à café }  
Diurène concentré : 1/2 à 2 cuill. à café } par jour.  
Diurène pilules : 4 à 12 pilules }

Prix de vente au public :

Liquide : 21 fr. 70 ; Pilules : 17 fr. 60.

**Laboratoires CARTERET**

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I<sup>er</sup>). (Tél. : Opéra 43-79.)

## DIURÉPHÉDRINE

Élixir.

Chl. Ephédrine naturelle..... 2 cgr.

Iodure de Sodium et Caféine..... 30 cgr.

Teinture Adonis Vernalis..... X gouttes.

Par cuillerée à café.

**Action.** — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchoscécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

**Indications.** — Traitement de fond, Asthme bronchique, Emphysème, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie, Gazés, Toux.

**Posologie.** — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir (à diluer dans un peu de liquide).

Voir également : **Garéphédrine, Éphédrasmine et Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 23 fr. 80 le flacon de 25 cuillerées à café environ.

**Laboratoires SAUGIER-THORAL**  
DOLE (Jura).

## DIUROBROMINE

**Composition :**

Théobromine pure isotonisée et recristallisée.

**Forme :**

Cachets de 0 gr. 50.

**Indications :**

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 16 fr.

**Laboratoires**

**L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON  
(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.



## DIUROCALCINE GROS

Association Calcium-Théobromine.

**Indications.** — Diurétique cardio-rénal.

**Propriétés.** — Pouvoir diurétique exalté.

Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

**Posologie.** — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 14 fr. 90 les 24 comprimés à 0 gr. 50.

Durée moyenne : 8 jours.

## DIUROCALCINE IODURÉE

**Indications.** — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

**Dose.** — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Prix : 18 fr. 40 (durée moyenne : 8 jours).

**Laboratoire GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.  
(Tél. : 60-55.)

## DIUROCARDINE

**Composition.** — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

**Propriétés.** — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

**Forme.** — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

**Doses.** — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

**Dose cardiotonique.** — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

**Dose cardiotonique d'entretien.** — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 20 fr.

Compte chèques postaux : LYON n° 134-34.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON.  
(Tél. : Parmentier 31-29.)

## DIUROCYSTINE

**Composition.** — Benzo-camphorate de Lithine, Terpene, Castoreum.

**Forme.** — Cachets.

**Indications.** — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorrhagie. Aucune contre-indication.

**Doses.** — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

Boîte : 30 cachets. — Prix : 20 fr.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**  
9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.

## DIUROPHYLLINE

Diurétique rénal et Cardio-rénal.

Mieux toléré et plus actif que la théobromine.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés et ampoules injectables.

**Composition :**

Aminophylline (Vaso-dilatateur des artères du rein et toni-cardiaque)..... 0,10

Extrait stabilisé de Scille (Diurétique azoturique). 0,02

**Propriétés thérapeutiques.** — Diurétique puissant et complet.

Diurétique aqueux.

Diurétique déchlorurant par action sur les vaisseaux du rein et par action toni-cardiaque.

Diurétique azoturique.

**Indications.** — Insuffisance rénale.

Néphrite chlorurémique et hydropigène; avec rétention du sel, œdème, ascite.

Néphrite azotémique avec élévation du taux de l'urée sanguine.

Oligurie des maladies infectieuses, des intoxications, des cardiopathies.

**Posologie.** — a) 3 à 4 comprimés par jour, avant de manger ou entre les repas.

b) Une ampoule par jour en injection intramusculaire.

**Prix.** — Comprimés : 25 fr. 80. — Ampoules : 40 fr. 20.

**MONAL, Docteur en pharmacie**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 52-73.)

## DIUROPHYTE

**Extrait total d'Orthosiphon stamineus.**  
**Extrait total d'Humulus lupulus**  
 (Houblon).

Préparés par un procédé spécial, présentés sous forme de solution concentrée sucrée et aromatisée à l'orange.

**Propriétés.** — Diurétique végétal atoxique, modificateur des éliminations, stimulant des fonctions hépatiques.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, diluées dans de l'eau, ou même plus suivant avis du médecin. A prendre au moment des repas.

**Laboratoires Jacques LORTHIOIR**  
 22, rue Perceval — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Ségur 79-58.)

## DMELCOS

Stock-vaccin antichancrelleux.

Émulsion de bacilles de Ducrey (225 millions par cm<sup>3</sup>), injectable exclusivement par la voie veineuse.

**Indications.** — Traitement du Chancre mou et de ses complications : Bubon, Phagédénisme, Paralysie générale (pyrétothérapie).

**Présentations et mode d'emploi.** — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Prix de vente :

La boîte de 6 ampoules : 41 francs.

**CUTI-DMELCOS.** — Diagnostic du chancre mou par intradermoréaction. Ampoules de 1/4 de cm<sup>3</sup>, titrées à 450 millions de germes par cm<sup>3</sup> (boîtes de 5 ampoules).

Prix de vente :

La boîte : 13 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## DOGASTRO

**Présentation.** — Granulés en boîtes métal (19 fr. 50).

**Principes actifs.** — Pepsine amylacée, pancréatine, belladone pulvérisée, S. N. de bismuth, kaolin, carbonate de chaux, bi-carbonate de soude, malt, essence d'anis.

**Indications.** — Hypersécrétion, Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies, Pyrosis, Brûlures et aigreurs de l'estomac.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, à la fin de chaque repas ou au moment des douleurs.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-31.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

**Composition.** — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

**Formes.** — Poudre, granulé et comprimés.

**Propriétés.** — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

**Indications.** — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose*.

**Cure antidyspeptique.** — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

**Cures reminéralisantes, simple ou intensive.** — Voir fiche *Enophos*.

## DOLOMA INJECTABLE

**Composition.** — Lactophosphite. Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

**Propriétés.** — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

**Indications.** — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récidive post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix et N° d'Enregistrement au L. N. C. M.

La boîte de poudre *Doloma* ..... 20 fr. 10

L. N. C. M. 216-1..

— granulé *Doloma* ..... 22 fr. —

L. N. C. M. 216-2

— 10 ampoules *Doloma* 2 cc. 22 fr. —

L. N. C. M. 216-4

— 6 ampoules *Doloma* 5 cc. 22 fr. —

L. N. C. M. 216-5

— 100 comprimés *Doloma* .. 22 fr. 50

L. N. C. M. 216-3.

**Communications :** à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer, juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

**Laboratoire général d'Études Biologiques, S. A.**  
29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

## DOLOPHAN

**Composition :**

Poudres de Genêt, Colchique, Gelsemium, Aconit, Gaïac., Bleu de Méthylène .....	0,01
Frêne, Salicylate, Benzoate de Lithine .....	0,05
Phénylcinchoninate de soude (para-acetphénétidine).....	0,10
Diméthyl amino-antipyrine.....	0,25
Théobromine .....	0,05
Oxyde de Magnésie .....	0,05

Pour 1 cachet.

**Indication.** — Arthritisme.

**Posologie.** — 2, 3, 4 cachets par jour en dehors des repas, ou au moment des douleurs, avec une infusion.

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**  
20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## DOLOZYMES

**Forme.** — Cachets.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumatismes musculaires et articulaires, Névralgies, Sciatique, Goutte, Maux de reins, Lumbagos. Toutes douleurs.

**Formule.** — Acide Phénylcinchonique, 0,20 ; Acide Thyminique, 0,005 ; Acide Acétyl-Salicylique, 0,25 ; Soufre pur, 0,01 ; Globulaire, 0,05 pour un cachet.

**Posologie.** — Un ou deux cachets avant les repas de midi ou du soir, dans une infusion chaude ou dans un verre d'eau sucrée.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL-PARIS.

## DOLPYC

**Thérapeutique thermogène et révulsive.**

**Composition.** — Alcaloïdes totaux de piments desolanées, Chloroforme, Essences de serpolet, lavande, thym, géranium.

**Avantages.** — Puissant révulsif et sédatif, d'odeur agréable, dont on peut aisément doser l'action. Ne détermine aucune irritation de la peau.

**Indications et mode d'emploi.** — Dans tous les cas où une révulsion est indiquée : Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Sciatiques, Lumbagos, Points de côté, Pleurites, Entorses, Sequelles de fracture, Contusions.

Appliquer sur la région douloureuse une très légère couche de *Dolpyc* recouverte d'un carré de flanelle ou de coton cardé. Action renforcée par la chaleur humide (compresses chaudes).

**Présentation et prix.** — 14 fr. 60 le tube pour 20 applications environ.

**Recommandation importante:** Eviter le contact du *Dolpyc* avec les muqueuses et les parties sexuelles.

**Laboratoires René KROTOFF**

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII\*).

(Tél. : Marcadet 6196.)

## DORYL MERCK

**Composition.** — Chlorure de carbaminoylcholine.

**Propriétés.** — Excite le système nerveux parasympathique, dilate les artères, abaisse la tension sanguine, stimule le péristaltisme intestinal, active la sécrétion du suc gastrique.

**Indications.** — États atoniques de l'appareil digestif : atonie vésicale post-opératoire et rétention d'urine des accouchées, éclampsie et prééclampsie, constipation atonique, hypertension lorsqu'il n'y a pas d'altération des vaisseaux, ozène (traitement local).

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 002.

Boîtes de 3 ampoules à 0 gr. 00025, dans 1 cc.

Flacons de 20 cc. solution à 0 gr. 05 % (pour le traitement de l'ozène).

**Posologie.** — Par voie buccale : 1/2 à 2 compr. par jour. Par voie sous-cutanée ou intramusc. : 1/2 à 1 amp., jusqu'à 3 fois par jour.

Traitement local de l'ozène par instillations, badigeonnages ou pulvérisations de la Solution de DORYL à 0,05 %.

**Laboratoires SANOMÉDIA**

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX\*).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## DO.SA.NO.SAL

**DOuce amère, SAponaire, NOyer, SALe-pareille.**

**Formule du D<sup>r</sup> MARTIN DU THEIL**  
**Forme.** — Granulé soluble.

**Composition.** — Ce granulé contient par cuillerée à café : Extraits de douce-amère, 0 gr. 09696; de saponaire, 0 gr. 04848; de noyer, 0 gr. 07272; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

**Propriétés.** — Diaphorétique, diurétique.

**Indications.** — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

**Doses habituelles.** — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.  
L. C. M. n° 563.

**Laboratoires LAOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII\*).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

## DOSOTOL

**Présentation.** — Capsules-doses en gélatine.

**Composition.** — Paramino-benzoate de butyle, résorcine, excipient aromatisé.

**Indications.** — Affections congestives de l'oreille : Otites, Otalgies.

*Sédatif, Antiseptique, Non irritant, Non toxique.*

**Mode d'emploi.** — *Enfants et adultes :* Couper l'extrémité de la capsule et, la tête étant inclinée, injecter par pression le contenu dans le conduit de l'oreille malade.

Prix : 14 fr. 70.

**Laboratoires J. LAROZE**

54, rue de Paris, CHARENTON (Seine).

(Tél. : Ent. 01-41.)

## DOSURINE (TROUSSES)

Les Examens d'Urine et le dosage des éléments anormaux (Sucre, Albumine, Acétone) sont grandement facilités par l'emploi des

### Trousses Dosurine

qui, en assurant à ces examens la plus grande précision scientifique permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousses se présentent sous 4 modèles :

1<sup>o</sup> Trousse Index « La Dosurine », qui permet de déceler la présence de l'Albumine ou du Sucre.

2<sup>o</sup> Trousse A « La Dosurine », destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.

3<sup>o</sup> Trousse D « La Dosurine », destinée à doser la quantité de Sucre (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 36 fr. 70 (franco par poste : 41 fr. 70).

*Ampoules de renouvellement*  
La boîte de 10..... 17 fr. 10 (par poste : 21 fr. 10)  
La boîte de 20..... 32 fr. 70 (par poste : 36 fr. 70)

4<sup>o</sup> Trousse AC « La Dosurine », qui permet de déceler et doser l'Acétone.

Prix de la Trousse AC : 117 fr. 30 (franco : 127 fr. 30).

### Ampoules de renouvellement :

La boîte de 12 Ampoules pour 6 Recherches. 17 fr. 10 (par poste : 21 fr. 10).  
La boîte de 8 Ampoules pour 4 Dosages... 29 fr. (par poste : 33 fr.).

Remise de 30 % à MM. les Docteurs.

(Envoi franco notice sur demande.)

LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
Chèques Postaux N° 1352.39 Paris. (Tél. : Archives 71-92.)

## DRAG-BIL

### Le laxatif physiologique.

#### Composition :

Extrait sec stabilisé de feuilles d'artichaut.....	0 gr. 050
Extrait de romarin.....	0 gr. 025
Oléate de soude.....	0 gr. 025
Phénolphthaléine.....	0 gr. 065
Agar-agar.....	0 gr. 045

**Propriétés thérapeutiques.** — « DRAGUE » les canaux biliaires et permet à la bile de s'écouler normalement. Combat la constipation. Désinfecte l'intestin. Agit mécaniquement sur le péristaltisme intestinal.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Posologie.** — 1 ou 2 comprimés à avaler, après le repas du soir de préférence. Ne pas croquer, ne pas sucer.

Prix : 13 fr. 70.

Laboratoire GERAUDEL

3, rue Watteau — COURBEVOIE

## DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée.  
4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

**Avantages.** — 1<sup>o</sup> Efficacité accrue par absorption progressive. 2<sup>o</sup> Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3<sup>o</sup> Tolérance parfaite de l'estomac.

**Indications.** — Toutes les indications du Chlorure de Calcium.

**Posologie et mode d'emploi.** — Comme *re-calcifiant, antispasmodique, antianaphylactique*, contre les engelures, on préfère les *doses faibles* : 1 dragée au début de chaque repas avec une gorgée d'eau et une entre chaque repas (6 par jour), pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps.

Comme *hémostatique, antialbuminurique, déchlorurant, antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours.

Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

Prix : 21 fr. la boîte.

## DRAGÉCALCION GRANULÉ

Granulé de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosé à 0,25 par cuillerée à café : 2 cuill. à entremets = 1 gr. de chlorure de calcium.

**Indications.** — Pour les petits enfants et pour tous ceux qui ne peuvent avaler les dragées : toutes les indications du Chlorure de calcium.

**Posologie et mode d'emploi.** — Comme ci-dessus : une cuill. à café = 1 dragée.

Prix : 21 fr. la boîte.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 11-96.)

## DRAGÉES BENGUÉ

**Composition.** — Menthol, Borate de soude, Cocaïne ou Menthol, Borate de soude (sans cocaïne).

**Propriétés et Indications.** — Antiseptiques et anesthésiques sans sécheresse. Affections de la gorge. Pharyngites, Laryngites, Angines. Bien-faisantes dans les affections de l'estomac et contre les vomissements de la grossesse.

**Forme.** — Dragées.

**Posologie.** — 6 à 8 dragées par jour (laisser fondre dans la bouche).

**Prix :** 6 fr. 10 la boîte.

L. N. C. M., n° 516-2, 3.

**Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils**

Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX°).

(Tél. : Trin. 85-60.)

## DRAGÉES BONDONNEAU

**Traitement de l'obésité et de l'arthritisme.**

**Composition :**

Sels de la Source Bondonneau.....	0 gr. 10
Extrait mou aqueux de fucus vésiculosus.....	0 gr. 05
Poudre de Cascara-Sagrada.....	0 gr. 05
Iodure de potassium.....	0 gr. 05

Pour une dragée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Favorise l'oxydation des graisses en activant la production du ferment lipolytique. Aucun retentissement sur l'état général.

**Indications.** — Obésité. Toutes les manifestations de l'arthritisme.

**Doses.** — 3 à 6 dragées par jour, au milieu des repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 537-1.

**G. BRIENS, Docteur en Pharmacie.**

20 et 22, rue de la République — LYON (Rhône).

## DRAGÉES DU D<sup>r</sup> GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 dragées.

**Composition.** — Bromure de potassium associé à l'Arsenic et à la Picrotoxine.

**Indications thérapeutiques.** — Épilepsie, Affections nerveuses.

**Posologie.** — Par dragée :

Kbr .....	1 gr.
Arsenic.....	1 milligr.
Picrotoxine.....	1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME**

28, rue Velpeau — ANTONY (Seine).

(Tél. : Berny 02-25.)

## DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

**Propriétés.** — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,  
Reconstituer sans exciter.

**Indications.** — Chloro-Anémie, Nervosisme.

**Dose.** — 4 à 6 dragées par jour.

**Prix :** 18 fr. 20.

**Laboratoire MONTAGU**

10, rue de La Barouillère — PARIS (6°).

(Tél. : Suf. 36-59.)

## DRAGÉES HÉPATO-RÉNALES GROS

**Composition.** — Extrait mou de feuilles d'artichaut, Extrait mou d'orthosiphon, Hexaméthylènetétramine, Salicylate de phényle, Salicylate de pipérazine.

**Propriétés.** — Diurétique, antiurique, sédative, antiseptique.

**Indications.** — Rhumatisme, arthritisme, uricémie, goutte, cystite, colibacillurie, maladies infectieuses, urémie.

**Forme.** — Dragées.

**Doses.** — 4 à 10 dragées par 24 heures, à prendre au milieu des repas.

**Prix :** 20 fr. 70.

Durée moyenne de l'unité : 10 jours.

**Laboratoires GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND  
(Tél. : 60-55.)

## DRAGÉES HYGER

**Drainent la bile, Décongestionnent le Foie,  
Réduquent l'Intestin.**

### Formule :

Bile de bœuf dépigmentée .....	0,10
Extrait moi d'Evonymus.....	0,03
Extrait mou boldo .....	0,10
Extrait mou jusquiame.....	0,005
Poudre belladone .....	0,005
Agar-Agar pulv.....	0,10
Podophylline .....	0,02

**Pour une dragée glutinisée à double noyau.**

Dragées d'une activité remarquable dans le traitement de toutes les affections d'origine hépatique ou intestinale.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées par jour aux repas.

**Prix** de la boîte de 40 dragées : 17 fr. 50.

**Préparé au Laboratoire du GRINOFLUX**  
52, rue Germain — LYON.

## DRAGÉES LE BRUN TONI-CARDIAQUES

(Tonisystol.)

**Composition.** — Ouabaïne, Sulfate de Sparteïne, Extrait d'Adonis, Extrait de Cratægus, Extrait de Scille.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toni-cardiaques, Diurétiques, Sédatives de l'érythisme cardio-vasculaire, Sans accumulation.

**Indications.** — Insuffisance cardiaque ventriculaire gauche et droite, Asystolie, Troubles de conduction, Tachycardie, Myocardites, Œdèmes cardiaques.

**Posologie.** — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

**Laboratoire LE BRUN**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 71-33.)

## DRAGÉES MANNET FERRO-ERGOTÉES

### Composition :

Ergot de Seigle .....	5 cgr.
Fer .....	10 —

Par dragée.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

**Prix :** 20 fr. 80.

**Laboratoire MANNET**  
LOUDUN (Vienne).  
(Tél. : 134 Loudun.)

## DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

### Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale et des états adynamiques et asthéniques.

**Mode d'emploi** (sauf avis du médecin). — Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

**Formule B.** Spéciale pour diabétiques.

Prix : 17 fr. 70.

**Laboratoire CHATELUT**

H. CHATELUT, Pharmacien 1<sup>re</sup> classe  
65, rue Louis-Blanc — PARIS (X<sup>e</sup>).

## DRAGEVAL

(ex-DRAGÉES LUMEVAL)  
*Sédatives, antispasmodiques.*

**Composition.** — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	} 0 gr. 03
— — Passiflore.....	
— — Cratægeus.....	
Butylethylmalonylurée.....	

**Indications.** — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

**Posologie.** — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enreg. au L. N. C. M. sous le n° 27-2.

Prix : 20 fr. 60 l'étui de 42 pilules.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS.

(Tél. : Roq. 49-22.)

**Descouraux et Fils, Pharmaciens**  
Docteur en Pharmacie.

## DRAINHÉPAR

Draine les voies biliaires.

S'oppose aux fermentations digestives.

**Composition.** — A base de produits organo-phytochimiques non toxiques : peptones polyvalentes — sulfate de magnésie — extraits de boldo — genièvre — artichaut — salicylate de soude — charbon suractivé.

**Présentation.** — Granulé poudre très soluble.

**Indications.** — Agent de fluidification et excrétion biliaire, de décongestion et de désinfection du foie et de l'intestin. Congestion du foie et des voies biliaires — Lithiase — Ictère et Cholémie — Dyspepsies — Fermentations — Auto-intoxications — Colibacillose — Constipation et Dermatoses d'origine biliaire.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/4 à 1/2 verre d'eau. Déjeuner une demi-heure après. Egalement à midi et le soir.

*Enfants* : 1/2 à 1 cuillerée à café le matin.

**Laboratoire MARTIN**

47-49, rue Bonnabaud

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).



## DRAINOBYL

du Docteur L. Lafay.

**Composition.** — Salicylate, benzoate et bicarbonate de soude, Chlorotone, Hexylrésorcine, Chlorures de nickel et de cobalt, Teintures de boldo, romarin, pissenlit, combretum.

**Propriétés.** — Antiseptique biliaire, Antispasmodique-sédatif, Cholagogue, Cholérétique.

*Drainage doux des voies biliaires, avec action élective sur les phénomènes douloureux.*

**Indications.** — Troubles chroniques digestifs ou généraux dus à une insuffisance hépatique.

Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Ictères, Maladies de la nutrition, Maladies hépatiques des pays chauds.

Crises douloureuses hépato-vésiculaires, Cholécystites, Angiocholites, Foies sensibles ou douloureux. Aucune contre-indication.

**Forme.** — Granulé effervescent soluble. Goût de citron.

**Posologie.** — Troubles chroniques : 1 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau, le matin à jeun, 10 jours par mois.

Cholécystites, Congestion hépatique, Ictères : 1 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau, 2 à 4 fois par jour suivant la gravité de l'affection.

Crises douloureuses : 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau, tous les quarts d'heure, jusqu'à sédation.

**Enfants :** dans les troubles chroniques, et suivant l'âge, 1/4 à 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, le matin à jeun, 10 jours par mois. Augmenter les doses suivant la gravité de l'affection.

Boîte pour traitement de 10 à 20 jours. Prix : 22 fr.

Laboratoires du Docteur L. LAFAY

F. FERRAND, Docteur en pharmacie

69, rue de Provence, 54, Chaussée d'Antin  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 21-06.)

## DRAINOBYL

Agent de drainage des voies biliaires.

Stimulant des fonctions hépatiques.

Sédatif des spasmes biliaires.

Désensibilisation.

**Forme.** — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur très agréable.

### Composition :

Peptones de viande.....	2 gr. 500
— de poisson.....	0 gr. 500
— d'œuf.....	0 gr. 166
Extrait total de Jaborandi.....	0 gr. 333
Extrait sec d'artichaut.....	0 gr. 330
Chlorure de magnésium.....	0 gr. 333
Sulfate de magnésie P. C.....	16 gr.
Lactosérum.....	30 gr.

Pour 100 gr. de saccharure.

### Indications :

- 1° *Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires :* Insuffisance hépatique, Cholémie, Congestion du foie, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystite chronique, Angiocholites.
- 2° *Troubles dyspeptiques d'origine hépatique :* Somnolences post-prandiales, Dyspepsies secondaires, Vertiges et nausées, Inappétence, Constipation.
- 3° *États anaphylactiques d'origine alimentaire :* Prurit et urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Rhume des foins, Asthme, Dermatoses.

**Particularités.** — Le plus actif et le plus doux des médicaments de drainage biliaire, parce que sans action drastique sur l'intestin. Par son *Jaborandi*, évite toute réaction violente. Par son *Lactosérum*, agit à la fois sur l'évacuation biliaire et sur la diurèse.

### Posologie :

**Adultes :** Le matin, à jeun, une demi-heure avant toute alimentation, deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède. Cette dose peut être portée, suivant indication médicale, jusqu'à 4 et 6 cuillerées à café.

**Enfants :** demi-dose ou quart de dose selon l'âge.

Prix : 24 fr. 60.

Traitement de 20 jours, soit 2 cures.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Docteur en pharmacie

78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 33-78.)

## DRAINOFUX

Traitement phytothérapique, agissant d'une façon remarquable sur le système neuro-circulatoire masculin et féminin.

**Composition.** — Gelsemium sempervirens, Fucus vesiculosus, Marron d'Inde, Crataegus et Anémone pulsatille.

**Indications thérapeutiques.** — *Femmes*: Troubles menstruels, ménopause, bouffées de chaleur, migraines, hémorroïdes, suites de phlébite, varices.

*Jeunes filles*: Retard de la formation et troubles de la puberté.  
*Hommes*: Pléthore et congestion, hypertension, troubles hépatiques, varices, hémorroïdes.

**Présentation.** — En flacons de 24 cc.

**Posologie.** — *Femmes et jeunes filles*: X à XV gouttes 2 fois par jour, 1/4 d'heure avant les repas, pendant 15 jours par mois.

*Hommes*: XV à XX gouttes, 2 fois par jour, pendant 15 jours par mois.

Laboratoires du

### COMPTOIR GÉNÉRAL PHARMACEUTIQUE

J. MAUNAND, Docteur en pharmacie

146, avenue Parmentier — PARIS (XI\*).

(Tél.: Archives 15-85.)

## DRINAL

Cachets. Comprimés.

Composition :

Pour 1 cachet :	Aspirine .....	0,30
	Pyramidon .....	0,10
	Phénacétine .....	0,10
	Caféine .....	0,05
	Poudre de Dower .....	0,03
Pour 1 comprimé :	Poudre d'aconit .....	0,005
	Carb. de chaux .....	0,10
	Aspirine .....	0,30
	Acétanilide .....	0,10
	Caféine .....	0,05
	Phényléthylmalonylurée ...	0,01

**Indications et doses.** — *Cachets* (en boîte de 10): Grippe, fièvre, rhumatismes, etc., 2 à 4 par jour;  
*Comprimés* (en tube de 15): Névralgies, migraines, douleurs, maux de dents, etc., 2 à 4 par jour.

**Prix.** — 10 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M, sous le n° 1082-1.

A. MIRONNEAU, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél.: 18.)

## DROPARGYL

(Gouttes nasales.)

**Composition.** — Soluté aqueux complexe, à base d'albume argentique neutre à 20 p. 100 d'argent; sel d'éphédrine naturelle stable et essences balsamiques.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique puissant, sédatif des voies respiratoires supérieures. Décongestionne rapidement et d'une façon durable la muqueuse nasale, facilite la respiration. Vaso-constricteur sans action desséchante sur la muqueuse. Neutre, indolore et d'emploi agréable.

**Indications.** — Rhino-pharyngites aiguës et chroniques. Coryza. Sinusites. États infectieux. Gripes. Otites. Asthmes. Rhumes des foins.

**Forme et emploi.** — Se vend en flacons compte-gouttes spéciaux pour *instillations* nasales. (3 à 4 gouttes dans chaque narine, la tête penchée en arrière, 2 à 3 fois par jour. Pour les bébés, 1 à 2 gouttes seulement.)

**En pulvérisations.** — A l'aide d'un pulvérisateur nasal, faire quelques pulvérisations dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 16 fr. 90.

LABORATOIRE M. G.

92, rue Émile-Guichenné — PAU (Basses-Pyrénées).

## DRYCO

Lait sec non sucré.

Analyse approximative :

Matières grasses .....	12 p. 100.
Sucre de lait .....	46 —
Matières azotées .....	32 —
Sels .....	7 —
Eau .....	8 —

**Indications.** — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

*Pour nourrissons*: digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

*Pour adultes*: régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

**Doses.** — Dilution normale: une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée (6 gr.) et 50 gr. d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél.: Opéra 59-09.)

## D<sup>3</sup> SECLO

**Antirachitique.** Fixateur de calcium à base de vitamine D naturelle.  
**Composition.** — Vitamine D naturelle : /100<sup>e</sup> de milligr. ou 4 0 U. I.  
 Inosito hexaphosphate de calcium et de magnésium... 0 gr. 05  
 Phosphate tricalcique..... 0 gr. 15

**Présentation.** — Comprimés. Préparation stable, dosée biologiquement. Les 4 0 U. I. de vitamine D par comprimé représentent la dose moyenne nécessaire journellement à l'enfant et à l'adulte.

**Propriétés.** — Favorise l'absorption, l'assimilation du calcium et équilibre le rapport calcium-phosphore.

La vitamine D<sup>3</sup>, Vitamine naturelle, celle qui existe dans l'huile de foie de morue et dans les téguments animaux irradiés, est la forme la plus active de la vitamine D.

**Indications.** — Rachitisme sous toutes ses formes. Retards de croissance et d'ossification. Développement physique difficile. Suites de fractures. Dentition incomplète. Fragilité dentaire. Grossesse. Convalescence.

**Posologie.** — *Nourrissons et enfants* : 1 à 4 comprimés par jour.  
*Adultes* : 2 à 8 — — —

ou selon la prescription médicale.

Pour les nourrissons et les tout jeunes enfants, écraser le comprimé et le délayer dans un peu de lait ou de boisson tiède.

Prix. La boîte de 60 comprimés : 17 francs.  
 Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-5.

**Laboratoires SECLO**  
**G. COGNE, Pharmacien**

6, rue Adolphe-Lu-Lyre — COURBEVOIE (Seine).  
 (Tél. : Défense 28-71, 13-34.)

## DUNA-CAÏNE

### Anesthésie locale.

Gluconate de para-aminobenzoyldiéthyl-aminoéthanol.)  
 Action précoce, efficace, sans troubles secondaires, due à l'emploi d'un sel de grande affinité cellulaire. Solutions stables.

**Indications et présentation.** — *Anesthésie locale régionale* : ampoules de 2, 5, 10 et 20 cc. à 1 p. 200 et 1 p. 100.

*Petite chirurgie* : ampoules de 1 et 2 cc. à 2 p. 100 et 4 p. 100.

*Anesthésie épidurale* : ampoules de 30 cc. à 1 p. 100.

*O.-R.-L., Stomatologie, Ophthalmologie* : ampoules de 2 cc. à 2 p. 100 et 5 p. 100 avec vaso-constricteur.

*Urologie* : ampoules de 5 et 10 cc. à 2,5 p. 100 pour anesthésie par contact.

*Infiltration des ligaments (entorses) et du sympathique* : ampoules de 10 cc. à 1 p. 100.

**Les Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>**  
 Docteurs en Pharmacie.

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Élysées 61-46.)

## DUNA-CAÏNOL

### Pommade analgésique.

**Principe actif.** — Tétra-méthyl-cyclopentane-carabaïde 'aminocaïne.

**Indications.** — Pommade sédative des douleurs de la peau et des muqueuses : prurit anal et vulvaire, prurit sénile, prurit diabétique, hémorroïdes, brûlures, urticaire, zona, radiodermite, plaies cancéreuses, algies, démangeaisons.

**Contre-indication.** — Eczémas évolutifs et toutes affections dermatologiques non justiciables d'un traitement par les anesthésiques.

**Mode d'emploi.** — *S'il y a plaie*, appliquer une compresse enduite de *Duna-Cainol*.

*S'il n'y a pas plaie*, onction plus ou moins prolongée avec le *Duna-Cainol* et laisser en place une compresse enduite de pommade.

**Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>**

Docteurs en pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Élysées 61-46.)

## DUNA-PHORINE

*Sels de Morphine à acides organiques.*

### AMPOULES

#### 3 Formules, 3 Modes d'Action.

La *Duna-Phorine*, préparée avec des acides organiques expérimentalement choisis, permet :

- 1° De régler la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux selon le but poursuivi ;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alkaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses ;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables.

#### Indications :

*Duna-Phorine rapide* (phényl-propionate de morphine) : action presque immédiate. Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, analgésie pré-opératoire, crises d'asthme.

*Duna-Phorine lente* (gluconate de morphine) : action moins immédiate, mais très prolongée. Zones, hémoptysies, douleurs néoplasiques et tabétiques, grandes algies.

*Duna-Phorine mixte* (phényl-propionate et gluconate de morphine) : action à la fois immédiate et prolongée

### SUPPOSITOIRES

*Une seule formule.*

Mêmes indications que les suppositoires de Morphine avec tous les avantages de nos sels spéciaux.

#### Formes :

*Ampoules* : boîtes de 7 ampoules correspondant à 1 ou à 2 centigr. de chlorhydrate de morphine.

*Suppositoires* : boîtes de 6 suppositoires dosés à 0 gr. 005 de morphine base hydratée à l'état de sels organiques.

#### Mode de prescription :

*Ampoules* : *Duna-Phorine lente* ou *rapide* ou *mixte* à 1 ou 2 p. 100.

Une boîte de 7 ampoules : 1 ampoule par jour.

Deux boîtes 7 ampoules : 2 ampoules par jour, etc... (*Produit du tableau B.*)

*Suppositoires* : 1 à 3 suppositoires par jour (*prescription ordinaire*).

Les Laboratoires **BRUNEAU et Cie**

Docteurs en pharmacie.

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Élysées 6146.)

## DYCHOLIUM

**Composition.** — Ampoules de 5 cc. contenant 1 gr. de déhydrocholate de soude. *Comprimés* dosés à 0 gr. 30 d'acide déhydrocholique.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules pour injections intra-veineuses. Tube de 20 comprimés.

**Propriétés.** — *Cholérétique* (non cholagogue), diurétique, désensibilisant.

#### Indications :

*Des injections intraveineuses* : Ictères par angiocholite, cholécocite, icères par hépatite prolongée, suites d'interventions portant sur les voies biliaires avec ou sans drainage externe. Toutes maladies par sensibilisation : intolérances médicamenteuses, accidents sériques... Delirium tremens, dépression. Oligurie d'origine cardiaque (employé seul ou associé aux diurétiques mercuriels, dont il potentialise les effets).

*Des comprimés* : Complément des cures par voie veineuse. Tous les phénomènes de *petite insuffisance hépatique* : cholémie, démangeaisons, céphalée, somnolence post-prandiale, selles décolorées. *Constipation*. Lithiase biliaire à toutes les phases de son évolution. Ictères. Oxyurose.

**Posologie.** — 1° *Ampoules* : *Adultes* : 1 gr. ou mieux 2 gr. (soit 1 à 2 amp.) tous les jours ou tous les deux jours. Cures de 6 à 10 injections.

*Enfants* : De 5 à 10 ans : 0 gr. 50 (soit 1/2 ampoule). De 10 à 15 ans : 1 gr. (soit 1 ampoule).

Prévenir le malade d'un goût amer transitoire apparaissant pendant l'injection intraveineuse.

2° *Comprimés* : *Adultes* : 1 à 6 par jour par périodes de 10 jours.

*Enfants* : De 2 à 10 ans : 1 à 3 par jour.

De 10 à 15 ans : 2 à 4 par jour.

Prendre les comprimés au début ou à la fin des 3 repas.

Étant donné leur goût amer, il est inutile, mais non contre-indiqué, de les croquer.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

### THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## DYNAVITAMINE

**Forme.** — Granulé friable, vitaminé irradié.

**Composition.** — Ergostérine irradiée (vit. D), 0,0005. Carotène (vit. A), 0,000 015. Extrait d'huile de germes de blé (vit. E), 0,0005. Extrait thyroïde, 0,02. Extrait surrénale, 0,10. Extrait de rate, 0,10. Glycérophosphate de chaux, 5. Gluconate de chaux, 2. Inositolphosphate acide de chaux et de magnésie, 2. Phosphate tricalcique, 3. Excipient sucré et aromatisé, Q. S. p. 100 gr.

**Indications.** — Anémie de toutes natures, Convalescence, États post-opératoires, Faiblesse générale, Grossesse, Allaitement, Dentition défectueuse ou tardive, Rachitisme, Scorbut, Carences diverses, Menace de tuberculose, Surmenage, Tous états de décalcification et de dénutrition.

**Doses et mode d'emploi.** — Sauf avis contraire du médecin :

*Adultes* : 3 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants* : 3 cuillerées à café par jour.

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café en trois fois dans la journée.

A croquer ou faire dissoudre dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 25 fr. 50.

### Laboratoires MALAVAL

Ch. MALAVAL et J. ROUSSELIN, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe.  
8, rue Fleury — LYON-OULLINS (Rhône).

## DYNOSTHÈNE

Comprimés.

*La cure magnésienne rationnellement conduite par adjonction d'un complexe polyminéralisé équilibré et assimilable.*

**Indications.** — Tous les états de carence magnésienne;

1<sup>o</sup> Atonie du tube digestif, congestion hépatique, constipation atonique.  
2<sup>o</sup> Syndromes neuro-dépressifs (Psychasthénie, angoisse, surmenage intellectuel, débilité génitale).

3<sup>o</sup> Convalescence des maladies infectieuses asthéniantes (grippe, fièvre typhoïde, etc.).

4<sup>o</sup> Prophylaxie du cancer. Puissant modificateur du terrain (prévention des récidives post-opératoires).

**Composition.** — Complexe phospho-magnésien polyminéralisé. (Chl. de Magn. Magnésie calcinée, Glycéroph. de Magnésie, Glycéroph. de Ca., Phosphore organique, Nucléinate de fer et Manganèse.)

**Forme et Posologie.** — 1 boîte de 45 comprimés.

2 à 4 comprimés par jour avant ou pendant les repas, de préférence le matin et à midi.

**Traitement.** — Ininterrompu pendant quelques semaines (aucun inconvénient à être continué pendant plusieurs mois).

*Adjuvant des cures thermales (Vichy, Vittel, etc...)*

Aucune contre-indication.

Prix : 23 fr. 20.

### Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Ph<sup>a</sup>. 183, rue de Rome — MARSEILLE.

## DYSARIODE

Association d'Iodobismuthate d'Oxyquinoléine, de Curcuma Xanthoriza, d'Ipéca, de Sous-Gallate de Bismuth.  
Comprimés à libération intestinale.

**Propriétés.** — Action antitoxique par l'Oxyquinoléine et l'Iode. Action topique sur les muqueuses (libération de l'oxyhydrate de bismuth colloïdal).

Action régulatrice sur les sécrétions et le transit digestif.

Action de drainage par les petites doses d'Ipéca.

Action cholérétique et cholagogue par le Curcuma.

Action parasiticide puissante.

**Indications.** — Fermentations intestinales, Entérocrites, Gastro-entérites aiguës et chroniques, Intoxications alimentaires, Aérocolies, Aérogastrites, Selles fétides, Insuffisance hépatique, Atonie intestinale, Constipation.

Amibiase, Protozoose, Dysenterie amibienne.

**Posologie.** — *Adultes* : 4 à 8 comprimés par jour, au milieu des repas.

*Enfant* : à partir de 6 ans, 1 à 2 par jour.

Boîte de 20 comprimés. Prix : 20 francs.

Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 196-8.

### Laboratoires du VIOPHAN

44, Grande-Rue — ARGENTEUIL. (Tél. 506.)  
R. C. Versailles 51-242. C. C. P. Paris 2-365-71

## DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,  
extrait du porc vivant.

Procédé du D<sup>r</sup> HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

*Enfants* : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Enregistré au L. N. C. n° 514-8.

Adresser toutes demandes :

### Produits Biologiques CARRION

L. CUNY

Docteur en Pharmacie, Docteur ès Sciences

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## DYSPEPTOL

**Composition.** — Poudre saturante de l'acidité gastrique : au sel de Vichy, Kaolin, Bismuth, Carbonates alcalino-terreux, Gardénal, Belladone.

**Indications.** — Toutes gastralgies et spasmes.

**Présentation.** — Poudre très fine, aromatisée à la Badiane.

Boîte de 130 gr. environ.

**Posologie.** — 2 cuillerées à café à 10 minutes d'intervalle au moment de la douleur.

Prix au public : 16 francs.

**Laboratoires BARDIAUX**

39, rue de Reims — VICHY (Allier).

## DYSPNÉ-INHAL

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Rhume des foies, Coryza spasmodique, Obstruction nasale, Gaz de guerre.

**Composition.** — Solution pour pulvérisation buccale d'adrénaline stabilisée et activée à dose infinitésimale.

**Avantages.** — Supprime toute crise, même violente, en quelques secondes. Supprime les piqûres. Innocuité permettant l'application aux jeunes enfants.

**Mode d'emploi.** — Quelques gouttes dans l'atomiseur spécial de poche. Au moment de la crise, faire une pulvérisation dans la bouche en aspirant. La crise cesse instantanément.

**Prix :** Pulvérisateur : 46 fr. 80.

Liquide (pour 2 mois) : 18 fr. 20

Prix spéc. au médecin pour usage personnel.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. sous le n° 1020-1:

**A. FOURTON, Docteur en Pharmacie**

38, rue du 11-Novembre

CLERMONT-FERRAND (P.-de-D.). (Tél. : 31-21.)

## DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.

**Indications.** — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale. Inaptitude au travail.

**Forme : GOUTTES.**

**Emploi et doses :**

**Adultes :** XL gouttes au total par jour, en deux fois aux repas, dans un peu d'eau.

**Vieillards :** XXX gouttes au total par jour.

**Enfants :** de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— de 12 à 16 ans : XII — —

— de 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 21 francs.

Durée moyennée : 15 à 20 jours.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

## DYSTONINE CHATRON

**Comprimés.**

Association équilibrée des médicaments du sympathique et du vague.

Ethyl-phényl-malonyl-urée ..	0 gr. 01
Extrait de Crataegus .....	0 gr. 05
Bromure de Calcium .....	0 gr. 10
Poudre de parathyroïdes ....	0 gr. 0003

**Propriétés.** — Sédatif et régulateur parfait des dystonies neuro-végétatives, cardio-tonique, antispasmodique.

**Indications.** — Insomnies, aérophagie et tous troubles et dérèglements du système vago-sympathique : émotivité, anxiété, nervosité, angoisses, dépressions, dyspepsies nerveuses, entérococolites spasmodiques, spasmes cardio-vasculaires, angor, troubles endocriniens notamment de la menstruation et de la ménopause.

**Posologie.** — **Adultes :** 3 à 6 comprimés par jour en plusieurs fois, de préférence avant les repas.

**Enfants :** 1 à 2 comprimés.

Prix : 21 fr. 50, le flacon de 40 comprimés.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1232-1.

**Laboratoires M. CHATRON, Docteur en Pharmacie,**  
146-150, rue de la République — MONTLUÇON (Allier).

## ECTO-STÉRANDRYL

(Usage externe.)

**Composition.** — Solution alcoolique de testostérone destinée à l'absorption per-cutanée de l'hormone mâle, dans un but d'action générale.

**Indications** (Cf. STÉRANDRYL). — L'ECTO-STÉRANDRYL permet de compléter ou de prolonger les effets des cures de STÉRANDRYL par injections.

**Chez l'homme:** Hypogénitalisme, Asthénies, Sénescence, Impuissance, Prostatisme.

**Chez la femme:** Mastopathies, Métrorragies.

**Chez l'enfant:** Retard de la puberté, Syndrome adiposo-génital.

**Présentation.** — Flacon de 10 cc. contenant 50 mgr. de testostérone.

**Mode d'emploi.** — Vider le contenu du compte-gouttes sur une surface cutanée plane (abdomen, pli du coude, face interne de la cuisse) et frictionner doucement jusqu'à évaporation du solvant. Ne pas appliquer sur les organes génitaux.

**Prix au public:** Le flacon ..... 58 fr.

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL  
LABORATOIRES FRANÇAIS  
DE CHIMIOTHERAPIE

S. A. au cap. de 10 000 000. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, r. du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél.: Lit. 58-43.)

## ECZÉDA

*Ichtyosallcylé.*

Pommade polyréductrice, doit à son excipient:

Son pouvoir absorbant.

Ses qualités d'épidermisation.

Ses propriétés antitoxiques.

**Indications.** — *Dermatoses suintantes et prurigineuses:* Eczémas sous ses différentes formes; Érythèmes, Prurits; Eczéma et Érythème fessier des nourrissons — *Brûlures. Engelures. Plaies.*

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux  
PARIS (IV<sup>e</sup>). Tél.: Arch. 69-03.

## ECZOSEC PORCHER

Pâte adhésive sans corps gras. Sèche rapidement.  
Ne tache pas. S'enlève à l'eau.

**Véritable pansement dermatologique ne nécessitant l'emploi ni de bandes, ni de gaze, ni de poudre.** Protège la peau et permet la respiration.

**Mode d'emploi.** — Etendre en couche mince, mais homogène, et laisser sécher simplement. Ne jamais mettre de pansement ni poudrer. Renouveler chaque jour l'application après avoir enlevé la couche précédente avec un tampon d'ouate imbibé d'eau.

**Indications.** — Eczémas secs. Dermites. Prurits. *Préservatif et curatif* des différentes formes d'Erythèmes: Érythèmes solaires; Érythèmes des nourrissons; Érythèmes provoqués par le vent, les reflets de la neige, les piqûres d'insectes. Dans les *Dermatoses suintantes*, complément de l'Eczéda comme pansement de jour.

**Eczosecs spéciaux:** *Ichtyolé* (Dermites eczémateuses). *Benzolique* (Dysidroses parasitaires).

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
Tél.: Arch. 69-03.

## ÉDISTOL

**Composition.** — Acide borique, tartrique, citrique; menthol, huile de Pinus sylv., gaulcol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styra benz.

**Indications.** — Toutes affections et antiseptisme des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

**Mode d'emploi.** — *Gargarismes* et bains de gorge: 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

**Fumigations:** 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

**Vaporisations:** 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

**Bain nasal:** 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Échantillon sur demande.

Prix: G. M., 18 fr. 20.

Laboratoire de l'ÉDISTOL

H. DUFOUR, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Anc. interne des hôp. de Paris,  
40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). (Tél.: 21-28.)

## EDRICAMPHRE

**Forme pharmaceutique et composition.** — Ampoules de 2 cc. de solution aqueuse correspondant à 2 cgr. d'*Ephédrine naturelle* et 20 cgr. de *Camphre*. (Boîte de 5 ampoules.)

**Propriétés et avantages.** — L'EDRICAMPHRE est le médicament type de la *défaillance du cœur périphérique*. Facilité de l'injection sous-cutanée. Indolence absolue, diffusion et absorption rapide. Pas de rétention ni d'abécédation.

**Indications thérapeutiques.** — Tous états *hypotensifs* (choc toxique, infectieux ou traumatique).

Avant, pendant et après les *interventions chirurgicales*.

Accidents sériques et post-opératoires.

**Mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 ampoules par jour en injections *sous-cutanées* ou intramusculaires.

**Prescription.** — 1 boîte ampoules EDRICAMPHRE FALVY.

L'EDRICAMPHRE existe également sous la forme *gouttes* (même composition) pour instillations et pulvérisations nasales et pour l'usage interne (XX à XL gouttes 3 à 5 fois par jour) dans l'asthme, le coryza spasmodique et les états allergiques.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires FALVY

Licencié des sciences,

Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## ÉDUCTYL

**Suppositoire antidyschésique « sul generis ».**

Procédé de Fabrication Breveté S. G. D. G.

**Mode d'action.** — Dégagement lent dans le rectum de gaz carbonique, ce qui déclenche promptement le réflexe dilatateur.

**Avantages particuliers.** — 1° Remplace les purgatifs et les lavements ; 2° Ménage le tube digestif ; 3° Emploi propre et aisé.

**Indications.** — Toutes formes de constipation rectale ou rectosigmoïdienne, surtout chez les dyschésiques habituels, les hémorroïdaires, les congestifs pelviens, et chez les constipés occasionnels : infectieux, opérés, parturientes, malades alités de tout ordre.

**Posologie.** — Un suppositoire au moment voulu ; un deuxième une demi-heure après dans les cas opiniâtres.

Boîtes de 6 ..... 8 fr. 60

— de 12 ..... 15 fr. 50

— de 25 ..... 28 fr. 80

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1492-1.

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

## EFEVITA

**Composition.** — Ester éthylique de l'acide isolinololéique (vitamine F).

**Indications.** — Troubles du métabolisme des lipides.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

## THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## EFRYL-SIROP

**Composition.** — Sirop à base d'*Ephédrine* et de *Codéthyline*.

### Formule :

Chlorhydrate d'éphédrine...	0,10	Salicylate de soude...	0,10
Codéthyline.....	0,08	Drosera.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	0,10	Sirop de serpolet Q.S.P.	100 cc.

**Présentation.** — Flacon de 150 cc.

**Propriétés.** — Antispasmodique, eupnéique, sédatif antiseptique.

**Indications.** — *Toux en général*. Rhumes, Trachéites, Laryngites, Bronchites aiguës et chroniques, Complications pulmonaires de la grippe, Emphysème, Asthme, Rhume des foins, Coqueluche.

**Posologie.** — 1 cuillerée à bouche d'Efryl-Sirop contient 0 gr. 015 d'*Ephédrine*.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour. *Enfants* (au-dessus de 2 ans) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

A prendre 1/2 heure avant les repas, ou 2 heures après.

Éviter de donner l'EFRYL-Sirop immédiatement avant le coucher.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

## THERAPLIX

98, rue de Sèvres, PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)



## ÉKINEUROL

Fortifiant. Stimulant nerveux et musculaire.

**Composition.** — Comprimés, à base d'extraits de noix vomique et de Damiana, d'huile de germe de blé (vitamine E), d'inosito-hexa-phosphate de calcium et de magnésium et de glycéro-phosphate de chaux.

**Indications.** — Affections d'origine nerveuse. Fatigue physique et intellectuelle. Surmenage. Asthénie. Frigidité masculine et féminine. Équilibre sexuel. Insuffisance glandulaire.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour pris aux repas, ou selon la prescription médicale.

L'Ékineurol est dépourvu de toute toxicité et ne provoque aucune accoutumance.

Prix : 30 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-17.

**Laboratoires SECLO**

G. COGNÉ, Pharmacien

6, rue Adolphe-La Lyre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## EKTAL

### Composition :

Peptone de viande.....	5 gr.
Chlorure de magnésium.....	2 gr. 50
Sulfate de magnésium.....	10 gr.
Sulfate de sodium.....	2 gr.
Tartrate de soude et de potasse.	5 gr.
Extrait d'artichaut.....	0 gr. 50
Sucre vanillé.....	Q. S.

Pour 100 gr. de granulé.

**Mode d'action.** — Cholérétique et cholagogue doux, légèrement laxatif. Assure le drainage biliaire et l'évacuation intestinale sans traumatiser le tube digestif.

**Indications.** — Syndrome entéro-hépatique, Congestions du foie et de la vésicule, Hépatites, Ictères, Cholécystites chroniques, Constipation, Dermatose.

**Mode d'emploi.** — Granulé : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun dans un peu d'eau ou dans une tisane chaude.

Il existe également une forme « Comprimés » (en prendre 5 le matin à jeun).

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Laboratoires FALVY**

40, rue des Acacias — PARIS (XVII°).

## EKTOGAN BOCQUILLON

A base de peroxyde de zinc, l'Ektogan Bocquillon dégage d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc.).

**Indications.** — Chirurgie, Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Obstétrique, Gynécologie, Soins des nouveau-nés.

**EKTOGAN-POUDRE** pour désinfection, désodorisation et cicatrisation, avec action desséchante de toute plaie. Traitement de l'Hyperhydrose.

Prix : le flacon poudreur : 17 fr. 70.

**EKTOGAN-POMMADE** pour cicatrisation et traitement des dermatoses et brûlures.

Prix : le tube : 16 fr. 90.

Pansements à l'**EKTOGAN** : gaze, mèches (largeur 1 cm., 2 cm. 5 et 5 cm.), ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux.

**Laboratoires DERNIS**

12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Trudaine 09-64.)

## EKTOPHANOL

Adopté par les hôpitaux.

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine carbonique.

**Indications.** — Rhumatismes musculaires ou articulaires, aigus ou chroniques, goutte, sciatique, lumbago, etc.

**Mode d'emploi.** — 4 cachets par jour (2 avant chaque repas) pendant 4 jours. Repos 4 jours.

### Présentation :

Boîte. G. M. de 32 cachets dosés à 0 gr. 20 : 20 francs.

Boîte. P. M. de 16 cachets dosés à 0 gr. 20 : 10 fr. 70

*Durée moyenne des unités venie :*

G. M. : 12 jours. — P. M. : 4 jours.

**Laboratoires de Blochlmé médicale.**

**CH. DESGREZ**

Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loe — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

## ÉLAIADINE

(*Oliva-Olivier.*)

Traitement phytothérapique de l'hypertension artérielle.

**Forme.** — Gouttes.

**Composition.** — Extrait stabilisé :

De feuilles fraîches d'Olea Europea ...	80 gr.
De fruits de Crataegus Oxyacantha ...	10 gr.
D'écorce de Betula Alba .....	10 gr.
<b>Total :</b>	<b>100 gr.</b>

**Indications.** — Hypotenseur, fébrifuge, diurétique, antitoxique.

Presclérose, Artériosclérose, Hypertension, Brightisme, États anxieux, Vertiges, Éréthisme cardiaque, Tachycardie, Angor pectoris, Syndrome hépatobiliaire.

**Posologie.** — XX à XXX gouttes par jour aux deux principaux repas dans un peu d'eau.

Laboratoires de l'ÉLAIADINE

1, rue de Verdun — MONTPELLIER

Formule de Marcel MURAT, docteur ès sciences, Pharmacien

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1409-3.

## ÉLASTOPLASTE

**Forme essentielle.** — Bandes de 1 et 2 m. 1/2 de long et de 3 à 30 centimètres de large.

**Composition.** — Sparadrapp adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre orpèpe) et d'une masse adhésive au ZnO.

**Formule A :** Entièrement enduite (occlusive).

**Formule B :** Partiellement enduite.

**Formule C :** Ajoutée.

**Formule S :** Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

**Indications :**

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs).

Extensions continues (formule A ou B : 2 m. 1/2 × 6 et 8 cm).

Traitement des ulcères variqueux (formule A : 2 m. 1/2 × 8 cm).

**Prévention et Traitement abortif des phlébites chirurgicales et périphlébites.**

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m. 1/2 × 3 cm).

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

**Autres présentations :**

**Elastodoigts :** noir ou chair.

**Elastoplaques :** existe en 4 × 4 cm. — 6 × 4 cm — 6 × 6 cm, etc...

**Sparalsa :** Pansement élastique en largeur, portant une compresse au Dermatol dans le sens de la longueur; existe en 4, 6 et 8 cm. de large.

**Elastovaccin :** Protecteur après vaccination.

**Elasto-yeux :** S'adapte à la forme de la tête.

**Elastocapsul :** Emplâtre élastique au Capsicum.

**Elasto/uron :** Emplâtre au Vigo, élastique et poreux.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 659-5.

Laboratoires FISCH et Cie, S. à r. l.

VIBRAYE (Sarthe).

Agence : 104, Frg Poissonnière — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Trudaine 92-52.)

## ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège.

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

**Dose et mode d'emploi.** — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

**A titre préventif.** — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'Elatine peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphyseme, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyérites, gravelle).

Prix : Le flacon 12 fr. 80.

L. N. C. n° 474-3.

Laboratoire FAGARD

LONS-LE-SAUNIER (Jura).

## ÉLECTRARGOL

*Argent colloïdal électrique à petits grains titrant 0,40 p. 1 000 (forme injectable) ou 0,70 p. 1 000 (usage local).*

**Propriétés.** — *Anti-infectieux omnivalent, par action directe sur les moyens de défense de l'organisme.*

**Indications.** — *Toutes infections locales et générales: Septicémies, gripes, maladies infectieuses. Suppurations et infections en chirurgie générale, en urologie, en gynécologie, en obstétrique, en oto-rhino-laryngologie.*

### Formes :

**Ampoules** de 1, 2, 5, 10 ou 25 cc., pour injections intramusculaires ou intraveineuses (doses moyennes : 10 à 20 cc.).

**Flacons stérilisés** de 50, 100 et 250 cc., pour pansements, lavages ou voie buccale.

**Pommade et Outils.**

## COLLYRE D'ÉLECTRARGOL

**Ampoule compte-gouttes stérilisée** pour instillations nasales et oculaires.

**Infections des voies respiratoires supérieures, maladies infectieuses, grippe, conjonctivites.**

**Ampoules compte-gouttes** de 25 cc., au titre de 0,70 p. 1 000.

**Ampoules de remplissage** de 25 cc. (pour recharge de l'ampoule compte-gouttes).

## PYOVARGOL

**Pommade au colloïdo-vaccin argentique antipyogène.**

**Émulsion microbienne** ayant fixé par absorption des micelles argentiques.

**Vaccin pour usage local** (application sous pansement).

**Plaies infectées, suppurations localisées, furoncles, anthrax, abcès, panaris, plaies atones, escarres.**

**Tubes de 30 grammes.**

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V°).

## ELGINE JULIEN

Comprimés.

### Composition :

Collargo largent colloïdal ....	0,03 cent.
Benzoate de soude .....	0,40 —
Formine.....	0,20 —

En comprimés glutinisés.

**Indications.** — *Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).*

**Posologie.** — *Adultes : 3 à 6 comprimés par jour. Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion.*

**Prix : 15 fr. 50.** — Boîte gratuite sur demande.

**Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

105, rue de Rennes — PARIS (VI°).

(Tél. : Littre 80-76.)

## ÉLIPOL

**Principe actif.** — *Dinitro 4-6-0-Crésol chimiquement pur.*

**Indications.** — *Embonpoint, Obésités, Oreximanie, Sédentarité, Ralentissements de la nutrition.*

**Forme.** — *Comprimés glutinisés.*

**Doses.** — *1 comprimé par 10 kg. de poids, soit :*

De 70 à 80 kg. : 7 comprimés.

De 80 à 90 kg. : 8 comprimés.

De 90 à 100 kg. : 9 comprimés.

100 kg. et au-dessus : 10 comprimés.

(Dose quotidienne usuelle.)

### Prix :

23 fr. 40 la boîte de 70 comprimés.

86 fr. 70 la boîte de 350 comprimés.

**Laboratoires DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## ÉLITYRAN

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Préparation et soluté injectable de glande thyroïde.

**Propriétés et indications.** — Possède les propriétés totales de la glande thyroïde. Augmente le métabolisme basal, active la diurèse, stimule la formation du cal.

Myxœdème, Crétinisme, Obésité, Oligurie, Troubles de la croissance et du développement intellectuel. En applications locales dans les Ulcères atones.

**Posologie.** — Par voie buccale : *Adultes*, augmenter progressivement de 1 à 6 comprimés par jour. Par voie intramusculaire : *Adultes*, augmenter progressivement de 1/2 à 2 cc. tous les jours ou tous les 2 jours.

**Présentation.** — Tube de 30 comprimés à 0 gr. 025. Boîte de 10 ampoules de 2 cc. (1 cc. correspond à un équivalent de 140 mgr. de glande fraîche).

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques.**

### THERAPLIX

98, r. de Sèvres — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## ÉLIXIR BONJEAN

**Mode d'action.** — Tonique puissant des voies digestives. Excellent stimulant diffusible.

**Indications.** — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale. Vomissements de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

*Enfants* : Demi-dose.

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe  
AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

## ÉLIXIR DÉRET

**Composition.** — Solution vineuse d'iode double de tanin et de mercure (0 gr. 0275 d'iode et 0 gr. 005 de Hg par cuillerée à soupe).

**Propriétés.** — Absence d'accidents d'hydrargyrisme grâce à la présence du tanin : innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhées).

**Indications.** — Antisypilitique doux, convenant aux personnes qui ne peuvent supporter un traitement mercuriel ou arsenical interne. Particulièrement recommandé chez les enfants.

Traitement d'entretien de la syphilis et de l'hérodosyphilis par voie buccale chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes.

A ses propriétés d'agent thérapeutique mercuriel, l'Elixir Déret ajoute celle d'être un tonique actif.

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge. A prendre en deux fois, dans un verre à liqueur gradué, pour éviter la réaction qui se produirait sur le métal de la cuiller, doses pouvant être doublées en cas de besoin.

**Forme.** — Flacons de 300 cc.

Permet le traitement d'entretien dissimulé.

## GOUTTES DÉRET

Forme concentrée de l'Elixir Déret.

Iodogallate de mercure en solution hydroglycérinée.  
45 gouttes = 1 cuillerée à soupe d'Elixir.

### Posologie :

*Adultes* : 90 à 135 gouttes par jour.

*Enfants* : 30 à 60 gouttes par jour, selon l'âge.

A prendre dans un peu d'eau sucrée, de vin ou de lait, en deux ou trois fois, pendant les repas.

Traitement mercuriel dissimulé.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>).

## ÉLIXIR DUCHAMP

**Composition.** — Extrait d'eaux-mères de Foie de Morue, Quinquina, Arrhénal et Phosphates, Cacao vanillé.

**Propriétés thérapeutiques.** — D'un goût exquis, apéritif puissant, reconstituant énergique, tonique et hématopoïétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

**Indications.** — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle, Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence, Lymphatisme, Scrofule, etc.

**Dose.** — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 29 francs le flacon de 310 cc.

Laboratoires RENÉ de GRAUWE,



Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

## ÉLIXIR DUCRO

Agent dynamique aux oranges amères et phosphore assimilable, légèrement alcoolisé et saccharosé.

**Tonique antianorexique :** asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuillerée à soupe ou 1 verre à liqueur, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

**Eupéptique,** euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

**Action d'épargne :** pneumonie, grippe, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuillerée à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les 2 heures.

Prix : le flacon, 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-2.

**DURIEZ**

20, place des Vosges. — PARIS.

## ÉLIXIR EUPEPTIQUE TISY

**Composition.** — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

**Avantages.** — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

**Indications thérapeutiques.** — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur au début ou à la fin de chaque repas.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le N° 544-1.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

## ÉLIXIR eupnéique MARTIN MAZADE

**Composition.** — Iodure de Caféine stable, 0 gr. 25 par cuillerée à café.

**Posologie.** — *Etats aigus :* 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée, de café, de lait.

*Etats chroniques :* 1 cuillerée à café le matin avant le petit déjeuner.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiasthmatique, Diurétique, Toni-Cardiaque, Respiratoire.

**Indications.** — Emphysème, Asthme, Artériosclérose, Dyspnées, Néphrites, Angine de poitrine, Affections cardio-rénales, Maladies infectieuses, Obésité, Bronchites chroniques.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 643-1.

Prix : 22 francs le flacon de 185 cc. environ.

Laboratoire MARTIN MAZADE

Pierre SUIFFET, Docteur en Pharmacie.

SAINT-RAPHAEL (Var). (Tél. : 0-40.)

## ÉLIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gastrique* dans toutes les formes de l'*Hypochlorhydrie*.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

**Indications.** — Insuffisances gastriques, Hypochlorhydrie, *Aérophagie*, Régime déchloruré, Vomissements de la grossesse et de la tuberculose, Gastro-entérites, Ptoses gastriques, Inappétence, etc...

**Posologie.** — Un verre à liqueur pur ou coupé d'eau, après chaque repas.

Prix : 27 francs. Enregistré au L. N. C. M., n° 696.

Laboratoire **MONIN**

Bureaux et correspondance.

49, rue de Maubeuge - PARIS (IX<sup>e</sup>). (Trad. : 37-45.)

## ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

**Titrage.** — Par cuillerée à soupe : 0,01 Bi-iodure de mercure. — 0,05 iodure de potassium.

**Originalité.** — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un goût très agréable, et une parfaite tolérance pour l'estomac.

**Présentation dissimulée.** — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour au début ou au milieu des repas.

*Enfants* de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 —

**A prescrire.** — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

**Indications.** — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Laboratoires **A. DUTEIL**

90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

## ÉLIXIR MANNET FERRO-ERGOTÉ

### Composition :

Ergot de Seigle ..... 5 cgr.

Fer..... 10 —

Par cuillerée à café.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 22 francs.

Laboratoires **MANNET**

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

## ÉLIXIR RODI

Traitement arsenico-mercuriel dissimulé.

### Formule :

Iodure d'arsenic, Iodure d'Hg, Iodure de K.

Dans un véhicule de goût agréable.

### Posologie :

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe au milieu des 2 principaux repas dans un peu d'eau.

*Enfants* (très bonne tolérance) : 1 cuillerée à café par jour en 2 fois pour les nourrissons.

Ensuite, 1 cuillerée à café par 3 ans d'âge.

### Indications :

Traitement complémentaire et d'entretien de la S. acquise ; traitement facile de la S. héréditaire des enfants ; traitement efficace des S. tertiaires grâce à la présence d'iodures ; traitement dissimulé (Dépuratif tri-iodé) de toutes les formes : S. conjugale, cas douteux, traitement discret dans les affections évoluant sur terrain syphilitique ou hérédo-syphilitique (dermatoses, eczéma, ulcères variqueux, incontinence d'urine, migraines, épilepsie, rhumatismes, etc.).

Se prescrit généralement par cure de 20 jours (2 flacons) tous les 3 mois.

Laboratoire de l'Angiolympe du Dr Rous

D. SEVENS, Pharmacien

9, rue Soyot — NEUILLY (Paris)

## ÉLIXIR SPES DU D<sup>r</sup> GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

**Composition de l'Élixir.** — Iodure double d'arsénite et de Mercure. Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au Sirop de Gibert.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

I.....	0,008	} correspondant à	0,01 Bifludure Hg.
Hg.....	0,006		0,005 Iodure As.
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

**Indications.** — *Syphilis et Ictéro-syphilis.* Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

**Doses :** { *Nourrissons :* 1 demi-cuillerée à café par jour.  
De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.  
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.  
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.  
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.  
*Adultes :* 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du verre gradué qui accompagne chaque flacon.

**Observation importante.** — Présenté comme tonique et modificateur, l'Élixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 25 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-6.

Laboratoire SPES GUIRAUD

20, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Carnot 94-28.)

## ELKIN (Dragées).

Bile, Soufre, Pancréatine.

Sans aucun drastique.

**Indications thérapeutiques.** — Digestions incomplètes; Somnolence, Ballonnement, Douleurs Post-Prandiales, Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire, Insuffisance pancréatique, Dermatoses hémoclasiques, Rougeurs de la face, Urticaire, Eczéma, Acné juvénile.

**Présentation et Posologie.** — Forme dragées (aa 0,05 par pilule dragéifiée), une ou deux pendant ou après les deux principaux repas. (Avaler sans croquer.)

La boîte de 40 dragées : 19 fr. 40.

Laboratoires DEPRUNEAUX

23, rue du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

(Tél. : Tremblay 12-04.)

## EMBROSTASE

Résolutive.

Liniment onctueux, homogène, à pénétration rapide.

**Composition.** — Hamamelis, arnica, térébenthine, piment, huiles essentielles aromatiques, jaune de l'œuf.

**Indications.** — Assouplissement et nutrition des tissus sains ou cicatriciels.

Vergetures de la grossesse.

Massothérapie des ankyloses (suites des blessures et fractures).

Traitement local, sous contrôle médical strict, de certaines stases.

**Emploi.** — Massages selon l'art.

**Autres indications :** faire pénétrer dans les tissus par onction douce, jusqu'à ce que la main ne glisse plus sur la peau. Répéter si besoin.

Laboratoire AGÉNIE

CLOYES (Eure-et-Loir).

## EMBRYEX

**Composition.** — Suc embryonnaire de Poulet prélevé au premier tiers de l'incubation, renfermant la totalité des éléments de l'animal, dont plus particulièrement les Hormones de la croissance décrites par A. Carrel sous le nom de Tréphones. Associé à la pulpe de rate fraîche et présenté sous forme de Comprimés légèrement sucrés.

**Indications.** — Toute embryothérapie, tout ralentissement des phénomènes vitaux se traduisant par :

Fatigue, surmenage, dépression, asthénie, inappétence, troubles endocriniens, sénilité précoce. Convient aussi dans les convalescences, les états post-opératoires et les états pré-tuberculeux.

**N. B.** — Ne contient ni albumine ni lécitine de l'œuf. Donc, aucune contre-indication chez les albuminuriques, les hépatiques, les entériques, etc...

**Posologie.** — Croquer huit à dix comprimés en une fois, le matin à jeun, de préférence dans un peu d'eau sucrée ou un jus de fruit frais. Cure complète : 4 boîtes de 5 tubes de 10 comprimés.

Cure d'entretien et enfants au dessous de huit ans : demi-dose.

Prix de la boîte : 39 francs.

**En ampoules** (chaque ampoule correspond à 10 comprimés). A prendre par la bouche :

Boîte de 5 ampoules : 53 francs ; 10 ampoules : 106 francs ;  
20 ampoules : 212 francs.

Laboratoire EMBRYEX

G. LECLERC, Pharmacien, Licencié ès-Sciences,  
Ancien Elève de l'Institut Pasteur  
162, boulevard du Montparnasse — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Danton 86-15).

## EMBRYHORMONE

**Cure de revitalisation et de rajeunissement.**

**Forme.** — Ampoules buvables.

**Composition.** — Association d'hormones embryonnaires et d'hormones désalbuminées de glande interstitielle, glandes surrénales, glande thyroïde, extrait hépatique en solution phosphorique catalysée par le chlorure de zinc et de manganèse.

**Propriétés.** — Tonique très puissant qui assure un relèvement rapide des forces physiques et intellectuelles, produit un état d'euphorie et entraîne un véritable rajeunissement de l'organisme.

Recommandé dans tous les cas de *déficience organique, d'asthénie, de déséquilibre nerveux, d'impuissance, de fatigue cérébrale, d'anémie et de surmenage.*

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule par jour pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 403-49.

**Laboratoire HOCQUETTE**

12, r. N.-D.-de-Nazareth, PARIS (III<sup>e</sup>). (Arc. 47-13.)

## EMBRYOCYTOL

**Synergie Embryocalcique**

**Composition.** — Pulpe embryonnaire desséchée à froid et Gluconate de chaux.

**Indications.** — Troubles de la croissance, Troubles endocriniens, Rachitisme, Décalfications, Terrain tuberculeux, Pleurésies, Consolidations de fractures, Troubles de la gestation, Insuffisance du myocarde, Caries dentaires, Convalescences.

**Forme.** — Granulé fondant à croquer. Goût agréable.

**Posologie :**

*Adultes :* 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

*Enfants :* 2 cuillerées à café par jour avant les repas.

**Prix de la boîte : 23 fr. 50.**

**Laboratoires " LA BIOMARINE "**

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. : 14-54.)

## EMBRYOL

**Suc embryonnaire total.**

**Propriétés et indications :** Catalyseur biologique de toute récupération tissulaire et fonctionnelle. — Troubles de la croissance. Troubles endocriniens, Troubles de l'hématopoïèse (anémies, leucémies), Ulcères gastriques, Cicatrisations cutanées et muqueuses, Suppurations, Maladies infectieuses, Choc opératoire, Surmenage, Sénilité, Psychasthénies.

**Formes et posologie :**

*EMBRYOL buvable*

Boîte de 10 amp. de 5 cc. Prix : 56 fr. 30.

*Adultes :* 2 ampoules par jour dans de l'eau froide sucrée, un quart d'heure avant les repas.

*Enfants jusqu'à 10 ans :* demi-dose.

*Opérés :* voie rectale : 3 doses de 5 amp. dans 30 cc. sérum physiologique (matin de l'opération, 1 heure et 4 heures après).

*EMBRYOL injectable*

Boîtes de 5 amp. de 5 cc. EMBRYOL et de 5 amp. de 5 cc. sérum physiologique glucosé. Prix : 41 fr. 10.

*Adultes et enfants :* série de 10 injections (1 injection par jour).

*Nourrissons :* demi-dose.

*EMBRYOL pansements*

Boîte de 3 amp. de 10 cc. Prix : 35 fr. 20.

Plaies atones — Cicatrisations difficiles.

**Laboratoires " LA BIOMARINE "**

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. : 14-54.)



## EMBRYONA PROBIOS

**Présentation.** — En boîtes de 8 flacons-ampoules : 55 fr. 65, et 4 flacons ampoules : 27 fr. 85.

**Principes actifs.** — Extraits secs d'embryons de poulets. Application thérapeutique des propriétés vivifiantes des tréphones embryonnaires de gallinacées.

**Indications.** — Chez le nourrisson et l'enfant : Tous les troubles de développement musculaire, squelettique ou intellectuel, Amyotrophies, Paralyse, Rachitisme, Retard de la marche ou de la parole, Athrepsies, Cachexies, Anémies et états pré tuberculeux.

**Chez l'adulte des deux sexes :** Toutes les déviations des fonctions physiologiques, Insuffisances digestives, Instabilité mentale, Sénilité précoce (vieillesse prématurée), Atrophie, Rides précoces et taches cutanées, Fatigabilité anormale.

**Chez les femmes :** Acné de la puberté, Dysménorrhées, Incommodités de la ménopause normale ou provoquée chirurgicalement.

*En chirurgie, traitement préventif et curatif du choc opératoire.*

**Mode d'emploi.** — A prendre en poudre ou délayée dans un peu d'eau ou de bouillon avant les repas.

**Adultes :** 2 à 4 flacons-ampoules par jour.

**Enfants :** 1 à 2 — —

**Nourrissons :** 1 — —

Pour le traitement préventif du choc chirurgical, 3 flacons-ampoules dissous dans 200 cc. de sérum artificiel en lavement à garder. Renouveler 5 heures après l'opération la dose précédente en lavement et de même 24 et 36 heures après l'opération.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-55.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

((tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## EMGÉ LUMIÈRE

**Prophylaxie et traitement de tous Troubles liée à un état d'instabilité humorale.**

L'Emgé Lumière correspond à la formule  $S^3 O^3 Mg$ . Son action est complexe, nous vous l'exposons ci-dessous :

Sous la forme de Comprimés :

Il est le médicament des maintes Constipations.  
Il est indiqué dans les Diarrhées post-prandiales ;  
Il est particulièrement efficace dans les insuffisances hépatiques ;

Il réalise une médication des manifestations anaphylactiques, luttant contre l'instabilité humorale ;

Il est un antiseptique bronchique pulmonaire ;

Il est le médicament type des Toxémies d'origine intestinale ;

Il permet de réaliser la reminéralisation magnésienne, et maintient ou rectifie l'équilibre neuro-végétatif.

En résumé, les comprimés d'Emgé Lumière sont essentiellement régulateurs des fonctions digestives.

**Ampoules d'Emgé Lumière**, pour injections intramusculaires, est un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie, mais il est surtout un médicament anti-choc omnivalent.

C'est la médication type de toutes les manifestations dites arthritiques. — Elles exercent une action directe sur l'équilibre humoral. — En injections intraveineuses, c'est une médication héroïque des états dépressifs de la cyclothymie. — Indications particulières en psychiatrie (Épilepsie, Manie, Accès anxieux).

**Indications.** — Tous états d'instabilité humorale (anaphylaxie), Insuffisance hépatique et pancréatique, Désintoxication par formation de sulfoconjugués atoxiques.

**Formuler.** — Une boîte de comprimés d'Emgé Lumière, dosés à 0 gr. 60.

Une boîte de 3 ampoules de 10 cc. d'Emgé Lumière, à 10 p. 100.

**Doses.** — 1 à 4 comprimés par jour (avalés tels quels avec un peu d'eau) au milieu des repas.

De l'injection intra musculaire quotidienne à 3 ou 4 par semaine. Aucune réaction locale ni générale.

Injection intra veineuse, 1 tous les deux jours (administrer lentement).

**Laboratoires LUMIÈRE** — 45, rue Villon — LYON.

## EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

**Caoutchoutés, Adhésifs** (formule de l'hôpital Saint-Louis).

**Huile de cade** : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

**Oxyde de zinc** : Eczémas torpides, Lichénisation.

**De Vidal** : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

**Prix** : 14 fr. 10. L. N. C. M. n° 20-15.

**Colopastre**. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

**Gaze anadhère**. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

**Prix** : 26 fr. 30.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> R. CAVAILLÈS**

29, r. Singer. — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Auteuil 65-97.)

## ENDOCRISINES

(Voir *Opothérapie Fournier*.)

**Extraits totaux d'organes frais. Hormones.**

**TOUTES LES GLANDES**

(Voir le détail à *Opothérapie Fournier*.)

**Prescrire** : ORCHITINE FOURNIER, etc.

**Cachets et comprimés dosés en extrait sec** (l'extrait sec représentant 5 fois le poids de la glande fraîche).

**Ampoules dosées en glande fraîche.**

**Posologie générale**. — 2 à 4 cachets, 3 à 6 comprimés ou 1 ampoule par jour.

**Exécution rapide de toutes les prescriptions magistrales opothérapiques.**

Échantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

## ENDOPANCRIINE

Insuline Française présentée sous forme liquide pour injections hypodermiques.

**Endopancrine tube de Soc.** Chaque cc. titré à 20 unités cliniques.

**Endopancrine 40** : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

**Endopancrine 5** : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.

**Endopancrine 10** : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.

**Endopancrine 20** : boîte de 10 ampoules de 1 cc. titré à 20 unités cliniques.

**Endopancrine-Protamine-Zinc** : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

**Indications** : Diabète et ses complications — Acidoses — Vomissements incoercibles de la grossesse — Dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant — Troubles trophiques des nourrissons — Insuffisances hépatiques — Artérites oblitérantes — Troubles Parkinsoniens — Ménorrhagies d'origine ovarienne — Ulcérations chroniques — Furonculose chronique.

**Dose du début dans le diabète** : 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

**Endopancrine** : 21 francs. — **Endopancrine 40** : 38 fr. 30.

**Endopancrine 5** : 17 fr. 20. — **Endopancrine 10** : 29 francs.

**Endopancrine 20** : 39 fr. 40. — **Endopancrine-Protamine-Zinc** : 46 fr. 90.

Demandez nos notices :

« La thérapeutique du diabète par l'insuline. »

« Les applications de l'insuline en dehors du diabète. »

L. N. C. n°s 234-1-1, 234-16, 234-1-3, 234-1-2, 234-36.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRIINE**

18, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Suffren 07-70.)

## ENDOTHYMUSINE

**Extrait de thymus injectable délipodé et désalbuminé.**

**Indications**. — Retard de croissance de l'enfant, arrêt de croissance du nourrisson, achondroplasie, ectopies testiculaires, troubles des règles chez la jeune fille, syndromes d'obésité dystrophiques de la période prépubère.

**Forme et composition**. — Boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube.

Chaque centimètre cube = 1 gr. de thymus frais. Prix : 22 fr. 90.

— — — = 3 gr. de thymus frais. — : 29 fr. 90.

— — — = 5 gr. de thymus frais. — : 37 fr. 50.

— — — = 10 gr. de thymus frais. — : 56 fr. 30.

— — — = 20 gr. de thymus frais. — : 81 francs.

**Conduite du traitement**. — Série de 12 injections à raison de 3 par semaine. **Adultes** : commencer par 5 gr., faire 10 gr. si nécessaire. **Enfants** : commencer par 1 gr., faire 3 gr. si nécessaire. Intervalle d'un mois entre les deux séries pendant lequel il est bon de donner 2 cachets par jour de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50. Pour les enfants indociles qui ne supportent pas les piqûres, remplacer celles-ci par 2 cachets de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50 de poudre de thymus avant les principaux repas.

L. N. C. n°s 234-2-1, 234-2-3, 234-2-4, 234-18, 234-35.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRIINE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Suffren : 07-70.)

## ÉNÉSOL

Sel arsenico-mercuriel.

**Propriétés.** — 70 fois moins toxique que le biiodure. Ne donne pas de phénomènes de stomatite. Indolence de l'injection. Activité spéciale accrue du fait de l'arsenic. L'élément arsenical, d'autre part, agit comme antitoxique à l'égard du mercure que l'on peut administrer à doses plus fortes sans accidents.

**Indications.** — Syphilis dans toutes ses manifestations, surtout cures d'entretien. Syphilis tertiaires et Syphilis anciennes. Psoriasis.

**Posologie.** — Doses moyennes : 2 cc. correspondant à 0 gr. 06 d'Énésol par jour.

Doses massives ou de saturation : Injections intramusculaires de 5 cc. tous les 2 ou 3 jours. Injections intraveineuses de 2 à 10 cc. (soit 6 à 30 centigr. d'Énésol), selon le sujet, l'urgence et la gravité, tous les 2 ou 3 jours. Séries de 12 à 15 injections.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. d'une solution dosée à 0 gr. 03 par cc.

Collyres d'Énésol à 0 gr. 03 d'Énésol par 10 cc. : Affusions ou instillations oculaires de quelques gouttes d'Énésol plusieurs fois par jour (Complications oculaires de la syphilis).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## ÉNIODE LEFEBVRE

**Composition.** — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

**Forme.** — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Éniode possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

**Doses et mode d'emploi.** — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

*Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Prix : 17 fr. 60.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Opéra 30-50.)

## « Sel de fruit » ENO « Fruit Salt »

Poudre fine, entièrement soluble dans l'eau avec effervescence. Ne contient ni sucre, ni édulcorant, ni sulfates alcalins. Très agréable à prendre.

### Indications :

**Troubles de l'appareil digestif.** Régularise le fonctionnement de l'estomac. Active les digestions paresseuses (ballonnements, malaises après les repas). Modère l'hypersecretion pathologique (brûlures, renvois acides). Particulièrement efficace dans les écarts et changements de régime, dans les vomissements simples ou gravidiques.

Sur l'intestin, action laxative, douce et régulière, très indiquée chez les femmes enceintes et les enfants.

**Affections du foie.** Soulage cet organe en favorisant ses sécrétions, Arthritisme, goutte, obésité, éruptions cutanées, migraines. Contribue à l'élimination des déchets toxiques qui, dans ces affections, encombrant l'organisme.

### Doses :

*Adultes* : 1 cuiller à café dans un verre d'eau, le soir au coucher ou le matin au réveil.

*Enfants* (à partir de 6 ans) : 1/3 et 1/2 cuiller.

Prix : 16 fr. 70 et 29 fr. 30. Durée : 3 et 6 semaines.

Laboratoire CANAT

4 ter, rue Barbès — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-35.)

## ENTÉRARGOL

Spécifique puissant de toutes les affections intestinales. Composition. — Association d'Argent Colloïdal, Sulfate Neutre d'Oxyquinoléine et Magnésie légère.

**Propriétés.** — Bactéricide et Antiseptique Intestinal, Stable, Atoxique, ne constipe pas, n'irrite pas.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite, Diarrhées, Dysenterie Affections à colibacilles, Typhoïde, Grippe intestinale. Diarrhées des nourrissons et des enfants, Maladies infect. des voies urinales.

### Présentation.

Granulé : *Nourrissons* dès le premier âge et *Enfants* jusqu'à huit ans, *Pilules* : *Enfants* à partir de huit ans et *Adultes*.

De 10 à 15 jours de traitement, 18 francs.

**Posologie.** — *Nourrissons* : Dès le premier âge et jusqu'à 6 mois : 1 cuillerée à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

De 6 à 18 mois : 1 cuill. et demie à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

*Enfants* : De 18 mois à 4 ans : 1 à 2 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour.

De 4 ans à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour. A faire prendre avant les tétées ou repas.

*Enfants* à partir de 8 ans : 1 à 2 pilules avant chacun des principaux repas.

*Adultes* : 2 à 3 pilules avant chacun des principaux repas.

Dépôt général :

Laboratoires PHOSMA, M<sup>r</sup> LABROUSSE, Pharmacien  
47, rue Maleret — BORDEAUX

## ENTÉRASPIRINE SANOVA

Synergie médicamenteuse plus active que l'aspirine seule et sans dommage pour l'estomac et le cœur.

Formule pour une dragée :

Bromhydrate de quinine .....	0,03
Pyramidon .....	0,02
Aspirine .....	0,35
Caféine .....	0,02

En deux noyaux solubles l'un dans l'estomac et l'autre dans le duodénum.

Le Bromhydrate de quinine tonifie l'estomac, — la caféine, le cœur, — l'aspirine n'est mise en liberté que dans l'intestin.

**Indications.** — Antithermique, antirhumatisme, algalgique, anti-infectieuse et tonocardiaque.

**Doses.** — 1 ou 2 comprimés, jusqu'à 6 ou 8 par jour, de préférence aux repas.

Pourquoi prendre 0,50 d'aspirine si 0,35 suffisent.

Pourquoi prendre 1 gr. d'aspirine si 0,70 font mieux.

Prix : 9 fr. 30.

**Laboratoires TACHOT et VIGAN**  
103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trinité 04-49.)

## ENTÉRIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme. Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

**Posologie.**

**Nourrissons :** 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

**Enfants :** 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

**Adultes :** 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Prix : 22 francs.

**Laboratoires Jean HUMBERT**  
1 bis, rue Carcel — PARIS (XV°)

## ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

**Indications.** — *Maladies des voies digestives :* Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilité, constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, coliques, entérocolites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleisner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

*Asthme, Rhume des foies, Emphyseme, Dyspnée* provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

*Maladies de la peau :* Eczémas, Eczéma variqueux, Urticales, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furonculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodémie, etc.

*Affections du foye :* Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

*Colibacillose, Cystites à colibacille.*

*Certaines formes de rhumatismes aigus ou chroniques, troubles de la ménopause.*

*Certaines migraines, neurasthénies,*

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

**Deux formes.** — 1° Ampoules à injecter ; 2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules de 1cc. — Littérature et échantillons sur demande. Prix : 34 fr. 80.

Durée moyenne du traitement des unités de vente :

Au début du traitement 10 à 20 jours ; ensuite 15 à 30 jours et plus, suivant indications du médecin traitant.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-1.

**Lab. DUCATTE**, 191, rue Saint-Honoré — PARIS.  
(Tél. : Opéra 68-80.)

## ENTÉROBYL DEHAUSSY

En une seule prescription réalise effectivement :

Le drainage médical des voies biliaires ;  
La désinfection atoxique de l'intestin et de la bile évacuée.

La désensibilisation de l'organisme.

### Composition :

**Cholérétiques et cholagogues :** Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptones.

**Antiseptiques :** Hexaméthylènetétramine, Charbon animal pur.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

**Posologie et Formes.** — Granulé. Cachets.

**Drainage biliaire :** 1 à 4 cuillerées à café ou 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

**Cure d'entretien :** 1 à 2 cuillerées à café, ou 1 à 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE

## ENTÉROCOCÈNE CARRION

Vaccin entérococcique buvable.

**Composition.** — Émulsion d'entérocoques de Thiercelin, 2 000 millions de corps microbiens pour 1 cc. d'eau physiologique (soit dix milliards par tube scellé).

**Forme.** — Tubes scellés de 5 cc.

**Indications.** — Grippe, infections gastro-intestinales et généralisées (Entérites coloniales).

**Posologie et mode d'emploi.** — *Adultes :* 2 à 3 tubes scellés 2 fois par jour, avec un peu d'eau ; le matin à jeun et 2 heures avant le repas du soir.

*Enfants :* Demi-dose.

**Nourrissons :** Pour traiter l'érythème fessier par la méthode Blechmann, prescrire : Vaccin Entérococcique buvable Carrion, en tubes scellés de 1 cc.

(Prix : voir Vaccins Carrion).

### Présentation et prix :

La boîte de 12 tubes scellés : 26 fr. 90.

La boîte de 6 tubes scellés : 16 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. n° 514-9.

### Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## ENTÉROCUPROL

### CACHETS

#### Composition :

Sulfate de cuivre.....	0,0025	Sulfate de magnésie anhyd.....	0,15
Poudre de Dower.....	0,05	Benzoate de naphтол.....	0,15
Badiane.....	0,05	Urotropine.....	0,03
Dermatol.....	0,10	Acide acétyl-salicylique.....	0,05
Salicylate de bismuth.....	0,05	Thymol.....	0,02
Peroxyde de magnésium.....	0,05	Charbon animal.....	0,10
Carbonate de chaux.....	0,05	Charbon végétal.....	0,20

Pour un cachet.

**Posologie.** — 1 cachet une demi-heure avant les repas.

### GRANULÉ

#### Composition :

Sulfate de cuivre.....	0,0005	Dermatol.....	3
Urotropine.....	2	Carbonate de chaux.....	3
Benzo-naphтол.....	3	Charbon animal.....	10
Bétol.....	2	Charbon végétal.....	15
Peroxyde de magnésium.....	2	Excipient aromatique.....	

Q. S. p. 100 gr. de granulé

**Posologie.** — De 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Arthritisme.

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## ENTÉRODAUSSE

### et

## ENTÉRODAUSSE CALCIQUE

(Antiseptique du tube digestif.)

Granulé se présentant sous deux formes :

1° **Entérodausse magnésien** (à base de Phosphate de soude et Hydrate de Magnésie) pour les constipés, applicable aux troubles suivants  
a. Affections gastriques : Gonflements, Flatulences, Aérophagie, Digestions difficiles. Haleine fétide, langue saburrale.

b. Affections intestinales — Putréfaction et fermentation intestinales : selles fétides, Entérites sèches, Aérocolie, Rectocolites graves, Sigmoïdites avec fausse diarrhée, Syndromes entérocolaux (infection rénale et vésicale d'origine intestinale, colibacillose), Appendicite chronique).

2° **Entérodausse calcique** (à base de sous-gallate de Bismuth et Carbonate de chaux) pour les diarrhéiques :

Mêmes indications que précédemment, bien que plus spécialement applicable aux entérites et colites diverses.

**Dose et mode d'emploi.** — Ce sont les mêmes pour les deux produits : Entérodausse simple et calcique.

Chez les adultes : 1 à 2 cuillerées à café au début de chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Chez les enfants : demi-dose.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

## ENTÉROFAGOS

**Bactériophages Intestinaux polyvalents.**

**Composition.** — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

**Dose.** — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les enfants.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue. Pas de réaction thermique, pas de choc.

**Indications.** — Entérites, colites, dysentéries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entérocolal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 25 fr. 80

la boîte de 5 ampoules : 14 fr. 35

**Laboratoire de Biologie médicale  
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

## ENTÉRO-GRANULÉ DELALANDE

Pansement intestinal carbobismuthé.

Antidysentérique et antiseptique.

**Composition.** — Rhexiade, Ipéca, Sous-Nitrate de bismuth, Charbon activé.

**Indications.** — Toutes les formes aiguës ou chroniques de dysenterie, spécialement de dysenterie amibienne, Entérocolites. Fermentations intestinales accidentelles.

**Posologie.** — Dysenteries : 3 cuillerées à café trois fois par jour, pur ou dans un peu d'eau, à la fin des repas.

Dans les cas accidentels ou chroniques, 1 à 2 cuillerées à café, à la fin des deux principaux repas, pur ou dans un peu d'eau.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Régnauld — COURBEVOIE

## ENTÉROMUCINE

**Composition.** — Mucine pure, neutre et stérile obtenue à partir des muqueuses intestinales et adaptée à la thérapeutique de la constipation et des entéro-colites.

**Propriétés.** — Régulateur naturel : laxatif idéal qui permet l'hydratation rapide et le cheminement normal des fèces.

Protecteur mécanique et protecteur chimique fixant les ions acides ou alcalins nuisibles au bon fonctionnement de l'intestin ou irritants pour la muqueuse.

**Avantages.** — L'Entéromucine est supérieure : a. aux laxatifs drastiques ou salins très irritants ; b. aux mucilages végétaux qui se digèrent et augmentent les fermentations ; c. aux poudres inertes et à l'huile de paraffine qui gênent l'assimilation et provoquent souvent des irritations graves ; d. aux celluloses indigestibles (son) qui raclent l'intestin, d'où des désastres chez les colitiques.

L'Entéromucine est particulièrement remarquable par la douceur de son action.

**Indications.** — Constipation simple et des colitiques, Colites, Entérites, Entérocolites.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café de granulé à chacun des 2 principaux repas.

Prix. — Modèle normal, granulé adultes..... 26 fr. 90  
Quadruple modèle..... 90 fr. 20

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. Inv. 20-60.)

## ENTÉRO-PANSEMENT

du Docteur ZIZINE

Protection, désinfection de la muqueuse intestinale.

**Composition.** — Deux formules :

**Simple.** — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Lactose.

**A l'Ipéca.** — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Ipéca.

**Forme.** — Granulé fondant aromatisé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant. Infections et intoxications intestinales ; leurs conséquences. Fermentations intestinales ; ballonnement abdominal. Dermatoses d'origine intestinale. Colites infectieuses et parasitaires. Entérite des pays chauds. Entérocrites. Colibacillose (localisations hepato-vésiculaires et rénales).

**Propriétés thérapeutiques spéciales à l'Ipéca.** — Amibiase, Dysenteries à Protozoaires.

**Posologie.** — *Adultes* : de 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, à jeun ou au repas (à croquer ou délayer dans un peu d'eau).

*Enfants* : de 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Prix de la boîte : 23 fr. 20.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et de Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 28-96.)

## ENTÉROPATHYL

**Bactéricide et Antiseptique puissant de toutes les infections intestinales, biliaires et urinaires.**

**Forme.** — Granulé fondant, aromatisé, agréable au goût.

### Composition :

Charbon végétal purifié .....	20 gr.
Charbon végétal suractivé .....	20 gr.
Charbon animal lavé.....	10 gr.
Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine..	1 gr. 50
Excipient, Q. S. pour .....	100 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Entéropathyl, dont l'association judicieuse des trois charbons employés en thérapeutique représente 50 p. 100 de produits actifs et sélectionnés, a son pouvoir antiseptique renforcé par l'action bactéricide du sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine, plus efficace et moins irritant que les adjuvants chimiques ordinairement employés. L'Entéropathyl ne constipe pas.

**Indications.** — Entérites aiguës et chroniques, Colites, Diarrhées diverses, Intoxications alimentaires, Fermentations intestinales, Aérophagie, Colibacillose, Oxyurose, et toutes infections intestinales et leurs conséquences.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café après les repas. A croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Prix : la boîte : 26 fr. 30. (Toutes pharmacies.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1907-3.

### Les Laboratoires « MÉDICIA »

L. NEUVILLE, Pharmacien

7, Impasse de la Sous-Préfecture — ROANNE

(Loire).

## ENTÉROPECTINE du Docteur A. FERR

**Thérapeutique des maladies gastro-intestinales :** toutes formes de diarrhées ou d'auto-intoxications du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.

**Composition.** — L'Entéropectine du Dr H. FERRÉ est obtenue par dessiccation à basse température de PECTINE DE POMMES ; par sa préparation, cette pectine possède un pouvoir absorbant et agglutinant très efficace ; sa présentation desséchée lui permet conservation sous tous climats.

**Présentation.** *Granulés :* pour nourrissons.  
*Dragées :* pour adultes.

**Posologie.** — *Nourrissons :* Dissoudre 1 cuillerée à café de granulés (dosé à 0,15 cgr. de pectine par cuillerée à café de granulé) dans 1 ou 2 cuillerées à soupe d'eau tiède bouillie ; 3 à 5 cuillerées à café par jour entre les tétées ou les repas, jusqu'à arrêt de la diarrhée.

*Adultes et enfants* à partir de 6 ans : prendre sans croquer 8 à 10 dragées par jour, entre les repas.

**Laboratoire Docteur H. FERRÉ**  
**M. AUZOUX, Pharmacien**  
15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ENTÉROSALICYL

(Admis par l'Assistance Publique  
et les Services de Santé de la Marine et des Colonies.)

Salicylate de Soude en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin. Suppression totale de toute irritation gastrique.

**Composition.** — 2 dosages : normal, 0 gr. 50 par capsule ; infantile, 0 gr. 25 par capsule.

**Indications.** — Rhumatisme Articulaire Aigu, Rhumatismes Chroniques, Goutte, Algies rhumatismales, Sciatique, Maladie de Basedow, Syndromes infectieux, Désensibilisant. Cholagogue.

(Dans les cas graves de Rhumatisme Articulaire Aigu, compléter par Glucosalyl, en injections intraveineuses. Dans les Rhumatismes Chroniques : Sulfide *per os* et Histalgine en piqûres intradermiques.)

**Posologie.** — Celle du Salicylate de Soude. Jusqu'à 10 gr. et plus par 24 heures. De préférence, pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

*Enfants :* 1/2 à 1 gramme par année d'âge.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-7 (1 et 2).

**Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN**  
14, avenue Perrichont — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Jasmin 00-37.)

## ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaptyle, 0 gr. 05 par comprimé ou par cuillerée à café de granulés.

**Indications.** — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticaire, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Féridité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

**Avantages.** — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépato-toxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants, de préférence sous la forme de « granulés ».

**Posologie et mode d'emploi :**

*Adultes :* 4 à 6 comprimés par jour en dehors des repas.

*Enfants :* 1 cuillerée à café de granulés par année d'âge et par jour.

**Prix :** le flacon de comprimés ou granulés : 15 fr. 80.

**Laboratoires SASSÉ**  
32, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 35-51.)



## ENTÉROSPASMYL LOGEAIS

### GRANULÉ VITAMINÉ

Médication totale des syndromes hépato-intestinaux.

Stimulant des fonctions hépatiques et biliaires. Régénérateur des cellules nobles du foie et de l'intestin. Stimulant physiologique des fonctions intestinales. Modificateur de la flore intestinale, antiseptique, adsorbant des toxines, antifermentescible. Antispasmodique.

### DEUX FORMULES:

**SIMPLE** à action générale hépato-intestinale.

A base de vitamines A-B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>, d'argent colloïdal adsorbé sur charbon activé, de peptones polyvalentes, d'hexaméthylène tétramine, de silice et de kaolin colloïdaux, de sulfate de soude anhydre, de carbonate de magnésie et de lactose.

**Propriétés.** — Régénérateur des cellules hépatiques et intestinales (vitamine A), antifermentescible (vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>), cholérétique et cholagogue doux (sulfate de soude et carbonate de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), antiseptique et adsorbant (argent colloïdal et hexaméthylène tétramine, kaolin et silice colloïdaux, dont le pouvoir adsorbant est bien plus considérable que celui des charbons).

**MUCILAGINEUX** à action physiologique intestinale.

A base de vitamines A-B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>, de mucilage végétal gommeux, d'extrait de *Rhamnus frangula* purifié, de poudre de belladone.

**Propriétés.** — Régénérateur des cellules intestinales (vitamine A). Antifermentescible (action des vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> sur les hydrates de carbone). Stimulant physiologique des fonctions du gros intestin par sa haute proportion, 75 p. 100, en mucilage végétal fermentescible et l'action doucement excitomotrice sur la musculature intestinale de l'extrait purifié de *Rhamnus frangula*. Antispasmodique (belladone pulvérisée).

Désintoxicant puissant et précieux adjuvant de tout traitement hépatique.

### Indications et Mode d'emploi :

**Entérospasmyl simple :** insuffisance hépatique et ses conséquences : migraine, urticaire, dermatoses, etc. ; stase biliaire : spasmes, atonie vésiculaire ou lithiase ; maladies inflammatoires intestinales : entérites, entéro-colites, colibacillose, etc.

2 à 5 cuillerées à café par jour, avec un peu d'eau.

**Entérospasmyl mucilagineux :** stases coliques ; constipations mécaniques intestinales (dolichocolon, mégacolon, atonie intestinale), colites, spasmes coliques, colibacillose.

1 à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires JACQUES LOGEAIS

ISSY-LES-MOULINEAUX - PARIS - Michelet 07-50.

## ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent

Immunisation antityphique par voie gastro-intestinale.

**Constitution.** — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-colibacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants. S'emploie à titre curatif et préventif.

### Propriétés :

Durée de l'immunité variable selon les individus : elle est en général de deux à trois ans. En période d'épidémie et en cas de séjour dans les régions contaminées, renouveler l'immunisation au bout d'un an. Efficacité de même ordre que celles des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée, mais aucune contre-indication, pas de réaction, rien à changer aux occupations habituelles ni au régime normal.

Le procédé le plus simple, le plus inoffensif d'immunisation et de traitement contre la Fièvre typhoïde, les Fièvres paratyphoïdes (A et B). Efficacité attestée par des rapports officiels et de nombreuses observations. Plus de 500.000 expériences sans un seul échec.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

**Doses.** — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.

Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

**Formuler :** Une boîte de 28 pilules d'Entérovacclin Lumière.

### VACCINOTHÉRAPIE CURATIVE

L'Entérovacclin Lumière est également utilisé avec succès à titre curatif, dans le traitement des états typiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution. L'employer à la même dose.

**LABORATOIRES LUMIÈRE** — 45, rue Villon — LYON.

## ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur DUCHON

**Composition.** — Entérocoques, Colibacilles, Stafylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie buccale.

**Indications.** — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome entéro-rénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

**Posologie.** — **Adultes :** 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

**Enfants :** 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

**Nourrissons :** 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 31 fr. 60.

Laboratoire **COBBIÈRE**

et Pansements brevetés **COBBIÈRE S. A.**

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

## ENTÉRO-VIOFORME

Iodochloroxyquinoléine.

CIBA

ANTISEPTIQUE INTESTINAL.

Agent chimiothérapique d'action hautement spécifique dans les dysenteries infectieuses ou parasitaires, aiguës ou chroniques. Non toxique et non irritant. Son usage peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire par périodes de traitement de 10 à 12 jours.

**Indications.** — *Dysenteries parasitaires et infectieuses* : dys. amibienne, dys. bacillaire, suites de dysenteries. *Infections* à balantidium et lamblia. *Dysenteries et diarrhées* d'origine non définie, Colibac. et helminthes.

**Doses.** — *Cas aigus* : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour, aux repas, pendant dix jours, puis suspension et reprise.

*Cas chroniques* : 1 ou 2 comprimés par jour, trois ou quatre jours par semaine.

*Prophylaxie* : 1 comprimé tous les deux jours.

**Formuler.** — Tube de 20 comprimés.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYER**  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Amylase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan, la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particulièrement pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique, que détruit par le suc intestinal dès leur arrivée dans le duodénum.

**Doses.** — 2 ou 3 dragées pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie certaine ou probable. Prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

Prix : Petit modèle 19 fr. 90.  
Grand — 43 fr. 40.

**Laboratoires NORGAN**  
Pierre ALEXANDRE, Pharmacien  
201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Invalides 64-36.)

## ÉPANAL

Régulateur du déséquilibre vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonylurée .....	0 gr. 02
Extrait hydroalcoolique de cratægus ...	0 gr. 03
— — — — — de valériane ....	0 gr. 03
— — — — — de passiflore ...	0 gr. 02
— — — — — de saule blanc..	0 gr. 02
— — — — — de ballote .....	0 gr. 02
Poudre de marjolaine.....	0 gr. 02
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 03

Par comprimé dragéifié et glutinisé.

**Principales Indications.** — Tics, Chorée, Epilepsie, Névrose, Mélancolie, Anxiété, Hyperémotivité, Vertige, Insomnie, Tachycardie.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour.

Prix : le tube de 40 comprimés : 19 fr. 55.

**Laboratoire CHARPENTIER-RODIET**  
Pharmacien,

Ancien interne des Hôpitaux de Paris  
47, rue de Bretagne, PARIS (III<sup>e</sup>). (Arch. : 94-65.)

## ÉPHASMA

Répousse la crise.

Médication pathogénique de l'asthme.

S'attaquant à tous les facteurs de la crise :

Sympathique par l'éphédrine,  
Parasympathique par la belladone,  
Bulbaire par la lobélie et l'euphorbe,  
Cardio-pulmonaire par l'iodure de caféine,  
Bronchique par le benzoate de soude.

**Traitement de la crise.** — Un à deux comprimés dès l'apparition des signes avant-coureurs. Trois comprimés dans les 24 h.

**Traitement de fond.** — Un comprimé par jour, 10 à 20 jours par mois.

Prendre le comprimé finement écrasé dans une tasse d'infusion ou dans un peu d'eau bien sucrée.

La forme sirop est provisoirement supprimée.

**Laboratoires DEHAUSSY**  
50, rue Nationale — LILLE.

## ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

Deux formes : comprimés et ampoules.

3 centigrammes d'Éphédrine et 5 centigrammes de Caféine par comprimé ou par centicube.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'Éphédrine et des Éphédroïdes, mais avec, en plus, l'action diurétique et toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations, de toute action déprimante sur le myocarde, et des troubles de la miction.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués chez les sujets hypocardioniques enclins aux palpitations, et chez les sensibilisés vésico-rénaux.

1 à 2 comprimés d'Éphédraféine dans les 2 heures précédant l'accès.

Les ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachianesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

1 à 2 cc. 10 minutes avant l'intervention ou au moment des chocs.

**Prescrire :**

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 19 fr. 40

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 25 fr. 80

Laboratoire BÉRAL

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRAMID

Pansement nasal gélatiné (instillations ou pulvérisations).

**Composition.** — Sulfamide (1162 F), argent colloïdal, éphédrine, essences végétales, excipient gélatiné (solution aqueuse formant émulsion).

**Caractères.** — Décongestif. Antiseptique polyvalent.

**Mode d'emplol.** — 4 à 8 gouttes dans chaque narine 2 ou 3 fois par jour ou 3 à 4 pulvérisations par jour.

**Indications.** — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Rhume des foins, Grippe, Rhino-pharyngites. Peut être prescrit aux nourrissons.

**Prix.** — Le flacon compte-gouttes : 20 fr. 50.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON

## ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

*Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine Béral par centicube.*

Pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses :

1 à 4 centicubes par jour.

S'emploient aussi en pulvérisations nasales, et pour autres applications externes de l'Éphédrine.

**Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL.**

Une boîte : 21 fr. 10

Laboratoire BÉRAL

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRASMINÉ

**Pulvérisations nasales.**

Solution physiologique.

Sulfate éphédrine naturelle ..... 2 p. 100

Adrénaline physiologique ..... 1 p. 10.000

**Action.** — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale. Inhibition des ramifications terminales du sympathique.

**Indications.** — Obstruction nasale, Asthme, Rhume des foins, Rhinites, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhino-pharynx, Migraines. Infections grippales.

**Mode d'emplol.** — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Garéphédrine, Diuréphédrine et Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 17 fr. 60 le flacon pour un mois environ.

Pulvérisateur spécial de poche 29 fr 30.

Laboratoires SAUGIER-THORAL  
DOLE (Jura).

## ÉPHÉDRICONES BÉRAL

**Suppositoires** contenant chacun :

Chl. sulf. d'éphédrine. .... 0 gr. 03  
Excipient correctif. .... 2 gr.

Un éphédricone produit les mêmes effets par voie rectale qu'un éphédroïde à 3 cgr. d'éphédrine *per os*.

**Toutes indications  
de l'éphédrinothérapie.**

**Formuler :** Éphédricones Béral, une boîte.

**Prix :** 18 fr. 70

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRINE BÉRAL

**Produit français intégral.**

*Formes pharmaceutiques spécialisées :*

**Grains d'Éphédrine Béral.** Dosés à 1 cgr. d'éphédrine par grain.  
**Éphédroïdes Béral.** Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine naturelle.  
**Éphédratéine Béral.** Gomprimés à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. de caféine.  
**Éphétropine Béral.** Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine-caféine et hyosclamine-barbiturique.  
**Éphédromel Béral.** Sirop mellité à 1/2 cgr. d'éphédrine par cuillerée à café.  
**Éphérodine Béral.** Élixir à 3 cgr. d'Iodéphédrine, par cuil. à café.  
**Éphédrampoules Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine par cc. Boîte de 10.  
**Éphédratéine Injectable Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine + 5 cgr. de caféine par cc.  
**Spartophédrine Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. de spartéine par cc.  
**Adrénéphédrine Béral.** Ampoule à 1/4 mgr. d'adrénaline et 3 cgr. d'éphédrine par cc.  
**Éphédrisol Béral.** Hydrolat d'éphédra à 1, 2, 3 et 5 p. 100 d'éphédrine.  
**Éphédropses Béral.** Poudre à priser à 3 cgr. d'éphédrine par prise.  
**Nasophédrine Béral.** Pommade nasale à 3 p. 100 d'éphédrine.  
**Oléophédrine Béral.** Huile d'éphédra à 1 p. 100 d'éphédrine.  
**Mydriédrine Béral.** Ampoule-colyre à 4 p. 100 d'éphédrine.  
**Oleazol.** Bain oculaire à l'hamamelis adrénéphédriné.  
**Rhinodrops Béral.** Capsules nasales à l'huile d'éphédra chlorétonée.  
**Éphédricones Béral.** Suppositoires à 3 cgr. d'éphédrine.  
**Grains de Spartophédrine,** à 1 cg. d'Éphédrine et 1 cg. sulf. de spartéine.  
(Voir annonces concernant chacun de ces produits.)

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRINE BÉRAL (Grains d') à 1 centigramme.

Les mieux appropriés à l'éphédrinothérapie fractionnée, notamment chez les intolérants et pour la prophylaxie des chocs thérapeutiques (injections arsenicales, sériques ou autres). Entièrement solubles.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 2 à 10 grains par jour : 1 grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection choquante. *Ne pas confondre les grains d'Éphédrine Béral à 1 centigr. avec les compr. à 3 cent. dénommés Éphédroides.*

**Prescrire :** GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL. Un flacon. Prix : 17 fr.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRINE HOUDÉ

(Chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.)

**Propriétés.** — Sympathicotrope. Excitant du centre respiratoire bulbaire. Relâche les muscles lisses de la paroi bronchique. Hypertenseur par vaso-constriction périphérique. À petites doses, ralentit et soutient le cœur. Tonique général. *Antianaphylactique.*

**Avantages.** — Non modifiée par les sucs gastro-intestinaux, comme l'adrénaline, ce qui permet de l'employer *per os*.

**Indications :**

- a. *Essentielles :* Asthme sous toutes ses formes. Dyspnée. Urticaires.
- b. *Secondaires :* Rhume des foins. Dysménorrhée. Réactions sériques. Hypotension permanente d'allure idiopathique. Myasthénies et myopathies. Syndromes vagotoniques. Enurésie.

**Présentation.** — Granules à 1 cgr. de chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Asthme.* 2 à 3 granules le plus près possible du début de la crise.

Répéter cette dose 25 minutes après, si pas d'amélioration nette.

Traitement de fond : même dose, le matin au réveil et le soir vers 4 heures.

*Hypotension permanente :* 4 granules par jour en 3 fois, par séries de 10 à 12 jours.

*Urticaire :* 3 à 6 granules par jour.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 40-58.)

## ÉPHÉDRINE MERCK

Chlorhydrate d'Éphédrine naturelle  
(extraite de l'Éphédra.)

**Propriétés.** — Augmente la pression sanguine, stimule l'activité cardiaque, contracte les vaisseaux, excite le centre respiratoire et dilate les bronches.

**Indications.** — Asthme bronchique, dyspnée, rhume des foins, urticaire, œdème de Quincke, faiblesse circulatoire, coryza, rhinite vasomotrice, etc.

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 05. Boîtes de 10 ampoules à 0 gr. 05 dans 1 cc.

**Posologie.** — 1/4 à 1/2 comprimé, 2 à 3 fois par jour, dans les cas urgents, par voie hypodermique.  
(Voir aussi *Ephétonine*.)

**Laboratoires SANOMÉDIA**

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## ÉPHÉDRISOL BÉRAL

*Hydrolat d'Éphédra à 1, 2, 3 et 5 p. 100 d'Éphédrine Béral, sans adjonction d'analgésiques.*

Pour **pulvérisations** nasales, préventives et curatives des crises d'asthme, du rhume des foins et contre les coryzas, rhinites, sinusites, céphalées et surdités catarrhales, etc...

Sans indication de dosage, c'est l'éphédrisol à 3 p. 100 qui est délivré.

**Prescrire :** Éphédrisol Béral, un flacon.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRIVAÏNE

Pommade nasale anesthésique éphédrinée.

### Formule :

Chlorhydrate d'éphédrine.....	1 gr.
Protéinate d'argent .....	0 gr. 20
Para-aminobenzoate de butyle normal .....	2 gr.
Baume du Pérou .....	0 gr. 25
Essences aromatisées de thym, de serpolet, de lavande, de bergamote .....	0 gr. 75
Essence d'orange douce.....	0 gr. 10
Excipient, Q. S. P.....	100 gr.

**Présentation.** — Tube avec embout spécial.  
Prix public : 9 francs.

**Affections des voies respiratoires.** Traitement du rhume de cerveau, rhume des foin, sinusites, grippe.  
*Enfants et adultes :* 3 à 5 fois par jour gros comme un pois dans chaque narine.

**Laboratoires M. DE RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

**Services commerciaux :**

11 bis et 13, rue Levert — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## ÉPHÉDROCAMPBRE

**Solution aqueuse d'éphédrine naturelle, chlorétone, camphre.**

**Action thérapeutique.** — Décongestionnant immédiat de la muqueuse nasale, rétablit la respiration nasale, désinfecte le rhino-pharynx.

**Indications.** — Coryza, catarrhe naso-pharyngien, rhume des foin, céphalées sinusiennes, sinusites.

**Posologie.** — Peut s'employer soit au compte-gouttes, soit sur un tampon de coton hydrophile. Pour obtenir le maximum d'effet, utiliser un pulvérisateur. Pulvérisations toutes les deux heures dans les cas aigus, moins fréquentes dans les cas chroniques.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Régnauld — COURBEVOIE

## ÉPHÉDROCURE

**Pommade nasale.**

**Formule.** — Chlorhydrate d'éphédrine : 1 gr. ; Chlorhydrate d'amylène : 0,20 ; Soufre précipité : 0,25 ; Métadixyphénol : 0,30 ; Camphre : 0,40 ; Sulfo-ichtyolate d'am., 0,25 ; Baume du Pérou : 1,50 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Excipient non mentholé, Q. S. pour 100 gr.

**Indications.** — Rhume de cerveau, rhume des foin, coryza, rhinite, ozène, sinusite, affections des voies respiratoires.

**Présentation.** — Tube avec embout spécial pour injection nasale.  
*Enfants et adultes :* Introduire 2 à 4 fois par jour gros comme un pois de la pommade dans chaque narine.

Prix au public : 14 fr. 10.

**Solution huileuse**

**Formule.** — Ephédrine base : 0,50 ; Paraforme : 0,40 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 2,60 ; Myrtil : 0,30 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0,55 ; Métadixyphénol : 0,12 ; Huile d'olive médicinale neutre et stérilisée, Q. S. pour 100 gr.

**Solution d'Ephédrine-Sulfamide**

Paraminophénylsulfamide : 0 gr. 40 ; Phénylpropionate d'éphédrine : 0 gr. 10 ; Chlorhydrate d'éphédrine : 0 gr. 90 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0 gr. 50 ; Huile essentielle melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Rhodinal : 0 gr. 10 ; Scurocaine : 0 gr. 50 ; Sérum isotonique P. H. 7. Pour 100 cc.

**Indications.** — Rhume de cerveau, rhume des foin, coryza, sinusite, céphalée, ozène, prophylaxie de l'asthme et de l'emphysème, traitement préventif de la grippe et toutes affections du rhino-pharynx, peut s'employer en pulvérisations ou en instillations.

**Présentations :**

Flacon (à compte-gouttes nasal intérieur) pour instillations. *Enfants et adultes :* III à VI gouttes dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.  
Prix : 21 fr. 60.

En Pulvérisations : 3 à 4 fois par jour dans chaque narine.

**Rhino-Capsules**

Même formule que la solution huileuse.

**Indications.** — Traitement préventif de la grippe et toutes affections du rhino-pharynx.

**Présentation.** — Boîte de 20 capsules nasales longues.

*Enfants :* 1/2 capsule dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

*Adultes :* 1 capsule dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Prix : 16 fr. 20.

**Comprimés d'éphédrine naturelle barbiturique :**

**Forme A.** — 0,015 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

**Forme B.** — 0,025 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

**Indications.** — Asthme. Rhume des foin, Rhinites, toux spasmodiques, Bronchites chroniques, Etat d'hypotension.

Prix : Forme A, 16 francs. Forme B, 18 fr. 50.

(Publicité exclusivement Médicale.)

**Laboratoires M. DE RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

**Services commerciaux :** 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

**Comprimés d'Éphédrine Béral à 3 cgr.**

**Posologie et mode d'emploi.** — Débuter par un Éphédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Éphédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Éphédroïde le matin.

**Prescrire :** Éphédroïdes Béral, un flacon : 17 francs.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDROLÉNOL

Huile balsamique campho-éphédrinée non irritante (sans menthol).

**Composition.** — Éphédrine base, camphre, huiles essentielles, véhicule huileux neutralisé et stabilisé par procédé original. Bien toléré, d'emploi agréable.

**Formes.** — Flacon d'huile à 1 % d'éphédrine. Flacon d'huile à 1/2 % d'éphédrine (dédoublé). Capsules nasales à 1 % et 1/2 %. Ampoules pour injections intratrachéales. Pommade.

Toutes les formes : 20 fr. 50 ; sauf Pommade : 15 fr.

**Indications.** — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Rhume des foins, Asthme nasal.

L'Éphédrinolénol dédoublé (1/2 %) convient aux cas chroniques, à l'hygiène du rhino-pharynx et au traitement des nourrissons.

Dans les cas aigus où l'infection domine, préférer l'Éphédramid, solution aqueuse sulfamidée.

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat, LYON.

## ÉPHÉDROLYPTOL

**Composition :**

Solution aqueuse d'essence d'eucalyptus, de Camphre de Bornéo (Bornéosol) et de Chlorhydrate d'éphédrine.

**Présentation :**

Ampoules de 2 cc. renfermant 0,01 d'éphédrine pour injections intramusculaires.

**Indications :**

Toutes les affections aiguës ou chroniques broncho-pulmonaires, Catarrhe bronchique, Asthme, Pneumonie, Bronchopneumonie.

**Propriétés thérapeutiques :**

Antiseptique pulmonaire, calmant de la toux et de l'oppression, médicament antigrippal.

**Laboratoires du BORNÉOSOL**

**DEROME-PINAUD**, pharmacien

143 bis, rue Ordener — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Mon. 07-76.)

## ÉPHÉDROMEL BÉRAL

*Sirop mellité à un demi-centigramme seulement d'Éphédrine par cuillerée à café.*

**Indications.** — Le sédatif par excellence des Toux spasmodiques des enfants et des adultes. Asthme infantile, Coqueluche, Énurésie.

**Posologie.**

Jusqu'à 6 ans, 2 à 8 cuillerées à café.

6 à 12 ans, 2 à 8 cuillerées à dessert.

Adultes, 2 à 8 cuillerées à soupe.

**Prescrire :** ÉPHÉDROMEL

Un flacon : 18 fr. 70.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉDRO-RHINOL

à l'Éphédrine végétale lévogyre.

**Forme.** — Pommade et Solution huileuse.

**Composition.** — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

**Indications.** — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foins, Céphalée d'origine nasale.

**Mode d'emploi.** — Pommade : 3 fois par jour ou plus, gros comme un pois dans chaque narine.

**Solution huileuse :** En instillations. *Adultes :* V à X gouttes 3 fois par jour dans chaque narine. *Enfants :* I à III gouttes, 2 fois par jour.

En pulvérisations avec le vaporisateur spécial Éphédro-Rhinol.

**Prix :** Pommade, 13 francs. Solution, 15 fr. 10.

Vaporisateur et solution : 25 francs.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 219-19 et 219-20.

**Laboratoires OALMEL-DOMERQUE**

S. A. R. L. au capital de 300.000 francs.

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

## ÉPHÉIODINE BÉRAL

*Elixir à 3 centigr. d'Iodéphédrine par cuillerée à café.*

La plus efficace des préparations éphédrinées dans les Périodes intercalaires de l'Asthme et contre les Bouffées asthmatiformes des Catarrheux bronchiques et des Emphysémateux.

*Dilate les bronches, Facilite l'expectoration, Soulage toujours. S'applique à tous les cas.*

**Posologie et mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin et au début des accès.

**Prescrire :** ÉPHÉIODINE BÉRAL

Un flacon : 24 fr. 60

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## ÉPHÉTONINE MERCK

**Composition.** — Chlorhydrate de phényl-méthyl-amino-propanol.

**Propriétés.** — Augmente la pression sanguine, stimule l'activité cardiaque, contracte les vaisseaux, excite le centre respiratoire, dilate les bronches ; action plus prolongée que l'adrénaline.

**Indications.** — Asthme bronchique, bronchites, rhume des foins, urticaire, œdème de Quincke, faiblesse circulatoire, coryza, rhinite vaso-motrice, etc.

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 05.

Flacons de 50 granules à 0 gr. 01.

Boîtes de 10 ampoules à 0 gr. 05 dans 1 cc.

Pommade Merck à l'Éphétonine à 3 %.

Solution Merck à l'Éphétonine à 3 %.

Sirop Merck à l'Éphétonine (Voir : Sirop).

**Posologie.** — 1/4 à 1 comprimé 2 fois par jour ou 1 à 3 granules, plusieurs fois par jour. Injections hypodermiques dans les cas graves. Traitement local des affections rhino-pharyngiennes par la Pommade ou la Solution à l'ÉPHÉTONINE.

**Laboratoires SANOMÉDIA**

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## ÉPHÉTROPINE BÉRAL

**Comprimés contenant chacun :**

Chl. d'éphédrine .....	3 cgr.
Br. d'hyosciamine (atropine gauche) .....	0 mgr. 25
Buth.-éth.-mal.-urée. ....	5 cgr.

Représentent l'association la plus rationnelle des synergiques et correctifs de l'éphédrine.

Particulièrement appropriés au traitement préventif et curatif des accès d'asthme rebelles ou nocturnes avec insomnie, des troubles vago-sympathiques (mal de mer et d'avions, embolies pulmonaires) et à la prophylaxie des réflexes vago-toniques.

1 à 4 comprimés *pro die*.

**Prescrire :** Éphétropine Béral. Une boîte : 21 fr. 80.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.



## ÉPHOLÉINE

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile éphédrinée au centième (éphédrine naturelle chimiquement pure) avec addition d'acétone-chloroforme et orthoforme. (Flacon de 20 grammes.)

**Propriétés.** — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

**Avantages.** — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Épholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Rhume des foies, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

**Prescription.** — Un flacon *Épholéine Falvy*.  
Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Les Laboratoires A. FALVY**  
Licenciés des sciences.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.  
40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## ÉPHYDION

*Éphédrine. Codéthylène.*

**Composition.** — Association synergique d'Éphédrine naturelle, Codéthylène, Belladone, Benzoate Na, Drosera et Grindella. Sous forme de comprimés glutinisés qui se dissolvent dans l'intestin et respectent intégralement l'estomac.

**Action thérapeutique.** — Antispasmodique, Antidyspnéique, Analgésique, Hypnotique léger, Ne provoque pas d'accoutumance.

**Indications.** — Sédatif puissant de toutes les formes de la toux (Spasmodique, Quinteuse, Coqueluchoïde, Emphysémateuse, Névropathique, Réflexe). Calme remarquablement la toux des tuberculeux et leur assure sans fatigue stomacale repos et sommeil.

**Posologie.** — Éphydion comprimés : 5 comprimés par jour, 6 à 8 dans les toux rebelles. Grands enfants : 2 à 5 comprimés par jour.

**Gouttes Éphydion.** — Un cc. ou XXX gouttes — un comprimé. *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge 5 à 8 fois par jour.

**Sirop Éphydion.** — 3 à 4 cuillerées par jour.

**Laboratoires du Docteur LAVOUÉ**  
RENNES (Ille-et-Vilaine).

## ÉPHYNAL « ROCHE »

**Composition.** — Vitamine E de synthèse stabilisée, acétate de dl- $\alpha$ -tocophérol, vitamine de fertilité et d'eutrophie neuro-musculaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Assure un harmonieux développement du fœtus et du nouveau-né, combat les tendances à l'avortement spontané, est indispensable à la spermatogenèse et à la gestation normale ; enfin présente une action eutrophique neuro-musculaire toute spéciale.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les troubles de la fertilité et de l'eugénisme, du fœtus et du nouveau-né, avortement habituel, avortement imminent, azoospermies, stérilité, troubles encéphalopathiques, dystrophies neuro-musculaires, sclérose latérale amyotrophique, etc.

**Avantages.** — Dosage rigoureux, stabilité parfaite, toxicité nulle, action constante par voie buccale, permettant une thérapeutique précise et sans contre-indications.

**Présentation.** — Comprimés sans odeur ni saveur, dosés à 3 mg. d'acétate de dl- $\alpha$ -tocophérol. Flacon de 30 comprimés.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Pour assurer une gestation normale* : 1 à 2 comprimés par jour durant la grossesse.

*En cas de menaces d'avortement* : prescrire 5, 10 ou même 20 comprimés par jour pendant 15 à 20 jours, sans craindre d'intolérance.

*Chez le nouveau-né* : donner 1/2 comprimé par jour délayé dans du lait.

*Dystrophies neuro-musculaires* : doses variant de 1 à 2 à 3 à 6 par jour, et plus, selon les cas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 504-90.

**Produits « ROCHE »**

10 rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. Archives 91-10)

## ÉPICRAL

**Ἐπικρασις**, action de tempérer les humeurs, et **Ἐπικρασις**, fortifier. Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée (1 mgr. Arséniate Soude, 2 mgr. Iode organique, 6 mgr. Lactate mercurique, etc., par cuillerée à soupe).

D'emploi très commode, de saveur très agréable, parfaitement toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

**Originalité.** — Formule bien spéciale, très active et sans aucun inconvénient, avec lactate mercurique (sel de mercure le mieux toléré), Arsénic, Iode (doses très faibles), citrate de soude (rôle très important), etc...

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisypillitique, tonique, agit très favorablement sur les sécrétions (glandes endocrines, foie, muqueuses...) et sur la circulation (diminue la viscosité sanguine, abaisse la tension, etc.). Augmente l'appétit et améliore toujours l'état général.

**Indications.** — Toutes les manifestations de l'Hérédosyphilis, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Ses résultats sont tout particulièrement remarquables dans les troubles endocriniens et de croissance, dans les affections hépatiques, nerveuses et circulatoires. Comme il est tonique, qu'il agit très favorablement sur les sécrétions et la circulation, et que son emploi améliore toujours l'état général, il est très souvent prescrit, avec profit, en dehors de toute manifestation spécifique.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. *Adolescents* : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour. *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Labor. Natl de Contrôle des Médicaments sous le n° 693-2.

Flacon P. M. de 125 gr. : Prix : 11 fr. 60.

Flacon G. M. de 250 gr. : Prix : 21 fr.

Laboratoires G. LAMBERT O. X, Docteur en Pharmacie  
Rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54.)

## ÉPIPALINE

Pommade vitaminée.

Augmente la défense naturelle de la peau et active la réparation des tissus.

**Compositions.** — Huile de Flétan (33 %) particulièrement riche en Vitamines A et D. Excipient composé exclusivement de produits d'origine animale et végétale, de tolérance parfaite.

**Propriétés.** — Action puissante due à sa pénétration facile dans l'intimité des tissus :

- 1° Décongestionnante et sédative.
- 2° Régénératrice et cicatrisante.
- 3° Anti-infectieuse par la vitamine A (sans adjonction d'aucun antiseptique).

**Indications.** — Lésions cutanées banales, dermites aiguës, intertrigo, érythème des nourrissons, crevasses du sein. Brûlures de quelque origine qu'elles soient. Radiodermites accidentelles ou thérapeutiques. Plaies atones, ulcérations chroniques, ulcères variqueux. Affections gynécologiques, ou obstétricales. Affections anales, hémorroïdes, fissures douloureuses. Affections rhino-pharyngées.

Enregistré au Laboratoire de contrôle sous le N° 1050-4.

Prix de vente : Le tube 16 fr.

Laboratoire du Docteur JOUVE

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI<sup>e</sup>) (Troc. : 69-87.)

## EPOXA

SYNERGIE totale des vaso-constricteurs et sédatifs vasculaires.

Forme et présentation :

Gouttes.	20 gouttes = 1 dragée.	Dragées.	
Intrait de marron d'inde... 20 gr.	Intrait de marron d'inde... 0,01		
Extrait fluide piscidia... 100 gr.	Extrait mou de piscidia... 0,01		
— — — senegon... 100 gr.	— — — de senegon... 0,01		
— — — crategus... 100 gr.	— — — de crategus... 0,01		
Alcoolature d'anémone... 120 gr.	— — — d'anémone... 0,006		
— — — bourse à Pasteur... 120 gr.	— — — bourse à Pas- 0,006		
Teinture d'hamamelis... 100 gr.	— — — de hamamelis... 0,005		
— — — de noix vomique... 100 gr.	— — — de noix vo- 0,005		
— — — de muguet... 100 gr.	— — — de muguet... 0,005		
Excipient Alcool-Glycérine. Q. S. P. .... 1.000 gr.	— — — de viburnum... 0,005		

**Indications.** — Troubles veineux des deux sexes. Médication de choix de l'époque critique. Hyposphyxie, Circulation ralentie, Stases veineuses, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, etc...

**Posologie.** — X à XX gouttes ou 1 à 2 dragées avant chaque repas.

Prix : 17 fr. 20.

Toutes taxes comprises.

Laboratoires SAPOREX S. A. R. L.

184, route de Genas — LYON (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Villeurbanne 93-83).

## ÉRANOL

Iode colloïdal physico-chimique à micelles de sens électropositif.

La première préparation d'iode présentée sous la forme micellaire.

L'*Éranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

**Propriétés.** — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Éranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa haute teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance (enfants, vieillards) et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Résultats thérapeutiques inégaux. Jamais d'iodisme.

**Indications.** — Toutes celles de la médication iodée : Lymphatisme, Hypertension, Arthritisme, Rhumatismes, Pré tuberculose, Tuberculoses torpides, Mycoses, Basedow, Goitre, Angor, etc.

**Forme.** — Flacon, avec compte-gouttes.

**Mode d'emploi et Posologie.** — Pendant les repas ou entre les repas, dans du vin, de l'eau rougie et toute boisson.

**Adultes :** XX à L gouttes et plus, deux fois par jour.  
**Enfants :** II à V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

**Nourrissons :** II à V gouttes *pro die*.

Laboratoire de L'ÉRANOL

45, rue de l'Échiquier — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Provence 48-40)

## ERCERHINOL

**Composition.** — Argent colloïdal électrique.

**Propriétés.** — Bactéricide puissant. Traitement pratique, rapide et propre.

**Indications.** — Grippe, Infections broncho-pulmonaires, Catarrhe naso-pharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

**Forme.** — Ampoule nasale de 25 cc. avec tétine. Ampoule de rechange de 25 cc., sans tétine, à deux pointes.

**Posologie.** — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

**Prix :** Nécessaires complets : simple, 21 francs.

Ephédriné, 23 fr. 40

Ampoules de rechange : simple, 15 fr. 20

Ephédriné, 17 fr. 60

(8 jours de traitement.)

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
1, av. de Villars, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Inv. 20-60.)

## ERETON

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Vitamine E d'origine végétale standardisée par voie biologique.

**Propriétés et indications.** — Vitamine de fertilité assurant un développement normal du fœtus. Stérilité de l'homme et de la femme, avortements habituels, menace d'avortement imminent chez les prématurées.

**Posologie.** — La dose normale de 3 comprimés jumelés par jour peut être portée à 9 pendant 15 jours en cas de menace d'avortement.

**Présentation.** — Boîte de 20 comprimés jumelés.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## ERGÉPATINE

Médication hépatique de drainage et de désintoxication  
des voies digestives.

Peptone de viande purifiée.....	2 gr. 14	Extrait mou de Boldo ..	0 gr. 28
Peptone de poisson.....	1 gr. 28	Extrait sec d'Artichaut.	0 gr. 20
Peptone d'œuf.....	0 gr. 85	Salicylate de soude.....	1 gr. 70
Sulfate de magnésie desséché .....	14 gr. 20	Charbon animal déca- nuré .....	2 gr. 28
Extrait mou de Genièvre	0 gr. 28	Sucre parfumé Q.S.p.	100 gr.
Granulé fin, agréable, très soluble.			
Contenance de la boîte 125 gr. env.			

**Particularités.** — Association des 3 peptones au Sulfate de magnésie, au Salicylate de Soude, et aux extraits végétaux (boldo, artichaut, genièvre); antiseptique (charbon) et laxatif.

**Emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café le matin et à midi.

**Indications.** — Maladies du Foie et des voies biliaires. Intoxications. Anaphylaxie. Maladies de la peau. Urticaire. Migraines. Constipation par insuffisance biliaire.

**Agréable au goût, indiqué chez la femme et chez les enfants.**

Inscrit au Laboratoire de Contrôle N° 169-5.

J C ARNAUT

SAINT-JUST EN CHAUSSEE (Oise).

## ERGORONE

Solution de vitamine D cristallisée titrée à 12.000 unités internationales par cm<sup>3</sup>, soit 400 unités pour une goutte.

**Indications.** — Rachitisme, Spasmodophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant.

**Présentation et posologie.** — Flacons de 15 cm<sup>3</sup>.

**Nourrissons :** III à IV gouttes par 24 heures.

**Enfants :** VI à X gouttes par 24 heures.

**Adultes :** X à XX gouttes par 24 heures.

Prix de vente : Le flacon : 20 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPEOIA »

Marques Poulen Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## ERGOTINE BONJEAN

Contient les principes actifs de l'ergot de seigle extrait par un procédé spécial.

(Procédé Bonjean, approuvé par l'Académie de médecine.)

**Indications thérapeutiques.** — Hémorragies de toutes natures : utérines, pulmonaires, gastro-intestinales. Fibromes, Hémorroides, Métrorragies, Hémoptysies, Rétentions urinaires.

**Formes.** — Ampoules injectables indolores de 1 cc. dosées à 0 gr. 15 d'Ergotine Bonjean par ampoule, et correspondant à 1 gramme d'ergot de seigle.

**Dragées :** Chaque dragée correspond à 0 gr. 15 d'extrait mou ou 1 gramme d'ergot de seigle.

**Extrait mou :** pour préparations magistrales.

**Solution :** XV gouttes correspond à 0 gr. 15 d'Ergotine.

**Posologie.** — **Adultes :** — Ampoules : suivant le succès de son action (1 à 4 par jour). La boîte de 6 amp. : 20 fr. Dragées : 4 à 6 par jour avant chaque repas.

Le flacon de 30 dragées : 34 fr. 50.

**Solution :** XV gouttes, 4 à 6 fois par jour.

Le flacon de 30 grammes : 47 fr. 50.

**Enfants :** 1/2 dose.

Fabrication assurée.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX°). (Tél. : Trinité 29-29.)

## ÉRUGON

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Hormone testiculaire standardisée, d'origine glandulaire.

**Indications.** — Impuissance d'origine endocrinienne ou psychique, Asthénie, Neurasthénie, Hypertrophie de la prostate, Troubles de l'âge critique (Troubles nerveux et circulatoires, Insomnie, Diminution du tonus psychique).

**Posologie.** — 1 à 2 dragées, 3 fois par jour.

**Présentation.** — Flacon de 30 dragées à 0,25 unités coq.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## ÉRYLSULFURE ÉON

**Composition.** — Monosulfure de Sodium à odeur et saveur dissimulées, Erysimum, Aconit, Goudron. Sirop stable, facile à prendre.

**Propriétés.** — H<sup>2</sup>S assainit l'arbre respiratoire ; régularise les sécrétions, les active et les fluidifie, ce qui facilite l'expectoration, ou les diminue si elles sont exagérées.

**Indications.** — Fragilité ou irritation chronique des voies respiratoires supérieures et moyennes. Soins de la Gorge. Rhino-pharyngites. Spécifique de l'enrouement et de l'extinction de voix.

L'Erysulfure pourra réussir dans certaines formes de toux et bronchites persistantes, de catarrhes, d'asthme. Permet de combattre la fréquence des Rhumes ; les suites de grippe, de coqueluche.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Jeunes gens : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Si possible avec une boisson chaude et une heure avant ou deux heures après les repas.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix du flacon : 22 francs.

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord).

## ÉRYTHÉMA (Pommade)

Médication rationnelle des épidermes lésés.

**Composition.** — Pommade à base de Calcium, Magnésium et Extrait d'Aunée.

**Indications.** — Toutes lésions de l'épiderme, Dermatoses aiguës et chroniques, en particulier : Érythèmes des nourrissons, Crevasses des seins, Eczémas, Prurit, etc...

**Présentation.** — Pommade en tube.

**Posologie.** — Une application matin et soir.

**L'Érythéma ne tache pas.**

Laboratoires de l'ÉRYTHÉMA

139, rue Jean-Jaurès

MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél. : Entrepôt 13-97.)

## ÉRYTHRA

Chimiothérapie élective de la ROUGEOLE. Antithermique puissant, bien toléré par les enfants, sans action secondaire sur le rein.

### INDICATIONS :

ROUGEOLE. — Arrête la poussée fébrile, abrège l'évolution, évite les infections secondaires (Thèse Boz, Paris, 1933).

Fèvres éruptives, saisonnières, septiques.

TYPHOÏDE. — Plus pratique que les bains froids, abaisse la température, augmente la résistance de l'organisme (Thèse Bernard, Paris 1935).

GRIPPE, PYREXIES, ALGIES.

Le plus maniable des antithermiques.

### POSOLOGIE

#### ROUGEOLE.

Enfants : II à IV gouttes par année d'âge.	} toutes les
Adultes : I à LXXX gouttes.	

#### GRIPPE, PYREXIE, ALGIES, TYPHOÏDE :

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.	} toutes les
Adultes : XXX à LX gouttes.	

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## ESCULEOL

Concentré de marrons d'Inde frais, sous forme parfaitement stable et d'action constante.

Traitement de l'insuffisance veineuse et de ses manifestations : Hémorroïdes, varices, troubles vasomoteurs.

Se fait sous deux formes : gouttes et suppositoires.

**Actions thérapeutiques.** — Hémorroïdes : l'élément douleur disparaît dès les premières prises d'Esculeol. L'affaissement des hémorroïdes se produit par la suite, avec disparition de l'inflammation due aux phénomènes congestifs.

Chez les variqueux, les trajets douloureux deviennent insensibles, les veines reprennent leur souplesse et leur élasticité.

**Posologie.** — Hémorroïdes : 15 à 50 gouttes deux fois par jour, dans l'intervalle des repas. Un à trois suppositoires par jour.

Varices : dans l'intervalle des repas (pendant vingt jours par mois), 15 à 30 gouttes deux fois par jour.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Régnauld — COURBEVOIE.

## ÉSÉRATROPINE

**Thérapeutique balancée des déséquilibres vagues sympathiques.**

Régulateur effectif du tonus neuro-végétatif par inhibition simultanée du vague et du sympathique. Action synergique sur les deux systèmes et sur l'état nerveux général.

Sédatif nerveux, antispasmodique.

Provoque la détente psychique.

**Composition.** — Salicylate d'ésérine, Sulfate d'atropine, Chloralose, Bromure de calcium, Extrait sec de ballote, Extrait sec de Cratægus.

**Indications principales :**

Dystonies, Hyperémotivité, Spasmes, Anxiété, Vertiges, Dépression, Asthme.

Gastronévroses, Entérocrites spasmodiques, Spasmes cardio-vasculaires et tous les troubles fonctionnels dus à l'hyperexcitabilité du système neuro-végétatif.

**Posologie.** — 2 à 5 comprimés dragéifiés par 24 heures, de préférence avant les repas ou 30 minutes avant le coucher.

L'Esératropine est enregistrée au L. N. C. M. sous le n° 29-14.

**Laboratoires Henri FOUCHER**

22, rue Lakanal — PARIS (XV°).  
(Tél. : Vaugirard 11-33 et 86-86.)

## ÉSÉRINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mgr. et à 1/4 de mgr.

Granules de sulfate d'ésérine, alcaloïde extrait de la fève de Calabar (ésérine ou physostigmine).

**Propriétés.** — *Excitant du pneumogastrique.* Myotique. Ralentit le cœur, accélère la respiration. Augmente le péristaltisme intestinal.

**Indications.** — Toutes les *sympathicotopies* (syndrome solaire, éréthisme cardiaque, tachycardies, cœur irritable, etc.). Hyperémotivité anxieuse. Vertiges. Colites chroniques. Atonie intestinale. Troubles fonctionnels de la démence précoce.

**Posologie.** — Dans les petites sympathicotopies, 2 à 3 granules au 1/4 de mgr. par jour avant les repas. En présence de phénomènes plus marqués, 1 ou 2 mgr. par jour (une semaine sur deux).

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X°).  
(Tél. : Nord 40-58.)

## ÉTHYL-PNEUMINE

**Éthylothérapie intraveineuse**

**Composition.** — Solution d'alcool éthylique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

**Forme pharmaceutique.** — Ampoules de 10 cc.

**Indications thérapeutiques.** — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves :* pneumonies, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poulmon, gangrène pulmonaire.

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc. *Traitement des intoxications barbituriques. Alcoolisme aigu et chronique.*

**Doses.** — *Adultes :* Cas graves : 20 à 40 cc. par voie intraveineuse ou intramusculaire, répétées tous les jours.

*Cas moyens ou légers :* 10 cc. par voie intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Prix.** — La boîte de 6 ampoules : 29 francs.

**Échantillons, Littérature :**

**Laboratoires INQÉ**

14, rue Maubland, PARIS (XV°). (Tél. : Vaugirard 88-90.)

## EUBINE

**Composition.** — Chlorhydrate de Dihydroxycodémine.

**Propriétés.** — Analgésique, Sédatif, Hypnotique, Antispasmodique. Antinauséuse, supprime la Morphine, n'a pas ses inconvénients et contre-indications, quatre fois moins toxique.

**Indications.** — Toutes douleurs, Cancer, Tuberculose, Coliques hépatiques et néphrétiques, douleurs fulgurantes et crises gastriques du Tabes, Névralgies, Sympathalgies, Prostatites, vomissements de la Grossesse.

**Présentation.** — 10 ampoules à 2 cgr., 10 ampoules à 1 cgr., 10 suppositoires à 2 cgr., 20 cachets à 2 cgr.

TABLEAU B.

**Posologie.** — Double de celle de la Morphine.

**Mode d'emploi.** — *Chirurgie :* 3/4 d'heure avant l'opération, une injection de 0,02 d'Eubine et 1/4 d'heure avant, une injection de 0,01. Après l'opération, si besoin, une injection de 0,02.

**Médecine générale :** Contre tous syndromes douloureux aigus ou chroniques, 1 à 3 suppositoires ou ampoules à 0,02 par 24 heures.

**Laboratoires Kœhly**

R. LEPICE, docteur en pharmacie,  
18, rue de Ménilmontant — PARIS.  
(Tél. : Ménilmontant 83-95.)

## EUCALYBROL

Toutes les formes de toutes les maladies, de toutes les voies aériennes.  
**AMPOULES :**

### Formule

Ether benzylique du Gaïacol.....	0,03
Cinnamate de Benzyle.....	0,002
Cholestérol.....	0,002
Eucalyptol.....	0,10
Éther.....	0,03
Camphre.....	0,03
Huile d'olive neutralisée et stérile Q. S. pour 1 cc.	
En ampoules de 1 cc., 2 cc. et 5 cc.	

### Posologie

*Adultes :* de 2 à 5 cc. par jour.  
*Enfants :* au-dessus de 5 ans, de 1 à 5 cc. par jour.  
*Enfants :* au-dessous de 5 ans, de 1/2 à 1 cc. par jour.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-14.

**Ampoules.** — Les Ampoules, dont l'injection intra-musculaire ou même sous-cutanée est *parfaitement indolore*, existent sous 3 formes : Ampoules de 1cc., Ampoules de 2 cc. et Ampoules de 5 cc.

### SIROP :

#### Formule

Codéine.....	0,12
Bromoforme.....	0,12
Acide Phénique.....	0,10
Sulfogaiacolate de Potasse.....	2,
Tincture de Belladone.....	0,50
— d'Aconit.....	0,50
— de Grindélia.....	0,50
— de Polygala.....	0,50
Chlorure de Tétraméthyl-Thionine.....	0,005
Sirop d'Eucalyptus Q. S.....	100

### Posologie

*Adultes :* 4 cuillerées à soupe par jour.  
*Enfants :* au-dessus de 10 ans, 4 cuillerées à dessert par jour.  
*Enfants :* de 3 à 10 ans, de 2 à 4 cuillerées à café par jour suivant l'âge.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-6.

### SUPPOSITOIRES :

#### Formule

Ether Benzylique du Gaïacol.....	0,15
Cholestéline.....	0,01
Camphre.....	0,03
Eucalyptol.....	0,05
Chlorhydrate d'Amyléine.....	0,005
Exciipient Q. S. 1 suppositoire	

### Posologie

*Adultes :* 1 à 3 par jour.  
*Enfants :* 1 à 2 par jour.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-15.

### Indications générales :

**Affections broncho-pulmonaires aiguës :** Trachéo-bronchites simples, aiguës et subaiguës, congestion pulmonaire, pneumonie broncho-pneumonie, en particulier préventivement et curativement dans les gripes.

**Fièvres éruptives :** Rougeole, coqueluche.

**Pleurésies séro-fibrineuses ou purulentes, pleurésies sèches.**

**Suppurations broncho-pulmonaires :** Bronchites chroniques, catarrhes, gangrène pulmonaire, abcès du poulmon, tuberculose pulmonaire.

**Prévention des complications pleuro-pulmonaires en milieu chirurgical.**

Laboratoires **BRICHARD et Fils.**  
BAR-LE-DUC (Meuse).

## EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique broncho-pulmonaire).

### AMPOULES de 1, 2 et 5 cc.

**Composition :** Eucalyptol, Acide phénique, Gaïacol, Camphre, Éther.

Les Ampoules existent également sous forme *non gaïacolée*.

Pour injections sous-cutanées ou intramusculaires.

**Doses.** — *Adultes :* 1 à 5 cc. par jour.

*Enfants :* 1 à 3 cc. suivant l'âge et le cas.

### CAPSULES

**Composition :** Eucalyptol, Acide phénique, Ether, Bromoforme, Gaïacol, Camphre.

**Doses.** — 6 à 9 par jour à avaler avec un liquide.

Eviter les eaux alcalines (type Vichy ou Vals). Ces capsules étant glutinisées se dissolvent dans l'intestin et n'ont aucune influence nocive sur l'estomac.

**SIROP :** Voir à la page **SIROP EUCALYPTINE.**

**SUPPOSITOIRES :** Voir à la page **SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE.**

**Indications.** — Grippe et ses complications broncho-pulmonaires. Pneumonies. Broncho-pneumonies. Bronchites et trachéo-bronchites. Abcès du poulmon. Gangrène pulmonaire. Dilatation des bronches. Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou osseuse. Coqueluche et ses complications broncho-pulmonaires. Fièvres éruptives de l'enfance et leurs complications broncho-pulmonaires (Rougeole, Scarlatine, etc...). Complications broncho-pulmonaires post-opératoires en chirurgie générale, en otho-rhino-laryngologie, etc., etc...).

Laboratoire **LE BRUN**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 71-33.)

## EUCHOL MORELLET

### Tonique hépatique.

Le Cynara en thérapeutique se présente sous les deux formes de l'EUCHOL :

**Comprimés dragéifiés** : 0,30 d'extrait stabilisé de Cynara.

**Ampoules Injectables** de 5 cc. : 0,15 de complexe actif du Cynara.

L'EUCHOL contient *uniquement* du Cynara (Artichaut). Il a une *priorité d'ancienneté de 5 ans*, car, de 1928 à 1933 il a été le *seul* à présenter au Corps médical du Cynara pur et simple sans adjuvant. Sa marque n'a jamais couvert de changement de formule.

### Propriétés thérapeutiques :

**Foie.** — Décongestionne le foie et la vésicule.

Stimule les fonctions cellulaires du foie.

Fluidifie la bile et augmente son volume quotidien.

**Rein.** — Provoque une diurèse rapide et abondante (urétique notamment).

**Sang.** — Renverse la tendance précipitante de l'excès de cholestérine en augmentant son pouvoir dissolvant du sang vis-à-vis du cholestérol.

Mobilise l'urée et active l'élimination des déchets protéiques : baisse de la constante d'Ambard.

**Assimilation des vitamines C, P-P, K.**

Lutte contre les causes de l'avitaminose C due principalement à des troubles digestifs et des intoxications alimentaires.

Combat l'insuffisance hépatique, qui est souvent liée à l'avitaminose P-P (professeur A. Giroud).

Régularise le flux biliaire : la vitamine K, qui raccourcit le temps de thrombine, n'est assimilable que si le flux biliaire est assez abondant. L'EUCHOL favorisera son assimilation, ce qui éclaire d'un jour nouveau son action déjà reconnue dans les états *pré-opératoires*.

### Posologie :

**Comprimés.** — 4 à 6 par jour, 2 comprimés avant chaque repas.

**Ampoules de 5 cc.** — Une injection intramusculaire (absolument indolore, tous les jours ou tous les 2 jours). 10 à 15 piqûres par cure. Faire suivre les piqûres d'un traitement de comprimés d'EUCHOL.

**N. B.** — Approvisionnement assuré, sans restriction prévue.

Spécialités à prescription uniquement médicale enregistrées au Laboratoire National de Contrôle sous les n<sup>os</sup> 336-1 et 5.

### Laboratoire MORELLET

**J. MORELLET, Docteur en Pharmacie**  
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

8, place de la Gare — PIERREFITTE (Seine).

## EUCODAL MERCK

**Composition.** — Chlorhydrate de dihydroxycodénone.

**Propriétés.** — Analgésique et sédatif ; action plus rapide et plus intense que la morphine à doses moins élevées, effets secondaires moindres.

**Indications.** — En remplacement de la morphine dans tous les états douloureux : coliques hépatiques et néphrétiques, crises gastriques, cancer, pleurésies, douleurs post-opératoires, etc.

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 005.

Boîtes de 10 ampoules à 0 gr. 01 dans 1 cc.

Boîtes de 10 ampoules à 0 gr. 02 dans 1 cc.

Boîtes de 10 suppositoires à 0 gr. 02.

L'EUCODAL est inscrit au tableau B des stupéfiants.

**Posologie.** — Employer l'EUCODAL avec prudence, en raison du danger possible d'accoutumance.

Pour apaiser les douleurs aiguës : 1 amp. à 0,01 ou 0,02 par voie sous-cutanée ou 1 suppositoire.

Pour calmer l'irritation tussigène : 1/2 à 1 comprimé.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## EUCRINOL

Association endocrine : Foie de veau, Rate, Embryons frais en synergie avec la vitamine B<sup>1</sup>.

### Composition :

Foie frais..... 5 grammes.

Rate fraîche..... 10 —

Embryons frais..... 5 —

Vitamine B<sup>1</sup> cristallisée..... 1 000 U. I.

Excipient alcool-aromatisé..... Q. S. pour un tube scellé de 10 cc.

**Indications.** — Anémies banales ou essentielles, convalescence des maladies aiguës ou infectieuses, dépression physique, surmenage, pré-tuberculeuse, asthénies, amaigrissement, neurasthénie, troubles de la formation.

**Posologie.** — 1 ampoule de 10 cc. avant les deux repas dans un demi-verre d'eau.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 10 cc. ; coffret de 6 ampoules.

Prix de vente : 45 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 2054-2.

### SUD-LABO

**R. TEYOHENE, Pharmacien.**

118, avenue de Toulon — MARSEILLE.



## EUKÉNOL

**Composition.** — A base exclusive de : *Sels biliaires purs* (Taurocholate et Glycocholate de sodium) totalement dépigmentés et privés de nucléo-albumine.

**Formes.** — *Dragées* (0 gr. 15 de sels biliaires purs par dragée).  
*Granulé* (0 gr. 20 de sels biliaires purs par cuillerée à café).

**Indications.** — Le plus sûr et le plus actif des cholagogues ; indiqué dans les Affections hépatiques et les Affections intestinales ou autres, liées à une insuffisance hépatique ; Lithase biliaire, Cirrhose, États icériques, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées toxiques, Fièvre typhoïde, Dysenterie, Diarrhée des pays chauds, Gastro-entérite infantile, Dermatoses auto-toxiques.

C'est le laxatif des Femmes enceintes, des Accouchées, des Nourrices, des Opérés.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 8 dragées par jour.

*Enfants* : 1/2 cuillerée à café de granulé par jour et année d'âge. Une cuillerée à soupe de granulé dans 1/2 litre d'eau bouillie tiède constitue le *lavement purgatif idéal*.

Enreg. au L. de C. sous les n<sup>os</sup> 427-1 et 427-2.

**Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE.**

Jean CLÉMENT, pharmacien,

105, rue Saint-Jacques — ÉTAMPES (Seine-et-Oise).

## EUNÉRYL

Médication de l'anxiété et des dystonies neuro-végétatives, antispasmodique et tonique.

### Composition :

Phényléthylmalonylurée soluble.....	4 grammes.
Hyposulfite de magnésium.....	10 —
Extrait fluide d'Adonis vernalis.....	16 —
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.

X gouttes — 0,01 de phényléthylmalonylurée.

### Propriétés thérapeutiques :

La phényléthylmalonylurée, obtenue en Solution rigoureusement stable par un procédé spécial, est mieux assimilée et agit à doses plus réduites.

L'hyposulfite de magnésium, régulateur du tonus vago-sympathique, est un stimulant qui permet d'éviter la légère action dépressive de la phényléthylmalonylurée. De plus, grâce à l'antagonisme existant entre le magnésium et le potassium, le magnésium procure la sédation des phénomènes d'hyperpotassiémie avec décharge d'adrénaline notés chez les émotifs.

Enfin, l'Adonis vernalis, en plus de ses propriétés cardiotoniques et diurétiques, exerce une action sédative sur certains centres moteurs cérébraux et médullaires régissant le système musculaire (Masslow).

### Indications :

Dystonies neuro-végétatives, anxiété, hyperémotivité, instabilité, irritabilité, syndrome solaire, légères insomnies, cauchemars, convulsions, toux de la coqueluche, mal de voiture.

**Formes.** — Gouttes.

### Posologie :

*Adultes* : L à LXXX gouttes par jour.

*Enfants* : XV à XXX — —  
en trois fois avant les repas.

*Nourrissons* : V à XX gouttes.

*En lavement* : Doubler les doses.

**Prix.** — Le flacon de 20 grammes (800 gouttes) :  
21 fr. 70.

**Laboratoires BIOLABO**

9, bd Malesherbes — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Anjou 61-61.)

## EUONYMINE PAUL THIBAUT

*Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault*, licencié es sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

**Indications.** — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécytites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

**Posologie.** — Pilules dosées à 0 gr. 02 d'Evonymine, de l'*Atropurpureus americanus*, et à 0 gr. 02 d'extrait de boldo — 1 à 4 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Prix : 11 fr. 50.

Pour un traitement de 15 à 30 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobellins 06-89.)

**Nota.** — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 218-2.

## EUPAVÉRYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine.

Chimiquement pur.

Action thérapeutique :

**Régulateur du système nerveux, végétatif** Agit soit sur le sympathique, soit sur le para-symphatique en rétablissant l'équilibre vago-symphatique.

**Freineur du spasme de la fibre lisse** ; agit directement sur la cellule musculaire lisse sans paralyser le nerf.

**Ne modifie pas les sécrétions. Sans action hypnotique.**

Indications :

**Spasmes viscéraux**, Spasme œsophagien, Spasme du pylore, Constipation spasmodique, Coliques hépatiques, Hypertension spasmodique, Angine de poitrine. Asthme, Toux spasmodiques, Coqueluche, Dysménorrhée spasmodique, Déséquilibre vago-symphatique.

Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

**Adultes** : de 0 gr. 50 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

**Enfants** : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Laboratoires THOMAS

2, rue Ste-Cécile — 31, fg. Poissonnière — PARIS (IX<sup>e</sup>)

(Tél. : Provence 49-77.)

## EUPAX

Le Médicament du Spasme,  
de l'Anxiété, de la Neurotonie.

Composition :

Camphre monobromé.....	0,03
Extrait de jusquiame.....	0,01
Amidopyrine.....	0,05
Phényléthylmalonylurée.....	0,02

Pour un comprimé.

**Indications.** — Tous les *Spasmes digestifs* : Aérophagies, Dyspepsies nerveuses.

Tous les *Syndromes nerveux et neuropathiques* : États anxieux, émotifs ; Insomnies, Nervosisme.

Tous les *Spasmes cardio-vasculaires* : Palpitations, Tachycardie, Hypertension artérielle.

*Syndromes endocrino-nerveux* : États para-basedowiens, Insuffisance ovarienne, Ménopause.

**Doses.** — *D'attaque* : 4 à 5 comprimés par jour par périodes de 10 à 15 jours ; *d'entretien* : 3 comprimés par jour 10 jours par mois.

Laboratoire E. BEYAERT

65 bis, avenue de Montrouge — GENTILLY-PARIS.

## EUPEPTIQUE MONAVON

**Composition.** — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure.....	0 gr. 12
Diastase.....	0 gr 15

**Propriétés thérapeutiques.** — Digère les viandes et les féculents.

**Avantages.** — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

**Indications.** — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 24 fr. 90.

Produits GONNON

J. et O. GONNON, Pharmaciens  
14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

## EUPHON

**Sirop et Pastilles contre l'enrouement.**

**Composition et forme.** — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codéine 0,006 + Teinture rac. aconit 0 gr. 20 ; formiate sodique 5 + sirop d'erysimum et d'année 100.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

**Indications thérapeutiques et posologie.** — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonies, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

**Prix :** Sirop : 19 fr. 40 — Prix : Pastilles : 8 fr. 60.

(8 jours de traitement).

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. Passy 51-12.  
A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,  
4, avenue Orban.

## EUPHORYL

**Dragées. Cachets. Intraveineux. Intramusculaire.**

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

**Formule** — Thiosulfate de sodium et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

**Indications.** — a. Dermatoses prurigineuses : Eczémas secs et suintants, érythrodermies, dermatites alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Psoriasis, toxidermatoses, accidents de l'aurothérapie.

b. Prurits essentiel, toxique, génital, sénile, parasitaire.

c. Manifestations anaphylactiques : Urticaire, migraines, œdème de Quinke, maladie sérique, chocs anaphylactiques.

**Posologie.** — *Cas moyens :* 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures ou 1 injection intramusculaire profonde de 5 cc. tous les 2 jours (8 à 12 injections).

*Cas aigus :* 1 injection intraveineuse bihebdomadaire, avec prise de 2 cachets ou 4 dragées les jours intercalaires.

**Nota.** — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

**Prix :** cachets : 25 fr. 10 ; dragées : 25 fr. 10 ; intraveineux : 25 fr. 10 et 42 fr. 40 ; intramusculaire : 35 francs.

**Laboratoires « ANA »**

**Docteur VENDEL et C<sup>ie</sup>**

16-18, avenue Daumesnil — PARIS (Tél. : Dorian 52-12+.)  
18, rue Lafon, MARSEILLE. (Tél. : Lycée 50-74.)

## EUPHORYL-INFANTILE

**Granulé soluble.**

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées. Anaphylaxies. Intoxications.

**Formule.** — Thiosulfates alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

**Présentation.** — Granulé soluble de goût agréable, facilement accepté par les enfants les plus jeunes.

**Indications.** — L'Euphoryl Infantile est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1<sup>o</sup> **Dermatoses prurigineuses.** — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermatites médicamenteuses, érythrodermies, toxidermatoses, strophulus, prurits, herpès, trichophyties, pityriasis.

2<sup>o</sup> **Troubles digestifs.** — Anorexies, Vomissements, État saburral des voies digestives, Intoxications alimentaires, constipation des nourrissons. Petite insuffisance hépatique.

3<sup>o</sup> **Anaphylaxies.** — Urticaire, migraines, œdèmes de Quinke.

**Nouvelle Posologie** — 1/2 cuillerée à café par année d'âge. Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait. Chez les nourrissons, il se dissout aisément dans les biberons.

**Prix :** 25 fr. 10.

**Laboratoires « ANA »**

**Docteur VENDEL et C<sup>ie</sup>**

16-18, avenue Daumesnil — PARIS. (Tél. : Dorian 52-2+.)  
18, rue Lafon, MARSEILLE (Tél. : Lycée 50-74.)

## EUPHRÉNINE BASTIA

**Sédatif. Décongestif. Hypotenseur.**

*Non toxique.*

**Forme.** — Gouttes.

**Composition :**

Extrait fluide de Scrofularia Tournefortii..	40 gr.
— de Betonica officinalis .....	40 —
— de Ballota nigra .....	10 —
pour 100 grammes.	

**Indications.** — Tous les Hypertendus quels qu'ils soient en relèvent, Athéromateux séniles, Artérioscléreux ; Cardiopathes gauches, Aortiques, Cardio-rénaux ; Crise d'angor, Œdème aigu, Pseudo-asthme ; Troubles de la ménopause.

**Dose habituelle.** — LX gouttes, une ou deux fois par jour, suivant le cas, dans un peu d'eau sucrée ou non.

**Laboratoire GERDA**

**F. GERIN, pharmacien**

10, rue Jacquard — LYON.

## EUPHYDIGTAL

**Composition.** — Combinaison d'euphyllin et de digitale stabilisée.

**Indications.** — États sténocardiaques, Insuffisances cardiaques, Scléroses coronaires, Insuffisances secondaires à décompensation cardiaque avec hypertension, États de stase hépatique.

### Posologie :

*Comprimés* : 1 à 2, trois fois par jour.

*Suppositoires* : 2 à 3 par jour.

### Laboratoires BIOS

10, rue Vineuse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Tro. 57-44.) (Télégraphe : Bios-Paris.)

## EUPHYLLIN

**Composition.** — Combinaison de la Théophylline à l'éthylène-diamine.

**Propriétés.** — Médicament des spasmes vasculaires coronariens, antalgique cardiaque. Toni-cardiaque. Diurétique. Excellent analeptique respiratoire. Aide le cœur et les reins. Action rapide, constante, sans aucune toxicité. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Angine de poitrine, Myocardites chroniques, Arythmies, Infarctus du myocarde, Aortites, Ascites, Œdèmes, Dyspnée, Cheyne-Stokes, Asthmes vrai et cardiaque.

### Posologie :

*Ampoules intra-musculaires* : 1 à 2 par jour. Action rapide et sans danger. *Tous les cas d'urgence* : angine de poitrine, œdèmes aigus du poumon, anasarques des cardio-rénaux, dyspnées cardiaques, des urémiques, etc.

*Ampoules intra-veineuses* : injecter très lentement (2 à 3 minutes), 2 à 3 par jour. Cas graves : crises aiguës d'angine de poitrine, infarctus myocarde, oliguries graves, comas toxiques.

*Comprimés* : 4 à 6 par jour à la fin des repas. Préventif des crises d'angine de poitrine, oppression des cardiaques, aortiques, urémiques, coronarites.

*Suppositoires* : 2 à 4 par jour. Cirrhose, hypertension portale.

L'association à l'Euphyllin des médicaments cardiaques éprouvés facilite la prescription médicale.

Littérature et renseignements sur demande.

### Laboratoires BIOS

10, rue Vineuse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Tro. 57-44.) (Télégraphe : Bios-Paris.)

## EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

**Forme. — Solution.**

**Composition.** — Une cuillerée à café contient  
*Cratægus oxyacantha*..... 31 centigr.  
 Extrait fluide de *passiflora incarnata* ..... 50 —  
 Extrait fluide de *Paulinia sorbilis* 16 —  
 Extrait mou de *Valeriana officinalis* ..... 12 —  
 Alcoolature de *Ballota nigra*..... 98 —

**Posologie.** — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

**Indications.** — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie,angoisse précardiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses,angoisse de la ménopause.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballote. Elle est toncardiaque par le *Cratægus oxyacantha*. Par la Passiflore, elle est sédatrice de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au *Paulinia sorbilis* (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09-83.)

## EUPLAGEX

Pansament antiseptique, balsamique (odeur agréable) et kératoplastique, pour cicatrisation des plaies par *vitaminothérapie locale*.

**Composition :**

Vitamine A stabilisée.....	80 000 unités Internationales.
Antiseptiques	Baume du Pérou purifié..... 3 gr.
balsamiques.	Essences sélectionnées déterpénées... 2 gr. 20
Antiseptiques	Sulfate d'oxyquinoléine..... 0 gr. 02
chimiques.	P. amino-phénylsulfamide..... } aa 0 gr. 10
	Soufre colloïdal..... } aa 0 gr. 10
Excipient.	Paraffines amorphes rigoureusement neutres
	Q. S. pour 100 gr.

**Avantages.** — 1° Antisepsie rationnelle permettant l'usage chirurgical ;

2° Activation de la régénération par la vitamine A à dose optimale, alliée au Baume du Pérou purifié.

**Indications.** — Plaies infectées ou non et réparations cicatricielles (brûlures aux trois degrés, dermo-épidermites, ulcères variqueux, infections génitales, furoncles, engelures ulcérées, prurit, etc.).

**Nota.** — Employer très peu de produit, mais faire une onction prolongée et si possible un massage.

**Présentation.** — Tubes P. M. : 14 francs.

Tubes G. M. : 35 francs.

**Labores « SYNTHESIS »** 45, av. Trudaine - PARIS (IX<sup>e</sup>).

## EUPLASTYL

**Forme.** — Pommade très pénétrante, demi-grasse, ne formant pas de croûte, et sans odeur.

**Indications.** — Calmant instantané de tout prurit ou douleur, antiseptique puissant, cicatrisant extraordinairement rapide.

Toutes lésions cutanées : ulcères, brûlures, eczémas secs, prurits, impétigos, etc.

**Composition.** — Huile de chaulmoogra, sulfo-ichtyolate d'ammoniaque, sulfate de cuivre, para-aminobenzoate de butyle, oxyde de zinc et de titane.

**Mode d'emploi.** — En couche épaisse sur la lésion.

Le tube normal : 6 fr. 10.

Le triple tube pour dermatoses étendues ou rebelles : 17 fr.

La poudre EUPLASTYL, au prix de 6 fr. 10 la boîte, complète utilement l'action de la Pommade, très efficace pour le poudrage des bébés, pour les dermatoses bénignes et pour la transpiration excessive.

Enregistré au L. N. G. sous le n° 1248-4.

**L. GUÉRET, Pharmacien**

89 rue Martre — CLICHY (Seine). (Tél. : Per. 11-01.)

## EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

**Dose et mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin et le soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

**Propriétés thérapeutiques.** — “ L'Eupnéique ” Diurétique et toni-cardiaque.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Dyspnées, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de Grippe.

Prix : 21 fr. 10 (10 jours de traitement).

**Laboratoires DARRASSE**

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).  
(Tél. : Galv. 86-17.)

## EUPNOL (Poudre)

Asepsie des muqueuses des premières voies respiratoires (nez et gorge).

**Composition.** — Eucalyptol, terpinol, menthol (peu), essence de pin sylvestre, acide benzoïque.

**Propriétés.** — Décongestionnant, désinfectant, ni caustique ni toxique, des fosses nasales, du pharynx et de la trachée.

**Indications.** — Oto-rhino-laryngologie, rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites.

**Emplol.** — Poudre : 1 cuillerée à café par doses fractionnées dans un bol d'eau bouillante en inhalations, gargarismes et grands lavages de gorge.

La fabrication des *Pastilles d'Eupnol* est suspendue.

**Prix :**

Poudre : le flacon, 20 francs.

L. N. C. 314-33.

**Laboratoires ECHEMAN**

26, rue des Moines — PARIS (XVII°).

## EUPNOPHÉDROL

**Pour instillations nasales et pulvérisations.**

**Présentation.** — Flacon avec compte-gouttes spécial.

**Composition.** — Ephédrine base, 0 gr. 50 ; Eucalyptol, Goménol, Chlorétone, Essence de lavande, Huile neutralisée, Q. S. pour 100 gr.

**Indications.** — Coryza, Rhume des foins, Asthme et Asthme nasal, Congestions fluxionnaires avec migraines d'origine nasale, Sinusites, Rhinites suppurées.

**Emplol.** — V à X gouttes dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour. *L'Eupnophédrol* réussit mieux encore en pulvérisations.

Prix. — Le flacon : 18 fr. 10.

L. N. C. n° 314-37.

**Laboratoires ECHEMAN**

26, rue des Moines — PARIS (XVII°).

## EUPULMOL

### LAVEMENTS. SUPPOSITOIRES.

**LAVEMENTS.** — Traitement d'urgence des affections pulmonaires aiguës. Tonicardiaque. Véritable spécifique des Broncho-pneumonies. Le lavement réalise une dispersion quasi instantanée d'éther et de goménol dans tout l'organisme, mettant celui-ci en état de défense et capable de supporter l'action secondaire du camphre et de la strychnine.

**Formule.** — Pour 250 cc., 8 cc. de goménol, 8 cc. d'éther sulfurique, 4 mgr. de strychnine sulf., 4 gr. de camphre, 60 gr. d'huile d'olive stérilisée. Emulsion à la gomme adragante.

**Indications.** — Broncho-pneumonie. Pneumonie. Congestion pulmonaire. Bronchite simple, aiguë. Coqueluche. Grippe à forme respiratoire.

**Posologie.** — L'Eupulmol se donne pur, en lavements à conserver à l'aide d'une petite poire en caoutchouc.

Jusqu'à 1 an 2 lavements par jour de 1 cuillerée à soupe.

de 1 à 2 — 3	—	1	—
de 2 à 4 — 4	—	1	—
de 4 à 6 — 3	—	1 1/2	—
de 6 à 10 — 3	—	2	—
Adultes 3	—	4	—

Dès que la phase aiguë de la maladie est passée, ces doses peuvent être réduites de moitié.

**SUPPOSITOIRES.** — Médication d'entretien dans toutes les affections pulmonaires. Tonicardiaque. Antisepique de choix des voies respiratoires.

L'Eupulmol « Suppositoires » contient les mêmes principes actifs que le « Lavement ».

L'Ether a été remplacé par le Cinnamate de Benzyle, dérivé possédant les mêmes propriétés.

Même processus d'action, simplement action moins instantanée dans l'organisme.

Le « Suppositoire » joue le rôle de désinfectant respiratoire électif et, de ce fait, réalise le véritable spécifique de toutes les affections pulmonaires chroniques.

#### Formule. — Suppositoires Enfants :

Goménol .....	0 gr. 25
Camphre .....	0 gr. 10
Cinnamate de Benzyle .....	0 gr. 015
Sulfate de Strychnine .....	1/10 de mgr.

Excipient Q. S. pour 1 suppositoire terminé à 2 grammes.

#### Suppositoires Adultes :

Goménol .....	0 gr. 50
Camphre .....	0 gr. 25
Cinnamate de Benzyle .....	0 gr. 05
Sulfate de Strychnine .....	0 gr. 001

Excipient Q. S. pour 1 suppositoire terminé à 3 gr. 60.

**Indications.** — En général toutes les indications de l'Eupulmol « Lavement », mais dans la forme chronique de la maladie. Tuberculeuse pulmonaire. Emphysème. Asthme. Oppression. Laryngite.

**Posologie.** — *Suppositoires Enfants :* Jusqu'à 1 an : 1 par jour.  
De 1 à 2 ans : 2 par jour.  
De 2 à 4 ans : 3 par jour.  
Au-dessus de 4 ans : 4 par jour.

*Suppositoires Adultes :* Dans la période active de la maladie : 1 suppositoire matin et soir au lever et au coucher. Dans les cures d'entretien, un suppositoire le soir au coucher.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1966-1-2-3.

Laboratoires de l'EUPULMOL  
M. CHAVATTE, Pharmacien.  
88, rue de France — ROUBAIX.

## EUQUINARGOL

### Formes :

Suppositoires dosés pour bébés et enfants.  
— adultes.

**Composition.** — Euquinine, Analgésine, Collargol, Cinéol.

**Propriétés.** — Analgésiques, Antisepiques.

**Indications.** — Tous états fébriles, infectieux et pulmonaires.

**Doses.** — 1 ou 2 suppositoires par 24 heures, suivant la température.

**Prix :** Bébés, enfants : 14 francs.  
Adultes : 16 francs.

### Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

## EUSEDYL

### Suppositoires.

**Composition.** — Association de sédatifs (chl. de méthylcodéine, belladone, scopolamine, phényléthylmalonylurée, ac. acétysalicylique, aneurine crist.) et d'ouabaine crist.

**Indications.** — Toutes les indications de la morphine. Syndromes douloureux abdominaux et pelviens. Névralgies et Myalgies. Néoplasies. Dyspnée, agitation, insomnie des asthmatiques, emphysemateux et cardiaques. Grande et petite chirurgie.

**Avantages.** — Prescription facile (aucun produit du tableau B). Aucune contre-indication. (Spécialement indiqué chez les insuffisants cardiaques et rénaux.)

**Posologie.** — 1 à 3 suppositoires par 24 heures. Enfants au-dessus de 8 ans : par 1/3 ou 1/2 suppositoires.

**Prix :** 21 fr. 80 la boîte normale de six suppositoires ;  
65 fr. 40 la quadruple boîte.

### Laboratoire de l'EUSEDYL

32, rue des Vallées — COLOMBES (Seine).  
(Tél. : Charlebourg 02-45.)

## EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée.)

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypnotique, sédatif, antialgique.

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphisation, Dyspepsie nerveuse.

**Mode d'emploi et dose.** — Comme sédatif : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

**Comme hypnotique :** Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, orange, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étul : 9 fr. 40.

**Laboratoires BÉLIÈRES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

**Formule.** — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Muscle cardiaque .....	0 gr. 50
Parenchyme rénal .....	0 gr. 50
Iodotyrosine .....	0 gr. 05
Scille .....	0 gr. 06
Scammonée .....	0 gr. 04

Pour un comprimé.

**Doses et mode d'emploi.** — Deux à quatre comprimés par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

**Indications.** — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension qu'il compense en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

On peut associer à l'Eutensyl la digitale

Enregistré L. N. C., n° 608-03.

**Prix.** — Le flacon de 40 comprimés : 25 r. 80

**Laboratoires GRÉMY**

14, rue de Cléchy, PARIS (IX<sup>e</sup>). Tél. Trinité 48-43.)

## ÉVATMINE CARRION

Médication adrénalino-hypophysaire de l'asthme.

**Composition.** — Solution injectable renfermant 1 demi-milligramme d'adrénaline naturelle, associée à l'extrait d'hypophyse.

**Forme.** — Ampoules de 1 cc.

**Indications.** — Crise d'asthme, Toux spasmodique.

Contre-indication : hypertension notable.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire au moment des crises 3 à 4 ampoules dans les 24 heures s'il est besoin. S'assurer que l'injection n'est pas poussée dans un vaisseau.

**Présentation et prix.** — La boîte de 6 ampoules 1 cc. : 19 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 514-11.

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## ÉVINE

Poudre soluble Évine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, désersive, décongestionnante, sédatrice, cicatrisante, non caustique. Ne jache pas.

**Indications.** — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

**Posologie.** — 1<sup>re</sup> Hygiène féminine : 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2<sup>o</sup> Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3<sup>o</sup> Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4<sup>o</sup> Hygiène masculine 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5<sup>o</sup> Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions compresses).

Ovules Évine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36°5. Ne tachent pas.

**Indications.** — Toutes affections gynécologiques.

**Posologie.** — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Évine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever

**Prix :** Poudre : 19 fr. 20 — Ovules : 22 francs.

**Laboratoires ÉVINE**

15, boulevard des Batignolles — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Europe 33-63.)



## ÉVIPAN

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — N-méthyl-cyclohexényl-méthyl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Hypnotique non toxique, d'action très rapide, ne prolongeant pas la durée du sommeil physiologique.

**Insomnies nerveuses, Assoupissement difficile, Réveil nocturne.** L'ÉVIPAN peut être prescrit aux femmes qui allaitent, sans aucun danger pour les nourrissons. Il n'est pas indiqué dans l'insomnie liée à la douleur.

**Posologie.** — Prendre dans une boisson chaude 1 à 2 comprimés le soir, immédiatement avant le coucher, ou 1 comprimé seulement en cas de réveil dans le courant de la nuit.

**Présentation.** — Tube de 10 comprimés à 0 gr. 25.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## ÉVIPAN-SODIQUE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Sel sodique de la N-méthyl-cyclohexényl-méthyl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Anesthésie générale par voie intraveineuse : de courte durée (10 à 20 minutes) ; prolongée, suivant la technique du professeur Jentzer, de Genève ; anesthésie de base. Chez les anxieux, les pulmonaires, les cardiaques, les vieillards ainsi que pour l'appareillage des fractures. Contre-indiqué dans la chirurgie ano-périnéale, les infections du rhinopharynx et les interventions sur les extrémités.

**Posologie.** — Injecter les premiers centimètres cubes à la vitesse de 40 secondes par centimètre cube jusqu'à la chute de la mâchoire (stade de sommeil). Observer un arrêt de 30 secondes environ et injecter à la vitesse de 20 secondes par centimètre cube une seconde dose égale à la première (stade anesthésique).

**Présentation.** — Boîtes de 1, 5 et 25 ampoules de 1 gr. d'ÉVIPAN-SODIQUE avec un nombre correspondant d'ampoules d'eau bi-distillée pour la préparation extemporanée de la solution à 10 p. 100.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## ÉVOLAXINE

(La laxatif de la Femme.)

**Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.**

**Pas d'accoutumance. Pas de coliques.**

**Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.**

**Par son muilage lubrifie les parois intestinales.**

**Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.**

**Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaires, pancréatique et intestinale.**

**Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.**

**Indications.** — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatose, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 13 fr 65.

Enregistré au L. N. C. M. N° 111-4.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> LAURENT-GÉRARD**

Pharmacien, Docteur ès sciences,

Ancien Chef de Laboratoire, Faculté de Médecine de Paris.  
40, rue de Bellechasse — PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

## ÉVONYL

**Composition.** — Synergie OPOTHÉRAPIQUE (extraits biliaires et de glandes intestinales, ferments lactiques) et VÉGÉTALE (Evonymine, Fucus, Agar-Agar, Podophyllin, Belladone, etc.).

**Propriétés.** — Cholagogue de premier ordre. Laxatif doux absolument certain. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

**Indications.** — Affections hépato-biliaires, Constipation aiguë ou chronique, Insuffisance hépatique, Cholécystites, Lithiases biliaires, Hypertension, Laxatif des grands aliés.

**Forme.** — Dragées.

**Posologie.** — Adultes : 2 le soir avant ou après le repas, à avaler sans mâcher.

Enfants : 1 après le repas.

Prix au public : 17 fr. 10 la boîte de 60 dragées pour le traitement d'un mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-1.

**Laboratoires FLUXINE**

**Produits BONTHOUX**

**Edm. JOËT, Docteur en pharmacie,**  
**VILLEFRANCHE (Rhône).**

## EXENTÉROL

**Composition.** — Pansement-vaccin intestinal constitué par le mélange extemporané d'une ampoule de vaccin (contenant 65 milliards de bacilles coli, entérocoques, Gartner, Proteus, Faecalis, Lactis) et d'une mesure de granulé mucilagineux spéciaux.

**Indications.** — Entérites, Entérocolites, Infections intestinales, Syndromes entéro-rénaux, Colibacilloses. Auto-intoxication.

**Propriétés.** — L'Exentérol assure un contact prolongé du vaccin et de la muqueuse. Il favorise d'autre part l'acheminement des matières fécales, évitant ainsi les fermentations intestinales qui accroissent l'infection.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour.

### Présentation:

**Adultes :** boîte de 8 ampoules de 10 cc. et 8 doses de granulé mucilagineux : 33 francs.

**Enfants :** boîte de 8 ampoules de 5 cc., et 8 doses de granulé mucilagineux : 24 fr. 40.

### Laboratoires du D<sup>r</sup> DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## EXOBOL

### Guérlson de la constipation.

Deux formes : Émulsion, Comprimés.

**1<sup>re</sup> Forme émulsion.** — Émulsion d'huile de paraffine pure, de goût extrêmement agréable, d'action certaine. Ne produit aucune action irritante, aucun suintement.

**Posologie.** — 1 à 2 cuill. à soupe à prendre au milieu des repas. *Enfants :* 1/2 ou 1/3 de ces doses.

**2<sup>e</sup> Forme comprimés.** — Mucilages, extrait spécial de foie, boldo et diacétyldioxyphénylisatine, action sûre, ne provoquant pas de coliques ni d'accoutumance.

**Posologie.** — 1 à 4 compr. au milieu du repas du soir ou avant de se coucher. *Enfants :* 1/2 ou 1/3 de ces doses.

### Établissements MOUNEYRAT

#### Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé Faculté de médecine,  
Docteur ès sciences, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
12, rue du Chemin-Vert  
VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).  
(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## EXOLITHOL

Cholagogue et diurétique, calmant, antiseptique biliaire et urinaire.

**Composition.** — Valérianate d'amyle, benzoate et salicylate de soude, principes végétaux cholagogues et diurétiques, glycérine, en solution dans de l'eau minérale naturelle du Bassin de Vichy.

**Indications.** — Lithiase hépatique, rénale, infections des voies biliaires ou urinaires, ictères, colibacillose, congestion ou insuffisance hépatique.

**Posologie.** — 1<sup>re</sup> Crises aiguës (coliques hépatiques ou néphrétiques) : 1 verre à madère, de 10 en 10 minutes, jusqu'à calme; 2<sup>o</sup> comme traitement de fond, à renouveler une ou deux fois par an : 5 verres à madère par jour, pendant 15 à 20 jours.

**Forme.** — Solution (en flacon de 500 cc.).

Prix : 17 fr. 60.

Laboratoires A. CHÉRADAME,  
à LA PALISSE (Allier).

## EXORPHYL (gouttes)

Médication spécifique des affections veineuses.  
Décongestion hépato-rénale.

Formule complète remarquablement active.

**Composition.** — Hamamélis, Cupressus, Boldo, Cynara, Millefeuilles, Vigne rouge, Fumaria, Cascara, Viburnum, Marron d'Inde, Ovaire, Testicule, Olivier, Nal.

**Indications.** — Hypertension, varices, phlébites, hémorroïdes, prostatite, ménopause, états congestifs hépato-rénaux, vaso-dilatation générale, métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, douleurs menstruelles, hypertension hépato-jugulaire.

**Posologie.** — De X à L gouttes et plus si nécessaire, à prendre deux fois par jour, de préférence à jeun, dans un peu d'eau ou dans une légère infusion de tilleul ou de menthe.

Aucune contre-indication.

Spécialité ne renfermant aucun produit toxique.

### Laboratoire E.-M. DAUMAS

1, rue Méhul — PANTIN (Seine).  
(Tél. : Nord 97-08.)

## EXOSEPTOPLIX

(1162 F ou paraminophénylulfamide)

### Composition :

Poudre pure de 1162 F, passée au tamis 200, neutre, très soluble dans les humeurs, diffusible, parfaitement tolérée.

### Présentations :

- 1° **Exoseptoplix-poudre** : Flacons poudreux de 10 et de 50 gr. Flacons de 100 gr. s'adaptant sur l'insufflateur *Thérapiex*. Boîte de 12 ampoules stériles de 2 gr. 50.
- 2° **Exoseptoplix-crayons** : Boîte de 10 crayons chirurgicaux dosés à 1 gr. Boîte de 10 crayons gynécologiques dosés à 0 gr. 50.
- 3° **Exoseptoplix-ovules** : Boîte de 6 ovules dosés à 2 gr.
- 4° **Exoseptoplix-mèches** : Tube de 1 mèche chirurgicale stérile (1 m. 50 x 0 m. 05), dosée à 2 gr. 70. Boîte de 10 mèches O. R. L. stériles (0 m. 25 x 0 m. 01) dosées à 0 gr. 10.
- 5° **Exoseptoplix-pommade** : Tube de 15 gr. de pommade à 50 % de 1162 F.

### Propriétés :

Bactériostatique polyvalent, particulièrement actif dans les infections à streptocoques, staphylocoques, anaérobies, b. de Ducrey, etc.

### Indications :

- 1° **Chirurgie** : toutes les plaies (prophylaxie et traitement de l'infection) abcès, fractures ouvertes, ostéomyélites, péritonites par perforation viscérale ou traumatisme.
- 2° **Gynécologie** : métrite du col, vaginite, etc.
- 3° **Dermato-Vénérologie** : chancre mou et herpès génital, impétigo, pyodermites, engelures et ulcères variqueux infectés, brûlures, eschares et gangrènes cutanées.
- 4° **Oto-Rhino-Laryngologie et Ophtalmologie** : rhinites et sinusites maxillaires, otites purulentes et plaies mastoïdiennes, conjonctivites purulentes, suppurations oculaires et péri-oculaires.
- 5° **Stomatologie** : pyorrhée, stomatites, soins post-opératoires.

### Posologie et mode d'emploi :

Répéter les applications tous les jours ou tous les deux jours.

La forme et la quantité d'EXOSEPTOPLIX à utiliser varient essentiellement avec la lésion à traiter. Ne pas dépasser pour une même application la dose de 15 gr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPIEX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## EXSUGYL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

**Composition.** — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Amylum tritici, Pulvis diatomel, Talcum.

**Propriétés.** — Poudre éminemment absorbante, anti-prurigineuse, microbicide.

**Indications.** — Eczémas suintants rebelles, toutes dermatoses avec exosérose, Dermite par irritation.

**Mode d'emploi.** — Sous forme de compresses de gaze matelassées d'*Exsugyl* dans les affections suintantes.

Demander les brochures des docteurs

P. et R. BOURGGRAFF :

*Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.*

Littérature sur demande aux :

**Laboratoires du PRATIOEN**

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## EXTENSOPLAST

Albuplast élastique.

Bandes adhésives extensibles en largeur ou en longueur, recouvertes d'une masse adhésive identique à celle de l'Albuplast.

Se présentent en bandes de 1 mètre ou 2 m. 50 de long et de toutes largeurs de 2 à 30 centimètres de large.

Peuvent être livrées :

- |  |  |
|--|--|
| 1° Entièrement enduites .....          | } extensibles en largeur ou en longueur. |
| 2° Partiellement enduites (striées) .. |  |
| 3° Perforées .....                     |  |

**Indications.** — Pansement des ulcères variqueux. Pansements aux articulations. Prévention et traitement de luxations, entorses. Renforcement des articulations (sports d'hiver).

Fabrication très réduite actuellement (1942) faute de matières premières.

**Anciens Établissements F. VIGIER et Cie**  
**Jean HUERRE et Cie**

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET  
(Tél. : Perdre 57-41.)

## EXTRAIT HAMYD

**Composition.** — Mélange en proportion définie de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur. Puissant décongestif pelvien et vasculaire. Sédatif gastrique.

**Indications.** — Tous les troubles de la circulation veineuse, tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, salpingites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.).

Troubles de la puberté et de la ménopause, gastralgies réflexes.

*Constipation des femmes enceintes.*

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau de 1 à 3 fois par jour.

Laboratoire GMET

A. LOROT, Pharmacien

1, avenue du Lycée-Lakanal — BOURG-LA-REINE (Seine).

(Tél. : Robinson 15-67.)

(Voir GMET, page 000.)

## EXUBYLE

Agent de drainage des voies biliaires. Désensibilisant.

**Forme.** — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur agréable.

**Composition.** — Association de peptones (de viande, de poisson de fibrine), de sulfate de magnésie, d'hyposulfite de soude et d'extrait d'artichaut et de boldo.

**Indications.** — a. Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires : Insuffisance hépatique et biliaire, cholécystite subaiguë, chronique avec ou sans calcul, ictères, congestion du foie, cirrhose, b. Troubles digestifs d'origine hépatique : Dyspepsies, gonflement, vertiges, nausées, somnolence après les repas, constipation, c. Etats anaphylactiques d'origine alimentaire : Eczéma, prurit, œdème de Quincke, migraine, asthme, certaines dermatoses, etc...

**Particularités.** — Cholagogue puissant sans action irritante sur l'intestin.

**Posologie.** — Deux cuillerées à café le matin à jeun, 1/2 heure avant toute alimentation, dans un demi-verre d'eau tiède.

Prix : 20 francs.

Laboratoire HEMOREX

R. PAULY, Pharmacien,

9, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET.

## FA-NER-VAL

*Faolt-nervum-validum.*

Formule du D<sup>r</sup> Martin du Theil.

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Ce granulé contient par cuillerée à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

**Indications.** — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

**Doses habituelles.** — 1 cuillerée à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Enregistré au L. C. M. sous le n° 563.

Laboratoires LAOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

## FANGO-FISCH

**Forme :** présenté :

En poudre et ramené à l'état de boue par addition d'eau. Sous forme de Cataplasme prêt à l'emploi.

**Mode d'emploi :**

En application directe sur la peau à des températures variables. Par applications du cataplasme amené par immersion dans l'eau bouillante à la température appropriée.

**Indications.** — Affections chroniques douloureuses musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

**Contre-Indications.** — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

**Présentation et prix :**

En paquet de : 1 kg. 500 : 19 fr. 90 ; 4 kg. 500 : 55 fr. 90.

Pour Clinique et Hôpitaux, prix spéciaux sur demande, par 100, 1.000 kilogs, etc.

En cataplasme :

A = 15 x 40 cm. (rectangulaire) 24 fr. 80.

B = 25 x 40 cm. (rectangulaire) 31 francs.

C = 20 x 40 cm. (rectangulaire) 31 francs.

Laboratoires FISCH et Cie, S. à r. l.

VIBRAYE (Sarthe).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Trudaine 92-52.)

## FANTOL

**Composition.** — Association de : Chlorure de magnésium, Chlorure de sodium, Bicarbonate de soude, Sulfate de soude (d'après la formule du professeur Nobécourt, *Journal des Praticiens*, 23 avril 1931).  
Présenté sous forme de granulé stable, de goût agréable, très bien accepté par les enfants.

**Indications.** — *Insuffisance du foie chez les enfants.* Vomissements, Inappétence, Constipation, Ictère, Érythèmes, Eczéma, Ecthyma, etc.

**Mode d'emploi.** — Jusqu'à 6 mois : 1/2 à 1 cuillerée à café.

6 mois à 3 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Au-dessus de 3 ans : 3 cuillerées à café.

Dans de l'eau, du lait, ou à croquer, 10 jours par mois.

*Adultes* : 1 cuillerée à bouche.

### Laboratoires du FANTOL

Directeur scientifique : Dr Paul SOURIGUÈRE  
22, rue de l'Arsenal — ANGOULÈME

## FARINE MALTÉE DÉJARDIN

à 5 % d'extrait de levure.

**Composition.** — Association d'extrait de levure (riche en phosphore, en vitamines B), de farines de céréales et d'extrait de malt français Déjardin.

**Propriétés.** — Très digestible par ses diastases. Aliment de la première enfance, riche en *acides aminés*, *Vitamines B naturelles* et en *sels minéraux assimilables*. Donne après cuisson une bouillie demi-fluide, grâce au maltage partiel.

Une cuillerée à soupe de farine maltée pèse 10 gr. et contient les principes actifs de 1 gr. 5 de levure fraîche.

**Indications.** — *Nourrissons* : Dès le 3<sup>e</sup> mois, couper le lait de l'enfant avec la décoction suivante cuite doucement une demi-heure :

*Farine maltée Déjardin* : 15 gr. ; eau 500 gr.

Au 6<sup>e</sup> mois, remplacer un biberon par la bouillie suivante :  
*Farine maltée Déjardin* : 1 cuillerée à soupe ; lait, 60 gr. ; eau, 100 gr.

*Adultes* : Aliment des colites accompagnées de putréfactions.

La boîte de 250 gr. **Prix** : 9 fr.

**Établissements DÉJARDIN**

A. BOUTROUX, Pharmacien.

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## FARINE MALTÉE VIAL

### Autodigestive.

**Composition.** — Aliment de premier ordre, riche en éléments azotés et en phosphates naturels assimilables.

**Formule.** — Composition centésimale en poids :

Farine de riz.....	49 gr. 5
Farine de malt .....	6 gr. 5
Farine de maïs .....	6 gr. 5
Poudre de cacao.....	3 gr. 9
Sucre de canne.....	35 gr. 6
Vaniline .....	0 gr. 95

**Propriétés.** — Les principes nutritifs des différentes farines entrant dans la composition de la Farine Maltée Vial ayant été rendus solubles pendant la préparation, cet aliment se digère de lui-même sans fatigue pour l'estomac.

**Indications.** — Sa facile digestibilité permet de le donner en bouillie aux enfants très jeunes. Elle est également utile pour les sujets présentant des troubles de la digestion et les convalescents.

**Dose.** — Pour les enfants, la proportion pour une bouillie est de 1 cuillerée à bouche de farine pour 5 à 6 cuillerées de lait ou d'eau. Pour les adultes, délayer la quantité de farine suivant la consistance désirée pour le repas.

**Prix** : 11 fr. 30 la boîte de 250 gr. environ.

### Laboratoires GRIMAULT

Fondés en 1856.

51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Bal. 20-70.)

## FARINE MONT-BLANC

**Caractéristiques et avantages.** — Extraite des meilleurs blés durs de France, transformée en biscottes par une double cuisson au four électrique, la FARINE MONT-BLANC n'est pas lactée, mais simplement légèrement diastasée et sucrée.

Sous l'influence de la chaleur humide et par l'addition d'extrait de malt au moment du pétrissage, les ferments transforment l'amidon du blé en une pâte diastasée et dextrinée très digestible. Un grillage et un blutage consécutifs permettent de la présenter sous la forme d'une poudre impalpable. Grâce à ces différentes opérations, conduites scientifiquement, et au moyen d'un outillage moderne, la FARINE MONT-BLANC acquiert une saveur biscuitée agréable, très appréciée des enfants.

**Principales indications.** — Chez les *nourrissons normaux*, la FARINE MONT-BLANC constitue, dans l'alimentation naturelle, mixte ou artificielle, le complément physiologique du lait dès le septième mois, et même plus tôt, à la condition d'être prescrite par le médecin.

Dans les *cas pathologiques* : débilité congénitale, atrophie, troubles gastro-intestinaux, intolérance lactée, la FARINE MONT-BLANC peut être conseillée dès les premiers mois de la vie comme aliment d'exception ou comme complément de régime ; elle sera alors associée au lait écrémé, au babeurre, au bouillon de légumes ou même à l'eau.

**Posologie et mode d'emploi.** — La FARINE MONT-BLANC s'emploie sensiblement aux mêmes doses et de la même façon que les autres farines utilisées à l'époque du sevrage. (Consulter le tableau figurant sur l'étiquette de boîtes.)

**Vente.** — Pharmacies, herboristeries, maisons d'alimentation et de régime, en boîtes de 375 grammes et 1 kilo nets.

Littérature et prix sur demande.

**COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT**  
RUMILLY (Haute-Savoie).

## FARINE NESTLÉ SANS LAIT

*Pour confection de décoctions farineuses et de bouillies.*  
Farine de blé rôtie et légèrement dextrinée, sans addition de lait ni de sucre.

*Décoction :* à préparer en une fois pour la journée (5 gr. de farine par jour et par mois d'âge), destinée à remplacer l'eau bouillie dans la préparation des biberons de lait concentré sucré, lait en poudre et lait ordinaire, dès les premières semaines. Facilite la digestion, favorise la croissance, prépare le tube digestif à mieux assimiler plus tard les bouillies.

*Bouillies :* à préparer soit sans lait, avec addition de légumes, soit avec lait (lait concentré sucré, en poudre ou ordinaire — mais mieux vaut alors recourir à la Farine lactée Nestlé, fabriquée tout exprès dans ce but).

Vente réglementée.

Prix : la boîte de 365 gr. : au cours.

**Société NESTLÉ**

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

## FARINES FAVRICHON

Les Établissements FAVRICHON continuent la fabrication de leurs trois principales spécialités :

### PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

**Indications.** — Alimentation des enfants. Plus spécialement : rachitisme, retard à l'ossification. Femmes enceintes et nourrices (contre la déphosphatation). Surmenés et convalescents.

### CÉRÉALES BÉBÉ

**Indications.** — Tous les cas de constipation infantile à partir de 6 mois. Les donner en remplacement de toute autre bouillie, car les CÉRÉALES BÉBÉ sont une farine de croissance de premier ordre.

### GRAINS GRILLÉS

**Indications.** — Alimentation légère : dyspepsie, gastralgie, entérite. Les Établissements FAVRICHON continuent aussi la fabrication, en quantité limitée, de crèmes et farines d'orge, maïs, riz, avoine et de flocons d'avoine. Toutes ces fabrications sont soumises au rationnement : le PHOSPHOGÈNE et les CÉRÉALES BÉBÉ sont réservés aux consommateurs des catégories E. Les soupes de grains grillés et les crèmes, farines et flocons, sont destinés, au contraire, aux consommateurs de toutes catégories.

**Produits diététiques J. FAVRICHON**  
Pharmacien-Chimiste  
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

## FARINES HEUDEBERT

pour les enfants et le régime

### Crèmes de Céréales :

**Farines maltées** (premières semaines du sevrage et périodes de troubles digestifs), Velouté Heudebert malté, Arrow-root maltée, Crèmes d'orge, d'avoine, de riz, maltées.

### Farines naturelles :

**Normales** : Crème de froment grillé, d'une digestibilité totale, Velouté Heudebert, Farine lactée, Crème de maïs.

**Rafraîchissantes** : Crèmes d'avoine, de seigle, de sarrasin, d'orge.

**Antidiarrhéiques** : Crème de riz, arrow-root.

**Farines de légumineuses.** — Farines de pois, haricots, lentilles, soja.

**Farines de fruits.** — Farine de châtaigne.

**Flocons.** — D'avoine, d'orge, de riz.

Ces différents produits, du fait de leur préparation spéciale, contiennent tous les éléments utiles de la graine et sont d'une très grande digestibilité.

**Indications.** — Sevrage, alimentation des enfants, des dyspeptiques, des entériques.

### Produits de régime HEUDEBERT

85, rue de Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

2 et 4, chemin Feuillat — LYON (Rhône).

## FÉCULYSE

**Composition.** — Diastases de céréales associées à une protéine alimentaire neutralisant l'acidité stomacale en excès.

**Principe.** — 1° Assurer la transformation des hydrates de carbone en supplément, par l'action des diastases, à la déficience partielle ou totale du ferment salivaire.

2° Permettre aux diastases d'agir dans les meilleures conditions en les protégeant contre l'acidité du milieu stomacal.

**Indications.** — La Féculyse donne une boisson digestive constituant la base du régime d'accompagnement dans les cas de dyspepsie des hydrates de carbone, hyperchlorhydrie, flatulence, fermentations. Utile à adjoindre également aux régimes riches en hydrates de carbone (albuminuriques, hépatiques, suralimentation), et à celui des personnes dont la dentition défectueuse ne permet pas une mastication suffisante.

**Mode d'emploi.** — Se prend dans un liquide froid ou chaud (50° environ), tel que café, lait, infusion, ou simplement eau.

**Doses.** — La Féculyse ne présente aucune contre-indication, les doses indiquées constituant des moyennes pouvant être dépassées sans inconvénient.

**Adultes** : Au petit déjeuner et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à soupe.

**Dans les cas d'hyperchlorhydrie** : prendre une cuillerée à dessert avant et après chaque repas et au moment des crises.

**Enfants** : Le matin et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à café ou plus selon l'indication du médecin.

### Produits de régime HEUDEBERT

85, rue de Saint-Germain, NANTERRE (Seine)

2 et 4, chemin Feuillat, LYON (Rhône).

## FÉLAMINE

Association d'acide cholique pur, décholestériné et dépigmenté, et d'hexaméthylène-tétramine.

*Fabrication provisoirement suspendue.*

## PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## FÉLISÉDINE

Médication synergique complète, à la fois régulatrice et sédatrice, des Dystonies du Sympathique et des Insomnies.

### Formule :

Extrait de Cratægus .....	0,05
Chlorhydrate de Papavérine .....	0,01
Phényléthylmalonylurée .....	0,015
Bromhydrate de Quinine .....	0,02
Extrait de Boldo .....	0,01
Extrait d'Anémone .....	0,03
Extrait de Valériane stabilisée .....	0,05
par comprimé.	

**Indications.** — Nervosisme, Emotivité, Etats anxieux, Psychasthénie, Surmenage, Troubles cardiaques, Palpitations, Tachycardie, Troubles de la Ménopause, Insomnies.

### Posologie :

1° Comme équilibrant du système nerveux : 3 à 6 comprimés par jour.

2° Contre l'insomnie : 3 à 4 comprimés le soir.  
L'étui de 30 comprimés : 21 francs.  
L'étui de 140 comprimés : 70 fr. 40.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ  
RENNES

## FÉMIDIOL

**Phytothérapie gynécologique.**

**Deux formes.** — Injections et ovules.

**Avantages.** — Antiseptique, décongestionnant non caustique, non toxique, ne tache pas.

**Indications.** — *Toutes affections gynécologiques* nécessitant un traitement local antiseptique, décongestionnant et sédatif.

**Posologie.** — 1 ovule le soir au coucher et une injection le lendemain (LX gouttes dans 2 litres d'eau bouillie).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-2.

**Laboratoires ROBIA**

LILLE.

## FÉMINADÈNE

**Deux formes :**

1° Féminadène (dragées).

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phényléthylmalonylurée.

**Indications.** — Nervosité féminine dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale. Anxiété, Émotivité, Dépression, Subagitation, Insomnies, etc... Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches. Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

**Doses.** — 4 dragées par jour en moyenne. La boîte de vente contient un traitement de 3 semaines environ.

Prix de la boîte : 27 fr. 40.

2° Féminadène (gouttes).

Extrait ovarien total, activité maxima par voie buccale.

**Indications.** — Toutes celles de la déficience partielle ou totale de la sécrétion ovarienne.

**Doses.** — Dose moyenne de début : VI gouttes trois fois par jour, loin des repas ; augmenter ou diminuer suivant les effets. La boîte de vente contient un traitement de 25 jours environ.

Prix de la boîte : 37 fr. 50.

**Laboratoires du FÉMINADÈNE**

1 bis, rue Carcel — PARIS (XV°).

## FENUCALCIUM

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Hémoglobine, Phytosphosphine, Protosalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhénal, 0,015, Poudre de Fenugrec.

**Indications.** — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, États pré-tuberculeux.

**Posologie.** — Un cachet au début des trois repas. Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-4.

**Laboratoire HOCQUETTE**

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III°).

(Tél. : Arc. 47-13.)

## FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécitine, calcium, fer et manganèse organiques.

**Propriétés.** — Stimulant puissant de l'appétit. Agent d'augmentation de poids. Producteur d'énergie et de forces.

**Indications.** — Tous les cas d'amaigrissement : maigre habituel, amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, amaigrissement chez les nerveux, stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

**Mode d'emploi.** — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'elixir.

**Dose journalière moyenne :** 4 cachets ou dragées pour les adultes ; Elixir : 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants, 2 cuillerées à soupe pour adultes. Granulé : 2 à 4 cuillerées à café pour les enfants.

Boîte de 36 cachets.

Tube de 50 dragées. — Elixir. — Granulés.

Enreg. au L. N. C. M. sous les numéros : Cachets, 590-6. Dragées, 590-5. Granulés, 590-4. Elixir, 590-17.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS. (Tél. : Archives 44-59.)



## FENUROBUR

**Cachets et granulé.**

Puissant agent de l'augmentation du poids, excitomoteur et reconstituant.

### Formule :

Fénugrec désodorisé.....	0,90
Poudre de rats.....	0,014
Poudre de surrénale.....	0,002
Oxyde de magnésium.....	0,083
Pour 1 cachet n° 50 ou 10 gr. de granulé.	

**Mode d'emploi.** — 3 à 6 cachets par jour au milieu des repas.

**Granulé :** 3 cuillerées à café par 24 heures pour les enfants, 3 cuillerées à soupe par 24 heures pour les adultes.

**Amalgrissement, Convalescences, Asthénies, Croissance.**

**Prix :** 24 fr. 75 la boîte de 50 cachets.  
23 francs le flacon de granulé.

Durée moyenne de la boîte vente : 15 jours.

Échantillons et littératures :

**Laboratoire ABARNOU**

72, avenue Thiers — LE MANS.

(Tél. : 15-56.)

## FER-ANDRINE VITALIS



**Dragées.**

### Composition :

Poudre Orchitique.....	0,05
Protosalate de Fer.....	0,02
Peroxyde de Manganèse.....	0,02
Extrait Hypophysaire lobe antér..	0,01
Poudre de Cascara Sagrada.....	0,002
pour 1 dragée.	

**Indications.** — Chez l'Homme: Impuissance, Infantilisisme.

Chez la Femme: États de carence sexuelle, Troubles liés à la continence.

Chez l'Enfant et l'Adolescent: Troubles de la Puberté et de l'Adolescence, Paresse intellectuelle.

**Posologie.** — Pro die: Adultes: 4 à 5 dragées.  
Adolescents: 3 à 4 dragées.  
Enfants: 2 à 3 dragées.

Enreg. au L. N. C. n° 27-8.

Prix : 19 fr. 50 l'étui de 40 dragées.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, pharmaciens,  
Docteur en pharmacie.

## FER BRAVAIS

**Formule.** — Ions de Fer catalysés actifs.

**Composition.** — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 1 000 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang) ; donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

**Indications.** — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences: Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

**Dose.** — X à XX gouttes (1 goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée. Vingt gouttes de Fer Bravais contiennent 3 centigr. de Fer et ½ milligr. de Manganèse.

**Examen du sang  
avant et après le traitement  
par le Fer Bravais.**

(Moyenne de très nombreux cas.)

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminution.
Globules rouges.	3.500.000	4.500.000	30 %	
Globules bl ..	7.150	6.500		10 %
Hémoglobine..	60 %	85 %	40 %	

Prix : 29 francs le flacon pour un mois.

20 francs le 1/2 flacon pour 15 jours.

**Laboratoires René de GRAUWE,**



**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

## FER-HÉPACRINE

**Composition.** — Extrait hépatique, chlorure ferreux, gluconate de cuivre, acide et amide nicotinique (facteur P.-P.).

**Indications.** — Toutes les anémies secondaires, les états d'hypovitaminoses et leurs complications cutanées, circulatoires ou digestives, l'insuffisance hépatique, toxique ou infectieuse, l'insuffisance alimentaire, les troubles d'assimilation.

**Posologie.** — 2 à 4 ou 6 dragées par jour, au cours de la journée.

**Présentation.** — Le tube de 40 dragées : 28 fr. 80.

**Laboratoires du Docteur F. DEBAT**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## FER INTRAVEINEUX FRAISSE

**Composition :**

Cacodylate de fer.....	0 gr. 01
Lactate de Cuivre.....	0 gr. 001
Cacodylate de Soude.....	0 gr. 02
Solution Isotonique .....	5 cc.

**Indications.** — Anémies graves, symptomatiques ou post-opératoires.

**Forme.** — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

Injecter dans la veine le contenu d'une ampoule tous les 2 jours.

**Prix :** boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 22 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-13.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**  
**Pharmaciens**

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## « FERMENT DEP »

Ferments lactiques garantissant  
à l'ÉTAT DE VIE LATENTE

**Troubles intestinaux :** Cachets.  
Comprimés.  
Ampoules.  
Poudre insoluble.

**Plaies :** Poudre insoluble.  
Ampoules.

**Gynécologie :** Ovules.  
Poudre insoluble.

**G. JIOFFREDY, Pharmacien**

13, rue Florestine — MONACO.

(Tél. : 017-18.)

## FERMENTÉRYL

(Boîte de 50 comprimés.)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Comprimés à base de :  
1<sup>o</sup> Ferments (ferments lactiques, entérokinase, levure de bière) ;  
2<sup>o</sup> Extrait végétal (bardane stabilisée) ;  
3<sup>o</sup> Médicaments chimiques antiseptiques et anti-infectieux (bi-oxyde d'étain, orthoxyquinoléine, paraminophényl sulfamide).

**Propriétés.** — Dépuratif, régulateur de la leucocytose, antiseptique bactéricide et antitoxique à titre préventif et curatif.

**Indications.** — Intoxications intestinales. Troubles généraux d'origine digestive ou infectieuse, asthénie, colibacillose. Maladies cutanées (furunculose, urticaire, érysipèle, etc.). Maladies d'origine microbienne (pneumonie, fièvre puerpérale, grippe infectieuse, cachexie, etc.). Maladies des voies urinaires. Plaies infectées.

**Mode d'emploi.** — 6 à 9 comprimés par jour (2 à 3 au début de chacun des repas. Pour les enfants 2 à 5 comprimés par jour).

**Prescription.** — 1 boîte de comprimés *Fermentéryl*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Pharmacien licencié ès sciences ex-interne lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 18-26.)

## FEROPOSSÉINE = OPOSSÉINE FERRO-ARSÉNIÉE

Une seule forme : cachets.

**Formule.** — Formule OPOSSÉINE + synergie Ferro-Arsénée. Propriétés sthéniques et anti-anémiques (Fer : 0 gr. 20 ; Arrhénal : 0 gr. 01 pour 1 cachet).

**Indications.** — Toutes celles de l'OPOSSÉINE et plus spécialement : Déficiences organiques ou endocriniennes avec Anémie prononcée, Amaigrissement, Inappétence.

**Contre-indications.** — Malades suspects de tuberculose ou sujets aux hémoptysies, auxquels la forme OPOSSÉINE normale convient mieux.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 cachets par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cachets par jour.

A prendre immédiatement avant ou après les repas et par périodes alternées de traitement et de repos (par exemple, sauf avis du médecin : traitement de 15 à 20 jours par mois, se reposer et reprendre le mois suivant).

Prix : 29 fr. 50 toutes taxes comprises.

Ar. 2099-6/2/42.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-10.

**Laboratoires OPOS-TOULOUSE**

HOMPS, Pharmacien,

13 et 13 bis, rue Matablau.

(Tél. : 253-97.)

## FER-OVARINE VITALIS

**Pilules.**

**Composition :**

Poudre d'Ovaires.....	0,02
Protoxalate de Fer.....	0,04
Peroxyde de Manganèse.....	0,02
Phénédine.....	0,02
Extrait d'Armoise.....	0,01
Folliculine.....	25 U. I.
pour 1 pilule.	

**Indications.** — Tous les troubles liés à l'insuffisance ovarienne : troubles de la puberté et de la ménopause (dysménorrhée, aménorrhée, etc.). Anémies liées à un état ovarien.

**Posologie.** — 2 pilules avant les 2 principaux repas 20 jours par mois.

Enreg. au L. N. C. n° 27-7.

Prix : 19 fr. 50 la boîte de 40 pilules.

**Laboratoires DESCAURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS (XI°).

(Tél. : Roq. 49-22.)

DESCAURAUX et Fils, pharmaciens,  
Docteur en pharmacie.

## FERROCRINOL NOËL

Chimio-opothérapie de la vie génitale chez la femme.

**Composition :**

Poudre d'ovaires.....	0,01
Bromure de potassium.....	0,02
Diméthylxyquinizine.....	0,02
Lactate double de fer et manganèse.....	0,05
Rhubarbe de Chine pulv.....	0,03
Jusquiame (feuilles) pulv.....	0,02
Gossypium herbaceum pulv.....	0,05
Viburnum prunifolium pulv.....	0,03

Pour 1 cachet.

**Indications.** — Retards à l'établissement de la puberté, Chloro-anémie des jeunes filles, États prébacillaires, Anémie après l'accouchement et l'allaitement, Hypoménorrhées avec dysménorrhées, Troubles de la ménopause.

**Forme.** — Cachets.

**Posologie.** — 2 à 4 cachets par jour avant les repas pendant 10 à 20 jours avant la date probable des prochaines règles.

Prix : 24 fr. 15 la boîte de 20 cachets.

**Laboratoires NOËL**

24, rue Saint-Augustin — PARIS.

## FERRO-HÉPATINE

Traitement de l'anémie et des déficiences organiques de toute origine.

**Formule.** — Extrait hépatique glyciné, Plasma musculaire à l'hémoglobine, Autolysat de levure de bière, Acide phosphorique, Phosphate bicalcique, Sulfate de manganèse, Sulfate de fer pur, Glycérophosphate de fer, Arséniate de soude, Extrait fluide P. E. de Rhamnus frangula.

**Propriétés.** — Stimule toutes les fonctions vitales. Hématopoïétique, favorise la multiplication des globules rouges.

Augmente le pouvoir oxydant du sang.

Tonique nervin et antisthénique.

**Indications.** — Anémie sous toutes ses formes, Chlorose, Asthénie, Convalescences, Grossesse, Surmenage physique ou intellectuel, Neurasthénie, Amaigrissement, Prétuberculose.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dilué dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

*Enfants* : suivant l'âge, une demi-cuillerée à café deux à trois fois par jour dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

**Laboratoires FOURNIER et Cie**

DIJON

J. LE LOUS, pharmacien.

## FERROPHYTINE

OIBA

MÉDICATION PHOSPHO-MARTIALE

Sel ferrique neutre colloïdal de l'acide inosito-hexaphosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments associés en une combinaison très assimilable.

Stimulant de l'hématopoïèse et de la nutrition.

Médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Parfaite tolérance.

**Indications.** — Toutes affections déglobulisantes. Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées de café de granulé.

**Formuler.** — Boîte de 30 cachets.

Flacon de granulé.

**Laboratoires OIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## FESTALE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Ferments pancréatiques (amylase, lipase, trypsine), extraits biliaires et hémicellulase (ferment possédant la propriété de transformer la cellulose).

**Propriétés et indications.** — Préparation stable pour le traitement des troubles digestifs liés à l'insuffisance pancréatique.

Dyspepsie, Flatulences, Pancréatites et Gastro-entérites chroniques. Pour l'élimination des gaz avant les radiographies.

**Posologie.** — Absorber sans la croquer 1 dragée après chacun des trois repas. Lorsqu'on cherche à obtenir l'élimination des gaz intestinaux, cette dose doit être prescrite durant les 3 ou 4 jours qui précèdent la radiographie.

**Présentation.** — Flacons de 20 et 50 dragées.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## FILHOSA

Pâte escharotique de FILHOS

Traitement de la métrite endocervicale.

Pâte homogène non grasse ayant toutes les propriétés déshydratantes du caustique de Filhos (chaux vive : 1 ; potasse caustique : 5).

Facile à manier et de conservation indéfinie.

Guérit les endocervicités chroniques les plus rebelles.

Evite la sténose consécutive à la cautérisation au crayon comme celle produite par un fragment détaché et abandonné dans la cavité cervicale.

Permet à la malade de continuer ses occupations.

Seul traitement local indiqué après les applications :

injections vaginales avec les comprimés de GYNOSTER

et application quotidienne d'un FILHOSOVULE

Enregistrés au L. N. C. M.

**Laboratoires Robert COLAS, Doct<sup>r</sup> en Ph<sup>1</sup>.**

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

## FIXASE

### Reminéralisateur effectif.

**Présentation.** — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

**Composition.** — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice sous forme utilisable.

**Posologie.** — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

**Indications.** — Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.

**Prix** : 17 fr. 30. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

## FIXASE IRRADIÉE

(Fixase + Vitamine D cristallisée.)

Titrée à 1000 unités internationales par cuillerée à café de poudre.

Même posologie que la FIXASE.

**Prix** : 24 fr. 60.

(Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les nos 342-1 et 3.

Laboratoire PARET

28, rue Guibal — MARSEILLE.

## FLAVEX

Biosymplex lutéinique total.

Actif par voie buccale.

**Composition.** — Extrait total de corps jaune (pro-cédé Biosymplex). 1 cc. de solution hydro-alcoolique (45 gouttes) correspond à 0 gr. 30 de glande.

**Mode d'action.** — En apportant les hormones lutéiniques déficientes, en stimulant la fonction lutéogène, *Flavex* rétablit l'équilibre lutéo-folliculinique. C'est la médication par excellence de l'hyperfolliculinie et des troubles de la gestation d'origine hormonale.

**Avantages.** — *Flavex* est une médication curative, rééducatrice de l'ovaire, active par voie buccale, à faibles doses, donc économique et de prescription facile.

**Indications.** — Syndrome hyperfolliculinique et ses conséquences : règles de quinzaine ; règles surabondantes, insuffisantes ou absentes ; congestion mammaire, mastodynie ; nervosisme, etc. Fibromatose utérine. Stérilité et avortements à répétition d'origine hormonale (Devraigne, Seguy). Méno-métrorragies de la puberté et de la ménopause. Ovarite scléro-kystique. Troubles généraux de la ménopause et de la castration.

**Posologie.** — 15 à 50 gouttes par jour, en 2 prises pendant la seconde moitié du cycle. Absorber les gouttes 1/2 heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre qu'on laissera fondre lentement dans la bouche.

Recourir aux doses faibles (15 à 30 gouttes comme médication stimulante, aux doses fortes dans les manifestations hyperfolliculiniques ou ménopausiques marquées, les mastodynies.

En cas d'hémorragie utérine, associer *Flavex* (50 gouttes par jour) et *Frénovex* (1 à 6 cuillerées à café par jour) suivant l'intensité des pertes. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-13.

**Prix** : Le flacon 29 fr.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Alésia 28-51.)

## FLÉTAGEX

Pommade biologique vitaminée.

**Composition.** — *Huiles de foie de flétan et de morue, incorporées à un excipient n'altérant pas les vitamines.*

**Trois actions thérapeutiques :** 1° cicatrisante ; 2° antialgique ; 3° anti-infectieuse.

**Indications.** — *Plaies atones, Escarres de décubitus, Brûlures, Engelures, Ulcères variqueux.*

**Emploi.** — Étendre FLÉTAGEX en couche épaisse. Recouvrir d'un pansement stérile. Bander.

Prix : 16 fr. 80 le tube.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1 731-4.

### Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Docteur en Pharmacie,  
CHATEAUROUX (Indre).

## FLÉTASE

Succédané de l'Huile de Foie de Morue particulièrement riche en Vitamine A. Huile de Foie de poisson raffinée, présentée sous forme de solution huileuse (25.000 unités intern. de Vit. A par cm<sup>3</sup>).

### Indications :

**Enfants :** Croissance retardée ou insuffisante. Troubles digestifs, anorexie, états ganglionnaires, infections chroniques du rhino-pharynx et des bronches.

**Adultes :** Convalescences, Grossesse, Anémie.

**Présentation et Posologie.** — Flacons de 10 cm<sup>3</sup>.

**Enfants** au-dessous de 5 ans : I à V gouttes par jour.

**Enfants** à partir de 5 ans : V à X gouttes par jour.

**Adultes :** X à XX gouttes par jour.

Prix de vente :

Le flacon : 16 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## FLÉTOBIOL

### Composition :

Complexe : d'huile de foie de flétan (vitamines A et D), biologiquement activée par un apport de vitamine D naturelle ; d'extrait de malt (vitamine B) ; de jus d'orange et de citron concentrés (vitamine C).

Vitamine A, minimum 500 U. I. par cc.

Vitamine D, minimum 100 U. I. par cc.

Reconstituant complet.

### Posologie :

**Enfants :** de 1 à 3 ans : 1 cuillerée à café par jour ; de 3 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; ensuite : 1 ou 2 cuillerées à dessert par jour.

**Adultes :** 2 à 3 cuillerées à dessert ou à soupe par jour.

Enregistré au L. N. C. M., n° 442-7.

### Laboratoire du FLÉTOBIOL

Établissements DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 84-40.)

## FLETONIC

### Tonique. Reconstituant.

D'un goût agréable, accessible aux estomacs les plus délicats.

A base d'huile de Flétan (vitamines A et D), Extrait de Malt, Vitamines B et sels minéraux en combinaison organique ; Ph, Ca, Mg et lécithines végétales.

**Indications.** — Rachitisme. Troubles de la Croissance. Décalcification (caries dentaires). Surmenage physique et intellectuel.

**Posologie.** — 2 à 5 ans : 1/2 cuillerée à 1 cuillerée à café ; 5 à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café ; au-dessus de 10 ans et adultes : 1 à 3 cuillerées à dessert par jour et prendre avant les repas.

Prix : 19 fr. 45.

### Laboratoires UNIS-SPÉS

14, rue Demarquay — PARIS.

(Tél. : Nord 71-64.)

## FLÉTOPHOS

Calcium. Phosphore + Vitamines A et D.

**Composition.** — Gluconate et Glycérophosphate de Chaux, Phosphate de Magnésie, Arrhénal. Par comprimé : vitamine A, 400 unités inter. Vitamine D, 100 unités inter. Les vitamines A et D sont apportées par l'huile de Foie de Flétan.

**Indications.** — Carences calciques, déséquilibre calcium-phosphore. Toutes carences vitaminiques, troubles de la croissance et de la dentition, décalcification, rachitisme. Grossesse, allaitement.

**Forme.** — Comprimés sucrés à croquer, parfumés mandarine.

### Posologie :

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

*Adolescents, Adultes* : 4 comprimés par jour.

*Femmes enceintes et nourrices* : 8 comprimés par jour.

**Prix** : la boîte de 60 comprimés..... 20 fr. 20

**C. ROUX, Docteur en pharmacie,**  
60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).  
(Tél. : Alésia 12-55.)

## FLOCULYSINE VALTRY SIMPLE

### Biophylaxie des états allergiques.

La *Floculysine Valtry* est un traitement biophylactique de toutes les manifestations allergiques utilisant une synergie micro-pluriglandulaire associée à la sérothérapie totale de jeunes tau-reux.

**Forme.** — Dragées.

**Action.** — Action catalysante de la synergie micro-pluriglandulaire sur les protéines du sérum de jeunes bovidés.

**Indications.** — La *Floculysine* a son emploi dans tous les cas où l'**ANAPHYLAXIE** s'accompagne d'intoxication, d'hyperuricémie, de vagotonie ou de déséquilibre endocrinien et humoral, et dans les principales manifestations suivantes :

**Phénomènes allergiques d'ordre intestinal :** Gastropathies allergiques. Entérite muco-membraneuse, colique vésiculaire ; Constipation. Diarrhée, intolérances digestives. Colite muqueuse.

**Phénomènes allergiques d'ordre nerveux :** Migraine. Déséquilibre vago-sympathique. Certain mal comital.

**Phénomènes allergiques d'ordre cutané :** Eczéma, Prurits, Urticaire, Eruptions médicamenteuses et toxico-alimentaires, Eruptions observées au cours de traitements spécifiques, Ictères anaphylactiques.

**Phénomènes allergiques d'ordre circulatoire :** Troubles cardio-vasculaires. Troubles veineux. Certaines hypertension. Douleurs angineuses. Bradycardies et tachycardies liées au déséquilibre sympathique.

**Phénomènes allergiques d'ordre respiratoire :** Syndrome asthmatique. Emphysème post-asthmatique.

**Phénomènes allergiques d'ordre endocrinien :** Troubles endocriniens, et, en particulier, puberté retardée, troubles menstruels et de la ménopause. Obésité.

**Symptômes généraux diathésiques :** Arthritisme, HÉPATISME, Goutte. ➔

**Travaux scientifiques :**

*Essai dans le traitement des états dits arthritiques d'une association sérothérapique et opothérapique, par le D<sup>r</sup> J. Saillant. (Thèse Paris).*

*Essai d'une association sérothérapique et opothérapique dans les manifestations anaphylactiques du chien et du chat, D<sup>r</sup> Lebreton. (Thèse Alfort).*

*Réflexions sur l'eczéma et son traitement oposérothérapique per os, D<sup>r</sup> Marceron.*

*Allergie cutanée et uricémie, D<sup>r</sup> Marceron.*

*Biophylaxie et instabilité humorale, par le D<sup>r</sup> Marceron.*

**Posologie :**

8 dragées par jour à prendre au moins une heure avant les repas.

**Prix du traitement :**

le grand tube : 25 francs ;

le petit tube, 19 francs.

**Laboratoire Biologique VALTRY**

122, avenue des Champs-Élysées — PARIS.

## FLOCLYSINE INFANTILE VALTRY

Traitement biophylactique de tous les états anaphylactoides et des crises anaphylactiques du nourrisson et de l'enfant en bas âge.

**Forme.** — Granulés.

**Composition :**

1<sup>o</sup> Sérothérapie totale de jeune taureau.

2<sup>o</sup> Opothérapie hépato-spléno-rénale.

3<sup>o</sup> Synergie micro-endocrinienne.

**Indications :**

*Troubles respiratoires :* Asthme infantile, rhume des foies.

*Troubles cutanés :* Eczéma des nourrissons, prurits, dermites médicamenteuses.

*Troubles digestifs :* Éruptions toxi-alimentaires, Intolérance lactée, Diarrhée, Gastropathies allergiques.

*Symptômes généraux :* Arthritisme, Hépatisme.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour, à prendre au moins une heure avant les repas.

**Prix :** 16 francs.

**Laboratoire Biologique VALTRY**

122, avenue des Champs-Élysées. — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

## FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

**Composition.** — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

**Indications.** — États d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

**Deux formes.**

**Solution.** — 1 à 4 verres à madère par jour : Grises aiguës ; 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à la cessation de la douleur.

*Enfants :* 1/2 dose.

**Prix :** 20 francs le flacon de 500 cc.

**Gouttes.** — *Adultes :* XXX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un demi-verre d'eau pure ou minérale.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : III gouttes 2 fois par jour et par année d'âge.

**Prix :** 20 fr. 70.

**Laboratoire RICHER,** Docteur en Pharmacie  
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS  
(Tél. : Provence 34-87.)

## FLORIX

**Comprimés effervescents.**

**Présentation.** — En boîte métal de 20 comprimés (13 fr. 05).

**Principes actifs.** — Soluté officinal de formal-déhyde, Peroxyde de magnésium, Sulfate de zinc, Amidon, Sulfate d'alumine et de potasse.

**Indications.** — Leucorrhées (pertes blanches), Métrites, Soins d'hygiène intime de la femme.

**Mode d'emploi.** — 1 comprimé pour 2 litres d'eau chaude pour injections vaginales, 1/2 comprimé pour un litre.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-22.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)



## FLUASE

(Gouttes.)

**Composition.** — Extrait fluide d'Hamamelis, d'Hydrastis, de *Cimicifuga racemosa*, de Marron d'Inde stabilisé, Teinture de noix vomique.

**Mode d'action.** — Tonique et stimulante par sa Noix Vomique, Vaso-constrictrice par son Hamamelis et son Hydrastis, Analgésiante par son Marron d'Inde et son *Cimicifuga*, qui est en même temps un bon tonique cardiaque.

**Indications thérapeutiques.** — Stases sanguines, Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause et de la puberté, Ménorragies, Métorragies, Dysménorrhées, Aménorrhées, Douleurs utérines, Métrites.

**Doses et mode d'emploi.** — XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin sucrés avant les principaux repas. Dans les états aigus, augmenter les doses jusqu'à XXX gouttes trois fois par jour.

Prix du flacon pour un mois et demi de traitement : 17 fr. 90

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1343-1.

Laboratoire de Pharmacologie Appliquée  
rue Frédéric-Gheveillon — ALLAUH (B.-du-R.) (Tél. 29.)

## FLUCHOLINASE

Granulé cholagogue et antianaphylactique de saveur légèrement anisée très agréable.

**Composition.** — Extrait de boldo, d'artichaut frais stabilisé, peptones polyvalentes (poisson, viande, lait, œufs), citrate de magnésie, hyposulfite de magnésium, sulfate de Mg et Na, urotropine.

**Indications.** — Affections du foie et de la vésicule biliaire, certains troubles digestifs et intestinaux, certaines dermatoses, Chocs anaphylactiques, Migraines, Urticaires.

**Prix :**

P. M. (20 cuillerées à café) : 22 francs.

G. M. (60 cuillerées à café) : 56 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. n° 1947-1.

Laboratoire TIXIER  
Saint-Quentin (Aisne).

## FLUDIOSE

à l'iodure de manganèse.

Iodure de manganèse, iodure de fer, méthylarsinate de soude, iode, tanin, lactophosphate de chaux.

Sirop à la vanille et au cacao, de goût très agréable, ne constipant pas.

Médication toni-reconstituante, puisante, énergétique, à action synergique des ions Mn-Fe et de ses divers autres éléments associés, indispensables à la croissance de l'enfant, à la formation de l'adolescent et à l'organisme adulte déficient.

### Posologie :

*Enfants* : de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour ; — de 3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour ; — de 6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

*Adolescents et adultes* : 3 cuillerées à potage par jour.

A prendre avant ou pendant les deux principaux repas.

Prix : Le flacon : 20 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 553-1.

Laboratoire de  
**MÉDECINE EXPÉRIMENTALE**  
BEAUBAIS (Oise).

## FLUOBYL

### Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

**Composition.** — Lactosérum ; Citrate de Magnésie ; Peptone de Fibrine sèche.

**Indications.** — Drainage des voies biliaires. *Maladies du foie :* Ictères ; Cholécystites ; Coliques hépatiques.

*Dyspepsies réflexes :* Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

*Maladies rénales.*

**Posologie :** 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher dix minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Suivre le traitement deux semaines par mois.

Prix : 23 fr. 70.

**Laboratoires LIOARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## FLUODYLE

### Forme : AMPOULES.

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium.....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

**Mode d'emploi.** — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 14 fr. 80.

### Forme : GRANULÉ vitaminé.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie, vitamine D.

**Doses.** — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

**Indications.** — Dérminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 14 fr. 80.

**A. EMPTOZ, Pharmacien**

**Établissements SABATIER-EMPTOZ**

10, rue René-Bazin - PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Auteuil 06-40.)

## FLUOKOL

**Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe.** Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

**Propriétés.** — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

**Indications.** — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.). Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation. Toutes intoxications.

**Doses et mode d'emploi.** — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

*Enfants :* moitié de ces doses.

Prix : 23 fr. 70 la boîte pour 10 à 15 jours de traitement.

**Laboratoires LAFFORT, Pharmacien**

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire). (Tél. : 38.)

## FLUOSALYL

**Composition.** — Association de fluorures alcalins, préparée à partir de FH et soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

**Propriétés.** — Détruit le tartre dentaire et les foyers infectieux. Modifie favorablement les sécrétions et la flore de la cavité buccale. Antiseptique puissant, il est sans action sur l'émail et ne lèse pas les tissus sains.

**Usages.** — Préviend et guérit la Pyorrhée alvéolaire. Toutes Gingivites (même médicamenteuse), Polyarthrites, sont rapidement améliorées et guéries par ce traitement. Supprime les abcès et les accidents post-opératoires.

**Formes.** — FLUOSALYL LIQUIDE, COMPRIMÉ, FLUOSALYL, FLUOSALYL PASTE.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café de FLUOSALYL LIQUIDE ou 2 comprimés dissous dans un 1/2 verre d'eau tiède, en bains de bouche fréquents, d'une durée de 5 minutes.

FLUOSALYL PASTE constitue le dentifrice anti-pyorrhéique idéal, d'une grande activité antispilulaire et d'un usage agréable.

**Laboratoire. BEAUGOURDON**

43-45, avenue Kléber — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Pas. 83-68.)

## FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

**Principes actifs.** — Sulfonate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : marron d'Inde, hamamelis, sénéçon, armoise.

**Indications.** — Troubles de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies ; hémorroïdes ; hypertension artérielle ; tendance aux néoplasies. Sénilité.

**Dose.** — XXV gouttes 3 fois par jour.

Prix : 17 fr. 50.

**Laboratoire MAUCHANT**  
à GENNEVILLIERS (Seine).  
(Tél. : Grésillons 05-21.)

## FLUXEX (Gouttes)

Médicament vaso-constricteur.

**Formule :**

Solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse au 5 p. 100, 10 gr. ; Alcoolature d'Anémone pulsatile, 5,00 ; Formiate de soude, 9,50 ; Teinture de Noix vomique, 3,50 ; Sirop, 47,00 ; Alcool 95°, 22 gr. ; Glycérine, 3,00. Pour 100 grammes.

**Indications :**

Troubles de la circulation, Troubles ovariens, Stases sanguines.

**Mode d'emploi :**

XV à XX gouttes dans un peu d'eau avant les repas.

**Laboratoires DISALQYL S. A. R. L.**  
62, rue Beaubourg — PARIS (III<sup>e</sup>).  
Prix : 14 francs.

(Tél. : Archives 38-33.)

## FLUXINE

**Composition.** — Complexe phytothérapique réalisé par la synergie : Intrait de Marron d'Inde Dausse, Alcoolature d'Anémone, Noix vomique.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire. Stimulant ovarien. Sédatif utérin.

**Indications.** — Troubles de la circulation veineuse des deux sexes, Phlébites, Varices, Hémorroïdes, Ulcères variqueux. Affections gynécologiques : Métrorragies, Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause. Règles douloureuses, certaines Névralgies, Prostatites, Engelures, etc.

**Formes.** — Gouttes, Dragées.

**Mode d'emploi.** — Une dragée = X gouttes.

**Gouttes :** X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 3 fois par jour avant les repas.

**Dragées :** 1 dragée à avaler sans mâcher 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 17 fr. 10 pour un mois de traitement.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-2.

**Laboratoires FLUXINE**

**PRODUITS BOUTHOUX**

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie  
VILLEFRANCHE (Rhône).

## FLUXIVÉNOL

Complexe organique réalisant sous une forme optimale l'action synergique de PION-IODE ; hytrotrope et lymphagogue, et d'une association phytothérapique vaso-constrictive.

*Spécifique des troubles de la circulation générale.*

**Formule.** — Hamamelis, Marron d'Inde, Jaborandi, Anémone, Cascara.

**Indications.** — Toutes les affections du système veineux, varices, hémorroïdes, engelures, varicocèle, ulcères variqueux, phlébites, crases sanguines. Tous les troubles du cycle ovarien : puberté, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragie, inflammation de l'utérus, troubles de la ménopause, hypertension artérielle, Hyposphyxie.

**Mode d'emploi.** — XX gouttes 2 fois par jour dans un peu de liquide avant les repas. On peut, dans certains cas et sur avis du médecin, augmenter cette dose.

Prix : 14 fr. 85.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## FLUXOVEINE

Gouttes.

Troubles veineux des deux sexes.

Complexe végétal, réalisé par l'association équilibrée et stabilisée d'Intrait de marrons d'Inde Dausse, de sénéçon, de condurango, de noix vomique, d'anémone, de cratégus, d'hamamelis et de passiflore.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur puissant, tonique des parois veineuses, stimulant des fonctions ovariennes, sédatif utérin, spécifique des troubles circulatoires d'origine veineuse: Varices, Hémorroïdes, Phlébites.

**Posologie.** — X à XV gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1495.

Prix de vente: 17 fr. 60.

Pour un mois de traitement.  
Littérature et échantillons.

Laboratoires Pharmacologiques de Guyenne.

E. MONSEGU, pharmacien.

PONT-DE-LA-MAYE, près Bordeaux (Gironde).

(Tél.: 32. Le Pont-de-La-Maye.)

## FOLLESTRINE GRÉMY

**Composition.** — Hormone folliculaire naturelle.

**Formes.** — Ampoules titrées à 500 Unités Internationales.

Granules titrés à 250 Unités Internationales par granule.

**Indications.** — Retards de puberté, Aménorrhées, Hypoménorrhées, Ménopause, Hypoplasie utérine, Stérilité hormonale.

**Contre-indications.** — Grossesse, Métrorragies, Ménorragies.

**Posologie.** — Pendant les 10 jours après les règles: 1 ampoule par jour ou 8 à 12 granules par jour, en plusieurs fois, à distance des repas.

Prix: Ampoules: 41 francs. — Granules: 25 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 608-67.

Laboratoires GRÉMY

J. ROY et Cie, Pharmaciens

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél.: Trinité 48-43.)

## FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

Première préparation d'hormone ovarienne active par voie buccale.

(Acad. Méd., 27 Janvier 1931.)

(Soc. belge de gyn., Février 1931.)

Activité buccale contrôlée.

**Composition.** — Solution huileuse, concentrée, d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

**Mode d'emploi.** — Trois doses par jour à intervalles de 4 heures au minimum, pendant les repas de préférence.

Traitement type d'attaque.

40 capsules à doses croissantes:

Matin, midi et soir.	{	pendant 3 jours	: 1 + 1 + 1;
		les 2 jours suivants	: 2 + 2 + 2;
		les 2 jours suivants	: 3 + 3 + 3.

(N. B. — On peut également prescrire avec de bons résultats 4 capsules par jour pendant 10 jours en 3 ou 4 prises quotidiennes espacées de 4 heures au minimum.)

Cures d'entretien.

15 à 20 capsules par mois: 1 capsule matin, midi et soir: pendant 5 à 7 jours.

**Date du traitement.** — Quand les règles existent: les capsules seront toujours absorbées dans les dix jours précédant la date présumée des règles.

Dans tous les autres cas (castration, aménorrhées): la cure sera régulière et mensuelle (première semaine du mois par exemple).

**Dysménorrhées:** Commencer 1 ou 2 jours avant le début présumé des règles et poursuivre jusqu'à cessation des troubles (6 à 9 capsules peuvent suffire).

**Indications spéciales:** Stérilité inexpliquée: Vulvovaginite gonococcique. Prurit vulvaire. Troubles nerveux menstruels, Poussée fébrile prémenstruelle des tuberculeuses, etc...

La boîte de 40 capsules pour une cure de 1, 2 ou 3 mois: 49 fr. 50.

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS. (Tél.: Anj. 37-14.)

## FOLLI-LOBINE

du D<sup>r</sup> Frayssé.

Deux formes : Pilules, Ampoules injectables.

(Voir aussi *Opothérapie* du D<sup>r</sup> Frayssé.)

Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse. Le lobe antérieur renforce l'action de la folliculine.

**Pilules.** — Gluténisées, actives par voie buccale.

**Doses :** 2 à 6 par jour, espacées dans la journée.

**Ampoules.** — 20 unités par ampoule : 10 U, Folliculine. 10 U, Lobe antérieur.

**Doses :** 1 ampoule par jour pendant 6 jours, 10 jours avant les règles.

**Indications.** — Déficiences ovariennes en général. Troubles menstruels, Puberté et Ménopause.

**Pilules.** — Un seul modèle de flacon.

**Ampoules.** — Boîte de 6 ampoules injectables de 2 cc.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> FRAYSSE et Cie**

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). (Tél. : 12-88.)

## FONDANTS DAUSSE

FONDANT DIGESTIF

Composition :

Pepsine .....	} à 0 gr. 10 par cuillerée à café.
Pancréatine .....	
Diastase .....	

**Indications thérapeutiques.** — Association destinée à combattre les digestions laborieuses causées par dyspepsie ou par hypopepsie, car il assure la bonne assimilation des hydrates de carbone et la digestion souvent défectueuse des amylacées.

**Posologie.** — 1/2 à une cuillerée à café au milieu, ou mieux, 1/2 heure après chacun des 2 principaux repas.

### FONDANT D'ÉTAÏN

Ce granulé sucré, préparé par procédé spécial, renferme par cuillerée à café 0 gr. 10 d'étain et d'oxyde d'étain.

**Indications thérapeutiques.** — Antistaphylococcique recommandé dans la furonculose et aussi préconisé contre la grippe (Seu de Rouville, Netter).

**Posologie.** — 4 à 6 doses par jour pendant 1 ou 2 semaines.

### FONDANT DE KOLA

Granulé spécial, très agréable, renfermant par cuillerée à café 0 gr. 50 d'extrait de kola stabilisée, dans lequel la caféine y figure non à l'état libre, mais sous forme de kolatine-caféine, ne produisant jamais de contracture caféinique.

**Indications thérapeutiques et Posologie.** — Toninervin et toni-musculaire énergique, qui s'emploie à la dose de 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne.

### FONDANT DE SALICAIRE

Médicament de choix, surtout chez les enfants, contre l'entérite sous toutes ses formes, se prescrit surtout dans la diarrhée infantile à la dose de :

2 cuillerées à café par jour chez le nourrisson ;  
3 à 4 cuillerées à café par jour chez l'enfant de 2 à 5 ans.

### FONDANT DE SOUFRE

Teneur en soufre colloïdial : 15 mgr. par cuillerée à café.

**Indications.** — Médicament antirhumatismal spécifique des douleurs articulaires de caractère rhumatismal ou d'origine goutteuse. — Indiqué également pour combattre les affections cutanées et celles du larynx et des bronches.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour comme traitement d'urgence ; 4 à 6 dans les cas de crise aiguë.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Turbigo 63-40.)

## FORIOD

Tétrajodophénolphtaléinate de Sodium.  
Substance opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

**Indications.** — Cholécyctographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.

### Posologie et mode d'emploi :

**Méthode des doses fractionnées** (dite de Sandström), le premier soir prendre 1 flacon de Foriod Poudre composée ; le lendemain, 1 flacon de Foriod Poudre composée en deux prises (la 1<sup>re</sup> moitié le matin, la 2<sup>e</sup> le soir). Examen radiologique le lendemain matin.

Prix de vente :

Le flacon de poudre composée : 34 francs.

Le nécessaire (pour méthode de Sandström) : 54 fr. 90.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## FORMOBENZYL

Désinfecte l'arbre bronchique, tient le cœur, calme la toux.

**Composition.** — Goménol à 20 %, camphre, orthoformate d'éthyle.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës ou subaiguës de l'appareil respiratoire. Bronchites, congestions pulmonaires actives, broncho-pneumonies et pneumonies. Complications respiratoires de la grippe et de la rougeole. Coqueluche. Toux spasmodiques.

**Ampoules huileuses.** — Adultes : 5 cc. Enfants : 3 cc. Posologie. — Injection intramusculaire : 1 ou 2 ampoules par jour.

Voie rectale : une ou deux ampoules par jour en lavement, étendues d'un volume égal d'huile d'olive. Lavement évacuateur au préalable.

**Gouttes.** — Enfants : par 24 heures : VI gouttes par année d'âge.

Dix ans : LX gouttes ; adultes : CXX gouttes.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

## FORMOCARBINE

Simple ou Naphtolée.

### Deux présentations :

#### Granulé.

Aromatisé, friable, très agréable à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

#### Comprimés-pastilles.

Sucrés, aromatisés, fondants, très agréables à croquer.

*Chaque comprimé correspond en principes médicamenteux à 1 cuillerée à café de granulé.*

Association de charbon animal ultra-divisé à la formine, avec ou sans addition de benzo-naphtol.

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

**Indications.** — Toutes affections ou infections gastro-intestinales, biliaires, urinaires.

**Posologie.** — 1, 2, 3 comprimés ou 1, 2, 3 cuillerées à café de granulé après les repas. Enfants : 1/2 dose.

Les doses peuvent être portées à 3 comprimés ou 1 cuillerée à potage de granulé, 4 à 5 fois par jour, à la fois dans les cas d'intoxications alimentaires ou pour les préparations aux examens radiologiques.

Il est à remarquer que la FORMOCARBINE Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Prix : La boîte granulé ou comprimé : 16 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. sous les n<sup>os</sup> 553-2 et 553-3.

Laboratoire de

MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

BEAUVAIS (Oise).

## FORMOCARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur activé (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

**Forme.** — Granulé rond anisé.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie, Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général toutes les manifestations anaphylactiques.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.  
*Enfants* : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge, avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 18 fr. 80.

Durée moyenne : 8 jours.

**Laboratoires E. MILLET**  
**RAMBOUILLET** (Seine-et-Oise).  
(Tél. : 30.)

## FORMULE JACQUEMAIRE N° 60

**Composition.**

Milieu magnésien associé aux Glycérophosphates de Calcium, Magnésium, Fer, Manganèse et à la Silice.

**Propriétés.** — Reconstituant cellulaire par reminéralisation polyvalente à prépondérance magnésienne. Redresse et élimine toute production cellulaire anormale. Rétablit l'équilibre acido-basique. Antiacide. Véritable aliment minéral, subvient à la carence minérale de l'alimentation.

**Indications.** — Toutes les proliférations anormales épidermiques ou des tissus profonds, verrues, papillomes, végétations, kératoses séniles ou autres ; médication adjuvante dans le traitement des tumeurs ; évite le terrain précanéreux. Troubles post-opératoires par déminéralisation. Débilisés par sub-minéralisation ou déminéralisation. Enfants débiles, malingres. Adultes surmenés et déprimés. Dermatoses diverses dues au déséquilibre du pH. Complément nutritif moderne indispensable.

**Forme.** — Cachets ouvrables, contenant une poudre que, pour les enfants ou adultes ne pouvant avaler les cachets, on peut faire prendre dans un aliment (potage, purée, compote, etc.).

**Posologie.** — 2 cachets par jour au milieu des repas.

**Remarques.** — Des observations cliniques ont montré que l'efficacité du traitement par **Formule Jacquemaire n° 60** est accrue si l'on tient compte des variations du pH humoral et urinaire. Dans certains cas difficiles, il sera utile de provoquer un *déséquilibre brusque du pH*, dont on suivra les variations avec un carnet réactif spécial.

Le traitement peut se prolonger sans inconvénients, car **Formule Jacquemaire n° 60** ne contient que les éléments minéraux qui devraient toujours se trouver dans les aliments.

**Prix public** : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 19 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-3.

**Laboratoires FLUXINE**  
**Produits BANTHOUX**

**Edm. JOËT, Docteur en pharmacie.**  
**VILLEFRANCHE (Rhône).**

## FORTOSSAN

CIBA

Sel sodique neutre de l'acide  
inosito-hexa-phosphorique.

PRÉPARATION PHOSPHORÉE POUR ENFANTS.

Médicament reconstituant et rectificateur de la nutrition spécialement préparé pour la pratique infantile. Très assimilable, parfaitement toléré.

**Indications.** — Retard du développement et de la dentition. Scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

**Doses.** — Poudre sucrée s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1/2 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

**Formuler.** — Boîte de 20 à 30 doses.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## FORTOSSAN IRRADIÉ

CIBA

PRÉPARATION PHOSPHORÉE AVEC VITAMINE D.

Puissant antirachitique par association de la vitamine D au phosphore organique végétal. La vitamine D développe, dans ces conditions, le maximum de son efficacité thérapeutique sans aucun effet secondaire: ni anorexie, ni diarrhée.

**Indications.** — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Anémie infantile, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, Caries dentaires.

**Doses.** — 1/2 à 4 cuillerées à café par jour.

**Formuler.** — Boîte de 20 à 30 doses.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOÏDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

**Formes.** — Fosfoxyli sirop : sirop opalin anisé, goût agréable.

**Fosfoxyli pilules** : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

**Fosfoxyli liqueur** : liquide opalin menthé spécialement destiné aux diabétiques.

**Dosage.** — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition. Acidifiant des urines. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium. *Action rapide et régulière.*

**Indications.** — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Asthénies primitives ou secondaires, Impuissance, Surmenage, Convalescences post-opératoires ou post-infectieuses, Anémie, Tuberculose, Diabète, Alcalose, Rhumatisme, Grossesse, Allaitement, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

**Contre-indication.** — État congestif aigu.

**Mode d'emploi.** — Dose moyenne: une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue de quantité égale d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant ou au cours des deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

*Prescrire:*

Sirop de **FOSFOXYL CARRON** (22 fr. 40).

ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** (20 francs).

ou **FOSFOXYL LIQUEUR** (21 fr. 10).

Chaque flacon ou boîte pour une semaine de traitement.

**Laboratoires du FOSFOXYL**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine),

(Tél. : Michelet 00-10.)



## FOSYLS CARRON

Terpénolhyphosphites minéraux.

**Reminéralisateurs chimiques physiologiques.**  
assimilables directement.

**Calcôfosyl : Sirop** (pour enfants) : 2 à 4 cuillerées  
à café, suivant l'âge.

**Comprimés** : 4 à 8 par jour.

**Magnésosofyl** : 4 à 8 comprimés par jour.

**Manganosofyl** : 4 à 8 comprimés par jour.

**Cuprosyl** : 2 à 4 comprimés par jour.

Tous ces corps possèdent les propriétés dynamiques.  
et trophiques du phosphore sur le système ner-  
veux et sur la nutrition générale, mais chacun  
d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente  
une activité d'action particulière qui conditionne  
sa prescription dans diverses affections.

Comprimés et sirop : 17 fr 10.

**Laboratoires CARRON**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine)

## FRANCALCIUM

**Calcithérapie.**

**Composition.** — Acétylglycocolate de calcium.

**Présentation**

- 1° En solution à 20 p. 100 (sans odeur ni saveur).
- 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 10 ampoules).
- 3° En ampoules de 10 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 5 ampoules).
- 4° En comprimés de 15 mgr. (boîtes de 45 comprimés).
- 5° **Francalcium C** (Lactate et Glycocolate). En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intramusculaires indolores (boîtes de 10 ampoules).
- 6° En ampoules de 10 cc. à 10 p. 100 pour injections intramusculaires indolores (boîtes de 5 ampoules).

**Indications cliniques :**

- a. **Indication recalciante :** Rachitisme, Retard de consolidation des fractures, Carie dentaire, Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale. Grossesse.
  - b. **Indication antihémorragique :** Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales, Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
  - c. **Indication de résorption :** Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques. Diarrhées des tuberculeux.
  - d. **Indication antichoc :** Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
  - e. **Indication spasmo-sédative :** Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.
- Indication antirhumatismale :** Polyarthrites chroniques.

**Posologie :**

En solution : 2 fois par jour, avant chacun des 2 principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

	Enfants :	
	au-dessous de 12 ans.	Adultes :
Indication recalciante .....	II gouttes par année d'âge.	XL gouttes
— antirhumatismale ..	VIII gouttes par année d'âge.	XL —
— antihémorragique ..	XX à LXXV gouttes.	CXX —
— antichoc .....	L à C gouttes.	CXX —
— spasmo-sédative ..		
Comprimés de 15 mgr. d'acétyl- glycocolate de Ca .....	Deux fois par jour, avant les repas.	
Ampoules de 5 cc. ou 10 cc. à 10 % pour injections intra- veineuses .....	1 comprimé.	2 ou 3 comprimés
(Aspirer un peu de sang dans la seringue et injecter très len- tement.)	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. ou 10 cc. tous les 2 jours.
Ampoules de 5 cc. ou 10 cc. à 10 % pour injections intra- musculaires.	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. ou 10 cc. tous les 2 jours.

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses, qui peuvent varier suivant les malades.

**Laboratoires du MYORAL**

3, rue Saint-Roch — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél. : Opéra 54-53.)

## FREINOLUTÉINE VOGUEIN

Chaque comprimé renferme 0,05 de Corps jaune privé de sa folliculine et des hormones excitatrices pour ne laisser subsister que ses effets inhibiteurs et freinateurs et 0,005 d'extrait thyroïdien.

**Action physiologique.** — Son rôle est de déclencher le mécanisme régulateur de la fonction menstruelle. Elle diminue les hémorragies utérines d'origine ovarienne, notamment les ménorragies de la puberté. Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.

Son action n'est pas brusque et se fait surtout sentir au cours des règles qui suivent l'administration du médicament.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas 5 à 6 jours avant l'époque présumée des menstrues.

Le flacon : 21 fr. 10. — L. N. C. n° 745-7.

### Laboratoires VOGUEIN

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV°).  
(Tél. : Danton 83-24.)

## FREINOSPASMYL

Éphédrine .....	0 gr. 02
Phénylméthylmalonylurée .....	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 06
Belladone .....	0 gr. 01

Médication élective de tous états spasmodiques. Régulatrice du système nerveux sympathique.

**Indications thérapeutiques.** — Asthme, Dyspnées, Éréthisme cardiaque, Hypertension artérielle, Aéro-phagie, Syndromes solaires, Épilepsie, Migraines, États névralgiques, Affections ovariennes et thyroïdiennes, Préparation pré-opératoire.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par 24 heures.

Cure d'attaque : périodes de 10 jours à 4 comprimés par jour.

Cures d'entretien : 2 ou 3 comprimés deux ou trois fois par semaine.

Prix de vente au public : 27 fr. 40.

### Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## FRÉNASMA

**Eupnéique phyto-hormonlue.**

**Composition.** — Éphédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

**Indications.** — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysemes, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foins, Rhinites spasmodiques, États allergiques (urticairé, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

**Posologie.** — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

**Enfants** à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Prix : 25 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-2.

### Laboratoires du FRÉNASMA

17, Avenue de Villiers — PARIS (XVII°).  
(Tél. : Carnot 91-99.)

## FRÉNITAN

**Vagotonique-hypotenseur.**

**Indications.** — Hypertension artérielle, angine de poitrine, fausse angor, spasmes vasculaires, névrose cardiaque, hypovagotonie, états anxieux.

**Composition.** — *Voie buccale* : chaque comprimé contient : chlorure de triméthyl-amino-éthyluréthane 0 gr. 002, acide adénosine phosphorique 0 gr. 0003. *Voie parentérale* : ampoules injectables de 1 cc. contenant : chlorure de triméthyl-amino-éthyluréthane 0 gr. 0001, acide adénosine phosphorique 0 gr. 0001, chlorhydrate de corynanthine 0 gr. 0001, protamine pure 0 gr. 002.

A cette forme ont été associées la corynanthine et la protamine pure pour rendre plus durable et moins brutale l'action du Frénitan.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés par jour ou plus (ne pas dépasser 5 comprimés par 24 heures).

1 à 2 ampoules de 1 cc. en injections intramusculaires après avoir eu soin de tâter la susceptibilité du malade en commençant par une demi-ampoule.

**Présentation.** — L'étui de 21 comprimés : 21 fr. 20. La boîte de 6 ampoules injectables de 1 cc. : 31 fr. 10.

### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## FRÉNOVEX

### Traitement des hémorragies utérines.

#### Médication préventive et curative.

#### Thérapeutique d'urgence.

**Composition.** — Extraits totaux de glande mammaire lactante et de corps jaune (procédé Biosymplex).

**Gouttes.** — Solution hydro-alcoolique : 1 cc. (40 gouttes) correspond à 1 gr. 5 de glande mammaire lactante et à 0 gr. 01 de corps jaune.

**Dragées à croquer.** — 1 dragée = 5 gouttes.

**Ampoules injectables.** — Solution aqueuse isotonique, indolore : 1 cc. correspond à 2 gr. de glande mammaire lactante.

**Mode d'action.** — L'extrait mammaire, en augmentant la tonicité utérine, ferme les vaisseaux sanguins béants. Il décongestionne l'endomètre et freine l'hypersécrétion folliculaire de l'ovaire (Cherry, Lendle, Aurisicchio).

Le corps jaune possède une action antifolliculinique spécifique et stimule la sécrétion lutéinique.

**Avantages.** — Frénovex agit très rapidement par voie buccale. Son action purement physiologique et durable, son *innocuité absolue, même à doses élevées et répétées*, en font la médication étiologique et symptomatique de la plupart des hémorragies utérines.

**Indications.** — *Frénovex* est la médication de choix dans les : Ménométrorragies de la puberté et de la ménopause, Polyménorrhées, Hyperménorrhées, Métrites

hémorragiques, Hémorragies par polype et fibrome sous-muqueux, Hémorragies du post-partum et du post-abortum, Menaces d'avortement, Hyperfolliculinie et ses conséquences, Mastodynies.

#### Posologie :

**Doses d'entretien ou préventives :** Faire prendre, pendant les 20 jours qui précèdent les règles : XX à XL gouttes par jour (4 à 8 dragées) (1 ampoule tous les 3 jours).

**Doses d'attaque** pendant les hémorragies : 100 à 200 gouttes par jour (1 ampoule tous les jours).

**Doses d'urgence** (hémorragies graves) : 1 à 6 cuillerées à café par jour (1 à 3 ampoules par jour).

Sauf en cas d'urgence, répartir la dose quotidienne en 2 à 3 prises, et absorber les gouttes pures, sur un morceau de sucre, ou diluées dans un peu d'eau, 1/2 heure avant les repas.

En cas d'urgence, faire absorber les gouttes par cuillerée à café, et si possible à jeun ; au besoin renouveler toutes les 1/2 heures.

*Bien croquer les dragées.*

Les ampoules de *Frénovex* seront injectées par voie sous-cutanée, seules ou en auto-hémocrinothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-5.

**Prix :** Gouttes ou dragées : 21 francs.

Boîte de 6 ampoules : 36 fr. 50.

#### Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Alésia 28-51.)

## FRUGEOLINES-VICHY

### Composition :

Agar-Agar.....	0,02	Charbon végétal.....	0,02
Talc.....	0,04	Benzoate de soude.....	0,005
Bile dépigmentée.....	0,05	Diacétyl-bioxyphényl- sécrétine.....	0,0025
Sécrétine.....	0,01	Sel de Vichy.....	0,01
Duodénase.....	0,05	Lactose.....	0,0275
Entérokinase.....	0,04		

**Forme.** — Lentilles dragéifiées de 0 gr. 275.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent régulateur de la sécrétion biliaire et intestinale. Aucune toxicité.

**Indications.** — Toutes les formes de la constipation, lithiases biliaires, coliques hépatiques, cholémie, acholie, ictères, entéro-colites.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 *Frugeolines-Vichy* avant déjeuner et 2 autres avant dîner. Cette dose peut être augmentée ou diminuée suivant le tempérament de chacun, mais ne doit pas excéder la dose de 6 *Frugeolines-Vichy* par jour.

Pour les enfants de 12 à 18 ans : la moitié des doses ci-dessus.

**Laboratoire MÉDICO-PHARMACOLOGIQUE  
DE VICHY**

1 et 3, rue Laffoque — VICHY (Allier).

## FUCOGLYCINE DU D<sup>r</sup> GRESSY

**Composition.** — Succédané naturel végétal de l'huile de foie de morue, sirop d'algues et fucus frais contenant les principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés de ceux-ci.

**Indications.** — Scrofule, lymphatisme.

**Doses.** — Comme l'huile de foie de morue.

**Laboratoires LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 08-73.)

## FUCUSOL

**Composition.** — A base d'algues marines (*Fucus vesiculosus* et *fucus serratus*).

**Indications.** — Traitement végétal absolument sans danger de l'obésité et de l'embonpoint selon la méthode de Duchesne-Duparcq.

Ne contient ni nitrophénols, ni extrait thyroïdien.

**Mode d'emploi.** — 4 à 6 pilules par jour. 2 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Boîte de 60 pilules.

Boîte de 200 pilules.

Granulés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les Nos  
Pilules 590-16. Granulés 590-26.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**  
2, place des Vosges — PARIS  
(Tél. : Archives 44-59.)

## FUMIGALÈNE

**Composition.** — Aconit, essence d'eucalyptus, essence de niaouli, menthol, benjoin.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, Sinusites, Bronchites et toutes affections du rhino-pharynx.

**Mode d'emploi.** — 1/2 à 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalation à l'aide de l'inhalateur en carton joint à la boîte.

**Présentation.** — Le flacon avec entonnoir carton pour inhalation : 11 fr. 70.

**Laboratoires du FUMIGALÈNE**  
**R. CHARBONNEL, Pharmacien**

7, rue du Marché — BLAYE (Gironde).

(Tél. : 74.)

## FUROPLAST

Enregistré au Laboratoire national sous n° 540-18.

Traitement des Furoncles par l'emplâtre de Vigo phéniqué.

Emplâtre caoutchouté (même masse adhésive que l'Albuplast) maintenant une rondelle de Vigo phéniqué ou — pour être employé quand le furoncle a crevé — un emplâtre au dermatol.

**Avantages.** — Permet le traitement des furoncles, soit par le docteur, soit par le malade lui-même, si celui-ci doit reprendre ses occupations ou ses déplacements avant achèvement du traitement.

Un *Furoplast élastique* (*Hermoplast*, enregistré sous n° 540-19) est particulièrement indiqué dans le cas de furoncles intéressant les parties du corps où un pansement rigide pourrait difficilement se maintenir.

### Présentations :

Boîte ronde méta : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Boîte carton : 3 emplâtres Vigo, 3 compresses dermatol.

Elastique (*Hermoplast*) : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

La fabrication de l'*Hermoplast* est actuellement (1942) très réduite faute de matières premières.

**Anciens Établissements F. VIGIER et Cie, Jean HUERRE et Cie**

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pereire 57-41.)

## GADUAMINE

**Composition.** — Extrait opothérapique de foies frais de morue, dont il contient la totalité des principes actifs.

**Indications.** — Anémie, lymphatisme, rachitisme, troubles de la croissance, pré tuberculose.

**Mode d'emploi.** — XL à LX gouttes par jour.

### Nota.

*Les matières premières qui nous sont allouées ne nous permettent pas de satisfaire toutes les demandes. Nous prions donc Messieurs les Médecins de limiter leurs prescriptions au strict nécessaire. Dès que la situation se sera améliorée, nous nous empresserons de les en aviser.*

**Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY.

(Tél. : Pereire 14-08.)

## GADUAUSE

Tonique et stimulant général d'action rapide et durable. Succédané classique de l'huile de foie de morue.

### Principaux principes actifs :

Hypophosphites de sodium et de calcium. Méthylarsinate disodique. Iode.

### Convient à tous les âges.

La Gaduase active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indications.

**Indications.** — Inappétence, anorexie, anémie, faiblesse générale, troubles de croissance, maigreur, manifestations du lymphatisme (ganglions, gourme, boutons, engelures) et du rachitisme (déviations, déformations, faiblesse des os, affections pulmonaires), troubles de la nutrition dus à une nourriture incomplète, etc.

**Posologie.** — La Gaduase se présente sous deux formes :

1° **Sirop framboisé**, très agréable à prendre, pur ou dans un peu d'eau, avant et après les repas.

2° **Dragées** (avalier sans croquer, de préférence avant les repas).

**Enfants de 6 à 12 ans :** Sirop, 1 cuillerée à café matin et soir. Dragées, 1 matin et soir, soit 2 par 24 heures.

**Au-dessus de 12 ans :** Sirop, 1 1/2 cuillerée à soupe matin et soir. Dragées, 2 dragées matin et soir, soit 4 par 24 heures.

**Adultes :** Sirop, 1/2 à 1 cuillerée à soupe matin et soir. Dragées, 2 à 3 dragées matin et soir, soit 6 par 24 heures.

Flacon de 215 cc. .... 21 fr. 30  
Boîte de 40 dragées. .... 15 fr. 60

### Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## GAÏACAMPHRE

### Présentation :

Quatre formes: Ampoules, Comprimés, Sirop, Suppositoires.

1° Ampoules de 2 et 5 cc.

Solution aqueuse de camphre (camphosulfonate) et de Gaïacol (glycéryl gaïacol) indolore, de résorption rapide, non toxique.

### Formule des ampoules :

Éther monoglycérique du gaïacol....	0 gr. 05
Camphosulfonate de sodium .....	0 gr. 17
Eau distillée .....	Q. S. P. 1 cc.

Correspondant à 0 gr. 10 de camphre et 0 gr. 05 de gaïacol par cc.

2° Suppositoires : adultes et enfants.

3° Comprimés :

Présentés en enrobage se dissolvant en milieu intestinal seulement.

### Formule des comprimés:

Dionine .....	0 gr. 005
Glycéryl gaïacol .....	0 gr. 10
Camphosulfonate .....	0 gr. 05
Alcoolature de racine d'aconit...	III gouttes.

4° Sirop : formule du sirop :

Glycéryl gaïacol .....	1 gr.
Camphosulfonate .....	0 gr. 2
Teinture d'Aconit .....	0 gr. 5
Dionine .....	0 gr. 06
Eau de Laurier-cerise .....	4 gr. 5
Eau distillée et sucre....	Q. S. P. 100 cc.

**Indications.** — Toutes affections bronchiques ou pulmonaires aiguës, toutes suppurations chroniques pulmonaires.

Préventif des complications pulmonaires d'origine médicale ou chirurgicale.

### Priz:

Ampoules : 26 fr. 80 la boîte de 10 ampoules de 2 cc.  
26 fr. 80 la boîte de 7 — de 5 cc.

Comprimés : 16 fr. 50 la boîte de 30 comprimés.

Sirop : 16 fr. 80 le flacon.

Suppositoires : la boîte 19 fr. 50.

Nous préparons aussi le **Gaïacampbre** sous toutes ses formes avec Ephédrine.

### Mode d'emploi:

Ampoules : Adultes, de 1 à 4 par jour ; Enfants, 1 par jour ou tous les 2 jours.

Comprimés : Adultes, 3 à 6 par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 1 à 3 par jour suivant l'âge.

Sirop : Adultes, 4 à 5 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Suppositoires : un le soir de préférence.

### Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES. (Tél. : 36-39.)

## GAIARSENAN DUCATTE

**Spécifique de la grippe et de ses complications.**

Solution aqueuse de cacodylate de galafal chimiquement pur et de strychnine.

**Deux formes :** Boîte de 12 ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées. — Flacon de 40 dragées de 0 gr. 25 pour médication interne.

**Action thérapeutique et usage.** — Prescrit dans la grippe et ses complications, dans les formes aiguës (broncho-pulmonaire ; gastro-intestinale ou nerveuse), dans la convalescence même après disparition complète des symptômes généraux (neurasthénie post-grippale).

**Posologie et Mode d'emploi :**

**Ampoules :** Une à deux injections sous-cutanées par jour selon la gravité de l'infection.

**Dragées :** Deux à trois dragées par jour selon le cas.

L'emploi du *Gaiarsenan Ducatte* n'exclut pas les autres médications symptomatiques ni l'observation des règles d'hygiène et de prophylaxie. Les injections pratiquées dans la région fessière avec les précautions d'usage seront faites très lentement, ce qui les rend indolores.

Chez l'enfant au-dessous de quinze ans la grippe se différencie peu d'une bronchite vulgaire.

Prix : 23 fr. 80.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-5 à 240-6.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS. (Tél. : Opéra 68-80.)

## GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lactosérique.

**Forme.** — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

**Indications.** — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

**Mode d'emploi.** — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

(Tél. : Dragon 12-55.)

## GALACTOGÈNE CHALVET

**Composition.** — Extrait stabilisé de graine de Brosme, plante tropicale, contenant la Vitamine F qui agit de façon remarquable sur les glandes mammaires. Véritable catalyseur, il augmente la sécrétion lactée et la qualité nutritive du lait.

**Action rapide.** — La montée du lait s'effectue souvent dès le lendemain de la 1<sup>re</sup> absorption et va s'établissant de mieux en mieux, si bien qu'on est parfois obligé de diminuer les doses au bout de quelques jours.

**Administration.** — Facile, le traitement peut être prolongé sans inconvénient aussi longtemps que devra durer l'allaitement.

**Résultats.** — Très heureux pour l'enfant, dont il favorise le développement, et pour la mère, qui, grâce à lui, loin de s'affaiblir, se fortifiera en allaitant.

**Mode d'emploi.** — XV gouttes dans un peu de liquide (eau, lait, café, etc.), 2 à 3 fois par jour aux repas.

**Prix du flacon :** 20 francs (correspondant à plus de 20 jours d'un usage quotidien).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1408-2.

Laboratoire LATOUR, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône).

## GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.

Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumín, fenouil.

**Indications :**

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

**Mode d'emploi :**

Trois fois par jour, 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte simple : 19 fr. 40.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au Capital de 12.800.000 fr.  
VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

## GALAGÉNOL

Opothérapie des troubles de la sécrétion lactée.

**Composition.** — Complexe buvable d'extrait placentaire et d'extrait mammaire, délipoidés et désalbuminés.

**Indications.** — Tous les cas de montée laiteuse déficiente ou difficile, hypogalactie, absence totale de sécrétion lactée.

**Action.** — Augmentation rapide de la sécrétion lactée, augmentation en quantité et en qualité du lait, d'où il découle un accroissement du poids du nourrisson, une amélioration de son état général, la reprise de l'appétit.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour dans un demi-verre de liquide, loin des repas de préférence.

Le traitement peut être commencé 48 heures après l'accouchement. Il sera poursuivi pendant 8 à 10 jours, on observera un arrêt de 4 à 6 jours, et on recommencera le traitement en alternant les périodes de repos aux périodes de traitement.

Ce rythme peut être entretenu plusieurs mois sans inconvénient.

**Présentation.** — La boîte de 10 ampoules de 5 cc. buvables : 24 fr. 40.

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## GALÉGON

L'équivalent végétal de l'insuline par son principe actif : Galéguine.

**Composition.** — Extrait fluide de Galéga, titré et stabilisé. Extrait fluide de Morus Nigra, stabilisé.

**Indications.** — DIABÈTE sous toutes ses formes.

**Posologie.** — CXX gouttes par jour, par cures discontinues (1 semaine sur 2).

Prix : 29 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 579-2.

Laboratoire PAUCHE

139, cours Tolstoï — VILLEURBANNE (Rhône).

## GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

**Indications.** — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3° Hygiène de la voix.

**Mode d'emploi.** — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et au besoin toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche

Prix : 8 fr. 20.

Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.  
à PRÉMERY (Nièvre).

## GAMBÉOL

Adopté par la Ministère de la Santé Publique.

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

**Propriétés.** — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

**Indications.** — Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes. Oxyurose. Insuffisance hépatique. Enurésie.

**Présentation et posologie :**

1° Cachets à 1 cgr. : 2 ou 3 chaque jour (10 jours de traitement).

Prix : 28 fr. 20.

2° Cartouches de pommade blanche pour frictions à 50 p. 100.

Adultes : 1 chaque jour (8 jours de traitement).

Enfants : Fractions suivant l'âge (15 jours environ de traitement).

3° Suppositoires adultes à 10 cgr. : 1 chaque jour (12 j. de traitement).

Prix : 28 fr. 20.

Suppositoires enfants à 5 cgr. : 1 chaque jour (12 jours de traitement).

Prix : 25 fr. 80.

Références : Thèses des D<sup>rs</sup> Dugué, Bouilloux, Rouzaud.

Laboratoire ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 francs.

Louis FERRAND, Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris  
Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, av. Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tel. Elys. 16-33.)  
Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON (Vaucluse). (T. : 19-32.)  
Fournisseur de l'Assistance Publique et des Ministères de la Santé Publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



## GAMOSTYL

Thérapeutique des maladies infectieuses par colloïdes hydrophobes.

**Indications.** — États infectieux, Fièvre typhoïde, Grippe.

**Composition.** — Or colloïdal, Argent colloïdal, Rhodium colloïdal, Quinine colloïdale.

**Posologie.** — Injections intramusculaires.

**Adultes :** 1 collampoule par jour.

**Etats aigus :** 2 collampoules par jour.

**Enfants :** à partir de 5 ans : 1 cc. ; de 2 à 5 ans : 1/2 cc.

Prix : 29 fr. 90 la boîte de 6 ampoules.

**Laboratoires MARONNEAU-MOREL**

107, boulevard de la Mission-Marchand,  
à COURBEVOIE (Seine).

## GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'Eau d'Alibour associés au principe actif du *Gambéol* et à l'oxyde de zinc.

### Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable .....	5 gr.
Sulfate de cuivre anhydre pulvérisé .....	0 gr. 50
Sulfate de zinc pur pulvérisé .....	1 gr.
Oxyde de zinc pur pulvérisé .....	18 gr.
Excipient spécial .....	75 gr. 50

**Indications.** — Toutes affections et infections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne. Acné, Dartres, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigo, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites.

**Présentation.** — En tubes étain imprimés.

Prix : le tube, 17 fr. 80.

**Laboratoire ROGER BELLON**

S. A. R. L. au capital de 1 250 000 francs.

Louis FERRAND, Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris,  
Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, avenue Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ely. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON (Vaucluse).  
(Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

## GARASPIRINE

**Composition.** — Association d'acide acétylsalicylique (0,45), de phényléthylmalonylurée (0,02) et de chlorhydrate de papavérine (0,01).

**Mode d'action.** — Sédatif de la douleur. Fait cesser les spasmes sensitivo-moteurs et les spasmes des organes à musculature lisse.

**Indications.** — Toutes douleurs greffées sur un élément spasmodique.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour.

Prix de vente : 10 francs.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 579-3.

**Laboratoire PAUCHE**

139, cours Tolstoï — VILLEURBANNE (R.).

## GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

### Indications :

**Epilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.** Antispasmodique (méthode des doses réfractées). Angor, migraine, prurits entérocolites, dysménorrhée.

### Présentations :

Comprimés à 0 g. 10 (tubes de 20) .....	8 fr. 60
— à 0 g. 05 (tubes de 30) .....	8 fr. 60
— à 0 g. 01 (tubes de 80) .....	7 fr. 20

### Doses par 24 heures :

**Adultes :** 0 g. 05 à 0 g. 30.

**Enfants :** 0 g. 02 à 0 g. 10.

Gardénal injectable : ampoules dosées à 0 g. 04 ou 0 g. 20 de gardénal (boîtes de 5 ampoules de 1 cc.).

Strychno-Gardénal : dragées dosées à Gardénal 0 g. 05. Sulf. de Strychnine 0 g. 0005 (Fl. de 40 dragées). Dragées dosées à Gardénal 0 g. 10 et sulf. de Strychnine 0 g. 001 (Fl. de 30 dragées).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## GARÉPHÉDRINE

Comprimés.

(Anolennement GARDÉPHÉDRINE)

Chl. Ephédrine naturelle .....	3 cgr.
Phényléthylmalonylurée.....	1 cgr.

**Action.** — L'addition de ce sédatif à très faible dose évite les troubles parfois provoqués par l'éphédrine dans les cas d'asthme nerveux (palpitations, tremblements, insomnies).

**Indications.** — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphyseme, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foies, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Hypotension, Toux spasmodique, Vertige de Ménières.

**Posologie.** — Un comprimé avant ou au début de la crise. Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine, Ephédrasmine**  
et **Bronchamine**

Échantillons et Littérature sur demande.

Prix : 18 fr. 70 le tube de 20 comprimés.

**Laboratoires SAUGIER-THORAL**  
**DOLE (Jura).**

## GARGYL

Collutoire, Gargarisme.

**Composition.** — Guimauve, Mauve, Coca, Salicylate de soude, Résorcine, Phénosalyl, excipient Glycérine.

**Propriétés.** — Antiseptique, émollient, sédatif.

**Indications.** — Toutes les affections de la gorge et de la bouche. Amygdalites, Angines, Abscess, Stomatites, Gingivites.

**Mode d'emploi :**

**Pur.** — En badigeonnage comme collutoire, toutes les 3 heures.

**Dilué.** — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie tiède pour gargarismes. De goût très agréable.

Prix : 8 fr. 80.

Durée moyenne de traitement : 2 jours.

**Laboratoires R. CHEMINEAU**

Docteur en Pharmacie, ancien Interne  
des Hôpitaux de Paris.

**VOUVRAY (Indre-et-Loire). (Tél. 30.)**

## GASMANYL

Agent régulateur des Fonctions digestives.

Composition :

Carbonate de chaux .....	7
Hydrate de magnésie .....	5
Bicarbonate de soude .....	3
Génatropine.....	0,004
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

**Forme.** — Granulé.

**Indications.** — Toutes les insuffisances gastriques. Stimulant des fonctions digestives. Calmant des douleurs stomacales.

**Doses :**

1 à 3 cuillerées à café par jour après les repas ou au moment des crises douloureuses.

**Prix.** — 17 fr. 60.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-3.

**E. VERDON**

Docteur en pharmacie

**CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).**

(Tél. : 8.)

## GASMAR LEGENDRE

(Comprimés dragéifiés à croquer.)

**Composition.** — A base de ferments digestifs frais, associés aux sels chimiquement purs de sodium (Bourget), de magnésium, de bismuth, et à la noix vomique (amer excito-moteur).

**Indications.** — Véritable *spécifique-digestif* complet. Dyspepsies, gastralgies, gastrites, insuffisances gastriques, Insomnie gastrique, etc.

**Avantages.** — Pas de toxicité, ne constipe pas, s'élimine bien. Pas d'accoutumance.

**Posologie et mode d'emploi :**

Après les repas ou au moment des douleurs.

**Adultes :** 3 à 10 comprimés par 24 heures.

**Enfants :** (à partir de 5 ans) demi-dose.

**Prix au public :** 18 fr. 50 (20 jours de traitement).

**Laboratoires LEGENDRE**

Section DS — B. P. COURBEVOIE (Seine).

Dépot général pour la vente en gros.

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1045-3.

## GASTÉRYL

### Composition :

Conium maculatum.....	5 cgr.
Atropa belladonna.....	10 cgr.
Anthemis nob.....	0,10
Condurango gonol.....	0,10
Rosmarinus off.....	0,10
Magnésium peroxyd.....	5
Gelosa Bismuthum carb.	
Calcium carbon.	
Magnésium carbon.....	aa 10
Kaolinum.....	30
Exc. arom.....	24,55

**Présentation.** — Poudre.

**Posologie.** — Comme pansement de l'estomac : 1 cuillère à soupe 1/2 heure avant les repas, délayée dans un peu d'eau tiède.

Comme calmant et anti-acide : 1 cuillère à café au moment des douleurs.

**Indications.** — Estomac.

Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE  
10 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## GASTRHÉMA

### Méthode de Castlé.

**Composition.** — Extrait de muqueuse d'antré pylorique de porc (opothérapie gastrique anti-anémique).

**Forme.** — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureusement dosées, d'une saveur agréable, contenant toutes les hormones de l'organe frais.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Asthénies, Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques, Convalescences, Dyspepsies, Hypochlorhydrie, Hypopepsie, Hémogénie.

Sans contre-indications.

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour dans un liquide froid, avant les repas.

La boîte de 8 ampoules : 32 francs.

Admis à l'Assistance publique de Paris.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-1.

Laboratoire du GASTRHÉMA  
17, avenue de Villiers — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 91-99.)

## GASTROBELLONE

### Pansement gastrique belladoné.

**Composition.** — Poudre à base de Kaolin colloïdal, Gélose et extrait de belladone.

**Propriétés.** — Le Kaolin, pansement gastrique par excellence, calme efficacement les douleurs provoquées par l'irritation de la muqueuse stomacale.

La Belladone vient ajouter son action bienfaisante sur les spasmes douloureux gastro-intestinaux et la Gélose, augmentant le volume du bol fécal, accélère le transit intestinal.

**Indications.** — Manifestations douloureuses de l'hyperchlorhydrie (crampes, brûlures). Coliques. Diarrhées.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café de poudre avec un peu d'eau avant, pendant ou après les repas, selon les indications du médecin.

Prix : 22 fr. 75.

Laboratoires ROUSSEAU

Docteur en pharmacie

49, rue du Château-d'Eau — PARIS (X<sup>e</sup>).

## GASTROCALCINE

Affections de l'estomac, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatation de l'Estomac, Ulcères.

### GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :	
Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie .....	0 gr. 20
Bicarbonate de soude .....	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. S. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

### GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth .....	2 gr. 50
— de magnésie .....	0 gr. 30
— de chaux .....	0 gr. 30
Bicarbonate de soude .....	0 gr. 25
Kaolin .....	5 gr.
Bromure de sodium .....	0 gr. 25
Codéine .....	0 gr. 005
Extrait de jusquiame .....	0 gr. 02
Sucre .....	6 gr.
Essence d'anis Q. S. p. aromatiser.	

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Fabrication momentanément suspendue

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de la Faculté de Pharmacie de Paris,

17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

## GASTROCAOL

Pansement gastrique.

**Composition.** — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés porphyrisés.

**Forme.** — Poudre insoluble en sachets de 20 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, peut et doit remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications. Plus efficace.

Mêmes doses. Jamais toxique.

Même mode d'emploi. 6 fois moins coûteux.

**Indications.** — Pansement gastrique. Hyperchlorhydrie. Ulcères de l'estomac et du duodénum. Spasmes du pylore. Aérophagie. Dyspepsies douloureuses. Hémorragies du tube digestif. Diarrhées aiguës. Diarrhées des tuberculeux. Dysenteries bacillaires et amibiennes. États cholériques.

**Doses.** 1<sup>o</sup> Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en 1 ou 3 fois.

2<sup>o</sup> D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3<sup>o</sup> Exception<sup>1<sup>re</sup></sup> : 100, 150, 200 gr. par j. dans les états cholériques.

**Mode d'emploi.** — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en trois fois, avant chacun des repas principaux.

**Prix.** — 17 fr. 50 pour un minimum de traitement de douze jours.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET  
BENDERITTE à VENDOME (Loir-et-Cher).

## GASTROCITRINE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin.

**Forme.** — Granulé fondant, agréablement parfumé au citron.

**Composition :**

Sulfate de soude.....	10 p. 100
Phosphate de soude .....	10 —
Carbonate acide de Sodium.....	15 —
Citrate Neutre de Sodium.....	15 —

**Indications.** — Dans tous les troubles gastro-intestinaux se traduisant par :

- 1<sup>o</sup> Langue saburrale et mauvaise haleine au réveil. Vertiges.
- 2<sup>o</sup> Somnolence après les repas. Migraines.
- 3<sup>o</sup> Démangeaisons. Urticaire.
- 4<sup>o</sup> Alternatives de diarrhée et de constipation.
- 5<sup>o</sup> Intoxications alimentaires. Congestion du foie.
- 6<sup>o</sup> Inaptitude au travail.

**Posologie et mode d'emploi :**

**Adultes :** 1 à 2 cuillerées à café bien pleines dans un verre d'eau le matin à jeun, et au besoin dans la journée.

**Enfants :** 1 cuillerée à café rase.

**Nota.** — Pour obtenir meilleur effet et bien meilleur goût, il est recommandé de faire dissoudre le granulé dans un verre d'eau.

Durée moyenne du traitement : 10. jours.

Prix de vente au public : 17 fr. 60.

Laboratoire de la GASTROCITRINE  
LUC-SUR-ORBIEU (Aude). (Tél. : 6.)

## GASTROCLEAN

**Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.**  
Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

**Gastroclean** est le remède spécifique et souverain des dyspepsies, des affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique, des infections biliaires et des auto-intoxications.

**Gastroclean** neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

### Dose et mode d'emploi

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

(Durée du traitement de l'unité 10 à 12 jours.)

Dépôt principal :

**Laboratoires ADLER**

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

Tél. : Tur. 90-59.

En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

## GASTRONIGER

Thérapeutique Rationnelle de toutes les lésions de la muqueuse gastro-intestinale.

**Composition.** — Charbon animal pur, Kaolin, Gomme Sterculia, Extrait : Q. S.

**Indications : 1° Principales.**

a) Les ulcères gastriques et duodénaux.

Le **Gastroniger** ne prétend pas guérir les ulcères relevant de la thérapeutique uniquement chirurgicale ; mais, son rôle calmant, anti-acide et désinfectant, le désigne comme traitement pré-opératoire ou post-opératoire (en particulier chez les gastro-entérostomisés hyperacides).

Par contre, dans tous les ulcères relevant du traitement médical, le **Gastroniger** peut amener la guérison et éviter l'intervention chirurgicale.

b) Les duodénites, les douleurs tardives.

c) Les gastrites hyperacides, les brûlures, le pyrosis, les régurgitations.

d) Les spasmes pyloriques.

2° Secondaires. Aérophagie, vomissements. Infections intestinales, aérocolie, colites, diarrhées, vertiges d'origine digestive. Intoxications.

**Posologie.** — Sauf indication particulière du médecin traitant.  
1° — **Affections gastro-duodénales :** un seul paquet délayé dans 1/3 de verre d'eau, pris le plus tard possible (2 heures 1/2 au moins) après le repas du soir.

2° — **Affections intestinales :** même posologie ou prise du paquet en deux fois à la fin ou dans l'intervalle des repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1479-2.

La boîte de 10 sachets : Prix : 19 fr. 70.

**Laboratoire L. COUVERT**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

11, rue de Mogador, Paris (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Tri. 22-01.)

## GASTROPANSEMENT

du Dr ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

**Forme.** — Paquets.

**Composition.** — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des ulcères gastriques et des gastro-pathies douloureuses.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie.

Gastrites.

Spasmes du pylore.

Atonie gastrique.

Dyspepsies réflexes.

Ulcères.

**Posologie.** — Prendre le matin à jeun, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 26 fr. 40.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 28-96.)

## GASTROPATHYL

Médication spécifique de toutes les Gastropathies.

Forme : Granulé soluble aromatisé, agréable au goût.

### Composition 42 :

Hyd. d'Alumine Colloidal.....	7 gr. 50
Carbonate de Chaux .....	15 gr.
Carbonate de Magnésie.....	10 gr.
Carbonate acide de Sodium.....	7 gr. 50
Excipient aromatisé.....	Q. S. p. 100 gr.

**Propriétés thérapeutiques :** Le Gastropathyl est le spécifique le plus efficace de toutes les gastropathies douloureuses. Il combat l'acidité et régularise les fonctions digestives. Ne contenant aucun toxique, il est absolument inoffensif et il ne constipe pas. De plus, l'adjonction de certains éléments (Hyd. d'alumine colloidal, carbonates de chaux et de magnésie) en fait un véritable pansement de la muqueuse gastrique.

**Indications.** — Digestions pénibles, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Pyrois, Gastrites (états préulcéreux) et toutes gastralgies.

**Posologie.** — Une à deux cuillères à café un peu avant ou après les repas, à renouveler au moment des crises douloureuses. (Croquer ou délayer dans un peu d'eau.)

**Prix :** La boîte, 24 fr. (Toutes Pharmacies.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1907-7

Les Laboratoires « MÉDICIA »

L. NEUVILLE, Pharmacien

7, Impasse de la Sous-Préfecture, 7. — ROANNE (Loire).

## GASTROPEPTYL

**Formes pharmaceutiques.** — 1° Granulé ; 2° Comprimés. (150 gr. granulé environ ou 50 comprimés.)

**Composition.** — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

**Propriétés et avantages.** — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la musculature gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

**Indications.** — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, algueurs.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillères à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

**Prescription.** — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés Gastropeptyl.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## GASTROSEDYL

Gouttes.

### Composition :

Teinture de Belladone stabilisée	
Dausse.....	46 gr.
Teinture de Jusquiame stabilisée	
Dausse.....	20 gr.
Liqueur ammoniacale anisée.....	20 gr.
Bromure de Sodium.....	13 gr.
Phosphate de Codéine.....	1 gr.

Pour 100 grammes.

### Indications :

Hyperchlorhydrie, Dyspepsies douloureuses, Ulcérations, Spasmes, toutes Douleurs gastriques.

### Propriétés thérapeutiques :

Le GASTROSÉDYL, par sa composition inchangée, est :

Un Antispasmodique certain,  
Un Régulateur de l'Acidité gastrique,  
Un Sédatif à effet immédiat.

### Posologie :

X à XL gouttes dans un peu d'eau sucrée après les repas et au moment des douleurs.

### Doses :

XL gouttes correspondent à 1/10 de mgr. d'Atropine, à 1 cgr. de Phosphate de Codéine et à 10 cgr. de NaBr.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1877-2.

Laboratoires J. LANDRIER

COULANGES-SUR-YONNE (Yonne).

## GASTRO-SODINE

**Composition :** par cuiller à café.

	Normale.	B. Bromurée.	C. Citratée.	S. Sulfatée.	M. Magnésienne comprimés.
Bic. de soude sursaturé .....	0,80	0,80	0,80	0,20	0,08
Phosphate de soude.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,16
Sulfate de soude.	0,20	0,20	0,20	0,80	0,33
Bromure de Sodium.		0,20			
Citrate de soude.			0,40		0,10
Sulfate de Magnésie.					0,33
Sels desséchés chimiquement purs					

**Propriétés et Indications.** — Gastro-entérites simples, gastro-entérites neuro-arthritiques, gastro-entéro-hépatites, Troubles circulatoires, Hypertension, Viscosité sanguine.

**Forme.** — Granulé

**Posologie et mode d'emploi.** — Une cuiller à café ou 2 comprimés le matin dans un verre d'eau de préférence chaude. Dose supplémentaire sur avis du médecin.

**Anciens Laboratoires ODINOT**

Robert COLAS, Docteur en Pharmacie

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Van. 48-10.)  
Laboratoires : 21, rue Violet, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Ség. 69-13.)

## GASTROZYMASE

**Composition.** — Ferments gastriques naturels.

**Indications.** — En plus du pouvoir de substitution utilisable en cas d'hypopepsie ou d'apepsie, le système des ferments gastriques (zymases), rassemblés dans la GASTROZYMASE, a la propriété de stimuler les fonctions digestives déficientes et de les régulariser, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes. Les troubles gastriques, qu'ils proviennent d'hypo- ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie.

**Forme.** — Comprimés effervescents.

**Posologie.** — Comme médicament de substitution ou régulateur gastrique : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

## GATRAN

**Composition.** — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le Savon Cadique et le Baume Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

**Indications.** — Pityriasis simplex, Eczéma séborrhéique, Séborrhée, Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

**Mode d'emploi.** — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de *Baume* ; le matin, lavage au *Savon*.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif contre toutes les affections séborrhéiques.

**Présentation.** — *Baume* : flacon de 90 cc.

*Savon* : flacon de 150 cc.

**Prix de vente :**

Le flacon de Baume GATRAN : 21 fr. 40.

Le flacon de Savon GATRAN : 22 fr. 60.

L. N. C. n° 463-12.

**Laboratoires L. LECOQ**

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, caloque et magnésien entièrement assimilable.**

**Présentation.** — 3 Formes : Ampoules injectables de 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique général de l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

**Indications thérapeutiques.** — Asthénie, Anémie, Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme, Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consolidation des fractures.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule injectable par jour ; 1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Enr. L. N. C. M. n° 43-1 à 43-3.

## GAUROL INTRAVEINEUX

**Présentation.** — Ampoules de 5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hémostatique puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

### Indications thérapeutiques.

#### En Médecine :

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Epanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

#### En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif. Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule tous les 2 jours. Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

Enr. L. N. C. M. n° 43-7.

**Laboratoires PÉPIN et LÉBOUQ**

30, rue Armand-Silvestre — COURBEVOIE (Seine)

(Tél. : Défense 09-71.)

## GAYAQUES

### Suppositoires à la Créosote.

**Formule.** — Créosote de Hêtre, 0,50 ;  
Métabenzamidosemicarbazide, 0,15 ;  
Camphre, 0,5 pour un suppositoire Adulte.

Créosote de Hêtre, 0,20 ; Métabenzamidosemicarbazide, 0,05 ; Camphre, 0,2 pour un suppositoire Enfant.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumes, Bronchites, Broncho-pneumonie.

**Posologie.** — Un suppositoire matin et soir.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## GAZE NÉOLÉE

**Composition.** — Tissu imprégné de corps gras stérilisés et aromatisés d'essences antiseptiques.

**Caractéristiques.** — Pansement *non adhérent* (ne collant pas à la plaie et évitant ainsi douleurs, saignement et arrachement des jeunes flocs cicatriciels) et *non occlusif*, permettant la lutte antibactérienne (antiseptiques ou sulfamides) tout en étant suffisamment perméable pour éviter la rétention du pus et la macération).

**Indications.** — Plaies superficielles bien vivantes et petites plaies opératoires. En application immédiate sur brûlures superficielles.

En pansement quotidien des plaies bourgeonnantes, des tumeurs cancéreuses et saignant facilement.

**Mode d'emploi.** — Application directe sur les plaies après nettoyage périphérique à l'éther ou à l'alcool (sulfamide s'il y a lieu). Recouvrir de coton. Renouvellement quotidien si seulement abondant. Tous les 2 ou 3 jours dans les autres cas. Nitrater en cas de prolifération épithéliale trop importante.

Prix : La boîte de 12 compresses (6 cm. x 12 cm.) : 12 fr. 20.

Le plus économique des pansements gras.

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI\*).



## GELIDERM

Toutes les affections de l'épiderme.

Composition :

Acide salicylique .....	} aa 1 gr.
Résorcine .....	
Chloral .....	
Acide phénique .....	

Excipient liquide spécial pour 100 grammes.

Forme : Liquide.

Indications. — Usage externe ; Eczéma, Impétigo, Herpès, Pityriasis, Affections parasitaires, Piqûres d'insectes, etc.

Mode d'emploi :

3 applications par 24 heures avec un tampon de gaze.

Prix. — 19 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1311-1.

Laboratoire **GELIA**

16, rue Saint-Yon — La ROCHELLE.

(Tél. : n° 2265.)

## GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation dénuée de toute action irritante ou toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi. — Le contenu d'un flacon (200 g.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Prix de vente du flacon de 200 g. : 12 fr. 40.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

**Posologie.** — Traitement des douleurs de l'estomac : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Prix : 22 fr. 40.

Laboratoires **LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

## GÉLOK

Tablettes.

Pansement gastrique complet (absorbant, protecteur, neutralisant) :

Formule :

Gélose.....	0,10
Généline .....	0,10
Magnésie hydratée .....	0,25
Kaolin purifié colloïdal.....	0,25

— Excipient menthé, Q. S. p. 1 tablette de 3 grammes équivalant à une cuillerée à café de poudre.

Tablettes **Gélok** belladonnées même formule + V gouttes de teinture de belladone par tablette.

**Présentation.** — En étuis de poche de 11 tablettes ; 4 étuis de **Gélok** simple ; 1 étui de **Gélok** belladonné ; par boîte : 20 francs.

C'est le parfait

traitement ambulatoire  
des hyperchlorhydriques.  
Laboratoire **LEURQUIN**  
**DREUX**

## GÉLOTANIN CHOAY

**Nature.** — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissoluble dans l'intestin en ses éléments anti-diarrhéiques : tanin et gélatine.

**Indications.** — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

**Formes pharmaceutiques et posologie :**

- 1° Pour nourrissons et jeunes enfants : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.
- 2° Pour adultes : Cachets dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Boîte de 20 paquets.

Boîte de 24 cachets.

**Laboratoire CHOAY**

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

## GÉLOTUBE 29

Le **GÉLOTUBE 29** contient la pommade prophylactique antivénérienne au cyanure de mercure suivant la formule du Dr GAUDUCHEAU.

Cyanure de mercure.....	0 gr. 125
Thymol.....	1 gr. 250
Calomel.....	25 gr.
Lanoline.....	50 gr.
Vaseline et huile de vaseline.....	24 gr.

Cette pommade est destinée à préserver de la Syphilis et de la Blennorrhagie l'homme qui vient de s'y exposer. Elle est logée dans un petit tube pointu à paroi de gélatine, renfermant une dose et permettant d'introduire une partie du contenu à l'entrée de l'urètre et de distribuer le reste sur les muqueuses externes.

Le **GÉLOTUBE 29** est accompagné d'un mode d'emploi rédigé par le Dr GAUDUCHEAU donnant tous les détails utiles pour accomplir correctement cette mesure d'hygiène. (Voir *Revue d'hygiène*, de 1919 à 1933.)

Prix : Boîte de 6 : 13 fr. 80.

**Laboratoire du GÉLOTUBE 29**

49, rue de Biche — COURBEVOIE (Seine).

## GELSÉMIUM TROUETTE-PERRET

**Teinture glycéro-alcoolique de**  
« *Gelsemium Sempervirens* ».

(Dose : 0 gr. 30 de plantes par 100 grammes.)

**Indications.** — Action antalgique et sédative dans toutes les **Névralgies** (Trijumeau, Sciatique, Dentaires) et particulièrement dans le Rhume des foins.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 21 fr. 20.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI°).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## GELS GASTRIQUES ET INTESTINAUX BEAUFILS

**Pansement adsorbant du tube digestif**

(Enregistré au Laboratoire de contrôle : 1950-1)

**Composition.** — Association, à la classique gélose-gélatine, de Gels siliciques et silico-aluminiques colloïdaux (polysilicates colloïdaux) à haut pouvoir recouvrant et adsorbant, 12 sachets de 8 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Grande capacité de recouvrement pour : es muqueuses, et grand pouvoir adsorbant (action physico-chimique) vis-à-vis des acides minéraux et organiques de fermentation, des toxines, etc.

**Indications.** — Inflammations et ulcérations des muqueuses digestives. (Ulcères, érosions intestinales, Gastrites, enterites, colites). Hyperchlorhydrie, hyperacidités. Fermentations, putréfactions.

**Mode d'emploi.** — 1 paquet de Gels gastriques et intestinaux dans une demi-tasse d'infusion chaude au gré du malade.

Prix au public : 24 fr. 60.

**Laboratoires des GELS MÉDICAUX**

Jean BEAUFILS, Pharmacien

Ex-interne, médaille d'or des hôpitaux de Paris, Licencié ès sciences.  
8, quai du Châtelet. — ORLEANS (Tél. : 44-13).

Dépôt général : O. C. P. 188, rue de Picpus, PARIS (XII°).

## GÉNACIDE

**Composition.** — Comprimés acigènes contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique ...	12 gr.	75
Chlorure ammonique .....	5 gr.	
Ac. phosphorique officinal....	1 gr.	35

Cinq grammes représentant comme coefficient d'acidité en  $\frac{N}{10}$  150 cc.

**Indications.** — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH). Colibacillose, Asthénie.

**Forme.** — Comprimés.

**Dose.** — 3 à 10 comprimés par jour.

Prix : 22 fr. 90.

**Laboratoire MONTAGU**

10, rue de La Barouillère — PARIS (6°)

(Tél. : Suf. 36-59.)

## GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux, Entérite muco-membraneuse.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr. Granules au 1/2 mgr. Ampoules à 2 mgr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 24 fr. 60.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière.

**Laboratoire AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65.)

## GÉNÉCARMINE

**Association de Phényléthylmalonylurée, Formine, Eséridine salicylate. Charbon animal et végétal.**

**Formule.** — 1 cuillerée à café de granulé contient : Phényléthylmalonylurée 0 gr. 02, Salicylate Eséridine 0 gr. 001, Charbon animal 0 gr. 50, Charbon végétal 1 gr., Formine 0 gr. 15.

**Présentation.** — Granulé fondant. Cachets. Dragées.

**Indications.** — *Troubles digestifs sympathicotoniques.* Entéro-colites, atonie gastro-intestinale, constipation chronique par atonie et leurs conséquences.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café ou cachets avant les repas.

**Prix :** Boîte modèle courant : 20 fr. 70. (Durée moyenne : 7 jours.) — Flacon Cure : 48 fr. 90.

**Laboratoire R. THIRODE**

**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,

33, Grande-Rue — BESANÇON

(Tél. : 30-37.)

## GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

Salicylate de Génésérine.

**Formes.** — Granules et dragées au 1/2 mgr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 mgr.

**Indications.** — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

**Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

Le flacon ou la boîte. Prix au public : 24 fr. 60.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

**LABORATOIRE AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65.)

## GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueur des tuberculeux.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr. Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte,  
24 fr. 60.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

**Formes.** — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 et à 10 centigrammes.

**Indications :**

**La douleur :** Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies, Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

**Mode d'emploi.** — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

**Comprimés :** 2 à 4 par jour. — **Ampoules :** 1 à 2 par jour.

**Prix :** La boîte de 7 ampoules de 4 cgr., 32 fr. 25.

Le flacon de 15 comprimés de 2 cgr., 32 fr. 25.

La boîte de 12 ampoules de 10 cgr. pour cure de démorphinisation, 117 fr. 30.

Chaque unité grand modèle correspond à un traitement de 7 à 10 jours, à dose journalière.

Laboratoire des Produits Amido

A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## GÉNOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.**

ÉTATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphaliques, Anesthésie chirurgicale.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.

Granules au 1/2 mgr.

Ampoules dosées à 3 mgr. et à 1 mgr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopamine à 3 mgr. suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 30 fr. 50.

La boîte d'ampoules : 39 fr. 90.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## GÉNOSTHÉNIQUES

**Ampoules, Granules. Gouttes.**

Cacodylate de Génomorphine et de Gènesérine  
Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémies.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

**Ampoules.** — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 27 fr. 50.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## GÉNOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

**Formes.** — Gouttes : XXX gouttes = 5 milligr.  
Granules à 0 gr. 002. Ampoules à 0,01.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.  
Dose injectable : une ampoule par jour.  
Le flacon ou la boîte : 21 fr. 40.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire **AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Archives 41-65.)

## GERMALPE

Germe de blé des Alpes, pur et non déshuilé.

Reconstituant vitaminé et phosphoré naturel.

Riche en sels minéraux, il apporte à la fois les vitamines A, B, D, E, P-P, et toute la gamme des composés phosphorés végétaux.

**Composition.** — GERMALPE renferme tous les principes actifs du germe de blé naturel. Stabilisé dans ses propriétés dynamogènes, sans aucune soustraction, il apporte à l'organisme, sous une forme directement assimilable, toutes les vitamines naturelles A, B, D, E, P-P, dont la présence est contrôlée par les méthodes biologiques et chimiques les plus sûres.

Sa composition chimique témoigne de sa richesse en éléments de construction et de réparation, spécialement en minéraux de qualité :

Eau.....	9,35	Manganèse.....	0,017
Matières grasses ou lipides.....	9,47	Magnésium.....	0,269
— azotées ou protéides.....	29,87	Calcium.....	0,072
Matières hydrocarbonées ou glucides saccharifiables (exprimés en amidon).....	45,45	Phosphore.....	1,196
Matières minérales ou cendres.....	4,46	Phosphore lipidique.....	0,094
Potassium.....	0,296	— nucléique.....	0,345
		— phytinique.....	0,496
		(soit exprimé en phytine.....	2,4 %
		Phosphore minéral.....	0,261)

**Indications thérapeutiques.** — GERMALPE est un énergétique puissant, reminéralisateur, stimulant de la nutrition et catalyseur des oxydo-réductions de l'organisme. Sa tolérance est parfaite, même pour les estomacs les plus délicats ; son action rapide est contrôlable en quelques jours.

GERMALPE est spécialement indiqué dans le régime des anémies, dépressions, déficiences, asthénies de toutes origines, amaigrissement, surmenage, impuissance, convalescence, neurasthénie, perte de la mémoire, gestation, allaitement, troubles des métabolismes phosphorés, calcique et magnésien.

A conseiller aux diabétiques, dont il améliore l'état, et qui, grâce à son emploi, peuvent arriver à diminuer ou suspendre l'usage de l'insuline (Marcel LABBÉ, NEPVEUX et GRÉGOIRE).

GERMALPE ne comporte aucune contre-indication.

### Posologie et mode d'emploi :

Du 8 <sup>e</sup> mois au sevrage.....	1 gr. par biberon.
Du sevrage à 2 ans.....	2 gr. par biberon.
De 2 à 10 ans.....	1 cuillerée à café.
De 10 à 15 ans.....	1 cuillerée à dessert.
Adultes.....	1 cuillerée à soupe.

Ces doses peuvent être répétées deux à trois fois par jour, à n'importe quel moment : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner ou entre les repas.

On peut délayer GERMALPE dans l'eau, la boisson, le potage ou en saupoudrer les aliments habituels, dont il n'altère pas la saveur.

**Important.** — GERMALPE perd une partie de son efficacité à la cuisson.

**Prix :** La boîte : 25 francs.

**Établissements GERMALPE**

L. BONNET, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Université de Lyon,  
LARAGNE (Hautes-Alpes).

Dépôt central : 44, rue Blanche — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Trinité 09-80.)

## GERMIDEX

Pâte cicatrisante vitaminée.

Composition :

Huile de germe de blé (vitamines A et E) : 5 gr. ; Sulfate de magnésie : 1 gr. ; Carbonate de magnésie : 5 gr. ; Essence de géranium : 5 gouttes ; Excipient spécial : Q. S. pour 100 gr.

**Action thérapeutique.** — Spécifique des dermatoses, plaies, brûlures et ulcérations nécessitant un puissant agent de régénération épithéliale. Régénératrice des tissus et anti-infectieuse par la vitamine A, cicatrisante par la vitamine E, la pâte GERMIDEX constitue un pansement biologique particulièrement efficace.

**Indications.** — Plaies atones, Ulcères variqueux, Eschares, Fistules, Brûlures, Pyodermites, Crerasses des seins, Engelures, etc.

**Mode d'emploi.** — Faire de larges applications en faisant pénétrer la pâte, le cas échéant, dans les anfractuosités des lésions. En cas de plaies, s'abstenir autant que possible d'épluchage et d'applications antiseptiques.

Prix : 18 fr. 10 le tube de 50 gr. environ.

Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETRÉFA »

R. GOUIN et J. COULET, Pharmaciens.

H. LUZUY, Docteur en Pharmacie,

Administ. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## GERMIDOR

Germe de blé pur, stabilisé.

Composition :

Vitamines : A (de développement, anti-infectieuse). B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup>, B<sup>6</sup> (antinévritique, d'utilisation nutritive et cellulaire).

E (de reproduction).

P (d'intégrité dermique).

Phosphates calco-magnésiens directement assimilables, fer, cuivre, lécithines.

**Propriétés.** — Facteur de stimulation physiologique générale, recalcifiant, neurotonique, laxatif.

**Indications.** — Tous les cas où il faut relever l'état général de façon atoxique : carences vitaminiques graves ou frustes, précurrences, déficiences organiques, troubles de la croissance, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescences, notamment à la suite des maladies infectieuses, états pré-tuberculeux et tuberculeux, adénopathies, grossesse, allaitement. Certain sont troubles des fonctions digestives, constipation (action laxative sans accoutumance), anorexie, colites. GERMIDOR doit être administré au cours des régimes alimentaires trop stricts (colitiques, hépatiques, cardio-rénaux) ; chez les diabétiques, GERMIDOR augmente la tolérance aux hydrates de carbone.

Posologie :

a) GERMIDOR entier.

Enfants : 1 cuillerée à café à 1 cuillerée à dessert 2 fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe à 2 fois par jour.

b) GERMIDOR pulvérisé. (Chaque boîte contient une mesure pour 1/2 gramme.)

Du 6<sup>e</sup> mois au sevrage : 1/2 gramme par biberon 3 à 4 fois par jour.

Enfants : 2 gr. (1/2 cuillerée à café) à 4 gr. (1 cuillerée à café) 2 fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à dessert (6 gr.) 1 à 2 fois par jour.

GERMIDOR pulvérisé convient seul aux nourrissons. Il a l'avantage, pour tous, de disparaître mieux que « l'entier » dans boissons et aliments auxquels il est incorporé.

GERMIDOR se mélange simplement aux aliments ou boissons sans cuisson.

Prix :

GERMIDOR entier :

21 fr. 40 la boîte P. M. (220 grammes environ).

GERMIDOR pulvérisé :

19 fr. 20 la boîte P. B. (200 grammes environ).

Toutes pharmacies.

Enregistré au L. N. C.

Laboratoires du GERMIDOR

GRASSE (Alpes-Maritimes).

## GERMINOL

**Présentation.** — Pastilles en étuis métal (19 fr. 50).

**Principes actifs.** — Inositolphosphate de chaux et de magnésie, phosphate de manganèse, protoxalate de fer, huile de foie de morue concentrée.

**Indications.** — Anémies de toutes origines, Retard de croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Amaigrissement, Dépression nerveuse.

**Mode d'emploi.** — a. *Enfants* : 3 pastilles par jour absorbées dans une gorgée d'eau, ou dans de la confiture, du miel, de la marmelade ou dans le potage.

b. *Adultes* : 6 pastilles par jour absorbées comme ci-dessus.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-46.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## GERMOSE

Gouttes à base de Fluorure de sodium stabilisé dans des extraits végétaux. Non toxique. Goût agréable.

**Indications.** — Employée contre la Coqueluche, dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émettante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Gripes pulmonaires, etc.

**Propriétés.** — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Non toxique. Sans action nuisible sur le tube digestif, ce qui en facilite l'emploi même chez les nourrissons.

**Forme.** — Gouttes concentrées :

Doses habituelles dans les 24 heures : jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires LEBEAULT**

BESINS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GESTORMONE

Hormone synthétique du corps jaune.

**Indications.** — Avortements à répétition, Certaines stérilités, Dysménorrhées, Ménorragies, Troubles de la ménopause.

**Présentation.** — Solution huileuse dosée à 5 ou 10 mgr. par cc.

Boîtes de 3 ampoules de 5 mgr..... **Prix** : 85 francs.  
Boîtes de 3 ampoules de 10 mgr.... **Prix** : 150 francs.

**Posologie.** — En général, faire les injections dans la deuxième moitié de la période intermenstruelle. Les doses à employer varient selon les cas de 5 à 10 mgr. par jour.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires.

**GESTORAL** : comprimés actifs par voie buccale.

Tube de 10 comprimés de 5 mgr.... **Prix** : 45 francs.  
de 25 comprimés de 5 mgr.... — 95 francs.  
de 50 comprimés de 5 mgr.... — 170 francs.  
de 25 comprimés de 10 mgr.... — 170 francs.

**Posologie.** — De 2 à 40 mgr. par jour.

Laboratoire pour la  
Diffusion des Produits synthétiques,  
Léonce GODEAU, Pharmacien,  
73, rue Dufot — PARIS (XV°).

## GLANDÉNAL

Association d'un complexe endocrinien à la phényl-éthyl-malonylurée.

L. N. C. M. n° 308-7.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Phényl-éthyl-malonylurée, cortico-surrénale, cratægus, thyroïde, extrait orchitique, extrait ovarien.

**Indications.** — Anxiété, Angoisse, Irritabilité, Neurasthénie, Insomnies nerveuses, Erythème cardiaque, Spasmes, Troubles thyroïdiens.

**Emploi.** — 4 à 6 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

**Laboratoires du GLANDÉNAL**

## GLANDEX PHOSCALCIQUE

**Forme.** — Granulé.

**Formule.** — Ergostérine irradiée, Parathyroïdine Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

**Indications.** — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.  
*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 24 fr. 40.

### Autres GLANDEX :

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

Glandex Orchitique, Thyro-Ovarien.  
Ovarien, Pluriglandulaire M. et F.,  
Thyroidien, Entéroglandex.

**Laboratoires M. A. ROUX**

58, rue de Maubeuge — PARIS.  
(Tél. : Trudaine 54-69.)

## GLANDIMBINE LAFRAN

**Indications.** — Impuissance génitale précoce ou sénile. Dépression morale ou physique.

**Composition.** — Yohimbine, 0,005 ; Cérébrine, 0,10 ; Orchitine, 0,15 pour un comprimé dragéifié.

**Posologie.** — (Pour adultes seulement).  
Un comprimé le matin, un à midi, un le soir au repas et un au coucher, si nécessaire.  
Avaler avec un peu d'eau ou autre liquide.  
Littérature et échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 34 francs.

**Laboratoires LAFRAN**

8, rue de Prague — PARIS (XII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Diderot 36-78.)

## GLANDOCALCOYL

**Recalcifiant. — Reminéralisateur.**

**Composition.** — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, diphosphate tricalcique et poudre d'os frais.

**Indications.** — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et prétuberculose.

**Formes.** — Pour adultes : cachets ; pour enfants : granulé.

**Doses.** — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : Cachets, 15 fr. 60 ; Granulé, 17 fr. 20

Enreg. au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 219-4 et 219-5.

**Laboratoires CALMEL-DOMERQUE**

S. A. R. L. au capital de 300.000 francs.  
20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

## GLÉFINA

Puissant reconstituant général de **savoir agréable**.  
Parfaitement toléré et assimilé en toutes saisons.

**Composition.** — A base d'extraits d'huile de foie de morue, d'extraits de malt et d'hypophosphites associés.

**Propriétés.** — Reconstituant énergétique et d'action durable, remplace l'huile de foie de morue dans toutes ses indications.

Est parfaitement digéré, toléré et assimilé l'été comme l'hiver.

**Indications.** — Toutes déficiences légères ou profondes, anémies, lymphatisme, tuberculose et prétuberculose, convalescences post-opératoires, post-gravidiques, etc...

### Posologie :

*Enfants* : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.  
6 à 10 — : 2 à 3 — à dessert —  
11 à 15 — : 2 — à soupe —  
*Adultes* : 3 — — —

**Gléfin** est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N<sup>o</sup> 689-4.

Prix du flacon : 25 fr. 15.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

**Laboratoire du GLÉFINA,**

348, rue Saint-Honoré — PARIS.



## GLÉSOL

### Traitement des Infections à staphylocoques.

**Composition.** — Extrait total de levure de bière (Levurine extractive), Soufre colloïdal, Étain colloïdal.

**Présentation.** — Deux formes : capsules enrobées (50 par flacon) et (pour les petits enfants) granulé sucré (40 gr.).

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Abscès, Phlegmons, Orgelets, Acné, Impétigo, Pyodermites, toutes éruptions cutanées à staphylocoques.

**Posologie.** — Dose d'attaque : 20 à 25 capsules par jour en 5 ou 6 prises, jusqu'à évolution favorable.

Doses décroissantes en cours d'amélioration.

Granulé : 1 à 8 mesures par jour selon le cas à traiter et l'âge de l'enfant.

Prix : 33 fr. 50 pour 3 à 7 jours de traitement.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

## GLOBEXINE

**Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique.** Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable.

Jamais d'anaphylaxie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénération globulaire intensive.

**Indications.** — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toute nature. Convalescences.

**Forme.** — Ampoules buvables 10 cc. et sirop à l'orange.

**Dose moyenne :**

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules ou cuillers à dessert de sirop par jour. — *Enfants* : 1/2 dose. Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 21 fr. 70 ; le flacon de 210 cc. de sirop : 22 fr. 20.

Fabrication assurée.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, Pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

## GLOBINOFER « ROCHE »

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

ℓ-Tryptophane .....	2 mg. 50
Monochlorhydrate de ℓ-histidine .....	5 mg. 00
Globine .....	16 mg. 00
Globine ferrique .....	66 mg. 00
Globine cuprique .....	3 mg. 30
Globine manganique .....	6 mg. 60

Excipient : Q. S. pour un comprimé de 15 centigr.

**Action.** — Thérapeutique équilibrée et totale de l'anémie, représente une véritable révolution hématologique, car, pour la première fois, l'hématopoïèse est, grâce à lui, placée sur son véritable terrain : celui du métabolisme (travaux des prof. Fontès et Thivolle).

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les anémies par spoliation sanguine, par hémolyse, par carence martiale. Anémie du paludisme, des infections, des parasitoses intestinales. Anémie du nourrisson, du donneur de sang, etc. *Toutes les indications du fer* (chlorose, puberté, grossesse, allaitement, diarrhées chroniques, etc.). *Toutes les indications de l'acidaminothérapie* (inappétence, maigreur, déficiences organiques, ulcères gastro-duodénaux, etc.).

Aucune contre-indication.

**Avantages.** — Les comprimés de Globinofer « Roche » sont inaltérables, sans aucune odeur et sans aucune saveur ; ils sont toujours admirablement supportés par le tube digestif et ils permettent, sans aucun inconvénient, un traitement intensif et prolongé.

**Posologie et mode d'emploi :**

*Nourrissons* : 2 comprimés par jour dans du lait.  
*Enfants* : 2 comprimés 2 fois par jour dans de l'eau.

*Adultes* : 2 comprimés ingérés tels quels au moment des 3 repas.

**Comprimés.** — Flacon de 60.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-80.

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## GLOBIRON BUVALE

**Composition.** — Hémopylore « 3 » organométallique (complexe globinique cupro-mangano-ferreux dissous dans de l'Hémopylore « 3 » pur).

3 cc. correspondent à	6 gr.	de foie frais.
	6 gr.	d'estomac frais.
	6 gr.	de levure de bière fraîche.
	0 gr. 10	de globinate de fer.
	0 gr. 01	de globinate de manganèse.
	0 gr. 001	de globinate de cuivre.

**Propriétés.** — Synergie anti-anémique associant le pouvoir érythropoïétique de l'Hémopylore « 3 » (méthodes combinées de Whipple, de Castle et de Wills) aux éléments organométalliques nécessaires à la constitution du pigment sanguin.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 3 cc.

La boîte de 14 ampoules ..... 42 fr.

Le coffret de 30 ampoules .... 88 fr.

### Posologie :

*Adultes* : 2 à 4 ampoules par jour.

*Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.

A prendre au début des repas, soit pur, soit dans un peu d'eau sucrée.

**Indications.** — Toutes anémies. Anémies hypochromes (chlorose). Carences martiales (aménorrhée). Traitement d'entretien des anémies graves traitées par l'Hémopylore « 3 ». États hémorragiques. Asthénie. Anorexie. Convalescences.

### Laboratoire ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 fr.

Louis FERRAND,

Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris,  
Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, avenue Marceau —  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élys. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch —  
AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

## GLOBULES RÉBAUD

### Composition.

Éphédrine chlorhydrate .....	0 gr. 15
Arrhénal .....	0 gr. 03
Iodure de caféine bromuré .....	7 gr. 20
Extrait sec polygala .....	0 gr. 12
— — lobélia .....	0 gr. 03
— — cratægus .....	0 gr. 12
— mou d'opium .....	0 gr. 03
— — belladone .....	0 gr. 03

pour 30 globules.

Même composition pour la liqueur Rébaud, destinée aux malades ne pouvant avaler les pilules.

**Doses.** — Deux globules ou XL gouttes, trois fois par jour : avant les repas de midi ou du soir et deux heures après le dîner.

**Indications.** — Les Globules Rébaud suppriment peu à peu les crises d'asthme, l'emphysème, les dyspnées, bronchites chroniques.

Prix : 18 francs.

Pharmacie ARDOIN

33, boulevard Dubouchage — NICE (A.-M.).

## GLOBULES ROMON

### Médication rationnelle de l'Impuissance.

**Deux formes.** — Globules glutinisés et ampoules injectables.

**Composition.** — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'yohimbine et au phosphore de zinc pur.

**Propriétés.** — Puissant stimulant du système nerveux et du système génital. Tonique général.

**Indications.** — Asthénie, Sénilité précoce, Dépression physique et intellectuelle, Impuissance.

### Posologie :

*Globules* : 4 à 6 par jour.

*Ampoules* : Une injection tous les deux jours.

Le flacon de 40 globules : 35 fr. 20.

La boîte de 10 ampoules : 58 fr. 60.

MONAL, Docteur en Pharmacie

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 52-73.)

## GLOTTARSINOL

Collutoire au Novarsénobenzol (1 gr. 60 p. 100), à l'extrait fluide d'Arnica Montana, au Citrate de Soude et au Miel d'abeilles.

**Indications thérapeutiques.** — Angines rouges, Angines de Vincent, Angines pseudo-membraneuses, Angines herpétiques, Gingivites, Stomatites, etc.

**Mode d'emploi.** — En badigeonnages très légers sur les amygdales ou sur les gencives. En instillations nasales : III gouttes dans chaque narine, matin et soir.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL-PARIS.

## GLOTTYL

**Composition.** — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

**Formes pharmaceutiques.** — Gouttes et Dragées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

**Indications.** — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

**Posologie.** — Gouttes : *Jeunes enfants* : X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

*Enfants* : XX à XXX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour

*Adultes* : XL à LX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : *Enfants* : 3 à 6 dragées par jour.

*Adultes* : 6 à 12 dragées par jour.

Durée moyenne des unités de vente :  
4 à 6 jours.

Prix : 17 fr. 60.

**Laboratoires R. DENIS**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 75-60.)

## GLOXINES

### Protéinothérapie des tumeurs.

**Composition et présentation.** — Protéines spécifiques purifiées, extraites de sang et de tissus néoplasiques, puis diluées en solution physiologique. Ampoules de 1 centicube.

**Propriétés.** — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Elles améliorent l'état général des malades et exercent à la longue une action locale sur les cellules cancéreuses, qu'elles ramènent vers une évolution normale.

**Indications.** — Associées à un traitement local (chirurgie, rayons X ou Radium), les GLOXINES le préparent et le complètent, diminuant ainsi les risques de récurrence ou de métastase. Elles ne sont à employer seules que lorsque tout traitement local est impossible ou contre-indiqué.

**Posologie.** — Traitement de base : deux ampoules par jour, à 12 heures d'intervalle, à boire dans un peu d'eau 1/2 heure avant le repas. On peut lui adjoindre l'injection intradermique quotidienne, bihebdomadaire ou hebdomadaire du contenu d'une de ces ampoules dont la solution isotonique et stérile convient également à ce mode d'administration.

**Durée du traitement.** — Il doit être prolongé sans interruption tant que la guérison ne peut être considérée comme acquise. La continuité du traitement et sa longue durée sont les conditions nécessaires de son efficacité.

**Choix des Gloxines.** — Employer les GLOXINES correspondant à la variété de tumeur qu'il s'agit de traiter (voir liste ci-contre). Pour le traitement des métastases, utiliser les GLOXINES se rapportant au type de la tumeur primitive.

Dans tous les cas où les GLOXINES spécifiques ne peuvent être utilisées, employer les GLOXINES POLYVALENTES.

### LES GLOXINES POLYVALENTES

**Composition et présentation.** — Protéines extraites de tumeurs de types très variés, diluées à parties égales en solution physiologique. Ampoules de 1 centicube.

**Indications.** — Elles sont à employer lorsqu'on ne sait quelles GLOXINES spécifiques prescrire. L'expérience montre que les malades bénéficient de l'extrait qui leur convient et n'éprouvent aucun effet des autres extraits.

**Posologie et durée du traitement.** — Identiques à celles des GLOXINES. Elles doivent aussi être employées en traitement continu et longtemps prolongé.

## LISTE DES GLOXINES

O. C. P. Dépositaire général.

- N° 1. *Épithéliomas épidermoïdes* (bouche, langue, lèvres et orifices naturels).
- N° 2. *Estomac* (cancers épithéliaux).
- N° 3. *Gros intestin, rectum* (épithélioma cylindrique).
- N° 4. *Ovaire* (épithélioma wolfien).
- N° 5. *Ovaire* (épithélioma germinatif).
- N° 6. *Peau* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés).
- N° 7. *Peau* (épithélioma baso-cellulaire).
- N° 8. *Prostate* (adénomes et épithéliomas).
- N° 9. *Sein* (épithélioma type ordinaire).
- N° 10. *Thyroïde* (épithélioma).
- N° 11. *Utérus-col* (épithéliomas à cellules cylindriques et baso-cellulaires).
- N° 12. *Utérus-col* (épithéliomas spino-cellulaires ou épidermoïdes).
- N° 13. *Utérus-Corps* (épithéliomas à cellules cylindriques).
- N° 14. *Chondrosarcome*.
- N° 15. *Vessie* (épithélioma).
- N° 16. *Vésicule biliaire* (épithélioma).
- N° 17. *Rein* (épithélioma à cellules claires).
- N° 18. *Lymphocytome*.
- N° 19. *Sarcomes* (à petites cellules et à cellules polymorphes).
- N° 20. *Testicule* (séménome).
  - A. *Léiomyome malin*.
  - B. *Parotïde* (tumeur mixte).
  - D. *Ovaire* (séménome).
  - E. *Ovaire* (sarcome provenant des cellules à lutéïnes).
  - G. *Fibrosarcome*.
  - H. *Maladie de Hodgkin*.
  - K. *Sein* (sarcome).
  - L. *Sein* (épithélioma à grosses cellules).
  - M. *Sein* (épithélioma à cellules cylindriques).
  - N. *Testicule* (épithélioma wolfien).
  - O. *Nævome achromique*.
  - P. *Nævome mélanique*.

**GLOXINES POLYVALENTES** (composé des variétés ci-dessus).

### Présentation :

Boîte de 20 tubes scellés d'un centicube. 29 fr. 30  
Boîte de 60 tubes scellés d'un centicube. 79 fr. 30

### Laboratoire des GLOXINES

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 93-94.)

## GLUCALCIUM

### Ampoules et Granulé.

Solution Isotonique à 10 p. 100 de *Gluconate de calcium pur*. Chimiothérapie intégrale de l'ion calcium par injections intramusculaires et intraveineuses.

Le *Glucalcium* est un sel organique de Calcium très pur qui possède toutes les propriétés de l'ion Ca et permet l'administration de fortes doses de calcium sans intolérances ni réactions locales ou générales.

Dans toutes les affections du système neuro-végétatif, Maladies anaphylactiques, Tuberculose, Hémorragies, Hémophilie, Décalfications et dans la médication antichoc.

### Posologie :

*Traitement d'entretien* : 1 ampoule de 10 cc. tous les jours.

*Doses massives* : 1 à 3 ampoules de 10 cc. tous les jours.

*Enfants* : 5 cc. tous les jours ou tous les deux jours.

*Médication antichoc* : Injections mixtes dans la même seringue.

Complètement indolore et ne donnant lieu à aucun phénomène hémoclasique.

### Composition du Glucalcium granulé « per os » :

Gluconate de calcium	10 gr. 00	Parathyroïdes .....	0 gr. 01
Inosite-hexaphosphate de chaux et de magnésie.....	4 gr. 00	Hypophyse totale.....	0 gr. 10
Ergostérine irradiée (vitamines D) pure		Surrénales .....	0 gr. 50
40 m U. S. I. au gr.	0 gr. 005	Thymus .....	0 gr. 20
		Extrait fluide de Kola .	0 gr. 10
		Extrait fluide de Panax	
		Ginseng .....	0 gr. 10

Par ses composants Calco-fixatifs créés pour répondre aux plus strictes exigences de la thérapie de minéralisation, le *Glucalcium* est indiqué dans :

Faiblesse générale, Lymphatisme. Asthénie, Surmenage, Pré-tuberculose, Tuberculose, Déminéralisation, Phosphaturie, Carie dentaire, Croissance, Fractures, Ossifications, Allaitement, Rachitisme, Dentition, Grossesse.

L'administration du *Glucalcium* par voie buccale est entièrement assimilable.

### Posologie :

*Adultes* : 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

*Prix* : 6 ampoules de 5 cc. : 22 francs ; 5 ampoules de 10 cc. : 25 francs.  
Granulé : la boîte : 24 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M., sous les nos 1814-13 et 14.

**Laboratoires CLEVENOT et ROSSO**

P. CLEVENOT, pharmacien

3, rue Lamblardie — PARIS.

(Tél. : Dor. 56-38.)

## GLUCOBIOCALCIUM ROSSO

### Voir Calcium Rosso.

Chimiothérapie organo-calcique par injections intramusculaires et intraveineuses

Aggréé par le Conseil supérieur de Santé du ministère de la Marine, expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

Fournisseurs des sanatorium et hôpitaux.

**Laboratoires CLEVENOT et ROSSO**

P. CLEVENOT, pharmacien

3, rue Lamblardie — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Dor. 56-38).

## GLUCOCHAUX

### Composition :

Gluconate de chaux pur .....	20 gr.
Inosite phosphate de chaux et Magnésie .	1 —
Formiate de chaux, Hypophosphite de chaux et Magnésie .....	1 —
Excipient sucré et aromatisé pour .....	100 —

**Formes. — Granulé et cachets.**

**Indications. —** Calcifiant organique puissant, indiqué dans tous les cas de déminéralisation et de dénutrition. Grossesse et allaitement.

Croissance et ossification.

Phosphaturie et carie dentaire.

Fractures, Asthénie et Convalescence.

**Doses : Enfants** : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

**Adultes** : 2 cuillerées à soupe ou 2 à 3 cachets par jour.

### Prix :

Granulé : 19 fr. 50; cachets : la boîte de 24 : 10 fr. 60.

Durée du flacon : 8 jours environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1284-1.

**A. MIRONNEAU, Pharmacien.**

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres — (Tél. : 18.)

## GLUCOCITHINE

### Composition :

Gluconate de calcium..... 10 gr.  
Lécithine d'œufs ..... 2 —  
Pour 100 grammes granulé.

**Présentation.** — Granulés simples.

**Indications.** — Asthénie, anorexie, surmenage, épuisement nerveux, impuissance fonctionnelle, sénilité, rachitisme, états pré-tuberculeux, tuberculose, phosphaturie, diabète, etc.

**Posologie.** — Granulés :

*Adultes* : 2 cuillerées à café pendant le repas.

*Enfants* : 1 cuillerée à café pendant le repas.

*Nourrissons* : 1/2 cuillerée à café délayée dans du lait tiède.

**Laboratoires LEBEAULT**

BESINS et C<sup>ie</sup>

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GLUCONYL

**Composition.** — Gluconate de calcium (C<sup>10</sup> H<sup>14</sup> O<sup>11</sup>)<sup>2</sup> Ca.

**Indications.** — Toutes les indications du calcium soluble découlant de ses propriétés recalculifiantes, anti-hémorragique, diurétique, déchlorurante, antiphlogistique, équilibrante du système vaso-sympathique.

### Présentation :

*Solution à 10 % concentration :*

- 1<sup>o</sup> Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 2<sup>o</sup> — 5 cc. : boîte de 10 ampoules.
- 3<sup>o</sup> — 10 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 4<sup>o</sup> — 10 cc. : boîte de 10 ampoules.

*Solution à 20 % concentration*

- 1<sup>o</sup> Ampoule de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 2<sup>o</sup> — 10 cc. : — 6 ampoules.

1<sup>o</sup> Cachets simples : boîte de 18 cachets.

2<sup>o</sup> — à la vitamine D : boîte de 18 cachets.

1<sup>o</sup> Granulés simples : boîte de 125 grammes.

2<sup>o</sup> — à la vitamine D : boîte de 125 grammes.

### Posologie :

*Ampoules* : 5 à 10 cc. par jour (intramusculaire ou intraveineux).

*Granulés* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

*Cachets* : 1 à 4 cachets par jour.

*Enfants* : 1/2 doses.

**Laboratoires LEBEAULT**

BESINS et C<sup>ie</sup>

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GLUCOPLIX

**Composition.** — Solution stable de gluconate de calcium chimiquement pur à 10 %.

### Présentation :

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. pour injections intra-veineuses ou intra-musculaires.

Boîte de 12 ampoules de 10 cc. pour injections intra-veineuses ou intra-musculaires.

**Propriétés.** — Recalcifiant, anti-hémorragique, diurétique et déchlorurant, antiphlogistique.

**Indications.** — Maladies s'accompagnant de décalcification et, notamment : états pré-tuberculeux, tuberculose pulmonaire et osseuse, affections hémorragiques, affections s'accompagnant d'épanchements ou d'œdèmes. Inflammations. Rhumatismes. Déséquilibre neuro-végétatif, anaphylaxie. Dermatoses.

**Posologie.** — Les injections doivent être intra-veineuses ou intra-musculaires profondes (dans la fesse).

*Adultes* : 1 ampoule de 5 ou 10 cc. tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

*Enfants* : 2 à 5 cc. tous les jours ou tous les deux à trois jours.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## GLUCOSALYL

**Puissant traitement d'attaque  
du Rhumatisme Articulaire Aigu.**

**Composition.** — Chaque ampoule de 10 cc. contient : Salicylate de Soude, 1 gr. ; Glucose anhydre, 1 gr. ; Thiosinamine, 0 gr. 04.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Rhumatisme Articulaire Aigu et à forme extra-articulaire. Manifestations cardiaques et oculaires rhumatismales ; 2<sup>o</sup> Maladies nerveuses, Encéphalite léthargique, Poliomyélite, Sclérose en plaques ; 3<sup>o</sup> Syndromes mentaux fébriles ; 4<sup>o</sup> Maladies infectieuses.

**Posologie.** — Injections strictement intraveineuses. Aiguille de 7/10 courte. 1 à 4 ampoules par jour pendant 4 ou 5 jours.

**Important.** — Toujours associer à la médication salicylée intraveineuse la médication salicylée *per os*, soit sous forme Entérosalyl (Salicylate de Soude pur en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin), soit sous forme Sulfosalyl (Polysalicylates, Soufre et Calcium, associés à l'Opothérapie à dose minime).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 1001-17.

**Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismales**

**SAREIN**

14, avenue Perrierhont — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

## GLUCOXYL NACHER

Antidiabétique nouveau par voie buccale.

**Composition.** — Tasi, plante de la République Argentine, dont l'alcaloïde Morrénine (Arata) augmente la sécrétion des cellules endocrines et par ses vitamines B2 et B3 favorise puissamment le métabolisme des glucides, Formiate de Quinine, Codéine, Arséniate de soude, Carbonate de lithine (Lab. National contrôle 1027-1).

**Propriétés thérapeutiques.** — Disparition des céto-acidoses, rétablissement du pH normal du sang et de la glycémie, maintien de la réserve alcaline, suppression de la glycosurie. reprise de l'activité physique et intellectuelle, augmentation de la tolérance hydrocarbonée.

**Indications.** — Diabète (bénin ou grave), Diabète infantile, Grossesse diabétique (peut s'associer à la médication insuliniennne).

**Avantages.** — Traitement commode. Résultats contrôlables. Pas d'intolérance. Pas de contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Deux cachets par jour, avant les repas, midi et soir.

**Prix :** Boîte cure 20 jours : 41 fr. 40 (40 cachets).  
Demi-boîte : 23 francs (20 — )

Laboratoire NACHER,  
Pharmacien licencié es sciences,  
71, boulevard Carnot — TOULOUSE.

## GLUTHIONAL

Troubles du métabolisme soufré.  
Etats arthritiques. — Insuffisances hépatiques.

Formule :

Méthyltrithioglycolate de Magnésium.....	0 gr. 10
Extrait biliaire dépigmenté et décholestériné .....	0 gr. 05
Extrait de levure de bière .....	0 gr. 002
Dextrose .....	0 gr. 05
Excipient, Q. S. pour un comp. glut.enrobé, terminé à ..	0 gr. 50

**Forme :** Comprimés.

**Avantages.** — Par sa teneur soufrée importante (27 p. 100 environ d'un soufre organique non oxydé et particulièrement assimilable), ce médicament permet une véritable recharge en soufre de la cellule hépatique, des tissus et des humeurs. Aucune toxicité.

**Indications.** — Etats arthritiques, rhumatismes chroniques. Maladies du foye et des voies biliaires. Insuffisance hépatique sous toutes ses formes, Angiocholites et Cholécystites, Lithiase biliaire, Dyspepsies et troubles intestinaux secondaires aux troubles hépatiques, Troubles auto-toxiques et états allergiques.

Adjuvant du traitement arsenical et mercuriel, Dermatoses d'intolérance, Catarrhes chroniques des voies respiratoires.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour avant les principaux repas.

Laboratoires CADUCIA  
Y. JUND, Docteur en Pharmacie,  
78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).  
(Tél. : Michelet 33-78.)

## GLUTINETTES D'ASPIRINE

**Composition.** — Comprimés glutinisés dosés à 0.25 d'Aspirine.

**Avantages.** — Suppriment les causes d'irritation possibles de l'estomac avec les cachets et les comprimés, les **Glutinettes d'Aspirine** traversant l'estomac et ne se dissolvant que dans le milieu alcalin du duodénum.

**Tolérance gastrique absolue.** Rapidité d'action, facilité d'absorption.

**Indications.** — Toutes celles de l'Aspirine : névralgies, migraines, affections rhumatismales, grippe, fièvre, etc...

**Mode d'emploi.** — 1 à 12 dans les 24 heures avant les repas ou dans leur intervalle, dans de l'eau, ou en les déglutissant en même temps qu'un peu de salive.

Société des Laboratoires de MONTMOROT  
G. de MONTMOROT, pharmacien  
12 bis, rue Keppler — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## GLUTISALYL

Comprimés glutinisés de 1 gr. de salicylate de soude.

**Avantages.** — Facilité de posologie, plus de goût à l'absorption, plus de troubles gastriques, la désintégration du comprimé se faisant dans l'intestin.

**Mode d'emploi.** — Les comprimés doivent être avalés sans être croqués.

Prendre dans la journée une cuillerée à café de bicarbonate de soude.

**Indications.** — Celles du salicylate de soude.

**Prix :**

50 comprimés dont 50 grammes de produit actif :  
24 fr. 15.

J. BARAIGE, Docteur en Médecine  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
24, rue Paul-Bert. — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roq. 21-22 et 01-88.)

## GLUXIUM

Équilibré Minéral Vitaminisé.  
Un Dynamogène.

**Composition.** — Gluconate de Calcium, Chlorure de Magnésium, Acide Phosphorique, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Citrate de fer ammoniacal, Extrait aminé de Levure de bière, riche en Vitamine B1, Vitamine C pure.

**Indications.** — Toutes dépressions physiques et nerveuses, Asthénie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Fatigue générale, Convalescence, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies nerveuses, Syndromes pluriglandulaires, Dysménorrhée, Règles douloureuses, Troubles de la Ménopause, Rhumatisme chronique, etc.

**Forme.** — Solution équilibrée physiologiquement, de goût agréable, présentée en flacons de 20 grammes.

**Posologie.** — *Adultes*: XX à XXX gouttes dans un demi-verre d'eau, au début de chacun des repas.  
*Enfants*, au-dessous de 12 ans : 1/2 dose.

Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE  
LAURENÇON et Cie

11, rue François-Giraud  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Z. O. : 1, rue Benoît-Sourigues — BAYONNE (B.-P.).

## GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

**Indications.** — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervein. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

**Dose.** — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de La Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,125 centigr. par cuiller-mesure. Ampoules injectables dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

**Indications.** — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## GLYCOCURE

**Forme.** — Pilules.

**Composition.** — Géranium Robert, Jambul, Noyer sauvage, Gentiane, Pyrole ombellée.

**Indications.** — Diabète, Glycosuries.

**Posologie.** — 3 pilules le matin, 3 pilules à midi, 3 pilules le soir à prendre avant les repas.

Laboratoire de Thérapeutique Générale  
du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER.



## GLYCO-M.

**Composition.** — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution de Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria. Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

**Propriétés particulières.** — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant, et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

**Indications.** — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des toins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

**Gencives spongieuses et maladies buccales.** — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

**A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :**

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical, et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

La pipette KANAR : 8 fr. 30.

Le flacon de 100 grammes : 8 fr. 30 (modèle de poche).

**Laboratoire GLYCO-M.**

**Georges Miquel, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.**

1, avenue Lowendal — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 16-85.)

## GLYCOSTHÈNE

Solution de Glycocolle à 2 p. 100.

### Toutes les MALADIES du MUSCLE

Myasthénies — Myalgies — Courbatures

**Tonifie la fibre MUSCULAIRE**  
**Répare les tissus MUSCULAIRES**  
**Détend les spasmes MUSCULAIRES**  
**Calme les algies MUSCULAIRES**

1 à 2 ampoules par jour, en injections intramusculaires.

**Laboratoire du MYORAL**

5, rue Saint-Roch — PARIS (1<sup>er</sup>).

## GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN Co.

**Traitement des affections de toutes les muqueuses.**

### Composition :

Perborate de Soude.....	0 510
Thymol.....	0 037
Menthol.....	0 037
Benzoate de Soude.....	2 040
Bicarbonate de Soude.....	2 040
Cajeputol.....	0 075
Salicylate de Soude.....	0 090
Huile de Pin.....	0 037
Huile de Bouleau.....	0 030
Excipient.....	95 104
	<hr/> 100 000

**Avantages.** — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

**Action thérapeutique.** — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel de sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

**Indications.** — *Voies digestives* : Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

**Cavité buccale** : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

**Pharynx et gorge** : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

**Voies nasales** : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

**Yeux** : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

**Maladies de la peau** : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

**Rectum et région anale** : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

**Gynécologie et Obstétrique** : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

*Plaies de toute nature.*

**Mode d'emploi.** — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

### Prix :

100 grs.....	8 fr. 50.
250 grs.....	17 fr.
500 grs.....	28 fr. 40.
Modèle Hôpital.....	120 francs.

(Taxe de transaction comprise.)

Remise spéciale au Corps médical.

**Établissements WEBER**

**A. GUILLAUME, Pharmacien**

76-78, rue Dareau — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## GMET

(Extraits Gmet.)

## Liste.

<i>Boldo Gmet</i> cholagogue.	<i>Kola Gmet</i> toni-stimulant.
<i>Composé Gmet</i> tonique.	<i>Piscidia Gmet</i> sédatif pelvien.
<i>Cratægus Gmet</i> régulateur sympathique.	<i>Quinquina Gmet</i> <u>manque.</u>
<i>Frêne Gmet</i> antirhumatismal.	<i>Sauge Gmet</i> antisudorifique.
<i>Fucus Gmet</i> amaigrissant.	<i>Ulmaire Gmet</i> antirhumatismal. Anti-goutteux.
<i>Gui Gmet</i> hypotenseur.	<i>Valériane Gmet</i> sédatif.
<i>Hamamelis Gmet</i> <u>manque.</u>	<i>Viburnum Gmet</i> tonique utérin.
<i>Hydrastis Gmet</i> <u>manque.</u>	<i>Diurétique Gmet</i> <u>manque.</u>
<i>Antiobe</i> <u>manque.</u>	
<i>Jugland Gmet</i> toni-dépuratif.	

*Extrait Hamyd* (voir ce texte).*Oliviasé* (voir ce texte).*Quindynol Biphile* (voir ce texte).

Dans la mesure des répartitions limitées, nous pouvons fournir tous nos produits habituels, sauf *Hamamelis, Hydrastis, Quinquina, Diurétique Gmet.*

## GMET

(Extraits Gmet.)

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial GIMBERT, qui permet d'obtenir une *extraction complète* sans altérer la plante.

*Correspondent* tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

*Se prescrivent* tous : en moyenne 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas, ou un peu avant.

Littérature sur chaque produit et échantillons sur demande.

## Laboratoire GMET

1, avenue du Lycée-Lakanal  
BOURG-LA-REINE (Seine)

A. LOROT, pharmacien  
(Tél. : Robinson 15-67.)

## GOMENOL

Nom et Marque déposés.  
Essence de Melaleuca viridiflora sélectionnée.

### GOMENOLÉ et Produits au GOMENOL

**Propriétés.** — Innocuité absolue, haut pouvoir antiseptique, rapidement diffusible, grand calmant, désodorisant, vivificateur des tissus et action modificatrice, hémostatique, toni-cardiaque.

**Action thérapeutique et usages.** — A l'intérieur, convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires (bronchites, tuberculose, etc.) et des voies urinaires (cystites, urétrites, etc.). En injections intramusculaires indolores (aiguilles fines) ou intraveineuses. Imprégnation gomenolée dans toutes infections locales ou généralisées (septicémie, etc.). Immunisation préventive.

A l'extérieur, en inhalations et pulvérisations : coryzas, laryngites, bronchites, etc.

Pansements chirurgicaux : brûlures, plaies septiques, ulcères.

Multiples indications, nombreuses formes correspondant aux diverses applications :

**Rhino-pharynx.** — Gomenol-Rhino, Gomenolé-Nasal, Vaseline Gomenolée, Gomenol pur en inhalations.

**Gorge.** — Gomenol-Pâtes, Gomenol-Sirop, Gomenolé 10 p. 100 en injections trachéales.

**Bronches, poumons.** — Gomenol-Capsules, Gomenolé en injections intrapleurales (10 et 20 p. 100), intrabronchiques (20 p. 100) et intramusculaires (33 p. 100), Gomenolé-éther.

**Intestin.** — Gomenol soluble, Gomenolé 10 p. 100 et 20 p. 100 en lavements profonds, Gomenol-Rectal, Gomenol-Glutinules.

**Rein, vessie.** — Gomenol-Glutinules, Gomenolé 20 p. 100 et 33 p. 100 en instillations. Lavages, eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble).

**Plaies, brûlures.** — Gomenol-Onguent, Gomenolé 20 p. 100 et 33 p. 100 en pansements, Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble) pour lavages et pansements humides.

**Gynécologie.** — Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble), Gomenovules, Gomenolé (pansements), Gomenol pur (attouchements), Gomenol-Savon.

**Grande chirurgie.** — Gomenol pur ou Gomenol-Rubé (champ opératoire), Gomenolé (Imprégnation gomenolée).

Les Produits sont inaltérables.

Présentations populaires :

Gomenolé, petit flacon.

Gomenolé-Nasal, tube canule.

Vaseline Gomenolée Prevet, tube canule.

### Laboratoire du GOMENOL

François PREVET, docteur en Pharmacie

48, rue des Petites-Écuries — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Provence 34-31.)

## GOMHYDRINE

### Capsules.

**Composition.** — Huile essentielle de Melaleuca viridiflora, 0,10 ; Essence de santal blanc, 0,10 ; Bromure de camphre, 0,02 Pour une capsule.

**Indications.** — Maladies des voies urinaires : Blennorrhagie, Urétrites, Cystites, Coliques néphrétiques, Catarrhe de la vessie.

**Mode d'emploi.** — 4 capsules au milieu des repas, midi et soir.

Selon les cas, la dose sera diminuée ou augmentée, selon la prescription du médecin.

*Publicité strictement médicale.*

Prix : 25 fr. 40.

### Laboratoires M. DE RIVE

A. de RIVE, pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert  
PARIS (XX<sup>e</sup>).

## GONACRINE

Mélange de 60 % de chlorure de 3-6-diamino-10-méthylacridine et de 40 % de chlorhydrate de 3-6-diamino-acridine. Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

**Indications.** — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Méningites, Mélétiococques, Erythème nouveau.

**Présentations :** boîtes de 10 ampoules à 2 % : 34 fr.  
— 3 — 2 % : 13 fr. 80.  
— 6 — 0,5 % : 13 fr. 80.

**Posologie et mode d'emploi.** — Lavages de l'urètre : solutions extemporanées de 1/8.000 à 1/1000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

**Pastilles de Gonacrine** (boîtes de 40 pastilles), dosées à 0 g. 003 par pastille, destinées au traitement des stomatites infectieuses ou médicamenteuses, gingivites, amygdalites. Prévention des infections à porte d'entrée bucco-pharyngée. Désinfection post-opératoire.

Prix de la boîte de 40 pastilles : 7 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock-vaccin polymicrobien renfermant :

Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

**Indications.** — Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

**Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).**

**Prix :** 6 ampoules : 37 fr. 50 ; 6 ovules : 25 francs.  
Enregistré au L. N. C. n° 514-99 et 111.

### Produits Biologiques OARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

### GONO-VACLYDUN

**Composition.** — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

**Indications.** — Urétrites, Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

**Posologie.** — En injections sous-cutanées, 3/4 de centicube le 1<sup>er</sup> jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

### GONARTHRI-VACLYDUN

Lysat de gonocoques.

Lysat-vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 31 fr. 60.

### Laboratoire OORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.  
27, rue Desreinaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## GOSIÉRINE DALLOZ

Formule p. 100 :

Cocaïne.....	0,05
Menthol.....	0,40
Borate de soude.....	4,00

**Forme.** — Dragées.

**Propriétés.** — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

**Action.** — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc.

**Doses.** — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 11 fr. 50.

### Laboratoire DALLOZ

12, boulevard de La Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>):

## GOSSYPIOL MAURIN

Régulateur menstruel sédatif des règles douloureuses.

Complexe spécialisé des douleurs « ovo-utérines », le GOSSYPIOL donne un triple effet : antinévralgique, anesthésique, antispasmodique, qu'aucun analgésique général ne peut réaliser.

Extrait de Gossypium..	0,01	Amido-Pyrazoline ...	0,05
Extrait de Gelsemium..	0,02	Phényléthylmalonyluree .....	0,01
Extrait racine Aconit....	0,0023	Scurocaine.....	0,003
Poudre Aloès.....	0,006	Benzoate de Dihydrofolliculine.....	25 U. I.

Pour un comprimé dragéfié.

16 comprimés dragéfiés en 2 jours au moment présumé des règles déterminent l'écoulement cataménial et calment toutes douleurs (4 le matin, 4 le soir) : en 4 jours, pendant trois menstrues à 24 jours d'intervalle, ordonnent la périodicité.

Prix : 17 fr. 70.

Enregistré au Lab. Nat. de Contr. sous le n° 327-11.

### Laboratoires JAMMES DE GOLBERY

102 bis, rue de l'Aigle — LA GARENNE-COLOMBES (Seine).  
(Tél. : Auteuil 51-85.)

## GOTIRA

" Phytodermyl ".

**Composition.** — Pâte à base de plantes en macération alcoolique (Rosa Centifolia, Hypericum perforatum, Malva Sylvestris, Chenopodium) incorporées à un excipient approprié. Ne contient aucun produit chimique, caustique ou toxique. Odeur agréable. Ne tache pas.

**Indications thérapeutiques.** — Antiseptique et cicatrisant. Toutes plaies et irritations de la peau : Acné, Eczéma, Gourme, Herpès, Urticaire, Prurits, Dartres, Crevasses, Engorgements, Furoncles, Blépharites, Blessures, Brûlures, Plaies, Ulcères variqueux, Eschares, Hémorroïdes, Prurit vulvaire, Touchers, etc.

**Mode d'emploi.** — Étendre une petite quantité, plusieurs fois par jour, masser légèrement jusqu'à l'absorption, puis laisser une légère couche en surface. Pour les plaies (ulcères variqueux, eschares), combler la cavité avec Gotira en étendant autour de la plaie, puis recouvrir d'un pansement sec de gaze et bander.

En pots et tubes.

Enregistré au L. N. de G. des M. sous le n° 1818-1.

Laboratoires RICHOU

S. DESCOUTS, Pharmacien

39, rue Talbott — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trin. 46-12.)

## GOUDROLINE

**Composition.** — Ce produit est extrait du goudron de houille.

**Propriétés.** — Agent réducteur doué de propriétés kératoplastiques, il ramollit la couche cornée épaisse et diminue la formation des squames qui entravent la vitalité des cellules de Malpighi et la circulation lymphatique.

Il est fortement astringent, et son action décongestionnante s'exerce tant superficiellement que par pénétration.

Il possède la propriété de faire disparaître rapidement des éruptions prurigineuses tenaces et de modérer le prurit d'une façon durable en agissant sur les terminaisons nerveuses.

**Indications.** — La Goudroline peut être employée dans tous les états desquamatifs de la peau, et notamment dans toutes affections prurigineuses de l'adulte (eczémas non suintants, parakératose psoriasiforme de Brocq, eczémasides, eczémas séborrhéiques.)

**Posologie.** — La Goudroline peut être utilisée pure ou incorporée à la pommade à l'oxyde de zinc.

Prix. — Le bidon : 7 fr. 30.

POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29.)

## GOUTTES ANTISPASMODIQUES ADOL

**Composition.** — Alcaloïdes totaux de la Belladone, de la Jusquiame, de la saïsepareille rouge, Bromure d'ammonium, Gardénal.

**Action thérapeutique.** — Synergie médicamenteuse à faibles doses, sous forme liquide. Spécialement aérophagie, vomissements incoercibles, spasmes intestinaux, etc., etc.

Sans contre-indication.

**Indications.** — Le spasme sous toutes ses modalités.

**Mode d'emploi.** — XXV à XXX gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée, de préférence avant les repas ou 2 heures après.

Prix : 22 fr. 50 le flacon. Pour 20 jours de traitement.

Laboratoires ADOL

G. VIENNOIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

50, rue des Rancy — LYON. (Tél. : Moncey 59-77.)

## GOUTTES BERNAMONT

Les Gouttes Bernamont (Hamamélis, Marron d'Inde, Noix vomique, Viburnum) complètent le traitement local par la Pommade Bernamont dans le cas d'ulcères variqueux et favorisent toujours l'amélioration de tous les troubles de la circulation veineuse.

**Indications.** — Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Phlébites, etc.

**Mode d'emploi.** — On les utilise à la dose de XX gouttes dans 1/2 verre d'eau à chacun des principaux repas.

**Prix :** Le flacon pour un mois, 15 fr. 50.

Approvisionnement assuré.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-1.

Laboratoires BERNAMONT

F. BERNAMONT et H. BERTRAND

Pharmaciens

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS

(Tél. : 0-23 Nevers.)

## GOUTTES B. O. P.

Hypotensives et diurétiques.

**Composition.** — Pour 100 gr :

Extrait stabilisé de *Olea Europea*, 15 gr.

Extrait spécial de *Betula alba*, 85 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypotensives et diurétiques — sans accoutumance — ne contiennent aucun produit toxique.

**Indications.** — Hypertension, artério-sclérose, urémie, hydropisie, insuffisance rénale, œdèmes cardiaux-rénaux.

**Posologie.** — X à XX gouttes plusieurs fois par jour.

L'absence de toxicité permet des doses très supérieures à cette moyenne.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1810-1.

Prix au public : 20 francs.

**Laboratoires PROCHAM**

**M. G. PROVENCE, Pharmacien**

8, boulevard de Cessole — NICE.

(Tél. : 837-70.)

## GOUTTES BRONCHOPHILES ANDRÉ

### Composition :

Codéine .....	0 cgr. 50
Bromoforme .....	3 cgr. 10
Chloroforme .....	2 cgr.
Gaïacol .....	2 cgr. 60
Eucalyptol .....	1 cgr.
Terpinol .....	5 cgr. 20

Pour une capsule.

**Indications.** — Toutes affections pulmonaires, toux, bronchites aiguës et chroniques, emphyseme, asthme, grippe.

**Posologie.** — 2 à 6 capsules par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments : 556-6.

**Laboratoires BADEL**

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

## GOUTTES D'ORARGOL-AMICROS

*Complexe colloïdal électrique or et argent.*

Anti-infectieux général.

L'*Orargol* (gouttes solution au 1/1 000), par la voie buccale, est un traitement simple et actif des maladies infectieuses ; il agit synergiquement avec toute autre thérapeutique, telle que vaccinothérapie, etc...

L'*Orargol* est le traitement idéal des maladies infectieuses infantiles.

**Indications.** — Toutes les maladies infectieuses, surtout chez l'enfant ; troubles infectieux d'origine intestinale, grippe, etc...

**Prescrire.** — Gouttes d'*Orargol* : 1 flacon de 60 gr.

**Posologie.** — XX à C gouttes par jour, dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire.

Pour les adultes : 1 cuillerée à café, 2 fois par jour.

**Laboratoire AMICROS**

177, rue de Courcelles — PARIS

## GOUTTES ERYL

Traitement *per os* des affections de la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique.

**Composition.** — Synergie phytothérapique complète (Euphorbe, Coca, *Rubus fruticosus*, Aconit Napel, Belladone, Roses de Provins), à base d'*Erysimum* (Herbe aux Chantres).

**Action thérapeutique.** — Analgésique, décongestive, Antispasmodique et tonifiante (action élective sur les cordes vocales).

**Indications.** — Toux quinteuses, rebelles, coqueluchoides. Laryngites, trachéites, grippe, coqueluche, bronchites.

**Mode d'emploi :**

**Adultes :** XXXV à LX gouttes ; 5 à 6 fois par jour.

**Enfants :** V à XV gouttes ; 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Durée du traitement : 10 à 30 jours.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

### Composition :

Extrait de Viscum Album.. 0 gr. 05  
Nitrite de Soude ..... 0 gr. 01  
pour 1 cc.

### Indications. — Hypotenseur.

Artériosclérose, Hypertension artérielle, Hémoptysies.

**Formes.** — Gouttes (flacon de 24 cc.) ; Ampoules (boîte de 12 ampoules de 1 cc.).

**Posologie.** — Gouttes : XX à XXV gouttes avant les repas. Ampoules : 1 ampoule tous les 2 jours dans le tissu musculaire.

**Prix :** GOUTTES, le flacon : 18 fr. 75 ;  
AMPOULES, la boîte : 22 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-6.

**Laboratoires FRAISSE Père et Fils**  
**Pharmaciens**

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## GOUTTES IONISÉES A

**Propriétés.** — Diminuent l'alcalinité des humeurs qu'elles acidifient, augmentent l'activité physiologique générale, combattent l'auto-intoxication en amplifiant l'oxydation.

**Composition.** — Phosphate et chlorure d'ammonium, Chlorure de sodium et Acide Phosphorique.

**Indications.** — Etat d'asthénie, Alcalose et les troubles liés au déséquilibre acide-base, Collibacillose, Dermatoses, Lithiase Rénale, Insuffisance hépatique.

**Présentation.** — Flacon de 40 gr. Durée : 25 jours.

**Posologie.** — XV à XXX gouttes matin et soir avant les 2 repas dans un peu d'eau.

**Prix :** 20 francs.

Enregistré au L. N. C., n° 1734-2.

**Laboratoires BIOS**

10, rue Vineuse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Trocadéro 57-44.)

## GOUTTES LECONTE

### Composition :

Orthoformiate d'éthyle.....	0,07
Codéine .....	0,01
Teinture de grindélia.....	0,10
Teinture de polygala.....	0,12
Teinture de racine d'aconit.....	0,10
Teinture de drosera.....	0,22
Teinture de belladone.....	0,15
Teinture de bryone.....	0,10

Pour 1 cc.

**Indications.** — Toux spasmodiques, Grippe, Trachéite, Coqueluche.

### Posologie :

De 2 à 5 ans : X à XII gouttes, 3 fois par jour.

De 6 à 12 ans : XV à XXV gouttes, 4 fois par jour.

De 12 à 16 ans : XXV à XL gouttes, 4 fois par jour.

De 16 à 20 ans : XLV à L gouttes, 5 fois par jour.

**Adultes :** LX gouttes, 5 à 6 fois par jour.

**Prix :** 19 fr. 70.

**Laboratoires LECONTE**

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Gut. 04-17.)



## GOUTTES LINOBER

**Indications.** — Toux nerveuse, Trachéite, Pharyngite, Laryngite, Asthme, Coqueluche, Toux chronique des vieillards.

### Formule :

β-dichloroéthane ... 0 gr. 02  
Propanone. }  
Teinture de grindelia } à Q. S. pour L gouttes.  
Teinture de drosera. }  
Essence de menthe. Q. S. pour aromatiser.

### Posologie :

Administrer 3 fois par 24 heures :

à chaque fois :			Total pour 24 heures :		
Enfants de 1 an à 2 ans	de 6 à 7 gouttes	de 18 à 21 gouttes	de 18 à 21	gouttes	
— 2 — à 3 —	de 9 à 10 —	de 27 à 30 —	de 27 à 30	—	
— 3 — à 4 —	de 12 à 15 —	de 36 à 45 —	de 36 à 45	—	
— 4 — à 7 —	de 20 à 25 —	de 60 à 75 —	de 60 à 75	—	
— 7 — à 14 —	de 25 à 30 —	de 75 à 90 —	de 75 à 90	—	
Au-dessus de 14 Adultes	de 40 à 50 — de 60 à 70 —	de 120 à 150 — de 180 à 210 —	de 120 à 150 — de 180 à 210 —	—	

Il s'agit de doses moyennes qui peuvent être augmentées ou même doublées sans aucun inconvénient, les gouttes Linober ne contenant aucune substance toxique.

Seules contre-indications : Diabète, Acétonurie.

**Mode d'emploi.** — Les Gouttes Linober doivent être prises de préférence en dehors des repas.

On peut les absorber directement sur 1 ou 2 morceaux de sucre ou, mieux, diluées dans un peu de liquide, sucré ou non (eau, infusions, etc...).

**Sous réserve**  
des possibilités de fabrication.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris,  
17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## GOUTTES LIVONIENNES

**Capsules de Goudron de Norvège, Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.**

**Indications.** — Affections chroniques des voies respiratoires (Toux, Bronchites, Catarrhes).

Le meilleur moyen de faire tolérer la Créosote.

**Posologie.** — 4 à 8 capsules par jour, au milieu des repas.

Prix : 13 fr. 80.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 87-34.)

## GOUTTES MAGALO

**Composition.** — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 superactivé par un sel de manganèse.

**Mode d'action.** — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue ; de goût agréable, bien supporté par l'estomac ; la plus économique de toutes les préparations similaires.

**Indications.** — Affections du foie et de l'estomac, asthénies, verrues, cancer.

Prix : 17 fr. 50.

Durée : 25 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 34-68.)

## GOUTTES MOTIL

Médication synergique.

Excito-motrice de l'Estomac, du Foie et de l'Intestin.

**Composition.** — Salicylate de gènesérine, noix vomique, quassia, colombo, gentiane, quinquina, condurango, rhubarbe, boldo, badiane.

**Indications.** — Traitement du Syndrome Solaire, Dyspepsie nervo-motrice, Atonie gastrique et intestinale, Aérophagie, Anorexie, Hypotonie Infantile, Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif, Spécifique des troubles sympathiques.

**Posologie.** — 10 à 30 gouttes dans un peu d'eau non sucrée, 10 minutes avant les 2 principaux repas.

Laboratoires J. LANDRIER  
COULANGES-SUR-YONNE (Yonne).

## GOUTTES NÉVROSTHÉNIQUES FRAISSE

**Composition :**

Glycérophosphate de Soude ..... 0 gr. 10  
Cacodylate de Strychnine ..... 1/2 mill.  
pour 1 cc.

**Indications.** — Dynamogénique puissant, active la phagocytose.

Asthénie, Neurasthénie, Adynamie.

**Forme.** — Gouttes (flacon de 24 cc.).

XXV gouttes par jour dans un peu d'eau avant les repas.

**Prix :** le flacon, 18 fr. 75 (15 jours de traitement).  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-5.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils  
Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## GOUTTES NICAN

(Sans sucra.)

**Composition.** — Bromoforme et Codéine purs, Aconit, Belladone, Drosera, Grindelia, Benzoate de Soude, Eau de Laurier-cerise.

(IV Gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé)

**Caractéristiques.** — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — Toux spasmodique et quinteuse *en général* ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, Toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.

**Mode d'emploi.** — A absorber *loin des repas* dans une tasse de liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes.

L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

**Doses moyennes par jour en 4 fois :** { Adultes : CCXL gouttes.  
Enfants : XII gouttes par année d'âge.

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, l'usage souvent en quelques heures.

Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

**Doses initiales :** { Adultes : CXX gouttes.  
Enfants : VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

**N. B.** — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Voir COMPRIMÉS NICAN à base de Chlorhydrate d'Ethylmorphine (Dionine N. D.), 0,01 et benzoate de soude.

Laboratoires CANTIN, à PALAISEAU (S.-et-O.).

## GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

**XX gouttes renferment :**

- 1 milligramme de sulfate de strychnine,
- III gouttes d'acide phosphorique officinal,
- 2 cgr. d'extrait de quina,
- 2 cgr. d'extrait de Coca.

**Indications.** — Asthénie, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

**Posologie.** — Débiter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Éviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Turbigo 63-40).

## GOUTTES SAP

Médication symptomatique de la Coqueluche  
Toux nerveuse, Asthme, Trachéite.

**Formule.** — Aconit, belladone, jusquiame, digitale, lobélie, drosera, grindelia, eucalyptus, thym, québraco, associé au bromoforme dissous et à la Créosote de hêtre (sans Codéine).

**Avantages :**

- 1<sup>o</sup> Action antispasmodique et anticatarrhale énergique (diminution très rapide des quintes) ;
- 2<sup>o</sup> Pouvoir antiseptique et bactéricide puissant ;
- 3<sup>o</sup> Action dynamogénique secondaire de la créosote ;
- 4<sup>o</sup> Absolument inoffensif, même chez les tout-petits.

**Doses.** — Toutes les 2 heures, dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée :

**Enfants** { Au-dessus de 1 an ..... II gouttes  
              De 1 à 2 ans ..... III —  
              De 2 à 3 ans ..... IV —

Au-dessus ..... I goutte en plus par année d'âge.  
**Adultes** : XX gouttes 5 fois par jour.

*Échantillons sur demande.*

Le flacon : 19 francs.

**Paul AUGIER, Pharmacien**

Ex-interne des hôpitaux de Paris,

2, rue des Lombards — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 09-04.)

## GOUTTES STHÉNIQUES VIAL

Strychnine, Arsenic, Acide phosphorique, Manganèse, Magnésium, Quina.

Composition pour 1 cc. = XX gouttes.

Strychnine, sulf .....	1 mgr.
Méthylarsinate sodique .....	3 cgr.
Magnésium } à l'état de phosphates	11 mgr.
Manganèse } acides .....	18 mgr.
Acide phosphorique offic. ....	20 cgr.
Quinquina .....	15 cgr.

**Posologie.** — Suivant indications et généralement : *Adultes* : XV à XX gouttes. *Enfants* : V à XV gouttes, dans un peu d'eau sucrée ou non, au cours des deux principaux repas.

**Indications.** — Asthénies de toutes sortes, Convalescences, Etats déficitaires de toutes origines.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 687-3.

**Laboratoires Pharmaceutiques VIAL FRÈRES**

7, rue Damon — VILLEURBANNE (Rhône).

(Tél. : Vill. 95-11.)

## GOUTTOLYSINE

*Sans colchique. Sans produits chimiques.*

**Indications.** — Rhumatisme aigu et chronique, Rhumatisme articulaire et complications cardiaques, Goutte (accès ou maladie constitutionnelle), Sciatique, Lumbago, Maladie de Bouillaud.

**Composition.** — A base d'extraits de Bruyère : Hieble, Barbiflore, Ulmaire.

Innocuité absolue sur l'estomac, le Foie et les Reins.  
Aucune contre-indication.

Liqueur agréable à absorber.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

**Laboratoire ALPHA**

MONTREUX-LE-CHATEAU (T<sup>re</sup> de Belfort).

## GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) à 0,025,

Belladone (extrait), 0,01.

Bile 0,02, Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

**Dose et mode d'emplol.** — 1 à 2 grains au repas du soir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

**Laboratoire H. NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## LES GRANIONS

Diastases organo-métalliques de synthèses.

(Fixation d'un ION métallique sur un GRANULE d'amylose.)

Procédé E. FOUARD.

Communications : Académie des Sciences, 7 février 1927.

Congrès de Lyon (Avancement des Sciences), 1926.

**Propriétés.** — Action spécifique du métal considérablement accrue, même à la dose de quelques microgrammes. Aucun choc apparent ; aucune contre-indication, aucune toxicité même chez l'enfant.

**Présentation.** — a. *Ampoules* (injections intraveineuses ou intramusculaires, indolores et sans choc : Argent (simple : enfants ; double : adultes) ; Arsenic ; Bismuth ; Cuivre ; Iode ; Mercure ; Or ; (simple : enfants ; double : adultes) ; Osmium ; Uranium.

Une à deux ampoules par injection, 3 fois par semaine.

N. B. — Ces mêmes ampoules pour l'Arsenic, le Cuivre, le Magnésium, peuvent être prises par voie buccale à la dose de une à deux ampoules par jour.

b. *Solution* — Iode, voie buccale : deux cuillères à café par jour chez l'adulte, deux demi-cuillères chez l'enfant.

c. *Poudre* — Soufre, voie buccale : une cuillerée à café par jour chez l'adulte, une demi-cuillerée chez l'enfant.

**Laboratoires des GRANIONS**

M.-L. BARBAN, Docteur en Pharmacie

61, rue Gaston-Lauriau — MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine).

## GRANUCHOL

**Granulé soluble, agréable au goût.**

**Formule.** — Sulfate de Magnésie, 250 gr. ; Hyposulfite de Soude, 35 gr. ; Bromure de Potassium, 50 gr. ; Peptones (viande, whitte, lait, œufs), 80 gr. ; Orthosiphon Stamineus, 5 gr. ; sucre parfumé au citron : Q. S. p. 1 000.

*Cholagogue complet* (cholécystokinétique et cholérétique) *désensibilisant, calmant total*, sans affinité végétative spéciale.

**Indication.** — Hépatisme sous toutes ses formes, dans toutes ses complications.

Prix : 21 fr. 70.

**Laboratoires de GRANUCHOL**

**S. LALLEMAND et Cie, Pharmaciens**  
42, rue de Paris — PANTIN (Seine).

## GRANULÉ CABASSON

**Reconstituant biologique rationnel.**

**Composition.** — *Aucun élément toxique. Aucune contre-indication* : Gluconate de Chaux, Phosphate bicalcique, Glycéro de soude, Nucléinate de fer et manganèse : tous ces éléments minéralisants en présence de traces de chlorure de magnésium qui intervient comme agent fixateur.

Extrait de Kola correctif des états d'asthénie cardiaque.

**Propriétés thérapeutiques.** — Apporte aux organismes jeunes les principaux éléments constitutifs du squelette, du muscle et du milieu sanguin, sous la forme la plus assimilable et la plus agréable. Complète cette action minéralisatrice par des éléments stomachiques qui excitent l'appétit et stimulent le cœur.

Action nettement recalcaifiante. Favorise l'assimilation.

**Indications :**

1<sup>o</sup> Croissance et toutes maladies osseuses.

2<sup>o</sup> Grossesse et allaitement.

3<sup>o</sup> Surmenage physique et intellectuel : convalescences, inappétence.

4<sup>o</sup> Débilités congénitales.

**Posologie.** — Granulé à croquer.

1 cuillerée à café avant ou après chacun des 2 principaux repas.

Prix : 20 francs.

**Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON**

**A. GROS-CAVALIER, pharmacien,**  
183, rue de Rome — MARSEILLE.

## GRANULÉ EDGÈS

Laxatif-désensibilisant.

**Composition.** — Hydrate de magnésie, citrate de soude, hyposulfite de magnésium, sel de Seignette.

**Forme.** — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

**Propriétés.** — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Excite doucement les fonctions intestinales et biliaires.

**Avantages.** — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

**Indications.** — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Manifestations anaphylactiques, troubles gastro-hépatiques, État saburral.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 10.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en pharmacie, Licencié ès Sciences,  
59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 88-70.)

## GRANULES AU PHOSPHURE DE ZINC

(Marque « Trois Cachets »)

**Composition et préparation.** — Le Phosphure de zinc permet d'introduire le phosphore dans l'organisme à l'état naissant (décomposition en hydrogène phosphoré), d'où sa grande activité.

**Action.** — Excitant du système nerveux. Élévation du tonus neuro-végétatif.

**Indications.** — Neurasthénie, Dépression nerveuse, Aménorrhées, Dysménorrhées, Impuissance.

**Dose et posologie.** — Chaque granule contient 4 mgr. de phosphure de zinc, soit 1/2 mgr. de phosphore actif.

4 à 8 granules par jour à chacun des principaux repas, de préférence dans du lait.

Prix : 17 fr. 50.

COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 02-79.)

## GRANULES CHANTEAUD

(Anciennement Granules dosimétriques.)

**Composition :**

Granules au milligramme, centigramme, etc., de toute la gamme des produits chimiques, alcaloïdes et glucosides les plus fréquemment employés en thérapeutique.

**Présentation :**

Flacons de 50 Granules ou boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 Granules.

**Doses et mode d'emploi :**

A définir et à indiquer par le médecin suivant chaque cas particulier.

Prix de vente, boîte de 200 granules : 14 fr. 65 (taxe comprise).

Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD

R. RAVAUD, Pharmacien

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES  
(Seine-et-Oise).

## GRANULÉS DE BOURGET

**Présentation.** — En boîte métal (16 fr. 35).

**Principes actifs.** — Sulfate de soude, Phosphate de soude, Bicarbonate de soude, Citrate de soude.

**Indications.** — Dyspepsie, Aérophagie, Insuffisance hépatique, Constipation, Météorisme et flatulences, Douleurs, Spasmes, Hyperacidité, Vomissements, Affections du foie.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café pour un demi-verre d'eau le matin à jeun ou après les repas, ou au moment des douleurs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-19.

Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## GRANULES DES VOSGES

**Composition.** — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dioninum.

**Indications.** — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

**Posologie.** — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

*Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.*

**Prix:** Le flacon de 50 granules : 11 fr. 90.

**Laboratoire G. BERNHARD.**  
11, rue Lafayette — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trinité 07-86.)

## GRANULÉS VITA-D

### Composition :

Carotène.....	0 gr. 001
Ergostérol irradié.....	0 gr. 0005
Arrhénal.....	0 gr. 15
Phosphate tricalcique.....	10 gr.
Lacto-sérum.....	65 gr. 5
Huile de foie de morue.....	3 gr.
Exipient sucré.....	Q. S. p. 100 gr.

Fortifiant agréable, qui apporte à l'organisme l'Huile de Foie de Morue sous une forme digestive et les éléments indispensables à l'organisme : Calcium, Phosphore, Arsenic, Vitamines A et D.

**Mode d'action.** — Stimule la croissance. Fixe le calcium. Apporte les éléments nutritifs nécessaires (sels minéraux, azote, hydrates de carbone). Lutte contre les carences.

**Indications.** — Anémies, rachitisme, croissance, allaitement, grossesse, pré tuberculose et tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café à 1 cuillerée à soupe suivant l'âge, après chacun des deux principaux repas.

**Laboratoires Français**  
de Produits Chimiques et Pharmaceutiques  
40-42, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## GRAPHITHIOL

### RÉGULATEUR du TRANSIT INTESTINAL

**Composition.** — Thérapeutique gastro-intestinale carbo-soufrée à base de :

GRAPHITE COLLOÏDAL : charbon minéral, non constipant, adsorbant intestinal.  
SOUFRE COLLOÏDAL : exonérateur et désinfectant intestinal.

COLCOTHAR : oxyde ferrique assimilable tonique et stimulant.

SILICATE DE CALCIUM : absorbant des gaz de fermentation intestinale.

### Propriétés. Indications :

ANTISEPTIQUE et DÉSINFECTANT INTESTINAL : Colites et Colites segmentaires chroniques.

Entérites et Entérocrites muco-membraneuses (bacillaires et colibacillaires).

Syndromes dysentériques.

ADSORBANT et ABSORBANT INTES-TINAL : Fermentations intestinales.

Aérocologie. Aérogastrie. Aérophagie.

### LUBRIFIANT INTESTINAL :

Constipations fonctionnelles chroniques.  
Constipations par atonie intestinale (sé-dentaires, femmes enceintes, vieillards).

### Forme. — CACHETS :

Graphite colloïdal.....	0 gr. 75
Soufre colloïdal.....	0 gr. 15
Colcothar.....	0 gr. 02
Silicate de calcium.....	0 gr. 08

**Posologie.** — Dose d'attaque : 4 à 6 cachets par jour à prendre au milieu des repas.  
Dose d'entretien : 2 à 3 cachets par jour suivant le rétablissement progressif du transit normal.

**Laboratoires Roger FOSSE**  
(Livartil-Lotusédine)

Docteur en pharmacie  
86, r. du Pas-Saint-Georges — BORDEAUX.

## GRAVIDOSTYL

**Composition.** — Sérum frais de jument gravide.

**Indications.** — Thérapeutique biologique polyhormonale.

Chez la femme : des insuffisances ovariennes légères. Hypoménorrhées, Oligoménorrhées, Troubles de la puberté et de la ménopause, Troubles de la grossesse, Etats nauséux.

Chez l'enfant : des déficiences hormonales complexes. Prématurés, Nourrissons débiles et hypotrophiques, Retard de croissance du squelette, Paresse intellectuelle, Nervosisme.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour en ingestion ou en lavement. Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

Prix au public : 35 fr. 50.

Les Laboratoires du Dr ROUSSEL

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE  
HÉMOPOÏÉTIQUE

S. A. au cap. de 15 000 000 de fr. — R. C. Seine 12.384.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 68-22.)

## GRIPPINE VILLARD

Cachet Antigrippe.

**Composition :**

Ac. acétylsalicylique .....	0,50
Benzoate de soude .....	0,10
Chlorh. d'Ephédrine gauche.....	0,015
Poudre de Dover.....	0,05
Aconit .....	0,01
Gelsemium .....	0,01
Alcoès .....	0,01
Cascara .....	0,025

**Propriétés.** — Antithermique, Anticongestif, Analgésique.

**Indications.** — Manifestations grippales, Courbatures fébriles, Coryza, Sinusite, Migraines.

**Posologie.** — 1 cachet 2 ou 3 fois par jour à distance des repas dans une infusion ou boisson chaude, alcoolisée.

**Présentation.** — Tube de 10 cachets.

Prix : 12 fr. 10.

Laboratoire G. VILLARD

3, place Sainte-Claire — GRENOBLE.

## GRIPPO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur L. DUCHON

Pour administration par voie buccale (Non injectable).

**Composition.** — Le Grippe-Vaclydun est un Lysat-vaccin polymicrobien. Hormis l'absence du bacille diphtérique, sa formule est la même que celle du *Brachio-Vaclydun*.

**Indications.** — Le Grippe-Vaclydun est destiné au traitement des infections trachéo-bronchiques communes et en particulier de la grippe saisonnière, en dehors de leurs complications.

**Posologie.** — Le Grippe-Vaclydun doit être utilisé exclusivement par voie buccale.

En principe, quel que soit l'âge, la dose est d'une à deux ampoules par jour. Verser le contenu dans un demi-verre d'eau sucrée ou aromatisée au gré du malade.

Cette solution ainsi préparée sera utilisée au plus tard dans la demi-journée.

L'administration se fera :

Chez les *enfants* : en trois fois, une demi-heure avant les repas.

Chez l'*adulte* : en totalité, de préférence à jeun ou une demi-heure avant les repas. Au besoin prendre 2 ampoules par jour

**Présentation.** — Le Grippe-Vaclydun est présenté en boîtes de 10 ampoules de 2 cc. de vaccin à ingérer.

Prix : 31 fr. 60.

Laboratoires CORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Carnot 78-11.)

## GROG MÉDICAL DEMONCLO

Médication eupnéique et pectorale, stimulante et antipyrétique.

**Composition.** — Codéine : 0 gr. 25 ; Bromoforme : 0 gr. 20 ; Ale. de Fucine d'acacia : 1 gr. 50 ; Teinture de lobélie : 0 gr. 50 ; Poudre de tartre stibié : 0 gr. 03 ; Extrait de digitale : 0 gr. 03 ; Tolu : 3 gr. ; Eau de laurier-cerise : 10 gr. ; Alcool et cognac : Q. S. P. 100 gr.

**Action thérapeutique.** — Le *Grog médical DEMONCLO* joint aux propriétés toniques et stimulantes de la classique Potion de Todd celles des meilleures formules de sirops à base de codéine, bromoforme, aconit, tolu et laurier-cerise ; la digitale et la lobélie qu'il contient lui confèrent en outre leurs propriétés toni-cardiaques et eupnéiques.

**Indications.** — Grippe, pharyngites, bronchites et trachéo-bronchites, coqueluche, asthme et emphyseme.

**Posologie.** — Outre son action thérapeutique propre, l'alcool employé comme véhicule permet d'utiliser des doses moindres que celles des sirops classiques (cuillerées à café au lieu de cuillerées à soupe).

*Adultes* : Une cuillerée à café, pur ou dans une infusion.

*Enfants* : V gouttes par année d'âge, dans une tisane.

3 ou 4-fois par 24 heures, une heure avant ou 2 heures après les repas.

Prix : 15 fr. 70 le flacon de 60 cc.

Laboratoires d'Études et de Réalisations

Pharmaceutiques de Paris (« ETRÉFA »)

R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZUY, Pharmaciens.

Administ. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## GUBLINE

**Formule** exactement adaptée à l'hyperacidité gastrique avec rétention biliaire et constipation. Bismuth, Magnésie, Phosphate, Charbon suractivé.

**Particularités.** — Poudre 6 fois tamisée. Pureté chimique. *Sans goût, ni odeur d'officine.* Absence de carbonate et kaolin. Sature l'excès d'acidité sans produire d'alcalinisation déminéralisante.

**Chlisme.** — En présence d'acides divers de l'estomac, se transforme en  $MgCl \cdot 6H_2O$  (chlorure de magnésium à l'état naissant), en  $CO_2$ , chlorure de calcium, acétates de magnésium et de calcium.

**Doses.** — 1/2 à 1 cuillerée à café avec un peu d'eau à la fin des deux repas.

**Prix :** 17 fr. 90.

Laboratoires Thérapeutiques

**A. MILLET et CH. GUILLAUMIN**

4, rue Richer — PARIS  
(Prov. 20-20.)

## GUÉTHURAL

**Formes.** — Ampoules, Tablettes, Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées. Catarrhes, Grippe, etc.

**Mode d'emploi :**

**Ampoules** (Solution aqueuse) : Cas aigus : 1 ampoule tous les jours ; Cas chroniques : 3 à 4 ampoules par semaine.

**Tablettes** : 6 à 8 tablettes par jour.

**Granulé** : 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 43-6, 43-8, 43-9.

Laboratoires **PÉPIN ET LÉBOUQ**

COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 09-71.)

## GUIGOZ (Lait en Poudre)

Antérieurement présenté sous trois formes : lait complet, lait demi-écrémé, lait écrémé (sucré).

*Fabrication réduite pour l'instant au seul lait demi-écrémé sucré.*

**Propriétés.** — Lait en poudre sucré, évaporé dans le vide à basse température (50°), conserve toutes ses vitamines d'origine, ferments, diastases. Extrêmement digestible, il se rapproche du lait maternel par sa coagulation en fins flocons. Dispense de l'adjonction de jus de fruits et de sucre.

**Indications.** — Alimentation des nourrissons. Diététique idéale des bébés privés partiellement, ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

**Mode d'emploi.** — 1 partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties (en poids) d'eau tiède bouillie, soit environ 1 cuillerée à soupe arasée de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau.

### LE LAIT GUIGOZ

Direction générale à RUMILLY (Haute-Savoie).

(Tél. : 43.)

Dépôt principal à PARIS : 2 et 4, rue Catulle-Mendès.

(Tél. : Galvani 87-47 et 48.)

## GUIMELINDE

(Gouttes hypotensives.)

**Composition.** — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamelis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

**Propriétés.** — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

**Indications.** — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

**Posologie.** — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

Laboratoire de la GUIMELINDE

**A. VERGER, Pharmacien**  
ANCENIS (Loire-Inférieure).



## GUIPSINE

Principes utiles du Gui.

**Indications thérapeutiques.** — Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale, non vaso-constricteur.

**Médication hypotensive.** Hypertension, Artériosclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la ménopause (Spécifique), Néphro-sclérose, Prostatisme.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Prix de vente au public : 22 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## GUITOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

**Forme et dosage.** — Pilules dosées à 0 gr. 05.

**Posologie.** — 4 à 8 pilules par jour entre les repas, par périodes de 10 jours.

**Indications.** — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

L. N. C. n° 1207-5.

**Laboratoire GERDA**

F. GÉRIN, Pharmacien.

10, rue Jacquard — LYON.

(Tél. : B. 87-18.)

## GUIVEINOS

Traitement complet des troubles de la *circulation*.

**Formule.** — Extrait de Gui, extrait de Genêt. Silicate de soude, extrait de Cupressus, d'Hamelis, Marron d'Inde, Viburnum, poudre d'Hypophyse, poudre de Surrénales.

**Forme.** — Se présente sous forme de gouttes et de comprimés.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour au moment des repas ; XX gouttes 3 fois par jour au moment des repas.

**Principales indications.** — Artériosclérose, Hypertension, Vertiges, Céphalées, Phlébites, Varices, Hémorroïdes, troubles de la Ménopause et de la Puberté.

**Laboratoires HOCQUETTE**

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Arc. 47-13.)

## GYNAICÉOL

### 1<sup>o</sup> Forme liquide :

Pour une cuillerée à soupe de 15 gr. :

Formol .....	0 gr. 90
Naphtol B.....	0 gr. 01
Soluté savonneux neutre à la dose d'une cuillerée à soupe dans 1 ou 2 litres d'eau bouillie.	

### 2<sup>o</sup> Forme poudre :

<i>Sachet bleu :</i>	Helmitol .....	1 gr. 50
	Acide borique....	3 gr. 50
<i>Sachet blanc :</i>	Persulfate de potassium .....	2 gr.
	Carbonate de soude..	1 gr. 50
	Borate de soude..	1 gr. 50
	Essence de géranium .....	Q. S.

**Mode d'emploi :** dissoudre en même temps dans 1 ou 2 litres d'eau le contenu d'un sachet bleu et d'un sachet blanc, donnant à la dissolution :

Formol à l'état naissant.....	0 gr. 25
Oxygène à l'état naissant calculé en H <sub>2</sub> O <sup>2</sup> .....	8 gr. 50
La boîte contient 12 sachets bleus et 12 sachets blancs.	

**Indications.** — *Maladies des femmes, métrites, leucorrhée. Hygiène intime.*

**Sous réserve  
des possibilités de fabrication.**

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris -  
17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## GYNAMIDE

(Sulfamide-Dakin.)

**Composition.** — Le crayon et le comprimé de GYNAMIDE (l'un utérin, l'autre vaginal) sont dosés à 10 ou 3 cgr. de p. Dichlor-sulfamide-benzoate de soude.

**Mode d'action.** — Au contact de l'eau ou des sécrétions humorales, le p. Dichlor-sulfamide-benzoate de soude (Aseptamide) se dissocie en libérant deux fonctions :

1<sup>o</sup> Une fonction sulfamidique : le p. Dichlor-sulfamide-benzoate de soude ;

2<sup>o</sup> De l'acide hypochloreux qui se dédouble en oxygène naissant et en chlore actif.

**Avantages.** — Facilement transportable, ne tache pas le linge, atoxique, non irritant, conservation indéterminée.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> A titre curatif dans toutes les affections génitales de la femme, dues aux gonocoques, staphylocoques, streptocoques (gonorrhée, leucorrhée, métrite, urétrite).

2<sup>o</sup> A titre prophylactique. Toutes infections provoquées par le coït dues aux gonocoques, streptocoques, staphylocoques, colibacilles, tréponèmes.

Le comprimé posé directement dans le vagin se met à mousser ; la mousse médicamenteuse, se répandant dans les replis de la muqueuse, la stérilise en quelques minutes. A noter qu'au point de vue antivénérien le crayon protège autant l'homme que la femme.

### Mode d'emploi :

**Comprimés :** introduire directement 1 à 4 comprimés par 24 heures dans le vagin.

Prix : 34 fr. 50 la boîte de douze.

**Crayons :** deux sortes : crayons souples, fusibles, non effervescent ; crayons rigides effervescent. 1 crayon par 24 heures.

Prix : 44 fr. 90 la boîte de douze.

**Laboratoires MERMINOD  
(Fondés en 1890).**

49, rue du Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>). (Pro. 30-32.)

## GYNARSOL

Poudre antiseptique spécialement créée pour l'hygiène intime de la femme et le traitement des affections génitales.

### Composition :

Sel sodique de l'acide oxy-acétyl-aminophénylarsinique .....	0 gr. 01
Chloramine T.....	0 gr. 05.
Chlorate de Potasse .....	0 gr. 10
Nitrate de Potasse .....	0 gr. 01
Bicarbonate de Soude .....	3 gr. 83

Pour 1 sachet.

**Indications.** — Hygiène journalière de la femme, Leucorrhée, Vaginite, Métrite, Salpingite.

**Mode d'emploi.** — Pour injections vaginales, un sachet par litre d'eau.

Pour lavages externes, un sachet pour 2 litres d'eau  
La boîte de 30 sachets : 12 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-32.

**Laboratoires du Docteur H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 39-44)

## GYNÉCO-VACLYDUN

**Lysat-vaccin du Docteur DUOHON**

**Composition.** — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

**Indications.** — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

**Posologie.** — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Prix : 31 fr. 60.

### VACLYDOVULES

Ovules à base de Gynéco-Vaclydun.

Prix : La boîte de huit ovules : 23 fr. 50.

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (Carnot 78-11.)

## GYNEPTA

**Composition.** — Di-hydro-folliculine ; Méthylarsinate de Manganèse ; Florure de Sodium ; Elixir de jus de Raisin.

**Propriétés.** — Hormone ovarienne assimilable par voie buccale grâce à un traitement spécial par un élément catalyseur d'hydrogénation. Son action est renforcée par les éléments organiques et minéraux qui lui sont associés et par la richesse du véhicule choisi en diastases et vitamines.

**Indications.** — Tous les cas d'insuffisance de la fonction ovarienne : puberté, aménorrhée, dysménorrhée, ménopause et les troubles associés : migraines, palpitations, etc.

**Présentation.** — Elixir.

**Posologie.** — Adultes : un verre à bordeaux avant chaque repas. *Fillette*s : demi-dose.

† L. N. C. M. : N° 1142-3.

L'action physiologique du Gynepta a été officiellement reconnue par le Laboratoire National d'Analyse physiologique de la Faculté de Pharmacie de Paris.

**Laborat<sup>rs</sup> BOURDOU**, FRONTIGNAN (Hérault) Tél. : 21.

## GYNERGÈNE

*Adopté par les Hôpitaux de Paris.*

**Composition.** — Tartrate d'Ergotamine, alcaloïde cristallisé isolé de l'ergot de seigle. Produit pur, exactement dosable.

**Formes.** — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine ; injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1 000. — Dragées à 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hémostatique utérin et sédatif électif du sympathique. Effets constants.

**Indications.** — Toutes hémorragies utérines (atonie utérine, cancer et fibrome). — Les sympathicotonies, migraines, tachycardies, accidents sériques, atonie gastrique, le Basedow.

**Posologie.** — 1/4 de cc. à 1 cc. à la fois ; XV à XXX gouttes ou 1 à 2 dragées, 2 fois par jour.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux**, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## GYNOCALCION

**Forme M.** — Traitement rationnel des troubles de la Ménopause naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de l'aménorrhée, de la sclérose utérine.

**Forme P.** — Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

**Propriétés.** — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douloureux ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extraits ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (hormone gonadotrope) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

**Doses.** — *Gynocalcion M.* — 9 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

*Gynocalcion P.* — 9 à 12 dragées par 24 heures en séries de dix jours par mois.

Effet rapide. Tolérance parfaite.

Prix : 29 fr. 30.

Échantillons, Littérature :

**LABORATOIRES CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél.: Suffren 53-70 et 53-71.)

## GYNŒSTRYL

Traitement des carences ovariennes par voie buccale.

**1° GYNŒSTRYL-Gouttes** (solution alcoolique).

a. Flacon de 10 cc. contenant 2 mgr. de di-hydro-folliculine (œstradiol) ;

b. Flacon de 20 cc. contenant 4 mgr. d'œstradiol.

**Mode d'emploi.** — Compter les gouttes dans une petite cuiller, les déposer sous la langue et les conserver sans déglutir jusqu'à ce que la muqueuse les résorbe (*administration perlinguale*).

**2° GYNŒSTRYL-Comprimés** dosés à 1/40 de mgr.

a. Boîte de 40 comprimés ; b. Boîte de 80 comprimés.

**Posologie.** — GYNŒSTRYL-Gouttes : V à X gouttes 4 fois par jour.

GYNŒSTRYL-Comprimés : 5 comprimés par jour.

Prix au public :

GYNŒSTRYL-Gouttes : Le flacon de 10 cc. ... 25 fr.

Le flacon de 20 cc. ... 45 fr.

GYNŒSTRYL-Comprimés :

La boîte de 40 comp. ... 25 fr.

La boîte de 80 comp. ... 45 fr.

Les Laboratoires du **D<sup>r</sup> ROUSSEL**

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au cap. de 10.000.000. — R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél.: Litté 58-43.)

## GYNO-GOUTTES ISCOVESCO

### Définition :

Solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la **totalité des hormones spécifiques de l'ovaire.**

« 1 cc. correspond à 10 gr. d'ovaire frais. »

**I. Activateur et régulateur de la fonction ovarienne :**

### 1° Période de la vie génitale :

a. *Puberté* : régulateur de la fonction menstruelle chez la jeune fille.

b. *Ménopause* : activateur de la fonction ovarienne. L'emploi du GYNO-GOUTTES étale la période de déséquilibre brusque et permet de franchir sans encombre la période de la ménopause.

### 2° Dans le domaine pathologique :

trois indications précises : règles douloureuses, règles insuffisantes, règles irrégulières.

**II. Rôle adjuvant dans la pathologie générale :**

Troubles circulatoires, hypertension. Insomnies, Psychopathies, etc.

### Posologie :

XV à XX gouttes par jour (selon les indications du médecin) dans un peu d'eau en dehors de la période cataméniale.

### Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTRouGE (Seine).

(Tél.: Alésia 4-39.)

## GYNO-LACTOSMOSE

Injection vaginale Acidifiante

pH : 4,5.

### Présentation :

Comprimés (bacilles lactiques sur lactose).  
Liquide physiologique (glucose et acide lactique).

### Emploi :

Dans un litre d'eau tiède, verser un comprimé et une cuiller à café de liquide : la dissolution est immédiate. Injection lente et sans pression (le bock placé à faible hauteur).

Le liquide, solution concentrée, *ne doit jamais être employé pur.*

### Action :

Les antiseptiques destructeurs de la flore vaginale, les alcalins, qui réduisent l'acidité protectrice, sont contre-indiqués.

GYNO-LACTOSMOSE, solution physiologique et biologique au même dosage d'acide lactique que le vagin (pH : 4,5), remplace antiseptiques et alcalins.

GYNO-LACTOSMOSE désodorise, décongestionne, et assure la désinfection mieux qu'un antiseptique. Il reconstitue l'état physiologique de l'organe, régénère la flore et l'acidité protectrices.

### Indications :

*Toutes leucorrhées, vaginites, vaginisme, vulvites, bartholinites, métrites, infections gynécologiques, vulvo-vaginites des petites filles, vaginites séniles, prurit vulvaire, suites de couches, d'électro-coagulation. Préparation et suites opératoires.*

Modèle courant (15 injections) ..... 28 fr. 20

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 768.

**Laboratoires LAVRIL**

PACY-SUR-EURE (Eure).

Bureaux : 11, rue Anatole-de-La-Forge — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 17-49.)

## GYNOMÉTINE

Comprimés.

**Composition.** — Polyoxyméthylène et Perborate de soude, Alun, dans mélange alcalin effervescent.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour injections vaginales.

**Indications.** — Antiseptique gynécologique, Métrites, Leucorrhées, etc.

Prix : 18 fr. 10 la boîte de 30 comprimés.

**Laboratoire RICHER**  
Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

## GYNOPAUSINE

du Docteur Guersant.

**Composition.** — Association d'extraits d'ovaire de thyroïde, de sedobenzyl.

**Mode d'action.** — Régulateur endocrinien de la femme, sédatif utérin.

**Indications.** — Troubles de la ménopause naturelle ou artificielle, Troubles de la puberté, Dysménorrhées, Algies pelviennes.

**Mode d'emploi.** — *Cachets* : 2 par jour.

*Comprimés* : 4 par jour.

A prendre avant les repas, dans la période qui précède les règles.

**Laboratoires ODILIA**

E. LACOMBE, pharmacien,

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

## GYNOPLIX

**Composition.** — Pansement vaginal sec contenant du stovarsol (nom déposé) et des hydrates de carbone.

**Présentation.** — Boîte de 20 comprimés dosés à 0 gr. 25 de Stovarsol.

**Propriétés.** — Modificateur du milieu, empêche la prolifération parasitaire, rétablit l'état normal des muqueuses, favorise la production d'acide lactique.

Réussit dans les cas où les antiseptiques plus ou moins irritants ont échoué.

**Indications.** — Pertes blanches de toutes origines, entre autres : leucorrhée due à des troubles généraux ; leucorrhée due à des irritations ou infections ; leucorrhée de la grossesse, et, électivement, vaginites à trichomonas.

**Mode d'emploi.** — Chaque jour, après toilette de la région, introduire profondément dans le vagin — de préférence le soir au coucher — un ou deux comprimés de *Gynoplax*.

Utiliser deux comprimés ou plus au début, diminuer le nombre de comprimés et espacer les applications dès qu'une amélioration est constatée.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres, PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## HALIVITE 42

Huile de foie de morue enrichie en vitamines A et D naturelles, titrée biologiquement, contenant :

Vitamine A : 2 140 U. I. par gramme.

Vitamine D : 3 000 U. I. par gramme.

**Présentation.** — Gouttes. Permettent l'absorption des vitamines A et D à haute dose sous un faible volume. Faciles à digérer.

**Indications.** — Hypovitaminoses A et D — Débilité générale — Rachitisme — Prétuberculose — Lymphatisme — Troubles de croissance — Dentition — Grossesse — Allaitement — Convalescence — Suites de fractures — Surmenage — Engèlures.

**Posologie.** — *Nourrissons* : II à V gouttes par jour. — *Enfants* : VIII à XV gouttes par jour. — *Adultes* : XX à XXV gouttes par jour.

A prendre dans une cuillerée de boisson tiède ou de jus de fruits, de préférence après les repas.

Prix : le flacon de 5 cc. 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-16.

Laboratoires SECLO

G. COGNÉ, Pharmacien.

6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de

*l'Hamamelis virginica*, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en

dilution convenable (20 cgr. p. cuill. à soupe)

l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

**Indications.** — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

**Dose.** — Par cuill. à soupe : 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix : 25 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64-36.)

## HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis virginica*.

**Indications.** — Maladies du système vasculaire.

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause.

Artério-sclérose.

Rhumatisme chronique.

**1° Gouttes concentrées.** — De XXX à LX gouttes par 24 heures. Dans certains cas d'hémorroïdes enflammées C et même jusqu'à CL gouttes *pro die*, ce qui procure un soulagement immédiat ; revenir à la dose d'entretien de LX gouttes par jour.

**2° Élixir** (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

**Sous réserve**  
des possibilités de fabrication.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris,  
17, rue Cadet — PARIS (IXe).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## HARLÉDINE

**Capsules Glutinisées.**

**Formule :**

Boldine ..... un demi-milligr.  
Extrait de bile ..... 0,03  
Huile de Haarlem vraie ..... 0,18

**Propriétés.** — Antiseptique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue.

**Indications.** — Lithiase biliaire, ictères, cholécystites, coliques hépatiques, coliques néphrétiques, entérites muco-membraneuses, Constipation, Goutte et rhumatisme chronique.

**Doses.** — Affections aiguës : 2 à 4 comprimés par jour.

Affections chroniques : 1 à 3 capsules par jour (à prendre au moment des repas).

La boîte de 40 capsules : 19 fr. 70.

**Laboratoire L. COUVERT**

11, rue de Mogador — PARIS (IXe).

(Tél. : Trinité 22-01.)

## HARLEM PHILIPPE (Pilules).

**Kérat-Harlem.**

Pilules Kératinisées à l'huile de Harlem vraie, pure et d'origine. Dose : 0 gr. 15 par pilule. Leur Kératinisation, d'après les procédés du Dr H. Philippe, évite les fatigues d'estomac, les renvois désagréables, le mauvais goût, occasionnés ordinairement par le goût spécial de l'Huile de Harlem.

**Indications.** — Affection du foie, lithiases biliaires ou rénales, ictère, coliques hépatiques ou néphrétiques, pyélo-néphrites, goutte, arthritisme, asthme hépatique, etc.

**Posologie.** — 1 à 2 pilules par jour au cours des repas ou avant de se coucher.  
4 à 6 pilules dans les cas aigus.

**Prix :** 19 fr. 90.

(Prière indiquer pilules Philippe Harlem.)

**Produits du Dr Henri PHILIPPE**

36, Quai Fulchiron — LYON.

## HECTARGYRE

(Sel mercuriel de l'Heotine.)

Spécifique de la Syphilis.

**Indications.** — Syphilis, Paludisme.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules

### Posologie :

**Adultes :** forme injectable. *Ampoule A :* tous les jours. *Ampoule B :* tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. *Per os :* 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

**Enfants :** Moitié doses.

### Établissements MOUNEYRAT

#### Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,  
Docteur ès Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

12, rue du Chemin-Vert,

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## HECTINE

(Benzo-sulfone-paraaminophényl-arsinate de soude.)

Spécifique de la Syphilis et succédané du cacodylate de soude.

**Indications.** — Syphilis, Asthénie, Anémie, Neurasthénie et États dépressifs, Eczéma des nourrissons, Paludisme, Tuberculose.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

### Posologie:

**Adultes :** forme injectable. *Ampoule A :* tous les jours. *Ampoule B :* tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. — *Per os :* 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

**Enfants :** Moitié doses.

### Établissements MOUNEYRAT

#### Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,  
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## HÉDÉRYL

**Composition.** — Pommade au lierre grim-pant.

**Propriétés.** — Fibrolysant, décongestif, analgésique.

**Indications.** — Cellulite, arthralgies, ar-thrites, névralgies.

**Posologie et mode d'emploi.** — En fric-tions et massages, puis onctions sur la région douloureuse. Recouvrir ensuite d'une feuille d'ouate.

**Prix :** 21 fr. 20 le tube de 55 grammes, pour une durée moyenne de 12 jours de traitement.

### Laboratoire LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littre 13-37.

## HÉDOPEPTOL

Deux formes : Granulé et pastilles.

**Composition.** — Citrate monosodique, hexaméthylène, tétramine, charbon animal.

**Propriétés.** — Antiseptique gastro-intestinal, urinaire et biliaire.

**Indications.** — Fermentations gastro-intestinales, Dys-pepsie, Aérophagie, Entérite, Diarrhée, Colibacillose, Appendicite chronique, Insuffisance hépatique, Cholécystite et Angiocholécystite, Infections des voies urinaires, Auto-intoxication et ses conséquences.

**Prix :** boîte de 80 gr. de granulé, 18 fr. 30 ; Boîte de 48 pastilles : 18 fr. 30.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café ou 1 à 2 pastilles après les repas.

### Laboratoires SAUNIER

35, avenue de Versailles — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Jasmin 29-56.)



## HÉDUSOL

**Tonique. Reconstituant.**

Elixir au vin de Muscat, d'un goût agréable.  
Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments  
sous le n° 957-1.

### Composition :

Phosphate de soude .....	1 gr.
Méthylarsinate de soude .....	10 cgr.
Extrait fluide de Kola .....	2 gr. 5
Extrait fluide de Quinquina .....	1 gr. 25
Teinture de Gentiane .....	VI gouttes.
Teinture Noix Vomique .....	XII —
Teinture de Cannelle .....	VI —
Teinture de Vanille .....	XII —
Vin de Muscat .....	Q. S. P. 100 gr.

**Indications.** — Surmenage. Faiblesse générale. Anémie. Asthénies. Neurasthénie. Troubles de Nutrition et de Menstruation. Affections des Bronches. Convalescence.

### Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe midi et soir.  
De 12 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir.  
De 8 à 12 ans : 1 cuillerée à café midi et soir.

### LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien, 47, rue Nollet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## HÉLÉNINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

**Hélénine Houdé.** — Principe actif cristallisé de l'aunée. Les travaux récents (D<sup>r</sup> Lefèvre, D<sup>r</sup> S. Schmidt) ont montré la nécessité d'utiliser l'Hélénine pure, sans association d'opiacés qui contrarient l'expectoration.

**Propriétés.** — Béchique, expectorant et décongestionnant. Calmant des toux rebelles (D<sup>r</sup> Delore et Coudert). Cholérétique direct. Amer apéritif et tonique.

**Indications.** — Bronchites chroniques. Toux quinteuses des tuberculeux. Coqueluche. Poussées de rétention avec congestion et fièvre, dans les formes ulcéreuses chroniques de la tuberculose pulmonaire. Insuffisance hépatique. Leucorrhées.

**Doses.** — Toux, Leucorrhées : 6 à 10 granules par jour (et même plus) avant ou entre les repas.

Poussées congestives avec rétention : 6 à 8 granules à doses réfractées dans la soirée, 8 à 10 pendant les jours suivants pendant quelques jours.

Comme fluidifiant et expectorant d'entretien, 2 ou 3 granules par jour avant le repas de midi.

### Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél.: Nord 40-58.)

## HELGUEROL

Traitement Phytothérapique des troubles de la Circulation et de la Nutrition.

**CHOLAGOQUE — ANTISPASMIQUE —  
DÉCONGESTIF — HYPOTENSEUR**

**Forme : Gouttes.**

**Composition.** — Synergie phytothérapique hypotensive à base de : Ail et Oignon, Romarin, Raifort, Cannelle, Safran, Badiane, Capillaire.

**Indications.** — *Troubles de la circulation :* Hypertension, Artériosclérose, Insuffisance cardiaque, États congestifs, Varices et Ulcères variqueux, Cédèmes, Hémorroïdes, Règles (formation et ménopause), Aménorrhée, Dysménorrhée.

*Troubles hépatiques et vésiculaires :* Ictères, Congestion du foie, Migraines, Constipation, Dermatoses, Urticaire, Eczémas, Psoriasis, Prurits, Anthrax, Furunculose.

*Maladies des reins et de la vessie :* Anuries, Dysuries, Pyuries.

*Arthritisme :* Rhumatismes, Goutte, etc...

*Troubles des voies respiratoires :* Emphysème, Asthme, Bronchites chroniques.

*Tous états infectieux* (suppurations rebelles).

*Modificateur du terrain dans les maladies héréditaires et acquises.*

### Posologie :

Prendre l'Helguerol dans un peu d'eau le matin au réveil :  
Troubles circulatoires..... XXX à C gouttes

États congestifs..... X à LXXV —

Dermatoses..... XV à C —

Dermatoses récidivantes..... X à LXXV —

Tous états infectieux (suppurations rebelles)..... X à LXXV —

*Vieillards :* réduire la dose.

A titre d'indication, 1 cuillerée à café = C gouttes.

*Il est recommandé de commencer le traitement par les doses faibles.*

Prendre les deux premiers flacons sans interruption.

La cure peut être prolongée pendant plusieurs mois sans inconvénient. Il n'y a aucune accoutumance, aucune toxicité et pas de contre-indication.

Il existe également une préparation d'Helguerol pour diabétiques et une préparation d'Helguerol spécial pour enfants.

*Doses de l'Helguérol spécial pour enfants :* X gouttes par année d'âge.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

### Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS (V<sup>e</sup>)  
(Tél.: Odéon 56-67.)

## HELMIFUGE ZIZINE

Traitement complet et atoxique des Parasitoses intestinales.

### Trois formules :

Simple (Vers ronds) : Pyréthrine, Kaolin colloïdal.  
Ténia (Ténias divers) : Pyréthrine, Étain, Protoxyde d'étain.

Huileux (Trichocéphales et Oxyures rebelles) : Pyréthrine, Carbures saturés paraffiniques.

**Formes.** — Tablettes chocolatées et suppositoires.  
Huile de viscosité spéciale pour lavements.

**Indications.** — Tous les cas de parasitisme intestinal reconnu (Oxyures, Ascaris, Ankylostomes, Trichocéphales, Anguillules, Lamblias, Trichomonas, Ténias divers). Complications secondaires et affections d'origine parasitaire soupçonnée : diarrhées colites parasitaires, appendicites vermineuses, colibacillooses. Dermatoses et prurits. Accidents nerveux dus aux toxines vermineuses : troubles du caractère (surtout chez les enfants), terreurs nocturnes. Anémies. Troubles de la croissance.

**Posologie.** — 1° **Helmfuge simple** (Vers ronds). — *Adultes* : 1 tablette le matin à jeun avec 1/2 verre d'eau ; 1 suppositoire le soir au coucher. *Enfants* : 1/2 tablette le matin à jeun ; 1 suppositoire le soir au coucher.

2° **Helmfuge ténia.** — *Adultes* : 1/2 tablette le matin à jeun ; 1/2 tablette avant le repas du soir. Poursuivre le traitement pendant huit jours sans aucune diète ni précaution alimentaire. *Enfants* de moins de 8 ans : 1/4 de tablette le matin à jeun ; 1/4 de tablette avant le repas du soir.

3° **Helmfuge huileux** (Trichocéphales et Oxyures rebelles). — Après un petit lavement évacuateur, administrer un lavement de 50 gr. d'**Helmfuge huileux** à garder. Employer de préférence une sonde de Nélaton et faire coucher le malade d'abord cinq minutes sur le côté gauche, puis sur le côté droit, enfin sur le ventre. Renouveler le traitement après huit jours.

Prix : 23 fr. 50.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie  
Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux  
Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et de Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 28-96.)

## HELMITOL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Anhydro-méthylène citrate d'hexaméthylène-tétramine.

**Propriétés et indications.** — Antiseptique et analgésique urinaire agissant même en milieu alcalin. Acidifie l'urine et libère du formaldéhyde. Bactériurie, Pyélite, Cystite, Pyélocystite, Urétrite, Abscesses urétraux et prostatiques, Infections des voies biliaires.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés dissous dans un verre d'eau, 3 à 4 fois par jour. Éviter la prescription d'eaux alcalines pendant la cure d'HELMITOL.

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés à 0 gr. 50.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sévres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

Règle les règles et supprime la douleur.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Trois analgésiques : Menthol, Phénacétine, Acide acétylsalicylique.

Un Emménagogue : Méthylnonylcétone.

Un Régulateur ovarien : Hypophyse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la Dysménorrhée, Régulateur du fonctionnement ovarien.

**Indications et Posologie :**

**Dysménorrhée :** Dès l'apparition des douleurs : 2 dragées. Répéter 2 ou 3 fois (maximum 8 par jour).

**Oligoménorrhée :** 3 ou 4 jours avant la date présumée des règles et jusqu'à leur apparition : 2 dragées 2 à 3 fois par jour (maximum 6).

**Douleurs de la Ménopause :** 2 dragées 2 fois par jour (maximum 6).

**Tranchées utérines :** 2 heures après l'accouchement, 2 dragées chaque heure, jusqu'à cessation des douleurs (maximum 8).

Flacon de 12 dragées : 10 fr. 80.

Flacon de 30 dragées : 20 fr. 50.

L. N. C. N° 479-13.

**Laboratoire P. SEVENET**

38, r. de Ponthieu — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Bal. 56-91.)

## HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsenicale  
phosphorée-strychnique.

**Doses et mode d'emploi :**

**Adultes :** 30 à 40 gouttes par jour.

**Enfants :** 2 gouttes par année d'âge et par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences. Tous états ganglionnaires, tous états infectieux. Asthme.

**Prix :** 19 fr. 50.

**Laboratoire CHATELUT**

H. CHATELUT, Pharmacien 1<sup>re</sup> classe  
65, rue Louis-Blanc PARIS (X<sup>e</sup>)

## HÉMATOÉTHYROÏDINE CARRION

**Composition.** — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure, ou desséché.

**Formes.** — Liquide. Comprimés et cachets dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

**Indications.** — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse. Insomnie, Hémophilie, Troubles de la ménopause.

**Posologie et mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

**Insomnies :** un comprimé au repas du soir.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 120 cc. : 39 fr. L'étui de 24 comprimés : 24 fr. 40.

La boîte de 24 cachets : 24 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. n° 514-35-45-124.

**Produits biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## HÉMÉDONINE

Solution d'Hématoporphyrine pure selon la formule de Nencki.

**Indications.** — États de dépression et de fatigue, Anémie, Déminéralisation, Vagotonie, États anxieux, Migraines, Stimulant général d'une innocuité absolue.

**Présentations.** — Deux formes :

**Ampoules** de 1 cc. et 2 cc. contenant 0 gr. 002 mgr.

d'Hématoporphyrine pure par cc.

**Gouttes :** flacon de 20 cc. contenant 0 gr. 005 milligr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

**Emploi.** — Ampoules, en injections intramusculaires profondes uniquement.

Se vend en boîte de 10 ampoules 1 cc. : 29 fr. 70.

10 ampoules 2 cc. : 47 fr. 50.

1 flacon gouttes : 59 fr. 30.

**Laboratoire C. GIREL**

J. LACOUR, Pharmacien

19, rue Godot-de-Mauroy — PARIS (9<sup>e</sup>).  
(Tél. : Opéra 76-24.)

## HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P<sup>r</sup> E. Maragliano.

**Composition.** — Sang de bœufs immunisés contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano..... 25 p. 100  
Alcool..... 14 —  
Glycérine..... 10 —  
Eau aromatique..... 51 —

**Indications.** — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofule. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

**Formes et Posologie.** — *Simple* : adultes : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas).

*Enfants* : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas).

*Triple* : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1207-1 et 1207-2.

Concessionnaire en France et Colonies :

F. GERIN, pharmacien

10, rue Jacquard — LYON

## HÉMOCALCINE

**Composition.** — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine ; sans arsénicaux intolérés, sans vitamines périssables.

**Propriétés thérapeutiques.** — Donne un PH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

**Indications.** — Anémie, Asthénie, Puberté, Dénutrition, Dépressions nerveuses et toxiques.

**Formes et mode d'emploi.** — 30 petits cachets. Un cachet par jour de 8 à 15 ans avant le repas.

2 à 3 cachets par jour pour les adultes avant le repas. En cas de contre-indication, formuler : HÉMO-CALCINE sans strychnine. Prix : 18 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

Vous rappelle ANTISUCE et ARTHRIDENT

Enregistré au L. N. C.

**Laboratoire FERCOQ, Licencié des sciences**  
**LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).**  
(Tél. : Gravelle 03-97.)

## HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactisante.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 36 fr. 75.

Boîte de 3 ampoules. Prix : 21 fr. 25.

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

(Tél. : Invalides 39-19.)

## HÉMODROME

(Phytothérapie Intégrale.)

**Forme.** — Liquide à prendre par gouttes.

**Composition.** — Anémone, Cupressus, Marron d'Inde, Berberis, Thlaspi, Thuya, Souci.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action supérieure à l'hamamélis et similaires. Ne contient aucun produit chimique. Assimilation plus rapide de par sa forme liquide que les produits pris en pilules ou en comprimés.

**Indications.** — Toutes affections du système veineux : varices, ménopause, règles irrégulières.

**Posologie.** — XV à XX gouttes 3 à 4 fois par jour dans un peu d'eau.

**LANOOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).**

(Tél. : Élysées 17-46.)

## HÉMODUCTYL

**Pilules. Gouttes.**

Extraits d'hamamélis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

**Dose moyenne.** — 2 pilules, ou 2 mesures, soit 120 gouttes, matin, midi et soir, avant les repas.

**Indications.** — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Pilules. Prix : 20 fr. 60.

Gouttes. Prix : 20 fr. 70.

**Laboratoires LICARDY**

38, boul. Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## HÉMOGÉNOL DAUSSE

(Sérum hémostatique de cheval.)

Ampoules buvables, non injectables, de 10 cc.

**Forme.** — Ampoules buvables en boîtes de 6.

**Indications.** — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémostase, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique, recommandé dans les affections hémorragiques et l'hémophilie.

### Formule :

Sérum hémostatique..... 8 cc.

Excipient glycérolé..... 2 cc.

pour une ampoule de 10 cc. non injectable.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules par jour, prises par la bouche, dans un peu d'eau sucrée ou en lavement.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## HÉMOGLOBINE DESCHIENS

**OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE**

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

**Nature.** — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine physiologique, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma non altérées.

**Action :**

- 1° Apport d'hémoglobine (fer globulaire).
- 2° Stimulation des organes hémostatiques (Hémostatopoiétiques).
- 3° Action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

**Indications.** — Anémies, Chlorose, Déchéances organiques, Tuberculose, Convalescences, Grossesses, Suite de couches.

**Possologie.** — Une cuillerée à potage à la fin des deux principaux repas. Doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

**DESCHIENS, Docteur en pharmacie**

9, rue Paul-Baudry — Paris (8<sup>e</sup>). — (Tél. : Élysées 40-26.)

## HÉMOLUOL

Phytothérapie toni-veineuse.

Liquide. Comprimés.

**Composition.** — Association d'extraits fluides stabilisés d'hamamélis, cupressus, bourse-à-pasteur, achillée, osier rouge, sénéçon, noisetier, anémone et marron d'Inde.

L'HÉMOLUOL existe sous deux formes : liquide et comprimés de composition identique.

Médication toni-veineuse périphérique et vaso-constrictive sans effets secondaires. Action décongestive et sédative de l'appareil utéro-ovarien.

**Indications.** — Toutes les insuffisances veineuses non néoplasiques : varices, phlébites, périphlébites, hémorroïdes, troubles de la ménopause, acrocyanose, engelures, couperose.

**Liquide.** — Prendre 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 10 jours par mois, entre les règles.

**Comprimés.** — Absorber deux comprimés au début de chacun des trois repas, 10 jours par mois, entre les règles.

Le liquide et les comprimés ont la même valeur thérapeutique, les mêmes indications et peuvent être employés indifféremment.

Le flacon ou la boîte de 50 comprimés :

Prix : 19 fr. 20.

**LABORATOIRES SUBSTANTIA ·**  
**M. GUÉROULT, Docteur en Pharmacie**

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

## HÉMOPANBILINE

**Forme.** — Comprimés et Solution.

**Définition.** — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de mécomptes.

**Composition.** — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Cholago-Cholérétiques) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

**Indications.** — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

**Dose.** — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

N° d'Enreg. au L. N. C. : 469-5-2, et 469-6.

Prix au public :

23 fr. 70 le flacon d'Hémopanbiline liquide.  
21 francs la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

**Laboratoires du Docteur PLANTIER**

ANNONAY (Ardèche).

## HÉMOPAUSINE

**Composition.** — Liqueur à base d'Hydrastis, Viburnum, Hamamelis, Capsicum, Senecion, Chlorure de calcium, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

**Action.** — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

**Indications.** — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour, avant les repas.

Prix : Le flacon de 220 cc., 15 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-1.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44)

## HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique.)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Boîte de 3 flacons-ampoules de formule :

Solution de pectine fraîche et stabilisée à 2 p. 100 .....	10
Chlorhydrophosphate de calcium .....	0,50
Solution titrée de genêt .....	0,20

(Pour 1 ampoule.) — Boîte de 3 ampoules.

**Avantages.** — Produit très actif, s'employant par voie buccale ; pas de contre-indication, pas de toxicité, même pour le très jeune enfant, pas d'accidents sériques, pas désagréable à absorber.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre préventif avant et après toute intervention sanglante.

**Mode d'emploi.** — 3 (enfants) à 6 (adolescents et adultes) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

**Prescription.** — 1 boîte ampoules Hémopectal Falvy.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux.

(Pour adultes.)

Formule :

Cacodylate de soude pur .....	20 centigr.
— de magnésie .....	10 —
Sulfate de strychnine .....	2 milligr.
Fer (méthylarsinate) .....	2 centigr.
Soluté chlorure isotonique .....	5 cc.

**Indications.** — Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

**Emploi.** — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse.

Boîtes de 12 amp. de 5 cc. Prix au public : 26 fr. 70.

**Hémo-Phagosthyl Infantile :** 12 ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans : 18 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-2.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 55-12.)

## HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques qu'elle qu'en soit l'origine-  
**Constitution.** — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'ani-  
maux réfractaires à la tuberculose contiennent : Hémoglobine dont  
l'activité oxydrique est maxima, sérum sanguin, lipides des globules  
rouges, lipides et ferments des leucocytes.

**Indications.** — Toutes anémies.

• Toxiques d'origine exogène ou endogène ;

2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;

3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;

4° Par cachexie néo-plasique.

L'Hémoplasme Lumière fait du sang, stimule toutes fonctions  
organiques, lutte contre les infections et contre les intoxications.  
Procédé le plus efficace de cure de tous états cachectiques. Stimule les  
défenses anti-toxique, anti-toxinique, anti-microbienne par suractivation  
hémopoïétique.

**Doses courantes.** — L'Hémoplasme Lumière peut être administrée  
par voie buccale, sous forme de granulé, de cachets et de dragées.

Granulés .....

Cachets .....

Dragées .....

Chez les enfants, employer de préférence la forme en granulé : une  
à 4 cuillerées à café par jour.

**Ampoules.** — Pour l'administration par voie intramusculaire

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

## HÉMOPTYSOL

**Composition.** — Association synergique de tartre stibié; d'Hélénine et de Phényléthylmalonylurée.

### Formule :

Tartre stibié .....	0 gr. 015
Phényléthylmalonylurée.....	0 gr. 02
Hélénine pure.....	0 gr. 03
Excipient .....	Q. S. P.

Un comprimé de 0 gr. 20.

**Propriétés et indications.** — Traitement des Hémoptysies légères par les médications sédatives et nauséuses.

Dans les Hémoptysies graves, en association avec l'hémorragine.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés toutes les 4 à 8 heures.  
Boîte de 20 comprimés.

### Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.  
(Tél. : Archives 44-59.)

## HÉMOPYLORE « 3 » BUvable

**Références.** — Ch. Aubertin, *Traitement des anémies graves par le foie*, 1938. — Ch. Aubertin et M<sup>me</sup> Hector, *Bulletin Société médicale des hôpitaux*, 14 novembre 1938. — Beiglbick, *Wien. Klinisch Wochenschrift*, 1941. — M. Graveron, *Thèse doctorat*, Paris, 1939. — M. Lombard, *Thèse doctorat*, Nancy, 1938. — B. Mouras, *Thèse doctorat*, Paris, 1937. — Wills, Clutterbuck et Evans, *Biochem. Journal*, 1937. — Winrobe, *Am. Journ. of Med. Science*, 1939.

**Composition.** — Combinaison originale des méthodes de Whipple, de Castle et de Wills.

5 cc. correspondent à 10 gr. de foie frais ;

— — 10 gr. d'estomac frais ;

— — 10 gr. de levure de bière fraîche.

L'HÉMOPYLORE « 3 » contient :

le principe antipernicieux préformé dans le foie ;

le principe antipernicieux préformé dans la levure ;

le principe antipernicieux issu de l'interaction de l'estomac sur le foie et la levure ;

le principe antimacrocytaire de la levure ;

les vitamines du groupe B<sub>2</sub> ; la vitamine B<sub>12</sub> ;

des acides aminés (histidine et tryptophane).

### Présentation.

Ampoules buvables de 5 cc.

La boîte de 10 ampoules..... 51 fr. 80

Le coffret de 30 —..... 123 fr. 80

Ampoules buvables de 2 cc.

La boîte de 12 ampoules..... 32 fr. 20

Le coffret de 30 —..... 64 fr. 40

### Posologie.

I. — *Anémies graves.*

a. Traitement d'attaque : 4 à 6 ampoules de 5 cc. par jour.

b. Traitement d'entretien : 2 à 4 ampoules de 5 cc. par jour.

II. — *Anémies légères.*

a. Traitement d'attaque : 2 à 4 ampoules de 5 cc. par jour.

b. Traitement d'entretien : 1 à 2 ampoules de 5 cc. par jour.

Chez les enfants, mêmes doses en ampoules de 2 cc.

A prendre au début des repas, soit pur, soit dans un peu d'eau sucrée.

Le traitement d'entretien, à doses réduites, peut être prolongé plusieurs mois.

**Indications.** — Toutes anémies : anémie pernicieuse, anémie macrocytaire d'origine alimentaire, sprue, anémies toxiques ou infectieuses, anémies par spoliation sanguine (pour les anémies hypochromes, voir GLOBIRON BUvable, p. 000). — États hémorragiques. — Asthénie, anorexie, convalescences.

### Laboratoire ROGER BELLON

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 francs.

Louis FERRAND, Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris, Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, avenue Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ély. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance publique et des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



## HEMOREX

**Traitement rationnel et complet  
des hémorroïdes.**

**Formes.** — Suppositoires, Pommade et Gouttes

**SUPPOSITOIRES ET POMMADE.** — A base de paraminobenzoate d'Ethyle, analgésique puisant et sans danger, de sous-gallate de bismuth et d'oxyde de zinc, cicatrisants et antiseptiques extrêmement actifs, combinés en un excipient spécial antiseptique s'opposant à l'infection microbienne et empêchant en outre toutes les irritations de contact.

**Indications.** — Hémorroïdes, rectites, fissures, états inflammatoires de la muqueuse anale, prostatite. Le prurit anal est rapidement supprimé par la pommade.

**Mode d'emploi.** — 1 suppositoire matin et soir. Application simultanée de la pommade sur la muqueuse externe.

**GOUTTES HÉMOREX.** Composées d'alcoolatures et de teintures stabilisées de plantes sélectionnées et réputées pour leur action spécifique sur les troubles veineux circulatoires (Marrons d'Inde, Hamamelis, Viburnum, Cupressus, Anémone).

**Propriétés.** — Combattent l'atonie de la paroi vasculaire par leur action vaso-constrictrice énergique. Stimulant Ovarien. Sédatif utérin.

**Indications.** — Varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorroïdes, troubles de la Ménopause, dysménorrhée, aménorrhée.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée avant les repas (20 jours par mois).

**Prix :** Suppositoires : 17 francs.

Pommade et Gouttes : 15 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 1266-1, 2 et 4.

**Laboratoires HEMOREX**

**R. PAULY, Pharmacien**

9, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pér. 43-22.)

## HÉMORRAGINE

**Compositions.** — Solution aqueuse stérile de Rouge Congo médicinale purifié à 1 p. 100.

**Propriétés.** — Provoque l'hémostase spontanée par modification de la formule du sang et de sa teneur en fibrinogène.

**Indications.** — Hémorragies de toute nature : Digestives, Pulmonaires, Gynécologiques, Urinaires, Traumatiques, etc., Hémophilie.

**Mode d'emploi.** — Injections intraveineuses, 1 ampoule de 10 cc. toutes les 8 heures.

Boîte de 6 ampoules.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## HÉMOSTATIQUE COUDERT

**Composition.** — Tubes scellés de 20 cc. contenant 0 gr. 10 d'émulsine en solution stabilisée.

**Propriétés.** — Puissant hémostatique, coagulant, tonique, sans toxicité, sans action sur la tension artérielle et la viscosité sanguine.

**Indications.** — Hémorragies de l'appareil digestif, des affections gynécologiques (fibrome, cancer, métrite), des affections urinaires (rein, vessie, prostate), tuberculeuses, lithiasiques ou néoplasiques. Hémoptysies.

Accidents hémorragiques dus à l'hyporésistance globulaire (anémie, affections du foie, purpuras hémorragiques).

Préventif et curatif de toutes les réactions sériques d'origines pathologiques, alimentaires ou médicamenteuses (hémorragie intestinale de la fièvre typhoïde, paludisme, réactions sériques, idiosyncrasies médicamenteuses ou alimentaires, urticaire). Spécifique de l'hémophilie, Hémogénie, hémorragies dues à des altérations de la crase sanguine (période de ménopause, règles abondantes, épistaxis rebelles).

Doit être employé dans toute opération chirurgicale susceptible d'entraîner une grosse perte sanguine (ablation des amygdales, végétations adénoïdes), en obstétrique et en stomatologie, prostatectomie (avulsion dentaire).

### Posologie :

**Curatif :** 1 à 8 ampoules par jour suivant la gravité des cas.

**Préventif :** 1 ampoule la veille, 1 ou 2 ampoules 1 ou 2 heures avant l'opération.

Pour les hémophiles, faire suivre un traitement de 2 ampoules par jour avant l'opération et vérifier les résultats obtenus en faisant un examen du sang (temps de saignement et de coagulation).

Le produit doit être pris dans un liquide froid, pur, ou aromatisé avec du jus d'orange ou de citron.

### Présentation et prix :

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. : 26 francs.

Boîtes de 6 ampoules de 20 cc. : 46 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 20 cc. : 80 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 453-1.

**Laboratoires COUDERT A. I. H. P.**

13, rue Antoine-Villon — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 59-72.)

## HÉMOSTATIQUE ERCÉ

**Composition.** — Suspension lipo-colloïdale stérile de Cytosyme titrée.

**Propriétés.** — Hémostatique et coagulant énergique (1 cc. de suspension coagule en 20 secondes 20 cc. de sang).

**Applications.** — Localement et *per os*. (Il ne doit jamais être utilisé en injections.) L'ingestion *per os* réduit d'une façon appréciable le temps de coagulation du sang (hémophilie).

**Indications.** — *Médecine* : Toutes hémorragies de pratique courante, Epistaxis, Hémorragies utérines, Hématémèses, etc.

*Chirurgie* de l'abdomen. Chirurgie osseuse, gynécologique et urinaire. Prostatectomies, Chirurgie esthétique. Préparation des opérés.

*Oto-rhino-laryngologie* : Epistaxis rebelles, ablations d'arygdales ou végétations, Préparation des opérés.

*Stomatologie et odontologie* : Toutes hémorragies buccales ou dentaires.

**Mode d'emploi.** — *Localement* : 1<sup>o</sup> *Surfaces saignantes* : Applications au moyen d'un tampon de coton stérile. Si l'écoulement est violent, faire une légère pression. — 2<sup>o</sup> *Organes creux* : tamponner au moyen de mèches imbibées d'Hémostatique Erce.

*Per os* : 10 à 20 cc. quotidiennement, pendant 3 ou 4 jours.

**Formes et prix.** — Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. : 15 fr. 20

6 ampoules de 5 cc. : 22 fr. 30

6 ampoules de 20 cc. : 44 fr. 10

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 20-60.)

## HÉMOSTATIQUE GOY

### Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté..... 0,75

Extrait fluide de Prêle..... 4

Chlorure de calcium..... 20

Sirop d'orties grièche..... 20

Pour 100 gr.

**Indications.** — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

**Avantage.** — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

**Mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Prix : 18 fr. 30.

Durée : 10 jours environ.

**Établissements GOY**

23, rue Beaureillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 34-68.)

## HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique et des Avitaminoses D.

**Composition.** Vitamine D cristallisée (dosée à 40 millions d'unités standard internationales au gramme), Hémoglobine, sels de chaux, le fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Inocuité absolue.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguin ; recalcaifiant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

**Indications.** — Rachitisme infantile, anémies, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculeuse). **Reconstituant physiologique**

**Deux formes :** Granulés. — Ampoules buvables de 5 cc. (boîtes de 8, 16, 32 ampoules).

**Posologie et mode d'emploi.** — *Enfants :* Au-dessous d'un an une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau. De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour ou une ampoule sans alcool.

*Adultes :* Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas ou deux ampoules.

Laboratoire A. DEFFARGE

S. Chenilleau, Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

## HÉMOSTRA « ROCHE »

**Composition.** — Solution de tryptophane et d'histidine. Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves (Fontès et Thivolle).

**Propriétés.** — Apporte directement à l'organisme en proportions rationnellement dosées les principes actifs du foie sans provoquer de dégoût, détermine l'élévation immédiate du taux de l'hémoglobine et du nombre des globules rouges.

**Indications.** — Toutes les Anémies graves, bierrémériques, leucémiques, néoplasiques, tous les états de Déficience organique, Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, Ulcères, Angine de poitrine, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — *Voie intramusculaire ou sous-cutanée :* 1 ampoule de 5 cm<sup>3</sup> ou de 2 cm<sup>3</sup> 5, suivant les cas tous les jours. *Voie intradermique :* 1 amp. de 1 cm<sup>3</sup> tous les jours pendant 21 jours. Ampoules 5 cm<sup>3</sup>, 2 cm<sup>3</sup> 5, 1 cm<sup>3</sup> : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-13.

Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Arch. 91-10)

## HÉ MOSTYL

**Composition.** — Sérum frais de cheval recueilli sur l'animal en pleine crise de régénération sanguine.

**Indications.** — Tonique polyhormonal, Hémopoïétique. Hémostatique.

**Présentations.** — 1<sup>o</sup> Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. ; 2<sup>o</sup> Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc. ; 3<sup>o</sup> Sirop, flacon de 300 gr.

**Posologie.** — Anémie : 1 ou 2 ampoules par jour en ingestion ou lavement, ou 2 à 3 cuillerées à potage de sirop.

*Enfant :* Demi-dose.

Hémorragies : Ingestion ou lavement de 3 ampoules ; application locale.

Hémorragies graves : Injection sous-cutanée de 30 cc.

Prix au public :

La boîte .....	31 fr. 60
Le coffret .....	88 fr.
Le flacon de sirop .....	28 fr. 70

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOIÉTIQUE

S. A. au cap. de 15.000.000 de fr. — R. C. Seine 12.384

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 68-22.)

## HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

**Indications.** — Maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, surmenage, débilité générale, croissance.

**Posologie.** — *Adultes.* — 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

*Enfants :* 1 cuillerée par repas.

Prix : 17 fr. 65.

Forme Elixir : 22 fr. 20.

Elixir.		Granulés.	
Arrhénal.....	0,07	Hémoglobine cristallisée..	5 gr.
Acide nucléinique .....	0,20	Glycérophosphate de	
		chaux .....	5,00
Hémoglobine .....	5,—	Poudre orchitique.....	0,50
Glycérophosphate de chaux.	5,—	Thyroïde poudre .....	0,20
Suc orchitique .....	2,—	Méthylarsinate disodique.	0,20
Fluorure de sodium .....	0,01	Fluorure de sodium.....	0,10
Alcool à 90° .....	20,—	Excipient pour.....	100 gr.
Suc thyroïdien .....	2,—		
Excipient aromatique. Q.S.			
pour.....	100 gr.		

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarqay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## HÉMOVÉINE

Comprimés.

**Composition.** — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus. 2° Poudres d'organe à sécrétion interne: ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

**Action.** — Pharmacodynamique multiple: Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de stase veineuse.

**Indications.** — Maladies veineuses en général: Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne: Dysménorrhée, Métorrhagie, Troubles de la Ménopause, Troubles de la circulation générale.

**Mode d'emploi.** — 6 dragées par jour à raison de 2 avant chacun des trois repas.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. Méd. sous le n° 718-4.

**Laboratoires BRICHARD et fils**  
BAR-LE-DUC (Meuse).

## HÉMYPNAL

CIBA

Trichloro-butyl-alcool.

Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone.  
Diallylmalonylurée, Ethyl-morphine.

ANALGÉSIQUE PELVIEN.

Très peu toxique, utilisable pour toutes les douleurs du pelvis.

Suppositoires.

**Obstétrique.** — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine).

**Gynécologie.** — Dilatations, curetages, pansements douloureux, crises dysménorrhéiques.

**Urologie.** — Explorations sur le rein, la prostate, l'urètre, la vessie, béniques, etc.

**Chirurgie.** — Remplace la morphine après les interventions.

**Doses.** — 1 à 4 suppositoires par 24 heures.

**Formuler.** — Boîte de 3 suppositoires;

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## HÉPACRINE

Du Dr Debat

Extrait désalbuminé et délipodé de foie.

Deux formes : buvable et injectable.

**Indications.** — Les anémies graves, les hémorragies, les anémies post-opératoires, les anémies des paludéens, les insuffisances hépatiques.

La forme injectable est appliquée, de préférence, dans les cas d'intolérance gastrique et d'hépatoparésie ou ceux très graves, exigeant une action immédiate.

**Posologie:**

**Adultes:** 1 à 3 amp. buvables ou 1 à 2 injectables par jour.  
**Enfants:** 1 à 2 ampoules de 3 cc. par jour, ou une ampoule injectable.

**Présentation:**

Boîte de 6 amp. de 12 cc. (1 amp. = 100 gr. d'organe) .....	44 fr. 40.
— 12 — de 3 cc. (1 amp. = 25 gr. d'organe). 29 fr.	
— 10 — injectables de 2 cc. ....	42 fr.

**Laboratoires du Docteur F. DEBAT**  
60, rue de Monceau — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## HÉPACRINOL

**Composition.** — Extraits de foie de veau, rate, muscle et orchitine.

**Indications.** — Asthénie, Déficiences.

**Posologie :**

**Adultes:** ampoules 5 cc., 1 à 3 par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Enfants:** ampoules 2 cc., 1 à 3 par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Laboratoires**

**d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## HÉP'ACTI

(anciennement HÉPASÉRUM)

Méthode de Whipple et de Castle.  
Tréphones embryonnaires amino-acides.

**Indications.** — Anémies graves ou secondaires, Anémies infantiles, Convalescences, Croissance, Asthénie, Insuffisances hépatiques.

**Forme.** — Ampoules buvables de 10 cc.

### Formule :

Extrait hémapoiétique de foie 1 = 20 ....	0 gr. 375
— d'autre pylorique 1 = 20.	0 gr. 625
Extrait hémapoiétique embryonnaire 1 = 20.	1 gr. 25
Extrait désalbuminé d'hématies .....	5 gr.
Méthylarsinate disodique .....	0 gr. 01

Excip. Q. S. pour un tube scellé de 10 cc.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1315-10.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 ampoules par jour, suivant l'avis du médecin. Prendre le contenu de chaque ampoule au début du repas dans un peu d'eau ou de potage.

**Prix:** 46 fr. la boîte contenant 10 ampoules de 10 cc.

Laboratoires de l'AÉROCID

R. DERAMBURE, Pharmacien

20, rue de Pétrograd — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Eur. 52-99.)

## HÉPADRAINASE

Médicament réalisant un drainage puissant des voies biliaires.

### Composition :

- I. Sulfate de Magnésie pur anhydre.
- II. Peptones d'œuf, de viande, de poissons.
- III. Cholate de Soude.

**Indications.** — Toutes affections atoniques des voies biliaires et en particulier :

Cholécystite, Cholécystatonie, Congestion hépatique, Insuffisance hépatique.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** le matin à jeun, dans 1/2 verre d'eau, 1 à 3 cuillerées à café d'Hépadrainase.

**Enfants :** à partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café.

**Prix :** La boîte de 125 grammes. 21 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-2.

Laboratoires du Docteur H. MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 39-44)

## HÉPADROPS

Drainage Hépato-Biliaire.

Association nouvelle d'Alcoolatures de plantes fraîches exotiques et de Vitamine B<sub>3</sub>.

**Indications.** — Troubles de l'excrétion biliaire : Cholécystites subaiguës et chroniques, Ictères, Engorgement des voies biliaires, Congestion de la vésicule et troubles réflexes, Angiocholites, Troubles fonctionnels de la cellule hépatique, Diathèse arthritique, Congestion du foie, Asthme à épine irritative hépatique, Migraine, Urticaire, Prurits, Rétention azotée, Hypercholestérinémie, Hypovitaminose B et ses retentissements d'ordre hépatique : Constipation par atonie-facteur d'auto-intoxication, Troubles du métabolisme des glucides (diabète), Arthrite, Rhumatisme articulaire.

**Formule.** — Vitamine B<sub>3</sub>, 0 mgr. 4 ; Alcoolature Veronica Virginica, 1 gr. ; Alcoolature Ptelea Trifoliata, 1 gr. ; Tinct. Combretum Raimbaultii, 40 gr. ; Alcool à 40° Q. S. pour 100 gr.

**Posologie.** — X à XX gouttes 2 fois par jour, à distance des repas, de préférence 1/2 heure avant.

**Dose moyenne** pouvant être portée à XXX gouttes par prise. Dans les cas aigus : V à X gouttes 3 à 4 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1965-2.

Laboratoires KERCKOVE

Place Charles-Roussel — TOURCOING.

## HÉPAFLORINE

(Dragées vertes hépato-néphrotropes.)

**Priorité.** — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par nos soins en 1934.

**Composition.** — Barbiflore totale, Cynara scolymus et extrait total hépatique.

**Propriétés.** — Diurétique hépatotonique, décholestérinisant, antilithiasique et protéolytique assurant une normalisation progressive des métabolismes déviés et une parfaite épuration de l'organisme.

**Indications.** — Toutes affections hépatiques ou hépatorénales et les syndromes associés. Cirrhoses, Œdèmes et Ascite, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie en excès, Athérome, Hypertension, Lithiases, Arthritisme, Suites d'infections aiguës, Maladies coloniales, etc.

**Posologie.** — 3 à 9 dragées aux repas, en moyenne 6 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

Laboratoire DE LA BARBIFLORE

H. ADAM, pharmacien

4, rue du Rocher — MONACO

## HÉPAFLUOL

**Composition.** — Peptone préparée par Witte, sulfate de soude et de magnésie, poudre de réglisse.

**Propriétés.** — Cholagogue, eupeptique, laxatif, stomachique, désensibilisation.

**Indications.** — Insuffisances hépatiques, constipation, dermatoses, eczémas, urticaire, asthme, hypertension, gastralgies.

**Forme.** — Poudre.

**Doses.** — Comme Cholagogue : une à trois cuillérées à café le matin à jeun.

Comme Désensibilisateur : une demi-cuillérée à café avant les deux principaux repas.

Prix : 20 fr. 70. Durée moyenne : 15 jours.

**Laboratoires GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.  
(Tél. : 60-55.)

## HÉPALIUM

**Composition.** — Extrait de foie frais associé à de l'extrait d'ail, sous forme d'ampoule.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Troubles de croissance, Tuberculose, Prétuberculose, Insuffisance hépatique.

**Action.** — Reconstituant général et antiscleureux, Antiseptique pulmonaire, Cardiotonique, Reprise de l'appétit, Réapparition des forces, Élévation du poids.

**Présentation.** — Ampoules buvables.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules par jour dans un peu d'eau au début des repas.

**Laboratoires BIOS**

10, rue Vineuse — PARIS.  
(Tél. : Tro: 57-44.) (Télégraphie Bios-Paris.)

## HÉPALOMEL VÉDÉ

**Affections hépatiques.**

1° *Comprimés verts* stimulants des fonctions biliaires (Extrait mou *total* d'artichaut, extrait d'iris versicolor, extrait de combrétum, extrait de boldo).

2° *Comprimés jaunes* complémentaires, antiseptie et action crypto-toxique.

(Palmitate de soude, bile de bœuf dépigmentée et desséchée, calomel.)

Les 12 premiers jours : 3 comprimés verts par jour.

Les 6 derniers jours : 2 comprimés jaunes par jour.

Prix de la boîte contenant les comprimés verts et jaunes : 27 fr. 60 pour un traitement de 18 jours.

**Société des Laboratoires de MONTMOROT**  
**G. de MONTMOROT**, pharmacien

12 bis, rue Keppler — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## HÉPAMINE MAUCHANT

**Ampoules buvables et comprimés.**

**Composition.** — Acides aminés hématogènes, résultant de l'hydrolyse diastasique aseptique de globules rouges. Contient non seulement le tryptophane et l'histidine, mais la totalité des acides aminés nécessaires à la synthèse de l'hémoglobine.

**Mode d'action.** — L'Hépamine Mauchant réalise la médication hématogène la plus complète. Elle fournit à l'organisme tous les éléments indispensables à la reconstitution de l'hémoglobine.

**Indications.** — Anémies graves, anémies secondaires aux infections et intoxications, chlorose. Carence organique en acides aminés, anémies d'origine alimentaire.

**Posologie :**

*Adultes* : ampoules buvables : 1 à 3 par jour. Comprimés : 8 par jour.

*Enfants* : ampoule : 1 par jour. Comprimés : 2 à 4 par jour.

Prix : { la boîte de 6 ampoules de 15 cc. : 30 fr. 20.  
la boîte de 40 comprimés : 30 fr. 20.

**Laboratoire MAUCHANT**

J. EURY, Docteur en Pharmacie.  
GENNEVILLIERS (Seine).

## HÉPAMULT

Extrait du Foie.

Réalisation pratique des méthodes de Whipple et de Castle sous une forme nouvelle, solide (granulé dragéifié) qui permet un emploi facile et un prix de revient moindre. 20 grammes d'Héпамult équivalent très sensiblement, quant à leur action antianémique, à 500 gr. de foie frais. C'est donc la dose quotidienne d'un traitement très énergique, permettant cependant aux fonctions digestives des malades de s'accommoder simultanément de la ration alimentaire que le médecin peut, d'autre part, juger utile.

**Doses.** — 10 ou 20 gr. par jour (2 ou 4 cuillères, mesure incluse dans la boîte).

**Emploi.** — Au milieu ou à la fin d'un ou des repas. Ne pas mâcher (amertume). Avaler soit avec une gorgée de liquide, soit mélangé à un peu de potage, purée, confiture, etc.

Prix: 25 fr. la boîte pour 5 à 10 jours.

Laboratoires **NORGAN**

**Pierre ALEXANDRE**, Pharmacien.

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64 36)

## HÉPANÈME CARRION

Médication des anémies en général.

**Composition.** — Association d'extrait concentré de foie, de protoxalate de fer et de phosphate de soude.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Posologie et mode d'emploi.** — 4 à 6 comprimés par jour, aux repas.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 50 comprimés : 26 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. 514-37.

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45 2 lignes groupées.)

## HÉPANOVA

Extrait de foie et de rate.

Traitement des diverses anémies.

Troubles de croissance, Rachitisme, Neurasthénie, Convalescence, Suites d'opérations et de gripes.

10 ampoules buvables de 5 cc. Prix : 36 fr. 70.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule avant chaque repas à prendre dans un peu d'eau.

Laboratoire **BIOSEDRA**

**G. MAHOUT**, Pharmacien.

60, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 19-13, 19-14.)

## HÉPARÉGULINE WANDER

Régulateur des fonctions hépatiques, stimule le foie, draine la bile.

**Composition.** — Sulfate de magnésie desséché, citrate trisodique, peptones polyvalentes purifiées, extrait d'artichaut désalbuminé, extrait de boldo. Sucre aromatisé.

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Cholérétique.* — Stimule la cellule hépatique, active la sécrétion biliaire, réveille les fonctions glycogénique, antitoxique, uropélique du foie.

*Cholagogue.* — Provoque l'excrétion biliaire, draine les voies intestinales.

**Indications thérapeutiques.** — *Affections hépatobiliaires.* —

Congestion du foie et de la vésicule biliaire, insuffisance hépatique, cholémie, lithiase biliaire, cholécystites médicales, icères.

*Affections intestinales.* — Nausées, constipation, entéro-colite. *Troubles généraux.* — Céphalées, migraines, vertiges, urticaire, maladies des pays chauds.

**Mode d'emploi.** — Le matin, à jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner, dans un demi-verre d'eau tiède.

Dose curative (10 à 15 jours) : 2 à 4 cuillères à café.

Dose d'entretien (2 à 3 mois) : 1 à 2 cuillères à café pendant 3 à 4 jours, puis repos 2 à 3 jours, ensuite reprendre la cure.

Enfants (au-dessus de 3 ans) : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

**P. BASTIEN**, Pharmacien

CHAMPIGNY (Seine), (Tél. : Tremblay 09-78, 09-79.)

## HÉPARTICHAUT INFANTILE

### Granulé.

Extrait mou d'artichaut .....	2 gr.
Poudre de foie .....	2 gr.
Citrate de soude .....	5 gr.
Citrate d'hexaméthylène-tétramine .....	0 gr. 50
Manne .....	5 gr.
Excipient Q. S. pour .....	100 gr.

De 1/2 cuillerée à café à 3 cuillerées à soupe par jour (de 3 mois à 15 ans), avant les repas

## HÉPARTICHAUT ADULTES

### Dragées.

Extrait sec d'artichaut .....	0 gr. 05
Poudre de foie .....	0 gr. 10
Bile .....	0 gr. 05

De 1 à 6 dragées par jour avant les repas. par dragée

**Indications.** — Toutes les insuffisances hépatiques, Ictères, Cholémies familiales, Disfonctionnement hépatique consécutif aux maladies infectieuses et aux intoxications, Constipation d'origine hépatique et ses conséquences : Migraines, Dermatoses, etc...

Laboratoire R. COUDERT

Ex-interne des Hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine,  
19, avenue Payret-Dortail, PLESSIS-ROBINSON (Seine).  
(Tél. : Robinson 1306.)

## HÉPASTHÉNYL

Méthode de Whipple et Castle.

### Formule :

Extrait hépatique .....	3 gr. 20
— Antre pylorique .....	3 gr. 50
Sérum sanguin .....	3 gr. 30
Pour 1 ampoule buvable de 10 cc.	

### Forme :

Ampoules buvables 10 cc. adultes.  
Ampoules buvables 3 cc. enfants.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Débilité, Insuffisances globulaires, Surmenage, Dystonies vago-sympathiques.

Laboratoire de l'HÉPASTHÉNYL

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

## HÉPATHÉMO DESCHIENS

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple. Technique de Minot et Murphy.

**Indications.** — Syndromes anémiques, Anémies pernicieuses. Asthénies. Insuffisance hépatique.

**Formes thérapeutiques.** — Ampoules buvables non injectables, Sirop.

**Présentation.** — *Ampoules* : 1 ampoule de 10 cc. correspond à 125 gr. de foie de veau frais. 1 ampoule de 3 cc. correspond à 38 gr. de foie de veau frais.

*Sirop* : 1 cuillerée à soupe correspond à 24 gr. de foie de veau frais.

En raison de sa concentration élevée l'HÉPATHÉMO DESCHIENS constitue une médication relativement peu onéreuse.

**Posologie.** — *Adultes* : Anémies graves : 3 ampoules de 10 cc. par jour.

Anémies moyennes : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour ou 2 à 4 cuillerées à soupe de Sirop. Anémies légères : 1 ampoule par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe de Sirop. Insuffisance hépatique : 1 à 3 amp. de 3 cc.

*Enfants* : Sirop de préférence ou 2 à 3 ampoules de 3 cc. par jour.

**Mode d'emploi.** — Les ampoules ou le sirop seront absorbés dans un liquide non alcoolique tiède, de préférence à la fin des deux principaux repas.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — Paris (8°). — (Tél. : Élysées 40-26.)

## HÉPATICALCION GRÉMY

**Composition.** — Extrait de Foie de veau frais associé au Chlorure de Calcium.

XX gouttes = 0,25 de Chlorure de Calcium.

**Indications.** — *Recalcifiant. Reconstituant.* Rachitisme Grossesse, Carie dentaire, Tuberculose.

**Hémostatique.** Hémorragies, Prophylaxie pré et post-opératoire.

### Posologie :

Enfants jusqu'à 2 ans : V gouttes	} 3 fois par jour.
Enfants jusqu'à 9 ans : XXV gouttes	
Au-dessus de 9 ans et adultes : L gouttes	

Prix : le flacon, 22 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 503-68.

Laboratoires GRÉMY

J. ROY et Cie, Pharmaciens

14, rue de Clichy — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 48-43.)



## HEPATIC-EFA DU D<sup>r</sup> LECACHEUX

Ampoules buvables et cachets combinés.

**Composition.** — Extraits spéciaux de plantes fraîches stabilisées : Eclaire (ou Chéilidoine), Fenouil, Artichaut (Efa).

*La Chéilidoine*: Action cholérétique intense, triple de celle de l'artichaut.

Action cholécysto-sédative élective par abaissement du tonus vésiculaire (prof. Loeper, A. Lemaire, H. Dany).

Tolérance absolue.

**Propriétés.** — Active la sécrétion hépatique. Apaise le spasme vasculaire. Facilite le drainage médical de la vésicule. Sédatif profond et régulateur physiologique atoxique.

**Indications.** — Stase, Rétention, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique et ses manifestations secondaires (Migraines, Eczéma).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 12 ampoules buvables et 12 cachets..... 42 fr. 50

Boîte d'essai, 6 ampoules buvables et 6 cachets..... 23 fr. 70

**Posologie.** — 1 cachet au réveil avec 1/2 verre d'eau; 1/4 d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans un peu d'eau.

Laboratoire BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

## HEPATICOL

Granulés fondants.

Composition :

Extrait mou de romarin .....	1 gr.
— de sauge .....	0 gr. 50
— de mélisse .....	0 gr. 50
— de boldo .....	1 gr.
— de combretum .....	1 gr.
— de Podophyllum .....	0 gr. 05
Sulfate de Magnésie .....	28 gr.
Salicylate de soude .....	1 gr. 50
Urotropine .....	0 gr. 70
Peptone de fibrine .....	1 gr. 00
— de gélatine .....	1 gr.
— de viande .....	1 gr.
Sucre aromatisé .....	q. s. pr. 100 gr.

**Indications.** — Excitation de la cellule hépatique. Drainage médical des voies biliaires. Antisepsie hépatique rénale et intestinale. Anaphylactique.

**Posologie.** — 2 cuillerées à café (ou 10 gr.) le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède. 1 cuillerée à café pour les enfants à partir de 5 ans.

Prix : 22 francs.

L. N. C. M. n° 1208-1.

Laboratoires Olivéol et Hépaticol ETIÉVANT

L. BORNET, Docteur en pharmacie, Licencié ès sciences  
5, Bd des Brotteaux — LYON.

## HEPATIOR

Tubes scellés à diluer dans une bouteille d'eau minérale

Composition :

Solution concentrée phytothérapique :

Mentha piperita .....	0 gr. 071
Curcuma xanthorriza .....	0 gr. 050
Anemona hepatica .....	0 gr. 500
Piscidia erythrina .....	0 gr. 019
Excipient colorant glyciné.....	

30 cc. par tube scellé.

**Indications.** — Tous les états congestifs et douloureux du Foie, de la Vésicule biliaire, des Reins, de la Vessie. Spécifique de la Lithiase biliaire et rénale (HEPATIOR calme rapidement la douleur, provoque l'évacuation des calculs).

Cholagogue complet (cholérétique et cholécystokinétique à action douce), Sédatif et Déplétif.

Médication des Pléthoriques, Arthritiques, Goutteux. Par son action décongestive est également à prescrire dans les douleurs menstruelles.

HEPATIOR est atoxique et d'un goût très agréable.

**Présentation et prix :** 25 fr. la boîte de 4 tubes scellés.

**Mode d'emploi.** — Diluer 4 tubes dans une bouteille d'eau minérale (source à définir).

**Posologie.** — Adultes : par verre à madère.

Enfants : par verre à liqueur.

**Traitement complet :** prescrire 8 boîtes HEPATIOR à prendre sans interruption : 4 bouteilles, soit 4 boîtes, pendant 12 jours : 6 verres (au réveil, 9 heures, 11 h. 30, 16 heures, 18 h. 30, au coucher).

Puis 3 bouteilles, soit 3 boîtes à raison de 4 verres par jour (au réveil, 11 h. 30, 18 h. 30, au coucher).

Enfin 1 bouteille, soit 1 boîte, à raison d'un verre au réveil et au coucher.

**Crises aiguës :** Coliques hépatiques, néphrétiques, menstruelles.

Un verre de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation complète des douleurs.

**Hépatisme léger, Foie colonial :** tous les mois, cure d'une bouteille, soit 1 boîte, à raison d'un verre au réveil et au coucher.

La boratoires LOISEAU

LOISEAU, Pharmacien.

119, rue Cardinet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wag. 08-16.)

## HÉPATISMINÉ

Suppléance et stimulation de toutes les fonctions du foie par synergie physiologique.

**Composition.** — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005, évonimine, 0,005 ; podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinisés.

**Cholagogue,** excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

**Indications.** — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique, glycosurie, piéthore abdominale.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

Prix : 20 fr. 30 le flacon de 40 comprimés.

**Laboratoires TACHOT et VIGAN**  
103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trinité 04-49.)

## HÉPATO-5

Le meilleur agent de drainage du foie et des voies biliaires.

Anti-choc humoral.

Sans aucune contre-indication.

### Composition :

Peptone de viande .....	8 gr.
Sulfate de magnésie.....	20 —
Sulfate de soude.....	5 —
Hyposulfite de magnésie ....	5 —
Extrait de jaborandi.....	0 gr 50
Pour 100 grammes de granulé.	

### 5 indications principales :

- 1° *Troubles hépatiques proprement dits* : Engorgement du foie et de la vésicule, ictères, cirrhoses.
- 2° *Troubles anaphylactiques* : Migraine, urticaire, eczémas, vertiges.
- 3° *Troubles dyspeptiques réflexes* : Hyperchlorhydrie par insuffisance biliaire, aérophagie, rougeurs de la face après les repas.
- 4° *Troubles intestinaux* : Constipation, alternative de diarrhée et de constipation, aérocolie.
- 5° *Troubles nerveux fonctionnels* (le plus souvent d'origine hépatique) : Émotivité, angoisse, tremblements.

### Posologie.

- 1° *Cholagogue* : 2 cuillerées à café dans un quart de verre d'eau tiède, le matin à jeun. 15 jours par mois.
- 2° *Anti-choc humoral* (urticaire, réactions sériques) : une cuillerée à café dans un peu d'eau, 3/4 d'heure avant les repas, matin, midi et soir.
- 3° *Pour les enfants* : 1/2 dose ou 1/4 de dose suivant l'âge.

**Présentation.** — Granulé extrêmement friable et soluble, agréable au goût, en boîtes métalliques contenant la quantité suffisante pour un traitement de 12 à 15 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1969-1.

Prix : 23 francs.

**Laboratoire C. ROYANNAIS**

17, rue Bodin — LYON (1<sup>er</sup>).

Envoi d'échantillons médicaux sur demande.  
(Tél. Burdeau 13-66.)

## HÉPATOCARNINE LEFRANÇO

Synergie hépatocarnée.

**Composition.** — Association de la méthode de Whipple et de la Zomothérapie. (Extrait de Foie de Veau Frais et Suc Musculaire de bœuf cru, à haute concentration.) Action synergique des principes musculaires et hépatiques.

**Propriétés.** — Antianémique par le foie de veau frais, reconstituant général par le suc musculaire cru.

**Indications.** — Toutes les anémies, pernicieuses, primitives ou secondaires, médicales ou chirurgicales, anémie infantile, lymphadénie, anémie rachitique, anémie des tuberculeux, toutes déficiences permanentes ou transitoires de l'organisme.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules de 10 cc. Présentation spéciale pour enfants.

**Posologie.** — 2 à 3 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse.

- Traitement d'attaque :** 3 ampoules par jour pendant 15 jours.
- Traitement d'intensité moyenne :** 2 ampoules par jour pendant 10 jours. A renouveler après 10 jours d'interruption.
- Traitement d'entretien :** 3 fois par semaine pendant 1 mois, 2 ampoules par jour.

**Remarque.** — L'Hépatocarnine peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait du biberon (au-dessous de 40°), à la dose de 1 à 2 ampoules.

Laboratoires LEFRANÇO

36 à 46, av. de Metz.-ROMAINVILLE (Seine).  
(Tél. : Nord 19-52.)

## HÉPATOCURE

Composition :

Crème de tartre.....	0,25
Benzoate de soude.....	0,05
Citrate de soude.....	0,075
Phosphate de soude.....	0,025
Bicarbonate de soude.....	0,10
Salicylate de soude.....	0,025
Peroxyde de magnésium.....	0,05
Calomel.....	0,000166
Urotropine.....	0,005
Extr. genévrier.....	0,000375
Boldo, artichaut, cresson raffort, pissenlit..... aa	0,00225
Chélideine.....	0,0005
Belladone.....	0,001

Pour 1 comprimé.

**Posologie.** — *Utilisés seuls :* en général, 6 à 8 comprimés par jour, le matin à jeun et 1 heure avant les repas. Contre les nausées et vertiges d'origine hépatique : 2 comprimés toutes les 2 ou 3 heures.

*Utilisés simultanément avec :* PASSIBROMINE (insomnie d'origine digestive), 2 comprimés, après le repas du soir.

**Indication.** — Foie.

Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## HÉPATODIAGNOSE

**Composition.** — Galactose chimiquement pur.

**Propriétés et indications :**

Ce produit est utilisé pour l'exploration fonctionnelle du foie par la galactosurie provoquée (méthode de Bauer mise au point par divers auteurs français).

**Posologie.** — Technique du procédé et de l'analyse sur demande.

Prix :

La dose de 40 grammes : 24 fr. 40.

POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29.)

## HÉPATOGENÈS CHARVOZ

### Composition.

Extrait de bile vésiculaire B : 0,10 ; Boldine cristallisée : 0,005 ; Extraits de Buxus : 0,03 ; Combretum : 0,02 ; Rhamnus : 0,05 ; Calomel : 0,0001.

### Propriétés.

Activant de la sécrétion biliaire ; accélérateur doux, sans spasme et sans douleur, de l'excrétion biliaire ; excitant physiologique du réflexe exonérateur.

### Indications.

Affections hépato-biliaires ; Stase vésiculaire ; Cholécystites ; Hypocholies ; Constipation.

### Posologie.

2 pilules avant chaque repas.

Prix : le tube de 50 pilules, 18 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 80-2.

### Laboratoires S. COUDERO

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Sufren 02-64.)

En Z. N. O. : 2, place Croix-Paquet — LYON.

(Tél. : B. 09-83.)

## HÉPATOglobine

**Composition.** — Extrait spécial de foie frais hypophysé.

Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais endolysé au sérum de cheval, renforcé par l'addition de :

Hémoglobine ..... 0,30

Extrait d'hypophyse totale ..... 0,05

**Forme.** — Ampoules buvables de goût agréable.

**Indications.** — Anémies, Tuberculose, Surmenage, Convalescences.

**Doses.** — Une à deux ampoules par jour.

Prix : 27 francs la boîte de six ampoules.

Durée de la boîte : 3 à 6 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1003-8.

### Laboratoires CH. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS 19<sup>e</sup>.

## HÉPATOMAGNÉSIE

### Toutes affections biliaires, hépatiques et digestives.

Peptone sèche de viande..	4,00	Extrait mou de Boldo.....	0,10
— — de gélatine..	2,00	— — de camomille..	0,10
— — de witte.....	3,00	— — de condurango..	0,10
Sulfate de magnésie.....	20,00	— — de maté.....	0,10
Hyposulfite de magnésium..	7,00	— — de noyer.....	0,10

Excipliant sucré aromatisé q. s. pour 100 gr.

**Indications.** — Maladies du foie et des voies biliaires. Congestion hépatique et de la vésicule, lithiase biliaire, ictere, cholécystite chronique, troubles divers d'origine hépatobiliaire, inappétence, nausées, constipation, urticaire, prurit, certaines dermatoses.

**Forme.** — *Granulé* et *Comprimés dragifiés*.

La composition des comprimés d'Hépatomagnésion est semblable à celle de l'Hépatomagnésion « Granulé ». La dose de 4 comprimés correspond exactement à une cuillerée à café de granulé.

**Posologie.** — *Granulé.* — *Adultes* : le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau légèrement chaude ; 1 à 2 cuillerées à café suivant les indications du médecin.

*Enfants* : Un quart à une cuillerée à café selon l'âge.

*Comprimés.* — De 2 à 8 dragées par jour selon les indications du médecin, le matin à jeun, ou une heure avant les repas, de préférence avec un demi-verre d'eau.

Prix au public : 22 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1079.

### Laboratoires de l'HÉPATOMAGNÉSIE

S. A. R. L. au capital de 125.000 francs.

A. COLLET-PIERRE, Pharmacien-Gérant.

30, rue de Créqui — LYON.

(Tél. : Lalande 41-31.)

## HÉPATO-MUSCULOSINE BYLA

(Suc de viande + foie.)

**Composition.** — L'HÉPATO-MUSCULOSINE BYLA réunit en un seul médicament le principe anti-anémique spécifique du foie et un suc musculaire hyperconcentré, préparé par l'expression à froid de la viande crue de bœuf.

**Indications thérapeutiques.** — Médicament anti-anémique par excellence, l'HÉPATO-MUSCULOSINE est indiquée dans toutes les Anémies, États consomptifs, Cachectiques, Athéniques, dans la Pré tuberculose, les États de maigreur, les Convalescences, etc...

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules ingérables de 10 cc. (boîtes de 12 ampoules) : 1 ampoule avant chaque repas, dans un peu d'eau.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

### ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 08-11.)

## HÉPATONIA

### Présentation :

En tubes de verre scellés de 10 cc., par boîtes de 6 tubes (36 fr. 75), 10 tubes (55 fr. 65) et 30 tubes (150 fr. 30).

En tubes de verre scellés de 5 cc., par boîtes de 10 (36 fr. 75) et 30 tubes (100 fr. 20).

En tubes de verre scellés de 2 cc., par boîte de 12 tubes (24 fr. 45).

**Principes actifs.** — Extrait de foie de veau, Extrait de rate de veau fraîche, Extrait muqueux gastrique de porc, extrait de glandes surrénales fraîches, Autolysat épuré de levure de bière, Nucléinate de soude.

**Indications.** — Anémies de toutes origines (Méthode de Whipple) ; Dyspepsies à régime carencé (féculents, pâtes), Neurasthénie, Asthénies de toute origine et particulièrement dans la convalescence des fièvres graves (typhoïde, typhus, rhumatisme articulaire aigu, dysphé-rie, grippe).

### Mode d'emploi :

**Adultes :** 1 à 2 tubes de 10 cc., 2 à 4 de 5 cc. par jour, au début des repas, dans un peu de vin de liqueur, dans le potage, ou suivant les indications du médecin traitant.

**Enfants :** 1 à 3 tubes de 2 cc. suivant l'âge.

### Se fait également sous forme de Granulés.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-11.

### Laboratoires PROBIOS

4, r. de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## HÉPATOPLASMINE

### du Docteur FRAISSE

(Voir aussi : *Opothérapie du Dr Frayssé.*)

### Méthode de Whipple et Castle.

### Formule :

Extrait hématique	Extrait de rate.....	0,20
désalbuminé.....	80 cc. Méthylarsinate de	
Extrait hépatique...	2,50 sodium.....	0,10
Ext. antre pylorique.	4 gr. Excipient....	Q. S. 100 cc.
pour 10 ampoules de 10 cc.		

### Forme :

Ampoules buvables	10 cc. adulte.	même
Ampoules buvables	3 cc. enfant.	concentration

### Indications :

Anémie sous toutes ses formes et particulièrement d'origine globulaire et leucocytaire, etc.

### Doses :

**Adultes :** 1 à 2 ampoules par jour de 10 cc.

**Enfants :** 1 ampoule par jour de 3 cc.

### Laboratoire FRAYSSE et Cie

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).  
(Tél. : Malmaison 12-88.)

## HÉPATOSODINE

### Comprimés. Granulé.

**Médication** alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'hexaméthylène tétramine.

**Action.** — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

**Indications.** — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes. Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

### Doses et mode d'emploi :

**Troubles gastriques :**  $\frac{1}{2}$  à 1 cuillerée à café de granulé dans un verre d'eau pure ou minérale, ou 4 à 10 comprimés absorbés avec quelques gorgées d'eau pure ou minérale, le matin à jeun et le soir 1 heure avant le repas.

**Troubles hépatiques :**  $\frac{1}{2}$  cuillerée à café de granulé ou 4 comprimés pris de la même façon, mais seulement le matin au réveil.

**Constipations par insuffisance biliaire :** 1 à 3 cuillerées à café de granulé ou 8 à 16 comprimés pris de la même façon, mais seulement le matin au réveil.

**Indications diverses :** Syndrome entéro-rénal, auto-intoxications, colibacillose, désintoxications pré- et post-opératoires.

**Dose moyenne :**  $\frac{1}{2}$  à 1 cuillerée à café de granulé ou 4 à 10 comprimés absorbés de la même façon, soit le matin à jeun au réveil, soit midi et soir, une heure avant les repas, suivant indications du médecin.

### Prix :

Granulé : Le flacon : 20 fr. 70.

Comprimés : Le flacon : 22 fr. 40.

### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

## HÉPATOVEINE LEBROT

Comprimés F et M.

**Médication hépatique et vasoconstrictive en association endocrinienne.**

**Action.** — Nouvelle thérapeutique des affections veineuses et des troubles circulatoires liés au Disfonctionnement Foie-Circulation-Porte, au Déséquilibre neuro-endocrinien, à l'Insuffisance de la circulation périphérique et de retour, à l'Hypotonie de la tunique musculaire veineuse et veineuse.

**Formule.** — Hépatine, Sels biliaires, Boldo, Noix vomique, Marron d'Inde, Iode organique, Extrait pancréatique, Hormone folliculaire (Form. F), Extrait androïque (Form. M), complexe pluriglandulaire

**Indications.** — Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Cyanoses, Syndrome de Raynaud, Troubles de la Menstruation et de la Ménopause. Insuffisance ovaro-hépatique. Suites d'Ovariectomie, Obésité,

**Mode d'emploi.** — 1, 2, 3 comprimés matin, midi et soir avant les repas. Prescrire à dose faible s'il y a hypotension, et à dose forte s'il y a hypertension, Interrompre pendant les règles.

**Prix :** La boîte de 50 comprimés : 25 fr. 50.  
Laboratoire de Contrôle n° 2008-2 et 3.

**Dépôt :** Les Laboratoires BIO-BOURGOGNE

**J. LEBROT, pharmacien**

24, avenue Albert-1<sup>er</sup> — DIJON. (Téléph. : 21-06.)

## HÉPATROL BUVABLE

**Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.**

**Méthode de Whipple.**

**Sans contre-indication. Adultes et enfants.**

**Indications.** — Toutes anémies, asthénies, insuffisances hépatiques.

**Formes thérapeutiques.** — Ampoules buvables non injectables.

**Présentation.** — Ampoules de 10 cc. = 125 gr. de foie de veau frais.

Boîtes de 6 ampoules.

Ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 62 gr. 50 de foie de veau frais.

Boîte de 8 ampoules.

Ampoules de 2 cc. — 1 ampoule = 25 gr. de foie de veau frais.

Boîte de 12 ampoules.

**Posologie.** — *Anémies graves :* Ampoules de 10 cc. associées ou non à l'HÉPATROL injectable.

*Anémies moyennes :* Ampoules de 5 cc.

*Anémies légères de l'adulte, insuffisances hépatiques, toutes anémies de l'enfance :* Ampoules de 2 cc.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

## HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau frais entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais.

**Indications.** — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

**Mode d'emploi.** — Par voie intramusculaire, injecter chaque jour 1 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer l'HÉPATROL buvable.

En raison de la purification très poussée de l'Hépatrol injectable, ces doses peuvent être très largement dépassées sans crainte d'intolérance.

### Présentation :

**Ampoules de 2 cc.** — Activité égale à celle de 250 gr. de foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 6 ampoules.

**Ampoules de 1 cc.** — Activité égale à celle de 125 gr. de foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 6 ampoules.

Voir communications :

*Société Médicale Hôpitaux*, 19 mai 1930 (Aubertin).

*Presse Médicale*, 20 septembre 1930 (Achard).

*Société Dermatologique*, janvier 1931 (Pinard).

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

## HÉPAVITA

Hépatothérapie suractivée : foie de veau, rate et rein (avec la surrénale). Glandes fraîches avec les acides aminés générateurs de l'hématopoïèse : histidine, tryptophane, peptone, fibrine, autolysat de levure de bière.

**Indications.** — Anémies graves, post-opératoires, et hémorragiques, pré-tuberculeuse. Débilité générale, convalescence, chlorose, surmenage, amaigrissement, neurasthénie, troubles de la formation, suites de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses. Insuffisance hépatique, Faiblesses, Anorexie, Asthénies, Carences, Hypoglobulie, anémies hypochrome et avec abaissement de l'indice colorimétrique (anisocytose, microcytose et poikilocytose).

**Action.** — Enrichissement du sang en globules rouges et augmentation du taux de l'hémoglobine, rôle antianémique, antihémorragique, antitoxinique.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. avant les deux repas dans un demi-verre d'eau pure ou gazeuse, de vin, ou avec une cuillerée de potage ou jus de citron. *Enfants* : 1 ampoule de 5 cc.

**2 Présentations.** — Ampoules buvables de 10 cc. et 5 cc.

Prix : 25 fr. 40.

*Diffusion strictement médicale.*

**Laboratoires M. DE RIVE**

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## HÉPAX

Liquide.

Composition :

Artichaut extrait mou.....	12 gr.
Polypode ext. fluide.....	10 gr.
Orthosiphon ext. fluide.....	10 gr.
Boldo ext. fluide.....	10 gr.
Combretum ext. fluide.....	10 gr.
Adonis vernalis ext. fluide.....	5 gr.
Chlorure de magnésium.....	1 gr.
Peptone polyvalente.....	—
Excip. arom.....	Q. S. p. 100 gr.

**Indications :** Intoxications et troubles généraux d'origines

*Digestive* : anorexie, dyspepsies, constipation.

*Hépatique* : insuffisance, congestion, icères.

*Rénale et alimentaire* : insuffisance de diurèse, excès d'urée sanguine.

*Dermatoses* : prurits, urticaire, anaphylaxie.

**Doses.** — *Adultes* : De 30 à 50 gouttes, trois fois par jour avant les repas, dans un peu d'eau sucrée, non sucrée ou dans une infusion.

*Enfants* : Une goutte par année d'âge avant les 3 repas.

Composé d'extraits végétaux sélectionnés, HEPAX est cholagogue, diurétique, antitoxique.

Inscrit au Labor. National de Contrôle N° 742-13.

**Laboratoires P. TAVERNIER**, Docteur en Pharmacie,

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV<sup>e</sup>)

**HEPBI****Hépatrol-Bismuth.**

**Composition.** — La première réalisation de l'association bismuth + extrait de foie en solution aqueuse.

1 ampoule 2 cc. = Bi 4 centigr. + 30 gr. foie de veau frais.

**Propriétés.** — Pas d'asthénie bismuthique ni de phénomènes d'intolérance, pas de réaction locale ni d'accumulation, résorption immédiate. Action rapide, évite toute complication rénale. Donne une grande souplesse au traitement, possibilité de rapprocher les séries.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Formes.** — *Adultes*: Ampoules de 2 cc.  
(Boîtes de 12.)

*Enfants*: Ampoules de 1 cc.  
(Boîtes de 12.)

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV°).  
(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

**HEPTYL BOURDOU****TONIQUE VIVANT****Composition :**

Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 25
Iode Métalloïdique.....	0 gr. 01
Fluorure de sodium.....	0 gr. 01
Chlorure de Manganèse.....	0 gr. 03
Chlorure de Magnésium.....	0 gr. 03
Matéine (caféine de Maté).....	0 gr. 10
Glucose de raisin.....	8 gr.
Muscat.....	Q. S. pour un verre à madère.

**Propriétés.** — Stimulant physiologique des diverses fonctions de l'organisme ; tonique du système nerveux et du système circulatoire ; excitant de la nutrition, riche en vitamines B, C et D, l'*Heptyl* favorise l'élimination des déchets et active les sécrétions gastriques et intestinales.

**Indications.** — Asthénie, Déminéralisation, Anémie. Tous les états où la stimulation des systèmes nerveux, circulatoire, hépatique, urinaire, etc., est nécessaire : convalescence, dyspepsies, obésité, grippe, etc.

**Posologie.** — Dose avant chaque repas :  
*Adultes* : 1 verre à Bordeaux. *Enfants* : demi-dose.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 1142-1.

**Laboratoires BOURDOU,**

FRONTIGNAN (Hérault).

(Tél. : 21.)



## HERGENOL

**Indications.** — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

**Composition.** — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

**Forme.** — Produit volatil, usage externe.

**Emploi.** — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

**Doses.** — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

*Adultes* : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 19 fr. 50.

Durée moyenne : 15 jours.

**Laboratoires GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.  
(Tél. : 60-55.)

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisymphilitique, Cholagogue, Antiseptique externe.

**Constitution.** — Mercure phénol-disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

**Propriétés.** — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxité permet à chaque injection intramusculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

**Indications et doses.**

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée : injections intramusculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

b) Par ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par co. tirée à 5 centigr.

b) Par voie stomacale : de 20 à 30 centigr. par jour d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE en dragées.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

2° *Antisepsie.*

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorragies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions 1 p. 100 et 1 p. 200.

Cystites. Lavages vésicaux, solution à 7 p. 1 000.

**Formuler.** — Selon le cas :

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

## HEVOGLAN

Régulateur de la circulation veineuse.

Ménopause, Hémorroïdes, Varices, *Ulcères variqueux* (pour ce dernier cas, appliquer en même temps sur la plaie la pommade *Hévoglanol*).

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Parathyroïde, iode en composition organique, marron d'Inde stabilisé, hamamélis, cupressus, condurango, citrate trisodique.

**Posologie.** — Une cuillerée à café au début des repas de midi et du soir dans 1/4 de verre d'eau.

Durée de chaque flacon : 12 jours.

Prix : 22 fr.

**Laboratoires A. BLANC**

BARCELONNE-DU-GERS (Gers).

(Tél. : 4.)

## HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

**Composition.** — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et glutein.

**Avantages.** — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

**Emploi et doses.** — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

*Cas chroniques* : 6-8-10 globules par jour.

**Indications.** — Cystites, Prostatites, Gonococcies Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

**Dépôt** — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS

Prix : (60 globules) 23 fr. 50.

**Laboratoires CAMUSET**

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

(Tél. : Gobelins 00-70.)

## HIGADOSE

*Médication synergique des affections hépatiques, des voies biliaires et rénales.*

**Composition.** — Huile de Harlem pure, Bile dépigmentée et décholestérinée, Oléate de Soude anhydre, chimiquement pur.

**Présentation.** — Forme capsules (ne se dissociant que dans l'intestin).

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Cirrhoses atrophiques, Congestion du foie, Coliques néphrétiques, Lithiase rénale, Pyélonéphrites, Cystites Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.

**Posologie.** — *Traitement d'entretien*: 2 à 3 capsules par jour.

*Traitement des affections aiguës*: 6 à 8 capsules par jour. (Aucune contre-indication. Innocuité absolue.)

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).  
(Tél.: Roq. 14-12.)

## HIRUDINASE

Association Iode, Citrate de Soude,  
Extraits Hirudiniques.  
Synergie médicamenteuse active.

**Composition et mode d'action.** — Iode: décongestif. Citrate de soude: fluidifiant. Extrait hirudinique: anticoagulant.

**Indications.** — Tous les troubles circulatoires d'origine:

- 1° *Veineuse*: varices, varicocèles, œdèmes et ulcères variqueux, hémorroïdes; Prophylaxie et traitement des phlébites médicales, obstétricales, chirurgicales;
- 2° *Sanguine*: hypercoagulabilité sanguine, stases viscérales, congestions passives;
- 3° *Endocrinienne*: troubles de la Puberté, de la Ménopause, Aménorrhées, Dysménorrhées, troubles thyroïdiens.

**Forme.** — Dragées.

**Posologie.** — 4 à 6 dragées par jour, par prises de 2 dragées au moment des repas.

Prix: 25 fr. 10.

**Laboratoires «ANA»**

**Docteur VENDEL et C<sup>ie</sup>**

16-18, av. Daumesnil, PARIS. (Tél.: Dorian 52-12.)  
18, rue Lafon, MARSEILLE. (Tél.: Lycée 50-74.)

## HISTALGINE

Histamine naturelle en solution isotonique à pH 7 stabilisée pour injections intradermiques indolores.

Employable également en ionisation et en scarifications.

**Composition.** — Chaque ampoule de 1 cc. contient: 0 gr. 0005 de bichlorhydrate d'histamine en solution glucosée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action double: *Analgésique*, sédation très rapide de la douleur. *Curative*, augmentation considérable de la circulation sanguine. Néof ormation et Vaso-dilatation capillaire. Métabolisme cellulaire exalté.

### Indications:

- 1° Rhumatismes chroniques (Douleurs et séquelles déformantes).
  - 2° Algies. Myalgies (Douleurs intercostales, Lumbago).  
Néuralgies (Sciatique, Néuralgies faciales, Zona); Cellulites.
  - 3° Traumatismes (Entorses, Foulures, Luxations, Fractures).
  - 4° Maladies de sensibilité (Asthme, Migraines, Urticatoire).
  - 5° Maladies neurovasculaires (Artérite).
  - 6° Dermatologie (Prurit anal, Ulcères variqueux).
  - 7° Ulcères gastro-duodénaux.
  - 8° Chirurgie (Cicatrices douloureuses, fibreuses, adhérentes).
  - 9° Art dentaire (Trismus, Contractures douloureuses des mâchoires).
- Posologie.** — Consulter la littérature qui accompagne chaque boîte. Utiliser de préférence une seringue de 1 cc. Aiguille courte de 4/10<sup>e</sup>. *Piqûres intradermiques*. 1/2 à 1 goutte aux points douloureux. Chaque piqûre fait apparaître la Triade réactionnelle de Lewis. 1/2 à 1 ampoule par jour pendant 3 à 10 jours.
- Ionisation.* 1 ampoule pour 10 gr. d'eau distillée.

Enregistré au L. N. G. M. sous le n° 1001-18.

**Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN**  
14, avenue Perrichont — PARIS (XVII°). (Tél.: Jasmin 00-37.)

## HISTA (Histamine BEYTOUT)

**Composition.** — HISTA (HISTAMINE BEYTOUT) est la  $\beta$ -imidazol-éthylamine, qui provient de la décarboxylation de l'histidine.

L'histamine présente dans l'organisme peut apparaître sous l'influence de causes diverses. Toute irritation de la peau (rayons ultra-violet, rayons X, bains chauds) fait naître de l'histamine au point d'application.

**Histamine et Histidine.** — L'histamine a un pouvoir analgésique propre que ne possède pas l'histidine. Le test de l'ionisation démontre la valeur analgésique remarquable particulière à l'histamine.

**Propriétés.** — L'histamine « transmetteur chimique » est surtout remarquable par son *action antalgique importante et constante*. C'est aussi un stimulant de la fibre lisse et un vaso-dilatateur des capillaires et des artérioles.

**Réactions histaminiques.** — Elles sont de 2 ordres

1° *Réaction locale*, ou « triade de Lewis », caractérisée par l'apparition au point d'injection des 3 manifestations successives : rougeur locale, aréole rouge de 3 à 7 centimètres, papule urticarienne oedémateuse 2 à 3 minutes après.

2° *Réaction générale* : bouffées de chaleur, congestion du visage, légère céphalée disparaissant au bout de quelques minutes. On peut en éviter l'apparition en faisant coucher le malade pour l'injection et en le laissant allongé 1/4 d'heure après l'injection.

**Antagonistes.** — L'adrénaline et la tyramine sont des antagonistes de l'histamine.

## HISTA INJECTABLE

**Présentation et composition.** — Ampoules de 1 cc. contenant 0,0005 de bichlorhydrate d'histamine, en solution stable, inaltérable pour injections intradermiques indolores.

**Indications.** — Toutes douleurs, Rhumatismes chroniques, musculaires et articulaires, Arthralgies, Arthrites, Coxarthrites, Névralgies (sciatiques, intercostales, faciales), Névrites, Myalgies, Lumbago, Torticolis, Plexalgies, Zonas, Prurits anal et vulvaire. — Ulcères variqueux.

**Contre-indications.** — Rhumatismes infectieux aigus et poussées évolutives des rhumatismes infectieux. Déséquilibres tensionnels importants.

**Posologie.** — 1 cc. par jour en injections intradermiques, *loco dolenti*. Dans certaines arthralgies rebelles, coxarthrites notamment, il peut être indiqué de recourir aux injections profondes, para-articulaires (technique de Costes).

**Résultats.** — En 3 à 5 jours, sédation des phénomènes douloureux, de la contracture et de l'impotence fonctionnelle.

**Présentation et prix**

La boîte de 6 ampoules : 24 fr. 50.

La seringue spéciale HISTA : 13 fr. 50.

L'étui de 2 aiguilles spéciales HISTA 6 fr. 50.

## HISTA LINIMENT

Pour usage externe, aussi actif que Hista injectable, ce dernier restant de maniement exclusivement médical

**Présentation et composition.** — Ampoules de 5 cc. pour usage externe, contenant 0,01 de bichlorhydrate d'histamine en milieu alcoolique.

**Indications.** — Toutes les indications de Hista injectable. Toutes douleurs. Rhumatismes chroniques, arthralgies, névralgies, myalgies, zonas.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une ou deux fois par jour, griffer superficiellement la peau, *loco dolenti*, avec la pointe d'une épingle, puis frictionner ou tamponner la région griffée pendant quelques minutes, avec un tampon d'ouate imbibé du contenu d'une ampoule d'Hista liniment.

**Présentation et prix.** — La boîte de 6 ampoules : 30 fr. 50.

## HISTA DIMILLI

**Composition.** — Solution d'HISTA au DixMILLIème, en ampoules de 1 cc. renfermant 0,0001 de bichlorhydrate d'histamine pour injections sous-cutanées ou intradermiques.

**Indications.** — Ulcères de l'estomac et du duodénum.

Crise ulcéreuse, Gastrites.

Toutes allergies, Asthme, Rhume des foins.

Urticaire, Sensibilisations, Intolérances alimentaires.

**Posologie et mode d'emploi :**

1° *Ulcères-Gastrites* : 1 cc. par jour, en injection sous-cutanée (ou intradermique) au bras, à la cuisse ou au creux épigastrique. Série de 10 injections. Repos de 8 jours. Nouvelle série si nécessaire.

2° *Comme désensibilisant* : doses progressives : 1/5 de cc. le 1<sup>er</sup> jour Augmenter de 1/5 de cc. par jour jusqu'au 5<sup>e</sup> jour.

Du 5<sup>e</sup> au 10<sup>e</sup> jour : 1 cc. par jour.

**Résultats.** — *Sédation de la douleur* entre la première et la troisième injection, suivie d'une disparition totale des douleurs et des signes associés de l'ulcère, en même temps qu'on constate une reprise importante de l'état général. Les autres signes de la crise ulcéreuse disparaissent successivement au cours de la série d'injections d'Hista Dimilli.

**Prix** : 28 fr. 20 pour un traitement de 10 jours.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 76-85.)

## HISTAMYL

**Composition.** — Bi-chlorhydrate d'Histamine pur.

**Présentations et indications.** — En ampoules de 1 cc. à 1/2 mmgr, pour 1 cc. pour injections intra-dermiques disséminées « loco dolenti » à raison d'une goutte à chaque piqure (6 à 20 pour une séance), en tubes de *baume* pénétrant à 0 gr. 50 p. 100 en applications-massages quotidiens le soir au coucher; sous ces deux formes, action remarquable contre les algies rhumatismales, névralgies, sciatique, torticolis, lumbago; en intra-dermiques: III à VI gouttes contre le prurit anal ou vulvaire, VI à X gouttes contre douleurs post-zonateuses

Pour désensibilisation: *Histamyl « D »*: boîte de 12 ampoules de 2 cc (1<sup>re</sup> série): depuis le millionième de mmgr. jusqu'au centième, et 2<sup>me</sup> série: 12 ampoules au centième: en sous-cutanées ou intradermiques: asthme, urticaire, migraine, chocs anaphylactiques, ulcères gastro-duodénaux.

Les solutions injectables sont parfaitement indolores; en intradermiques et avec le Baume, réaction locale normale dite de Lewis (rougeur et démanagements fugaces). Réaction générale rare avec la solution au 1/2 mmgr. et tout à fait exceptionnelle avec l'*Histamyl « D »*.

**Prix:** la boîte 6 amp. 1 cc. à 1/2 mmgr.: 19 fr. 30;

Le tube de Baume: 21 fr. 80; *Histamyl D*, chaque série: 29 francs.

**Laboratoires J. PLÉ**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3<sup>e</sup>).

## HISTOCHROME (D. O. M. F.)

**Composition.** — Dibromo-oxy-mercuro-fluorescine pure, en solution stabilisée pour usage de collyre.

**Propriétés.** — Puissant antiseptique oculaire, par imprégnation cellulaire profonde.

**Indications.** — A. Médicales: toutes affections externes des yeux, toutes conjonctivites, kératites. Conjonctivite de piscine, ophtalmie des nouveau-nés, antiseptie du trachome.

B. Chirurgicales: préparation et suites opératoires ophtalmologiques, voies lacrymales.

**Forme et posologie.** — Collyre: II à III gouttes dans les culs-de-sac conjonctivaux, imprégnation du champ opératoire.

**Laboratoires DOLADILLE**

L. DOLADILLE, Docteur en Pharmacie  
NOYERS-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. O.  
et SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. N. O.  
(Tél.: 69.)

## HISTOCOLLYRE (H. M. T.)

**Composition.** — Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure, stabilisée pour usage de collyre.

**Propriétés.** — Grande diffusibilité dans les milieux cataractes, action ophtalmotrope, résorption des encombrements tissulaires du vitré, des membranes profondes et du tissu cristallinien.

**Indications.** — Prophylaxie et traitement de la cataracte, des corps flottants, des affections du pôle postérieur de l'œil et des affections virussiennes à porte d'entrée oculaire.

**Posologie.** — II à III gouttes 3 fois par jour.

**Laboratoires DOLADILLE**

L. DOLADILLE, Docteur en Pharmacie

NOYERS-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. O.

et SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. N. O.

(Tél.: 69.)

## HISTOGÉNOL

(Médication arsénio-phosphorée organique.)

Puissant reconstituant général.

**Indications.** — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, Convalescences, etc.

**Formes.** — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

**Posologie:**

**Adultes:** 1 cuillerée à soupe d'élixir ou deux cuillerées à café de granulé au milieu de chaque repas, ou 2 comprimés matin et soir, ou une ampoule par jour.

**Enfants:** Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

**Docteur MOUNEYRAT**

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,  
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
12, rue du Chemin Vert  
VILLENEUVE LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).  
(Tél.: Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## HISTOSMOSE (H. M. T.)

**Composition.** — Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure, en solution stabilisée pour usage ophtalmologique.

**Propriétés.** — Voir HISTOCOLLYRE.

**Deux présentations.** — A. Histosmose Injectable aux pôles antérieur et postérieur du globe oculaire. Emploi réservé au médecin ophtalmologiste.

B. Histosmose Concentration II, pour bains oculaires : X à XV gouttes et au delà dans une ceillère de 10. cc., sous le contrôle du médecin ophtalmologiste.

**Indications.** — Toutes affections graves des milieux oculaires, du pôle postérieur, du segment antérieur, résorption des masses molles traumatiques ou post-opératoires, taies et pannus cornéens.

### Laboratoires DOLADILLE

L. DOLADILLE, Docteur en Pharmacie

NOYERS-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. O.

et SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (L.-et-Ch.), Z. N. O.

(Tél. : 69.)

## HISTROPA

**Traitement physiologique  
des spasmes douloureux de l'appareil digestif  
et des coléalgies.**

**Composition.** — Solution injectable de Bromhydrate d'Histidine associé en proportions physiologiquement calculées aux Bromhydrates d'Atropine et de Scopolamine, en milieu isotonique.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc.

**Action.** — Calme les algies provoquées par les lésions ulcéreuses ou les inflammations du tube digestif; favorise leur cicatrisation; calme et fait céder les spasmes viscéraux.

**Indications.** — a. Tous les *spasmes* et toutes les *douleurs* du tube digestif et des viscères : œsophage, cardia, estomac, région pyloro-duodénale, intestin grêle, côlons (typhlocolites, entéro-colites, sigmoïdites, diverticulites, rectocolites, etc.); rectum et région anale, appareil urinaire (plexalgies lombaires, rénales, urétrales ou vésicales), appareil biliaire (vésicule et voies biliaires), coléalgies, coliques hépatiques et coliques pancréatiques, séquelles d'opérations.

b. Toutes les *ulcérations* du tube digestif volent leur cicatrisation accélérée quand on associe les injections intradermiques d'*Histropa* au régime et au traitement local par le poudrage.

c. Enfin, tous les *déséquilibres* du système nerveux vago-sympathique, les cercles vicieux douloureux, les *douleurs-souvenirs* des divers viscères, solarite, vagotonie et aérophagie, douleurs des plexus abdominaux, coléalgies, cœnestopathies diverses.

**Contre-Indications.** — Cardiopathies, aortite, hyperthyroïdie, maladie de Basedow.

**Posologie.** — Injections intradermiques et sous-cutanées.

**Dose moyenne :** 1/2 à 1 cc. par jour ou tous les 2 jours.

**Dose maxima :** 1 ampoule matin et soir en cas de grande crise.

**Enfants :** 1/2 ou 1/4 de dose selon l'âge.

### Prix :

La boîte de 4 ampoules : 30 fr. 50.

— de 12 — : 73 fr. 20.

### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

## HOLOS

Opothérapie osseuse.

**Nature.** — Extrait opothérapique vitaminé d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

**Indications.** — Déficit en calcium alimentaire. Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculose osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse. Allaitement, Convalescence, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une promptre reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

**Posologie.** — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.), à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

**DESCHIEUS, Docteur en pharmacie.**

9, rue Paul-Baudry — Paris (8<sup>e</sup>). — (Tél.: Ellysées 40-26.)

## HOLOSPLÉNINE

Extrait de rate injectable  
Délipé et désalbiné.

**Indications.** — Anémies, Amalgissements, Tuberculose, Eczémas chroniques, Erythodermie arsénobenzolique, Pemphigus, Lichen ruber acuminosus, Pityriasis rubra de Hebra, Prurigo simplex, Urticaires récidivantes, Éruption miliaire, Eczéma rebelle, Prurit anal, vulvaire, périnéal, Lichen plan, Psoriasis.

**Forme et composition:**

Boîte de 6 ampoules de 1 cc. chaque cc. = 30 grs de rate fraîche. Prix : 37 fr. 50.

— 6 — de 1 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 27 fr. 50.

Tube de 6 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 25 fr. 20.

**Conduite du traitement.** — Série de 12 à 15 injections de 1 cc. sous-cutanées ou intramusculaires comme suit : 1 injection les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> jours, pas d'injection les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> jours, ensuite injection tous les 2 jours. L'injection est indolore. Pour les eczémas, ne pas hésiter à injecter les doses fortes : 2 à 3 cc. (c'est-à-dire 30 à 45 gr. de rate) ainsi que dans les dermatoses rebelles.

L. N. C. n° 234-32, 234-22.

**Laboratoire de l'ENDOPANORINE**

48, r. de la Procession, PARIS XV<sup>e</sup> (Tél.: Suffren 07-70.)

## HOLOVARINE

**Forme et composition.** — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

**Avantages.** — Desséchée par un procédé nouveau qui par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

**Indications.** — Toutes les insuffisances ovariennes : troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

**Mode d'emploi.** — **Adultes :** 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

**Adolescentes :** 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 18 fr. 70. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 12 fr. 90.

L. N. C. n° 234-10-3, 234-10-1.

**Laboratoire de l'ENDOPANORINE**

48, r. de la Procession, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Suffren 07-70.)

## HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégagant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

**Propriétés.** — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

**Formes.** — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

Prix : la boîte de 30 cachets : 18 fr. 80

**HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES** pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

Prix : le flacon de 40 pilules : 16 fr. 90.

**Laboratoires DERNIS**

12, rue Lamartine — PARIS.

(Tél.: Trudaine 09-64.)

## HORDÉNOL

A base d'Hordénine Beytout.

**Indications.** — Médication héroïque des diarrhées de toutes origines, toutes natures et toutes intensités.

Diarrhées des adultes, diarrhées infantiles, diarrhées des nourrissons, diarrhées des tuberculeux. Traitement des entérites.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

**Enfants et nourrissons :** 3/4 de cc. par jour, le reste de l'ampoule administré par voie buccale.

(Thèse Dr. Germain. Paris 1939.)

Les ampoules peuvent être administrées par voie buccale, dès apparition d'une selle moulée.

<b>Composition</b>	Sulfate d'hordénine .....	0,125
	Vanadate de soude .....	0,002
	Triméthylxanthine.....	0,002
	Eau distillée.....	Q. S. P. 2 cc.

**Présentation et Prix.** — Boîte de 6 ampoules: 31 francs.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).

(Tél.: Nord 76-85.)

## HORMANTOXONE

**Composition.** — Extrait contenant intégralement et sous forme stable le principe antitoxique du foie, purifié, concentré et titré biologiquement.

**Formes.** — Globoides pour adultes. Granulés pour enfants. Suppositoires pour jeunes enfants et anorexiques.

**Propriétés.** — *Supplée* la fonction antitoxique du foie quand elle est déficiente; la *stimule* quand elle est perturbée.

### Indications :

I. *Insuffisance de la fonction antitoxique* du foie, cirrhoses, ictères, hépatisme, lithiase biliaire.

II. *Auto et hétéro-intoxications* (urémie, intoxications alimentaires et microbiennes, toxicomanies, éthylisme, intoxications médicamenteuses, urobilinémie). Toxémie gravidique, vomissements incoercibles de la grossesse, pré-éclampsie.

III. *Toxi-infections* (adjuvant des sérothérapies spécifiques). Psychoses infectieuses, soins pré et post-opératoires. Cholécystites et péricholécystites.

IV. *Anaphylaxies. Intolérances alimentaires*: Asthme, urticaire, migraines, accidents sériques, strophulus et fièvre des foins.

V. *Dermatoses*: Eczémas, prurits, érythèmes, œdème de Quincke.

VI. *Oliguries.*

VII. *Indications diverses* (Diabète, albuminurie, rhumatismes chroniques).

**Posologie.** — Avaler avec un peu d'eau avant chacun des 3 repas :

*Cas aigus :* 2 à 3 globoides.

*Cas moyens :* 1 à 2 globoides.

*Cure d'entretien :* 1 globolde.

*Jeunes enfants* ne pouvant pas absorber les globoides: 1 cuillerée à café de granulés avalée avec un peu d'eau avant chaque repas ou bien un suppositoire le soir.

*Anorexiques :* 1 ou 2 suppositoires;

Prix :

Le flacon de 36 globoides (8 jours): 25 fr. 10.

La boîte de granulés (8 jours): 25 fr. 10.

La boîte de suppositoires (8 jours): 20 fr. 10.

**Laboratoire PHYGIÈNE**

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél.: Charlebourg 39-70.)

## HORMIADYNE

### Composition par dragées :

Silicate de Soude pur .....	0,10
Extrait stabilisé de Gui .....	0,05
De Muguet .....	0,015
Extrait sec de Cascara .....	0,015
Bile desséchée .....	0,035
Thyroidine .....	0,0025
Poudre de poumon .....	0,02
Poudre de surrénales .....	0,0125

**Forme.** — Dragées à noyau mou.

**Indications.** — Médication hypotensive polyvalente, Artério-sclérose, Hypertension, Troubles cardio-vasculaires et toutes complications.

**Doses.** — 2 à 6 dragées par jour.

Prix : 20 fr. 50 la boîte de 50 dragées.

Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1082-4.

**A. MIRONNEAU, Pharmacien,  
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).  
(Tél. : 18.)**

## HORMOBILINE

### Laxatif opothérapique.

Médicament hérolque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

**Composition.** — Hormones céco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

**Indications.** — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères cholémies.

**Avantages.** — Ne provoque ni dégoût ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

**Posologie.** — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

*Clystère* : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

*Forme pilulaire* : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-1 et 586-2.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires DORANTOWICZ**  
17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).  
(Tél. : Roquette 14-12.)

## HORMOCALCIUM

**Composition.** — Association de : Inosito-Phosphate de Chaux et de Magnésie, Silicate de fer, Silicate de chaux, Nucléinate de manganèse, Hypophyse, Parathyroïde, Thymus, Surrénale, Rate, Moëlle osseuse, Os frais, Hémoglobine.

**Mode d'action.** — Assure à l'organisme l'apport nécessaire et la fixation des sels de chaux et de fer. Stimule les organes hémapoïétiques et régulateurs du métabolisme du calcium.

**Indications.** — Toutes les déficiences du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte : Inappétence, Anémie, Amaigrissement, Convalescences, Surmenage physique et intellectuel, Asthénie, Troubles de la croissance, Grossesse, Allaitement, Pré tuberculose, Tuberculose.

**Formes et mode d'emploi.** — 1° Poudre : formule normale-formule B (sans fer) : 1 à 2 cuillerées à café. *Enfants* : 1 cuillerée à café.

2° Cachets : formule normale-formule B : 2 cachets par jour.

3° Comprimés dragéifiés : 6 par jour.

### Laboratoires du FANTOL

Directeur scientifique : Docteur Paul SOUBIGUERE  
22, rue de l'Arsenal — ANGOULÊME.

## HORMOCRINOL « F » ET « M »

### Hormonothérapie associée aux Électrolytes. (Phosphore et Potassium.)

« F » Ovaire .....	0,010	« M » Orchitique ..	0,010
Thyroïde .....	0,015	Thyroïde .....	0,015
Hypophyse ..	0,001	Hypophyse ..	0,001
Surrénale .....	0,001	Surrénale ..	0,001
Thymus .....	0,005	Thymus .....	0,005
Électrolytes activateurs		Électrolytes activateurs	
(P et K) ...	0,10	(P et K) ...	0,10

Pour un comprimé dragéifié.

**Indications.** — Myxœdèmes, Troubles de la circulation sanguine, Engelures, Troubles ovo-utérins, Rhumatisme chronique, petite et grande Obésités, Prostatisme, Troubles psycho-sexuels, etc.

**Posologie.** — Prescrire « M » chez l'homme et chez la femme, « F » chez la femme. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour. — *Enfants* : 4 à 6.

Prix : 30 fr. 50.

Enregistré aux L. N. C. sous les n°s (M) 327-7 et (F) 327-8.

**Laboratoires JAMMES DE GOLBERY**  
102 bis, rue de l'Aigle — LA GARENNE-COLOMBES  
(Seine).  
(Tél. : Auteuil 51-85.)



## HORMODAUSSÉ

(Hormonothérapie totale)

**Formes.** — Sirop : flacon de 810 cc.

Ampoules buvables de 10 cc.

**Composition.** — Extrait de sang de taureau

(correspondant à 50 gr. de sang frais).....	10,00
Extrait de sang de génisse	
(correspondant à 37 gr. 5 de sang frais)....	7,50
Extrait de sang de veau	
(correspondant à 12 gr. de sang frais).....	2,50
Extrait de foie de veau	
(correspondant à 50 gr. de glande fraîche)..	1,25
Extrait de levure .....	1,25
Extrait de cuticules de céréales .....	2,50

Pour 100 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Hormodausse apporte aux organismes affaiblis tous les produits endocriniens qui circulent dans les vaisseaux des animaux jeunes et vigoureux, ainsi que les stimulants de l'hémopoïèse et les matériaux de la régénération des hématies.

**Posologie** par jour : Sirop. *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café.

Ampoules. — *Adultes* : 2 ampoules. *Enfants* : 1 ampoule.

**Mode d'emploi.** — 30 min. avant les repas dans un peu d'eau.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Turbigo 63-40.)

## HORMOFLAVÉINE

**Composition :**

Hormone spécifique du corps jaune, physiologiquement titrée.

**Indications thérapeutiques et posologie :**

**Aménorrhée, hypoménorrhée** (1 injection quotidienne, de préférence du 14<sup>e</sup> au 21<sup>e</sup> jour de la période intermenstruelle) ; **ménoragies, métrorragies** (1 ou 2 injections tous les jours dans la semaine précédant les règles, ou au cours même de l'hémorragie) ; **stérilité d'origine hormonale** (1 injection quotidienne du 14<sup>e</sup> au 28<sup>e</sup> jour de la période intermenstruelle). L'Hormo flavéine est spécialement indiquée à partir du 14<sup>e</sup> jour après les règles (1 injection quotidienne) chez les femmes qui ont déjà fait un ou plusieurs **avortements**, pour leur permettre de mener à bien une nouvelle grossesse.

**Présentation et mode d'emploi :**

Deux titrages (solution huileuse) : Hormo flavéine A (boîtes de 6 ampoules titrées à 1/6 u. i. par ampoule) ; Hormo flavéine B (boîtes de 1 ampoule titrée à 1 u. i.). Injection sous-cutanée profonde, ou intramusculaire).

**Laboratoires d'Endocrinologie appliqués**

**Concessionnaires des Marques des**

**ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>). (Tél. : Danton 08-11.)

## HORMOLÉOL

**Opothérapie entéro-hépatique.**

**Composition.** — Extraits biliaires dépigmentés et décholestérinés. Hormones intestinales, Agar-Agar.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'action synergique des éléments composants de l'HORMOLÉOL réalise une médication opothérapique assurant le maximum de résultat :

1<sup>o</sup> **Intestins** : Dans toutes les Constipations où il y a déficience du rythme moteur de l'intestin (insuffisance motrice) et déficience de l'activité glandulaire (insuffisance sécrétoire). Dans les entérites d'origine diverses (muco-membraneuse, paludéenne, etc.).

2<sup>o</sup> **Foie** : Par les extraits biliaires qui entrent dans sa composition, l'HORMOLÉOL est employé utilement dans le traitement des affections de l'appareil biliaire (arrêt, insuffisance ou perversion de la bile, Avantagusement recommandé dans :

Lithiase biliaire, Insuffisance biliaire, Ictère, Cholémie familiale.

**Avantages.** — Laxatif doux, non irritant, ne provoquant ni colique ni accoutumance. Sans contre-indication.

**Posologie.** — A prendre de préférence avant le repas du soir.

*Adultes* : 1 à 3 dragées par jour.

*Enfants* : de 6 à 15 ans : 1/2 à 1 dragée par jour.

**Laboratoire de l'HORMOLÉOL**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 14-12.)

## HORMOLUTÉINE VOGELIN

Chaque comprimé contient, à côté du corps jaune, 0,05 d'Hormone folliculaire, titrée à 5. U. I., et 0,005 d'extrait thyroïdien.

**Action physiologique.** — Cet ensemble provoque le stimulus qui déclenche le flux menstruel, supprime les douleurs des règles et les rend plus régulières et plus faciles.

**Indications.** — On l'emploiera dans tous les cas d'hypovarie où il sera nécessaire de provoquer l'arrivée du flux menstruel, et dans les malaises généraux résultant d'un flux peu abondant, dans l'aménorrhée, la chlorose. C'est le spécifique de l'insuffisance ovarienne dans la puberté.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas pendant la semaine devant précéder le flux menstruel

**Prix :** Le flacon : 21 fr. 10. — L. N. C. n° 745-10.

**Laboratoires VOGELIN**

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 83-24.)

## HORMONE GONADOTROPE du Docteur ROUSSEL

**Composition.** — Hormone extraite du sérum de jument gravide.

**Propriétés.** — Commande dans les deux sexes le développement et les fonctions des glandes génitales.

**Indications.** — Chez l'homme : Cryptorchidie.

Chez la femme : Aménorrhée, Hypoménorrhée.

Dans les deux sexes : Stérilité, retards de la puberté, Syndrome adipo-génital.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules titrées à 800 unités internationales et 6 ampoules de solvant à mélanger extemporanément.

**Posologie.** — Série de 6, 12, 18 injections selon les cas (par voie sous-cutanée ou intramusculaire). Repos de 15 jours entre deux séries.

Prix au public : La boîte de 6 ampoules : 75 fr. 60.

(Consulter les « Schémas d'utilisation de l'Hormone Gonadotrope » édités par les Laboratoires Roussel.)

**Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL**  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOIÉTIQUE

S. A. au capital de 15 000 000 de francs. — R. C. Seine 12.384.  
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Littré 68-22.)

## HORMONES HYPOPHYSAIRES BYLA

Les Laboratoires Byla présentent, les premiers en France, la série des hormones hypophysaires, **réellement et exclusivement extraites de la glande hypophyse**, en ampoules injectables, physiologiquement titrées.

### HORMONES DU LOBE ANTÉRIEUR

**Gonadormone**, stimule la maturation folliculaire et la spermatogenèse. Son origine hypophysaire la différencie de tous les extraits gonadotropes précédemment utilisés.

**Thyromone**, régularise le fonctionnement thyroïdien.

**Lactormone**, provoque ou augmente la sécrétion lactée.

**Somatormone**, stimule la croissance.

### HORMONES DES LOBES POSTÉRIEUR ET INTERMÉDIAIRE

**Ocytormone**, Action ocytotique (inertie utérine).

**Leïormone**, action myocinétique sur les fibres lisses à l'exception de celles de l'utérus (atonies gastrique, intestinale, vésiculaire, etc.). Anti-hémorragique par action sur les fibres lisses vasculaires. Action antipolyurique (diabète insipide).

**Neurormone**, traitement des migraines hypophysaires.

**Pituitobine**, hormone post-hypophysaire totale.

**Gonadormone**: 1 ampoule 2 cc. = 10 unités (boîtes de 6 ampoules).

**Thyrorrmone**: 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-cobaye (boîtes de 6 ampoules).

**Lactormone**: 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-pigeon (boîtes de 3 ampoules).

**Somatormone**: 1 ampoule 1 cc. = 100 unités-rat (boîtes de 6 ampoules).

**Ocytormone**: 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

**Leïtormone**: 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

**Neurormone**: 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

**Pituitobine**: 0<sup>5</sup> 1 ampoule 1 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules);

0<sup>10</sup> 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat (boîtes de 3 ampoules);

B 1 ampoule 1 cc. = 40 unités internat. (boîtes de 2 ampoules);

E 1 ampoule 15 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

*Littérature sur demande aux*

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

**Concessionnaires des Marques des**

**ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 08-11.)

## HORMOPLASMINE LEFRANCO

**Complexe Hormo-zomique.**

**Composition.** — 1. — Extrait de lobe antérieur de l'hypophyse, 2. — Extrait total de rate fraîche, 3. — Suc musculaire concentré de jeunes taureaux.

**Propriétés.** — Spécifique des troubles de la croissance et des insuffisances glandulaires par la rate et l'hypophyse. Reconstituant général par le suc musculaire.

**Indications.** — Retard du développement ; Formation difficile ; Paresse, nonchalance ; Asthénie ; Rachitisme ; Scrofule ; Dermatoses d'origine auto ou hétérotoxique (eczéma, prurigo, urticaire).

**Présentation et posologie.** — 10 ampoules buvables de 10 cc. Chaque ampoule doit être diluée dans un demi-verre d'eau froide naturelle ou gazeuse.

**Nourrissons** : 1 ampoule par jour mélangée au lait du biberon.

**Enfants** : 1 ampoule avant les 2 principaux repas.

**Adultes** : 2 à 4 ampoules.

**Laboratoires LEFRANCO**

36 à 46, avenue de Metz, — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

## HORMOVARINE BYLA

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

**Composition.** — Extrait ovarien, titré en folliculine.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

**Indications.** — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, aménorrhées, hypoménorrhées, dysménorrhées, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause, ovariectomie, stérilité, obésité, etc.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les jours, en injection lente, intra-musculaire, ou XV à LXXX gouttes, ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'Hormovarine doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours dans la période qui précède immédiatement la date présumée des règles.

N. B. — Les ampoules d'Hormovarine sont toujours préparées en partant de l'hormone ovarienne intégrale, tandis que nous avons adopté la folliculine cristallisée comme base de nos 3 autres préparations. (Voir aussi Benzoate de di-hydro-Folliculine Byla, amp. à 1.000 10.000 et 50 000 unités.)

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

**Concessionnaires des Marques des**

**ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>). (Tél. : Danton 08-11.)

## HORMOVITOL

Puissant tonique et reconstituant cellulaire.

Elixir de goût très agréable à base d'extraits androïques totaux, d'extraits cérébro-médullaires et de nucléines.

**Indications.** — Asthénie, Amaigrissement, Troubles nerveux, Dépression intellectuelle, Neurasthénie, Convalescence médicale ou chirurgicale, Troubles glandulaires, Surmenage, Phosphaturie.

### Doses :

*Adultes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

*Enfants* : de 5 à 10 ans, 1 cuillerée à café ; de 10 à 15 ans, 1 cuillerée à dessert.

Prix : Le flacon de 250 cc. 22 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-3.

**Laboratoires du Docteur H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc. — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 39-44)

## HORMUTER

Extraits utérins sélectionnés.

### Formes :

*Comprimés* (2 à 6 comprimés par jour pendant les 10 jours qui précèdent les règles.)

*Ampoules injectables* :

(1 ampoule tous les 2 jours pendant les 12 jours qui précèdent les règles.)

**Indications** : Troubles de la ménopause chirurgicale, Dysménorrhées, Douleurs mensuelles, Fibromes.

**Laboratoires FOURNIER Frères.**

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

## HUILE DE FOIE DE MORUE

**Médecinale Suractivée**  
**Rhône-Poulenc.**

2 000 unités internationales Vitamine A,  
500 unités internationales Vitamine D,  
par centimètre cube.

**Indications.** — Toutes celles de l'huile de foie de morue avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Arrêt du développement statural et pondéral.  
Lymphatisme, adénopathies, convalescences.

**Présentation** : Flacons de 125 cm<sup>3</sup>. Prix de vente : 21 fr. 80.

**Posologie** (par 24 heures) :

*Première année* : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

*Enfants* : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

*Adolescents et adultes* : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## HUILE D'HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly,

Trois siècles d'existence.

Produit de la Société de la véritable Huile de Haarlem.

Achterstraat 8, 8<sup>A</sup>, 8<sup>B</sup>, Haarlem (Hollande).

**Présentation et prix** (Juin 1942).

1<sup>o</sup> *Gouttes* : le flacon de 10 cc. : 3 fr. 50.

2<sup>o</sup> *Capsules* : la boîte de 36 capsules : 6 fr. 20 ;

la boîte de 108 capsules : 17 fr. 50.

**Indications** : Multiples, consacrées par l'expérience de plusieurs siècles.

Usage interne : Affections et Infections des divers appareils.

a. *Hépatique* : Congestions et Insuffisances du foie, Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiases, Icères, Chocs anaphylactiques, Rhumatismes et tous états uricémiques.

b. *Urinaire* : Lithiases, Cystites, Pyélonéphrites, Colibacilluries.

c. *Pulmonaire* : Bronchites, Bronchorrée, Asthme.

Usage externe : Alopecies, brûlures, plaies, piqures d'insectes, contusions, engelures, crevasses, furoncles.

**Posologie et mode d'emploi** :

Usage interne : X gouttes ou une capsule 3 fois par jour.

Usage externe : en applications légères.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle sous les n<sup>os</sup> 650-4 (*gouttes*) et 650-5 (*capsules*).

Pour la France, Colonies, Pays de protectorat, Espagne, Roumanie, Italie :

**Laboratoires THOMAS**

2, rue Sainte-Cécile, 31, faubourg Poissonnière

PARIS (IX<sup>e</sup>)

(Tél. : Provence 49-77.)

## HUILE VITA-D

**Composition :**

Ergostérol irradié.....	0 gr. 002
Hypophosphite de chaux.....	0 gr. 010
Huile de foie de morue.....	33 gr.
Excipient.....	Q. S. pour 100 gr.

**Avantages.** — Activité plus grande que l'huile de foie de morue ordinaire. Teneur constante en principes actifs. Goût agréable. Digestibilité et assimilation parfaites.

**Indications.** — Croissance, convalescences, anémies. Surmenage physique et intellectuel. Hypo-alimentation.

**Mode d'emploi.** — Jusqu'à 1 an : 1/4 de cuiller à café.

*Enfants* : 1/2 cuiller à café.

*Adultes* : 1 cuiller à café.

A prendre au milieu du petit déjeuner.

**Laboratoires Français de Produits Chimiques et Pharmaceutiques**

40-42, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HUILORHINE

**Composition :**

Camphre, eucalyptol, résorcine, essences aromatiques et antiseptiques (essence de menthe, etc.); véhicule : huile d'olive neutralisée et stérilisée sans éphédrine.

**Propriétés :**

Antiseptique et tonique des voies respiratoires supérieures.

**Indications :**

Toutes affections du rhino-pharynx, coryza, rhinites, sinusites, végétations adénoïdes, désinfectant pré et post-opératoire, prophylaxie des maladies infectieuses.

**Posologie et mode d'emploi :**

Instillations nasales : V à VI gouttes dans chaque narine matin et soir. Pulvérisations matin et soir.

Enregistré au L. N. C. n<sup>o</sup> 2027-1.

**Laboratoires Yves CHABROL**

29, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 25-85.)

## HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

**Composition.** — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Essences aromatiques.

**Propriétés.** — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

**Indications.** — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

**Présentation.** — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

**Mode d'emploi.** — Prescrire, pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 14 fr. 70.

Traitement unité : 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-8.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

(Tél. : Sufren 12-63.)

## HYDRAR 41

**Composition.** — Solution stable d'Hydroxymercurofluorescéine dibromée sodique à 1,5 p. 100.  
(Synonyme : mercurochrome 220 de Young.)

**Avantages.** — Fabrication française. Pouvoir antiseptique maximum par haute teneur en mercure (26 p. 100). Absence de toxicité du mercure organo-métallique non ionisable. Indolorité absolue.

**Indications et mode d'emploi.** — En applications et pansements : Plaies, brûlures. Maladies de la bouche, de la gorge et des oreilles. Affections gynécologiques et urologiques. Dermites, ulcères, furoncles, etc.

**Laboratoires Français de Produits Chimiques et Pharmaceutiques**

40-42, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII°).

## HYDRASTINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 mmgr. d'Hydrastine.

Alcaloïde principal de l'*Hydrastis canadensis*, exempt de Berbérine.

**Propriétés.** — Détermine la contraction du muscle utérin. Vaso-constrictrice et hypertensive. Accroît le tonus gastrique et intestinal. Sympathicolitique.

**Indications :**

a. **Essentielles :** Toutes les métrorragies ; ménorragies par congestion utérine primitive (Siredey). Kystes de l'ovaire, métrites hémorragiques. Hémorragies de la ménopause.

**Aucune contre-indication.**

b. **Secondaires :** Epistaxis. Hémorragies hémorroidaires. Hémoptysies. Dyspepsies atoniques. Insuffisance hépatique de la ménopause.

**Présentation.** — Granules à 2 mmgr.

**Posologie et mode d'emploi.** — 6 à 15 granules par jour en 2 ou 3 fois avant les repas, pendant 8 à 10 jours avant la date présumée des règles, ou dès le début de l'hémorragie. Ces doses peuvent être largement dépassées sans aucun inconvénient.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

## HYDROXYDASE

Antitoxine naturelle vivante,

eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

**Composition.** — Eau minérale naturelle chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici unique en hydro-minéralogie, donne des réactions oxydantes.

**Mode d'action.** — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

**Indications.** — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

**Mode d'emploi.** — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase. embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée aussitôt débouchée.

Caissettes de 20 petites bouteilles :

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. :

Source Marie-Christine du Breuil-sur-Couze déclarée d'intérêt public par décret du 2 septembre 1934.

**Compagnie de l'HYDROXYDASE**

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. (Tél. : Pigalle 83-15 et 83-16.)

## HYGIODINE

**Composition.** — Par cuillerée à soupe :

Iode métallique .....	0,030
Iodure de potassium.....	0,007
Bi-iodure de Hg.....	0,006
Méthylarsinate de soude ..	0,024

**Indications.** — Traitement discret et complémentaire antisiphilitique.

Aucune mention mercurielle ni spécifique sur le conditionnement.

**Forme.** — Elixir à base de vin iodotannique.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe dans un verre à liqueur avant chaque repas.

Voir composition.

**Prix :** 19 fr. 70 le flacon (8 à 10 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. n° 568.

**Laboratoires du Dr PILLET**  
222, boulevard Pereire — PARIS.

## HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

**Deux formes.** — Élixir Hymel (Hydrargyre et Miel), comportant un excipient spécial à base de miel, qui lui procure un goût très agréable et une tolérance parfaite pour l'estomac.

**Suppositoires Hymel**, préparés entièrement à froid, au mercure vif : 2 dosages : **Adultes.**

**Enfants et Nourrissons.** (Calibre très réduit.)

Voir : Élixir Hymel,

**Suppositoires Hymel.**

**Laboratoires A. DUTEIL**

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS

## HYOL

**Médication inhalante, d'odeur agréable, d'efficacité certaine.**

**Composition.** — Menthol cristallisé 1,7453. Gaïacol liquide 0,4363. Essence de thym 2,6178. Essence de lavande 1,3961. Essence de pin de Norvège 1,7452. Teinture de benjoin 13,0890. Teinture d'eucalyptus 13,0890. Teinture d'aconit (racine) 13,0890. Eau de laurier-cerise 4,3630. Teinture d'érysimum 4,3630. Essence de romarin 0,4363. Alcool à 80° 43,63. Pour 100 grammes. Les plantes aromatiques sont traitées par distillation.

**Présentation.** — En solution.

**Indications.** — Angine. Asthme. Bronchite. Coqueluche. Coryza. Emphyseme pulmonaire. Enrouement. Grippe. Laryngite. Oïte. Sinusite. Toux spasmodique.

**Propriétés.** — Aseptise les muqueuses jusqu'aux alvéoles pulmonaires, régularise rapidement les sécrétions, tarit l'expectoration.

**Posologie et mode d'emploi.** — *En inhalations :* Une cuillerée à café dans un verre d'eau très chaude. Respirer l'émanation pendant 8 à 10 minutes, 4 fois par jour. (*Laryngite, bronchite, coryza, catarrhe du nez, coqueluche, oïte suppurée.*)

*En évaporation à froid :* Une cuillerée à café dans une soucoupe matin et soir. Laisser évaporer dans la chambre du malade. (*Rougeole, coqueluche, scarlatine, bronchite, grippe.*)

*En pulvérisations :* Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie. Pulvériser dans le fond de la gorge 4 ou 5 fois par jour. (*Angine, pharyngite, abces, etc.*)

*En gargarismes :* XV gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie tiède, 4 fois par jour. (Toutes les affections de la gorge.)

**Prix :** 20 francs.

R. CUNIASSE, Pharmacien.

6, Place des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>) (Tél. : Wag. 39-93.)

## HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

**Hyoscyamine Houdé.** — Alcaloïde pur cristallisé extrait de l'*Hyoscyamus niger*.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique et anticonvulsivante, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique, où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante dans le parkinsonisme et la vagotonie. Arrête les tremblements séniles, le hoquet épidémique. Traitement de la chorée infantile, de l'épilepsie, des troubles de la démarche, etc...

Produit absolument inoffensif si l'on respecte la posologie, détaillée dans le conditionnement des flacons.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 4 granules *pro die*, les prendre avant les repas. Pas d'accumulation. S'arrêter en cas de vision brouillées.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 40-56.)

## HYOSTINAL

### « Type Normal ».

#### Composition :

Flacon n° 1.	
Acide sclérotique.....	4,1
Bromhydrate d'Hyoscine...	0,063
Amygdaloside.....	1,38
Extrait d'Ellebore vert....	6
Eau distillée.. Q. S. pour	100 gr.
Flacon n° 2.	
Bromhydrate d'Hyoscine...	0,063
Méthylarsinate disodique...	0,0013
Teinture de racines d'aconit	
à 50 p. 1 000 d'alkaloides	
totaux.....	1,800
Hydrolat de laurier-cerise	
titré à 1 p. 1 000 d'acide	
cyanhydrique.....	98,1357

**Mode d'action.** — Traitement du Parkinsonisme et des séquelles de l'Encéphalite léthargique.

Sous l'action d'HYOSTINAL, la rigidité musculaire s'atténue, l'insomnie et la salivorrhée disparaissent progressivement, l'amélioration est de règle.

**Mode d'emploi.** — Le matin : V à VI gouttes du flacon n° 1. L'après-midi : V à VI gouttes du flacon n° 2.

Augmenter de I goutte par jour sans jamais dépasser XXV gouttes de chaque flacon, puis redescendre à VI gouttes par jour comme dose d'entretien.

**Dans les cas rebelles, utiliser**

### HYOSTINAL « Type Fort ».

qui renferme une plus forte proportion de Bromhydrate d'Hyoscine, soit 0 gr. 34 p. 100.

Ne pas dépasser la dose de X gouttes par jour de chaque flacon au début du traitement, puis agir ultérieurement selon les résultats obtenus.

Prix : « Type Normal » : 68 francs.

« Type Fort » : 106 francs.

**Laboratoires J. M. RICARDOU**

Docteur en Pharmacie

38, rue Capitaine-Ferber — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. Ménil. 52-83).

## HYPALÈNE

### Comprimés et Suppositoires.

**Composition.** — Combinaison de l'acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

**Action.** — Analgésique, Sédatif, Hypnogène, Antispasmodique.

**Indications.** — Traitement de toutes les insomnies nerveuses, algies diverses, angoisse pré-opératoire, douleurs post-opératoires, spasmes douloureux du pylore.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Suppositoires de grosseur moyenne permettant leur usage aux adolescents et aux adultes et enveloppés dans une enveloppe de matière plastique hermétique.

**Posologie des Comprimés** (dosés à 0,15 ctgr.).

**Insomnies :** 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, une heure ou deux après le repas.

**Algies diverses :** 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

**Angoisse, Nervosisme :** 1 à 2 comprimés par 24 heures ou quelques minutes avant les interventions chirurgicales, les examens médicaux douloureux, les soins dentaires.

Dose maximum par 24 heures : 6 comprimés.

**Posologie des Suppositoires** (dosés à 0,20 ctgr.).

**Insomnies :** 1 à 2 suppositoires en se couchant.

**Algies diverses :** 1 à 2 suppositoires dans les 24 heures au moment des douleurs.

**Angoisse pré-opératoire :** 1 ou 2 suppositoires la veille de l'intervention, 1 suppositoire une heure avant l'intervention.

**Etats anxieux :** 1 suppositoire par 24 heures.

Dose maximum par 24 heures : 4 suppositoires.

**Adolescents :** administrer la moitié des doses pour adultes (Comprimés et Suppositoires).

#### Prix :

**Comprimés.** Le flacon ..... 18 fr. 40

**Suppositoires.** La boîte de 6..... 18 fr. 40

— de 18..... 40 fr. 20

Hypalène mal de mer. } Demander la littérature.  
Hypalène obstétrical. }

#### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs, ASNIÈRES.

(Tél. Grés. 37-34).

Dépôt : 127, bd Saint-Michel — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. Odéon 22-01.)



## HYPERSAN

*Médication hypotensive et diurétique.*

**Composition.** — Association d'extraits fluides de Gui, Cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

**Action.** — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'érythisme vasculaire.

**Indication.** — L'hypertension sous toutes ses formes.

**Doses.** — 30 à 50 gouttes, 3 fois par jour.  
ou 90 à 100 — le soir au coucher.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## HYPIODE

**Composition.** — Hyposulfite de Magnésium, Iodure de Sodium. En ampoules de 10 cc : M (étiquette bleue), pour injections intramusculaires ; V (étiquette rouge) pour injections intraveineuses.

**Indications.** — Dans les troubles liés à l'instabilité humorale. Algies de toutes sortes (Sciatiques, lombagos, radiculalgies, etc.). Migraines, rhume spasmodique, urticaire, eczémas, etc. Séquelles d'encéphalite, états anxieux.

**Formes.** — Boîtes de 5 ampoules de 10 cc.

**Posologie.** — Injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 10 à 40 cc. par jour, pendant 10 jours consécutifs.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Régnauld, COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 18-33.)

## HYPNO-NERVINE

*Régulateur et stabilisateur du système neuro-végétatif.*

**Présentation.** — Forme dragées.

**Indications.** — États sympathicotoniques et vagotoniques, Syndromes solaires, Érythisme cardiaque, Psychasthénie, Angoisse, Insomnies, Anxiété, Émotivité, Irritabilité, Mal de mer, Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies nerveuses, Cure de désintoxication, Maximum d'activité. Aucune contre-indication.

**Composition :**

Extrait de Valériane stabilisé.	0 gr. 10
Extrait de Cratægus stabilisé.	0 gr. 05
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 015
Gardénal .....	0 gr. 02

Pour 1 dragée.

**Posologie.** — 2 à 3 dragées par jour. Cure pouvant être prolongée sans inconvénient.

**Laboratoires DORANTOWIOZ**

-17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roq. 14-12.)

## HYPOBROMINE

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Formule.** — Bromure de Méthylacétylcholine : 0,008 ; Théobromine : 0,12.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les troubles de l'hypertension.

**Posologie.** — De 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, 15 jours par mois.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS.

## HYPOLACTOL DAGUIN

Toutes les indications du soufre soluble.

Synergie médicamenteuse : hyposulfite + sel de calcium.

Désensibilisant. Sédatif.

### Présentation. — Pilules glutinisées :

Hyposulfite de sodium chimiquement pur... 0,30

Lactate de calcium..... 0,10

### Ampoules de 10 cc. pour 1/1 V :

Hyposulfite de sodium chimiquement pur... 2,50

Lactate de calcium..... 0,50

Excipient aqueux stabilisant, totalement indolore..... Q. S. pour 10 cc.

### Doses. — 6 à 8 pilules par jour.

1 ampoule 3 fois par semaine en intraveineuse.

**Indications.** — Urticaire, Eczéma, Dermatoses récidivantes, Prurits, Manifestations anaphylactiques. Prévention des accidents de l'arsénothérapie.

Prix : Le flacon de 50 pilules : 19 fr. 50.

La boîte de 10 ampoules : 29 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 372-5 et 372-6.

**Laboratoires DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Grav. 32-17.)

## HYPOPHÉDRINE

**Éphédrine corrigée.**

### Composition :

Ephédrine chl..... 0 gr. 03

Hypophyse totale ..... 0 gr. 03

Ext. de Lobélie ..... 0 gr. 01

Par dragée.

**Indications.** — Rhume des foins, Asthme, Bronchites emphysémateuses. Tous états dyspnéiques.

**Avantages.** — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaux, ni insomnie.

**Posologie.** — 3 à 4 dragées par 24 heures.

L'étui de 25 dragées : 25 fr. 50.

**Laboratoires du CYPROVEINOL**

12, rue du Dragon — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 78-81.)

## HYPOSULFÈNE

**Soufre soluble. — Aliment soufré.**

Produit chimiquement pur, neutre, stabilisé, toujours égal à lui-même.

Activité exaltée par la glutinisation qui supprime la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et évite ainsi au malade le mauvais goût, les éruptions sulfureuses et la gastralgie.

**Pilules glutinisées** dosées à 0 gr. 25 d'hyposulfite de soude pur, sec (correspondant à 0 gr. 32 de sel cristallisé).

Flacon de 65 pilules : 20 francs.

**Ampoules intraveineuses :** solution d'hyposulfite de soude pur à 20 p. 100 stabilisée par la méthode de Kabelik.

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. : 32 fr. 50.

**Indications.** — *Dermatoses récidivantes :* Eczéma, Urticaires, Prurits, etc.

*Intolérances alimentaires et médicamenteuses, Intoxications, Sensibilisations, Anaphylaxies.*

*Indications du Soufre :* Acné, Séborrhée, Ictère, Saturnisme, *Insuffisances hépatiques*, carences soufrées.

*Hypertension artérielle* par son action « détoxicante » sur les hypertensines et l'apport de soufre dans le métabolisme des parois vasculaires.

**Doses.** — 4 à 12 pilules par jour aux repas (dose moyenne 4 à 8 pilules) ou 2 à 3 intraveineuses par semaine. Dans les cas graves ou rebelles, combiner les deux modes d'administration (action cholagogue et action cholérétique).

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## HYPOTAN COMPRIMÉS

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive (Bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

**Propriétés.** — Synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. L'Hypotan améliore la circulation périphérique et réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre la musculature lisse.

**Indications.** — Hypertension, spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'Acécoline; hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue, tolérance parfaite.

Boîte de 44 compr. Prix : 23 fr. 70.

## AMPOULES INJECTABLES

Une ampoule de 1 cc. correspond à 2 cg. de bromure de méthylacétylcholine (synonyme bromure d'acétyl- $\beta$ -méthylcholine).

**Propriétés.** — 1° Hypotenseur 200 fois plus puissant à doses égales que l'Acécoline.

2° Artério-dilatateur d'effet très prolongé.

3° Excito-sécréteur et excito-moteur de l'appareil digestif.

**Effets accessoires.** — 1° Chez certains sujets: chute tensionnelle et bouffée vaso-motrice importantes. Abondance des sueurs et des sécrétions digestives.

2° Chez les asthmatiques, effet broncho-constricteur.

L'atropine (1/4 ou 1/2 milligramme) inhibe l'action de l'Hypotan.

**Indications.** — Hypertensions rebelles et paroxystiques. Médicament d'urgence dans les coliques de plomb, l'état de mal épileptique, l'éclampsie, les troubles de la ponction lombaire, l'iléus paralytique, les tachycardies paroxystiques.

**Contre-Indications.** — Asthme et ses équivalents.

**Posologie.** — Dose normale: 2 cg. par voie sous-cutanée. Tâter la susceptibilité du sujet avec une 1/2 ampoule.

Boîte de 6 amp. Prix : 25 fr. 80.

L'HYPOTAN ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

(Tél.: Trinité 44-31. — Télégr.: Chevrematte-90 — Paris.)

## HYPOTAN-PAPAVERINE

**Composition.** — Dérivés de la choline (bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et au phénylglycolate de papavérine.

**Propriétés.** — Les dérivés de la choline dilatent les artères par voie nerveuse. La papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel.

La somme de ces deux actions est un effet antispasmodique vasculaire complet.

**Indications.** — Hypertension, Nervosisme des hypertendus, Spasmes vasculaires.

Cure complémentaire de l'Acécoline-Papavérine.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, 15 jours par mois.

*L'Hypotan-Papavérine ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées.*

Boîte de 44 comprimés : 25 fr. 30.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

(Tél.: Trinité 44-31. — Télégr.: Chevrematte-90 — Paris.)

## HYPOTENSA

### Comprimés hypotenseurs.

**Présentation.** — En pilulier bakélite de 50 comprimés (27 fr. 85).

**Principes actifs.** — Extrait d'aubépine, Extrait de gui, Teinture de strophanthus au 1/10<sup>e</sup>, Valérianate d'iso-amyle.

**Indications.** — Hypertension artérielle, Troubles circulatoires, Palpitations, Spasmes, Artériosclérose, Angoisses, Angines de poitrine, Anévrismes, Lésions athéromateuses, Hémoptysies.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-51.

Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

(Tél.: Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## HYPO-THIORINE

### Hyposulfite de soude pur.

**Deux formes.** — 1° *Comprimés* glutinifiés et dragéifiés, dosés à 0 gr. 50 d'hyposulfite Na desséché.

2° *Ampoules* de 10 cc. à 20 % (injection intraveineuse).

### Indications :

#### Traitement de fond de l'hypertension.

**Médication anti-choc.** — Phénomènes anaphylactiques de toutes natures. Intolérance arsenicale, bismuthique ou aurique. Erythrodermies toxiques et médicamenteuses.

**Médication antirhumatismale.** — Rhumatismes chroniques, déformants et ankylosants.

Arthropathies gonococciques, Erythème noueux.

**Médication dermatologique.** — Dermatoses séborrhéiques, Séborrhées, Acné, Furoncles, Anthrax, Eczémas, Psoriasis, Prurits divers.

**Médication hépato-intestinale.** — Insuffisance hépatique. Ictère. Constipation.

**Médication respiratoire.** — Dans tous les cas où le soufre est indiqué l'hypo-thiorine réalisera sans dangers et sans fatigue pour l'organisme l'apport de soufre nécessaire.

### Dose et mode d'emploi :

1° *Comprimés*: avaler sans croquer 2 à 6 comprimés par jour aux repas.

2° *Ampoules*: cas graves — 1 injection intraveineuse chaque jour ou à jour passé, dans l'intervalle 2 à 6 comprimés par jour.

50 Comp. : 17 francs. — 10 Amp. : 34 fr. 45 — 1 Amp. : 5 fr. 50.

Echantillons et littérature sur demande.

### Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Ph<sup>ie</sup>, 39, rue Fondaudége — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

## I. A. M.

### Iode Arsenic-Manganèse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Composé organique, réalisant sous une forme optimale l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopolétique, lymphagogue, L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

**Indications.** — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Asthénies, Etats de dépression, Asthme, Convalescences.

**Posologie.** — *Gouttes* « I. A. M. » (*adultes*), XV à XX gouttes matin et soir.

*Gouttes* « I. A. M. » (*enfants*), 1 goutte par année d'âge matin et soir.

*Sirop* « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

### Littérature et échantillons

Docteur LAVOUÉ — RENNES.

## IDONIL

Complexe organique (bloton) extrait du poisson frais, ne renfermant ni huile, ni graisse, ni protéines.

**Indications.** — Toutes celles de l'huile de foie de morue (lécithines, alcools supérieurs).

Toutes celles des nucléines pures de la totalité du poisson, Soit : anémies (syphilitique, paludéenne, post-opératoire), neurasthénie, déficiences organiques, fatigue et surmenage physique et intellectuel, lymphatisme, enfants débiles, arriérés, retardés, rachitiques, etc...

**Action.** — Intégralement assimilable, si l'intestin n'est pas colmaté. Aucune contre-indication.

### Doses moyennes :

*Comprimés* : 3 à 4 aux repas, au début, puis 4 par jour.

*Granulé* (enfants) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

### Présentation :

*Comprimés*, en boîte de 40, une semaine : 26 fr. 50.

*Granulé*, en boîte carton, une semaine : 13 fr. 50.

*Comprimés* Idonil-Maté, une semaine : 26 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. sous nos 1039, 10 et 13.

### Laboratoires A. V. E.

81, Quai Valmy — PARIS (X°).

(Tél. : Nord 69-01).

## IFRANOL

**Composition.** — Association de quinine, arsenic, strychnine, manganèse, extrait cortico-surrénal, boldo, évonimine, scammonée.

**Présentation.** — Flacon de 30 dragées dosées à 0 gr. 10 de quinine. Boîte de 10 suppositoires (Suppo-Ifranol) dosés à 0 gr. 20 de quinine.

**Propriétés.** — Spécifique des pyrexies par la quinine ; reconstituant, stimulant et tonique par la strychnine. l'arsenic et le manganèse ; cardiotonique par l'extrait cortico-surrénal.

**Indications.** — Maladies infectieuses (grippe et angines grippales en particulier), convalescence et prophylaxie de la grippe.

### Posologie et mode d'emploi :

**Grippe aiguë.** — Adultes : six dragées ou trois suppositoires par jour. Enfants : de 1/3 à 2 suppositoires 1/2, ou de 1 à 5 dragées, suivant l'âge.

**Convalescence.** — Adultes : 2 ou 3 dragées, ou 1 suppositoire par jour, pendant une dizaine de jours au moins.

Enfants : de 1/4 à 1 suppositoire, ou 1 à 2 dragées, suivant l'âge.

**Prophylaxie.** — Une dragée par jour.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

93, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## IMIDO « ROCHE »

**Composition.** — Solution injectable de bichlorhydrate d'Histamine dosée à 1 milligramme par cm<sup>3</sup>.

**Propriétés.** — Détermine une sécrétion abondante du suc gastrique permettant la réalisation pratique de l'épreuve de l'Histamine ; détermine également des réactions locales et générales, ainsi qu'une action rapide sur les douleurs.

**Indications.** — Particulièrement utile pour poser le diagnostic des ulcères et des cancers gastriques.

Utilisé également dans toutes les applications thérapeutiques de l'Histamine : arthrites rhumatismales, dyspnées asthmatiformes, rhume des foies, etc.

**Posologie.** — Une seule ampoule en injection sous-cutanée (épreuve de l'Histamine). 1/4 à 1/2 ampoule en inj. intradermique ou scarifications.

Boîte de 6 ampoules de 1 cm<sup>3</sup>.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-15.

Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Archives 91-10)

## IMINASTHME

**Médication abortive de la crise d'asthme.**

Un seul comprimé d'Iminasthme pris dès l'apparition des signes avant-coureurs de la crise d'asthme la fait avorter presque à coup sûr, sans danger pour le malade.

### Composition :

Agaricine .....	0,005
Théophylline .....	0,10
Citrate de diphenyléthylamine.....	0,035
Diméthylaminophénazone.....	0,10

**Thérapeutique.** — Grâce à la double association Agaricine-Théophylline et Diméthylaminophénazone - citrate de diphenyléthylamine, l'Iminasthme a une toxicité beaucoup moindre que celle de ses composants, ce qui permet de la laisser en permanence aux mains du malade. Il agit rationnellement sur l'équilibre vago-sympathique.

En aucun cas, l'Iminasthme ne peut être nuisible, ou contrecarrer un traitement général, car :

- 1° Il ne produit aucun effet secondaire ;
- 2° Il ménage la circulation (ni éphédrine, ni adrénaline) ;
- 3° Il ne provoque pas d'accoutumance (absence de barbituriques et d'analgésiques).

**Posologie.** — Dès les premiers symptômes, variables avec chaque malade, faisant craindre l'imminence d'une crise, prendre un comprimé d'Iminasthme avec un peu d'eau.

Si le malade prévoit une crise nocturne, il doit prendre un comprimé, le soir en se couchant, et deux comprimés si les crises se déclarent habituellement à la fin de la nuit.

La boîte de 10 comprimés : 16 fr. 90.

Littérature et échantillons :

Laboratoires **SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## IMMUNICORPS MARY LAURENT

Immunothérapie  
physico-chimique

(Complexe Carbone-Iodo-Magnésien.)

**Traitement des maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, par voie buccale.**

### Indications :

Grippes, Angines, Pneumonies, Otites, Rhumatismes, Septicémies, etc., assurent la fixation et la collection du pus : Furonculose, Anthrax.

### Dose d'attaque :

50 gouttes 2 fois par jour.

### Dose d'entretien :

30 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau. Dépourvus de toute toxicité, pas de contre-indication.

Littérature et Échantillons :

**Laboratoire Docteur H. FERRÉ**

**M. AUZOUX, Pharmacien**

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## IMMUNIDERM GRÉMY

### Pommade Vacoïn.

Pommade vaccinnante réalisant l'association du bouillon vaccin concentré et du Bactériophage.

Bouillon vaccin concentré ..... 9,09

Bactériophage staphylo ..... 2,70

Lanoline, vaseline aa..... 9,09

Sulf. double d'oxyquinoléine et de potasse ..... 0,015

Pour un tube de 30 grammes.

### Indications :

Furonculose, Anthrax, Sycosis, Prurit, Ulcères variqueux, Plaies et brûlures infectées et toutes dermatoses.

### Mode d'emploi :

Appliquer sur la partie infectée une couche de pommade. Nettoyer à l'éther avant une nouvelle application.

Prix : 16 fr. 40 le tube de 30 grammes.

Enregistré L. N. C., n° 608-69.

### Laboratoires GRÉMY

**J. ROY et C<sup>ie</sup>, pharmaciens**

14, rue de Clichy — PARIS. (Tél. : Trinité 48-43.)

## IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

**Composition.** — Bacille d'Achalme + entérocoques.

**Forme injectable.** — 5 séries (I, II, III, IV, V) à doses croissantes. Débuter par la série II pour le Rhumatisme articulaire aigu et la Chorée. Débuter par la série I pour le Rhumatisme viscéral, subaigu ou chronique.

**Indications.** — Toutes les formes cliniques de l'infection rhumatismale : Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, myoarticulaire, chronique, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Pleurésie rhumatismale, Sciatique, Névrites, Névralgies rhumatismales, Chorée, Thyroïdites, Arthritisme, Dermatoses streptococciques.

**Forme à ingérer.** — Ampoules de 5 cc. Une ampoule par jour.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique ne pouvant pas être traité par la forme injectable. Manifestations douloureuses gastro-intestinales, hépatiques, rénales des arthritiques ; Hypertension, Insuffisance cardiaque, syndromes angineux liés à l'Arthritisme.

**Prix.** — La boîte : 39 fr. 50.

**Laboratoire des IMMUNOVACCINS**

16, avenue George-Sand — NICE. (Tél. : 832-22.)

## IMPÉTIGOL

**Présentation.** — Pommade en tube. Poids brut : 60 gr. environ.  
**Composition.** — I complexe minéral : Iode-Cuivre associé à I complexe phytothérapique : Calendula — Hypericum — Thymus.

**Composition en grammes p. 100 :**

Protocole de l'essai	5 gr.
Huile de millepertuis	12 gr.
Teinture mère de soufre	12 gr.
Huile essentielle de thym	4 gr.
Launelle	40 gr.
Vaseline	35 gr.

### Indications :

#### Dermatologie :

Sireptococcies cutanées. Impétigo, Intertrigos, Dermatoses croûteuses et squameuses, Dermatoses à forme circinée, à forme nummulaire, Eozéma rétro-auriculaire. Sporotrichoses, Tricophytoses, Folliculites staphylococciques, Acné pustuleuse, Ecthyma, Suppurations récentes ou anciennes, Ulcères varicelleux non eczématisés, Plaies infectées rebelles.

**Gynécologie.** — Ulcérations du col de la métrite cervicale.

**Mode d'emploi.** — En applications ou en frictions suivies d'applications.

Prix au public : Le tube, 14 fr. 70.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 1501-2.

Laboratoires JAUFFRET : NÉOBIO-IMPÉTIGOL

Vanves, près PARIS

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-Interne des Hôpitaux.

Correspondance et Bureaux : 181, av. Victor-Hugo, CLAMART (Seine).  
 (Tél. : Michelet 04-71.)

## INAVA

### Pâte dentaire immunisante

au Pyodarsénol.

#### Hygiène quotidienne

(Fuso-strepto-vaccin gingival Inava B associé au Sulfarsénol.)

Antipyrorrhéique. — Antispirillaire.

Pour prévenir et traiter :

La suppuration des gencives, la carie dentaire le déchaussement des dents.

Et toutes Gingivites, Stomatites et Pyorrhée.

Tube ord. : 8 fr. 50 — Tube g. mod. : 10 fr. 70.

Enregistré L. N. C. M. n° 760-12

Laboratoires INAVA

ASNIÈRES (Seine).

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS, 23, rue des Moines.

## INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Association d'extraits opothérapiques et végétaux.

### Composition :

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucres glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

### Indications :

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non supprimées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

### Mode d'emploi :

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 21 fr. 50.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Dorian 47-00.)

## INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

**Composition.** — Principes actifs d'Hamamélis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de la circulation générale, Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonique vasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

**Indications.** — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 17 fr. 50.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS XII<sup>e</sup>. (Tél. : Dorian 47-00.)

## INERTYL CHARVOZ

**Composition.** — Carbonate de bismuth, Charbon actif, Bioxyde de Manganèse, Hydrate de Magnésie, Lactose, Kaolin colloïdal.

**Indications.** — Intoxications gastro-intestinales exo- et endogènes, Viciations du métabolisme des féculents, Entéro-colites, Diarrhées, Aérophagie.

**Formes.** — Cachets, Granulé.

### Posologie :

**Adultes :** 1 à 2 cachets, ou 2 cuillerées à café de granulé, après chaque repas.

**Enfants :** demi-dose.

Prix : Les deux formes : 21 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 80-5 et 80-6.

### Laboratoires S. COUDER

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 02-64.)

En Z. N. O. : 2, place Croix-Paquet — LYON.

(Tél. : B. 09-83.)

## INFANGYL CARLIER

### Composition :

Thiocol, antipyrine, tolu.....	ãã	0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier-cerise .....	ãã	0 gr. 04
Teinture de Drosera .....		0 gr. 08

Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.

**Indications.** — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

**Propriétés.** — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Prix : 15 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-2.

Échantillons et Littérature :

### Laboratoires René CARLIER

43, rue de Gréteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

## INHALANTYL

**Définition.** — *Inhalantyl* se présente sous forme de comprimés prompts à se désagréger, à base d'essences balsamiques extraites de zestes de fruits. Il ne contient ni alcool, ni menthol.

**Originalité.** — Sa nouveauté et sa raison d'être sont de deux ordres :

1° Nous avons fait appel à un groupe d'essences puissamment antiseptiques, utilisées pour la première fois d'une façon systématique pour la désinfection des voies aériennes supérieures, nous voulons dire les *essences de zestes d'agrumes*, dont les travaux poursuivis dans divers laboratoires de la Faculté de pharmacie de Lyon et des thèses soutenues depuis lors ont montré l'action remarquable contre les microbes habituels des voies aériennes supérieures : méningocoque, streptocoque, staphylocoque, Loeffler, etc. Des stations expérimentales italiennes, installées pour la plupart en Calabre, ont apporté mêmes résultats probants (notre laboratoire avait déjà mis ces essences sur le plan supérieur qu'elles méritent en les utilisant pour l'huile balsamique qu'il a dénommée *Balsamotinal* et qui a fait ses preuves).

2° Pour garder les essences pures dans les comprimés, nous utilisons un excipient-support *inerte* dont les mailles ou trabécules maintiennent les essences prisonnières à l'état de fines gouttelettes. Le comprimé jeté dans l'eau chaude se dissocie immédiatement : les essences subtiles sont libérées et happées par les voies respiratoires avec la vapeur d'eau ; le support devenu inutile se dépose au fond du bol. Ainsi sont maintenues en captivité, sans altération, des particules aussi subtiles et évanescences que celles des essences pour être libérées au moment opportun.

**Action.** — Les essences balsamiques utilisées agissent de manière élective contre les agents microbiens des fosses nasales, du rhino-pharynx, du larynx, de la trachée et des bronches. Elles se dégagent d'emblée (et continûment durant cinq à six minutes) gagnent avec la vapeur d'eau chaude l'ensemble des cavités aériennes et de leurs annexes (sinus, trompe d'Eustache) jusqu'aux alvéoles pulmonaires, décongestionnant et aseptisant toutes les muqueuses de l'arbre respiratoire.

**Indications.** — Toutes les affections inflammatoires, banales ou grippales, parties du nez et du rhino-pharynx et tombant sur la gorge ou les bronches ; toutes celles aussi qui touchent d'emblée le larynx et les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire : *coruzas, sinusites, rhino-pharyngites, pharyngites, angines*. — *laryngites, enrouement, aphonie, toux*. — *trachéites, bronchites, affections grippales avec ou sans complications*.

**Mode d'emploi.** — Trois inhalations par jour en moyenne (matin, midi et soir), de cinq minutes chacune, préparées en faisant dissoudre dans un bol d'eau bouillante, ou dans un inhalateur, 1 à 2 comprimés. Respirer les vapeurs alternativement par le nez et par la bouche.

**Nota.** — Le dépôt qui, après inhalation, reste au fond du bol est sans valeur. Il est constitué par l'excipient qui servirait de support aux essences balsamiques.

Prix : boîte de deux tubes de comprimés, 18 fr. 60.

Laboratoire FIDES, R. VOUZELLAUD, Docteur en pharmacie.

14, rue de la Comète — PARIS (VII°). — Tél. : Invalides 64-13.



## INHALATION LANCOSME

**Composition.** — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la **créosote de hêtre pure.**

**Présentation.** — Liquide.

**Propriétés.** — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

**Indications.** — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

**Contre-Indications.** — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

**Emploi.** — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante ; deux à trois inhalations par jour.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Élysées 17-46.)

## INHALO BOL

**Cornet pour inhalations**  
(en papier parcheminé).

Simple,  
pratique,  
bon marché.

**Indications thérapeutiques :**

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 6 fr. 80.

**Laboratoire de l'INHALO-BOL**

32, rue de l'Ouest — PARIS

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

## INHALO-PAST

**Gargarisme sec en tablettes.**

**Composition.** — Alcoolature de racines d'Aconit, chl-te d'Amyléine, borate de soude, chlorate de Potassium, *chlorhydrate de Diamino-Acridine*. Eucalyptol, Menthol, Soufre colloïdal, Terpène.

**Indications thérapeutiques.** — Affections de la gorge, angines, amygdalites, laryngites, pharyngites, enrouements. Infections de la bouche : Stomatites, Gingivites.

**Posologie.** — 8 à 15 tablettes par jour pour adultes ; 4 à 8 tablettes par jour pour enfants.  
Laisser fondre lentement la tablette sans la croquer.

Prix : 9 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 742-10.

**Laboratoire P. TAVERNIER**

Docteur en Pharmacie,

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## INHALO-SEL

**Composition.** — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles (pin, niaouli, eucalyptus).

**Avantages thérapeutiques.** — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 8 fr. 10

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 742-2.

**Laboratoire P. TAVERNIER**

Docteur en pharmacie.

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## INHALO-THIORINE

Hydrogène sulfuré naissant.

**Forme.** — Comprimés pour inhalations (hydrogène sulfuré à l'état naissant, essence de Niaouli et Terpinol).

**Propriétés.** — L'INHALO-THIORINE permet de réaliser à domicile la cure sulfureuse externe par inhalation d'Hydrogène sulfuré à l'état naissant.

Dans les affections des voies respiratoires, c'est le complément de la cure interne de Sulfo-Thiorine.

**Indications.** — Rhinites, Sinusites, Pharyngites, Trachéites, Enrouements, Laryngites chroniques, Catarrhes, Bronchites.

**Mode d'emploi.** — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante pour inhalation de 4 à 5 minutes. 2 à 3 inhalations par jour.

30 comprimés. Prix : 17 fr. 25.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 820-04.)

## INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

**Composition.** — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

**Mode d'emploi.** — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : comprimés : 13 fr. 80.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Aut. 71-98.)

## INJECTION DÉSENSIBILISANTE FRAISSE

**Composition :**

Hyposulfite de Soude .....	0 gr. 10
Hyposulfite de Magnésie .....	0 gr. 40
Soluté de glucose isotonique ....	5 cc.

**Indications.** — Troubles anaphylactiques, Eczéma, Furunculose, Prurit.

**Forme.** — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

**Posologie.** — 1 ampoule tous les 2 jours.

**Prix :** Boîte de 6 ampoules : 22 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-15.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## INJECTION IMMUNISANTE FRAISSE

**Composition :**

Cinnamate de Benzyle ....	0 gr. 05
Cholestérine .....	0 gr. 05
Camphre.....	0 gr. 05
Huile d'olive.....	2 cc.

**Indications.** — Tuberculose primaire et autres états d'infection.

**Forme.** — En ampoules de 2 cc. (boîte de 12 ampoules).

**Posologie.** — 1 ampoule tous les jours dans le tissu musculaire.

**Prix :** boîte de 12 ampoules : 22 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-2.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

Pharmaciens

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## INOCRININES

Extraits non glycerinés de glandes fraîches en ampoules buvables non injectables. Toute la gamme endocrinienne.

### Formules simples :

0 Epiphysine.....	0 gr. 02	4 Hypophysine ant...	0 gr. 10
1 Thyroïdine.....	0 gr. 025	5 Hypophysine tot...	0 gr. 10
2 Ovarine.....	0 gr. 10	6 Surrénine.....	0 gr. 10
3 Orchitine.....	0 gr. 10	7 Thymusine.....	0 gr. 50

### Formules associées :

8 Thyroïdine.....	0 gr. 025	13 Thyroïdine.....	0 gr. 025
Hypophysine ant...	0 gr. 10	Hypophysine ant...	0 gr. 10
9 Hypophysine ant..	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine.....	0 gr. 10	14 Thyroïdine.....	0 gr. 025
10 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Hypophysine ant.	0 gr. 10
Orchitine.....	0 gr. 10	Ovarine.....	0 gr. 10
11 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Surrénine.....	0 gr. 10
Surrénine.....	0 gr. 10	15 Thyroïdine.....	0 gr. 025
12 Thyroïdine.....	0 gr. 025	Hypophysine ant ..	0 gr. 10
Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine.....	0 gr. 10	Surrénine.....	0 gr. 10

Formuler : ampoules buvables d'Inocrinines, formule n° 00, 1 boîte.

Doses et mode d'emploi. — Une à deux ampoules par jour 1/2 heure avant les repas. La boîte de 10 ampoules : 29 fr. 30.

Lab. contrôle : n° 9, 909-3 ; n° 12, 909-4 ; n° 14, 909-5

### Laboratoires des INOCRININES

D<sup>r</sup> FURT, 4, av. du Maréchal-Pétain, LE BOUSCAT, près Bordeaux

## INOGYL

Complexe d'extrait placentaire et d'extrait orchitique désalbuminé et délipoidé.

Actif par voie buccale.

**Indications.** — Tous les troubles liés à une insuffisance ovarienne partielle ou totale : aménorrhée, dysménorrhée, ménopause, castration.

**Action.** — Réapparition et régularisation des règles, diminution de la douleur, sédation des troubles ménopausiques secondaires.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules ou 4 à 8 dragées par jour, selon l'intensité des troubles.

**Présentation.** — La boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. : 24 fr. 40.

L'étui de 40 dragées : 17 fr. 10.

### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOLAXINE

Granulé mucilagineux végétal, naturel, pur, sans adjonction d'aucun produit laxatif chimique.

**Propriétés.** — L'*Inolaxine* absorbe 40 fois son volume d'eau. Elle augmente le bol intestinal et lui donne une consistance moelleuse. Elle favorise les mouvements péristaltiques et facilite l'acheminement des matières fécales. Elle agit mécaniquement et ne détermine pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation, atonie intestinale.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas. Mettre à sec sur la langue, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

**Présentation.** — La boîte : 17 fr. 10.

### Laboratoires du D<sup>r</sup> F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar désodorisé.

**Propriétés.** — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

**Indications.** — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès. Soins de la gorge et du nez. Gynécologie. Ulcérations du col. Pansements des plaies.

### Mode d'emploi.

*Lavages* : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau

*Gargarismes* : Bains de bouche : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

*Badigeonnages* : pur ou au demi.

*Inhalations.*

*Dentifrice* : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

## SPECIALITÉS INOLÈNE

**Inolène simple** : Soins des muqueuses et des plaies. (Voir ci-dessus.)

**Inolène vaseline** (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

**Inolène thymolé** : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau.)

**Inolène ovules** : Gynécologie.

**Inolène pommade et Inolène poudre** : Dermatologie. Prurits. Plaies.

Enreg. au L. C. M. sous le n° 563.

**Laboratoires ODILIA**

**E. LACOMBE, Pharmacien.**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 25-51.)

## INOPHYLINE

Antalgique cardiaque, Diurétique.

L'aminophylline ou théophylline-éthylène diamine vaso-dilate électivement les artères coronaires (action antalgique), assure une meilleure nutrition du myocarde (action toni-cardiaque).

Elle dilate les vaisseaux du rein et augmente la diurèse (diurétique pur et cardio-rénal).

Elle a une action eupnéique nette.

Son action est rapide, fidèle, atoxique, sa tolérance parfaite. Elle n'a pas de contre-indications.

### Indications, posologie.

*Comprimés* à 0 gr. 10 : 1 à 2 comprimés 2 à 4 fois par jour après les repas : prévention de l'angine de poitrine, oppressions des cardiaques, aortiques, urémiques, coronarites, myocardites, asthme cardiaque et vrai.

Ascite, œdèmes cardiaques et rénaux, néphrites, oliguries infectieuses.

*Suppositoires* à 0 gr. 35 : 2 à 3 par jour en cas d'intolérance gastrique, d'hypertension portale.

*Ampoules intraveineuses* à 0 gr. 25 : 1 à 2 par jour dans les cas graves ou urgents : infarctus du myocarde, asthme cardiaque ou vrai, oliguries graves, comas toxiques, urémie, etc. Injecter lentement (en 3 minutes).

*Ampoules intramusculaires* à 0 gr. 35 : 1 à 2 par jour.

**Laboratoires MILLOT**

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE DIGITALIQUE

### Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine.....	0,05
Intrait de digitale stabilisée.....	0,005

**Propriétés.** — Depuis plusieurs années, les cardiologues avaient noté l'augmentation d'efficacité de la digitale sous l'influence de l'aminophylline.

Différentes interprétations de cette augmentation d'activité ont été données. Il semble, en outre, que l'action diurétique de l'Inophylline augmente la rapidité d'élimination de la digitale sur la fibre cardiaque, évitant ainsi le risque d'accumulation.

**Indications.** — Cette association peut être considérée comme une préparation digitale particulièrement active. Ses indications et sa posologie sont celles, classiques, de la digitale.

**Posologie.** — Entretien : 2 à 4 comprimés par jour.  
Hyposystolique : 4 à 8 comprimés par jour.

### Laboratoire MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE-OUABAÏNE

### Formule :

Théophylline-éthylène-diamine.....	0,10
Ouabaïne.....	1/4 de mgr.

Pour une ampoule de 2 cc. pour injections intra-veineuses.

Cette association, exclusivement pour la voie endo-veineuse, utilise l'action compensatrice de l'Inophylline et de l'Ouabaïne.

On sait la brusque augmentation de contractilité myocardique provoquée par ce médicament puissant, mais parfois trop brutal.

L'association, préparée à l'avance dans une ampoule de 2 cc., augmente l'action de l'Ouabaïne seule et donne une meilleure tolérance et une sécurité plus grande.

**Posologie.** — Les mêmes que celles de l'Ouabaïne.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE PAPAVERIQUE

### Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine.....	0,08
Chlorhydrate de papavérine.....	quatre centigrammes.

**Propriétés.** — L'action vaso-dilatatrice de l'Inophylline, quoique électorale sur le territoire coronarien, s'étend aussi aux artères périphériques ; elle a été utilisée par exemple dans la claudication intermittente. Mais cet effet antispasmodique vasculaire est remarquablement renforcé par celui de la papavérine, « antispasmodique électif de la fibre lisse », à condition d'employer cette substance à dose suffisante, quatre centigrammes par comprimé. Nous tenons à insister sur ce dosage en papavérine, car les pharmacologues ont bien montré que seules les fortes doses (20 à 25 centigrammes de papavérine) permettent d'obtenir en clinique des antispasmodiques remarquables obtenus expérimentalement. Les doses de quatre à cinq centigrammes par jour sont strictement inefficaces, quoique préconisées quelquefois.

**Indications.** — Aortites thoraciques, abdominale, arthrite des membres inférieurs, claudication intermittente ; hypertension et ses troubles : céphalées, vertiges, éblouissements.

**Posologie.** — 3 à 6 comprimés par jour.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE SCILLITIQUE

### Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine....	0,05
Extrait mou de Scille stabilisée..	0,01
Poudre de Scille stabilisée.....	0,01

**Propriétés.** — L'Inophylline est un puissant diurétique déchlorurant ; son action azoturique étant moindre, il a paru utile de l'associer à la Scille, diurétique azoturique vrai.

**Indications.** — Dans les cas d'œdème, de cœurs séniles, et pour maintenir la compensation cardiaque.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE SPARTÉINÉE

Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine...	0,06
Sulfate de Spartéine.....	0,02

**Propriétés.** — Augmente l'action diurétique déchlorurante de l'Inophylline au cours des rétentions chlorurées et des œdèmes.

**Indications.** — Cette association sera utilisée dans les défaillances cardiaques des maladies infectieuses, typhoïde, pneumonie et notamment diphtérie.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE STROPHANTIQUE

Théophylline-éthylène-diamine.....	0,05	} par comprimé
Intrait de Strophantus.....	0,00025	
Sulfate de Spartéine.....	0,01	

**Propriétés.** — Le strophantus et la strophantine, tonocardiaques puissants, augmentent brusquement la contractilité du myocarde, mais sans que cet effort demandé au muscle cardiaque soit « compensé » de façon immédiate par un apport plus important de sang nourricier coronaire.

En associant l'Inophylline au Strophantus, on potentialise l'activité tonocardiaque de cette substance.

L'Inophylline Strophantique est une *médication strophantique compensée*.

L'intrait de Strophantus Dausse a été choisi en raison de sa stabilité, de son activité pharmacodynamique égale à celle de l'Ouabaine et pour sa toxicité trois fois moindre. En outre, l'Inophylline Strophantique est active par la bouche, alors que l'Ouabaine (sauf à très fortes doses) est détruite dans l'estomac.

**Indications.** — Insuffisance ventriculaire gauche, asystolie (entre les cures de Digitaline et d'Ouabaine), l'hyposystolie, les cardiopathies valvulaires, le cœur des vieillards, les arythmies, les œdèmes, les oppressions des cardiaques.

**Posologie.** — 2 à 6 comp. par jour à prendre à la fin des repas.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 29-54.)

## INOPHYLINE TRINITRINÉE

Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine.....	0,05
Trinitrine (1 goutte).....	0,015

**Propriétés.** — L'action vaso-dilatatrice coronaire extrêmement rapide, mais fugace, de la trinitrine est activée et prolongée par l'action vaso-dilatatrice, plus lente mais plus durable, de l'Inophylline.

**Indications.** — Traitement d'urgence et, dans certains cas, d'entretien de l'angine de poitrine et des spasmes artériels.

**Posologie.** — En cas d'urgence, on fera croquer 1 à 3 dragées, à quelques minutes d'intervalle, à titre préventif ou au moment de l'accès.

Comme médication d'entretien, on laissera fondre la dragée dans la bouche pour absorber la trinitrine contenue dans l'enrobage et, lorsque apparaîtra une sensation d'amertume, on avalera sans croquer le petit noyau dur restant. On fera prendre ainsi 2 à 4 dragées par jour.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 29-54.)

## INORÉNOLO

Extrait désalbuminé et délipodé de rein.

**Indications.** — Albuminurie, Urémie, Uricémie, Arthritisme, Néphrites aiguës ou chroniques, Rhumatismes.

**Résultats.** — Augmentation de la diurèse et de l'élimination des chlorures, de l'acide urique et de l'urée ; abaissement de la concentration de l'albumine urinaire.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules buvables ou injectables par jour, ou 2 à 6 dragées à jeun ou loin des repas, pendant des cures de 12 jours, alternées avec des périodes de repos de 10 jours.

### Présentation

La boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. : 39 fr. 10.

La boîte de 10 ampoules injectables de 2 cc. : 34 fr. 20.

L'étui de 40 dragées : 21 fr. 20.

### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## INORHINYL

### Pommade. Vaccin.

**Composition.** — Antivirustherapie des affections rhino-pharyngées. Bouillon antivirux de cultures de streptocoques, staphylocoques, microcoques, "eumo-coques, etc., incorporé à un excipient dans une pommade d'application aisée, ou présenté en ampoules pour instillations nasales.

**Indications.** — Coryza aigu ou chronique, toutes les affections rhino-pharyngées, prévention de la grippe.

**Emploi.** — 2 à 3 fois par jour, particulièrement matin et soir, introduire dans le nez un peu de pommade ou instiller le contenu d'une ampoule.

**Présentation.** — Le tube de pommade : 8 fr. 30.

La boîte de 6 ampoules de 3 cc. : 20 fr. 50.

### INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE DE GARCHES, INSÉVA

151, 153, 155, rue de Buzenval — GARCHES (S.-et-O.).

#### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOSEPTA

Pommade à base de bouillon-vaccin, de streptocoques, staphylocoques, pb. pyocyaniques.

Pyodermites, Furoncles, Acné, Impétigo, toutes lésions cutanées infectées.

**Prix :** Le tube : 19 fr. 60. Le 1/2 tube : 11 francs.

### INOSEPTA AURICULAIRE

Traitement des furunculoses du conduit auditif, otites, mastoidites, etc.,

**Prix :** La boîte de 10 amp. de 2 cc. : 24 fr. 40.

### INOSEPTA OPHTHALMIQUE

Pommade contre les blépharites, conjonctivites, orgelets, dacryocystites, toutes affections oculaires.

**Prix :** Le tube : 13 fr. 50.

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

#### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — Paris (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOSPLÉNOL

Extrait de rate désalbuminé et delipoidé.

Forme injectable. Forme buvable.

**Indications.** — L'extrait de rate est le traitement spécifique des dermatoses rebelles, eczémas de Quincke, dermatoses prurigineuses, eczémas chroniques, prurigo, urticaire, prurits anaux, vulvaires, prurits diabétiques, prurits séniles, herpès, lichen plan.

**Traitement.** — En injections intramusculaires profondes : le premier jour 2 cc. pour éprouver la sensibilité du malade, les jours suivants 4 et même 6 cc. en une ou plusieurs fois.

Le traitement comporte une série de 15 à 20 injections. On peut le compléter ou le poursuivre pendant quelque temps après la guérison par l'absorption d'Inosplénol buvable : 1 à 2 ampoules par jour pendant la période du traitement hypodermique, 2 à 4 ampoules par jour par période de 6 jours, alternant avec un repos de 6 jours pour les cures d'entretien.

### Présentation :

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. injectables. 34 fr. 20

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. buvables... 39 fr. 10

#### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOTYOL

Pommade adoucissante, réductrice et cicatrisante.

Traitement de toutes les affections cutanées ou irritations de la peau : eczémas, ulcères, prurits, érythèmes, rougeurs des nouveau-nés.

### POUDRE INOTYOL

Toilette des bébés, prévention des rougeurs, en poudrage sur la pommade pour en augmenter l'adhérence.

### Présentation :

Pommade INOTYOL : le 1/2 tube, 8 fr. 30.  
le tube, 14 fr. 10.

Poudre INOTYOL. La boîte poudreuse : 8 fr. 30.

#### Laboratoires du Dr DEBAT

60, rue Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOXÉMOL

**Pommade réductrice** pour le traitement des dermatoses rebelles.

**Composition.** — Gynocardate d'Éthyle, Glycérides de Gynocardacées, Soufre et Goudron combinés, Huile végétale, Camphre.

**Action.** — L'Inoxémol est doué d'une très grande activité réductrice et kératoplastique.

**Indications.** — Eczéma lichénifié, eczéma chronique rebelle, eczéma psoriasiforme, eczéma séborrhéique, parakératose psoriasiforme, prurigo, lichen, psoriasis. L'Inoxémol ne doit pas être employé sur des dermatoses inflammées.

**Mode d'emploi.** — Étaler sur les lésions, sans frotter, puis recouvrir d'un pansement léger; renouveler le traitement matin et soir. Nettoyer au préalable les lésions à la vaseline.

**Présentation :** le tube, 19 fr. 20.

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## INOXYL

**Composition.** — Pâte dentifrice antipyorrhéique, à base de cultures de streptocoques, staphylocoques, pseudo-diphthériques, proteus, entérocoques, diplococcus pharyngis flavus, micrococcus, provenant d'infections buccales.

**Indications.** — Traitement des gingivites, stomatites, pyorrhées, caries, etc.

**Mode d'emploi.** — En friction énergique avec une brosse à dents, deux fois par jour ou plus.

**Présentation.** — Le tube : 8 fr. 30.

**INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES, INSÉVA**

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73 4 lignes groupées.)

## INSÉVACCINS

**Antityphoïdique T. A. B. Préventif.**

Vaccination par voie buccale contre les fièvres typhoïdes et para-typhoïdes.

**Mode d'emploi.** — Prendre une ampoule par jour, pendant 3 jours consécutifs, à jeun, le matin, 1/4 d'heure après avoir absorbé une plûle de bile.

**Présentation.** — La boîte de 3 ampoules buvables de 10 cc., *adultes* : 26 fr. 90.

La boîte de 3 ampoules buvables de 5 cc., *enfants* : 15 fr. 80.

**Insévaccin intestinal nourrisson.**

Traitement des gastro-entérites, diarrhées, par vaccination buccale.

**Présentation.** — La boîte de 12 ampoules de 1 cc. : 22 fr.

**INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES, INSÉVA**

151, 153, 155, rue de Buzenval — GARCHES (S.-et-O.).

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)



# INSTITUT PASTEUR

## SÉRUMS

1	Antidiphthérique	3 000 unités.....	10 cc.
2	—	5 000 — .....	10 cc.
3	—	10 000 — .....	10 cc.
Antidiphthérique purifié :			
4	—	(Dose préventive). 1 000 unités	
5	—	(Pour traitement). 5 000 unités	
6	Antitétanique	3 000 unités .....	10 cc.
7	—	20 000 — .... (pour traitement)	
Antitétanique purifié :			
8	—	(Dose préventive). 3 000 unités	
9	—	(Pour traitement). 10 000 unités	
10	Solution d'Antitoxine Tétanique..	3 500 unités	
11	Antistreptococcique.....	10 cc.	
12	Antiméningococcique.....	10 cc.	
13	Antidysentérique.....	10 cc.	
14	Anticollibacillaire.....	10 cc.	
15	Antivenimeux.....	10 cc.	
16	Antivenimeux en flacon auto-injecteur...	10 cc.	
17	Anticharbonneux.....	10 cc.	
18	Antipoliomyélite .....	10 cc.	
19	Antipesteux.....	20 cc.	
20	Antipneumococcique .....	20 cc.	
21	Antigangreneux, Monovalent	Antiperfringens.....	20 cc.
22		Antisporogènes.....	20 cc.
23		Antioedématisiens .....	10 cc.
24		Antivibrion-septique .....	10 cc.
25		Antihistolytique .....	10 cc.
26	Antigangreneux Polyvalent.....	20 cc.	
27	Antipéritonite.....	10 cc.	

## VACCINS

28	Antidiphthérique (Anatoxine)...	boîte 3 ampoules
29	—	bte 1 amp. (inj. d r a pel)
30	—	..... amp. 10 cc.
31	Antitétanique : (Anatoxine)...	boîte 3 ampoules
32	—	boîte 1 amp. (inj. de rappel).
33	—	..... amp. 10 cc.
34	Antistaphylococcique (Anatoxine)...	boîte 5 amp.
35	—	bte 2 amp. (suite du trait)
Antidiphthérique-Antityphoïdique :		
36	—	boîte 4 ampoules (enfants)
37	—	boîte 3 ampoules (adultes)
38	—	boîte 1 amp. (inj. de rappel)
39	—	..... ampoule 10 cc.
Antitétanique-Antityphoïdique :		
40	—	boîte 4 ampoules (enfants)
41	—	boîte 3 ampoules (adultes)
42	—	boîte 1 amp. (inj. de rappel)
43	—	..... ampoule 10 cc.
44	Antidiphthérique-Antitétanique:	boîte 3 ampoules
45	—	boîte 1 amp. (inj. de rappel)
46	—	..... ampoule 10 cc.
Anti-Diphthérique-Tétanique- Typhoparatyphoïdique :		
47	—	boîte 4 ampoules (enfants)
48	—	boîte 3 ampoules (adultes)
49	—	boîte 1 amp. (inj. de rappel)
50	—	..... ampoule 10 cc.
51	Antistaphylococcique: (Furunculose).	boîte 6 amp.
52	—	(Ostéomyélite). boîte 6 amp.
53	Antigonococcique .....	boîte 6 ampoules
54	Tétra-vaccin Antipyrogène.....	boîte 6 ampoules
55	Antipneumococcique.....	boîte 6 ampoules
56	Anticholérique .....	boîte 2 ampoules
57	Antityphoparatyphoïdique: (T.A.B.).	boîte 3 amp.
58	Antipesteux .....	amp. 10 cc.
59	Extrait d'antigène tuberculeux: Dilué.	bte 10 amp.
60	—	Pur.. bte 10 amp.
61	Tuberculine brute.....	flacon 1 cc.
62	—	..... flacon 5 cc.
63	Tuberculine au 1/100.....	amp. 1 cc.

Institut PASTEUR

36, rue du Docteur-Roux — PARIS.

(Adr. télég.: Serpasteur Paris. Tél.: Ségur 07-95.)

## INSULANOL

**Composition.** — Pommade à l'Insuline.

**Propriétés.** — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

**Indications.** — Ulcères variqueux, Prurits de toute nature, Hémorroïdes, Plaies fistuleuses, Brûlures, Plaies atones.

**Présentation.** — Tube de 30 gr. environ.

**Posologie.** — En onctions épaisses sur les parties malades. Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Prix au public : Le tube : 21 fr. 30.

**Les Laboratoires du Dr ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxystases.

S. A. au capital de 1 000 000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 68-22.)

## INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Voir **POUDRE ET POMMADE  
D'INSULINE PHYLOZE**

**Laboratoire  
de l'Endopancrine**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 07-70.)

## INSULINE

Licence Bayer.

**Composition.** — Extrait des flots de Langerhans, préparé à partir du pancréas de bœuf.

**Propriétés et indications.** — Hormone hypoglycémisante agissant sur le métabolisme des glucides, des lipides, des protides et de l'eau. Possède des propriétés trophiques.

Diabète sucré et complications diabétiques (coma, gangrène, furonculose), Acidose, Cures d'engraissement, Cardiopathies, Ménorragies d'origine ovarienne, Vomissements incoercibles de la grossesse, Schizophrénie, certains Ulcères cutanés.

**Posologie.** — De 5 à 40 et même 80 unités par jour, avant les repas, par voie sous-cutanée ou intraveineuse.

**Présentation.** — Flacons de 5 cc. dosés à 20, 40 ou 60 unités par cc.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## INSULINE BUCCALE FORNET

(Pilules d'Insuline.)

Pour éviter toute confusion avec les solutés injectables d'Insuline, l'Insuline Buccale Fornet s'appellera désormais :

## PANSULINE

Voir ce mot.

## INSULINE CHOAY

**Insuline cristallisée standard.**

**Nature.** — Hormone hypoglycémisante extraite des îlots endocriniens du pancréas.

**Indications.** — Diabète grave avec dénutrition. Complications du diabète, même léger. Acidose diabétique ou non diabétique. Cures d'engraissement.

**Mode d'emploi.** — Injections sous-cutanées, parfois intraveineuses (coma diabétique).

**Posologie.** — Très variable suivant l'indication. Cas d'un diabète moyen: 20 à 40 unités par jour, en deux fois, avant les principaux repas.

### Formes pharmaceutiques :

**Ampoules** de 1 cc. = 10 unités internationales.

1 cc. = 20 unités internationales.

**Flacons** de 5 cc. = 100 unités internationales  
(20 u. i. par cc.).

5 cc. = 200 unités internationales  
(40 u. i. par cc.).

## INSULINE - ZINC - PROTAMINE CHOAY

**Insuline à action prolongée.**

**Nature.** — Complexe unissant l'insuline cristallisée au Zinc et à la Protamine, présenté en suspension colloïdale amenée au pH des tissus.

**Indication.** — Diabète.

**Mode d'emploi.** — Après agitation du flacon, pour rendre homogène la suspension, injection sous-cutanée profonde, six heures environ avant le repas le plus chargé en féculents.

**Posologie.** — Après tâtonnement, la dose s'établit environ aux 2/3 de la dose d'insuline ordinaire.

Le caractère plus durable et plus étalé de l'action permet généralement de réduire le nombre des injections.

### Forme pharmaceutique :

**Flacon** de 5 cc. = 200 unités internationales.  
(40 u. i. par cc.).

### Laboratoire CHOAY

43, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

## INSULINE « LEO »

Décret n° 65 du 8 juillet 1931.

**Indications.** — Diabète, cures d'engraissement et toutes autres applications de l'Insuline.

Les circonstances économiques actuelles et la raréfaction de plus en plus sévère des matières premières ne permettent plus d'assurer une fabrication et une vente régulières de ce produit.

**Valentin Aage MOLLER**

57, rue Pierre-Duham — BORDEAUX  
(Tél. : 807-85.)

Dépositaire pour la France et Colonies :  
Jean DEDIEU, Pharmacien,  
39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

## INSULINE « NOVO »

Décret d'autorisation n° 75 du 4 août 1933.

**Indications.** — Diabète, Cures d'engraissement.

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. contenant 100 U. I. (soit 20 U. I. pour 1 cc.). Prix : 21 fr. 95.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-50.

Ampoules de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 41 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-51.

Ampoules de 5 cc. contenant 400 U. I. (soit 80 U. I. pour 1 cc.). Prix : 80 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-52.

**Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :**  
5 flacons de 10 cc., chacun de 200 U. I.

Prix : 186 fr. 75.

5 flacons de 10 cc., chacun de 400 U. I.

Prix : 345 fr. 65.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses. L'Insuline NOVO est recommandée pour sa grande pureté et son action constante. Elle ne provoque ni irritations, ni intoxications ; elle est de plus d'une conservation parfaite, sans adjonction d'aucun antiseptique.

## INSULINE-ZINC-PROTAMINE-NOVO

Décret d'autorisation n° 98 du 4 juillet 1938.

Complexe insoluble dont la dissociation lente dans l'organisme retarde l'action hypoglycémiant de l'insuline libérée.

**Forme.** — Flacons de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.).

Prix : 46 fr. 80.

Flacons de 10 cc. contenant 400 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 87 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-48.

**Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :**  
5 flacons de 10 cc., chacun 400 U. I.

Prix : 389 fr. 80.

**Laboratoires du Docteur H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 39-44)

## INSULYL

**Composition.** — Solution d'insuline pure.

**Indications.** — a. Diabète et ses complications ;

b. Cure d'engraissement ;

c. Toutes indications extra-diabétiques de l'insuline.

### Présentation :

Tube de 5 cc. à 20 unités par cc.

Tube de 5 cc. à 40 unités par cc.

Prix au public :

Tube à 20 U. par cc. .... 25 fr. 30

Tube à 40 U. par cc. .... 45 fr. 10

(Voir : Insulyl-Retard.)

(Consulter la brochure *Comment utiliser l'Insuline* éditée par le « Département Scientifique » des Laboratoires Roussel.)

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxystases.

S. A. au capital de 1 000 000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. Littré 68-22.)

## INSULYL-RETARD

**Composition.** — Insuline, Protamine, Zinc.

**Propriétés.** — Action hypoglycémiant retardée, continue et prolongée.

**Indications.** — Chaque fois que l'état du diabétique réclame plusieurs injections d'insuline par jour, ou lorsque la glycémie reste élevée, malgré un traitement correct. Diabète infantile, Diabète avec hyperthyroïdie, Diabète compliqué de tuberculose.

**Présentation.** — Tube de 200 unités, dosées à 40 unités par cc.

Prix au public : 47 fr. 30.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxystases.

S. A. au capital de 1 000 000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. Littré 68-22.)

## INTESTARSOL

Granulés.

Réalise le complexe à la fois cicatrisant et parasiticide de la muqueuse intestinale.

### Composition :

Acide Oxyacétylaminophényl arsinique.....	0,50
Charbon animal spécial .....	10
Charbon de peuplier .....	10
Magnésie anglaise.....	5
Excipient aromatisé. Q. S. P. 100 gr.	

**Indications.** — **Diarrhées**, colites et entérocolites, gastro-entérites, entérites tuberculeuses, fermentations, flatulences, toutes intoxications, et colibacillooses, **parasitoses** (**oxyurase**, ascarides).

### Posologie :

**Adultes** : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour en 2 à 3 cures de 5 jours séparées par des intervalles égaux de repos.

**Enfants** : demi-doses.

**Nourrissons** : 1 à 2 demi cuillerées à café par jour à délayer dans un petit peu d'eau sucrée.

### Traitement spécial de l'Oxyurase :

**Par voie buccale** : 1 cuillerée à dessert, à croquer le matin.

*En alternance avec l'emploi.*

**Par voie rectale** : 1 cuillerée à dessert, dans 3 cuillerées à soupe d'eau tiède, en lavement à garder, le soir.

**Présentation et prix.** — 19 fr. 80 (taxe comprise) la boîte de 100 grammes de granulé fondant.

**Laboratoires H. CALAS**

162, rue de l'Hay — GENTILLY (Seine).

(Tél. : Alésia 19-02.)

## INTESTO

(Granulés)

**Présentation.** — En tube métal (19 fr. 50).

**Principes actifs.** — Charbon végétal pulvérisé, Kaolin, Sous-nitrate de bismuth, Bicarbonate de soude.

**Indications.** — Entérites, Colites, Stases intestinales et tous états toxi-infectieux d'origine intestinale, Diarrhées des adultes et des nourrissons, Fermentations intestinales, Météorisme ou ballonnement et gaz.

### Mode d'emploi :

**Adultes** : 1 à 2 cuillerées à potage une demi-heure avant les repas ou le matin à jeun.

**Enfants** : 1 à 2 cuillerées à café.

Peut être croqué ou délayé dans l'eau.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-30.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## INTRAITS DAUSSE

### INTRAIT DE MARRON D'INDE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des Hémorroïdes, Varices, Phlébites.

**Forme.** — *Solution d'Intrait de Marron d'Inde à 5 %.*  
*Comprimés d'Intrait de Marron d'Inde à 2ctg.*

**Mode d'emploi.** — *Usage interne :*

- a. Solution d'intrait de Marron d'Inde : V à X gouttes, matin et soir.
- b. Comprimés d'intrait de Marron d'Inde : 1 à 2 comprimés deux fois par jour.

**Usage externe :** crayons antihémorroïdaux Dausse (intrait de Marron d'Inde et Stricteforme). Placer chaque soir ou au besoin matin et soir un crayon. Cette médication locale s'associant très bien à l'usage interne de la solution.

### INTRAIT DE VALÉRIANE

**Antispasmodique sédatif du système nerveux.**  
Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

**Forme.** — *Solution d'Intrait de Valériane à 2 %.*  
*Comprimés d'Intrait de Valériane à 0 gr. 05 par comprimé.*

**Indications.** — *Insomnie d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.*

*Nervosisme, irritabilité nerveuse, affections spasmodiques, dermatoses prurigineuses, chorée, tics, convulsions infantiles.*

**Posologie.** — *Solution d'Intrait de Valériane à 2 %.* Une cuillerée à café = 0 gr. 10 d'intrait.  
Dose moyenne : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; doubler la dose si nécessaire.

*Comprimés d'intrait de Valériane à 0 gr. 05 par comprimé, 3 à 6 par jour.*

### INTRAIT DE DIGITALE

Préparation de Digitale conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot et Goris*). Tonicardiaque à zone maniable très étendue.

**Forme.** — *Solution d'intrait de Digitale à prendre par gouttes :* correspondant comme posologie à la solution officinale de Digitaline à 1 p. 1 000 dosée par voie physiologique.

**Posologie.** — Dose d'entretien cardio-tonique : V à VII gouttes par jour en moyenne pendant une quinzaine.

Dose sédatif : XV à XX gouttes par jour, pendant 3 ou 4 jours, avec intervalle de 10 à 12 jours.

Dose antiasystolique : L à LV gouttes, en trois prises, pendant une journée seulement.

### INTRAIT DE PASSIFLORE COMPOSÉ

Préparation d'intrait de Passiflore associé à l'intrait de Valériane, à l'Aubépine et au Gelsemium Dausse titré physiologiquement.

**Propriétés.** — Calmant de l'excitation cérébrale. Antis-asmotique, Modérateur de l'éréthisme cardiaque, Sédatif nerveux.

**Indications.** — Affections spasmodiques ; palpitations cardiaques réflexes ; états anxieux ; insomnie d'origine nerveuse.

**Posologie et mode d'emploi.** — Régulateur du système nerveux ; 1 à 2 cuillerées à café avant chacun des deux principaux repas.

Calmant des insomnies nerveuses :

*Enfants :* 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

*Adultes :* 1 à 2 cuillerées à dessert.

### INTRAIT DE SAUGE

Ne se délivre qu'en solution.

Excellent tonique gastrique (Pron) et anhydrotique puissant très efficace pour lutter contre les sueurs nocturnes du phthisique.

**Mode d'emploi.** — Comme tonique des voies digestives : 1 cuillerée à café après chacun des deux principaux repas. Comme anhydrotique : 1 ou 2 cuillerées à café le soir au coucher pendant 2 ou 3 jours, cesser ensuite pour éviter l'accoutumance.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 64-40.)

## INTRA-REIPAR

**Composition.** — Solution d'acide salicyllique injectable par voie intraveineuse.

**Indications.** — Toutes les indications de la médication salicylée : Rhumatisme articulaire aigu, particulièrement les formes graves ou à localisations viscérales, Névralgies et leurs séquelles, Sclérose en plaques, Parkinsonisme.

**Avantages.** — Action rapide et sûre. Aucune réaction soit locale, soit générale. Aucun des inconvénients du salicylate de soude par voie buccale (troubles gastriques, acidose) ou par voie intraveineuse (sclérose, etc...).

**Aucune contre-indication.**

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 25 fr. 80.

Prix spéciaux pour propharmaciens, cabinets médicaux, Hôpitaux et Cliniques. Échantillons sur demande.

**LES LABORATOIRES DRAPIER**  
RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

## IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 cgr. d'iode par cc. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes, sans iodisme.

**Arthritisme.** — **Goutte.** — **Rhumatisme.**  
— **Artério-sclérose.** — **Maladies du cœur et des vaisseaux.** — **Affections glandulaires.**  
— **Rachitisme.** — **Goitre.** — **Fibrome.** — **Syphilis.** — **Obésité.**

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 21 fr.

Enregistré au L. N. C. M. N° 33-1.

**Laboratoire GALBRUN**

10 et 12, rue Guynemer — ST-MANDÉ (Seine).  
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

## IODAMÉLIS LOGEAI

### GOUTTES

**Formule.** — Préparation basée sur la combinaison d'iodo-iodure de potassium et d'hamaméline donnant naissance à un iodotannin complexe, dont le doublement lent et progressif permet l'utilisation totale de l'iode ingéré.

### Propriétés :

*Stimulant de la circulation artérielle et veineuse.*

*Sclérolisant efficace, vasodilatateur et hypotenseur, eupnéique.*

*Stimulant des glandes endocrines, du tissu lymphoïde et du métabolisme basal.*

### Indications :

*Maladies de la circulation artério-veineuse : artério-sclérose, hypertension, pléthore des hypervisqueux, cyanose, jambes en poteau, varices, hémorroïdes, etc.*

*Maladies de la nutrition : lymphatisme, scrofule, adénopathies, obésité, maladie de Basedow, rhumatisme chronique, goutte chronique, asthme, emphyseme, bronchite chronique, etc...*

*Maladies gynécologiques : troubles de la puberté et de la ménopause, métrites chroniques, etc...*

**Posologie.** — L gouttes d'Iodamélis contiennent : 0,03 d'iode, 0,20 d'iodure de potassium et 0,20 d'hamaméline.

**Doses :** De XX à L gouttes par jour aux deux principaux repas, dans un peu d'eau (Vichy de préférence).

*Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.*

## IODAMÉLIS COMPRIMÉS

Comprimés glutinisés et enrobés contenant chacun 0 gr. 10 d'iodotannin de l'Iodamélis, sous forme d'un *extrait sec, neutre et sans iode libre*, reproduisant exactement la composition de l'Iodamélis : gouttes. Six comprimés équivalent à L gouttes d'Iodamélis.

**Doses.** — De 2 à 6 comprimés par jour.

(Voir Opo-Iodamélis.)

**Laboratoires JACQUES LOGEAI**

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

## IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-1.

**Formule.** — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

**Indications.** — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme Rachitisme, Scrofule, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

**Posologie.** — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour.

— 2 ans à 8 ans	IV à XX	—
— 8 ans à 15 ans	IV à XXX	—
Adultes	X à XL	—

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes 35 gr. — Prix : 20 francs.

Echantillons et Littérature :

Laboratoire JUIN-GUIRAUD

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Carnot 94-28.)

## IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode sans dommage pour l'estomac.

**Formule.** — Iode 3 — INa, IK, BrNa, chimiquement purs, à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

**Champ d'action.** — 1<sup>o</sup> Affections cardio-vasculaires, aortites, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.

2<sup>o</sup> Goitre exophtalmique, maladies de la ménopause.

3<sup>o</sup> Lymphatisme, adénopathies, scrofule, obésité, etc.

4<sup>o</sup> Bronchites chroniques, asthme, emphysème.

5<sup>o</sup> Maladies spécifiques, héréditaires, infections, mycoses.

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre-indication : l'œdème du poulmon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la goutte, de l'obésité, du rhumatisme chronique. Dans le lymphatisme, les affections chroniques des voies respiratoires, syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est antiscclérosante, antiseptique et résolutive.

**Dose.** — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge, de 5 en 5 jours.

Prix : 24 fr. 50 le flacon.

Laboratoires TACHOT et VIGAN

108, rue St-Lazare — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Tré. 04-49.)

## IODASEPTINE CORTIAL

**Composition.** — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 p. 100 d'Iode : soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dérivées de la nature de ses composants : iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzolés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie). Adénopathies, Paludisme, Spirillose, Puissant tonique du cœur.

**Prép. pharm. Posologie.** — Ampoules : A. 2 cc., B. 5 cc., C., 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire. Indolore.

**Rhumatismes chroniques (doses fortes) :** 5 à 20 et même 25 cc. pro die.

**Tuberculose (doses faibles) :** 2 à 5 cc.

**Gouttes :** XXX à C par jour (enfants : XX à L).

**Prix :** Ampoules A, 2 cc. : 24 fr. 60. — Ampoules B, 5 cc. : 33 fr. 40. — Ampoules C, 10 cc. : 49 fr. 25. — Gouttes, le flacon, 22 fr. 30.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

## IODASEPTINE SALICYLÉE

Dans les rhumatismes aigus et subaigus, dans les formes évolutives du rhumatisme chronique, l'Iodaseptine salicylée joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Supplée le traitement salicylé à haute dose, souvent mal supporté, et qui ne peut être continué longtemps.

**Présentation :**

Ampoules de 5 et de 10 cc contenant :

Ampoules de 5 cc.	Iodaseptine .....	5 cc.
	Salicylate de soude pur .....	0 gr. 50
Ampoules de 10 cc.	Iodaseptine .....	10 cc.
	Salicylate de soude pur .....	1 gramme.

**Solution à ingérer :** XXX gouttes correspondent à 0 gr. 30 de salicylate de soude.

**Doses.** — **Injections intraveineuses,** exceptionnellement intramusculaires profondes : 1 à 2 ampoules de 5 ou de 10 cc. par 24 heures (à injecter matin et soir).

**En ingestion :** L à C gouttes par 24 heures en deux fois au début du repas.

Ce traitement parfaitement toléré peut être prolongé longtemps.

**Prix :**

Ampoules de 5 cc. : la boîte de 10 ampoules : 35 fr. 20.  
Ampoules de 10 cc. : la boîte de 4 et 10 ampoules : 22 fr. 30 et 51 fr. 60.

**Solution à ingérer.** Le flacon de 60 cc. : 24 fr. 60.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique, — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70.)



## IODASSIUM

*Solution iodo-iodurée (Lugol stabilisé).*

1 p. 100 d'Iode — 2 p. 100 d'Iodure de Potassium.  
Préparé avec Iode et Iodure de K chimiquement purs;  
stabilisé en solution spéciale, l'*Iodassium* réduit au  
minimum les possibilités d'Iodisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitant du tissu  
lymphoïde. Régulateur thyroïdien. Antimycosique.  
Toutes affections ganglionnaires, adénopathies, lymphatisme,  
scrofule, etc. Goitre, insuffisance thyroïdienne,  
troubles circulatoires, obésité, Scléroses viscérales,  
artério-sclérose, Lichen.

L'*Iodassium* peut être associé au Staprolysat pour le  
traitement vaccino-iodé des affections neurotropes,  
avec troubles trophiques ou paralytiques dominant.

### Posologie :

**Adultes :** 1 à 6 cuillerées à café par jour.

**Enfants :** X à L gouttes 2 fois par jour.

1 cuillerée à café = LXX gouttes = 0,05 Iode; 0,10 KI.  
(Mélanger à l'eau, au vin, au lait et absorber au début  
des repas.)

**Prix :** 18 francs.

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne, PARIS (V<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## IODAUBÉPINE

Établi sur des bases scientifiques contrôlées par une  
longue expérimentation clinique, l'*Iodaubépine* constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats  
les plus heureux dans les maladies dues à l'altération  
des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Cratægus et de  
l'Iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues  
ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices,  
l'*Iodaubépine* en même temps qu'il active les échanges  
de notre économie, en facilite l'élimination des toxines.  
Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies  
du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose,  
l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la  
Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les  
diverses affections glandulaires.

**Doses (sauf avis spécial du Médecin).**

**Adultes :** XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu  
d'eau sucrée ou non.

**Enfants :** V à X gouttes 3 fois par jour.

(Durée du traitement de l'unité : 15 à 18 jours.)

Dépôt principal :

**Laboratoires ADLER**

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Tur. 90-59.

Détail dans toutes les pharmacies.

## IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine).

**Propriétés.** — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toux, Emphysème, Asthme.

**Formes pharmaceutiques :**

**Sirop.** — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à  
soupe. 22 fr. 90.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

**Gouttes.** — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine  
crist. 22 fr. 90.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un  
peu d'eau sucrée.

**Pilules.** — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 18 fr. 20.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

**Ampoules** (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour 22 fr. 90.

**Laboratoire MONTAGU**

10, rue de La Barouillère — PARIS (6<sup>e</sup>)

(Tél. : Suf. 36-59.)

## IODÉMOGLOBINE LEDOUX

Opothérapie hématique et Acidamino-thérapie.

**Composition.** — Chaque cachet ou ampoule contient la dose d'une cuillerée à soupe de sirop d'**Hémoglobine**, provenant de bovidés sélectionnés, et suractivée par :

- De l'**iode** en combinaison organique (iodalbuminate sanguin) ;
- Du sérum **hémopoïétique** et du l'oxyhémoglobine naissante ;
- Une forte proportion en **acides aminés** (et surtout d'histidine).

**Acidamino-thérapie.** — Les acides aminés, comme les Vitamines, agissent à doses infinitésimales. En particulier, ils président à la formation de globules sanguins et modifient leur richesse en fer organique (*taux de l'hémoglobine*). Ils résultent de l'hydrolyse totale des matières protéiques en mono-peptides. Nos Laboratoires extraient l'histidine à partir d'un peptonate de globine, c'est-à-dire de son milieu naturel.

**Action thérapeutique d'IODÉMOGLOBINE.** — Elle s'exerce :

- *Sur la nutrition*: accroissement du taux des échanges, aptitude de l'organisme à fixer les éléments minéraux et le phosphore. Augmentation de poids.
- *Sur les organes lymphoïdes*. IODÉMOGLOBINE stimule les réactions de défense de l'organisme contre l'infection et son processus de désintoxication.
- *Sur le sang*: leucopoïèse et phagocytose. Élévation du taux de l'hémoglobine. Formation de leucocytes toxicophages.

**Applications.** — IODÉMOGLOBINE, médicament de choix, permet à l'enfant comme à l'adulte de réagir : contre toute carence alimentaire, contre toute infection et relève l'état général.

D'où ses nombreuses applications dans les cas suivants :

*Anémie, Déficiences, Lymphatisme, Troubles de croissance, Alimentation défectueuse (régime sévère, apport alimentaire insuffisant).*

**Posologie.** — *Cachets* : 2 ou 3 par jour.

*Ampoules buvables* : 1 ou 2 par jour.

*Granulés* : 2 ou 3 cuillers (suivant l'âge).

**Laboratoires Yves LEDOUX**

Docteur en Pharmacie, — LE HAVRE.

*Iodémoglobine, Bactérase, Uro-Mais.*

## IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

### Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Principales indications: adénopathies, oreillons, goîtres, impétigos, trichophyties, furoncles, traumatismes.

### Iodex au Salicylate de Méthyle

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes, lumbagos, pleurites, points de côté, névrites, entorses.

### Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

**Laboratoires RISSA**

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

## IODHÉMA

### SOLUTION

#### Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

### IODIFORMINE

**Composition.** — Solution titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène-tétramine (42 p. 100 d'iode).

**Indications.** — Antiseptique général des infections chroniques et parasitaires. Toutes les indications de l'iode. Rhumatismes. Sciatiques. Adénopathies. Troubles circulatoires.

#### Préparations pharmaceutiques :

Ampoules de 5 cc. (Boîte de 10 amp.).  
Ampoules de 10 cc. (Boîte de 10 amp.).  
Gouttes.

#### Posologie :

**Ampoules :** Par voie intramusculaire ou intraveineuse, 1 injection tous les jours ou tous les 2 jours.  
**Gouttes :** De L à C gouttes par jour en 2 fois.

#### Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

Trois formes :

**Iodinjectol simple :** amp. 3 cc. d'iodure de forme benzosodique (20 cgr.).

**Iodinjectol salicylé :** amp. 3 cc. (Iodinjectol + 20 cgr. de salicylate de soude). Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous rhumatismes. Sciatiques. 1 à 2 injections intramusc. ou intrav. par jour.

**Iodinjectol « gouttes » :** LX à C gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 30 fr. 50. Gouttes : 21 fr. 90.

N<sup>o</sup> d'enreg. 603-2 (Iodinjectol) ;

N<sup>o</sup> d'enreg. 603-3 (Iodinjectol salicylé).

#### Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 51-85.)

### ODOCAÏNE

Traitement des douleurs de toutes natures par les injections anesthésiantes locales.

**Composition.** — Chlorhydrate d'éthocaïne (novocaïne), 0,05 cgr., Caféine, 0,05, Iodure de sodium, 0,10, Sérum physiologique, 10 cc.

**Indications.** — Rhumatisme chronique, névralgies, sciatique, lumbago, douleurs musculaires, cellulite, etc.

**Technique.** — Injecter tous les deux jours une ou deux ampoules au point maximum de la douleur repéré par la palpation.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

#### VINCENT, Pharmacien

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

## IODOCALCIUM

La forme moderne du Sirop Iodotannique.

2 formes : Sirop, Gouttes.

**Composition.** — Une cuill. à café d'Iodocalcium Sirop ou XX gouttes Iodocalcium Gouttes renferment :

Gluconate de calcium..... 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Iode en combinaison organique .... 0 gr. 01

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du calcium.

Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré-tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

### Posologie :

**Enfants** au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café de sirop ou X à XX gouttes de la forme gouttes, 2 fois par jour.

**Adultes** : 1 à 2 cuillerées à dessert de sirop ou XX à XL gouttes 2 fois par jour, au début des deux principaux repas.

**Mode d'emploi.** — Les gouttes doivent être prises dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

A. DÉTROIS, Pharmacien

19, avenue d'Orléans — Paris (XIV<sup>e</sup>).

## IODOCITRANE

Nouveau corps original

**IODE — ALBUMINE**

Associé au CITRATE DE SOUDE.

Tolérance parfaite du tube digestif.

Aucun accident d'iodisme.

Protection contre toute oxydation du produit depuis la préparation jusqu'à sa désintégration dans l'intestin.

**Indications thérapeutiques.** — *Hypertension artérielle*, Artériosclérose, *Hyperviscosité sanguine*, Troubles artériels et veineux, Varices, Hémorroïdes, Congestions de la *Ménopause*, Rhumatismes, Obésité. *Maladies de l'appareil respiratoire* : Sclérose pulmonaire, Emphysème, Etats congestifs.

**Formes.** — Pilules glutinisées ne se dissolvent que dans l'intestin. Chaque pilule correspond à VIII gouttes de teinture d'iode et contient 0 gr. 10 de citrate de soude.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 pilules à avaler au début des repas 2 à 3 fois par jour.

**Prix.** — La boîte de 80 pilules : 18 fr. 80 (traitement de 20 jours). La triple boîte de 240 pilules : 49 fr. 30.

Fabrication assurée.

Laboratoire des **PRODUITS SOIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, Pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## IODOCYANYL

### Composition :

Peptone iodée.....	60
Rhodanate de potassium.....	5
Chloral.....	5
Teint. aubépine.....	5
Teint. cimicifuga.....	5
Teint. ballotte.....	5
Extrait fluide olivier.....	5
Extrait fluide préle.....	5
Excipient.....	Q. S. p. 100 gr.

### Présentation. — Gouttes.

**Posologie.** — XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour, dans un peu d'eau, avant les repas.

**Indication.** — *Hypertension.*

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**  
20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

**Propriétés.** — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

**Indications.** — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

**Posologie.** — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

L. N. C. M. n° 43-5.

**Laboratoires PÉPIN ET LÉBOUCQ**  
COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 09-71.)

## IODOLIPINE

**Traitement de fond de l'hypertension artérielle.**

**Forme.** — Capsules d'huile iodée composée.

### Composition :

Iode pur combiné à l'huile.....	0,09
Diméthylxanthine.....	0,10
Extrait de gui.....	0,05
Extrait de bardane.....	0,05

Pour une capsule.

**Propriétés.** — Vaso-dilatateur, vaso-trophique et antiscléreux. Diurétique. Hypotenseur.

**Indications.** — Présclérose, Aortites, Artérites, Artériosclérose, Traitement préventif des scléroses viscérales : Myocardite chronique, Angine de poitrine, Sclérose rénale, Sclérose cérébrale.

**Posologie.** — 1 capsule 2 à 3 fois par jour au moment des repas, pendant 10 jours par mois.

Prix : 25 fr. 80 le tube.

**MONAL**

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Invalides 52-73.)

## IODO-MAGNÉSIMUM

Du Dr J.-P. CLARY.

**Composition.** — MgI<sup>2</sup> chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau.

**Indications.** — Toutes celles des composés iodurés halogénés et iodés organiques. Plus actif et mieux toléré. Toutes celles du magnésium, dont l'importance thérapeutique grandit tous les jours.

**Posologie.** — X à XXX gouttes, suivant avis du médecin, dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas, 10 jours consécutifs par mois.

Le flacon : 21 francs.

**Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY**

72, avenue Kléber — PARIS,

## IODOMAÏSINE

### Globules.

Combinaison directe de l'Iode et d'une Albumine d'origine strictement végétale.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goitres, asthme, emphyseme, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes et endocriniennes.

**Posologie.** — Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois avant les repas.

Prix : 19 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-3.

## IODOMAÏSINE

### Pommade.

Iodomaisine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

**Propriétés particulières.** — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

**Indications.** — Adénites, engorgements glandulaires, goitres, sporotrichoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

**Mode d'emploi.** — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

**L'Iodomaisine pommade** est présentée en tube. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Prix : 19 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

### Établissements SOUDAN

43, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>). (Tél. : Gobelins 06-89)  
Enregistré au Laboratoire National sous le n° 218-4.

## IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone tryptique.

**Gouttes** : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

**Comprimés** : 1 correspond à X gouttes d'Iodone.

**Doses et mode d'emploi.** — X à C gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson. Comprimés : 2 à 10 par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite. jamais d'iodisme.

**Indications.** — Maladies par ralentissement de la nutrition, artériosclérose, obésité, polysarcie, dégénérescence graisseuse, intoxications chroniques, asthme, emphyseme, rhumatisme, arthritisme, goutte, tertiarisme, pré-tuberculose.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoiodobenzoate de soude).

**Forme.** — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

**Indications.** — Hypertension, Artériosclérose, Rhumatisme chronique, Emphyseme, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

**Doses.** — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 17 fr. 50.

**Laboratoire MAUCHANT**  
à GENNEVILLIERS (Seine)  
(Tél. : Grésillons 05-21.)

## IODOPAN (GOUTTES)

**Composition.** — Nouvelle combinaison de l'iode avec une peptone spéciale.

L'iode n'est libéré que dans l'intestin, d'où impossibilité absolue de troubles gastriques et d'iodisme.

**Indications.** — Toutes les indications de l'iode et des iodures.

**Doses.** — XX gouttes agissent comme 1 gr. d'iodure alcalin.

**Enfants :** V à XV gouttes par 24 heures après les repas.

**Adultes :** XX à LX gouttes et plus après les repas.

Prix : 20 fr. 70 pour 1 mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Dépôt à Paris : 2, rue Jobbé-Duval (XV<sup>e</sup>).

**E. ROCHE, Pharmacien.**

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

## IODORGANINE MERCIER

Enregistrée au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous les numéros 1051-4-1 et 1052-4-2.

### IODORGANINE formule n° 1

**Traitement.** — 6 boîtes.

**Prix.** — La boîte pour 11 jours de traitement : 21 fr.

La boîte pour 66 jours de traitement : 103 fr.

### IODORGANINE formule n° 2.

**Traitement.** — 6 boîtes.

**Prix.** — La boîte pour 11 jours de traitement : 31 fr.

**Laboratoires MERCIER**

41, route de Turin — NICE.

## IDOSEPTOPLIX

**Composition.** — Association de paraminophénylsulfamide 1162 F et d'iode.

### Formule :

Septoplax .....	0 gr. 50
Iodoprotide .....	0 gr. 22

Pour 1 comprimé.

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés.

**Propriétés.** — Bactériostatique électif vis-à-vis des staphylocoques.

**Indications.** — Toutes les staphylococcies.

### Possologie :

**Chez l'adulte :** 4 à 16 comprimés par jour, suivant la gravité de l'affection.

**Chez l'enfant :** 1 à 12 comprimés par jour, suivant l'âge et la gravité de l'affection.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

### THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## IODOSTEM

### Résolutif énergique

Association de l'iode métalloïdique et du tanin aux éléments salins et hydro-carbonés du jus de raisin frais concentré.

### Composition :

Jus de raisin frais .....	49,50
Iode métalloïdique .....	0,10
Tanin .....	0,90
Sucre .....	45,00
Solution glycinée .....	4,50

pour 100 grammes.

**Avantages.** — Combinaison iodée de haute stabilité qui bénéficie à la fois des propriétés toni-musculaires du tanin, des propriétés diurétiques du jus de raisin et du pouvoir dissimulateur de ces deux éléments à l'égard de l'iode. Tolérance parfaite du tube digestif. Pas d'iodisme. Pas de constipation. Saveur agréable.

**Indications.** — Tous les cas de lymphatisme, Goitre, Affections glandulaires, Rachitisme, Scrofule, Bronchite aiguë et chronique. Écoulements d'oreilles, Végétations adénoides, Hypertrophie des amygdales, Asthme, Emphyseme.

**Doses.** — **Adultes :** 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

**Enfants** au-dessus de 10 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; au-dessous de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

(De préférence au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 537-2.

**G. BRIENS, Docteur en pharmacie**

20 et 22, rue de la République. — LYON (Rhône).

## IODOSULFÈNE

Iodosulfothérapie à haute dose.

**Composition :** 21,4 p. 100 d'Iode.  
22,4 p. 100 de Soufre.  
38,6 p. 100 de Strontium.

**Indications.** — *Rhumatismes*: Scléroses viscérales, articulaires, artérielles. Tous états douloureux d'origine musculaire ou nerveuse. Hypertension. Adjuvant au traitement des syndromes douloureux par le *Slaprotysat*.

**Présentation.** — *Pilules* glutinisées sphériques et ampoules de 3 cc. en injections *intramusculaires*, indolores, bien tolérées.

**Posologie.** — 4 à 8 pilules par jour.  
2 à 3 ampoules par semaine.

**Prix :** 60 pilules : 20 fr. 50 ; 10 ampoules : 31 fr.

### Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne, 22 — PARIS (V<sup>e</sup>).  
(Tél. : Odéon, 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## IODOTENSYL DUBOIS

### Dragées.

**Composition.** — Pour une dragée :  
Di-iodhydrate de Sparteine ..... 5 cgr.  
Benzoaté de Benzyle ..... 10 —  
Extrait de Bourdaine ..... 3 —  
Excipient ..... 10 —

**Indications.** — Hypertension, Artério-sclérose, Asthme, Angine de poitrine et Spasmes divers.  
Troubles fonctionnels de l'âge critique chez les deux sexes.

**Forme.** — Dragées.

### Posologie.

**Adultes :** 3 à 5 dragées par jour, de préférence avant les repas.

**Enfants :** 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.  
Durée de traitement : 10 jours.

**Prix :** 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-7.

### Laboratoires DUBOIS

**R. DUBOIS,** Docteur en Pharmacie  
52, rue Montesquieu — ASNIÈRES.  
(Tél. : Gré. 03-92.)

## IDO-TÉTLAGNOSTE MERCK

**Composition.** — Tétraiodophénolphtaléine sodique Merck.

**Propriétés.** — Colorant iodé s'éliminant par la bile en rendant opaque aux rayons X la vésicule biliaire.

**Indications.** — Radiographie de la vésicule biliaire.

**Présentations.** — Flacons de 4 gr. pour la méthode simple. Boîte de 3 tubes de 2 gr., pour la méthode fractionnée (de Sandström). Ampoules pour injections intra-veineuses.

**Mode d'emploi.** — Pour l'emploi par voie buccale, l'IDO-TÉTLAGNOSTE doit être délayé dans de l'eau gazeuse (Périer ou Seltz). Des indications détaillées se trouvent dans notre brochure sur les préparations radiologiques Merck.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck,  
J. HUMBERT, Pharmacien,  
65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trinité 14-86.)

## IDO-THYRŌÏDINE CATILLON

**Forme.** — Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

**Indications.** — Obésité, Goitre, Myxoédème, Dermatoses.

**Doses.** — 1 à 2 contre Myxoédème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Le flacon de 45 comprimés.

### Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III<sup>e</sup>).



## IODULANE

(Anciennement *Iode Tulasne*.)

**Iode organique en pilules.**

**Préparation nouvelle, stable, à forte teneur en iode métalloïdique.** Ne libère son iode que très lentement : *pas d'intolérance, pas de fatigue, pas d'iodisme.*

Pilules à enrobage contrôlé, solubles dans l'intestin seulement ; *pas de risques d'irritation stomacale.*

IODULANE permet des traitements prolongés.

**Formule.** — Chaque pilule contient 2 cgr. 5 d'iode métalloïdique entièrement assimilable. Une pilule = XX gouttes de teinture d'iode.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et des iodures : *Artériosclérose, Hypertension, Emphyseme, Lymphatisme, Goutte, Rhumatismes, Obésité, Basedow, Syphilis, Tuberculose.*

**N. B.** — L'Iodulane s'est montré particulièrement actif dans les *Troubles de la Cinquantaine et l'Obésité*. Traitement facilité par la forme pilulaire.

**Posologie.** — 2 à 6 pilules par jour, au début des repas. Pour les enfants : demi-dose.

Prix : Le tube, 17 fr. 20.

Enregistré Lab. Nat. Contr. Méd. n° 91-2.

**Laboratoires BOUILLET**

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01.)

## IODURASE

**Description.** — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur..... 0 gr. 50

Levurine extractive ..... 0 gr. 10

Par flacons de 36 capsules.

**Action thérapeutique.** — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iode que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

**Indications.** — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphyseme, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Prix : 40 fr. 30 pour 6 à 36 jours de traitement.

**Laboratoires Oh. OOUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

**Antiseptique énergique dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.**

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humérales, de l'iode à l'état naissant.

**Infections gastro-intestinales** (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie). Traitement iodé.

**Formule.** — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

**Dose.** — Adultes : 6 à 12 pilules par jour.

**Usages externes.** — **Pansements et chirurgie** : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

**Pansement Lumière** : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte et poudre) et *Tulle gras Lumière* constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

**Formuler.** — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'Amidon Lumière.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## IODURES CROS

**Chimiquement purs.**

**En pilules solubles dans l'intestin.**

**Trois formes :**

Iodure de potassium (pilules à 0 gr. 25 de KI pur).

Iodure de sodium (pilules à 0 gr. 25 de NaI pur).

Bi-iodure (pilules à 0 gr. 20 de KI pur associé à 0 gr. 005 de HgI<sup>2</sup>).

**Indications.** — *Toutes celles de l'iode et des iodures* : Artériosclérose, Accidents spécifiques primaires, secondaires et tertiaires, Emphyseme, Goutte, Hypertension, Lymphatisme, Maladie de Basedow, Obésité, Rhumatismes, Troubles circulatoires.

**Avantages.** — Grâce à l'enrobage spécial CROS, l'Iodure conserve jusqu'à l'intestin son intégrité moléculaire. Traitement facilité par la forme pilulaire. Pas de gastrite médicamenteuse, pas d'iodisme.

**Posologie.** — 2 à 8 pil. et plus par j. pour l'iodure de potassium et de sodium. Moitié de ces doses pour le bi-iodure. (Prendre au mil. des repas.)

Enregistré au L. N. de C. des M. sous le n° 199-1, 2, 3.  
En raison de la rarefaction des matières premières, la fabrication des Iodures Cros est réduite.

**Laboratoire des IODURES CROS**

**G. BROCHON, Pharmacien,**

202 bis, rue de Paris — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

## IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium ou de sodium à faire dissoudre au moment de l'emploi. Conservation parfaite. Absolument sans iodates, et par conséquent sans iodisme.

**Présentation.** — Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. d'iodure de potassium ou de sodium.

**Laboratoires THOMAS**

2, rue Sainte-Cécile — 31, taub. Poissonnière  
PARIS (IX<sup>e</sup>)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## IOGLOTT

Comprimés violets et blancs dégageant 3 mgr. d'Iode Naissant par couple de comprimés.

**Indications.** — Angines, Asepsie pré et post-opératoire, Prophylaxie des maladies épidémiques, Avulsions dentaires septiques, Gastrites infectieuses, Lymphatisme.

**Mode d'emploi.** — Mettre dans la bouche, 4 à 5 fois par jour et le soir au coucher, un comprimé violet et un comprimé blanc et laisser fondre lentement.

La boîte pour 15 jours de traitement : 10 fr. 15.  
Adresse télégr. : Gaipharncy, Alger.

Enregistré au L. N. C. N° 1113-1.

**CHARLES ROCHE**, \* † ‡, Pharmacien  
Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée, Ex-chef de travaux de chimie,  
2, rue Michelet — ALGER.  
Tél. : 348-00.

Dépôt général : Office Commercial  
Pharmaceutique, Paris.

## IOGUINE DELBA

Médication hypotensive.

**Composition.** — Combinaison d'Iode avec la peptone et l'extrait de Gui d'Aubépine stabilisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de l'Hypertension et de l'Artériosclérose chez tous les sujets et à tous les stades de la maladie.

Tolérance parfaite et sans mauvais goût.  
Pas d'Iodisme.

**Posologie.** — XX gouttes avant les repas, avec de l'eau.

**Prix :** 20 fr. 50 le flacon pour un traitement d'un mois.

**Laboratoire de l'Ioguine DELBA  
F. DELCAMBRE**

ISSOUDUN — (Indre.) Tél. 109.  
Enregistré au L. N. C. sous le n° 1181.1.

## IONYL

Médication bio-énergétique complète.

**Composition.** — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

**Action thérapeutique et Indications :**

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

**Action immédiate.** — Innocuité absolue.

**Posologie.** — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

**Prix :** 21 fr. 40.

**Laboratoires "LA BIOMARINE"**  
DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

## IO-SALYL

*Dragées glutinisées*, contenant 0 gr. 45 de salicylate de soude et 0 gr. 05 d'iode de potassium purs.

Dissociées et assimilées seulement dans le milieu intestinal. Aucune action sur la muqueuse gastrique. L'association de l'iode, en petite quantité, et du salicylate donne à cette formule le maximum d'activité.

**Indications.** — *Toutes les diathèses rhumatismales.*

**Posologie.** — Celle du salicylate, en tenant compte que chaque dragée contient 0 gr. 50 de produits actifs.

**Mode d'emploi.** — Avaler les dragées sans les briser, par une ou par deux, avec un 1/2 verre d'eau, ou mieux de tisane diurétique.

**Prix :** 21 fr. 80 la boîte de 44 dragées.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. sous le n° 955-2.

### Laboratoires du NÉVRALGOL

Ernest CORNAUD. — LA ROCHELLE.  
Anc. Pharmacien-Chimiste en chef de la Marine.  
Licencié ès Sciences. Expert des Tribunaux.

## IPÉCOPAN

Association des alcaloïdes actifs de l'Ipécacuanha et des alcaloïdes actifs de l'opium à l'état pur et en proportion constante.

*N'est pas au tableau B.*

**Propriétés.** — Sédatif de la toux et expectorant.

**Indications.** — Traitement de la Toux et des phénomènes congestifs et sécrétoires au cours des affections trachéo-bronchiques : Rhumes, Trachéites, Bronchites, Grippe, Refroidissements, Toux des tuberculeux

### Formes et posologie :

**Gouttes :** XXX, 2 à 4 fois par jour.

**Enfants :** 1 goutte par année d'âge, 3 fois par jour.

**Sirop :** 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

**Enfants :** 1/2 à 3 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

*L'Ipécopan ne se prend pas à jeun.*

### PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## IRÉNINE GONNON

**Composition.** — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

**Indications.** — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

**Posologie.** — 1, 2 ou 3 cachets par jour. Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

(Pour 8 jours de traitement environ.)

Prix public : 12 fr. 30.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

## IRRASTÉRINE

**Vitamine D cristallisée.**

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolats.

**Composition.** — Vitamine D. cristallisée, en solution dans l'huile d'olive, sans aucune addition de cholestérine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

**Indications.** — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmodiques. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Pré-tuberculose et tous états de déminéralisation.

**Dose et mode d'emploi.** — *Solution huileuse* (0 milligr. 5 de vitamine D cristallisée par cc.) Jusqu'à un an : X gouttes ; de 1 à 10 ans : XX gouttes ; adolescents, adultes : XXX gouttes.

*Chocolats* (1 chocolat = 0 milligr. 1 de vitamine D cristallisée) : 1 à 3 par jour.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

28, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>). (Danton 08-11.)

## ISCAUTOXÈNE NAUGRLÉON

**Auto-Défense. Désintoxication.**

**Composition.** — Soufre purifié lavé et Hyposulfite de Mg. Extraits d'Iris versicolor, de Boldo, de Romarin. Alcalins classiques (Citrate, Bicarbonate et Sulfate de Na).

**Propriétés.** — Stimulant tonique de la fonction hépatodigestive et protéopexique. Destruction des poisons intestinaux. Neutralise les putréfactions acides. Assure et augmente la réserve alcaline. Agit par réveil ou renforcement de mécanismes défensifs naturels.

**Indications générales.** — Traitement des insuffisances hépatiques, des auto-intoxications et de leurs conséquences.

**Indications principales.** — Toutes Dermatoses dites réactions cutanées en rapport avec un système hépato-digestif insuffisant ou surmené, ou provenant d'une mauvaise alimentation : Acné, Eczémas, Erythème (Gale du pain), Herpès, Prurits, Urticaires, Furonculose, etc.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café, soit au début, soit de préférence un peu avant les repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix : 23 fr. 50.

Laboratoire ÉON, à DINAN.

Enregistré au L. N. C. M.

## ISOGEV

**Antiseptique des muqueuses de la bouche et du pharynx.**

**Forme.** — Poudre soluble en sachets.

**Composition.** — Acétylamino-hydroxyphénylarsinate de Na, Cuivre colloïdal, Borate de soude.

**Indications.** — Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Maux de gorge, Pharyngites, et Angines.

**Mode d'emploi.** — 1 sachet par verre d'eau bouillie chaude en bains de bouche ou gargarismes : 4 à 5 fois par jour.

Prix :

Grand modèle..... 21 fr. 10.

Petit modèle ..... 11 fr. 70.

**Laboratoires GEV**

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 77-70.)

## ISONAL

**N-Méthyl-Ethyl-Phényl-Malonylurée.**

Barbiturique sans toxicité.

**Indications.** — Dépression nerveuse, États anxieux, Angoisses et palpitations, Insomnies, Surmenage, Nervosisme, Névroses et troubles convulsifs.

**Présentations :**

Tube de 20 comprimés titrés à ..... 0,10

Tube de 30 comprimés titrés à ..... 0,05

Tube de 60 comprimés titrés à ..... 0,01

**Posologie.** — Dans les cas d'éréthisme nerveux, administrer 10 à 20 cgr., en 8 à 10 prises.

Chez les enfants : 2 cgr. par année d'âge, en doses réfractées.

Chez les nourrissons, la dose quotidienne correspond à 0 gr. 01 par semestre d'âge.

Dans les troubles convulsifs des adultes, le traitement d'attaque nécessite des doses importantes variant de 0 gr. 30 à 0 gr. 80 par jour. Pour le traitement d'entretien, on pourra les réduire en les répartissant en plusieurs prises.

Prix au public : Le tube de comprimés..... 10 fr. 70

**Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

Laboratoires Français de Chimiothérapie

S. A. au capital de 10 000 000 de francs. — R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>)

(Tél. : Littré 58-43.)

## ISOPHOS

Reminéralisation. Reconstituant énergétique. Rénovateur sanguin. Tonique cérébral à base d'acide orthophosphorique associé aux phosphates monosodique, monopotassique, monomagnésien, monomanganique.

L'ISOPHOS est acidifiant ; il relève l'acidité du milieu, créant ainsi un terrain plus réfractaire aux agressions microbiennes et infectieuses. Modificateur du pH.

**Indications :**

Fatigues morales et physiques, Asthénies, Anémies nerveuses, Surmenage, Convalescences, suites de Gripes, Colibacillose, Décalcification (grossesse, carie dentaire, rachitisme).

**Mode d'emploi :**

1 cuillerée à café dans un verre d'eau ou de vin blanc avant les 2 principaux repas.

Prix : 16 fr. 50.

**Laboratoires UNIS-SPÉS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ISORGANE LAURIAT

### AIL

Cachets de 0,25.

**Dose normale.** — 1 cachet 2 ou 3 fois par jour.

**Indications.** — Traitement de l'Hypertension, des Rhumatismes, des Vers intestinaux, des Bronchites fétides, etc...

Boîte de 20 cachets. Public : 40 fr. 60.

(Voir à Opthérapie Lauriat.)

### Laboratoires LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

## ISO-SELS

Granulés effervescents.

(Remplaçant les anciens comprimés solubles.)

Médication alcalino-sodique du type Bourget, renforcée par les chlorures de magnésium et d'ammonium.

**Propriétés.** — Stimulent les sécrétions du foie. Corrigent les dyspepsies hypo- et hypersthéniques. Combattent les fermentations entérocoliques. Assurent l'équilibre acido-basique des humeurs.

**Indications.** — Insuffisance hépato-biliaire. Gastrite chronique. Fermentation intestinale. Colibacillose. Migraines. Asthénie. Dermatoses d'origine digestive. Insuffisance digestive. Déséquilibre acido-basique.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café ou 1 à 3 comprimés 1 à 3 fois par jour, à jeun, au coucher, ou au cours de la journée dans un peu d'eau de préférence minérale (Châtel-Guyon, Evian, Vittel, suivant les cas).

*Enfants et Nourrissons* : 1/4 ou 1/2 dose dans un peu d'eau sucrée ou dans le biberon.

Durée de la cure : 15 à 20 jours consécutifs.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien ex-interne des hôpitaux de Paris,  
8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 09-63.)

## ISOTANIN

**Composition.** — L'*Isotanan* est une solution aqueuse de Tanin spécialement purifié et stabilisé, additionnée de Chlorure de Sodium et présentée en ampoules stérilisées.

**Indications.** — Traitement des brûlures par tannage.

Cette méthode a pour avantages de diminuer la gravité de la brûlure par neutralisation des poisons formés à sa surface, de réaliser une protection complète de la plaie, de supprimer la douleur et de provoquer une cicatrisation très rapide.

L'*Isotanan* est également présenté sous la dénomination *Isotanan* « G », en association avec un antiseptique, le Violet de Gentiane, pour brûlures profondes et très souillées.

**Mode d'emploi.** — L'*Isotanan* et l'*Isotanan* « G » s'emploient en pansements ou pulvérisations après dilution dans l'eau bouillie. Les solutions initiales ayant une concentration de 25 % pourront être amenées ainsi à 15, 5, 2 % suivant les nécessités.

**Présentation.** — *Isotanan* ou *Isotanan* « G » : Boîte 1 ampoule de 10 cc. Boîte 5 ampoules de 10 cc.

Enregistré au L. N. C. M. sous les numéros :  
Isotanan 590-30. Isotanan « G » 590-31.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 44-59.)

## ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

**Action.** — L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire attendre toujours le point cryoscopique de 0,38 nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'*Isotonyl* Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyperacide, assure l'évacuation gastrique.

**Formes et mode d'emploi.**

**Paquets**, 1 pour 1 litre. Discoides, 2 pour 1 verre.

**Adultes** : 1 à 3 verres par jour.

**Enfants** : 1/2 verre à 2 verres à bordeaux par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : Paquets : 17 fr. 15.

Discoides : 18 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 16.

Pharmacie OHAUMEL

87, rue La Fayette — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Trud. 27-44.)

## IXIUM

**Composition.** — Solution isotonique de Thorium X (exempte de radiothorium et de corps radioactifs à vie longue).

**Présentation** — Boîte de 1 ampoule de 5 cc. pour injection intraveineuse ou intramusculaire.

**Propriétés.** — Anti-rhumatismal. De plus, action sur les organes hémo-poïétiques ; — stimulant à doses faibles, — destructif à très fortes doses.

**Indications et mode d'emploi.** — *Spondylose rhizomélisque, rhumatismes chroniques ou déformants, névrites, tritis rhumatismales, psoriasis* (particulièrement psoriasis arthropathique) ; 8 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives de 50 à 150 ou 180 microgrammes.

*Anémie* ; 8 à 10 injections hebdomadaires, dosées à 25, 50, puis 75 microgr.

*Leucémies, maladie de Hodgkin, polyglobulies* ; 5 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 100 à 350 microgr. en principe.

**Remarques.** — N'employer l'Ixiuim qu'en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses.

Les séries peuvent être renouvelées après un repos de 2 mois ; surveiller la formule sanguine en cas de séries répétées ou de doses fortes.

**N.B.** — L'Ixiuim, préparé toutes les semaines, est expédié le mardi ; les dosages sont prévus normalement pour utilisation le jeudi après-midi.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX

98, rue de Sevres — PARIS (7<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## JABOSULFÈNE

JABOrandi + hypoSULFite

« Le désensibilisant de choix » Modifie le « terrain » et régularise l'équilibre neuro-végétatif.

**Pilules glutinisées** à 0 gr. 25 d'hypo-sulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuille de Jaborandi stabilisée.

**Doses.** — 2 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas. Dose usuelle ; 4 à 6 par jour.

**Indications.** — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes, Asthme, Migraine, Rhume des foies. Toutes insuffisances hépatiques.

**Action.** — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hypo-sulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 65 pilules glutinisées : 21 francs.  
**Ampoules** de 10 cc. pour injections intraveineuses.  
La boîte de 10 ampoules : 34 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, r. de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 73-92.)  
Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## JÉCOBIASE

**Composition et formes.** — Deux formes.

Formule.	Adulte.	Infantile.
Sulfate de soude cristallisé .....	1 gr.	0,50
Citrate trisodique.....	0,25	0,125
Bicarbonate de soude bicristallisé ..	0,05	0,025
Chlorure de magnésium anhydre...	0,50	0,25
Excipient spécial .....	qs p. 8 cc.	qs p. 8 cc.

**Indications.** — Toutes les manifestations de l'insuffisance hépatique (migraines, nausées, vertiges, etc.). Les infections biliaires (ictères, lithiase biliaire, cholestyrites).

Les congestions du foie.

Les asthénies dont la cause est liée à des toxi-infections d'ordre digestif.

La constipation sous toutes ses formes.

**Posologie.** — Une ampoule le matin à jeun dans un verre d'eau. Après une semaine de repos, reprendre une nouvelle série de 10 ou 20 ampoules suivant le cas.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 23 fr. 80.

Laboratoires de la JÉCOBIASE  
Dr R. PIONNEAU, Pharmacien  
VAYRES (Gironde).

## J. B. 5. BELLAS

Traitement des maladies tumorales.

Etats cancéreux et précancéreux

Organothérapie Bellas.

### Présentation :

Comprimés (boîtes de 50 comprimés) : 93 fr. 80.

**Composition.** — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique et Extrait de rate.

**Indications.** — *Cancers et affections susceptibles de devenir cancéreuses.*

1° *Traitement préventif.* — Toutes affections aiguës ou chroniques (ulcères internes, fibromes, métrites, prostatites, ulcérations persistantes de la peau, etc.), susceptibles de devenir cancéreuses.

2° *Tumeurs malignes.* — Traitement adjuvant de la Chirurgie, Curiothérapie et Radiothérapie : Traitement préparatoire des cas qui, en raison de l'état général ou local, ne sont pas indiqués pour une intervention chirurgicale immédiate ; traitement post-opératoire pour éviter les risques de récidives et métastases ; traitement des cas réfractaires, ou devenus réfractaires aux rayons ; augmentation de la tolérance des malades aux rayons.

3° *Traitement des cas inopérables.* — Traitement freinant la croissance de la masse tumorale et des ganglions ; relève l'état général et moral, supprime les douleurs et assure souvent une survie appréciable.

### Posologie :

**Comprimés :** dose moyenne : 3 à 6 comprimés par jour à prendre en 3 fois, 1/2 heure avant les repas. Dose d'attaque : 9 à 12 comprimés par jour pendant 8 à 10 jours.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd., n° 167-16.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser :

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

B. Abadie, pharmacien,

3, place Intérieure-Saint-Michel — TOULOUSE

(Tel. : 213-06.)

## JÉCOL

L'auxiliaire physiologique du foie.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 223-2.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

*Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, Colibacillose, etc.*

### A. Formule.

Combretum (Extrait spécialisé de Kinkélibah) .....	3 centigr.
Boldo (Extrait aqueux) ....	2 1/2 centigr.
Evonymine (Codex).....	1 centigr.

Pour 1 cachet.

### B. Forme.

**Cachets minuscules, faciles à avaler, forme la plus simple pour administration aux adultes.**

### C. Posologie.

1 ou 2 cachets à la fin de chaque principal repas.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés par le médecin traitant chez le malade.

D. Boîte de 30 cachets..... 22 fr. 20

**Laboratoire JÉCOL**  
COURBEVOIE (Seine).

## JÉCOPEPTOL

**Indications.** — Toutes affections gastro-hépatiques. Calme immédiatement. Effet durable par usage régulier.

**Composition.** — Association de 2 formules : l'une *gastrique* : poudre magnésio-bismuthée, avec adjonction de silice absorbante. L'autre *hépatique* : cholagogue et désinfectante des voies biliaires.

**Forme.** — Poudre d'une extrême finesse, sans toxique, d'un goût excellent, d'un prix modique

**Posologie.** — 1 cuillerée à soupe de poudre dans un verre d'eau après les principaux repas.

Prix de la boîte  
pour un traitement d'une semaine : 19 fr. 40.

**L. QUÉRET, Pharmacien**

89, rue Martre — CLICHY (Seine). (Tél. : Per. 11-01.)

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 1248-1.

## JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue et d'extraît de malt, sous forme de paillettes.

**Composition.** — Huile de foie de morue, 30 p. 100 ; Extraît de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ; Essences aromatiques, Q. S.

**Indications.** — Le Jémalt réalise la médication à l'huile de foie de morue (apport en vitamines A et D), enrichie des éléments nutritifs et digestifs de l'Extraît de malt (diastases et vitamines B). Prétuberculose. Tuberculose. Lymphatisme. Croissance. Anémie.

**Posologie.** — *Enfants* jusqu'à 2 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

*Enfants plus âgés, adolescents et adultes* : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas, tel que (il fond rapidement dans la bouche) ou dilué dans du lait tiède ou dans une infusion.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

**P. BASTIEN, Pharmacien**  
CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## JUGLANE

**Composition.** — Extraît purifié de Noyer sauvage.

**Indications :**

- 1° *Diabète* et ses complications ;
- 2° *Tuberculose pulmonaire* ;
- 3° *Bronchites chroniques avec bronchorrhée* ;
- 4° *États lymphatiques*.

Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 8 pilules avant chaque repas, suivant avis du médecin.

Prix : 18 fr. 60 la boîte de 150 pilules.

L. N. C., n° 257-1.

**Laboratoires du JUGLANE**

Camille CONS, Pharmacien,

Ancien Interne des Hôpitaux de Lyon.

8, rue Jaboulay — LYON.

(Tél. : Lyon-Parmentier 49-06.)

## JUGLANREGINE ANDRÉ

Iodotannique phosphaté à base de feuilles de noyer, fraîches et sèches.

**Indications.** — Lymphatisme, tuberculose, reminéralisation, anorexie, états asthéniques, convalescence, hypothyroïdie, diabète.

**Présentation.** — Élixir très agréable au goût.

**Dose.** — 2 à 3 cuillerées (à bouche ou café, suivant âge) par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments : 556-1.

**Laboratoires BADEL**

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).



## JURANOL

**Hulle sulfurée naturelle du Jura.**

Hulle d'origine animale fossile, très riche en soufre organique (13,5 p. 100), extraite d'une roche du massif montagneux du Jura. Réalise un Ichtyol suractivé et incolore.

Réparateur puissant des tissus, décongestif, calmant, antiseptique léger, antiprurigineux, ni irritant ni toxique. Ne tachant pas.

Pommade à 20 p. 100, tube de 30 gr. : 11 francs.

Solution huileuse à 10 p. 100, flacon de 60 gr. : 17 francs.

Ovules à 3 p. 100, la boîte de 6 : 21 fr. 50.

### COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI°).  
(Tél. : Ségur, 02-79.)

## KALMANGOR

**Association Trinitrine-Yohimbine.**

**Composition.** — Dragées à noyau mou contenant chacune :

Chlorh. d'Yohimbine.....	0,002
Trinitrine à 1 p. 100.....	2 gouttes.
Phényl-éthyl-malonylurée .....	0,015
Extrait de Cratægus .....	0,05

**Indications.** — Angine de poitrine, hypertension. Action vaso-dilatatrice immédiate (Trinitrine) et durable (Yohimbine).  
Médication sympathicolytique générale.

**Posologie.** — 4 à 6 dragées par 24 heures à croquer au moment des crises.

**Prix :** Le flacon de 50 dragées : 25 fr. 50.

### Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).  
(Tél. : Alésia 23-48.)

## KANEURON

Nouvelle forme créée en 1933.

**Modérateur des perturbations vago-sympathiques et psycho-affectives.**

**Présentation.** — Gouttes, solution 1/25.

**Composition.** — Paullinia, Cratægus, Passiflore, Phényléthylmalonylurée.

**Indications.** — Spasmes, Vertiges, Anxiétés, Angoisses. Insomnies, États Parkinsoniens, Émotivité, Syndrome solaire, Enurésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — La phényléthylmalonylurée sodique en solution permet une posologie plus souple. Très vite assimilé, il peut être prescrit à dose « filée », progressive, dégressive. Il autorise la dose optimum et son fractionnement par le malade. Les extraits de Cratægus et de Passiflore renforcent son action. Le Paullinia combat l'action dépressive que peut occasionner la phényléthylmalonylurée.

**Posologie.** — X à XXX gouttes 3 fois par jour.

X gouttes = 0,01 de phényléthylmalonylurée.

Le flacon 30 grammes, durée moyenne 1 mois.

**Bibliographie :** *Annales Médico-Psychologiques*, 22-12-1938. Doses filées en sympathologie juin 1937.

Enregistré L. N. C.

**Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA**  
P. CORDONNIER, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

## KAOBROL

**DEUX FORMES :** Poudre. Tablettes.

**DEUX FORMULES :** Simple. Belladoné

**KAOBROL simple :** Kaolin colloïdal. — Bromure de Sodium (20 à 25 cgr. par cuillerée à café). Carbonate de Chaux et de Magnésie.

**KAOBROL belladoné :** Kaobrol simple + Poudre de Belladone titrée (IV gouttes de teinture par cuillerée à café).

Poudre homogène, adhésive et absorbante, très agréable au goût, sucrée et aromatisée à la menthe.

**Indications.** — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

**Posologie.** — Une cuillerée à café ou 2 tablettes après les repas et au moment des crises douloureuses.

Prix : 17 fr. 60.

**Laboratoires J. LAROZÉ, pharmacien.**

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Entrepôt 01-41.)

## KAO CARBO

**Présentation.** — Tubes aluminium de 30 comprimés (16 fr. 70).

**Principes actifs.** — Carbonate de chaux, kaolin, sous-nitrate de bismuth, magnésie calcinée, bi-carbonate de soude, extrait de belladone, ess. d'anis.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Pyrosis (brûlures et aigreurs de l'estomac), Aérophagie, Météorisme, Flatulence (gaz), Entérocologie, Entérite, Diarrhée.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés par jour dans le courant des repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-44.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## KAOLÉO

**Composition.** — Poudre micellaire à base de Kaolin colloïdal paraffiné.

**Action thérapeutique.** — Protège la muqueuse gastro-intestinale contre l'offense des germes et des aliments insuffisamment digérés ou altérés. Neutralise et absorbe les acides d'hypersécrétion et de fermentation.

**Indications.** — Dyspepsies acides, Gastro-entérites, Diarrhées saisonnières, Entérocologies, Dysenterie.

**Présentation.** — Poudre.

**Posologie.** — *Adultes :* 1 cuillerée à soupe dans un demi-verre d'eau le matin à jeun et au moment des douleurs.

*Enfants :* 1/2 dose.

Prix : La boîte, 19 francs.

**Laboratoires SITSA**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grés. 37-34.)

## KAOLINASE

Pansements gastriques parfaits,  
les moins coûteux.

**Composition.** — Silicate d'alumine naturel, stérilisé, finement porphyrisé, en poudre fine très adhésive: 10 grammes par paquet.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, Gastrites; Gastralgies, Ulcères de l'estomac et du duodénum, Colites, Fermentations.

**Posologie.** — 1 à 2 paquets délayés dans un verre d'eau le matin à jeun.

Renouveler 1/2 ou 1 paquet dans la journée si nécessaire, au moment des douleurs.

**Présentation et prix.** — Boîte de 20 paquets de 10 grammes: 16 fr. 40.

## KAOLINASE BELLADONÉE

**Composition.** — Kaolinase simple, 10 gr. Teinture de belladone: 10 gouttes par paquet.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie grave, Gastropathies rebelles, Ulcères graves ou aggravés de spasmes, Spasmes gastro-intestinaux, Vomissements, Toux émetisante des tuberculeux.

**Posologie.** — Un paquet délayé dans un verre d'eau le matin à jeun. Renouveler dans la journée si nécessaire.

**Présentation et prix.** — Boîte de 20 paquets de 10 grammes: 18 fr. 70.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (Xe).

(Tél.: Nord 76-85.)

## KAOSYL DESLEAUX

**Composition.** — Silicate d'aluminium colloïdal, de préparation spéciale; carbonate de calcium amorphe; carbonate de magnésium.

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement gastro-intestinal de choix, d'innocuité absolue, assurant un tapissage intégral, adhésif, homogène et uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Ramène à la normale le pH gastrique et intestinal, ne coagule pas le mucus protecteur.

**Indications.** — États inflammatoires et affections organiques du tube digestif: ulcus, ulcérations gastriques ou duodénales, hyperchlorhydrie, gastrites, aérophagie, suites d'opérations gastriques, entéro-colites, colites, fermentations, toxi-infections.

**Présentation.** — Poudre impalpable, formant avec l'eau un lait homogène, de goût agréable.

**Posologie.** — *Pansement gastro-intestinal*: 1 à 2 cuillerées à potage, prises à jeun, 3 fois par jour, dans 1/2 verre d'eau, 1/2 heure avant les 3 principaux repas.

*Hyperchlorhydrie, Pyrosis*: 1 cuillerée à entremets prise dans 1/2 verre d'eau, 1 à 2 heures après les repas.

*Aérophagie, Vomissements*: 1 cuillerée à potage, prise à jeun dans 1/2 verre d'eau.

E. LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél.: Élysées 17-46.)

## KATOX INTRA

(Cobratoxine nouvelle)

**Composition.** — Venin de cobra suractivé et non choquant, obtenu par suppression de protéines hétérogènes et freinatrices et s'employant à des doses toujours très faibles.

**Indications.** — L'Algie rebelle quelle qu'en soit l'origine et l'ancienneté; en particulier toutes localisations douloureuses: névralgies, névrites, hyperesthésies.

**Technique et posologie.** — Injections quotidiennes et fractionnées dans l'épaisseur du derme.

Les doses injectées ne provoquent aucune réaction focale ou générale et sont absolument inoffensives même chez les enfants.

**Présentation.** — En boîte de six ampoules de 1 cc. contenant une aiguille intradermique inoxydable. Titré à 1/10 U. S. par 1/2 cc.

Prix: 29 fr. 30.

Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél.: Carnot 78-11.)

## KAVIASE

**Pilules, Suppositoires, Ovules.**

### PILULES

Extrait hyd. alc. frais de Kawa-Kawa... 0 gr. 10  
Hexaméthylène-tétramine..... 0 gr. 03

**Posologie.** — 6 à 9 pilules par jour, à répartir avant les repas.

**Indication.** — Le symptôme « douleur » dans la sphère génito-urinaire.

Étui de 50 pilules : 19 fr. 50.

### PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE

Extrait hydr. alc. frais de Kawa-Kawa... 0 gr. 10  
Bleu de méthylène..... 0 gr. 02

**Posologie.** — 6 à 9 pilules à répartir avant les repas.

**Indications.** — Cystites (banales, gonococciques ou bacillaires), Urétrites, Prostatites, Orchites, Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, Colibacilloses.

Étui de 50 pilules : 19 fr. 50.

### SUPPOSITOIRES

Extrait hyd. alc. frais de Kawa-Kawa... 0 gr. 30  
Stovaine..... 0 gr. 005  
Extrait de jusquiame..... 0 gr. 03

**Posologie.** — 1 à 2 suppositoires par jour.

**Indications.** — Toutes les Algies ano-rectales et pelviennes. Règles douloureuses, Congestion prostatique, Hémorroïdes.

Boîte de 10 suppositoires : 19 fr. 50.

### POMMADE

Extrait hyd. alc. frais de Kawa-Kawa... 10 gr.  
Chlorhydrate d'amyléine..... 0 gr. 15  
Excipient. Q. S. P..... 100 gr.

**Posologie.** — Étendre la pommade sur les parties tuméfiées et maintenir autant que possible le contact par une gaze.

**Indications.** — Prurit, Hémorroïdes, Dermatoses douloureuses, Tube à canule de 40 grammes : 19 fr. 50.

### OVULES

Extrait hyd. alc. frais de Kawa-Kawa... 0 gr. 35  
Sodium (*m*-Acétylamino-para-Oxyphénylarsinate de)..... 0 gr. 10

**Posologie.** — 1 ovule le soir.

**Indications.** — Toutes Affections gynécologiques douloureuses. Décongestif et Sédatif. Ne tache pas.

Boîte de 6 ovules : 23 fr. 20.

## KAVIASE SULFAMIDE

Para-aminobenzène sulfamide..... 0 gr. 20  
Extrait hyd. alc. frais de Kawa-Kawa... 0 gr. 08  
Extrait splénique..... 0 gr. 05

**Posologie.** — 4 à 10 pilules par jour, par 1 ou 2 à la fois.

**Indications.** — Thérapeutique curative et préventive des infections à gonocoque, streptocoque, méningocoque, pneumocoque.

Étui de 40 pilules : 23 fr. 50.

**Laboratoire G. CANAT**

22, rue Lalande — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 71-02.)

## KÉFÉROL

Médicament antihémorragique, d'équilibre hormonal. Solution huileuse de vitamine E ( $\alpha$ -tocophérol) et de vitamine K (méthyl-naphtoquinone), titrant 2<sup>me</sup> 5 de chaque vitamine par gramme d'huile.

**Présentation.** — Gouttes. Produit entièrement assimilable, très digestible.

**Indications :** *Gynécologie* : Grossesse — Avortements — Accouchements prématurés — Hémorragies du *post-partum* — Stérilité — Troubles menstruels.

*Nourrissons* : Troubles nerveux et musculaires — Croissance générale — Ictères — Toutes hémorragies internes ou sous-cutanées.

*Enfants et adultes* : Interventions chirurgicales des voies biliaires — Interventions chirurgicales hémorragiantes — Oto-rhino-laryngologie — Ictères par rétention.

**Posologie :** *Gynécologie*. — Dose moyenne : XV à XX gouttes par jour. Dose massive avant l'accouchement : XL à LX gouttes par jour.

*Nourrissons* : II à V gouttes par jour.

*Enfants et adultes* : Ictériques ou avant interventions chirurgicales hémorragiantes : XL à LX gouttes par jour.

**EMPLOI.** — A prendre dans du lait, jus de fruits ou aliments au moment des repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-18. Prix : 28 francs.

**Laboratoires SECO** — G. COGNÉ, pharmacien.

6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).

## KÉFIROGÈNE CARRION

Pour la préparation domestique du Kéfir.

**Composition.** — Ferments sélectionnés, fournis par des cultures pures des agents de la fermentation kéfirique. Préparation liquide glycinée.

**Indications.** — Le Kéfirogène permet la fabrication du Kéfir, lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

**Mode d'emploi.** — Chaque dose (une ampoule) est ajoutée à 250 cc. environ de lait bouilli, puis refroidi. Après un séjour de 24 heures, 25 degrés, on a le Kéfir n° 1 ; au bout de 48 heures, le Kéfir n° 2 (le plus souvent utilisé), et, au bout de 72 heures, le Kéfir n° 3. Une étuve simple facilite cet emploi du ferment (renseignements sur demande).

**Présentation et prix.** — La boîte de 12 ampoules : 12 fr. 50.

**Produits biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## KÉLÉDOL ET SUPPO-KÉLÉDOL

### Composition :

Chlorhydrate de Morphine..... 1 centigramme.  
Bromhydrate de Scopoline... 1/4 de milligramme.  
Par ampoule de 1 cc., par suppositoire ou 2 comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tous les emplois de la morphine sans les inconvénients : action hypnotique et sédative plus forte, pas d'effets toxiques sur la circulation et la respiration, beaucoup moins d'accoutumance.

**Indications.** — Douleur, Cancer, Sciatique, Anxiété, Agitation, Anesthésie pré-chirurgicale, Accouchement.

**Posologie.** — Ampoules, suppositoires ou comprimés : 1 à 4 par 24 heures.

### Présentation pharmaceutique et prix :

12 ampoules : 16 fr. — 6 ampoules : 8 fr.  
10 suppos. Kélédol : 22 fr. — 5 suppos. Kélédol : 12 fr.  
14 comprimés : 10 francs.

**D. RAQUET**, Pharmacien Supérieur,

Licencié des Sciences.

114, rue Solferino — LILLE.

## KERASALICYL

Pilules *kératinisées* suivant le procédé du Dr Henri Philippe, ne se dissolvant que dans l'intestin et permettant l'absorption des fortes doses de salicylate sans intolérance ni fatigue d'estomac.

Salicylate de soude chimiquement pur dosé à 0 gr. 50 ou 0 gr. 25.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme infectieux, rhumatisme chronique, goutte, sciatique, névralgies, coliques hépatiques, fièvres infectieuses, infections urinaires, état infectieux.

**Posologie.** — 8 à 20 pilules à 0 gr. 50 par jour, soit 4 à 10 grammes, à déterminer par le prescripteur. Dose double pour les pilules à 0 gr. 25. Étui de 60 pilules à 0 gr. 50 ou de 80 pilules à 0 gr. 25 : 19 fr. 90.

**Produits du Dr HENRI-PHILIPPE**

36, quai Fulchiron — LYON.

## KÉRATOPLASTOL

Pâte kératoplastique polyréductrice.

*Ulcères variqueux, Plaies atones, brûlures, eczémas, prurits, impétigo, dermatoses, etc.*

Une ou deux applications quotidiennes.

Présentation en tubes.

Pendant les hostilités, la préparation du *Kératoplastol* est momentanément suspendue, les produits entrant dans sa composition étant épuisés. Les produits de remplacement ne donnant que des résultats médiocres, la fabrication sera reprise dès que les matières premières de qualité se retrouveront sur le marché français.

**Laboratoires DORDIN**

HARNES (Pas-de-Calais).

Livraisons très réduites.

## KIDARGOL

Thérapeutique rhino-pharyngée.

**Composition.** — Adréaline. Chlorhydrate d'éphédrine. Chlorhydrate de para-aminobenzoyldiéthylamino-éthanol. Chlorhydrate de paraminobenzène sulfamide. Vitellinate d'argent. Solution isotonique.

**Indications.** — Rhinites et Adénoïdites aiguës, Rhinites congestives, Sinusites aiguës fronto-maxillaires, Rhinites spasmodiques, Rhume des foins, Trachéites, Otites.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : en pulvérisations ou en instillations de IV à V gouttes par narine pratiquées 3 à 6 fois par jour.

*Enfants* : 1/2 dose suivant l'âge et avis du médecin traitant.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes de 20 cc. : 14 francs.

**Laboratoire R. GALLIER**

1 bis, place du Président-Mithouard — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 46-57.)

## KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

### Indications.

- 1° Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2° Adénoidite aiguë de l'enfance : décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage utile de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3° Accès de faux croup.
- 4° Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

### Mode d'emploi.

Chez les nourrissons, instiller à la fois II à III gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.  
Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller IV à V gouttes.  
Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 cc.

Prix : 19 fr. 55

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII°).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## KIDOPHÉDRINE

Association Ephédrine-Adréraline en solution huileuse.

**Indications.** — Rhinites et adénoidites aiguës, Rhinites congestives, Sinusites aiguës fronto-maxillaires, Otites, Mastoïdites, Rhinites spasmodiques, Rhume des foins, Trachéites, Coqueluche.

### Mode d'emploi :

**Oto-rhino-laryngologie :** en instillations nasales, IV à V gouttes dans chaque narine, 5 à 6 fois par jour.

**Rhume des foins, rhinites spasmodiques.** — Instillations nasales 5 à 6 fois par jour et au moment où la crise s'annonce par un chatouillement du nez ou de la gorge.

**Coqueluche.** — Instillations fréquentes et répétées, à raison de II gouttes dans chaque narine toutes les 2 heures.

Flacon de 20 cc. : 19 fr. 95

Flacon de 10 cc. : 12 fr. 90

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII°).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## KINÉCHOL

**Composition.** — Granulé soluble de goût agréable à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

**Indications.** — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique ; Vomissements.

Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique. Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

**Contre-indications.** — Cholécystites aiguës et dysenterie.

**Posologie.** — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 19 fr. 50

Enregistré au L. N. C. n° 399-1.

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 2-75.)

## KINECTINE

(Combinaison d'Hectine et d'Éphédrine.)

Spécifique de la Fièvre des Foins, de la grippe et du Coryza.

**Indications.** — Fièvre des foins, Coryza aigu, grippe, asthme, emphysème.

**Forme.** — Comprimés.

### Posologie :

Adultes : 3 à 5 comprimés par jour.

Enfants : Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine  
Docteur ès sciences, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## KINURÉA TERRIAL

Traitement des hémorroïdes internes par injections sclérosantes.

Le premier en date, créé et expérimenté dans les hôpitaux (Hôpital Saint-Antoine). Adopté par les spécialistes des hémorroïdes.

**Avantages.** — Évite toute intervention sanglante. Méthode ambulatoire, active, indolore, sans incidents réactionnels.

**Formule.** — Solution stabilisée de chlorhydrate de Quinine et d'Urée, en milieu hypersclérosant.

**Technique.** — Adressée sur demande.

**Bibliographie.** — Les hémorroïdes et leur traitement (*Presse médicale*, du 5 juin 1928.)

**Laboratoires DUMESNY**

199, avenue Michel-Bizot — PARIS.  
(Tél. : Did. 04-53.)

## KODOS

**Composition.** — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'urotropine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Élimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines.

**Indications.** — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Asthme et Emphysème, Cholémie.

**Mode d'emploi.** — Une pellette chaque matin, à jeun, au lever, dans une eau très-peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles), ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Prix : 26 fr. 10, étui 180 grammes.

**Laboratoire des ABATILLES**  
Route du Mouleau — ARCACHON.

## KOLA ASTIER

**Composition.** — Tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, kolacatéchine, rouge de Kola.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur du cœur, Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

**Indications.** — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescences, asthénies, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

**Formes.** — Granulé et Dragées, ces dernières très faciles à emporter en déplacement, voyages, sports.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 cuill. à caté ou 3 à 6 dragées par jour.

Prix : 17 fr. 60.

**Laboratoires du Dr P. ASTIER**

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>),  
(Tél. : Auteuil 24-52.)

## KOLA MONAVON

### Présentation et composition :

	Prix public.
<i>Élixir</i> (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).....	25 fr. 10
<i>Vin</i> (18°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).....	27 fr. 10
<i>Granulée</i> : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.	17 fr. 60
<i>Pastilles</i> : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.	11 fr. 70

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

**Indications.** — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

### Posologie :

*Élixir* : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

*Vin* : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

*Granulée* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

*Pastilles* : 10 à 15 par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente :

*Élixir* : 12 jours. — *Vin* : 8 jours. — *Granulée* : 8 jours. —

*Pastilles* : 4 jours.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

## KOLA-STHÉNYL

Élixir aux vins généreux de France et principes actifs en association très stable : *Noix fraîches de Kola*, coca, quinquina, noix vomique, Phosphate de Manganèse, arrhénal, associés à l'Acide orthophosphorique (1 partie); Phosphate acide de soude (2 parties selon les proportions de la formule de Joule).

**Propriétés-indications.** — *Tonique musculaire, Tonique cardiaque, Tonique antigrippal. Reconstituant des Forces physiques et cérébrales*, remarquable par la *sûreté* et la *rapidité* de son action, dans : *Toutes les déficiences organiques, toutes les Convalescences* : médicales, chirurgicales, obstétricales.

*Toutes les dépressions* : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

**Présentation.** — Flacon de 155 cc.

**Posologie.** — D'un goût liquoreux très agréable, le Kola-Sthényl se prend pur ou dilué dans eau ou vin, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café, avant, pendant ou après les principaux repas.

*Enfants* : 1/2 dose.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-11.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine.

38, rue du Louvre — PARIS (1<sup>er</sup>).

(Tél. : Central 01-35.)



## KOLATINÉS

**Tonique sédatif.**

Kola nature, *non caféinée* grâce au traitement sur place (A. O. F.) de l'amande vivante, avant oxydation diastasique destructrice de la *Kolatine* et productrice de caféine. La poudre soluble ainsi obtenue n'a, de ce fait, aucun rapport avec les kolas caféiques provenant des noix du commerce simplement séchées à l'air. Stimule beaucoup mieux que le café et *n'énervé pas*.

**Indications particulières.** — Asthénies du matin, des *hépatiques*, des surmenés, des insomniaques ; des enfants lymphatiques, anorexiques, adénodians.

Dépression mentale, sous toutes ses formes, à toutes ses intensités, quelle qu'en soit l'origine.

Déficience sexuelle masculine, avec anxiété, dépression morale, impuissance psychique.

Stimulant inoffensif chez les neuro-végétatifs privés de café, thé, le matin, à midi, au goûter ou même le soir.

Élimine l'impression de fatigue éprouvée lors de certains régimes restrictifs : obèses, hépatiques, *diabétiques* (sucrer à la saccharine).

Intérêt de mordançage dans les thérapeutiques stimulatrices thyroïdienne, surrénale, orchitique, cérébrale.

*Innocuité complète vis-à-vis du sommeil. Aucune contre-indication. Ni accumulation, ni accoutumance.*

**Utilisation de choix.** — Dans l'eau sucrée très chaude, le lait ou les déjeuners, *après dissolution complète*. 1/2 à 4 sachets par jour, moyenne 1 à 2.

En vue de l'effort physique ou intellectuel chez les sujets bien portants (épreuves sportives ou scéniques, examens, concours, discours) : 1/2 heure avant l'action.

Boîte P. M., 10 sachets (16 fr. 70).

Boîte G. M., 30 sachets (46 fr. 50).

**Sté des Produits et Procédés CHALAS**

75, rue Jacques-Dulud,  
NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

## KOUMYL

Concentrat de bacilles lactiques vivants en gouttes.

Le Koumyl est une suspension concentrée de ferments lactiques, stabilisée par un milieu qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

**Avantages :**

- 1° Maniement pratique.
- Quelques gouttes versées au moyen du compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.
- 2° Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable aux ensemencements accidentels.
- 3° Ne renferme pas d'acide lactique.
- 4° Pas de saveur désagréable.
- 5° Conservation pratiquement illimitée.
- 6° Traitement peu onéreux.

**Indications :**

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxications, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées. Le Koumyl étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

**Posologie :**

*Nourrissons* : I à V gouttes trois fois par jour.

*Enfants* : X gouttes trois fois par jour.

*Adultes* : XV à XX gouttes trois fois par jour. Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## K. THROMBYL

Vitamine K, de coagulation sanguine.

**Composition.** — Solution huileuse de 2-méthyl-1, 4-naphtoquinone, destinée à l'ingestion et à l'injection.

**Propriétés.** — Agit sur la production de prothrombine.

**Indications.** — Traitement et prévention des : Hémorragies du nouveau-né, Hémorragies chirurgicales, Hémorragies des icteriques, des hépatiques, des intestinaux.

**Présentations.** — K. THROMBYL buvable : I goutte = 1/10 mgr.

K. THROMBYL injectable : ampoules de 1 cc. dosées à 5 et 10 mgr.

**Posologie.** — Chez le nourrisson : III à X gouttes par jour.  
Chez l'adulte : 2 à 10 mgr. par jour.

(Aux hépatiques, administrer en même temps des extraits biliaires.)

Prix au public :

Boîte de 5 amp. de 1 cc. à 5 mgr.....	20 fr.
Boîte de 5 amp. de 1 cc. à 10 mgr.....	25 fr.
Flacon de 20 cc.....	22 fr. 50.
Flacon de 20 cc. + 20 pilules d'extrait biliaire.	30 fr.

### Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

**Dose.** — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait bouilli revenu à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 18 fr. 60.

**Laboratoires Henry ROGIER**

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

## LACARNOL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Extrait musculaire contenant de l'adénosine et des substances voisines douées de la même activité.

**Propriétés et indications.** — Vaso-dilatateur des coronaires et antispasmodique. Soutient l'action de la digitale, augmente le débit cardiaque, améliore l'état général des vieillards.

Angine de poitrine et spasmes vasculaires.

**Posologie.** — Par voie buccale : X à XXV gouttes une à trois fois par jour.

Par voie sous-cutanée ou intramusculaire : 1 à 2 ampoules par jour.

**Présentation.** — Gouttes, flacon de 20 cc. Boîte de 5 ampoules de 1 cc.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## LACCODERMES

Vernis souples, solubles à l'eau.

### TRAITEMENT

de toutes les affections de la peau.

« A chaque dermatose son médicament ». Les Laccodermes, vernis souples, ne tachent pas, ne graissent pas, n'ont aucun des inconvénients des pommades.

Ils dispensent de tout pansement

**ECZÉMAS** (suintants) : Laccoderme au goudron de houille à 5% — 10% — 20%.

**DERMATOSES LÉGÈRES** (Erythèmes) : Laccoderme à l'oxyde de zinc.

**DERMATOSES INFECTÉES** (Impétigo) : Laccoderme à l'ichthyol.

**DERMATOSES PRURIGINEUSES** (Névrodermites) : Laccoderme au chl. d'amyléine (Stovaine N. D.) ou à l'ichthyol-stovaine.

**DERMATOSES SÈCHES** : Laccoderme au soufre. — Laccoderme sulfocadique.

Laboratoires **BRISSON**

**Dr DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 75-01.)

## LACHÉSINE

Extrait du venin  
du *Trigonocephalus lachesis*.

**Forme.** — Comprimés solubles dans l'eau.

**Mode d'emploi.** — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

**Indications.** — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)  
S'abstenir pendant les règles.

Prix : 16 fr. 50 le tube de 40 comprimés.

Laboratoire **RENAUD**

2, rue Pierre-Demours — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 23-82.)

## LACODAL

Laxatif doux, efficace et sans accoutumance.

**Forme.** — Flacon de 50 comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Extrait biliaire total, Cascara désamérisé, Podophyllin, Jusquiame, Agar-Agar.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rééducateur intestinal. Action douce et répartie sur les 24 heures. Ne donne pas de coliques ni d'irritation de la muqueuse intestinale.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix : 14 francs (arrêté du 6-2-42).

Laboratoires **GODAL**

M. BLANCHER, Pharmacien,  
Ancien interne des Hôpitaux de Paris.

1, bd Louis-Salvator — MARSEILLE (B.-du-R).

## LACPININE

**Forme.** — Liquide blanc laiteux.

**Composition.** — Émulsion d'essence de pin naturelle.  
Essence de pin 20,00 pour 100 gr.

**Indications.** — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

**Mode d'emploi.** — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	Flacon de	60 gr. :	8 fr. 10
	—	150 gr. :	18 fr. 60
	—	750 gr. :	62 fr. 20
	—	1 000 gr. :	74 fr. 70

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-7.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>, S. à r. l.**  
VIBRAYE (Sarthe).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.  
(Tél. : Trudaine 92-52.)

## LACTACYD

**Émulsion acidifiante vitaminée**  
à base de Lacto-Sérum Lavril.

**pH : 5,2.**

**Composition :**

**Lacto-sérum** (élément de régénération cellulaire).

**Acidifié** par fermentation lactique à pH : 5,2, condition d'équilibre physico-chimique.

**Vitamines A et D** (huile de foie de flétan, en émulsion inoxydable). Élément d'activité biologique.

**Excipient ionisé.** — Disparaît à l'eau, ne graisse pas, ne fait pas macération, émulsionne les graisses, absorbé par la peau.

**Principe :**

La peau est acide : pH : 5,2 (Darier).

Cette acidité, facteur essentiel de kératinisation, protège contre les influences extérieures et contre les microbes.

La thérapeutique doit : provoquer la fonction normale des ferments cellulaires acidifiants de l'épiderme, rétablir l'acidité naturelle, et s'exercer à pH : 5,2, niveau d'équilibre physiologique.

*Lactacyd calme la douleur.*

— apaise la démangeaison.  
— régénère l'épiderme.

**Indications :**

**Cicatrisation.** — Plaies, brûlures. Gerçures. Crevasses. Ulcères, Escarres, Crevasses du sein.

**Eczémas par sensibilisation exogène.** — Eczémas localisés, chimiques, professionnels. Eczéma infantile.

**Érythèmes et tissus infiltrés.** — Engelures, Œdèmes, Traumas, Cellulite. — Erythème fessier infantile.

**Démangeaisons et prurits.** — [La démangeaison ne se calme qu'en milieu acide (Darier).]

Syndromes prurigineux. Lésions de grattage. Prurits vulvaires et anal, Hémorroïdes.

**Dermatoses par séborrhées. Acné.** — Boutons, Pustules. Intertrigos. Maladies du cuir chevelu.

**Dermites microbiennes, parasitaires et coloniales.**

**Contre-indication :** aux personnes sensibilisées au poisson, la présence d'huile de flétan risque de provoquer un léger érythème urticarien.

Prix : 23 fr. 25.

Inscrit au L. N. C. M., n° 768-6.

**Laboratoires LAVRIL** — PACY-SUR-EURE (Eure).  
Bureaux : 11, rue Anatole-de-La-Forge — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 17-49.)

## LACTAGOL

### Poudres.

**Nature.** — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phosphoprotéides, Phosphates organiques assimilables.

**Mode d'emploi.** — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

**Indications.** — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

Prix : la boîte, 21 francs.

Pour un traitement de 10 à 20 jours.

### Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

(Tél. : Gobellins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 218-6.

## LACTARIS

### DÉSINFECTION INTENSIVE DE L'INTESTIN

#### Bactériothérapie polyvalente nouvelle

par précipité massif de cultures anaérobies facultatives.

### ACIDOPHILES ET LACTIQUES STABILISÉES

**Effet.** — Hyperactif et toujours identique.

**Présentation.** — Ampoules de 6 cc. à sucer, pur, avec chalumeaux stérilisés inclus dans la boîte.

**Richesse microbienne.** — Env. 5 milliards de bactéries acidophiles et lactiques en symbiose, par ampoule.

**Indications.** — Toutes diarrhées, entérites, hyperintoxication intestinale. Colibacillose.

**Dose moyenne.** — Adultes, enfants : 2 ampoules par jour, 1/4 d'heure avant petit déjeuner et repas du soir.

Nourrissons : 1 ampoule, mélangée au biberon.

Prix : 30 fr. la boîte de 18 ampoules (cure de 9 jours).

### Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS. (Prov. 20-20.)

## LACTÉOL-COMPRIMÉS

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés : 2 600 000 000 pour un comprimé.

**Propriétés.** — Il réalise une épuration biologique de l'intestin, empêche la putréfaction intestinale. Il fait disparaître les causes d'irritation locale et les troubles généraux d'auto-intoxication.

**Indications.** — Enfants, adultes.

Entérites, Désinfection intestinale, Diarrhées, Infection et Auto-intoxication intestinales, Gastro-entérites des nouveau-nés et nourrissons.

**Présentation.** — Il se présente sous forme de comprimés enfermés dans un tube de verre (9 comprimés par tube).

**Mode d'emploi.** — 6 à 9 comprimés par jour dans un verre d'eau avant les repas.

**Nourrissons :** 3 à 6 comprimés par jour délayés dans un peu d'eau bouillie et sucrée (avant les tétées). Innocuité absolue.

### Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## LACTÉOL-LIQUIDE

**Composition.** — Culture de bacilles lactiques tyndalisés : environ 53 000 000 pour 1 cc.

**Propriétés.** — Il lutte contre les troubles intestinaux qui sont la règle dans les maladies infectieuses, et, en empêchant la putréfaction intestinale, il limite la production des toxines qui aggravent l'état général. (Produit tyndallisé.)

**Indications.** — Enfants, adultes.

Il est employé pour le traitement intensif. Entérites, Colites et tous les troubles d'intoxication et d'infection intestinales.

**Présentation.** — Le Lactéol-liquide est présenté en ampoules de 5 cc.

**Mode d'emploi.** — 2 ou 3 ampoules par jour dans un verre d'eau sucrée avant les repas, ou mieux dans de l'eau lactosée avec une cuillerée à café de lactose.

**Nourrissons :** 1 ampoule dans un peu d'eau bouillie et sucrée (avant les tétées).

### Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 09-93.)



## LACTÉOL-OVULES

### Composition :

Glycérine .....	8 gr. 10
Bacilles lactiques .....	0 gr. 20

Pour un ovule.

**Propriétés.** — Les ovules au *Lactéol* ont une action émolliente, décongestionnante et antiseptique. Les ferments lactiques exercent une concurrence vitale vis-à-vis des pathogènes et rétablissent la réaction de défense.

**Indications.** — Soins hygiéniques, Action curative : Vulvo-vaginites, Leucorrhées, Métrites, Ulcérations et tous les États inflammatoires.

**Présentation.** — Boîtes de 8 ovules enveloppés chacun dans un papier paraffiné.

**Mode d'emploi.** — Prendre la position horizontale, mouiller l'ovule et l'introduire profondément. Se gar-  
nir à cause du suintement.

Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD  
30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 09-93.)

## LACTÉOL-PANSEMENT

**Composition.** — Culture de bacilles lactiques *tyndallisés* : environ 50 000 000 pour 1 cc.

**Propriétés.** — Dès les premiers pansements : atténuation de la douleur, désodorisation. La plaie manifeste une activité de défense et une vitalité inaccoutumée : exsudats abondants, phagocytose intense ; elle se déterge, se nettoie, les éléments sphacelés sont éliminés et la multiplication cellulaire entraîne une réparation et une cicatrisation sensiblement plus rapides et plus correctes qu'avec les pansements habituels.

**Indications.** — Enfants, adultes.

Traitement des plaies, Brûlures, Eczéma, Ulcères, Phlegmons, Prostatites, Anthrax, Panaris.

Gynécologie : pertes blanches, métrites, ulcérations du col et tous les états inflammatoires.

**Présentation.** — Il est présenté en ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi.** — Il est important que les cellules de la plaie soient en contact avec le produit. S'il y a lieu, bien nettoyer la plaie à l'eau bouillie, *sans antiseptique*, l'arroser ensuite de *Lactéol-Pansement* et la recouvrir avec une compresse imbibée largement.

Gynécologie : pansements avec des tampons ou des mèches imbibés de *Lactéol-Pansement*, ou instillation dans la position couchée (2 ou 3 cc.).

Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD  
30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 09-93.)

## LACTÉOL-SUPPOSITOIRES

### Composition :

Glycérine .....	1 gr. 15
Bacilles lactiques .....	0 gr. 08

Pour un suppositoire.

**Propriétés.** — Action sédative, désinfectante et décongestionnante.

**Indications.** — *Enfants, adultes.*

Constipation chez les adultes et les nourrissons.  
Hémorroïdes, rectites, états inflammatoires.

**Présentation.** — Boîte de 8 suppositoires, enveloppés chacun dans du papier gras.

**Mode d'emploi.** — Pour faciliter l'introduction, tremper le *Lactéol-Suppositoires* dans l'eau froide.

Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD  
30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 09-93.)

## LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques  
sélectionnés, sur lait.

**Dose et mode d'emploi.** — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Thérapeutique digestive par ferments lactiques. Modification du milieu entéral.

**Indications.** — Auto-intoxication intestinale, Entérites, Diarrhées, Dermatoses.

Prix : 14 fr. 10 (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE  
Rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

## LACTOBYL

### Composition :

Sels biliaires.....	0,03
Poudre de muqueuse intestinale.....	0,02
Chabon activé.....	0,02
Poudre de laminaria flexicaulis.....	0,03
Poudre d'aloès.....	0,0245
Extrait d'hyoscyamus muticus.....	0,00215

Pour 1 comprimé.

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 35.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rééducateur intestinal.

**Indications.** — Toutes les modalités de la constipation.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

### Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI°).  
(Tél. Aut. 81-45, lignes groupées.)

## LACTOCHOL

**Composition.** — Ferments lactiques. Sels biliaires.

**Forme.** — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

**Propriétés thérapeutiques.** — Infections intestinales, entérites (Adultes et nourrissons), Insuffisance biliaire.

**Dose et mode d'emploi (Comprimés et Granulés) :**  
**Adultes :** 4 à 12 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalier sans mâcher).

**Enfants :** 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour dans miel, confiture, avant les repas.

**Nourrissons :** 1/2 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

### Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif et cholagogue. Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin et du foie sans la moindre irritation.

**Doses.** — 1 à 2 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau.

**Enfants :** 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 17 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-1.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).  
(Tél. : Ségur 55-12.)

## LACTOPROTÉIDE CARRION

**Composition.** — Lait homogénéisé pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

**Forme.** — Ampoules de 2, 5 et 10 cc.

**Indications et Posologie.** — Les indications sont, dans l'ensemble, celles de la Protéinothérapie :

Infections de nature diverse : générale (gripes, fièvre puerpérale, etc.) ou localisées (suppuration, pyodermites, etc.).

Une injection intramusculaire (jusqu'à 10 cc.) le plus tôt possible, la répéter après 2 à 5 jours.

Anémies : 5 à 10 cc. tous les 5 jours.

Affections oculaires : 5 cc. tous les 2 jours.

Intolérance des enfants au lait de vache : 5 à 10 cc., puis réinjecter par doses progressives : 1/2 cc., puis 2 cc. une heure après, enfin 5 à 10 cc. une heure plus tard.

### Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 13 fr. 50

— de 6 — de 5 cc. : 20 fr. 10

— de 6 — de 10 cc. : 23 fr. 20

Enregistré au L. N. C. n° 514-40.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).  
(Tél. : Anjou 36 45, 2 lignes groupées.)

## LACTO-SÉRUM LAVRIL

Adopté par l'Assistance Publique.

### Cure de DÉSINTOXICATION et DIURÈSE.

Un flacon à jeun, en trois fois, à 20 minutes d'intervalle, pendant 4 à 8 jours. Diète jusqu'à midi. Régime sans laitage. Sucrer ou aromatiser à volonté (café, citron, rhum). Alcaliniser en cas d'intolérance gastrique.

**Indications.** — Troubles hépatiques, cardio-rénaux, intestinaux. Intoxications, azotémie, hypertension. Entérite. Colibacillose. Déséquilibres. Troubles humoraux. Eczéma. Eczéma infantiles.

### DIÈTE (fiévreux, opérés).

Grande cure (de 960 cc.) : 120 cc. toutes les 2 heures. Sucrer, aromatiser, modifier les doses à volonté. Remplace tisane et diète hydrique : Diète des fiévreux, thyphiques. Préparation opératoire. Diète des opérés.

### ENFANTS

Troubles d'assimilation : mélanger 30 % Lacto-Sérum par biberon.

Gastro-entérites, diète : Lacto-Sérum pur toutes les 2 heures. Remplacer le lait ou l'eau par un volume égal de Lacto-Sérum. Réellement par mélange très progressif de Lacto-Sérum et de lait. Cette diète peut être prolongée 8 jours sans perte de poids.

Lacto-Sérum Lavril arrête la Gastro-entérite la plus grave.

**Prix** : boîte de 4 flacons : 41 fr. 40. Flacon grande cure : 26 fr. 80.

Inscrit au L. N. C. M. n° 768-1.

**Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE (Eure).**

Bureaux : 11, rue Anatole-de-La Forge — PARIS. (Étoile 17-49)

## LACTOSMOSE PANSEMENT

### (BOÜILLIE LACTIQUE)

Adopté par l'Assistance Publique.

**UNE POUDRE** (bacilles lactiques) DÉSINFECTANTE.

**UN LIQUIDE** (lacto-sérum isotonique) CICATRISANT.

Remplace les antiseptiques : Désinfection puissante sans oxydation des tissus. Nettoyage des tissus et protéolyse extraordinaire. Cicatrisation des plaies profondes.

Ni dosage, ni précaution, ni contre-indication (sauf greffe).

**Plaies externes** : Saupoudrer, puis appliquer une compresse de sérum. Renouveler les 2 premiers pansements à 24 heures d'intervalle et ne plus changer les compresses, que l'on maintiendra humides en les arrosant extérieurement avec le sérum.

**Pansement vaginal** : Imbiber une mèche, puis la saupoudrer.

**Instillations vésicales** : Mélanger Lacto-sérum avec 10 % de poudre. Instillations quotidiennes de 15 à 30 cc.

**Indications** : Toutes les plaies. Ulcères. Gangrènes. Brûlures. Toutes les indications des antiseptiques.

### Présentation :

Type courant : 8 pansements (ampoules de 15 cc.) et poudre..	38 fr.
Grand modèle : 8 pansements (flacons de 60 cc.) et poudre....	48 fr. 30
Poudre Lactosmose : 1 flacon de 40 cc. de poudre.....	19 fr.

Inscrit au L. N. C. M. n° 768-2.

**Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE (Eure).**

Bureaux : 11, rue Anatole-de-La Forge — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 17-49.)

## LACTOSODINE

### Composition et propriétés thérapeutiques. —

La Lactosodine renferme :

- 1° Des bacilles lactiques sélectionnés : *Bacillus lacticus* de Pasteur (le plus grand producteur d'acide lactique) *Bacille bulgare*.
- 2° Des sels de chaux assimilables qui neutralisent l'action déminéralisante de l'acide lactique.
- 3° Du citrate de soude dont l'action eupeptique et le pouvoir antiémétique ne sont plus à discuter.

### Présentation :

Comprimés : agréablement aromatisés, se dissolvant parfaitement dans un peu d'eau ou de lait tièdes.

**Vitalité et conservation des B. L.** — Ensemencer, avec 2 gr. 50 de poudre de comprimés, 20 cc. de bouillon de touraillons, peptonisé et lactosé : au 4<sup>e</sup> jour, à la température de 37°, l'analyse donne 5 gr. 65 d'acide lactique. Avec des comprimés datant de 9 mois : 5 gr. 40, donc pratiquement la même quantité.

**Indications.** — Toutes affections gastro-intestinales de l'adulte comme du nouveau-né.

Dermatoses d'origine digestive.

Dans les gingivites et les stomatites : on obtiendra une désinfection buccale rapide en suçant, toutes les heures, un ou deux comprimés de Lactosodine.

### Posologie :

**Nourrissons** : 1 à 3 comprimés par jour, dissous dans le lait tiède du biberon ; dans les cas graves d'entérite, la dose pourra être sans crainte augmentée, la Lactosodine étant tout à fait inoffensive.

**Enfants** : de 3 à 10 ans : 4 à 6 comprimés par jour, avant le repas.

**Adultes** : de 4 à 10 comprimés par jour, avant le repas.

**Mode d'emploi.** — Sucrer les comprimés ou les faire dissoudre dans un peu d'eau tiède sucrée.

La Lactosodine assure l'antisepsie du tube digestif sans déminéralisation.

**Laboratoires de l'UROÏDINE**

17 bis, rue Juge — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 41-22.)



## LACTO-SUCRE

### Composition :

Babeurre.....	Ogr. 30	} pour 100 gr.
Poudre de ferments.....	Ogr. 05	
Sucre .....	Ogr. 15	

Poids d'un comprimé : 0 gr. 50.

**Mode d'action.** — Arrêt des fermentations intestinales par acidification du milieu.

**Avantages.** — Haut pouvoir acidifiant de ferments spéciaux inaltérables. Action préparatrice et acidifiante du babeurre. Action anti-infectieuse du saccharose, totalement transformable en acide lactique.

**Indications.** — Infections gastro-intestinales, Maladies infectieuses, Auto-intoxications.

**Mode d'emploi.** — *Nourrissons* : 1 à 4 comprimés par 24 heures.

*Enfants* : 2 à 6 comprimés par 24 heures.

*Adultes* : 6 à 8 comprimés par 24 heures.

**Laboratoires Français de Produits Chimiques et Pharmaceutiques**

40-42, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## LAITANCYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

### Deux formules :

1<sup>o</sup> *Laitancyl simple*, comprimés dragéifiés de laitances de harengs, très riches en phosphore, desséchées dans le vide et à froid, sans goût ni odeur.

Leur action est renforcée par de l'huile de germe de blé (vitamine E), de l'huile de fletan (Vitamine D), de la Cérébrine et de l'inositophosphate de chaux et de magnésie.

2<sup>o</sup> *Laitancyl méthylarsiné*, même formule additionnée d'arrhénal (0,008) et de fenugrec désodorisé et déshuilé.

**Propriétés.** — Le *Laitancyl* est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent aliment phosphoré.

**Indications.** — Anorexie, amaigrissement, surmenage physique et intellectuel, asthénie post-grippale, rachitisme, toutes adynamies et débilités.

### Posologie :

*Adultes* : 4 à 5 comprimés par jour.

*Enfants* (à partir de 7 ans), 3 comprimés.

Prix : 20 francs le flacon de 80 comprimés.

**Laboratoire du Laitancyl: R. PANIER**  
MALO-LES-BAINS (Nord)

Transféré 19, rue de la Chaîne, BAYEUX (Calvados).]

## LAIT CALCIA MOLARD ou CALCIA MOLARD

Lait de vache sucré, additionné de farine et transformé par action du Lactate de chaux, agissant dans des conditions physico-chimiques bien précises pour acquérir les avantages suivants :

Caséine diminuée par rapport aux albumines solubles et donnant un fin coagulum facilement digestible. Présence d'*acide lactique naissant* possédant une action bactéricide progressive et efficace.

C'est un produit possédant un pouvoir thérapeutique actif, un pouvoir nutritif égal à celui du lait de femme et une saveur agréable.

**Indications.** — Pour les vomisseurs, les débiles, les hypothyroïdiques privés du sein maternel

Pour les diarrhéiques, les dyspeptiques, les eczémateux ne supportant pas ou refusant le Babeurre.

**Présentation.** — Consistance liquide, en boîtes ou flacons.

**Mode d'emploi.** — Tel quel, aux mêmes doses que le Lait.

Prix : 6 fr. 50 la boîte.

**Laboratoires MOLARD**  
25, cours Lafayette — LYON.  
(Tél. : Lalande 20-71.)



## LAIT CALCIQUE ZIZINE

Lait sec, partiellement écrémé et décaseiné.

**Forme.** — Poudre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment de transition pour la reprise du régime lacté. Alimentation des nourrissons dyspeptiques et eczémateux.

**Indications.** — Chez les vomisseurs, les diarrhéiques, les dyspeptiques, les eczémateux, les nouveau-nés privés du sein et dans tous les cas d'intolérance lactée,

**Mode d'emploi.** — Pour préparer un biberon, ajouter à 100 cc. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5 p. 100 2 mesures de lait calcique sec. Agiter pour dissoudre.

Pour une quantité supérieure, verser une mesure par 50 cc. d'eau supplémentaire.

Pour la préparation des décoctions farineuses, l'eau bouillie peut être remplacée par une quantité égale de décoction de riz ou d'orge, sucrée ou non, suivant les indications du médecin.

Les bouillies au LAIT CALCIQUE sont préparées avec 50 cc. de bouillie tiède pour une mesure de LAIT CALCIQUE ZIZINE.

Valeur calorique du lait ainsi reconstitué : 685 calories environ.

**Prix :** Petit modèle : 11 fr. 80.

Grand modèle : 31 fr. 10.

**Laboratoires du Dr. ZIZINE**

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 28-96.)

## LACTOMA

## LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT

**Composition.** — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

**Indications et Posologie.** — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

**Enfants :** demi-doses.

**Avantages.** — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable. (Jus de citron facultatif.)

**Présentation et Prix :**

Triple flacon 360 cc. .... 23 fr. 50.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 76-85.)

## LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Antérieurement présenté sous trois formes : lait complet, lait demi-écrémé, lait écrémé (sucré).

*Fabrication réduite pour l'instant au seul lait demi-écrémé sucré.*

**Propriétés.** — Lait en poudre sucré, évaporé dans le vide à basse température (50°), conserve toutes ses vitamines d'origine, ferments, diastases. Extrêmement digestible, il se rapproche du lait maternel par sa coagulation en fins flocons. Dispense de l'adjonction de jus de fruits et de sucre.

**Indications.** — Alimentation des nourrissons. Diététique idéale des bébés privés partiellement, ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

**Mode d'emploi.** — 1 partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties (en poids) d'eau tiède bouillie, soit environ 1 cuillerée à soupe arasée de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau.

**LE LAIT GUIGOZ**

Direction générale à RUMILLY (Haute-Savoie).

(Tél. : 43.)

Dépôt principal à PARIS : 2 et 4, rue Catulle-Mendès.

(Tél. : Galvani 87-47 et 48.)

## LAIT MONT-BLANC

### CONCENTRÉ SUCRÉ

**Caractéristiques et avantages.** — Préparé avec le lait de Savoie comparable aux meilleurs « crus laitiers » suisses, exempt de tous microbes ou germes pathogènes par une pasteurisation minutieuse, concentré sous le vide et à basse température, il constitue une véritable « confiture de lait », riche en vitamines de toutes sortes, de composition constante, de grande valeur nutritive et de digestibilité parfaite. L'adjonction, au cours de la concentration, d'une forte proportion de sucre cristallisé de premier choix, lui assure en toutes saisons et sous tous les climats une conservation parfaite et prolongée.

**Principales indications.** — *En alimentation infantile* : c'est l'aliment idéal des nourrissons normaux privés de lait maternel, ainsi que de tous ceux atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition, d'arrêt de croissance et de rachitisme, et d'une façon générale des prématurés, débiles et intolérants aux autres laits.

— *Chez les grands enfants et les adultes* : En cas d'entérite, de dyspepsie, de tuberculose intestinale ou pulmonaire, ainsi que dans les régimes de suralimentation.

**Posologie et mode d'emploi.** — Pour la reconstitution d'un lait normal, se reporter aux indications figurant sur l'étiquette des boîtes. A titre d'exemple, en ajoutant à une boîte normale de 400 gr. net 900 gr. d'eau bouillie, on obtient un litre 100 de bon lait normal sucré à 150 gr. par litre. — *En alimentation infantile*, pour faciliter le dosage, utiliser le BIBERON MONT-BLANC à large goulot fabriqué en verre résistant aux brusques variations de température.

**Vente.** — Pharmacies, herboristeries et Maisons d'alimentation, en boîtes de 400 grammes nets. Littérature et prix sur demande.

### COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT

RUMILLY (Haute-Savoie).

## LAMBARÈNE

**Composition.** — Extrait sec de racines de *Tabernaemontana* Manetti, dosé à 0 gr. 20 par tablette chocolatée, 0 gr. 10 par comprimé, 0 gr. 40 par ampoule injectable et suppositoire « Adultes », 0 gr. 10 par suppositoire « Enfants ».

**Action thérapeutique.** — Stimulant neuro-musculaire, oriente les combustions cellulaires et efface la fatigue. Action toujours prolongée et non suivie de dépression. Antitoxique.

**Indications.** — *Dépressions et asthénies* physiques et intellectuelles, *convalescences* de maladies et d'opérations, *maladies infectieuses*, *intoxications*, *névrites retrobulbaires*, *sédentarité* et *cellulites*, effort physique ou intellectuel anormal à fournir par un sujet sain, *résistance à la sous-alimentation*.

**Doses et mode d'emploi.** — *Tablettes* (à laisser fondre dans la bouche), 1 à 6 par jour. — *Comprimés* (à avaler), 1 à 12 par jour. — *Suppositoires* « Adultes et Enfants », *Ampoules*, 1 à 3 par jour. Pratiquement pas de contre-indications. Peut être administré aux hypertendus.

**Recommandations importantes.** — Faire prendre les tablettes et comprimés avant les repas du matin et de midi et éviter d'employer les suppositoires et ampoules le soir, sauf si l'on veut se livrer à un travail nocturne.

Éviter d'absorber de l'alcool en même temps que le Lambarène.

**Prix** (Boîtes de 24 tablettes, de 50 comprimés ou de 12 amp. 29 fr. 60 Boîte de 10 suppositoires « Adultes » ..... 25 fr. 60 Boîte de 10 suppositoires « Enfants » ..... 20 fr. 90

laboratoires d'Études et de Réalisations Pharmaceutiques de Paris « ÉTREFA »

• R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZY, Pharmaciens.

**Administr.** : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)  
Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## LANCERYL

**Composition.** — Formule de Lancereaux :

Digitale Standard .....	} à 0,05.
Scille .....	
Scammonée .....	

**Avantages.** — Composants stabilisés et titrés physiologiquement. Complexe préparé à l'abri de toute humidité conservant une valeur thérapeutique constante.

**Action.** — Poni-cardiaque, diurétique albuminurique et azoturique stimulant hépatique.

**Indications.** — Cardiopathies subaiguës et chroniques, œdèmes périphériques, rétention chlorurée et azotémique, cirrhoses, congestions du foie et toutes affections hépatiques.

**Posologie.** — 3 à 5 pilules par jour pendant 10 jours. Arrêter 5 jours et recommencer. Dose pouvant être modifiée au gré du médecin traitant, car LANCERYL est de prescription uniquement médicale.

LANCERYL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1009-1.

Prix : 24 fr. 40 (arrêté 2099 du 6-2-42).

Laboratoires E. MOREAU, Pharmacien

18, rue Saint-Martin — PARIS.

(Tél. : Turbigo 87-05.)

## LANTOL

Anti-infectieux omnivalent.

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium (Procédé Couturier); en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules.

**Action thérapeutique.** — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque une *hyperleucocytose intense et durable*, suivie de la destruction des germes infectieux. Peut être associé à tout autre traitement anti-infectieux.

**Indications.** — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux hyperthermiques.

**Enfants** : Une à deux ampoules par jour en injection ou en lavement à conserver.

Prix : 40 fr. 30 pour 1 à 8 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. Carnot 18-75.)

## LARISTINE « ROCHE »

**Composition.** — Solution isotonique neutre et stérilisée à 4 p. 100 de chlorhydrate d'histidine.

**Propriétés.** — Traitement biochimique de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale d'après les travaux des professeurs A.-G. Weiss et E. Aron, qui ont mis en évidence l'action anti-ulcéreuse remarquable de l'histidine. Régression rapide sans régime strict de tous les symptômes, douleurs, hémorragies, vomissements, susceptibilité gastrique. Reprise immédiate de l'état général.

**Indications.** — Ulcère gastro-duodénal sous toutes ses formes, Préparation à l'intervention, Consolidation des résultats opératoires et aussi Angor, Asthme, Epigastralgies, Rhume des foins, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — 1 ampoule de 1 cm<sup>3</sup> = 0,04 monochlorhydrate d'histidine ; 1 ampoule 5 cm<sup>3</sup> = 0,20 monochlorhydrate d'histidine. Une injection quotidienne intramusculaire ou sous-cutanée d'une ampoule de 5 cm<sup>3</sup> ou intradermique d'une ampoule de 1 cm<sup>3</sup> pendant trois semaines environ.

Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

**Présentation.** — Ampoules de 5 cm<sup>3</sup> et 1 cm<sup>3</sup> : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-65.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Arch. 91-10)

## LAROCAÏNE « ROCHE »

Chlorhydrate du 1-paraaminobenzoyl-2-2-diméthyl-3-diéthyl-amino-propanol.

**Action thérapeutique.** — Anesthésique local ayant toute l'activité de la cocaïne.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les indications sans exception de la cocaïne. Anesthésies de surface et par infiltration. Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, urologie, stomatologie, chirurgie.

**Avantages.** — Anesthésique synthétique local deux fois plus actif et moins toxique que la cocaïne. Effets secondaires pratiquement nuls. Pas de danger de narcomanie. Pas au tableau B. Pas d'irritation des tissus ni d'action mydriatique.

**Posologie et modes d'emploi.** — Mêmes utilisations aux mêmes doses que la cocaïne. Solutions faciles à préparer, à stériliser ou à tyndalliser. On peut l'employer également en pommades, suppositoires, collutoires, ainsi que dans la préparation du liquide de Bonain.

### LAROCAÏNE « ROCHE »

Poudre (tubes de 5 et 25 g.).

Étant donnée la diversité des concentrations à employer (0,25 à 30 p. 100), la Larocaïne n'est présentée que sous la forme du produit en nature.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 504-55:

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Archives 91-10)

## LAROSAN « ROCHE »

**Composition.** — Caséine-Calcium. Spécifique de la diarrhée infantile.

**Propriétés.** — Alcalinisation du milieu intestinal, suppression du petit lait, apport minimum de sucre, taux élevé de caséine.

**Indications.** — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (diarrhée simple, hémorragique, verte, infectieuse, cholériforme, diarrhées de dentition, de sevrage, athrepsie, etc.). Diarrhées toxiques des enfants et des adultes, États dyspeptiques des adultes, Ulcère de l'estomac, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — On prépare des mélanges : eau bouillie, lait, Larosan, contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Poudre : boîte de 100 g.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-20.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Arch. 91-10)

## LAROSCORBINE « ROCHE »

**Soutien Indispensable de l'organisme carencé.**

**Composition.** — Acide l-ascorbique. Vitamine C synthétique cristallisée.

**Propriétés.** — Favorise tous les phénomènes d'oxydo-réduction au cours des divers processus biologiques. Action anti-infectieuse et antitoxique très nette. Joue un rôle évident de désensibilisateur (allergies).

**Indications.** — Décalcification des os et des dents, Altération des vaisseaux, Troubles de la nutrition au cours de la grossesse, Anémie et troubles de la croissance des nourrissons, Diathèses hémorragiques, Maladie des capsules surrénales et pigments cutanés, Hémorragies du vitré, Rétinite pigmentaire, Scorbut infantile, Anaphylaxie, etc.

La fréquence de l'hypovitaminose C a pu être constatée par un simple test et par une méthode simplifiée de titration qui repose sur la réduction, par la vitamine C, du *dichlorophénol-indophénol* qui est transformé en leuco-dérivé incolore.

**Posologie et modes d'emploi.** — *Comprimés* à 50 mg. d'acide l-ascorbique, 1 à 4 par jour. — *Ampoules de 2 cm<sup>3</sup>* à 100 mg. d'acide l-ascorbique, 1 à 2 par jour, sous-cutanées ou endoveineuses. — *Ampoules de 5 cm<sup>3</sup>* à 500 mg. d'acide ascorbique (dosage fort), 1 par jour, et plus, sous-cutanées ou endoveineuses.

*Ampoules de 2 cm<sup>3</sup>* : boîte de 6 ; *Ampoules de 5 cm<sup>3</sup>* : boîte de 3 ; *Comprimés* : tube de 20.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 504-71 (comprimés), 504-72 (ampoules de 2 cm<sup>3</sup>) et 504-89 (ampoules de 5 cm<sup>3</sup>).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Arch. 91-10)

## LASAL

Spécifique des maladies des voies respiratoires et de leurs convalescences.

**Propriétés.** — Antiseptique pulmonaire et en même temps reconstituant par l'association d'un tonique (Gleflina) (voir ce mot). Bonne saveur, ne provoque pas d'intolérance.

**Composition.** — Ortosulfogalcolate de potassium, sirop de sève de pin, de goudron, de baume de tolu, associés à une partie de Gleflina reconstituant (voir ce mot).

**Indications.** — Toutes affections des voies respiratoires et particulièrement leurs convalescences, bronchite chronique, rougeole, coqueluche, tuberculose, grippe, etc.

### Posologie:

*Enfants* : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.  
— 6 à 10 ans : 2 à 3 — à dessert par jour.  
— 11 à 15 ans : 2 — à soupe par jour.  
*Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

LASAL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 689-12.

Prix du flacon : 24 fr. 90.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Fabrication et vente réduites.

Laboratoire du GLEFLINA,  
348, rue Saint-Honoré — PARIS.

## LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

**Indications.** — En chirurgie, gynécologie, obstétrique brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale.

**Mode d'emploi.** — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

**Doses.** — Suivant les indications.

Le litre : 12 fr. 20. — Le demi-litre : 7 fr. 60.

**Formes actives.** — SAVON LAURÉNOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURÉNOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURÉNOL (affections de la peau).

LAURENOL N<sup>o</sup> 2, désinfectant, sans odeur ni mercure. Savon Laurénol 4 fr. 90. — Savon dentifrice : 7 fr. 30.

Laurénol n<sup>o</sup> 2 :

Le flacon G. M. : 7 fr. 30. — P. M. : 4 fr. 90.

Laboratoires BELIÈRES  
19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>),

## LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.  
Poudre cristalline d'un goût très agréable.

### Posologie:

**Nourrissons:** 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

**Enfants:** 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

**Adultes:** 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Prix : 20 fr. 60.

### Laboratoires LIOARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## LAXASEPTOL

Trois présentations :

### GRANULÉ SIMPLE

#### GRANULÉ BILIÉ pour enfants.

Constipation. Antisepsie intestinale légère. Insuffisance hépatique. Intoxications alimentaires. Affection à point de départ intestinal.

**Posologie.** — 1 à 2 ans : 1/2 cuillerée à café le soir ; 2 à 5 ans : 1 cuill. à café ; 5 à 12 ans : 2 cuill. à café.

#### DRAGÉES pour les adultes.

Laxatif non irritant. Constipation chronique ou passagère. Rééducation de l'intestin. Laxatif de choix pendant la grossesse.

**Posologie.** — De 1 à 3 dragées le soir au coucher.

**Formule.** — Diacétylisatine avec ou sans bile.

Ne contient pas de Phénolphtaléine.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-3-4-5.

### Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BÉTHUNE  
(Pas-de-Calais).

## LAXATIF GOBEY

Sirop sec.

**Composition.** — Principes actifs exclusivement végétaux, incorporés dans un excipient de saveur agréable à base de sucs de fruits.

**Propriétés.** — Laxatif d'action douce et constante.

**Présentations.** — Granulé à croquer ou à faire fondre dans un peu d'eau.

**Indications.** — Nourrissons, Enfants, Femmes enceintes, Opérés, Vieillards.

**Posologie.** — **Adultes:** 1 à 2 cuillerées à dessert avant le coucher. **Enfants:** 1 à 2 cuillerées à café, selon l'âge et les effets désirés. **Nourrissons:** 1/2 à 1 cuillerée à café dissoute dans un peu d'eau.

**Prix au public:** La boîte..... 21 fr.

### Les Laboratoires du Dr ROUSSEL.

Laboratoires Gobey.

S. A. au capital de 880 000 francs.

R. C. Seine 223.195 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

## LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

### PASTILLES MIRATON CHATEL-GUYON. —

Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

**Dose.** — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

Prix : la boîte, 9 fr. 50.

Pour un traitement de 20 à 30 jours.

### GRAINS MIRATON CHATEL-GUYON. — Sels

de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

**Dose.** — 1 à 2 grains au repas du soir.

Prix : le flacon, 11 francs.

Pour un traitement de 30 à 50 jours.

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 218-7

(grains) et n° 218-8 (pastilles).

Littérature et échantillons :

### Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

## LAXIOR

### LAXATIF. CHOLALOGUE.

Rééduque l'Intestin.

**Indications.** — Traitement rationnel de la Constipation sous toutes ses formes : Atonie intestinale, Entérocélite, Spasme intestinal, Insuffisance biliaire.

**Composition.** — Agar-Agar pulv., Ferments lactiques, Entérokinase, Extrait biliaire, Aloès pulvérisé, Extrait de cascara.

**Propriétés.** — A pour but de rééduquer l'intestin. Ce n'est donc pas un purgatif ni un simple laxatif d'action mécanique ou drastique. Son emploi est indiqué dans tous les cas de constipation chronique et son action est douce, sans accoutumance ni douleurs.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés par jour, de préférence avant ou après le repas.

Prix : 14 francs la boîte de 60 comprimés.

Echantillon sur demande aux :

**Laboratoires PILLIER**

8-10, rue Masséna — NICE (Alpes-Maritimes).

## LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines. Citrate de soude, Eueptiques, poudre agréable à prendre.

**Mode d'emploi.** — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans lait ou eau bouillie.

*Enfants* : doubler ou tripler les doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur des fonctions digestives, antiseptique intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes enfants.

**Indications.** — Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infectieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomissements du nourrisson et de l'adulte, Constipation infantile.

Prix : le flacon 15 francs.

Pour un traitement de un mois environ.

**Établissements SOUDAN**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 405-4.

## LAXO-SULFURYL

Médication sulfurée, laxative et cholagogue.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

### Composition :

Soufre lavé .....	0,04
Evonymine .....	0,05
Extrait de Jusquiame .....	0,01
Agar-Agar .....	0,05
Extrait de Bourdaine .....	0,02
Bile desséchée .....	0,07
Extrait de glandes intestinales .....	0,03
Silicate d'alumine et de soude sulfuré...	0,03
Pour 1 dragée	

**Indications.** — Affections du foie et de l'intestin, Constipation, Dermatoses.

**Posologie.** — 1 à 4 comprimés par jour, au repas du matin ou à celui du soir, suivant indications du médecin. Avaler sans croquer.

Prix : 18 fr. 70 la boîte.

**MONAL, Docteur en Pharmacie,**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Inv. 52-73.)

## LAXO-THIORINE

**Désintoxicant. Désensibilisant. Laxatif.**

Soufre, Hyposulfites Na et Mg, Extraits biliaires, Pancréatine, Extraits d'Artichaut, de Boldo, Aloïne, Poudre de Belladone.

**Indications.** — Auto-intoxication par stase intestinale. Accidents anaphylactiques, Insuffisance hépatique, Migraines, Dermatoses, Acné, Urticaire, Eczéma, Constipation.

1 à 4 comprimés par jour.

Boîte de 50 : 15 fr. 25.

**Laboratoire de la SULFO-THIORINE**

**J. DEDIEU, Pharmacien**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

## LÉCIFLÉTONE

Solution naturelle de Vitamine A, Vitamine D.

En synergie avec les Phosphatides de l'œuf.

**Indications.** — États carentiels et précarentiels, États infectieux, Prétuberculose, Troubles du métabolisme du calcium, Anémie, Anorexie, Grossesse, Convalescence.

### Formule :

Vitamine A .....	250 000 U. I.	} pour 100 gr.
Vitamine D .....	62 500 U. I.	
Ovo-Lécithine .....	1 gr.	

Par suite de l'impossibilité actuelle d'obtenir les huiles naturelles aux très fortes concentrations d'autrefois, la posologie du LÉCIFLÉTONE doit être provisoirement multipliée par quatre, elle s'établit en moyenne comme suit :

*Nourrissons* : VIII à X gouttes, par jour.

*Enfants* : XX à XL gouttes, par jour.

*Adultes* : LX à C gouttes, par jour.

**Conditionnement provisoire** : flacon de 60 cc.

### Laboratoire JOUENNE

234, rue des Pyrénées — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine  
par cuillerée à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle; Chlorose, diabète, rachitisme; Convalescences longues et pénibles.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 20 francs.

### Produits GONNON

J. et O. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

## LEMONAI

**Granulé stable très agréable.**

**Composition.** — Chaque cuillerée à café contient :

Citrates trisodique et monosodique .. 0 gr. 50

Iodure de Sodium ..... 0 gr. 05

Granulé sucre friable spécial stable. Q. S.

**Propriétés.** — Antivisqueux, Fluidifiant de la circulation sanguine, Antiépéthorique, Décongestif, Chocogogue.

**Indications.** — Troubles de la circulation artérielle et veineuse, tous états congestifs, hyperviscosité, hypertension, arthritisme et ses séquelles.

**Présentation et prix.** — La boîte de granulés : 22 francs.

**Posologie.** — *Traitement classique* : 1 cuillerée à café avant les deux principaux repas.

*Traitement d'attaque* : 1 et même 2 cuillerées à café le matin à jeun avec un jus de fruit ou un verre d'eau minérale. En plus 1 cuillerée à café avant la collation du soir.

Enregistré L. N. C. : n° 1483-1.

Echantillons et Littérature :

### Laboratoires Biochimiques de l'Est

J.-H. FRECHIN

Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur,  
LURE (Haute-Saône).

## LENADRYL

(Huile rhinologique)

**Composition.** — Antiseptiques végétaux, camphre, eucalyptol, terpinéol, en solution huileuse spéciale adrénalino-éphédrinée (formes lévogyres).

**Propriétés.** — Synergie lénifiante, vaso-constrictive, décongestive et antispasmodique. Bactéricide, analgésique, cicatrisant. Ni caustique, ni toxique. Ne dessèche pas la muqueuse.

**Indications.** — Coryzas aigus et chroniques, rhumes des foins, sinusites, ozène, trachéites, laryngites ; inflammations et infections du rhino-pharynx, asthme.

### Mode d'emploi. — Formes :

*Flacon compte-gouttes spécial* : X à XII gouttes matin et soir dans chaque narine, la tête penchée en arrière et du côté de la narine traitée.

*Capsules nasales* :

*Adultes et auto-injections* : 1 capsule dans chaque narine.

*Enfants* : une demi-capsule dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).



## LÉNIBAR

Lénifiant Baryté

Pansement gastro-intestinal à grand pouvoir cuvrant ; remplace *avantageusement* le bismuth.

### LÉNIBAR POUDRE

**Principes actifs.** — Sulfate de baryte précipité, oxyde de titane à propriétés colloïdales.

**Indications.** — Ulcères gastro-duodénaux (traitement intensif), Crises aiguës d'hyperchlorhydrie, Spasmes, Gastrites, Côlites.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 3 sachets par jour.

*Enfants* : demi-doses.

Le matin à jeun, 1/2 heure avant les repas et au moment des douleurs, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, jamais chaude.

**Prix** : 28 fr. 50 la boîte-portefeuille... 16 sachets.  
79 fr. 90 la boîte grand modèle. 50 sachets.

### LÉNIBAR POUDRE BROMURÉ

(avec 0,25 de bromure par sachet.)

Spécialement contre spasmes.

Même présentation. Même prix.

### LÉNIBAR GRANULÉ

**Principes actifs.** — Sulfate de baryte précipité oxyde et peroxyde de zinc et charbons activés.

**Indications.** — Douleurs gastro-intestinales (traitement usuel), Hyperchlorhydrie, Entérites, Fermentations.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : demi-doses.

Le matin à jeun, 1/2 heure avant les repas et au moment des douleurs.

Croquer ou avaler avec 1/2 verre d'eau.

**Prix** : 18 fr. 70 la boîte de 100 gr.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).  
Tél. : MAL. 00-32.

## LÉNICADE

Topique à l'Huile de Cade.

**Propriétés thérapeutiques.** — C'est un agent de transformation, de rénovation et de réfection épidermique. Le Lénicade jouit d'une grande puissance de pénétration et d'un grand pouvoir kératolytique.

**Indications.** — Dermatoses sèches, Parakératoses, DARTRES.

**Mode d'emploi.** — Nettoyer la région malade. Étendre le LÉNICADE en couche un peu épaisse. Faire une application matin et soir.

### Laboratoires BRISSON

D<sup>r</sup> DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## LENIENTOL

**Composition.** — Seule préparation présentant sous la forme liquide l'association médicamenteuse : phényléthylmalonylurée et tartrate borico-potassique. — Sans bromure.

**Indications.** — Mal Comitial, Epilepsie, Crises nerveuses, Insomnies, Angoisse, Spasmes divers, Chorée, Troubles névropathiques en général, etc.

### Deux formes :

**Lenientol adultes.** — Prix : 28 fr. 20.

Une cuillerée à soupe contient :

Phényléthylmalonylurée ... 0,05 cgr. } 1 flac. dure  
Tartrate borico-potassique. 0,50 cgr. } env. 20 jours.

**Lenientol infantile.** Prix : 20 francs.

Une cuillerée à café contient :

Phényléthylmalonylurée.... 0,01 cgr. } 1 flac. dure  
Tartrate borico-potassique. 0,10 cgr. } 20 jours.

Enregistré au L. N. C. n° 2003-1 et 2003-2.

### Laboratoire DEMOULIN

27, rue Brézin — PARIS (XIV<sup>e</sup>). — (Tél. : Ségur 76-90.)  
et Grossistes.

## LÉNIFÉDRINE (Huileuse)

**Composition.** — Huile antiseptique à l'Oléate d'Ephédrine. Solution *faible* à 0 gr. 50 % et solution *forte* à 1 gr. %.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires supérieures : Coryzas spasmodiques, Rhinites arthritiques, Sinusites.

**Présentation.** — Se vend :

- 1° En flacons ;
- 2° En rhino-capsules pour auto-injections nasales ;
- 3° En vaseline ;
- 4° En pommade.

### Prix :

Flacon .....	18 fr. 70
Rhino-capsules .....	15 francs
Vaseline.....	15 francs
Pommade.....	15 francs

## LÉNIFÉDRINE (Aqueuse).

**Composition.** — Solution aqueuse de Camphorate d'Ephédrine et de Para-oxy-benzoate de méthyl.

Solution *faible* à 0 gr. 50 % et solution *forte* à 1 gr. %.

**Indications.** — Coryzas spasmodiques, Asthme, Sinusites, Rhinites arthritiques.

**Présentation.** Flacon. — **Prix : 18 fr. 40.**

**L. GAILLARD, Pharmacien**

26, rue Pétreille — PARIS (IX°).

## LÉNIFORME

**Composition.** — Huile à 2, à 5 et à 10 % d'Essences végétales antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

**Présentation.** — Se vend

- 1° en *Flacons* ;
- 2° en *Rhino-Capsules* pour auto-injections nasales ;
- 3° en *Vaseline* ;
- 4° en *Pommade*.

### Prix :

Flacon .....	15 francs
Rhino-Capsules .....	13 fr. 50
Vaseline.....	12 fr. 40
Pommade .....	12 fr. 40

**L. E. V. A. — L. GAILLARD, Pharmacien**  
26, rue Pétreille — PARIS (IX°).

## LEPTAB

Évacuant intestinal, spécifique du péristaltisme.

**Comprimé** à base de : résine pure de jalap, résine de scammonée, scille, badiane, sans action drastique.

**Action.** — Synergie médicamenteuse, évacue rapidement le contenu septique de l'intestin, assure la disparition du *Colmatage du grêle*.

**Indications.** — Toutes affections de l'appareil digestif, avec retard du transit, et leurs conséquences : constipation, ballonnement, aérophagie, migraines, névralgies, affections cutanées, acné, eczéma, urticaire, etc.

**Présentation.** — Deux modèles sous boîte aluminium 13 fr. 40 (8 jours) ; 36 fr. 20 (1 mois). Enregistré au L. N. C. sous le n° 1039-3.

**Laboratoires A. V. E.**

81, quai Valmy — PARIS (X°).  
(Té. : Nord 69-01.)

## LEPTOL

Les premiers comprimés laxatifs français à base de Leptandrine (extrait du Rhizome de *Leptandra*).

Rééducateur de la fonction

Hépto-Intestinale.

Ne contient pas de Phénolphtaléine.

Laxatif doux mais actif. . { pas de coliques.  
pas d'irritation.  
aucune toxicité.

Peut être donné en période de grossesse et d'allaitement.

1/2 à 2 comprimés le soir au dîner.

Augmenter ou diminuer la dose suivant effet.

Laboratoires du LEPTOL

## LEUCAGINE SULFAMIDÉE

(sans radium).

Traitement des métrites.

1<sup>o</sup> Crayons utérins: souples, taillés en pointe, faciles à introduire, ne traumatisant pas la muqueuse, d'un diamètre moyen de 4 mm., dosés à 0 gr. 50 de sulfamide (1162 F.) et 0 gr. 10 d'argent colloïdal.

La boîte de 5 crayons : 34 fr. 50.

2<sup>o</sup> Ovules: de petit format. Dosés à 1 gr. de sulfamide (1162 F.) et à 0 gr. 10 d'oxyquinoléine (antimycosique).

La boîte de 6 ovules : 34 fr. 50.

Doses. — 1 crayon tous les 2 ou 3 jours.  
1 ovule chaque jour.

N. B. — Les ovules de Leucagine sulfamidée remplacent les anciens ovules radifères qui sont supprimés. Par contre, les crayons de Leucagine radifères sont toujours présentés aux doses de 1, 3 et 5 micros (10 micros supprimés).

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél.: Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Prix : 33 fr. 50 pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Oh. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél.: Carnot 18-75.)

## LEXIODE (EX-IODOCITROL)

Médicament unique par sa composition et son dosage, d'efficacité certaine dans toutes les maladies de la circulation.

Composition. — Triple association d'iode organique, de citrate monosodique (obtenu en partant du jus de citron frais et d'extrait d'hamamelis (de la plante fraîche stabilisée).

Indications. — Tous les troubles circulatoires, hyperviscosité sanguine, hypertension, vertiges, scléroses. Rhumatisme chronique, obésité, plethore et intoxications. LEXIODE maintient jeune. Aucune contre-indication.

Présentation. — Forme liquide et forme comprimés.

Liquide. — Une cuill. à café par j., au repas de midi seulement, dans 1/2 verre d'eau sucrée (0 gr. 20 d'iode; 1 gr. Citr. de Na; 0 gr. 10 Extrait hamamelis par cuillerée à café).

Comprimés. — 4 à 6 par j., en 2 fois, aux repas de midi et du soir (0 gr. 02 d'iode; 0 gr. 10 Citr. de Na; 0 gr. 025 Extrait hamamelis par comprimé).

Prix de vente, liquide ou comprimés : 23 fr. 50.

Le liquide ou les comprimés permettent un traitement de 20 jours.

Laboratoires CODY

BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze).

(Tél.: 31.)

## LICARDET

Vernis soluble antiseptique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Solution alcoolique de coaltar, riche en leucol. Le Licardet est un réducteur, un agent kératoplastique et un décongestif. Il forme sur l'épiderme une pellicule souple qui se prête à tous les mouvements et isole la lésion des contacts extérieurs.

**Indications.** — Prurits, Prurigo, Névrodermites, Plaies atones.

**Mode d'emploi.** — Étendre le vernis avec un pinceau. Laisser sécher et poudrer. Pour l'hygiène de la femme, comme antiseptique et décongestif, une cuillerée à soupe par litre d'eau.

**Laboratoires BRISSON**

D<sup>r</sup> DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

**Médicament de la nausée et des vomissements nauséux.**

**Forme.** — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

**Doses.** — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

**Mode d'emploi.** — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

**Indications.** — *Toutes les nausées*, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. *Nausées d'origine psychique* (émotions, dégoûts), *d'origine auriculaire* (vertiges), *d'origine digestive*, pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.

**Contre-Indications.** — Aucune. Médicament atoxique.

Prix : 15 fr. 30.

**Laboratoires DUCLOY et Cie.**

ARQUES (Pas-de-Calais).

## LIKAN ASIATIQUE

Traitement de la Constipation et des Affections hépato-biliaires.

**Composition.** — Agar-Agar, Gracillaria Lichenoides Asiatica, Extraits biliaires sélectionnés, etc.

**Action.** — Rééducateur mécanique et opothérapique des fonctions intestinales par l'hydratation des produits végétaux, l'action cholagogue et cholérétique de la bile purifiée et dépigmentée, et des matières mucilagineuses.

Aucune contre-indication, sauf l'appendicite déclarée.

Aucune accoutumance.

**Posologie et forme.** — De 1 à 3 dragées au lever ou le soir au coucher. Avaler sans croquer.

Prix : 16 francs la boîte de 35 dragées.

**Laboratoires ORÉXYL**

Paul PHILIPPE, Docteur en Médecine, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

5, rue Mazarin — LYON.

## LIMOL CHURCHILL

Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de chaux et de phosphore au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable, Recalcifiant idéal.

**Indications.** — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

**Mode d'emploi — Adultes :**

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

**Ampoules 3 cc.** pour injections intraveineuses chaque deux jours.

**Enfants :** Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 60.

PRODUIT FRANÇAIS

Enregistré au L. N. C. n° 225-1

Laboratoire des Produits du D CHURCHILL

P. DESCHAMPS, pharmacien

92, avenue Saint-Mandé — PARIS (XII<sup>e</sup>). (Tél. : Diderot 74-02.)

## LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée  
au Citrate basique de Magnésie.

**Avantages.** — Seule limonade liquide au citrate basique de Magnésie susceptible de conservation.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées ni coliques.

**Formes.** — Flacon pour adultes de 100 cc.; flacon pour enfants de 50 cc.

**Mode d'emploi.** — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue d'une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 8 fr. 20 ; flacon pour enfants : 5 fr. 90.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n° 704-1 et 704-2.

**Laboratoires P. et A. GODFRIN**

(Docteurs en Pharmacie).

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 04-48.)

## LIMONADE MOULIN

Au Citrate de Magnésie, en solution carbonatée sodique.

La seule limonade au Citrate de Magnésie stabilisé en milieu acide.

Le flacon de 200 cc. pour adultes est dosé à 50 gr. de Citrate de Magnésie.

Le flacon de 100 cc. pour enfants est dosé à 25 gr. de Citrate de Magnésie.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS.

## LINIMENT LONGUET

**Composition.** — A base de teintures de Kaempferia et de Hoang-Nan, renfermant de la strychnine, de la brucine et des essences (éther éthylique de l'acide méthoxycinnamique, bornéol, carène et méthoxystyrène).

**Indications.** — Douleurs musculaires et articulaires, torticolis, névralgies, lombalgies, Engelures.

**Mode d'emploi.** — Frictions ou compresses de 1/3 liniment pour 2/3 d'eau chaude sur la partie douloureuse.

Prix : 18 fr. 70.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## LIPAUIROL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

**Mode d'emploi.** — Faire chaque semaine 2 injections intramusculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

**Durée du traitement.** — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

**Présentation.** — En boîtes de 3, de 6 ou de 12 ampoules de 1 ou 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

**Prix de vente au public :**

La boîte de 3 ampoules de 1 cc....	28 fr. 75
La boîte de 3 ampoules de 2 cc....	45 fr. 15
La boîte de 6 ampoules de 1 cc....	51 fr. 75
La boîte de 6 ampoules de 2 cc....	86 fr. 80
La boîte de 12 ampoules de 1 cc....	95 fr. 45
La boîte de 12 ampoules de 2 cc....	152 fr. 60

L. N. C. 463-9.

**Laboratoire L. LEOOQ**

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## LIPIODOL LAFAY

Huile d'œuflette iodée à 40 p. 100 contenant 54 cgr. d'iode par cc.

### EMPLOIS EN THÉRAPEUTIQUE

**1° Action générale :** Le Lipiodol permet, grâce à son élimination progressive, de réaliser une impregnation iodée de longue durée et d'intensité constante au moyen de prescriptions discontinues. Il en résulte une efficacité plus grande et l'absence de risques d'accidents d'iodisme.

**Indications.** — Arterio-sclérosé, Hypertension, Rhumatisme, Lymphatisme, Asthme, Syphilis tertiaire, Mycoses.

Voie buccale : 8 à 20 jours par mois — 2 à 5 unités par 24 heures.

Voie intramusculaire : 10 à 20 cc. par mois en 2 à 10 injections.

(Voir ci-dessous Lipiodol « F » fluide.)

**2° Action locale :** Injections : Sciatique, Lumbago, Algies diverses, etc. Pommade : Adénopathies, Plaies atones, Plaies infectées, Escarres, Staphylococcie, Erysipèle, Erythrasma.

### EMPLOIS EN RADIOLOGIE

Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier : Exploration du Système nerveux, des Voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des Voies biliaires, des Abcès, Fistules, etc.

(Voir ci-dessous Lipiodol « F » fluide.)

#### Présentations :

**Voie buccale.** — Capsules : 1 cap. = 20 cgr. d'iode 2 à 4 par 24 heures.

Flacons de 50 et 25. **Prix :** 35 fr. 70 et 20 fr.

**Emulsion :** 1 c. à café = 20 cgr. d'iode 2 à 5 par 24 heures.

Flacons de 250 et 125 gr. **Prix :** 40 fr. et 21 fr. 40.

**Comprimés chocolatés :** 1 com. = 4 cgr. d'iode, 2 à 5 par 24 heures.

Boîtes de 50. **Prix :** 21 fr. 40.

**Usage externe.** — Pommade : Tube de 25 gr. **Prix :** 21 fr. 40.

**Injection.** — Ampoules de Lipiodol à 40 p. 100 (Lipiodol descendant).

#### Prix :

8 de 2 cc .....	41 fr. 40
4 de 5 cc .....	45 fr.
1 de 10 cc .....	20 fr.
1 de 20 cc .....	40 fr.

Le Lipiodol Lafay existe à des concentrations en iode inférieures :

Lipiodol à 20 p. 100, Lipiodol à 10 p. 100 (Ascendant). Mêmes présentations.

## LIPIODOL "F" FLUIDE

Esters éthyliques des acides gras de l'huile d'œuflette, iodés à 40 p. 100 (52 cgr. d'iode par cc.).

6 fois plus fluide que le Lipiodol Lafay, le Lipiodol « F » s'injecte à la seringue et pénètre dans les fins trajets à explorer avec une facilité plus grande.

**Indications.** — Mêmes indications thérapeutiques et radiologiques que celles du Lipiodol Lafay. Il est cependant préférable de ne pas l'utiliser pour l'exploration des espaces sous-arachnoïdiens.

**Présentations.** — Ampoules de Lipiodol « F » fluide à 40 p. 100.

#### Prix :

8 de 2 cc .....	50 fr.
4 de 5 cc .....	52 fr. 80
1 de 10 cc .....	26 fr. 40
1 de 20 cc .....	50 fr.

Laboratoires A. GUERBET et C<sup>ie</sup>

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Montmartre 22-56.)

## LIPO-ANTIGÈNES-LIPOIDES

**Composition.** — Antigène méthylique pur (1/10 de cc. par ampoule de 3 cc.). Cholestérine, Eucalyptol, Goménol.

**Propriétés.** — Emulsion d'une parfaite stabilité, conservation remarquable du pouvoir antigénique. Résorption progressive évitant toute action de shock. Agissant électivement sur le système lymphatique et sur les poumons, organes destructeurs des graisses.

Puissant modificateur du terrain, stimulant de la nutrition. Réalise une thérapeutique d'action générale et spécifiquement locale. Pas de contre-indication.

**Posologie.** — *Adultes :* tuberculose pulmonaire, 1 injection sous-cutanée de 2 cc. par semaine. Tuberculose externe, 1 injection sous-cutanée de 3 cc. tous les deux jours.

<i>Enfants :</i> de 2 à 3 ans .....	0 cc. 5
de 3 à 5 ans .....	0 cc. 8
de 5 à 7 ans .....	1 cc.
de 7 à 9 ans .....	1 cc. 5
de 9 à 11 ans .....	1 cc. 6
de 11 à 13 ans .....	2 cc.
de 13 à 15 ans .....	2 cc. 5
de 15 à 17 ans .....	3 cc.

### Laboratoire des LIPO-VACCINS

du Docteur LE MOIGNIC

32, rue de Vouillé et 1, rue Santos-Dumont — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LIPOCÉRÉBRINE

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 g. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 g. 05 d'extrait.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsif, Tonique.

**Indications.** — États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.

**Doses.** — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

La boîte de 12 amp. **Prix :** 28 fr. 10.

La boîte de 60 dragées. **Prix :** 20 fr. 50.

### Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte-90-Paris.)

## LIPOCRINYL

**Hormonothérapie ambo-sexuelle par les Iloïdes orchitiques totaux d'animaux jeunes.**

**Composition.** — Iloïdes orchitiques totaux : 0 gr. 10 pour une pilule.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rétablit l'équilibre hormonal altéré par manque ou insuffisance de sécrétions endocriniennes. Activités s'exerçant indifféremment sur les deux sexes. (Travaux du Professeur Ch. Champy.)

**Indications.** — *Chez l'homme :* Hypertrophie de la prostate et ses troubles urinaires, Retards de la puberté, Présénescence, Impuissance, Déclin génital. *Chez la femme :* Troubles nerveux dépressifs liés à la ménopause et à la puberté. *Chez les deux sexes :* Neurasthénie d'origine sexuelle, et tous syndromes d'insuffisance endocrinienne.

**Posologie.** — 6 à 12 pilules par jour réparties en 3 prises dans l'intervalle des principaux repas. Pour les enfants, doses réduites de moitié. Durée du traitement : 20 jours par mois, pendant trois mois.

**Laboratoires DEROL**

34, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Passy 16-80.

## LIPOIODINE

**Diliodobraseldate d'éthyle**

**OIBA**

**IODE ORGANIQUEMENT COMBINÉ.**

La Lipiodine (41 p. cent d'iode) remplace avantageusement les iodures et iodiques à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

**Indications.** — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, Hypertension artérielle, Angine de poitrine, Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

**Doses.** — *Adultes :* 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants :* 1 à 2 comprimés à partir de 4 ans (aux repas principaux).

**Formuler.** — Tube de 20 comprimés.

Boîte de 6 ampoules.

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## LIPOLYSINE<sup>2</sup>

**Amalgissant sûr et sans danger.**

**Deux formules** { Lipolysine féminine.  
Lipolysine masculine.

**Composition :**

Formule féminine :	Formule masculine :
Thyroïde..... 0,05	—
Thymus ..... 0,02	—
Ovaire ..... 0,02	Testicule ..... 0,02
Hypophyse (lobe antérieur)..... 0,025	—

La Lipolysine est le médicament spécifique de l'obésité endogène ; elle n'a aucune contre-indication.

**Présentation.** — Comprimés.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés par jour.

Le comprimé doit être avalé avec un demi-verre d'eau 10 minutes avant le repas.

Le flacon de 40 comprimés : 35 fr. 40

Enr. au L. N. C. M. sous les Nos 1059-13-1 et 1059-13-2.

**Laboratoires du Docteur H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 39-44)

## LIPOSEPTINE

**Antitoxine polyvalente du Professeur G. Lemoine.**

**Composition.** — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. Possède les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

**Indications.** — Toutes les maladies infectieuses.

**Mode d'emploi.** — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale. Innocuité absolue.

Boîte de 5 ampoules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro 590-7.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## LIOSPLÉNINE DU D<sup>r</sup> GROC

Opothérapie splénique spécifique.

**Références scientifiques propres à la Liosplénine du D<sup>r</sup> Groc :**

**Communications :** Académie de médecine : 18 janvier 1927; 18 juillet 1928.

Société de Biologie : 22 décembre 1928, 16 février 1929, 21 décembre 1929.

XX<sup>e</sup> Congrès de médecine de Montpellier : 18 septembre 1929.

II<sup>e</sup> Congrès du Paludisme : Alger, 19-21 mai 1930.

Société de Thérapeutique, Paris : 12 octobre 1930, 8 février 1933.

Société d'Hématologie, Paris : 3 février 1932.

Société de Pédiatrie, Paris : 18 juin 1935.

Société de médecine infantile de Bordeaux et du Sud-Ouest : 20 octobre 1935.

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Lipides inaponifiables contenus dans la pulpe splénique, dont le cholestérol, extraits par un procédé spécialement établi par le P<sup>r</sup> L.-C. Soula ; 2<sup>o</sup> l'Insaponifiable X partiellement soluble.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> *Médication spécifique :*

a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).

b. Amaigrissements graves et persistants.

c. Anémies et déminéralisations en cours de grossesse ou après un accouchement pénible. *Points névralgiques dorsaux.*

d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, lymphatisme, déminéralisations, *troubles douloureux dentaires du nourrisson, eczéma du nourrisson.*

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, Inappétence, tous états de déchéance organique.

2<sup>o</sup> *Puissant modificateur du terrain dans :* Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

**Présentations.** — 1<sup>o</sup> *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement), séparées par un repos de trois jours.

2<sup>o</sup> *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon ce rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.  
(La boîte de huit ampoules.)

3<sup>o</sup> *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs par cuillerée à café. *Enfants :* 2 cuillerées à café par jour ; *Adultes :* 3 à 4 cuillerées à café par jour. A prendre dans l'intervalle des repas.

4<sup>o</sup> *Gouttes*, titrées à 5 p. 100 de principes actifs. Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à deux ans : XL gouttes, toujours en trois prises dans la journée. Au-dessus de deux ans, recourir au sirop. (Flacon pour 15 à 20 jours de traitement.)

5<sup>o</sup> *Granulé*, remplace le sirop, même dosage, même posologie. A prendre à la cuillère et à avaler avec quelques gorgées d'eau.

**Laboratoire des LIPIDES**

**Jean OLIVE, pharmacien**

14, rue des Minimes — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 03-94.)

Et provisoirement : 9, av. Frizac, TOULOUSE.



## LIPOVITA (Granulé)

Vitamines liposolubles.

### Formule :

Carotène (Vitamine A) : 4 000 unités internationales.  
Ergostérol irradié (Vitamine D) : 40 000 unités internationales pour 100 grammes. Goût très agréable.

**Indications.** — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, États ganglionnaires. Fixation du calcium par l'organisme.

### Doses :

**Nourrissons :** 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

**Enfants :** 2 cuillerées à café par jour.

**Adolescents et adultes :** 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 22 fr. 80.

**Laboratoire MAUCHANT**

à GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grésillons 05-21.)

## LIQUISAN

Régulateur et Tonic de la circulation du sang.

**Formule.** — *Æsculi* extr. — *Anemone sylv.* alcoholatur., 20 mgr. — *Viburn. tinct.* — *Strychn. tinct.*, 10 mgr. — *Di-folliculin. benzoïc.*, 5 U. I. — *Glycerin.* — *Spiritus.* — *Aqua pro X guttis.*

### Indications :

A. Pour les deux sexes : Varices internes ou externes, Phlébites, Hémorroïdes.

B. Chez la femme : Troubles des règles, Métrites, Troubles de la ménopause.

C. Chez l'homme : Prostatites.

### Doses :

Le LIQUISAN est présenté en solution et administré par gouttes. Les doses habituelles sont de 2 à 3 fois X gouttes par jour, pendant une vingtaine de jours, suivi d'un arrêt d'une dizaine de jours.

Le LIQUISAN sera absorbé dans un peu d'eau avant les repas. Si les troubles à combattre s'accompagnent de douleurs, on peut élever la dose sans aucun inconvénient jusqu'à I. ou LX gouttes en 24 heures.

Lorsque le traitement s'adresse à des désordres périodiques, tels que les troubles des règles, on administrera le LIQUISAN pendant l'intervalle des époques.

**Pharmacie centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## LITA

Cuniculi-sérum Iodobenzométhylé.

**Composition.** — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'iodoseptine (2 parties).

**Présentation.** — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou exceptionnellement intraveineuse.

**Mode d'emploi. Doses.** — Deux injections par semaine par série de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration passagère, continuer jusqu'à guérison.

Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. Chez l'enfant, on commencera par 1 cc. pour la première injection, 2 cc. pour la seconde, 3 cc. pour la troisième.

**Indications.** — Chez l'adulte : Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculoses viscérales. Tuberculose des séreuses. Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres). Chez l'enfant : Prétuberculose, formes ganglio-pulmonaires du premier âge.

Prix : Boîte de 6 ampoules : 93 fr. 85.

4 ampoules : 66 fr. 75. — 2 ampoules : 33 fr. 40.

**Laboratoires OORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

## Traitement LITHOL A. B. C.

Pour débarrasser la vésicule biliaire de sa boue, de ses cristaux et de ses petites concrétions.

Ce traitement amène une mobilisation complète de la bile, qu'il évacue en 24 heures sous forme de nappe ou de plus ou moins grosses concrétions verdâtres (biliverdine), ou rougeâtres (bilirubine).

Les résultats sur l'organisme sont souvent surprenants.

**Présentation.** — Trois flacons A. B. C. renfermant les essences et principes actifs des plantes, les huiles et le principe évacuateur nécessaire.

**Mode d'emploi.** — Prendre le flacon A, une heure avant la fin d'un déjeuner léger (vers 14 heures). Le flacon B, huit heures après le premier (vers 22 heures). Le flacon C, le lendemain matin. Boire ensuite des infusions d'herbes. On peut s'alimenter une fois les selles obtenues. Ne pas utiliser en période de crise aiguë.

**Laboratoire G. LESOURD**

88, rue Duhamel — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## LIVARTIL

Le stimulant d'élection des parenchymes hépatique et pancréatique.

### Composition :

Extrait total de feuilles fraîches d'artichaut de Macau  
(350 gr. de feuilles fraîches d'artichaut).

Combretum .....	7,50
Boldo .....	7,50
Adonis Vernalis .....	0,25
Jaborandi .....	0,05
Formiates de Calcium et de Magnésium .....	5,00
pour 100 grammes de Livartil.	

### Propriétés :

**L'Artichaut** stimule les fonctions hépatique (notamment la fonction antitoxique (1) et pancréatique, augmente la diurèse, élimine la cholestérine et l'urée.

**Boldo** et **Combretum** : cholagogues et cholofluidifiants classiques.

**Adonis** : toni-cardiaque et diurétique direct et indirect.

**Jaborandi** stimule la musculature lisse du tube digestif par son action parasymphaticotonique.

**Formiates de Calcium et de Magnésium**, diurétiques azoturiques, renforcent en outre le pouvoir diurétique propre de l'artichaut.

### Avantages.

- 1° L'extrait total liquide de feuilles fraîches d'artichaut de Macau procure des succès thérapeutiques bien supérieurs à ceux qu'on obtient avec les « principes » partiels préparés à partir de la plante desséchée ou avec l'extrait sec.
- 2° Absolument atoxique.
- 3° Effet rapide, mais durable.

### Indications. — A. Hépatiques.

- 1° Toutes insuffisances hépatiques, aiguës, subaiguës et chroniques, légères ou graves. Cholémie familiale. Ictères catarrhal et infectieux. Hépatites aiguës et chroniques. Congestion du foie. Gros foie douloureux des paludéens, des alcooliques, des gros mangeurs. Lithiase biliaire. Coliques hépatiques et vésiculaires. Cirrhoses. Surcharge et Dégénérescence graisseuse du foie (2). Cholécystitis, Angiocholites, Angiocholécystites, Séquelles des cholécystectomies. Atteinte hépatique au cours des maladies infectieuses, Foie grippal.

(1) O. GAUDIN Docteur en sciences : *Bulletin de la Soc. de Thérap.*, 3 février 1939.

(2) H. PÉRICAUD et LAPORTE : *L'Envahissement graisseux du foie.*

2° Toutes les conséquences de l'insuffisance hépatique et pancréatique : dyspepsie hépatique avec douleurs tardives. Constipation. Hémorroïdes. État saburral des voies digestives. Anorexie des hépatiques. Nausées. Somnolence post-prandiale. Urticaire. Migraines. Manifestations anaphylactiques d'intolérance digestive. Auto-intoxication. Intolérance aux arsénobenzènes et aux sels d'or. Dermatoses d'origine hépatique. Prurits. Asthme hépatique.

### B. Rénales :

Oliguries. Ascites. Insuffisance rénale. Rétention azotée. Azotémie d'alarme. **Brightisme**, Mouches volantes. Bourdonnements d'oreilles. Fourmillements des extrémités. Prurit. Crampes. Doigt mort. Céphalées des brightiques.

### C. Sanguines et circulatoires :

Hypercholestérinémie. Athérome artériel. Hypertension et ses troubles subjectifs.

### Posologie et mode d'emploi :

**Traitement d'attaque.** — 80 gouttes 3 fois par jour, aux repas, dans le premier verre de boisson. (Penser à une exonération intestinale abondante possible due à l'augmentation de la cholérèse.)

**Traitement d'entretien.** — 30 à 80 gouttes 2 à 3 fois par jour.  
*Enfants* jusqu'à 5 ans : III à V gouttes par année d'âge 2 à 3 fois par jour.

**Remarque.** — Le Livartil étant dénué de toute toxicité, les doses ci-dessus peuvent être augmentées si besoin.

**Prix :** 24 fr. 30 pour un traitement moyen de 15 à 18 jours.

Enregistré au L. N. C. 1863-1.

**Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine),**

Docteur en Pharmacie,  
86, rue du Pas-Saint-Georges,  
BORDEAUX (Gironde).  
(Tél. : 86-258.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

## LOBÉLIANE LALEUF

**Composition.** — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

**Propriétés et indications.** — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques, névropathiques, névroses et insomnies.

**Formes.** — *Liquide et comprimés.*

(2 comprimés correspondant à 1 cuillerée à café de LOBÉLIANE liquide.)

### Posologie et mode d'emploi :

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café — 4 à 6 comprimés par jour.  
Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café — 2 à 4 comprimés, après le repas du soir.

La LOBÉLIANE se prend avec un peu d'eau ou, mieux, avec une infusion de tilleul ou de verveine.

**Durée moyenne des unités de vente :** 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 20 francs.

### Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## LOBÉLINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies des centres respiratoires.

**Composition.** — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobéline chimiquement pur. (Conservation indéfinie.)

**Indications.** — Tous les états asphyxiques. *En chirurgie* : syncope anesthésiques. *En obstétrique* : asphyxie des nouveau-nés. *En médecine générale* : accidents respiratoires au cours de la pneumonie, de la broncho-pneumonie, de la coqueluche et dans l'asthme ; états asphyxiques consécutifs aux empoisonnements, à l'électrocution, à la submersion.

### Posologie et mode d'emploi.

Chez l'adulte : 0 gr. 010 en injections sous-cutanées ou intramusculaires qu'on peut sans danger répéter toutes les 10 ou 15 minutes (dose maxima 0 gr. 10 par 24 heures).

0 gr. 003 à 0 gr. 010 en injection intraveineuse poussée lentement. On peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0 gr. 010.

Chez l'enfant : En injection sous-cutanée ou intramusculaire exclusivement, 0 gr. 003 chez le nouveau-né et le nourrisson, 0 gr. 005 à partir de 4 mois et 0 gr. 010 à partir d'un an.

**Présentation.** — Boîtes de 2 ou de 6 ampoules titrées exclusivement à 0 gr. 003 et 0 gr. 010.

Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>, Docteurs en pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>) (Tél. : Élysées 61-46.)

## LOBÉLINE « SANDOZ »

**Composition.** — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la *lobelia inflata*, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

**Avantages.** — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

**Indications.** — Asphyxie bleue des nouveau-nés, laryngite striduleuse, asthme, broncho-pneumonie, toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

**Posologie et présentation.** — Boîtes de 3 ampoules, dosées à 0 gr. 003 et à 0 gr. 01. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

### PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## LOBULINE

**Composition.** — Extrait spécial des flots de Langerhans du pancréas et levure sélectionnée à haut pouvoir glycolytique, présentés en dragées à enrobage spécial.

**Avantages.** — Renforcement de l'action de l'extrait par une levure désintégrant rapidement la molécule de glucose.

**Indication.** — Opothérapie du diabète.

**Posologie.** — A régler selon la glucosurie.

A titre d'exemple :

Pour 2 à 20 gr. de sucre éliminé en 24 heures : 1 à 2 comprimés par jour ;

Pour 25 à 50 gr. : 2 à 3 comprimés par jour ;

Pour 50 à 100 gr. : 3 à 4 comprimés par jour.

Pour 100 gr. et plus : 4 à 6 comprimés par jour.

L'augmentation des doses est sans danger.

**Prix** : Boîte de 60 comprimés : 52 fr. 80.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>)

(Tél. : Inv. 20-60.)

## LOGAPHOS

**Composition.** — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

**Dose.** — XX gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Traitement: 15 jours.

Prix: 18 fr.

**Laboratoires**

**L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue du Maréchal-Lyautey — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.

## LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.

**Composition :**

Emulsion parfaitement homogène et stable d'Huile de paraffine *spécialement traitée*, remarquablement pure et de haute viscosité, d'Agar-agar et de Phénolphthaléine *chimiquement pure*. Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

**Indications :**

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Très indiqué chez les constipés par atonie intestinale, les malades obligés de garder le lit, les femmes enceintes et les vieillards.

**Action physiologique :**

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion. Ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement par l'anus. Aucune accoutumance.

**Dose et mode d'emploi :**

De goût agréable, naturel, le Loraga est miscible à tous liquides : lait, eau sucrée ou non, infusions, potages.

**Adultes :** Commencer par une cuillerée à café, le soir, au moment du coucher, et augmenter jusqu'à 1 cuillerée à soupe (1 à 3 cuillerées à café) ou plus ; si c'est nécessaire, répéter la dose le matin en se levant.

**Enfants :** 1/2 à 2 cuillerées à café ou plus, suivant l'âge et selon l'avis du médecin.

Prix : 15 francs le flacon P. M.

21 fr. 80 le flacon M. M.

37 fr. 50 le flacon G. M.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-2.

Littérature et échantillonnage médical sur demande

**LABORATOIRES SUBSTANTIA,**

**M. Guérout, Docteur en pharmacie.**

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

## LOTION PY

**Au Soufre dissous associé.**

**Composition.** — Soufre, Houblon, Hamamelis, en solution éthylique.

**Propriétés.** — Dissout les graisses, désinfecte, décape et apporte au derme le soufre indispensable et *actif*.

**Avantages.** — Rigoureusement *ininflammable, non irritante, non toxique* ; odeur agréable.

**Indications.** — Tous les *états séborrhéiques* ; Alopecies ; toutes les formes d'*Acnés* : Comédons, Pityriasis ; Erythrasma ; antiseptique et parasiticide puissant : (Gale).

### Mode d'emploi :

**Séborrhée.** — Savonner la tête le soir avec un savon au goudron ou ordinaire et rincer à l'eau tiède ; *bien sécher*, puis appliquer la lotion avec un tampon de coton hydrophile.

**Acné.** — Même traitement, mais utiliser un savon au naphthol soufré, ou ordinaire.

**Alopecies.** — Frictionner le cuir chevelu tous les soirs, en écartant les cheveux par mèches et en massant avec les pouces. Eviter de faire couler le produit dans les yeux.

Dans le traitement de la *séborrhée*, il peut y avoir un « picotement » dû au contact du produit avec de légères érosions produites par le grattage ; cette sensation disparaît au bout de quelques applications.

**Prescrire :** LOTION PY : 1 flacon.

Prix : 26 fr. 50.

### Laboratoire SCHOU

Maurice PY, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

15, rue de la Sablière

BÉCON-LES-BRUYÈRES (Seine).

(Tél. : Défense 12-33.

## LOTUPHAR MILUC

(ex-NERVANTYL MILUC)

### Composition :

Extrait de Lotus alc.....	0,10
Teinture Aubépine 1/5.....	0,50
Extrait de Nénuphar aq.....	0,05
Extrait de Valériane Stab. alc.....	0,10
Ion Calcium.....	0,05

Excipient sans sucre : Q. S. pour une cuillerée à café ou un comprimé

**Propriétés.** — Sédatif des palpitations et des troubles fonctionnels nerveux. — Sédatif du système nerveux à électivité génitale.

**Indications.** — Toutes dystonies du sympathique, déséquilibre nerveux, émotivité, anxiété, neurasthénie, psychasthénie, mélancolie, palpitations, tachycardie et troubles fonctionnels cardio-vasculaires, éréthisme génital, insomnies.

**Présentation :** Solution sans sucre. — Comprimés.

**Posologie.** — Régulateur du système nerveux : 1 ou 2 cuillerées à café ou 1 ou 2 comprimés 1/4 d'heure avant chacun des 2 principaux repas. Contre l'insomnie nerveuse : 2 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés le soir au coucher.

Chaque cuillerée dans un 1/4 de verre d'eau, ou mieux dans une tisane (feuilles d'oranger). Demi-dose pour enfants.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien.

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 02-53.)

## LOTUSÉDINE

Médication phytothérapique des déséquilibres neuro-végétatifs et des insomnies nerveuses.

### Composition :

Alcoolature d'Anémone .....	22 gr. 60
Extrait stabilisé de Lotus .....	3 gr. 33
— de Gattilier .....	3 gr. 33
— de Crataegus .....	6 gr. 66
— fluide de Belladone .....	0 gr. 60
Eau de laitue .....	Q. S. pour 100 gr.

### Indications :

- 1° **États névropathiques**; états anxieux; hyperémotivité, hyperexcitabilité, nervosisme, irritabilité, crises de dépression, modifications du caractère.
- 2° **États spasmodiques gastro-intestinaux**; aérophagie aérocolie; syndrome solaire; troubles dyspeptiques post-prandiaux d'origine nerveuse.
- 3° **Érêthisme cardio-vasculaire**, palpitations, tachycardie, fausse angine de poitrine et troubles circulatoires nerveux; vertiges, bourdonnements.
- 4° **Troubles nerveux de la vie génitale**: émotivité, nervosisme, règles douloureuses, bouffées de chaleur, vertiges, bourdonnements, etc...
- 5° **Toutes insomnies** provoquées par le surmenage physique, le surmenage intellectuel et moral, les soucis, les chagrins, la nervosité.

### Posologie et mode d'emploi :

- 1° **Sédatif et équilibrant neuro-sympathique**. — Dose moyenne: 50 à 100 gouttes, 2 fois par jour, dans une tisane chaude, après les deux principaux repas.
  - 2° **Insomnies nerveuses**. — Dose moyenne: 1/2 à 2 cuill. à café le soir, dans une tisane chaude, en une seule fois.
- Enfants à partir de 5 ans*: V gouttes par année d'âge et par jour.

**Remarque**. — La Lotusédine, étant d'une atoxicité absolue, peut être donnée sans inconvénients aux enfants, aux vieillards, aux femmes enceintes. Les doses moyennes peuvent être notablement augmentées sans aucun danger.

**Prix** : 23 fr. 40 (3 semaines de traitement environ).

Enregistré au L. N. C. n° 1863-2.

**Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine)**

Docteur en Pharmacie,

86, rue du Pas-Saint-Georges — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 86-253.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

## LUBRIGEL

**Gelée lubrifiante soluble dans l'eau.**

Convient pour tous les instruments de chirurgie. N'irrite pas les muqueuses les plus sensibles.

*Pas de littérature, mais un échantillon sur demande à la*

**Pharmacie ARDOIN,**

33, boulevard Dubouchage — NICE.

**Prix au public : 10 francs.**

## LUDIN

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

**Formes.** — Granules, Gouttes, Sirop.

### Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop }  
ou 3 granules } — 1 cgr. Hg. + 1 millgr. As.  
ou XX gouttes }

Sans IODURE, sans Alcool.

### Doses moyennes :

#### Sirop :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.  
Adolescents : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.  
Enfants : par cuillerées à café.

#### Granules :

Adultes : 8 à 12 granules par jour.  
Adolescents : 4 à 8 granules par jour.  
Enfants : 2 à 3 granules par jour.

#### Gouttes :

Adultes : XX gouttes.  
Adolescents : X à XV gouttes.  
Enfants : V à X gouttes.  
Nourrissons : I à II gouttes. } 2 à 4 fois par jour.

**Nota.** — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc...). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

**Indications thérapeutiques.** — Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc., etc...

Les gouttes ou le Sirop Ludin peuvent être prescrits sans inconvénient aux nourrissons en diluant soit dans de l'eau, soit dans du sirop de sucre ou même dans le lait des biberons.

Les granules sont sans sucre.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 302-1, 302-2, 302-5.

**Laboratoires REY — DIJON — Tél. : 22-12.**

## LUGOCALCION

Sirop de Chlorure de Calcium suractivé. Délicieux au goût.

### Composition :

Solution pseudo-colloïdale de Chlorure de Calcium, incorporé par procédé spécial.

1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de Calcium ..... 1 gr. 50  
Adrénaline physiologique sol. 1/1000..... DIX gouttes.  
Teinture belladone..... DEUX gouttes.

Seule préparation de goût réellement délicieux.

### Indications et posologie :

a. **Récalcifiant** : Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement Convalescence, Rachitisme, Ostéomalacie, Tétanie, etc.

Adultes : 1 cuillerée à soupe. Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

b. **Hémostatique** : Hémoptysies, Gastrorragies, Epistaxis, Purpura. Menstruations abondantes, Préventif des Hémorragies post-opératoires, etc.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. Enfants : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

c. **Antianaphylactique** : Urticaire, Eruptions d'origine digestive, Prurits, Rhume des Foins, Eruptions post-sérothérapeutiques, Asthme.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café. Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

d. **Déchlorurant, résorbant** : Albuminurie, Néphrite, Pleurésie, Accidents sériques, Convulsions des nouveau-nés, Ascite, Diarrhée des Tuberculeux, Œdème malléolaire, Cellulite.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. Enfants : 3 à 4 cuillerées à café. Nouveau-nés : 1/2 cuillerée à café par jour.

e. **Neuro-sédatif** : Etats spasmodiques, Ménopause, Basedowiens, Nervosisme, Surmenage.

Par petites doses de 1 cuillerée à café, à prendre 4 fois par jour.

f. **Tenso-régulateur artériel** : Hyper et Hypotension, 2 à 4 cuillerées à café par jour.

g. **Thérapeutique oculaire** : Glaucome, rétinites, Choroidites, spasme oculaires, Décollements de la rétine, Cataracte, Hémorragies de la rétine, etc.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe. Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre pur ou additionné de 2 fois son volume d'eau, avant les repas.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## LUMINAL

**Composition.** — Acide phényléthylbarbiturique.  
**Propriétés.** — Antiépileptique, hypnotique, sédatif, antispasmodique.

**Indications.** — Épilepsie, chorée, convulsions, insomnies graves, vomissements de la grossesse, cures de désintoxication.

**Présentations :**

Tubes de 10 comprimés à 0 gr. 10.  
 Flacons de 50 comprimés à 0 gr. 10.  
 Tubes de 10 comprimés à 0 gr. 30.  
 Flacons de 50 comprimés à 0 gr. 30.  
 Solution à 20 %, en ampoules de 1 cc., boîtes de 10 ampoules.

### LUMINAULETTES

Flacons de 30 comprimés à 0 gr. 015.  
 Flacons de 100 comprimés à 0 gr. 015.

**Posologie :**

Enfants : 0 gr. 015 à 0 gr. 10 en 24 heures.  
 Adultes : 0 gr. 05 à 0 gr. 30 en 24 heures.

### Laboratoires SANOMEDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien.

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## LUMINAL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Phényl-éthyl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Anti-épileptique, hypnotique et analgésique puissant.

Épilepsie, Chorée, États d'excitation, États anxieux, Éclampsie, Cures de démorphinisation, Insomnies liées à la douleur.

**Posologie.** — Par voie buccale : de 0 gr. 05 à 0 gr. 60 par jour.

Par voie intramusculaire (Solution de LUMINAL à 20 %), 1 à 3 ampoules par jour.

**Présentation.** — Tubes de 10 et flacons de 50 comprimés à 0 gr. 10 et 0 gr. 30.

Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. d'une solution à 20 %.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## LUMINAULETTES

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Phényl-éthyl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Permettent l'administration du Luminal à doses fractionnées. Antispasmodique sans effet hypnotique.

Migraine, Dyspnées spasmodiques, Angine de poitrine, Névroses cardiaques, Spasmes vasculaires, Hypertension, Coqueluche, Neurotonies.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par jour.

**Présentation.** — Flacons de 30 et de 100 comprimés à 0 gr. 015.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## LUSITOL

**Composition.** — Corps chimiquement défini (Iodosalicylate de manganèse).

**Forme.** — Pilules glutinisées, désagrégées seulement dans l'intestin, évitant ainsi les phénomènes d'intolérance gastrique.

**Doses.** — 2 à 6 pilules par jour, prises en deux ou trois fois au moment des repas. Doses pouvant être augmentées sur avis du médecin.

**Indications.** — Doit être employé toutes les fois qu'il s'agit de réaliser un traitement iodé intensif, notamment dans : le Rhumatisme chronique, l'Asthme, l'Emphysème, les Affections du cœur, l'Athérome et l'Artériosclérose, l'Angine de poitrine, l'Hémorragie cérébrale, le Ramollissement cérébral, les Phlébites, la Cataracte, le Lymphatisme, le Scrofule, les Adénopathies, le Lupus, les Mycoses, la Syphilis, le Tabes.

Le Lusitol possède l'action sûre et puissante des iodures alcalins, mais cette action se manifestant avec des doses bien plus faibles, il permet d'éviter avec certitude les accidents d'iodisme.

Enreg. au L. de C. sous le n° 427-4.

**Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE**

Jean CLÉMENT, pharmacien,

105, rue Saint-Jacques — ÉTAMPES (S-et-O).



## LUSOFORME

Solution de formol et de ricinoléates alcalins.

Antiseptique, bactéricide et désodorisant.

**Indications.** — Gynécologie, Obstétrique. Hyperménorrhées. Hygiène journalière, Désinfection domestique.

**Formes.** — Liquide et comprimés.

**Posologie.** — Une cuillerée à café ou un comprimé donnent avec 1 litre d'eau une solution à 1/2 p. 100.

**Emploi.** — *Lusoforme médical.* — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

*Lusoforme brut.* — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100 et 250 gr., à 5 fr. 50 et 11 fr. La boîte de 50 compr., 12 fr. 30

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 27 fr. 90, 66 fr. 80 et 130 fr. 70.

**Laboratoires CARTERET**

15, r. d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél.: Opéra 43-79.)

## LUTAZOL

**Composition.** — Comprimés de para-sulfamidophényl-azo-salicylate de potassium. Solution de para-sulfamidophényl-azo-salicylate de lithium injectable par voie intramusculaire.

**Indications.** — Trachôme, Conjonctivites, Kératites, Dacryocystites, Ecthyma, Chancre mou.

**Présentation.** — Boîte de 4 ampoules injectables à 1 p. 100. Flacons de 25 comprimés dosés à 0,50.

**Posologie.** — Doses moyennes quotidiennes pour l'adulte : 3 gr., soit 6 comprimés.

Chez l'enfant : 1/4 de comprimé par année d'âge. (La forme soluble peut être utilisée en injections sous-conjonctivales.)

Prix public :

La boîte de 4 ampoules de 2 cc. : 23 francs.

Le flacon de 25 comprimés à 0,50 : 20 fr. 70.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, r. du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Litré 58-43.)

## LUTOCYCLINE

Hormone du corps jaune cristallisée.

PROGESTÉRONE

CIBA

En solution huileuse injectable.

La Lutocycline, hormone du corps jaune obtenue par synthèse, exerce sur l'utérus et les ovaires une action élective dont l'application en clinique permet soit de régulariser la sécrétion folliculaire et l'ovulation, soit de compléter et d'achever le développement de la muqueuse utérine antérieurement préparée par l'hormone folliculaire (OVOCYCLINE) : état de prénidation.

L'action physiologique de la Lutocycline a été étudiée sur l'animal par la méthode des tests (réactions de Corner-Allen et de Claiberg) Ces réactions correspondent aux modifications de la muqueuse utérine lorsque, au cours du cycle menstruel, elle passe de la phase de prolifération (action folliculaire) à la phase de nidation (action lutéinique).

La Lutocycline entraîne, en clinique, des effets thérapeutiques divers, suivant qu'il s'agit de freiner un ovaire à activité folliculaire exagérée, de favoriser une fécondation, de juguler l'avortement, de combattre certaines manifestations secondaires, telles que douleurs des seins, fibromes, insuffisance de la lactation.

L'association de la Lutocycline à l'hormone folliculaire ou œstradiol (OVOCYCLINE) est indiquée dans les cas d'hypoplasie, de stérilité et de troubles marqués de la ménopause. (Voir *Ovocycline*.)

La Lutocycline est présentée uniquement sous forme injectable, en ampoules de 1 cc. renfermant une solution huileuse dosée à 5 et 10 mgr. de progestérogène.

**Indications.** — Tous les troubles ayant pour origine l'insuffisance activité du corps jaune.

*Métrorragies, hyperménorrhées et polyménorrhées par hyperfolliculinie. Symptômes nerveux et psychiques qui y sont liés. Stérilité d'origine ovarienne. Avortement habituel. Grossesses fragiles. Hémorragies au cours de la grossesse.*

*Insuffisance de la lactation.*

*Syndrôme d'hyperfolliculinisme: seins douloureux, mastopathies et fibromatose utérine.*

*Manifestations de carence lutéinique de la ménopause.*

**Deux présentations.** — Comprimés de Lutocycline (anhydro-oxyprogestérogène), dosés à 5 mgr.

Ampoules de Lutocycline (progestérogène en solution huileuse), dosées à 5 mgr. et à 10 mgr.

**Doses.** — Comprimés de Lutocycline à 5 mgr. : 6 à 10 par jour.

Ampoules de Lutocycline à 5 mgr. et à 10 mgr. : de 2 à 10 mgr. (cas bénins), à 25 mgr. et 35 mgr. et plus (cas sévères), par semaine.

**Formuler :**

1 flacon de 10 comprimés de Lutocycline.

1 boîte de 50 comprimés de Lutocycline.

1 boîte de 1 ampoule de Lutocycline à 5 mgr.

1 boîte de 3 ampoules de Lutocycline à 5 mgr.

1 boîte de 3 ampoules de Lutocycline à 10 mgr.

**Laboratoires CIBA**

D<sup>r</sup> P. DENOYEL

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON

Tél.: Moncey 43-26.)

## LUTOGYL

Hormone du corps jaune.

**Composition.** — Progestérone cristallisée, chimiquement pure, en solution huileuse injectable.

**Indications.** — Toutes insuffisances fonctionnelles du corps jaune : Ménorragies, Métrorragies, Aménorrhées, Avortements endocervinaux, Stérilité.

**Présentations.** — Voie intramusculaire : Boîte de 3 amp. de 1 cc. dosées à 5 mgr. de progestérone; Boîte de 3 amp. de 1 cc. dosées à 10 mgr. de progestérone.

Voie buccale : Flacon de 25 comp. à 5 mgr. de prégnéninone.

Flacon de 25 comp. à 10 mgr. de prégnéninone.

*Prix au public :*

Boîte de 3 ampoules à 5 mgr. ... 85 fr.

Boîte de 3 ampoules à 10 mgr. ... 150 fr.

Flacon de 25 comprimés à 5 mgr. 95 fr.

Flacon de 25 comprimés à 10 mgr. 170 fr.

(Consulter les *Schémas d'utilisation des Hormones ovariennes*, éditées par les Laboratoires Roussel.)

Les Laboratoires du **D<sup>r</sup> ROUSSEL**

LABORATOIRES FRANÇAIS

DE CHIMIOTHÉRAPIE

S. A. au cap. de 10 000 000. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, r. du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél.: Lit. 58-43.)

## LUTRÈNE

Nom déposé. Licence Bayer

**Composition.** — Hormone du corps jaune (Progestérone en solution huileuse).

**Propriétés et indications.** — Transforme l'endomètre en déciduale et favorise la nidation.

Avortement imminent et Avortement habituel, Aménorrhée primitive et secondaire (en association avec la folliculine ou le Cyène B fort). Ménorragies, Métrorragies, Métropathies hémorragiques, Hyperfolliculinémie, Stérilité.

**Posologie.** — Par voie intramusculaire : de 2 à 5 mgr. par jour soit tous les jours, soit une ou deux fois par semaine, soit par traitement cyclique.

**Présentation.** — Boîtes de 3 ampoules à 2 mgr. Boîtes de 3 ampoules à 5 mgr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPIL**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél.: Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## LYMPHIODE

Iode entièrement fixé sur un support extrait des ganglions lymphatiques.

**Histotropisme électif.** — Tolérance parfaite. Activité exaltée. Absence d'iodisme.

Le **LYMPHIODE** peut être pris dans n'importe quel liquide après repas : eau bicarbonatée sucrée, vin rouge, lait, etc.

**Doses :**

**Adultes :** X à L gouttes par jour en deux fois après chaque repas.

**Enfants :** V à XX gouttes par jour suivant l'âge.

Ces doses peuvent d'ailleurs être largement dépassées.

**Indications.** — Toutes celles de la médication iodée : Affections du cœur et des vaisseaux, Hypertension, sclérose vasculaire, déficience circulatoire, etc. Affections oculaires relevant de la médication iodée : choroidite, iritis, etc. Affections respiratoires : asthme, emphysème, bronchite chronique. Affections ganglionnaires : adénites, micro-polyadénopathie des enfants. Affections de la peau : eczéma, psoriasis, tuberculides. Mycoses.

États infectieux aigus. — Syphilis tertiaire.

**Prix :** 20 francs le flacon de 45 cc., suffisant à un traitement de 1 à 2 mois selon les doses. — Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-31.

Laboratoires du **D<sup>r</sup> H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## LYSACRÈME L. M. L.

**Composition.** — Émulsion savonneuse stable d'antivirius Lysats concentrés à 70 p. 100 (travaux des D<sup>rs</sup> Larget, Moreau et Lamare).

**Avantages.** — 1<sup>o</sup> Le savon spécial permet une concentration considérable des antivirius et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirius; 2<sup>o</sup> Souches non repiquées et fraîchement prélevées; 3<sup>o</sup> Lysé par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirius; 4<sup>o</sup> Aucune réaction. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses.

**Posologie.** — Trois pansements par jour avec massage doux et prolongé. Recouvrir avec taffetas. Dans les cavités : mèche imbibée de *Lysacréme L. M. L.*

**Prix :** 12 fr. 10 le grand tube; 14 fr. 30 le petit tube.

## LYSAXINS L. M. L.

**Composition.** — Lysats pyocyaniques, Corps microbiens formolés, Peptones polyvalentes.

**Avantages.** — 1<sup>o</sup> Lysats très polyvalents (souches sélectionnées). Très actifs (souches non repiquées, pH spécialement étudié); 2<sup>o</sup> Vaccins microbiens très efficaces, grâce à l'atténuation par la formoline.

**Indications.** — *Antipyogène* : suppurations dues aux pyogènes communs : Furoncles, Anthrax, etc. *Abdominal* : Suppurations digestives. *Antineisser* : Urétrites, Orolites, Métrites, etc.

**Forme.** — Ampoules 2 cc.

**Posologie.** — 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Minimum 3 inj. de 2 cc. ou 4 inj. de 1 cc. Espacer les injections de 48 h. au minimum.

**Prix :** 23 fr. 70 la boîte de 4 ampoules.

Laboratoires **ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél.: Inv. 20-60.)

## LYSAMIDE

(237 M.)

**Spécifique des affections à streptocoques, à pneumocoques, à gonocoques, à méningocoques.**

**Composition.** — Tri (para-aminophénylsulfamide) aluminique. Pas de troubles sanguins. Très bien tolérée.

**Indications.** — Streptococcies, Méningococcies, Pneumococcies, Affections pulmonaires chroniques, Blennorrhagies aiguës et chroniques.

**Formes.** — Comprimés à 0 gr. 55. Poudre. Pommade. Ovules. Crayons. Sachets.

**Posologie.** — *Adultes* : 7 à 8 comprimés en 24 heures. 1 comprimé à la fois.

*Enfants* : moitié ou tiers de ces doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

**D<sup>r</sup> MOUNEYRAT**

Professeur agrégé Faculté de Médecine  
Docteur ès sciences, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## LYSAPYRINE

(402 M.)

**Traitement des affections à gonocoques, à streptocoques, à pneumocoques, à méningocoques.**

**Composition.** — Sulfamide pyridique : Alu-tri (para-aminophénylsulfamidopyridine). Bien tolérée. Pas de cyanose.

**Indications.** — Blennorrhagie et ses complications, Affections streptococciques : érysipèle, fièvre puerpérale, Pneumococcies, Méningococcies.

**Applications externes.** — Traitement des plaies. Dermatoses. Pyodermites. Ulcères, etc.

**Formes.** — Comprimés à 0 gr. 56. Ampoules. Poudre. Pommade. Solution. Ovules. Crayons. Suppositoires. Sachets.

**Posologie.** — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour, pendant 8 à 12 jours, selon le poids.

Ces comprimés seront avalés, par doses fractionnées, dans le courant de la journée.

*Enfants* : la moitié ou le tiers de ces doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

**D<sup>r</sup> MOUNEYRAT**

Professeur agrégé Faculté de Médecine  
Docteur ès sciences, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## LYSARTHROL

**Granulé effervescent chimio-opothérapique.**

**Composition.** — Diastases tissulaires rénales, Uroformine, Benzoate de lithine.

**Propriétés.** — Anti-rhumatismal, Anti-arthritique, Solvant et éliminateur de l'acide urique, Diurétique.

**Indications.** — *Traitement de fond des rhumatismes chroniques*, Goutte, Gravelle, Uricémie.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café par jour : au lever, au coucher et avant chaque repas, dans un peu d'eau froide.

**Prix** : 17 fr. 60 pour 10 jours de traitement.

**Laboratoires FOULON**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 76-85.)

## LYSOCOCCINE

Sulfamide « Vraie »  
— 1162 F—

Chimiothérapie Antiinfectieuse  
Polyvalente.

### Présentations :

Comprimés dosés à 0 gr. 30 de para-amino-phényl-sulfamide.

Boîte de 44 comprimés. Prix : 28 fr. 70.

*Ampoules.* — Solution injectable contenant 0 gr. 25 de Sulfamide vraie dissoute pour un centicube.

1<sup>o</sup> Ampoules mixtes pour I. M. et I. V.  
Boîte de 10 ampoules 2 cc. Prix : 58 fr. 60.

2<sup>o</sup> Ampoules injectables intra-musculaires.  
Boîtes de 10 ampoules 2 cc. Prix : 58 fr. 60.  
Boîtes de 5 ampoules 5 cc. Prix : 58 fr. 60.

3<sup>o</sup> Ampoules injectables intra-veineuses.  
Boîtes de 10 ampoules 2 cc. Prix : 58 fr. 60.  
Boîtes de 5 ampoules 5 cc. Prix : 58 fr. 60.

### Posologie :

*Comprimés :* de 4 à 12 par jour en fractionnant les prises sur 24 heures. Toutes les 6 heures.

*Ampoules :* de 2 à 10 cc. par 24 heures en une seule fois si besoin.

**Laboratoires M. BORNE**

24, rue des Ursulines

SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

## LYSOTHIAZOL

(640 M)

Sulfamidothérapie thiazolique.

**Composition.** — Sulfamide thiazolique : 2 (para-aminophénylsulfamido) thiazol aluminique. Excellente tolérance à doses élevées.

**Indications.** — Colibacillozes, Blennorragie, Infections urinaires, Streptococcies, Staphylococcies, Méningococcies.

**Formes.** — Comprimés à 0 gr. 56. Poudre. Pommade. Solution. Ovules. Crayons.

**Posologie.** — 6 à 12 comprimés par jour, pendant quatre à six jours. Boire un demi-grand verre d'eau à chaque comprimé.

### Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé Faculté de médecine,  
Docteur ès sciences, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

12, rue du Chemin-Vert  
VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## LYXANTHINE ASTIER

**Composition.** — 33 p. 100 de principes actifs : bitartrate de lysidine, iodopropanol-sulfonate de sodium, gluconate de calcium.

*Aucun toxique ni analgésique.*

**Propriétés.** — Puissant anti-arthritique, dissolvant de l'acide urique, régulateur de la nutrition et du métabolisme calcique.

**Indications.** — Rhumatismes chroniques, convalescence de la maladie de Bouillaud, lithiases biliaires ou urinaires, névralgies et névrites d'origine rhumatismale, troubles hépatiques des arthritiques, cellulite.

**Posologie.** — *Granulé :* 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
Cures de 10 à 20 jours.

Prix : 22 fr. 80.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> P. ASTIER**

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. Auteuil 24-52.)

## MAGBROMYL

Solution pour adultes.

Solution de Bromure de Sodium pur, reforcé par le Chlorure de Magnésium et du  $\text{CaCl}_2$ . Tonique et stabilisateur du Système nerveux.  $\text{MgCl}_2$  augmente l'activité thérapeutique des Bromures.  $\text{CaCl}_2$  stabilise le système nerveux. Plus de tonique, plus de dépression. Pas d'anaphrodisie.

**Indications.** — Toutes celles des Bromures.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, de tisane ou de lait sucrés.  
Une cuillerée à café = 0 gr. 50 NaBr, 0 gr. 25  $\text{MgCl}_2$ , 0 gr. 10  $\text{CaCl}_2$ .

**Sirop de Magbromyl (Médecine infantile) pour enfants jusqu'à 12 ans.**

**Doses.** — 1 à 8 cuillerées à café *pro die*.  
Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaBr, 0 gr. 10  $\text{MgCl}_2$ , 0 gr. 05  $\text{CaCl}_2$ .

Ces préparations, de goût agréable, masquent totalement la saveur désagréable des Bromures.

Traitement de 8 à 15 jours suivant les cas.

L.N.C. n° 552-2.

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE. (Tél. : Italie 16-91.)

## MAGÉCARINE

Comprimés.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 12 comprimés au moment des troubles.

**Propriétés thérapeutiques et composition.** — Unit à l'action saturante et neutralisante des alcalins et alcalino-ferreux classifiés le pouvoir *sédatif* et calmant sur le *plexus solaire* des extraits *végétaux* atoxiques. — Inoffensif.

**Indications.** — Acidités anormales, Hyperchlorhydrie. Dyspepsie hypersthénique.

Prix : 16 fr. 40. (10 à 15 jours de traitement.)

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).  
(Tél. : Galv. 86-17.)

## MAGNELAX

**Composition.** — Émulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

**Indications.** — **LAXATIF** ne contenant **aucun drastique : CONSTIPATION**, fermentations, acidités.

**Posologie (Doses moyennes) :** que l'on peut augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

**Adultes :** 1 cuillerée à soupe par jour, au repas du soir de préférence.

**Enfants :** 1 cuillerée à dessert par jour.

**Nourrissons :** 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

## MAGNÉSIE DECHOSAL

*Magnésie calcinée suractivée par un procédé nouveau de porphyrisation.*

**Avantages.** — Conservation parfaite. Action plus que doublée, goût très agréable. Se délaye instantanément dans l'eau sans aucun grumeau.

**Indications.** — Toutes celles de la magnésie calcinée.

**Doses.** — 1/4 à 3 cuillerées à café suivant l'âge et suivant les cas.

**Prix de la boîte :** 15 fr. 20.

Laboratoires DECHOSAL

Pharmaciens Spécialistes,

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine)  
(Tél. : 65.)

## MAGNÉSIE LANCOSME

### SURACTIVÉE

**Présentation.** — Magnésie lourde de fabrication spéciale, ténue, inodore, insipide, se tenant en suspension parfaite dans l'eau et d'une absolue pureté. Saveur agréable. Parfaitement acceptée par tous les malades.

**Indications.** — Constipation, acidités gastriques, flatulences, lithiase biliaire, atonie vésiculaire ; anti-acide buccal, intoxications par acides corrosifs, arsenic, sels métalliques.

**Posologie.** — Prendre la magnésie dans un peu d'eau sucrée ou une infusion chaude.

*Dose purgative :* 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

*Dose laxative :* 1 cuillerée à café le soir au coucher.

*Dose anti-acide :* 1/4 de cuillerée à café à chacun des 2 repas.

*Anti-acide buccal :* 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau pure et après brossage des dents se rincer la bouche avec ce mélange.

Contre les intoxications : après lavage de l'estomac 15 à 20 gr. dans 1/2 litre d'eau.

### LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Élysées 17-46)

## MAGNÉSIUM HARDY

Deux formes : **Granulé-Bouillon & Sirop.**

**Composition.** — *Granulé-bouillon :* 1 g. 20 Chlorure de Magnésium par demi-cuillerée à café.

*Sirop :* 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par cuillerée à soupe.

**Originalité.** — Agrément et facilité d'absorption tant du *Sirop* aromatisé à la Groseille, que du *Granulé-Bouillon* donnant avec une tasse d'eau chaude un consommé très savoureux.

**Posologie.** — Une demi-cuillerée à café de *Granulé-Bouillon* par jour ou une cuillerée à soupe de *Sirop* au début d'un des repas.

**Indications.** — Asthénie nerveuse. Prostatisme. Vieillesse prématurée. Stimulant biologique général. Verrues et toutes proliférations. Reminéralisation. Prurits, tremblements.

### Présentation :

*Granulé-Bouillon :* flacon pour 16 jours de traitement.

*Sirop :* flacon pour 14 jours de traitement.

Laboratoire National de Contrôle : n° 1.555-1 et 2.

### Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,

22, rue François Bonvin — PARIS (XV<sup>e</sup>). Tél. : Ségur 19-21.

## MAGNÉSIUM-PERHYDROL MERCK

**Composition.** — Peroxyde de magnésium.

**Propriétés.** — Se décompose dans l'estomac en oxygène et chlorure de magnésium ; neutralise l'acide chlorhydrique, agit comme désinfectant, antiputride, désodorisant et laxatif.

**Indications.** — Troubles gastro-intestinaux, dyspepsie, météorisme, hyperacidité gastrique, constipation chronique, acétonurie.

**Présentations.** — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 50. Boîtes de 50 gr. de Magnésium-Perhydrol en poudre.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés ou 1/2 à 1 cuillerée à café de poudre délayée dans de l'eau, immédiatement après les repas ; dans la constipation habituelle, le matin à jeun.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## MAGNÉSIUM ROSSO

Solution Hypertonique de Galacto-Gluconate de Magnésium à 8 p. 100.

*Chimiothérapie sédative des syndromes neuro-végétatifs par hyperminéralisation magnésienne.*

Par injections

Intramusculaires et intraveineuses.

Le Magnésium Rosso en thérapeutique est le traitement de choix de : Troubles de déséquilibre neuro-végétatif (Emotivité, Insomnies, Hyperexcitabilité, Irritabilité, Angoisse), Troubles névropathiques, Vaso-moteurs et cardiaques par sympathicotomie, Contractures et crampes, Asthme, Saturnisme et tremblements séniles, Séquelles des maladies infectieuses et post-encéphalites avec lésions organiques (Chorées-Parkinson et sclérose en plaques). Carence sexuelle, Ménopause physiologique post-opératoire : Bouffées de chaleur, Transpiration, Aménorrhée.

Troubles complexes de femmes privées de maternité, aide au déclenchement du flux menstruel, favorise l'apparition et le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Eclampsie, Spasmophilie, Anaphylaxies, Dermatoses (prurigo, urticaire), Maladie de la prostate, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires, Lésions précancéreuses, Prophylaxie du cancer.

**Posologie :**

*Traitement d'entretien :* 10 cc. tous les jours par injections intramusculaires ou tous les 2 jours intraveineuses.

*Traitement d'attaque :* de 10 à 30 cc. tous les jours par injections intraveineuses ou intramusculaires.

De préférence, la dose par voie intraveineuse n'excédait pas, la première fois, 10 cc.

**Présentation et prix :**

Boîte de 12 amp. de 5 cc. : 35 francs.

Boîte de 6 amp. de 10 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 5 amp. de 20 cc. : 40 francs.

Boîtes de 6 amp. à 20 p. 100 de 10 cc. : 40 francs.

*Médication intensive, Cytophylactique, Cytotrope, Indolore, Aucune réaction.*

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

P. CLEVENOT, pharmacien

3, rue Lamblardie — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Dor. 56-38.)

## MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydro-oxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

**Présentation.** — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

**Emploi.** — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

**Posologie.** — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

**Indications.** — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement défectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

**Terrains magnésiens et cancer, L. Robinet.** — Pour la France : communication à l'Académie de médecine par M. le professeur Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

**Terrains magnésiens et cancer, MM. Pierre Delbet et L. Robinet** (nouvelle étude). Communication Académie de médecine (mars 1934).

**Sulfoïdes, tuberculose, sénilité et terrains magnésiens,** communication à l'Académie de médecine (avril 1934).

## MAGNOXOL

Granulé.

Formule :

Magnésiate d'Ortho-oxyquinoléine.....	5 gr.
Charbon suractivé.....	12 gr. 50
Belladone poudre.....	0 gr. 0625
Sucre aromatisé Q. S. pour 100 gr. de Saccharure.	

**Indications.** — Affections intestinales ; Colibacilloses  
Diarrhées et complications, Oxyures.

Affections des voies biliaires : Cholécystites, Angio-  
colites ; Affections urinaires.

Posologie :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 22 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1636-2.

Laboratoires J. CORTEEL

74, rue de La Fère — SAINT-QUENTIN (Aisne).  
(Tél. : 37-29.)

## MAGSALYL

Association Soufre-Salicylate de Soude.

Forme Solution : dosée par cuillerée à café à :

Salicylate de Soude pur.....	0,50
Hyposulfite de Magnésium.....	0,075

Plus Chlorure de Mg, Chlorure de Ca, Salicylate de K, pour établir une solution en équilibre physiologique avec les ions Na, Ca, K et Mg du plasma sanguin.

**Propriétés.** — Activité accrue surtout dans le traitement des affections cardiaques évolutives par l'action catalytique puissante du soufre vis-à-vis du salicylate, en milieu calcique.

Atoxique. Parfaite tolérance gastrique par l'hyposulfite de Mg, antichoc, antitoxique, cholagogue. pH = 7,4. Seule préparation de goût agréable et persistant grâce à un procédé spécial de fabrication.

Forme Comprimés glutinisés :

Composés des mêmes principes actifs, sans aucun excipient, ils se délitent et se dissolvent rapidement et complètement dans l'intestin.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatismes chroniques, sciatique, lumbago, hépatisme, états infectieux.

**Mode d'emploi.** — 4 à 20 cuillerées à café ou comprimés par 24 heures, à diluer 2 cuillerées à café dans un verre de liquide (tisane, lait, etc.).

**Traitement.** — De 3 à 15 jours suivant les cas. Tant que dureront les circonstances actuelles, nous demandons à MM. les Médecins de prescrire de préférence la forme Comprimés. Ne prescrire que dans les cas où vous la jugerez indispensable ou réserver à la médecine infantile la forme solution dont nous ne pouvons garantir une fabrication régulière.

L. N. C. n° 552-3.

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

10, rue de la Mairie

IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)



## MAÏAS

**Ampoules Maïas** à l'essence de térébenthine pure.

**Accouchement** : En injections intra-utérines.

**Émulsion Maïas** à l'essence de térébenthine pure.

**Gynécologie** : En injections vaginales, 1/2 à 2 mesures pour 2 litres d'eau bouillie.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER.**

## MAISLERIASE

**Composition.** — Deux liquides : *Oxydant* : Peroxyde d'H. benzoiné et catalysé. — *Spécifique* : Argent en combinaison protidique, colloïdal, fermenté et peptisé.

**Propriétés.** — *Par voie externe* : Oxydation physiologique et formation d'Ag. ionique. Immunité active. Consolidation de l'immunité naturelle. Anti-infectieux, résorbant, cicatrisant, hémostatique et analgésique.

**Indications.** — Traitement biologique d'ordre pathogénique, quel que soit l'endroit et l'ag. pathogène. Blennorragies, Prostatites, Cystites, Hémorroïdes, Métrites, Vulvo-vaginites des petites filles, Vaginisme, Fissure à l'anus, Prurit anovulvaire, Conjonctivite, Otite, Plaies, Fistules, Phlegmons, Ulcères, Brûlures, Folliculites.

**Formes.** — Par voie externe : deux flacons : Oxydant incolore et Spécifique brun. *Maisleriase* avec seringue, 73,25 ; *Maisleriase F.*, 48,90 ; *Maisleriase P. M.*, 30,55.

**Posologie.** — Injection ou arrosage successif avec l'Oxydant d'abord et le Spécifique ensuite. Urètre : 1 cc. pur. Prostate : 1/2 cc. pur. Vessie : 1 cc. pur. Vulve : 1 cc. Vagin et Rectum : 6 cc. pur ou dilué au tiers. Plaies : 1 à 3 cc. purs. Leucorrhée : 1 cuil. à café dans 1/2 verre d'eau bouillie froide.

**Laboratoires de la MAISLERIASE**

143, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Vaugirard 70-61).

## MAÏZENA

**Présentation.** — Poudre blanche, sans saveur, ni odeur, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau chaude et formant une crème onctueuse et, si la concentration est suffisante, une gelée en refroidissant.

### Analyse :

Carbohydrates .....	87,60 %
Matières grasses.....	0,04 —
Matières azotées.....	0,72 —
Matières minérales .....	0,14 —
Humidité.....	11,50 —
	100 %

**Indications.** — Aliment léger, facilement assimilable convenant particulièrement aux enfants et aux sujets présentant des troubles digestifs.

**Mode d'emploi.** — Sous forme de bouillies, potages, entremets sucrés et aromatisés : 1° Délayer la *Maïzena* dans un liquide froid (lait, bouillon) pour que le mélange soit bien lisse ; 2° Verser ce mélange dans le reste du liquide en ébullition ; 3° Laisser bouillir quelques instants seulement.

**Doses.** — Variables suivant les mets à préparer. Pour les enfants. 1 cuillerée à soupe rase (10 grammes) pour une bouillie de 160 grammes.

### Société des PRODUITS DU MAÏS

29, rue de Berri — PARIS. (Tél. : Élysées 72-06.)

## MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Suraliment, reconstituant, extrait d'orges germées.

### Composition.

42 mg. de Vitamines B <sub>1</sub> (titrage obtenu à l'électrophotomètre de Pt. Meunier) ;
88,0 g. de Maltose, correspondant à 410 calories ;
2,5 g. de Phosphates organiques ;
2,0 g. d'éléments minéraux (Ca, Fe, Mg) ;
7,5 g. d'eau de cristallisation.

**Pouvoir diastasique.** — 1 g. de *Maltea Moser* permet de digérer 1 kg. d'amidon à une température de 37°.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant énergétique (sous-alimentation, convalescence). Galactogène. Alimentation des enfants (préparation des bouillies maltées). Régulateur des fonctions digestives. Anti-nerveux (forte teneur en Vitamines B<sub>1</sub>).

**Mode d'emploi.** — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Assimilation immédiate et goût agréable.

### MOSER et C<sup>ie</sup>

8, chemin de Montbrillant — LYON (III<sup>e</sup>).  
(Tél. : Moncey 42-19.)

## MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé concentrée, riche en phosphates et sels de chaux assimilables.

Préparé dans le vide et à basse température, cet extrait contient toutes les vitamines et les principes toniques et galactogènes du malt.

**Indications.** — Troubles de l'assimilation et de la croissance, Insuffisance lactée des nourrices, Dyspepsies, Arthritisme, Déminéralisation, Anémie, Surmenage.

**Posologie.** — *Adultes* : un verre à bordeaux d'extrait non dilué un peu avant les repas. On peut également s'en servir comme boisson en mangeant, en le coupant au quart avec une eau minérale légèrement alcaline.

*Enfants* : de 1 à 3 cuillerées à soupe avant les repas. Le flacon est vendu 10 fr. 40 + 0 fr. 70 de verreconsigné.

### Établissements DÉJARDIN

A. BOUTROUX, Pharmacien.

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 03-04.)

## MALTOGIL

Malt pailleté garanti pur.

**Composition.** — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique riche en vitamines. Renferme toute la diastase du malt. Réunit dans sa composition du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones, des vitamines.

**Propriétés.** — Aliment très concentré, de saveur agréable et de digestibilité parfaite. Puissant accélérateur de la nutrition, remarquable reconstituant.

**Principales indications.** — Convient particulièrement aux enfants dont on veut favoriser la croissance, à tous les adultes qui nécessitent un régime de suralimentation ainsi qu'aux convalescents, surmenés, anémiés, dyspeptiques, cardiaques, hépatiques. Remplace avantageusement la bière pour nourrice.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau, du lait ou une infusion. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées par jour, à prendre de la même façon.

**Préparation de bouillies maltées par addition de MALTOGIL.** — On peut en outre malter les bouillies à base de farine en y ajoutant du MALTOGIL et en procédant de la façon suivante : après cuisson, retirer la bouillie et la laisser reposer 2 ou 3 minutes. Mettre 1 cuillerée à café de MALTOGIL par cuillerée à soupe de farine employée et remuer. Attendre 1/4 d'heure, puis porter rapidement à ébullition. La bouillie devient fluide et parfaitement digestible.

### Établissements JACQUEMAIRE

Société anonyme au capital de 12 800 000 fr.

VILLEFRANCHE (Rhône).

Laboratoire à RIS-ORANGIS (Seine-et-Oise).

## MALTOSAN

Bouillie maltosée dosée et prête à l'emploi.

**Composition.** — Malt diastasique et farine de céréale, dans la proportion voulue pour réaliser au moment de la préparation la formule de la bouillie maltosée classique (apport en maltose, dextrines).

**Indications.** — Dyspepsie du lait de vache ; combat les fermentations putrides. Désinfectant intestinal, exerce une action favorable dans le traitement de la constipation. Facilite le sevrage.

**Doses.** — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

**Préparation.** — Cuire rapidement sans cesser de remuer. Retirer du feu au premier bouillon.

### Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## MALTOSINE DÉJARDIN

Extrait purifié de malt d'orge séché et stabilisé par atomisation. **Pouvoir diastasique élevé.** Phosphore assimilable. **Vitamines B naturelles.** Maltosage des biberons.

**Indications.** — Facilite la digestion des féculents. Traitement rationnel des colites accompagnées de putréfactions. Tonique et reminéralisant.

**Mode d'emploi.** — Bouillie maltosée. Une cuillerée à café arasée de MALTOSINE (1 gr. 50) liquéfiée à 70° une bouillie contenant 15 gr. de farine. Additionnée au lait, dont elle facilite la digestion, la MALTOSINE réalise un aliment tonique et stimulant pour tous.

### Établissements DÉJARDIN

A. BOUTROUX, Pharmacien.

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## MALT WANDER ou GLOMALT

(Extrait de malt sec.)

**Composition.** — Matières azotées, 5,87 p. 100 ; Hydrates de carbone (maltose et dextrine), 89,19 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Acide phosphorique des substances minérales, 9 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Diastases. Vitamines.

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérococolite chronique par insuffisance amylolytique. Source de diastases et de vitamines B. Permet la préparation des bouillies maltosées.

**Établissements WANDER**  
CHAMPIGNY (Seine)  
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## MANACINE

(Produits à l'extrait de Manaca.)

**Comprimés**  
(Us. interne).

**Pommade**  
(Us. externe).

### Composition :

KI.....	0,048	Extr. mou de Manaca....	1 gr.
KBr.....	0,008	Huile de Chaalmoogra....	1,50
Extr. mou de Manaca.....	0,05	Ichtyol.....	1 gr.
— de Quinquina.....	0,024	Camphre.....	0,40
— de Gentiane.....	0,008	Menthol.....	0,10
— de Marrube.....	0,004	Deutoxyde de Plomb.....	0,10
— d'Agaric.....	0,02	Oxyde de Zinc.....	10,00
— de Passiflore.....	0,004	Excipient.....	Q. S. P. 100 gr.
— de Centaurée.....	0,004		

pour un comprimé.

**Indications.** — Maladies de la Peau (Eczéma, Psoriasis, Acné, Urticaire, etc.), Ulcères variqueux, Troubles de la circulation (Varices, Phlébites, etc.), Artériosclérose, Arthritisme, Brûlures.

### Posologie

2 comprimés matin et soir avant le repas. | Un pansement (ou une application) matin et soir suivant le cas.

Littérature et échantillons :  
**Laboratoires de la MANACINE**  
83, boulevard de la Villette — PARIS (X°).

## MANDÉLIUM

**Composition.** — *Mandélium-ampoules* : ampoules buvables de 3 gr. 38 de mandélate d'ammonium. *Mandélium-poudre* : cachets dosés à 1 gr. 12 de mandélate de calcium.

**Présentation.** — Boîte de 12 ampoules buvables. — Boîte de 36 cachets.

**Propriétés.** — *Bactéricide et acidifiant urinaire.*

**Indications.** — Infections urinaires aiguës et chroniques ; *spécifique du colibacille*. Lithiases phosphatique et oxalique. Toutes alcaloses.

**Posologie.** — 1° Infections urinaires : *Adultes* : 4 ampoules par jour, à raison d'une immédiatement après chaque repas ou 9 à 12 cachets par jour, également répartis en 4 fois dans la journée.

*Enfants* : de moins de 6 mois à 2 ans : 2/3 à 1 ampoule par jour ; 2 à 5 ans : 1 à 2 ampoules ; 5 à 12 ans : 2 à 3 ampoules ; en quatre fois dans la journée comme chez l'adulte.

2° Lithiases et alcaloses : la moitié ou le quart des doses précédentes.

N. B. — L'action du *Mandélium* est sûre, si l'acidité urinaire est suffisante.

Dès le début du traitement, il faut la mesurer plusieurs fois avec notre papier réactif ; si celui-ci reste jaune après avoir été trempé dans l'urine, l'acidité de cette dernière est suffisante (pH égal ou inférieur à 5,3) : s'il vire au gris ou au gris violacé, les urines sont insuffisamment acides.

Si le papier réactif vire au gris violacé après deux jours de traitement par le *Mandélium*, on administrera en plus un acidifiant urinaire. Lorsque l'acidité nécessaire est atteinte, diminuer progressivement l'acidifiant et même les doses de *Mandélium*.

Pendant le traitement, ne pas suivre un régime alimentaire alcalinisant.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## MANDOCARBINE

**Indications.** — Antisepsie des voies biliaires, intestinales et urinaires. Fermentations intestinales, Intoxications alimentaires, Aérophagie, Entérites, Congestion du foie, Prostatites, Cystites, Colibacilloses, Constipation.

**Composition.** — Charbon absorbant, magnésie, poudre de feuilles de belladone, para-amino-benzène sulfamide, mandélate de calcium.

**Forme.** — Granulé fondant.

**Prix :** 22 fr. la boîte pour 10 jours de traitement.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas principal, à placer sur la langue et à absorber avec une gorgée d'eau.

**Enfants :** 1/2 cuillerée à café.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1248-5.

**L. GUÉRET, Pharmacien**

89, rue Martre — CLICHY (Seine). (Tél.: Per. 11-01.)

## MANGAINE

Polyoxyde de Manganèse chimiquement pur.

**Forme et Dose:**

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

**Propriétés thérapeutiques:**

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

**Indications thérapeutiques:**

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

**Dose.** — 4 à 6 tablettes par jour.

**Prix :** 17 fr. 60.

**Laboratoire de la MANGAÏNE**

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

(Tél.: Richelieu 19-26.)

## MANGANÉSIA

Solution permanganique arsenicale.

**Traitement du Diabète.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Manganésia atténue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les oxydations intra-cellulaires, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

**Dose et mode d'emploi.** — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

**Prix :** 21 fr. 50.

L. N. C. n° 437-3.

**Laboratoires des Produits DANNEC'H**

**MARTINEAU, Pharmacien.**

64, rue des Tournelles — PARIS (11<sup>e</sup>). (Tél.: Arch. 87-44.)

R. C. Seine 218.670.

## MANGANO-PHOSPHAL

Gouttes sans aucun toxique.

**Composition.** — XX gouttes contiennent:

Ac. phosphorique offic. anh.....	0 gr. 25
Magnésium et polyglycérol. anh.....	0 gr. 32
Sels de manganèse. anhydre.....	0 gr. 07
Gluconate de cuivre.....	0 gr. 001
Phosphate de zinc.....	0 gr. 0002

En solution sans alcool et sans sucre.

**Indications.** — Puissant reconstituant, sans aucun toxique, agissant très rapidement et donnant des résultats durables. Enfants, adultes, femmes enceintes ou qui nourrissent, diabétiques, vieillards même hypertendus.

**Posologie :**

**Enfants :** 2 gouttes par jour par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

**Adultes :** XX gouttes à chacun des repas de midi et d-soir, dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

**Prix :** 19 fr. 80. — Flacon gratuit sur demande:

**Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie.**

105, rue de Rennes — PARIS (VI<sup>e</sup>). — (Tél.: Littre 80-76.)

## MARINERGOL (Sirop à l'orange.)

La synthèse la plus approchée  
de l'huile de foie de Morue.

**Composition.** — Ergostérine des algues irradiée sur Eau de Mer (Vitamine D-160.000 U. par litre). Extrait de tréfle frais (Vitamines A et D). Complexe minier et abondant, complet et équilibré (Fe + Ca + P). Iode en milieu marin (le plus favorable à son action).

**Particularités.** — L'Irradiation sur Eau de Mer de l'Ergostérine imite, d'aussi près que possible, la formation des Vitamines de la Morue (irradiation au soleil arctique de l'ergostérine des algues, nourriture des fémoras du plankton, puis des harengs, puis des morues).

**Indications.** — Toutes celles de l'huile de foie de Morue et des cures hélio- ou lodo-marines.

Ménage les voies digestives, permet la cure d'hiver. Apporte une réserve minérale pour que les Vitamines ne travaillent pas à vide.

### Posologie :

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café.

*Enfants* : 1 cuillerée à soupe.

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour avant le premier repas.

Laboratoires A. T. L. A. S.

M. FORNIER, Pharmacien

264, Route d'Heyrieux — LYON (VII<sup>e</sup>).

## MARINOL

Reconstituant marin physiologique.  
Inaltérable. De goût agréable.

**Composition.** — Eau de mer captée au large. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

**Particularités.** — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

**Indications.** — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.  
*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Prix : 21 fr. 40.

Laboratoires " LA BIOMARINE "  
DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

## MARRHAMA

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Poudre d'Hamamelis stabilisée : 0,30 ; Poudre de marrons d'Inde stabilisée : 0,30 ; Citrate de Soude : 0,05.

**Indications thérapeutiques.** — Troubles de la circulation et de la Ménopause, Varices, Hémorroïdes.

**Posologie.** — 2 cachets par jour un quart d'heure avant chacun des deux principaux repas.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS.

## MARRUBÈNE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzpate de soude.

**Propriétés.** — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

**Indications.** — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

**Mode d'emploi.** — Le Marrubène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granules et d'éllixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granules, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'éllixir.

Boîte de 36 cachets.

Tube de 45 dragées.

Élixir — Granulés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les numéros :

Cachets 590-10. Dragées 590-9.

Granulés 590-11. Élixir 590-18.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

## MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

**Formes.** — Dragées et sirop.

**Propriétés.** — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

**Indications et Posologie.** — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

*Intoxications, dysenteries* (selles nombreuses) : 2 cuillerées à café ou 4 dragées toutes les 2 heures.

*Entérite chronique* : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n° 103-3 et 4.

Prix : 19 fr., durée 1 à 4 jours.

**OOMTE, Pharmacien,**

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

## MARRUCOL

**Composition.** — Sulfogalacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

**Indications.** — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladie de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

**Propriétés.** — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

**Mode d'emploi.** — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

La boîte de 30 cachets : 14 fr. 70.

**Laboratoire OOLIER**

69, avenue du Maine — PARIS (XIV°).

(Tél. : Danton 86-76.)

## MARUBOR

**Sirop à base d'extrait hydroalcoolique stabilisé de Marrube Blanc.**

**Propriétés.** — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant, toni-cardiaque.

**Indications.** — Congestion pulmonaire, Bronchites rebelles ou chroniques, Catarrhe, Asthme, Tuberculose.

Aucune contre-indication.

**Posologie.** — Agréable malgré sa haute teneur en Marrube (10 gr. d'extrait stabilisé par litre), ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 20 fr. 20.

Littérature et Échantillons au

**Laboratoires du MARUBOR**

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-59.)

## MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

**Indications.** — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

**Composition.** — Vin : Muscat de Samos et Maté. Élixir : Crème de Cacao et Maté.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.

Prix du granulé : 16 fr. 20.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice, sur demande adressée au Dépôt général :

**PHARMACIE ANGLAISE**

**DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII°).

(Tél. : Élysées 22-52.)

## MÉDICOFERMENT

Phosphates, Diastases, Vitamines.

Culture pure et active de Levure de Raisins sélectionnée, acclimatée à hautes températures et physiologiquement préparée pour l'usage thérapeutique. (R. Thiré, pharmacien.) Enregistré au L. N. C. M., n° 826-1.

**Propriétés.** — Désintoxication et immunisation de l'organisme par les ferments vivants et en pleine activité.

**Indications.** — 1° Dermatoses (Furuncles, Acné, Orgelets, Rougeurs, Eczéma, Dartres, Démangeaisons, etc.);

2° Troubles digestifs (Dyspepsie, Intestin, Diarrhée, Constipation, etc.);

3° Maladies de la nutrition (Diabète, Arthritisme, etc.);

4° Maladies infectieuses.

La dose pour une cure d'environ 3 semaines : 35 fr. 80 franco.

**Mode d'emploi.** — Un petit verre à liqueur avant les repas de midi et du soir dans un demi-verre d'eau sucrée avec un demi-morceau de sucre scié.

**Cas rebelles :** 3 verres à liqueur par jour.

**Enfants 2 à 6 ans :** demi-doses.

Ne pas confondre le Médicoferment avec les us de raisins stérilisés ou autres.

Littérature et Echantillon gratuits.

Laboratoire G.-CÉSAR BOSS,

MÉDICOFERMENT

10, rue de la Viotte — BESANÇON (Doubs).

## MENOSÉDINE

**Composition.** — Gossypium, Hamamelis, Poudre ovarienne, Pyramidon, Bromure de sodium.

**Indications.** — Sédatif utérin, Calme les phénomènes douloureux et malaises qui précèdent ou accompagnent les règles.

**Formes.** — Liquide et comprimés.

**Posologie.** — Au début des malaises, une cuillerée à soupe : une seconde cuillerée une demi-heure après si la première n'a pas suffi.

Trois comprimés dans un peu d'eau ; trois autres une demi-heure après si besoin.

**Prix :** Liquide et comprimés : 15 fr.

**Laboratoires Docteur DEMASLES**

8, r. du Musée — VIENNE (Isère). (Tél.: 9-71.)

## MENSIVAL

Médicament spécifique de la douleur menstruelle.

**Forme.** — Cachets de 0 gr. 50 constitués uniquement par le Diméthylpropanoateorthoxybenzoïque (Ether valérianique de la fonction oxydrique salicylique).

**Propriétés thérapeutiques.** — a. Sédatif utérin analgésique, antipyrétique et antispasmodique, agissant en 20 minutes.

b. Régulateur du flux menstruel. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

**Indications.** — Règles douloureuses, Dysménorrhées, Spasmes utérins, Coliques post-partum, Névralgies utéro-ovariennes, Troubles douloureux de la ménopause, Nervosisme de l'époque menstruelle.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux jours avant la date présumée des règles : 2 cachets par jour. Pendant les règles : 3 à 4 cachets par jour avec une infusion chaude, à 3 ou 4 heures d'intervalle.

**Prix :** 20 fr. 30 la boîte de 24 cachets.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1731-3.

**Laboratoires SUJAL**

J. LAFARGE, Docteur en Pharmacie

CHATEAUROUX (Indre).



## MENSUOSÉDYL

*Calmant immédiat des Douleurs menstruelles, adjuvant à tous traitements des Dysménorrhées.*

### Composition :

Un sédatif utérin .....	Anémone.
Un analgésique .....	Pyramidon.
Un diurétique-décongestif .....	Scille.
Un antispasmodique .....	Valériane.
Un toni-cardiaque .....	Aubépine.

(Procédé spécial de conservation.)

La boîte de 12 cachets : 17 francs.

### Processus de l'action.

Le flux menstruel est régularisé grâce à l'action *sédative* élective qu'exerce l'*Anémone* sur le faisceau vasomoteur du para sympathique et sur les filets de l'appareil utérin.

L'efficacité *analgésique* et *antinévralgique* du *Pyramidon* est très connue dans le cas considéré.

La scille diurétique et tonocardiaque réalise une heureuse action *décongestive* sur le rein hyperémié à cette période et joue le rôle de *correctif* vis-à-vis du pyramidon.

La *valériane*, par action équilibrante sur le sympathique, calme les symptômes nerveux et amorce l'action sédative.

L'extraît d'aubépine lutte contre la *dépression cardiaque* (palpitations, vertiges, syncopes) qui complique généralement les troubles de la période menstruelle et régularise l'action sédative.

Sans opothérapie, le *Cachet Mensuosédyl* n'influence pas directement le rythme de l'ovulation. Il ne vise qu'à calmer l'élément douleur dans toutes ses manifestations symptomatiques et y réussit parfaitement.

Il constitue l'adjuvant, le catalyseur idéal de tous traitements de la cause d'une irrégularité fonctionnelle ovarienne et ne présente aucune contre-indication.

**Mode d'emplol.** — 1 cachet dès l'apparition des douleurs, 2 à 3 par 24 heures. Menstrualgies, Dysménorrhées, Troubles nerveux de la vie génitale, Algies post partum.

*Échantillons sur demande.*

**Paul AUGIER, Pharmacien**

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
2, rue des Lombards — PARIS (IV°).  
(Tél. : Archives 09-04.)

## MERCUROCHROME 220 H. W. D.

**Formes.** — Solutions aqueuses 2 p. 100, 14, 60 cc., etc.

Pommades : 30 gr., 2 et 5 p. 100.

Collyre, pommade et solution.

Ovules 2 et 5 p. 100.

Suppositoires.

Solution chirurgicale : acéto-alcoolique.

**Indications.** — Antiseptique général, Bactéricide tinctorial puissant, non caustique.

**Usage externe :** désinfection de la peau, des muqueuses.

**Injections intraveineuses :** Septicémie (sel sec préparé spécialement).

**THANTIS-TABLETTES :** pastilles sel sodique de la monohydroxymercuri-diiodo-résorcine-sulfonphthaléine. Antiseptique bucco-pharyngé extrêmement actif.

Le tube de 10 pastilles : 23 fr.

Laboratoire

du **MERCUROCHROME 220 H. W. D.**

**M. MASSON, Pharmacien**

25, rue Saint-Augustin — PARIS (2°).

(Tél. : Opéra 87-23.)

## MERCURO-PAST

**Dermatologie - Chirurgie.**

**Composition.** — Pâte à l'eau spéciale au mercuro-fluoren.

**Propriétés.** — Par l'association stable des deux meilleurs agents dermatothérapeutiques. La pâte à l'eau traditionnelle. L'antiseptique moderne de choix : le dibromooxymercurifluorescéine (marque déposée : mercuro-fluoren).

**Indications.** — Le *Mercuro-Past* est indiqué dans toutes les dermatoses.

**Dermatologie :** Eczémas, Dermatoses inflammatoires, Dermatoses parasitaires.

**Chirurgie :** Cicatrisant et désinfectant des plaies superficielles et anciennes. Cicatrisant des plaies superficielles infectées. Plaies chirurgicales traînantes : fistules, escharres, etc. Retard de cicatrisation.

**Mode d'emplol.** — Selon l'indication du médecin.

**Présentation.** — Tube de 80 gr. Prix public : 18 fr.

Laboratoire **PRIGNIAU**

52, rue des Cinq-Diamants — PARIS (XIII°).

(Tél. : Gob. 90-79.)

## MÉSOTHINE RHEMDA

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine).

**Action.** — 1° La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2° Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolitiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

### Diathèse arthritique.

**Indications.** — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine. Affections vésico-rénales et biliaires.

**Posologie.** — 1 à 4 comprimés, le matin à jeun, de préférence suivant l'indication du médecin.

Dans les cas de manifestations aiguës : 4 tubes de 20 comprimés. Cure préventive ou d'entretien : 1 tube tous les 3 mois.

Prix au public : tube de 20 comprimés : 15 fr. 30

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le N° 466-1.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-89, 18-41. — R. C. : Seine 255.068 B.)

## MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium en ampoules.

**Primesol.** — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix au public : 12 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-8.

**Bimesol.** — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix au public : 21 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-9.

**Trimesol.** — 2 microes par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine.) Traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 microes par jour pendant 8 jours.

Prix au public : 75 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-10.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

S. MOGAN, Pharmacien

51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-89, 18-41. — R. C. : Seine 255-068 B.)

## MÉTACARBINE

Formine (recristallisée dans l'alcool)... 3 gr.

Charbon hyperactivé..... 15 gr.

Sucre aromatisé..... Q. S. P. 100 gr.

**Propriétés.** — Anti-infectieux interne, absorbant et puissant adsorbant.

**Indications.** — Infections biliaires, urinaires ou gastro-intestinales d'origine épidémique, parasitaire avec ou sans fermentation (entérites, entéro-colites muco-membraneuses, colites spasmodiques, colibacillooses, etc.).

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin et après les 2 principaux repas. A croquer ou délayer dans un peu d'eau.

**Nota.** — Le pouvoir adsorbant de ce charbon a été considérablement augmenté par une préparation spéciale. Il ne ressemble en rien aux autres charbons dont la force attractive envers les toxines et les poisons ne peut être comparée à celle du charbon hyperactivé.

Prix : 17 fr. 70 la boîte de 135 gr.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

71, rue Saint-Anne, PARIS — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France

O. C. P., Paris, et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PELISSARD, ALGER-CASABLANCA

## MÉTACITRINE

Citrate trisodique..... 6 gr. 50

Phosphate de soude..... 7 gr. 50

Sulfate de soude..... 8 gr. 50

Lactose et sucre effervescent..... 100 gr.

Poudre granulée.

**Propriétés.** — Favorise la digestion, active la sécrétion biliaire, fluidifie le sang, prévient la lithiase intestinale.

Son action (léotonique) sur le muscle lui-même et (cholagogue) sur la sécrétion biliaire, détermine une réaction directe et indirecte sur les glandes annexes.

**Indications.** — Dyspepsies, gastropathies, crise hémoclasique, diathèse arthritique, stase veineuse.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées acafé le matin à jeun ou 1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas. Dans un grand verre d'eau tiède.

**Nota.** — Si le Phosphate Acide de Soude dissout les calculs phosphocarbonatés, le Sel de Magnésie agit moins en dissolvant les concrétions oxalo-phosphatées qu'en empêchant leur formation.

Prix : 22 francs le flacon de 150 gr.

Laboratoire du D<sup>r</sup> E. AUBERT

71, rue Sainte-Anne, PARIS — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France.

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PELISSARD — ALGER-CASABLANCA.

## MÉTAFORMINE

(GRANULÉ SOLUBLE)  
Composition :

Rein (extrait total).....	3 gr.
Formine (anhydro-citrate).....	2 gr.
Pipérazine (tartrate).....	2 gr.
Lithine (citrate).....	2 gr.
Lactose et sucre. Q. S. pour.....	100 gr.

Propriétés. — Stimulant diastasique rénal, diurétique atoxique. Dialytique, anti-urlique.

Indications. — Arthritisme, uricémie, goutte, gravelle, rhumatisme, migraine.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un grand verre d'eau. Le matin à jeun ou avant les repas, et le soir au coucher.

Etats aigus : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Prix : Grande boîte étanche : 135 gr. : 22 fr. 60.

10 jours de traitement.

Conditions spéciales au corps médical.

Nota. — La première synergie des diastases rénales associées aux diurétiques chimiques.

Il existe aussi une forme *Métaformine comprimé*, renfermant uniquement 0 gr. 50 de formine purifiée par comprimé soluble dans l'eau. — Toutes indications des antiseptiques diffusibles.

LABORATOIRES du Docteur E. AUBERT

71, rue Sainte-Anne, PARIS (IIe) — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement pharmaceutique et Dépôts France :

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD — ALGER-CASABLANCA.

## MÉTATITANE

Pommade et Poudre introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures, Coups de soleil, Engelures, Piqures d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Tourneux, Juster, etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus rigoureusement purs par un procédé tout particulier.

Présentation : Grand tube. — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER  
TOURS. (Tél. : 35-35, 2 lignes.)

## MÉTAVACCIN

Vaccin-pommade aux antiviruses. Rigoureusement stérile.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abcès, Panaris, Pyodermes, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites. Tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunsation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunsation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles.

Présentation : Grand tube — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER  
TOURS. (Tél. : 35-35, 2 lignes.)

## MÉTREX

Extrait total d'utérus.  
Actif par vole buccale.

**Composition.** — Extrait total d'utérus (procédé Biosymplex). 1 cc. de solution hydro-alcoolique (45 gouttes) correspond à 2 gr. d'organe.

**Mode d'action.** — L'importance du rôle endocrinien de l'utérus est aujourd'hui démontrée. La sécrétion interne de l'utérus est indispensable au fonctionnement normal de l'ovaire (formation des corps jaunes normaux), de la thyroïde et de l'hypophyse.

L'opothérapie utérine stimule le développement et améliore le trophisme de l'utérus hypoplasique. Chez les hystérectomisées, elle évite la sclérose de l'ovaire ou du greffon ; chez les femmes ménopausées ou castrées, elle renforce les effets de l'opothérapie ovarienne ou ambohormonale.

**Indications.** — Dysménorrhées essentielles, Dysménorrhées, Oligoménorrhées, Aménorrhées, Stérilité par infantilisme utérin, Hypoplasie utérine, Troubles subjectifs de la Ménopause et de la Castration.

**Posologie.** — Prescrire pendant la deuxième moitié du cycle menstruel : le premier mois, 10 à 25 gouttes par jour, en 2 prises. Suivant les résultats obtenus après le 1<sup>er</sup> mois, maintenir la dose initiale ou la porter à 30-45 gouttes par jour. *Absorber les gouttes une demi-heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre qu'on laissera fondre lentement dans la bouche.*

a. Dans les *dysménorrhées*, continuer le traitement le 1<sup>er</sup> jour des règles.

b. En cas d'aménorrhée primaire, administrer *Métrex* pendant la 2<sup>e</sup> et la 4<sup>e</sup> semaine du mois, en alternant avec *Crinex* et *Flavez*, qui seront donnés respectivement la 1<sup>re</sup> et la 3<sup>e</sup> semaine.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-14.

Prix : Le flacon 24 francs.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

I, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Alésia 28-51.)

## MÉTRITOLS

Thérapeutique gynécologique

### COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES EFFERVESCENTS « MÉTRITOLS »

**Composition.** — Acide picrique, oxyquinoléine, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptiques, alcalins, astringents, les MÉTRITOLS donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

**Mode d'emploi.** — **Injections vaginales :** Un comprimé dans 1 litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bœck très bas. **Hygiène journalière :** un comprimé dans 2 litres d'eau à la température du corps. On utilisera de préférence la canule « Métritol » à double courant, prix : 21 francs.

La boîte de 40 comprimés, prix : 21 fr. 10.

### CRAYONS INTRA-UTÉRINS « MÉTRITOLS »

**Composition.** — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorocéine, Argent colloïdal, Chlorothymol, Parachlorométacrésole, Chloroxylinol.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptiques, Polyvalents, Cicatrisants, Décongestionnants.

Métrites chroniques endocervicales de toute origine.

**Mode d'emploi.** — Placer un crayon intra-utérin tous les 2 ou 3 jours. Dans l'intervalle, prescrire les ovules.

Prix : 23 fr. 50.

### OVULES « MÉTRITOLS »

**Composition.** — Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorocéine — Parachlorométacrésole — Chloroxylinol — Sous-gallate de Bismuth, Oxyde de titane, Essences de cèdre et de Labiées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Désodorisants.

**Mode d'emploi.** — Un ovule tous les 2 ou 3 jours.

La boîte, prix : 21 fr. 10.

Laboratoires LEES

Directeur : Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V<sup>e</sup>).  
(Tél. : Odéon 22-01.)

## MEXYL

**Pâte dentifrice antispirillaire à l'arsénobenzol.**

**Propriétés.** — Le Phénylaminarsan, arsénobenzol pentavalent, est un agent antispirillaire puissant: il présente l'avantage d'une grande stabilité et d'une très forte diffusibilité, propriétés qui en font l'agent thérapeutique de choix des spirochètes buccales.

**Indications.** — Pyorrhée alvéolaire, gingivites, stomatites, noma, gangrène buccale, hygiène buccale préventive.

**Mode d'emploi.** — Brosser gencives et dents, faces externe et interne. Si les gencives ne supportent pas la brosse, masser avec doigt enduit de pâte.

Prix : le tube, 9 fr. 60.

L. N. C. M. n° 574-1.

**Laboratoires MEXYL**

12, rue Henri-Rivière — LE PERREUX (Seine):

(Tél. : Tremblay 01-97.)

## MICELLIODE

**Iode colloïdal micellaire électro-positif.  
Préparé à partir de foies frais.**

### Composition :

Iode métalloïdique libre..... 0 gr. 15

Glycogène extrait du foie frais. 2 gr. 50

Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.

Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 5) d'iode libre par gramme ou centimètre cube.

**Avantages.** — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

### Jamais d'iodisme

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les indications de l'Iode. Préparation de choix pour l'administration de l'iode aux Basedowiens.

### Présentation :

1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).

2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

### Posologie :

**Gouttes :** Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

*Adultes :* LX à C gouttes.

*Adolescents :* L à LXXX gouttes.

*Enfants :* XXX à L gouttes.

*Nourrissons :* XV à XX gouttes.

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

## MICRODERME

### (CRÈME D'ALIBOUR CICATRISANTE)

Non irritant. Microbicide par le Zn et Cu ionisés.  
Isotonique par le MgCl<sup>2</sup>. Cicatrisant.

**Formule.** — So<sup>4</sup>Cu, 0,20 ; SO<sup>4</sup>Zn, 0,20 ; Sérum magnésien, 40 ; ZnO, 8 g. ; Huile de Flétan, 2 ; Excipient gras enlevable à l'eau, Q. S. p. 100.

**Indications.** — *Toutes pyococcies cutanées et plaies dtones. Impétigo, Orgelets, Anthrax, Dartres volantes, Eczéma et Dysidrose infectés, Ulcère de la jambe, Brûlures. Dermites fessières des nourrissons, Prurit, etc.*

**Aucune contre-indication.** — Est supporté par tous épidermes et muqueuses même irrités par une médication préalable.

Le tube de 50 gr. .... 16 fr. 40

**Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## MICROLYSE

**Thérapeutique de l'infection par Imprégnation.**

**Traitement de toutes les affections à Staphylocoques, Streptocoques et surtout action élective sur le Colibacille et le Gonocoque.**

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

Communication à l'Académie de médecine  
du 24 janvier 1933.

### Action et Composition :

Combat l'infection généralisée et les phénomènes consécutifs sur l'arbre urinaire par la coordination de deux éléments bactéricides.

SEL A. Chlorhydrate de méthyl-oxyquinoléine. Imprègne l'organisme et lui rend ses moyens de défense.

SEL B. Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine. Se porte sur l'arbre urinaire qu'il calme et assainit.

### Indications.

La plupart des états infectieux. Septicémies, Furunculose (action rapide).

*Colibacillooses* : Infections des voies intestinales et biliaires, Entérocrites, Cholécystites, Lithiases. Infections urinaires. En général : Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites.

*Parasites intestinaux* : Vers, Amibes et autres protozoaires, souvent générateurs de colibacillose. *Gonococcies* : Urétrites, Métrites, Salpingites.

### Quatre formes :

*Comprimés* : 3 par jour, un pendant ou après chaque repas. Avaler sans croquer. Prix : 25 fr.

*Suppositoires* pour enfants et adultes. Prix : 24 fr. 10.

*Tablettes* pour lavages vésicaux et vaginaux. Prix : 25 fr. 80.

*Ovules* pour gynécologie. Prix : 23 francs.

**Laboratoires de Physiologie  
et de Thérapeutique.**

10, rue de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 46-14.)

**MICTASOL****Décongestif pelvien.****Composition.****Comprimés.** — *Malva purpurea*, Bromure de Camphre, Hexaméthylènetétramine.**Suppositoires :** *Malva purpurea*, Stovaine, Ext. de Jusquiame, Ichtyol.**Ovules :** *Malva purpurea*, Ichtyol, Ext. de Jusquiame.**Propriétés thérapeutiques.**

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

**Indications thérapeutiques.**

Prostatisme. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Congestions utéro-ovariennes. Métrites. Salpingites. Vaginites. Rétention. Incontinence. Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.****Comprimés :** 6 à 9 comprimés par jour, à prendre aux repas, avec un peu d'eau.**Suppositoires :** 1 ou 2 par jour.**Ovules :** 1 le soir au coucher.**Laboratoires du MICTASOL**5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 71-33.)

**MICTASOL BLEU****Décongestif pelvien.****Composition.** — *Malva purpurea*, Bleu de Méthylène, Bromure de Camphre.**Indications.** — Toutes les indications du *Mictasol*, et en particulier les infections, congestions et inflammations du petit bassin s'accompagnant de douleurs.**Forme.** — Comprimés.**Posologie.** — Même posologie que le *Mictasol*, soit 6 à 9 comprimés par jour.**Laboratoires du MICTASOL**5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 71-33.)

**MICTASOVULES****Décongestif pelvien.****Composition.** — *Malva purpurea*, Ichtyol, Extrait de Jusquiame.**Indications.** — Les *Mictasovules* complètent très utilement la cure buccale par le *Mictasol* ou le *Mictasol Bleu* dans les Métrites, Salpingites, Vaginites, Congestions utéro-ovariennes, etc.**Posologie.** — 1 ovule le soir au coucher. En raison des circonstances économiques actuelles et de la raréfaction de certaines matières premières, la vente des MICTASOVULES peut être ralentie.**Laboratoires du MICTASOL**5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 71-33.) →

## MICTAZINE

*Anti-infectieux et décongestif pelvien.*

### Composition :

Para-amino-phényl-sulfamide, Malva purpurea, Bromure de camphre.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Anti-infectieux* par la para-amino-phényl-sulfamide, spécifique contre le streptocoque, le gonocoque, le colibacille, le staphylocoque souvent associés dans les infections génito-urinaires.

*Décongestif pelvien* par la Malva purpurea.

*Anti-spasmodique et sédatif génital* par le bromure de camphre.

**Action rapide, durable, sans toxicité.**

**Indications thérapeutiques.** — Infections urinaires aiguës, Urétrites, Cystites, Prostatites, Pyérites, Pyélonéphrites, Métrites, Salpingites, Prophylaxie du post-partum et du post-abortion, Fièvre puerpérale, Prophylaxie des accidents infectieux post-opératoires en chirurgie abdominale et urinaire, Infections gonococciques, streptococciques, colibacillaires, etc.

**Posologie.** — *Infections urinaires à gonocoques :* Commencer le traitement par 10 comprimés par 24 heures pendant la première semaine (doses fractionnées de 1 ou 2 comprimés d'heure en heure), puis dégressivement 9 et 8 comprimés jusqu'à guérison intégrale. *Sous surveillance médicale.*

*Infections urinaires à streptocoques, colibacilles, staphylocoques :*

**Traitement curatif** des infections déclarées : Pyélonéphrites, Cystites, Infections du petit bassin, Salpingites, Métrites, Prostatites, Infections puerpérales : 10 comprimés par 24 heures (par 2 comprimés d'heure en heure). *Sous surveillance médicale.* Diminuer progressivement avec la chute de la température, l'éclaircissement des urines, la sédation des phénomènes douloureux.

**Laboratoire du MICTASOL**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Kléber 71-33.)

## MICTOPHILE RICHER

**Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.**  
Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

### Composition :

Bleu de méthylène .....	0,02
Lactose .....	0,29
Extrait de belladone .....	0,003
— de mauve .....	0,05

Pour 1 comprimé glutinisé.

**Indications.** — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyérites, Pyélonéphrites, Blennorrhagies, Prostatites, Colibacillurie.

**Mode d'emploi.** — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 18 fr. 70.

**Laboratoire RICHER**

**Docteur en Pharmacie,**

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,  
PARIS. (Tél. : Provence 34-87.)

## MICTOSÉDA

### Comprimés.

Sédatif-décongestif génito-urinaire.

Deux formes : Bleu et Simple.

Petits comprimés lenticulaires.

**Composition.** — *Mictoséda bleu :* Bromure de Camphre 0,02, Benzoate de Lithine 0,10, Hexaméthylène Trétramine 0,05, Bleu de Méthylène 0,02, Extrait de chiendent 0,01, Extrait de Jusquiamme 0,01, Bimalva qualité supérieure 0,30. *Mictoséda simple :* même formule, sauf remplacement du Bleu de Méthylène par extrait marron d'Inde 0,05.

**Indications.** — Syndromes entéro-rénal et vésical. Prostatisme, Urétrites, Cystites, Néphrites, Bacturies, Dysménorrhées, Métrites, Vaginites, Salpingites. Rétention, Troubles nerveux urinaires, Congestion du petit bassin chez l'homme et la femme.

**Mode d'emploi.** — 6 à 8 comprimés par 24 heures, aux repas, avec une gorgée d'eau.

Prix : 20 fr. 20 l'étui de 50 comprimés.

(6 à 9 jours.)

**Laboratoires FAURE et LAGENTE**  
MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59.)



# MICTUALINE

Antiseptique, Sédatif, Décongestif.

1° PILULES

Collargol à 80 p. 100 argent pur .....	0,02
Urotropine recrystallisée .....	0,10
Bleu de méthylène pur .....	0,01
Bromure de camphre.....	0,02
Extraits d'Uva ursi @ seneçon.....	Q. S. p. 1 pilule

Indications :

- 1° Maladies des voies urinaires (métrites, cystites, pyélonéphrites, prostatites, hypertrophie de la prostate, etc.).
- 2° Maladies des voies génitales des deux sexes.
- 3° Maladies intestinales dans leurs rapports avec le tractus génito-urinaire (syndrome entéro-renal, colibacilliose, etc.).

Posologie. — 6 à 9 pilules par jour.

Prix : 22 fr. 50

2° SUPPOSITOIRES

Extrait Belladone .....	0,01
— Jusquiame .....	0,05
— Hamamelis .....	0,10
Bromure de camphre.....	0,10
Analgésine .....	0,40

Toutes algies : 1 à 2 par jour. — Prix : 18 fr. 70.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Émile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

# MINEPLASTINE

Pâte stabilisée à l'eau, exempte de corps gras.

Tous les constituants de cette pâte, y compris l'excipient, sont de nature minérale.

Formule :

Oxyde de zinc.....	25 gr.
Silicate de Magnésie.....	25 gr.
Silicate d'Alumine Colloïdal.....	60 gr.

Propriétés. — Le gel argile base de la Mineplastine possédant une tension de vapeur égale à celle de l'eau pure, la Mineplastine laisse sur la peau un enduit homogène, poreux, antiseptique, doué d'un pouvoir absorbant considérable et parfaitement perméable à l'air.

Indications. — Toutes dermatoses aigües et stuintantes quelle qu'en soit l'origine. Dermites aigües ou médicamenteuses.

La Mineplastine réussit particulièrement bien dans le traitement des eczémas humides et de l'intertrigo. Son action contre les escarres des malades alités est remarquable.

En thérapeutique infantile. — La Mineplastine a de nombreuses indications, dont la plus importante est l'érythème fessier. Les eczémas et l'impétigo du nourrisson sont également justiciables de la Mineplastine.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche épaisse recouverte ou non de gaze.

Enlever quotidiennement l'enduit de Mineplastine par simple lavage à l'eau.

La Mineplastine ne tache pas le linge.

Prix : le tube : 14 fr. 70.

Laboratoire MAUCHANT

GENNEVILLIERS (Seine). — (Tél. : Grés. 05-21.)

# MINÉRALINE

DU DOCTEUR BAUD

(Poudre antiseptique, infermentescible, strictement minérale).

Composition. — La fabrication à l'échelle industrielle de cette poudre permet seule la longue série de manipulations qui confèrent à la MINÉRALINE un degré de finesse inégalé, finesse qui lui permet de pénétrer dans lesreplis cutanés les plus profonds.

Indications. — Traitement externe des diverses affections cutanées : urticaire, intertrigo, eczéma, impétigo, psoriasis, prurit anal et vulvaire.

Pays chauds. — Outre son intérêt contre les coupures causées par la transpiration, la MINÉRALINE est utilement employée pour le traitement des éruptions connues sous le nom de « Hamonil » et « Bouton du Nil ».

Thérapeutique infantile. — La MINÉRALINE est la poudre à poudrer par excellence des bébés après le bain, bien supérieure au talc qui ne possède ni sa finesse, ni son adhésivité, ni ses qualités antiseptiques.

Remarque. — Pour le traitement des dermatoses infectées ou stuintantes, il est préférable de faire précéder le poudrage à la MINÉRALINE d'une application de Mineplastine (voir ce mot).

Prix : Boîte poudreuse : 8 fr. 80.

Boîte de réserve quintuple : 29 fr. 30.

Laboratoire MAUCHANT

GENNEVILLIERS (Seine). (Tél. : Grés. 05-21.)

# MINERVOL

Pommade en tube. Poudre.

Pommade. Formule : Acide benzoïque du toluol, 0 gr. 20 ; acide borique, 3 gr. ; Silicate de magnésie, 10 gr. ; Baume du Pérou, 1 gr. 50 Stéarate de zinc, 10 gr. ; Acide orthoxybenzoïque, 0 gr. 30 ; Méta dioxypnéol, 0 gr. 70 ; essence de verveine et excipient, Q. S. P. 100 grammes.

Indications. — Erythème fessier, rougeurs, démangeaisons, crevasses du sein et des mains, engelures, gerçures, brûlures, coups de soleil, prurits, impétigo, intertrigo, et toutes dermatoses.

Poudre. Formule : Sous-gallate de Bismuth, 0 gr. 20 ; Oxyde de Titane, 2 gr. 50 ; Peroxyde de zinc, 0 gr. 50 ; Stéarate de zinc, 37 gr. 50 ; Carbonate de magnésie, 2 gr. 50 ; acide borique 2 gr. Silicate de magnésie spécial hydraté, Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Complète l'action de la pommade. Démangeaisons, transpiration, toilette intime, échauffements de la peau, érythème fessier et rougeurs des nouveau-nés et des adultes.

Poudre siccatrice, hydrofuge, à pouvoir couvrant considérable et atomisée.

(Publicité exclusivement médicale.)

Prix : Pommade, 8 fr. 30 — Poudre, 8 fr. 30.

Laboratoires M. DE RIVE

A. de Rive, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## MINUREX

Du Docteur P. BOURGGRAFF

**Composition.** — Pour 1 comprimé :

Extrait de Cécropla .....	} à 0,015
Extrait de Cynara feuilles fraîches .....	
Extrait de Teskra .....	
Diméthylxanthine .....	
Phosphate de Soude Anhydre .....	0,125
	0,10

**Propriétés.** — Diurétique direct, il diminue l'azotémie, régularise et stimule la systole ventriculaire.

**Indications.** — Syndrome cardio-rénal, azotémie légère chez certains porteurs d'ulcères jambiers, déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux, Dyspnée d'effort.

**Mode d'emploi.** — Prendre 3 fois 2 comprimés par jour. Demander les brochures des Docteurs P. et R. Bourggraft : *Ulcers Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.*

**Littérature sur demande aux :**

Laboratoires du **PRATICIEN**

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## MITIGAL

Nom déposé. Licence Bayet.

**Composition.** — Combinaison huileuse de disulfure de diméthyldiphénylène contenant 25 % de soufre.

**Propriétés et indications.** — Parasiticide et anti-prurigineux, non irritant.

Gale, Dermatoses parasitaires et séborrhéiques, Eczémas, Herpès tonsurant, Impétigo, Favus, Acné, Dishydrrose, Prurit essentiel et Affections cutanées prurigineuses.

**Mode d'emploi.** — Pour le traitement de la gale, répartir en 3 fractions le contenu du flacon de 150 gr. et procéder 3 soirs de suite à une friction soigneuse. Appliquer en couche mince. Prendre un bain savonneux chaud le soir qui suit la dernière friction. Chez les enfants qui présentent des lésions de grattage intenses ou étendues, on procédera par applications locales.

**Présentation.** — Flacons de 75 et de 150 gr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## MITOSYL

PANSEMENT BIOLOGIQUE

Pâte aux vitamines A et D,  
Huile de foie de morue et de flétan.

Le premier pansement français aux vitamines.

**Propriétés :**

*Mitosyl active les mitoses cellulaires.*

*Mitosyl constitue le pansement biologique idéal, antalgique, cytophyllactique, anti-infectieux.*

*Grâce à la vitamine A, il est un régénérateur des tissus cutanéomuqueux et osseux.*

*Grâce à la vitamine D, il réduit l'inflammation, diminue la douleur et permet la suppression des drains.*

*Grâce à l'huile de foie de morue, Mitosyl possède un pouvoir de pénétration très grand et rend indolore le changement des pansements.*

**Indications :**

*En chirurgie :* plaies avec ou sans délabrement tissulaire, abcès incisés, anthrax, panaris, brûlures du premier au troisième degré, ulcérations des mognons, cavités osseuses d'ostéomyélites.

*En médecine :* ulcérations cutanées atones, engelures, ulcères variqueux, suppurations cutanées, staphylococcies épidermiques, escarres de décubitus.

*En pédiatrie :* eczéma du nourrisson, érythème fessier.

*En dermatologie :* eczémas aigus, dermatoses prurigineuses et croûteuses.

*En gynécologie :* métrites, ulcérations du col, vaginites.

*En proctologie :* fissures et ulcérations anales et périanales.

*En oto-rhino-laryngologie :* cavités de mastoïdectomie, rhinites atrophiques, ozène.

*En stomatologie :* stomatites, pyorrhées alvéolaires.

**Mode d'emploi de la pâte Mitosyl :**

Désinfecter, réséquer, traumatiser le moins possible. Appliquer *largu manu* le Mitosyl — faire pénétrer dans les anfractuosités et les fistules — couvrir de compresses stériles simples — renouveler le pansement toutes les 24 heures.

Ne jamais associer d'antiseptiques chimiques au Mitosyl.

**SOCIÉTÉ**

**D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES**

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## MIXIOD

Médication spécifique de l'Amibiase.

Acide 7 Iodo-8 oxyquinoléine-5 sulfonique additionné de bicarbonate de Sodium qui facilite la dissolution de cet acide dans l'eau.

### Présentations:

Mixiod poudre pour préparations extemporanées (Cachets-Solutions pour lavements).

Flacons de 15 g. Prix: 41 fr.; de 30 g. Prix: 75 fr.

Mixiod pilules, dosées à 0 g. 25.

Flacons de 20 pilules. Prix: 20 fr. 50.

**Indications.** — Amibiase aiguë et amibiase subaiguë.

— Destruction des Amibes et des kystes amibiens.  
**Mode d'emploi et posologie.** — Traitements par voie buccale, par voie rectale (en lavements) et traitements mixtes.

**Voie buccale:** 1 g. 50 à 3 g. *pro die* pendant une semaine.  
**Voie rectale:** Lavements à doses croissantes de 0 g. 25 à 1 g.

Société parisienne d'Expansion chimique

**SPECIA**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Balzac 22-94.)

## MOLÈNE

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse); adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative; tuberculose pleurale; tuberculoses cutanées diverses.

**Contre-indication:** Néphrite avec albuminurie abondante.

**Mode d'emploi.** — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours; chez les grands fabricants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

**Présentation.** — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

**Prix de vente au public:** 35 fr. 20 la boîte de 12 ampoules.

L. N. C. 463-10.

**Laboratoire L. LECOQ**

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## MOLINAL

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

**Formes.** — Gouttes et comprimés de Phényléthylmalonylurée.

**Indications thérapeutiques.** — Insomnies, États anxieux, Convulsions, Épilepsie, etc...

**Posologie.** — *Adultes:* de 0 gr. 05 à 0 gr. 30 de Phényléthylmalonylurée par 24 heures.

*Enfants:* de 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

### GOUTTES MOLINAL

Solution stable à 1/5 de Phényléthylmalonylurée.  
II gouttes = 0 gr. 01 de Phényléthylmalonylurée.

### COMPRIMÉS MOLINAL

Comprimés dosés à 0 gr. 01, 0 gr. 05 et 0 gr. 10 de Phényléthylmalonylurée.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL — PARIS

## MONOL

Solution de Permanganate de Calcium à  
1 p. 100.

**Indications.** — Antiseptique puissant pour Injections, Lavages, Pansements, Médecine urinaire, Gynécologie, Maladies des yeux et des oreilles, Plaies infectées, etc.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix: 13 fr. 50.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél.: Roquette 87-34.)

## MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Éthyle : solution huileuse à 25 p. 100  
(Ampoules de 2 cc.)

*Traitement de la tuberculose pulmonaire.*

**Indications.** — Le Moréthyl est actif contre toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique, en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et produit, dans certains cas, la rétrocession des lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées. — Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

**Posologie.** — Une injection chaque jour, pendant 20 jours consécutifs, par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél.: Turbigo 63-40.)

## MORISLAND

Augmentation de poids.

**Formes.** — Dragées, Granulé fondant.

**Composition.** — Extrait de Foie de Poisson, Lécithine, Ergostérine irradiée, Iode en combinaison iodotannique.

**Indications.** — Engorgements ganglionnaires, Amaigrissement, tous états de Faiblesse générale.

**Posologie :**

**Adultes :** 4 dragées ou 2 cuillerées à dessert par jour, avant les repas. **Enfants :** 1 à 3 dragées ou cuillerées à café, selon l'âge.

**Contenance et prix :**

Dragées : 20 ; 20 fr. 60. L. N. C. n° 1270-8.  
Granulé : 90 gr. ; 22 fr. 20. L. N. C. n° 1270-7.  
Distribution assurée en dragées, très réduite en granulé.

**Laboratoire P. CHEVILLON**

rue de la Paix — CROIX-DE-VIE (Vendée).

## MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arséniée (entièrement assimilable).

**Forme.** — Sirop (savour agréable sans action nocive ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

**Compos.** — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique ; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

**Action physiol.** — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoïétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

**Indicat.** — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoides, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

**Posologie.** — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour, de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>). (Tél.: Roquette 14-12.)

## MORRHUÉTINE JUNGKEN

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Forme et Composition.** — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse), en tout 15 mgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 mgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

**Propriétés.** — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Lymphatisme, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

**Doses et Mode d'emploi.** — **Enfant :** 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — **Adultes :** 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

**Laboratoires BRACQUEMOND et Cie**

Docteurs en Pharmacie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél.: Défense 05-54.)

## MORRHUÉTINE VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

### Composition et forme :

Granulé physiologiquement titré renfermant par cuillerée à café :

Vitamines A .....	800 unités.
— D .....	200 —
Iode (en combinaison organique absolue) .....	2 mgr. 4
Phosphore (Phosphates et Hypophosphites composés) .....	15 mgr.

### Indications :

Toutes les indications de l'huile de foie de morue dont elle est le véritable succédané : Lymphatisme, Rachitisme, Retards de croissance, Etats de dénutrition, Hypotrophies, Asthénies, Convalescences, Carences alimentaires.

La MORRHUÉTINE VITAMINÉE « JUNGKEN » présente un quadruple avantage : efficacité maximum sous un petit volume, digestibilité parfaite, saveur particulièrement agréable aux enfants, possibilité de traitement en toute saison.

### Posologie :

Avant 3 ans : 1/2 cuillerée à café deux fois par jour au début des repas.

De 3 à 12 ans : une cuillerée à café deux fois par jour.

Au-dessus de 12 ans : une cuillerée à entremets deux fois par jour.

Laboratoires BRACQUEMOND et Cie

Docteurs en Pharmacie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 05-54.)

## MORRHUOL CHAPOTEAUT

**Composition.** — Extrait concentré d'huile de foie de morue, débarrassé des lipides indigestes, ayant une forte teneur en vitamines A et D et contenant tous les autres principes actifs (bases organiques, acides gras, phosphore organique, etc.) de l'huile de foie de morue.

**Présentation.** — Capsules faciles à ingérer, ne laissant pas de goût désagréable et contenant :

Extrait alcoolique d'huile de foie de morue .....	0 gr. 10
Vitamine A .....	1 100 U. I.
Vitamine D .....	150 U. I.
Hypophosphite de chaux .....	0 gr. 01

**Indications.** — 1° Chez l'enfant : rachitisme, troubles et retards de la croissance, lymphatisme, pubertés difficiles ;

2° Chez l'adulte : toutes les défaillances de l'état général d'ordre pathologique (convalescence, surmenage, carences) ou physiologique (grossesse, lactation) ; troubles de la fixation du calcium.

**Posologie.** — Adultes : 4 à 8 capsules par jour au début des repas.

Enfants : 2 à 4 capsules par jour au début des repas.

Prix : 20 fr. 20 le tube de 80 capsules.

Laboratoires GRIMAULT

Fondés en 1856.

51, rue François-Ier — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Bal. 20-70.)

## MORUCALCOSE

(Granulé)

**Forme.** — Granulé reconstituant, de goût très agréable (Huile de foie de morue d'hiver et d'été sans odeur.)

**Composition.** — Extraits lipoidiques de foie de veau et de foie de morue, thyrotoxine, surrénine, phosphate tricalcique et combinaison iodotannique.

**Indications.** — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue dans toutes ses indications : Anémie, Croissance, Scrofule, Lymphatisme, Rachitisme, Bacillose, etc.

### Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

## MORUFINE

Médicament de choix.

Pour les croissances difficiles. Facteur puissant du développement de l'organisme carencé.

**Indications.** — Troubles de la Nutrition, Lymphatisme, Pré-tuberculose, Anémie et Faiblesse générale, Bronchite chronique, Troubles du Métabolisme, Furunculose et éruption cutanée.

### Posologie :

Adultes : 3 cuillerées à soupe avant ou après les repas.

Enfants de 2 à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 2 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1111-7.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

## MUCICARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur activé (Carbos), associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.

**Forme.** — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé**.

**Indications.** — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocrites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 18 fr. 80.

Durée moyenne : 8 jours.

**Laboratoires E. MILLET**  
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).  
(Tél. : 30.)

## MUCIGRAINS

**Grains de Mucilage.**

**Composition :**

Mucilage pur..... 98 %  
Extraits de Rhamnus..... 2 %

**Action** purement mécanique, par gonflement et augmentation du bol alimentaire. Protège et lubrifie la muqueuse intestinale. Action douce et progressive sans accoutumance.

**Indications.** — *Constipation*, Atonie intestinale.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 1 à 2 cuillerées à café au début ou à la fin des repas. Mettre à sec sur la langue et, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

**Prix :** La boîte de 250 gr. : 28 fr. 75.

**Laboratoires Henri FRILLEY**  
94, bd Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## MUCINUM (Comprimés de)

**Composition :**

Entérokinase .....	0 gr. 005
Érepsine.....	0 gr. 005
Pancréase.....	0 gr. 005
Bile .....	0 gr. 010
Atropa Belladonna .....	0 gr. 005
Cassia acutifolia .....	0 gr. 075
Phénolphthaléine.....	0 gr. 075

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

**Forme.** — Petits comprimés, très friables, pouvant être croqués ou avalés.

**Posologie.** — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

**Prix :** 10 fr. 60 la boîte de 36 comprimés.

## INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

ARCUEIL (Seine).

## MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

**Indications.** — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

La situation économique actuelle ne nous permettant pas d'être réapprovisionnés en carbonate de bismuth, la fabrication de la MUCOBISMUTHINE est momentanément suspendue.

L. N. C. M. n° 515-2.

**Docteur J. GALIMARD O. \* \* \***

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

## MUCOFOIE

**Composition.** — Complexe d'extrait hépatique et de muqueuse pylorique.

**Indications.** — Anémies pernicieuses quelle que soit leur origine : anémies Biermériennes, anémies au cours des leucémies, au cours des ictères hémolytiques, au cours des néphrites ; anémies secondaires ou idiopathiques.

**Forme.** — Granulé.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 4 mesures par jour. *Enfants* : 1 à 3 mesures par jour, selon l'âge, pendant 15 jours.

La mesure permet de prélever une quantité de granulé correspondant à : 0 gr. 280 d'extrait de foie ; 0 gr. 140 de poudre de muqueuse pylorique.

Prix de la boîte : 55 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-38.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRINE**

48, rue de la Procession — PARIS.

(Tél. : Suffren 07-70).

## MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

**Composition.** — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

**Propriétés.** — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

**Indications.** — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigations.

Prix : 12 fr. 20.

Traitement unité : 10 à 12 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-7.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 12-63.)

## MUCYLLIUM

**Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.**

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**. Désinfectées rationnellement sans détruire ni Vitamines ni Hormones indispensables. Élimination sûre de tous corps étrangers métalliques et organiques.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

**Indications du Mucyllium.** — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocolon, et ce aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut le prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroides, fissures anales, appendicite chronique, cholécystites, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

**Doses.** — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe.

*Adultes* : 2 à 6 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, laisser se former le mucilage pendant quelques minutes.

Le Mucyllium se fait en : boîte de 250 grammes, boîte de 500 grammes, boîte de 1 kilogramme.

Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 914-1.

**Laboratoires BERNARD-GAROIN**

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : n° 6.)

**Eugène GRAS**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Ex-interne des hôpitaux.

Chimiste expert des tribunaux.

## MULTIPLAST

**Pansement adhésif cicatrisant.**

**Composition.** — Le *Multiplast* est composé d'une compresse de coton et gaze imprégnée à la Pyoktanine, puissant antiseptique.

Cette compresse est montée sur un support adhésif permettant la fixation instantanée.

**Indications.** — Au foyer, à l'usine, en voyage, une boîte *Multiplast*, type « Sport », sera très utile pour les soins rapides et la protection des petites blessures des enfants et des adultes.

Pour le cabinet de consultations, le Poste de Secours, l'Infirmier, un coffret contenant des bandes de largeurs 4, 6, 8 centimètres, permet des centaines de pansements.

**Présentation :**

Pour le public : modèle en pochette, boîte de poche.  
Pour le poste de secours : coffret de grande contenance.

*Fabriquée à Paris par les  
Laboratoires HERBEL*

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII).

## MURONES DU D<sup>r</sup> ROBERT JACQUES

1<sup>o</sup> **MURONE aéro-gène.** — Redressement fonctionnel du poumon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

**Indications.** — S'adresse aux anémiques, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés de tuberculose*.

**Composition.** — Essences oxydées et essence phénol en proportion juste : ampoule n° 1, et essence diffusible : ampoule n° 2, contenues dans la même boîte.

**Mode d'emploi.** — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2<sup>o</sup> **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

**Composition.** — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

**Mode d'emploi.** — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C. B. A. B. C. Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 16 fr.

**Fabriqués par les laboratoires AUG. LUMIÈRE**

Dépôt et vente :

**Établissements SILBERT et RIPERT**  
30, rue Bénédit — MARSEILLE.



## MUSCULOGÉNOL

Reconstituant, recalifiant.

**Forme.** — Elixir et cachets.

**Composition.** — L'Elixir: reconstituant à base de méthylarsinate disodique, nucléinate de soude, glycérophosphate de soude, fluorure de sodium, muscat vanille. Les cachets: recalifiants à base de nucléinate de manganèse, fluorure de calcium, de glycéro de chaux et de sel calco-magnésien de l'acide anhydroxyméthylène diphosphorique.

**Indications.** — Convalescence, Surmenage, Débilité, Lymphatisme, Scrofule, Anémie, Neurasthénie. Tous états asthéniques et atoniques ou troubles du métabolisme calcique.

### Posologie :

**Elixir.** { Adultes: 2 à 3 cuillerées à soupe par jour avant les repas.  
Enfants: 2 à 3 cuillerées à café de 4 à 10 ans.  
Au-dessus, par cuillerées à dessert.

**Cachets.** { Adultes: 2 à 3 cachets par jour aux repas.  
Enfants: 1 par jour.

Prix: Elixir, 26 fr. 90; Cachets, 26 fr. 90.

Médicament enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1480-1.

**Laboratoires PRUVOST**

117, rue Victor-Hugo — HOUILLES (Nord).  
(Tél.: II.)

## MUTHANOL

Hydroxyde de bismuth radifère.

**Indications thérapeutiques.** — Syphilis à toutes ses périodes et dans toutes ses manifestations. Action stérilisante immédiate et profonde. Solidité des résultats acquis cliniques et sérologiques.

**Présentation et mode d'emploi.** — Adultes: Ampoule 2 cc. (13 cgr. Bimétal), une injection intramusculaire tous les 3 à 5 jours, par série de 10 à 15 ampoules. Boîte de 10 ampoules: 42 fr. 20.

Ampoule 3 cc. (26 cgr. Bimétal), double dose. Une ampoule tous les 5 à 8 jours.

Boîte de 10 ampoules: 56 fr. 20.

Enfants: Ampoule 1 cc. (2 cgr. 6 Bimétal), jusqu'à 5 ans: 1/2 ampoule par an d'âge tous les 8 jours. De 5 à 10 ans: 2 ampoules tous les 6 à 4 jours.

Boîte de 10 ampoules: 30 fr. 40.

Suppositoires MUTHANOL. — Traitement de sécurité. **Autres indications.** — Les angines, l'oxyurose, où le Bismuth par voie rectale constitue une médication très active.

Forme pour adultes et enfants: 21 fr. 50 et 18 francs.

**Laboratoire G. FERMÉ**

22, rue de Turin — PARIS (VIII°)

(Tél.: Europe 49-50.)

Z. N. O.: PETRIER, 30, rue Créqui — LYON.

## MUSCULOSINE BYLA

Suc de viande crue hyperactivé par les oxydases et la catalase du sang et les vitamines musculaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antibactérienne, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

**Indications.** — Convalescences, Anémies, Tuberculoses, Neurasthénie.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse ou non.

Pour les diabétiques, prescrire:

**MUSCULOSINE sans SUCRE.**

**HÉPATO-MUSCULOSINE** (Musclosine + foie)

(Voir ce texte).

**Laboratoires d'Endocrinologie Appliquée**

Concessionnaires des Marques des

**Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV°).

(Tél.: Danton 08-11.)

## MUTHIODE

Solution d'Iodure double de Bismuth et de Sodium.

**Indications.** — Syphilis à tout âge et à toutes ses périodes. Le MUTHIODE peut être utilisé comme traitement d'attaque.

Hérédo-Syphilis.

Scléroses parenchymateuses et vasculaires.

**Mode d'emploi.** — 2 injections intramusculaires par semaine.

### Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (Adultes).

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (Enfants).

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. 28 fr. 75.

La boîte de 12 ampoules 1 cc. 22 fr. 00.

L. N. C. n° 463-17.

**Laboratoires L. LECOQ**

14, r. Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine)

## MUXAGOL

Régulateur du tube digestif. Seul mucilage garanti stérilisé au cours de sa préparation.

**Composition.** — Graines de *Plantago decumbens* (Psyllium blond des Indes) produit le mucilage le plus abondant et dont la teinte claire permet, par triage à la main, d'éliminer totalement les impuretés qui sont généralement de couleur foncée.

**Indications.** — Rééducation et pansement de l'intestin, Constipations, Colibacilloses, Entérocrites mucomembraneuses, Colite et dans toutes les affections d'origine intestinale.

**Recommandé aux** « entéro-névropathes », dyspeptiques, malades atteints d'hémorroïdes, de fissures, de ténisme ano-rectal, etc.

**Action sédative** dans les coliques néphrétiques, les cystites et dans toutes les inflammations des voies urinaires.

**Posologie.** — 1 ou 2 fois par jour, au cours des repas.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe.

*Enfants* : 1 ou 2 cuillerées à café.

Un traitement régulier de 3 mois est généralement nécessaire, mais un emploi pendant des années de même qu'une augmentation des doses ci-dessus indiquées ne présentent aucun inconvénient, le MUXAGOL n'étant pas un laxatif, mais un régulateur de transit intestinal. — L. N. C. M. n° 1629-5.

Prix : 21 fr. 10. Permettant un traitement de 15 à 30 jours.

**Laboratoire du MUXAGOL**

43, rue de Chartres — NEUILLY-SUR-SEINE.

## MYCIDOL BADEL

Combinaison allylique et sulfurée de méthanal, essences aromatiques et sels de radium.

**Externe.** — Antiséptique général, chirurgie, gynécologie, obstétrique.

**Dose.** — 2 cuillerées à café par litre d'eau.

**Interne.** — Infections gastro-intestinales, non spécifiques, dysentériques, typhiques et grippales. Helminthiase.

**Dose.** — L à C gouttes par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 556-2, 556-3.

**Laboratoires BADEL**

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme.)

## MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimulation de la phagocytose.

**Formes et doses :**

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

**Indications.** — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

**Laboratoires LEBEAULT**

**BESINS et Oie, Pharmaciens.**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## MYOCHRYSINE

Aurothiomalate de Sodium, sel titrant 50 % d'or métal sous forme de solution aqueuse et de suspension huileuse pour injections intra musculaires ou sous-cutanées. À utiliser dans les cas où les injections intraveineuses de CRISALBINE sont impossibles. Bien toléré localement.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire de l'adulte et T. P. infantile. T. ganglionnaires et cutanées. Tuberculides. Rhumatismes chroniques et infectieux. Asthme.

**Présentations.** — Solution aqueuse (étiquettes bleues) et suspension huileuse (étiquettes jaunes). Dosages : 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Boîtes de 1 et 10 ampoules. (Prix suivant dosage et conditionnement.)

**Tuberculose pulmonaire.** — Débuter à 0,05 et ensuite 0,10, puis 0,20 et 0,30 par semaine.

**Rhumatisme.** — Débuter à 0,01 et ensuite 0,05 et 0,10 ou 0,20 par semaine (consulter la notice).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulen Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## MYODEN

**Élixir Antirhumatismal et Antigoutteux**  
au Phosphohexaparadiazinammonium.

**Composition.** — Phosphohexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

**Indications.** — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

*Enfants au-dessus de dix ans* : 2 demi-cuillerées à café par jour.

**Durée du traitement** : pour un flacon 8 jours. Traitement complet : 3 flacons.

Médic<sup>1</sup> enregistré au Lab. N° de Contrôle des Médic<sup>1</sup> : 726-1. C.

Prix : 27 francs.

**Laboratoires E. DAUPEZ**

37, rue des Lois — TOULOUSE (Hte-Gar.). (Tél. : 224-55.)

## MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une remarquable efficacité.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile d'autre part, en font le mieux toléré de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intramusculaire qui est absolument indolore.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 5 cg. (demi-dose), 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

### Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série. Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

**Laboratoires du MYORAL**

3, rue Saint-Roch — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél. Opéra 54-58.)

## MYOSÉRUM

**Plasma musculaire peptonisé et adrénaliné.**

*Agent fixateur. — Injectable et buvable.*

Possède la propriété d'exciter le pouvoir *fixateur* des cellules, permettant ainsi aux tissus malades de *fixer* et de *retenir* les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement.

**Médication sthénique de 1<sup>er</sup> ordre.** — Anémies, Neurasthénies, Déminéralisation, Blessés, Opérés, Accouchées, Convalescents et toutes déficiences organiques.

**Emploi.** — Une injection sous-cutanée tous les 2 ou 3 jours ou même tous les jours selon la gravité des cas.

**N. B.** — Les mêmes ampoules de *Myosérum* peuvent aussi être bues. Ceci pour les cas bénins et dans l'intervalle des injections.

Inscrit au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments.

**Produits SAMY**

**Laboratoire LÉCUYER**

5, place Lévis — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 49-51.)

## MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

**Indications.** — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

**Mode d'emploi.** — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 16 fr. 40.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

## MYOVARSYL

Sulfarsénobenzol Codex.

**Composition.** — Dioxydiamino-arsénobenzène-méthylène-sulfonate de soude destiné à la voie intramusculaire ou sous-cutanée.

Injectons indolores.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes. Traitement convenant spécialement aux sujets chez lesquels l'injection intraveineuse est difficile : femmes, enfants, nourrissons.

**Présentation.** — En boîtes unitaires : ampoules de 0,015 à 0,60 accompagnées d'une ampoule de solvant.

Prix au public :

Ampoules de 0,015 à 0,60 : 3 fr. 20 à 21 fr. 40.

Les Laboratoires du **D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

S. A. au capital de 25.000.000 de francs.

R. C. Seine 235.442 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 58-43.)

## MYRTALYL

**Formes.** — Ampoules, Sirop, Suppositoires.

**Formule : AMPOULES :**

	Enfants.	Adultes.
Essence de Niaouli rectifiée et désaldéhydée..	0,25	0,625
Galacal .....	0,15	0,375
Camphre .....	0,10	0,25
Eucalyptol .....	0,10	0,25
Sulfure d'allyle .....	0,05	0,125
Strychnine base .....	0,001	0,0025
Huile d'olive neutre .....	2 cc.	5 cc.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes maladies infectieuses à localisations pulmonaires : grippe, bronchites, broncho-pneumonies, bacillloses.

**Posologie.** — **AMPOULES :** le contenu d'une ampoule en injection intramusculaire par 20 h.

*Enfants de 2 à 5 ans :* de 1/2 à 1 cc.

*Av-dessus de 5 ans :* de 1 à 2 cc.

**SIROP :** *Adultes :* de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants de 2 à 10 ans :* de 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

*Enfants de 10 à 15 ans :* de 2 à 4 cuillerées à dessert par 24 heures.

**SUPPOSITOIRES :** *Adultes :* 2 à 4 suppositoires par jour.

*Enfants :* 1 à 2 suppositoires par jour.

Laboratoires de **V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## MYRTILLES DU D<sup>r</sup> GALIMARD

(Extrait de)

**Présentation.** — Boîte de 2 flacons contenant chacun 60 cc. d'extrait de myrtilles liquide d'un goût agréable.

**Propriétés.** — Anticollibacillaire par sa matière colorante ; antiputride par son tanin spécial ; d'une innocuité parfaite, assure la guérison des troubles de l'intestin sans le traumatiser.

**Indications et posologie.** — Entérites et crises aiguës collibacillaires : 2 flacons par jour.

Diarrhées infantiles : 1/4 flacon matin et soir.

Diarrhées de toutes sortes, Entérites muco-membraneuses, Collibacilloses, dothiéntéries, Putréfaction azotée } 1/2 flacon  
matin et soir  
avant les repas

Prix : 33 fr. 10.

Enregistré L. N. C. M. sous le n° 1640-1.

Laboratoire du **D<sup>r</sup> Jacques GALIMARD**

68, rue de la Paroisse — VERSAILLES

(Tél. : Ver. 26-14.)

## MYRTINE BÉRAL

**Composition.** — Essence de Myrte déterpénée, enrichie en Myrténol et Cinéol, Terpinéol et Camphre.

**Propriétés.** — Clarifie et tarit l'expectoration. Antiseptise les bronches. Stimule les centres respiratoire et cardiaque.

**Indications.** — Toutes broncho- et pneumopathies au stade de *muco-purulence*. Hypersécrétion bronchique. Infections broncho-pulmonaires.

**Présentation.** — Ampoules 2 cc. (inj. hypod. indolores) : 1-4 cc. *pro die*. Suppos. (adultes et enfants) : 1-2 cc. *pro die*. Gouttes : X à XII gouttes *pro die* dans un peu de lait *per os* ou en lavement.

Laboratoire **BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## NAÏODINE LOGEAI

### Formules :

- 1° Normale ou A, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé pour intramusculaires.
- 2° Concentrée, solution B aqueuse à 5 %. Spéciale pour intraveineuses.
- 3° Sulfoiodée (voir Thionalodine).
- 4° Vitaminée (voir Naïodine suractivée).

### Formes :

A ou B. — Boîtes de 6 ampoules de 10 cc.  
Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

### Propriétés :

**Solution A.** — Sédatif type de l'élément douleur dans les algies rebelles, grâce à l'action neurotrope intense de NaI stabilisé.

**Solution B.** — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des névralgies et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAÏODINE A ou B est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires. Ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'accoutumance ni d'accumulation.

### Indications :

**Solution A.** — Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatiques, Lumbagos, Zonas, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Toxicomanies, etc., et toutes indications des iodures : Asthme, Emphysème, Artérites, Aortites, Coronarites, etc.

**Solution B.** — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles, Épilepsie essentielle, Algies rebelles, Mycoses, Artérites, Aortites, Coronarites, etc.

### Posologie :

**Solution A.** — 10 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires (loco dolenti si possible).

**Solution B.** — Injections intraveineuses très lentes : 10 à 40 cc. par jour. Non sclérosante.

**Laboratoires JACQUES LOGEAI.**

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS.

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

## NAIODINE SURACTIVÉE

NaI stabilisé + Vitamine B<sub>1</sub>.  
associés en une même préparation immédiatement injectable.

**Forme A** pour injections intramusculaires (2 milligrammes de vitamine B<sub>1</sub> par ampoule de 10 cc.).

**Forme B** pour injections intraveineuses (1 centigramme de vitamine B<sub>1</sub> par ampoule de 10 cc.).

**Propriétés et indications.** — Agit synergiquement par l'action neurotrope et antialgique de la NAÏODINE et l'action antinévritique et modificatrice du métabolisme des glucides de la vitamine B<sub>1</sub>.

Toutes algies, névrites et polynévrites d'origine toxique ou infectieuse (éthylques, nicotiniques, saturnines, malariques, gravidiques, diabétiques). Névralgies : myélites, poliomyélites, myéloses, encéphalites, scléroses du névraxe.

### Posologie :

**Forme A :** 1 à 3 ampoules par jour.

**Forme B :** 1 à 2 ampoules par jour.

*Atoxique. Indolore. Sans réactions secondaires.*

**Laboratoires JACQUES LOGEAI**

ISSY-LES-MOULINEAUX-PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

## NARGÉNOL

### Composition :

Campho-sulfonate de dihydroxycodénone	Deux centigrammes
— de scopolamine.....	0,0005
— d'éphédrine.....	0,02
— de spartéine.....	0,05
Sérum physiologique.....	Q. S. P. 2 cc.

*Pré-anesthésique. Analgésique.*

Adjuvant de l'anesthésie générale, loco-régionale ou rachidienne.

Tous phénomènes douloureux intenses.

**Ampoules de 2 cc.** (Boîtes de 12 ou 50 ampoules) : une ampoule de 2 cc. une heure avant l'intervention chirurgicale. Injections sous-cutanées.

**Tableau B :** Prescrire en toutes lettres deux centigrammes de dihydroxycodénone par ampoule.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## NASAMIDE

### Composition :

Protéinate d'argent .....	0,50
Éphédrine chl. ....	0,50
Extrait de belladone .....	0,25
Camphre .....	0,10
Essence de Niaouli .....	0,10
Para-amino-phénylsulfamide.....	0,20
Excipient .....	Q. S. p. 100 cc.

**Présentation.** — Gouttes.

**Posologie.** — IV à V gouttes 2 à 3 fois par jour.

**Indications.** — Affections pulmonaires.

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## NASOBORE

**Forme.** — Comprimés effervescent instantanément solubles, pour Gargarismes et Inhalations.

**Composition.** — Associe la *Chloramine T* au baume du Pérou véritable et à des essences balsamiques naturelles, décongestionnantes, sédatives et bactéricides.

**Indications.** — Prophylaxie et traitement des affections du nez, de la gorge, de la trachée, du larynx et des bronches.

### Mode d'emploi :

1° Gargarismes (3 à 4 par jour) : 1 comprimé effervescent dans 1/2 verre d'eau bouillie chaude ;

2° Inhalations (3 à 4 par jour) : 2 à 3 comprimés effervescent dans un bol ou un inhalateur d'eau bouillante. Respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes.

Durée de traitement : 5 à 10 jours.

**Les Laboratoires NOVALIS**  
OULLINS (Rhône).

## NASOPHÉDRINE BÉRAL

*Pommade nasale (Huile gélifiée)*  
à 3 p. 100 d'Éphédrine Béral.

Rigoureusement neutre. Exempte d'analgésique et d'oléate.

Effet intégral de l'éphédrine sans irritation et avec conservation de la perception de la respiration nasale.

Agit mieux que les instillations huileuses, dont elle évite les inconvénients.

**Indications.** — Coryza, Rhinite spasmodique, Asthme nasal, Obstructions nasales, Sinusite, etc.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un grain de chènevis dans chaque narine.

**Prescrire :** Nasophédrine Béral, un tube.

Prix : 14 fr. 70.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

**Forme.** — Solution au 1/1000.

**Indications.** — Myocardites avec troubles du rythme et dilatation des cavités ventriculaires — Arythmie complète avec troubles du tonus — Hypertension artérielle avec tendance à la tachycardie.

**Doses.** — Suivant le degré de l'insuffisance cardiaque, entre XV et L gouttes de *Natibaïne Nativelle* par jour, les cinq premiers jours de chaque dizaine ou de chaque quinzaine.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 81-21 (3 lignes).

## NATIROSE

**Comprimés de Trinitrine.**

**Propriétés.** — Sédatif de la crise angineuse. Diffusibilité rapide. Action vaso-dilatatrice prolongée.

**Indications.** — Angine de poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Hypertension artérielle, Œdème aigu du poumon.

**Doses.** — 1 à 2 comprimés au moment de l'accès. Dose maximum : 6 comprimés par 24 heures. Croquer les comprimés et les faire dissoudre rapidement dans la salive ; ne pas avaler trop tôt.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 31-21, 3 lignes.)

## NATROSYL

**Forme pharmaceutique.** — Soluté,

**Composition.** — Soluté alcalin à base de Baume du Pérou et d'Essences antiseptiques aromatiques.

**Action.** — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

**Indications.** — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie chaude en injections vaginales.

Prix : 16 fr. 40.

**Laboratoires LEES**

**Directeur : Docteur Pierre ROLLAND**

Dépôt : 127, bd St-Michel — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 22-01.)

## NÉALGYL BOTTU

**Composition.** — Synergie chloral-amidopyrine avec adjonction d'un correctif (formine-caféine) des effets nocifs secondaires sur cœur et rein.

**Indications.** — (A recommander particulièrement chez les malades dont l'estomac ou le rein supportent mal les spécifiques antidouleurs courants.)

**Hypnoalgésique** des algies banales (courbatures, céphalées, odontalgies, algies grippales, insomnies douloureuses), des névralgies du trijumeau et des douleurs tenaces et rebelles (rhumatismes, goutte, sciatique, névrites).

**Antialgique** puissant susceptible d'être adjoint aux opiacés dans les grandes douleurs (tabes, cancer).

Action élective dans les menstrualgies (sans les suites hémorragiques que peuvent déterminer les salicylés).

**Préventif** des douleurs post-opératoires.

**Posologie.** — Comprimés dragéifiés pratiques, absorbables n'importe où sans liquide. A avaler sans sucer ni croquer. Pour effet immédiat et massif : 3 comprimés d'emblée.

Pour action prolongée et soutenue : 8 à 10 comprimés par 24 heures à intervalles réguliers, avant ou pendant les repas.

Pour les algies grippales et insomnies douloureuses : 2 comprimés le soir dans un liquide très chaud.

Comme préventif des douleurs post-opératoires : 2 comprimés avant l'intervention.

**Prix :** 8 fr. 80 la boîte de 12 comprimés.

18 fr. 80 la boîte de 30 comprimés.

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs  
PARIS (VI<sup>e</sup>).

## NÉATOL-SUJAL

Calmant sûr et constant de toutes les algies.

**Forme.** — Cachets.

**Composition.** — *Trois antalgiques éminemment actifs et dont les effets se renforcent mutuellement :*

amidopyrazoline, phénacétine, phénylacétamide.  
*Un éliminateur de l'acide urique*  
(la semence de colchique).

**Indications.** — Toutes les manifestations douloureuses, rhumatismes chroniques, douleurs articulaires et musculaires, lumbagos, névralgies, etc.

**Mode d'emploi.** — Un cachet avant chaque repas. Dans les cas aigus : 4 cachets par jour.

Prix : 20 fr. 30 la boîte de 24 cachets.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1731-5.

**Laboratoires SUJAL**

J. LAFARGE, Docteur en Pharmacie.  
CHATEAUROUX (Indre).

## NEMAUTAL

**Boîtes et dispositif breveté NEMAUTAL.**

Pour le médecin qui n'a pas à pratiquer quotidiennement des pansements aseptiques, la disposition de plusieurs compresses dans une même boîte présente le grand inconvénient de compromettre l'asepsie des gazes non encore utilisées, quelles que soient les précautions prises en prélevant chaque compresse.

Le dispositif NEMAUTAL consiste à isoler chaque compresse dans un sachet hermétique, se décauchetant comme une cartelle et assurant sa protection individuelle. Les boîtes brevetées NEMAUTAL en feuille métallique soudée contiennent 10, 25 ou 50 sachets.

**Avantages.** — Facilité d'ouverture de la boîte NEMAUTAL et du sachet. Conservation de l'asepsie pour les compresses non encore utilisées. Prix réduit de la boîte NEMAUTAL.

**Formes.** — Le dispositif NEMAUTAL est appliqué aux : Compresses de gaze NEMAUTAL, Compresses oculaires NEMAUTAL, Coton pour accouchement NEMAUTAL, Pansement vulvaire NEMAUTAL, Pansement ombilical NEMAUTAL, Tampons vaginaux NEMAUTAL, Tulle gras NEMAUTAL.

**Laboratoires de la FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT**

5, Grande-Rue — MONTPELLIER  
(Tél. : 54-93.)

## NÉMOPLASME

Coton Cataplasme ASTRUC,  
antiseptique, antiphlogistique, émollient.

**Forme.** — Constitué d'une nappe de coton hydrophile épaisse, protégée par un papier imperméable et recouverte d'une gaze adhérente imprégnée d'un mucilage desséché.

**Présentation.** — Présenté en boîte de 5 ou 10 carrés.

**Mode d'emploi.** — Plongé dans l'eau bouillie chaude, le NÉMOPLASME se gorge d'humidité et emmagasine la chaleur. Essorer l'excès d'eau et appliquer sur la région intéressée.

**Indications.** — Toutes les applications de la chaleur humide prolongée, en médecine, en petite chirurgie, oto-rhino-laryngologie : abcès, furoncles, phlegmons, anthrax, panaris, orgelets, ulcères variqueux, adénites, angines, otites, etc...

**Laboratoires de la FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT**

5, Grande-Rue — MONTPELLIER  
(Tél. : 54-93.)

## NÉOBILINE

**Forme.** — Pilules.

**Composition.** — Bile de porc, Oléate de soude, Boldo, Iris versicolor.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Congestion du foie, Constipation.

**Posologie.** — 4 pilules par jour aux repas.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.**

A. FOUCHÈRE, Pharmacien.  
RIVE-DE-GIER.



## NÉO-BIOÉLIXIR

### Liquide.

Tonique hématopoïétique.

**Propriétés.** — Thérapeutique reconstituante et anti-anémique énergique par l'acidaminothérapie et l'hépatothérapie combinées : Acides aminés + méthode de Whipple.

### Composition :

Acides aminés :	
Tryptophane gauche .....	0 gr. 009
Monochlorhydrate d'Histidine gauche .....	0 gr. 018
Bichlorhydrate de Lysine droite .....	0 gr. 018
Extrait de foie frais .....	0 gr. 75
(= 75 gr. d'organes frais).	
Élixir de Garus .....	38 gr.

Pour 100 grammes.

**Indications.** — Les anémies, l'asthénie, les convalescences médicales ou chirurgicales, l'amaigrissement, les états de dénutrition et de carence.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café, pur ou dans un peu de liquide, avant les 2 repas.

**Enfants :** 1/2 dose.

**Prix :** 23 fr. 40.

**Laboratoires P. REYGAGNE**  
160, avenue d'Italie — PARIS.  
(Tél. : Gobelins 90-00.)

## NÉOBIOL

**Composition.** — Soufre colloïdal et complexe hydro-carburé spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Formule enregistrée au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1501-1.

**Indications.** — Séborrhée et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné. Dermatoses mycosiques. Parasiticide.

### Mode d'emploi :

**Au visage :** En applications externes quotidiennes. En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

**Au cuir chevelu :** Ecarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

**Présentation.** — Provisoirement flacon d'un seul modèle à prix public : 15 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1501-1.

**Laboratoires JAUFFRET**

NÉOBIOL-IMPÉTIGOL — VANVES, près PARIS.

**L. JAUFFRET**, pharmacien, ex-interne des hôpitaux.  
Correspondance et bureaux : 181, avenue Victor-Hugo,  
CLAMART (Seine). (Tél. : Michelet 04-71.)

## NÉOBOLDINE

Pilules titrées à un milligramme de Boldine et à 0,05 d'Extrait de Boldo, représentant le *Totum Actif* du *Pneumus Boldus*.

### Indications Thérapeutiques :

Toutes les *Insuffisances Hépatiques, Maladies du Foie* (Cirrhoses hypertrophiques, Cholécytites chroniques, Congestion du Foie, Ictère), *Constipation chronique*.

### Posologie et mode d'emploi :

De 2 à 6 pilules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

**Prix :** 17 fr. 50.

**Laboratoires Henri SCHÉHADÉ**

9, impasse Thoréton — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NÉOBY

### (Pilules.)

Médication antisypilitique mixte par voie gastrique (Iodobismuthate vanadique et Calomel).

Chaque pilule contient :

0 gr.	01 Calomel,
0 gr.	05 Iodobismuthate vanadique,
0 gr.	0005 Anhydride vanadique.

**Posologie.** — Médication d'entretien, sous forme de 4 cures annuelles d'un mois à la dose de 2 à 3 pilules par jour.

**Prix :** 22 fr. 50.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## NÉO-CALCILINE

Total endocrinien Intégral.

Reconstituant biologique, para-hépatopancréato-splénique, Anti-rachitique.

### Composition :

Os frais pulvérisé.....	0,15
Parathyroïde.....	0,001
Thymus .....	0,05
Surrénale .....	0,05
Diastase pancréatique.....	0,05
Poudre de muq. intest.....	0,05
Extrait lipoidique de foie.....	0,05
Extrait lipoidique de rate.....	0,05
Par comprimé ou mesure de granulé.	

**Doses.** — 2 comprimés ou 2 mesures (granulé) avant chaque repas, 20 jours par mois.

**Enfants :** 1/2 doses.

### Anciens Laboratoires ODINOT

Robert COLAS, Docteur en Pharmacie

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>), (Tél. : Vau. 48-10.)

Laboratoires : 21, r. Violet, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Ség. 69-13).

## NÉOCARDYL

Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.

**Indications.** — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

**Présentations et posologie.** — Néocardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 g. 05 de Bi métal par cm<sup>3</sup>. Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 5 contenant 0 g. 075 de Bi métal (boîtes de 12 ampoules).

Série de 12 injections bihebdomadaires ; intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

**Néocardyl infantile :** Solution huileuse dosée à 0 g. 015 de Bi métal par centimètre cube. Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la Notice détaillée).

Prix de vente ;

Néoc. *Adultes*. La boîte de 12 ampoules. 28 fr. 70

Néoc. *Infantile*. La boîte de 10 ampoules. 17 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## NÉO-CARNINE LEFRANÇO

Synergie anticarentielle et reconstituante.

**Composition.** — Acides aminés (histidine, tryptophane, glyco-colle, cystine) préparés à partir de protéines animales et associés à des vitamines (B et PP) et à des sels minéraux (gluconate de Ca et Mg).

**Indications.** — Carences alimentaires. Troubles de la croissance. Anémies. Anorexie. Toutes convalescences.

**Présentation et posologie.** — Boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. 2 à 4 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau.

Laboratoires de LA CARNINE LEFRANÇO

36, avenue de Metz — ROMAINVILLE

(Tél. : Nord 19-52.)

## NÉO-COCCYL

1162 F

Para-amino-phényl-sulfamide.

Sulfamidothérapie antibactérienne polyvalente.

**Présentation.** — Comprimés à 0 gr. 50 de 1162 F.  
Ampoules 20 cc. à 0,85 p. 100 (injections intrarachidiennes, pleurales, articulaires, péritonéales).

Ampoules 200 cc. (goutte à goutte sous-cutanés ou intraveineux).

Crayons chirurgicaux. Crayons gynécologiques.

Bougies. Mèches (1, 2, 3 et 5 cm. de largeur).

Poudre (voir PULVO-COCCYL). Ovules : GYNO-COCCYL.

Livraisons suspendues : RHINO-COCCYL, DENTO-COCCYL, DERMO-COCCYL, COLLU-COCCYL).

**Indications.** — Spécifique des infections à streptocoque, méningocoque, pneumocoque, staphylocoque, mélitocoque, gonocoque, colibacille, bacille de Ducret, bacille de Friedlander, bacille de Pfeiffer, bacille de Flexner, bacille de Shiga, virus du trachome, virus de la lymphogranulomatose et tous états infectieux.

**Posologie.** — Préventive : 2 à 4 comprimés par jour.

*Curative :* Cas bénins. Cas aigus. Cas graves.

Adultes....	4 à 6	8 à 12	14 à 24
-------------	-------	--------	---------

6 à 12 ans..	2 à 4	5 à 8	10 à 16
--------------	-------	-------	---------

1 à 5 ans..	1 à 2	2 à 5	6 à 10
-------------	-------	-------	--------

6 mois.....	0,5	2	6
-------------	-----	---	---

Gonococcies aiguës ou chroniques ; en traitement associé aux lavages : le 1<sup>er</sup> jour, 8 comprimés ; les 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> jours, 7 comprimés, 6, 5, 4...

**Mode d'emploi.** — La posologie doit commencer par la dose maxima indiquée et les doses très fractionnées. Le traitement sera poursuivi quelques jours après l'amélioration recherchée. Le soufre (sulfates, œufs) sera proscrit et le bicarbonate de soude conseillé.

Prix : 17 fr. 60 le tube de 20 comprimés.

Admis à l'Assistance Publique et à l'Assistance Médicale Gratuite.

Laboratoires du Docteur PILLET

G. HOÛET, Pharmacien

222, boulevard Pereire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 40-15.)

Adr. télégr. : Houépillot-Paris.

Service de garde : Molitor 58-85.

## NÉO-CODION

Puissant sédatif de la toux.

A base de deux nouveaux dérivés :

### LE CAMPHOSULFONATE DE CODEINE

et

### LE CAMPHOSULFONATE DE DIONINE

Plus actifs — Moins toxiques

que la Codéine et la Dionine.

**Composition :**

**Nouveaux principes actifs :**

Camphosulfonate de Codéine.....	0 gr. 75
---------------------------------	----------

Camphosulfonate de Dionine.....	0 gr. 75
---------------------------------	----------

**Excipient thérapeutique :**

Teinture de Drosera .....	30 gr.
---------------------------	--------

Teinture de Grindelia .....	25 gr.
-----------------------------	--------

Teinture de Marrube blanc stabilisé.	20 gr.
--------------------------------------	--------

Pour 100 grammes.

**Présentation.** — Deux formes : *Gouttes* et *Dragées*.

**Indications :**

1<sup>o</sup> *Toux spasmodiques et réflexes* : Laryngites,

Trachéites, Coqueluche ;

2<sup>o</sup> *Bronchites aiguës* : Grippe, Asthme ;

3<sup>o</sup> *Toux rebelles* : Bronchites Chroniques, Bacillose.

**Doses.** — *Enfants* : II gouttes par année d'âge  
2 à 3 fois par jour.

*Adultes* : XXX gouttes 3 à 4 fois par jour.

**Prix** : 19 fr. 55 pour un traitement de quinze jours.

Laboratoire CHARPENTIER-RODIET

Pharmacien,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

47, rue de Bretagne — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 94-65.)

## NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (75 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïné pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans les maladies infectieuses.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-19.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-17.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-21.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la colibacillose et l'appendicite chronique.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-18.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-22 (sous le nom de solution).

Pommade cocaïnée : 31 fr. 30 (le tube de 20 gr.). —

Pommade non cocaïnée : 29 fr. 60 (le tube de 20 gr.). —

Ovules : 21 fr. 10 (les 6). — Suppositoires :

17 fr. 60 (les 6). — Pilules : 17 fr. 60 (les 40). —

Compte-Gouttes : 16 fr. 20 (le flacon de 15 cc.).

**Laboratoires du D<sup>r</sup> H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44)

## NÉOCORTINE

**Composition.** — Esther acétique de l'hormone cortico-surrénale obtenue par synthèse (acétate de désoxycorticostérone).

**Indications.** — Toutes les insuffisances surrénales : Chroniques (maladies d'Addison) ;

Aiguës (au cours des maladies infectieuses).

*Traitement du shock, Traitement des grandes asthénies.*

**Présentation.** — En ampoules de 1 cc. contenant en solution huileuse 2 mgr. ou 5 mgr. d'acétate de désoxycorticostérone.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires.

**Posologie.** — Variable, selon les cas, de 2 mgr. à 20 mgr. *pro die*.

**Prix :**

La boîte de 4 ampoules de 1 cc. à 2 mgr. .... 80 fr.

La boîte de 4 ampoules de 1 cc. à 5 mgr. .... 160 —

**Laboratoire pour la Diffusion des Produits synthétiques,**

**Léonce GODEAU, Pharmacien**

73, rue Dutot — PARIS (XV°).

## NÉO-DMÉGON

**Vaccin curatif des complications de la gonococcie.**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonococcus* traitées par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmégon agit notablement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules imprimées rouge et bleu. Voie hypodermique, intramusculaire ou intraveineuse.

Prix de vente : la boîte de 6 amp. : 27 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## NÉO-DMÉTYS

**Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traités par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Vaccinothérapie et vaccination préventive de la coqueluche.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (souches différentes). Une injection intramusculaire (de préférence) ou sous-cutanée, tous les 2 jours; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule dès la deuxième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Séries de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules imprimées rouge et bleu.

Le *Néo-Dmètys* peut être utilisé pour l'intradermo-réaction (diagnostic).

Prix de vente : La boîte de 6 amp. : 27 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## NÉO-FEROXAL

### Composition :

Protosalate de fer...	10 gr.	Glycérophosphate de chaux.....	0 gr. 26
Sulfate de cuivre...	0 gr. 030	Glycérophosphate de magnésie.....	0 gr. 26
Phosphate de soude.	1 gr. 33	Pour 100 grammes.	

**Présentation.** — Flacon de 85 gr. de granulé.

**Propriétés.** — 1<sup>o</sup> Le cuivre associé en quantité minime au fer accélère l'action hémostatique de ce dernier métal.

2<sup>o</sup> La concentration en fer importante permet une thérapeutique martiale très active.

3<sup>o</sup> La présence de phosphates alcalins prévient les troubles gastriques et la constipation.

**Indications.** — Toutes les anémies, associé ou non, suivant le type de l'anémie, aux extraits hépatiques ou gastriques. La chlorose, le lymphatisme, la scrofule. Au cours de la puberté, de la grossesse, de l'allaitement, dans les convalescences de toutes les maladies infectieuses.

**Posologie.** — Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de protosalate de fer et 0 gr. 0015 de sulfate de cuivre.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café et plus pendant trois semaines.

Enfants : 1/2 cuillerée à café par année d'âge et par jour.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## NÉOGAÏACOL LUMIÈRE

Médication créosotée intensive.

Galacol-créosoté, Hydrosoluble injectable.

**Composition.** — Le NÉOGAÏACOL LUMIÈRE est une solution aqueuse, injectable, de Créosote, enrichie en Galacol, présentée en ampoules de 3 cc. à 5 % (galacol, 0 gr. 09; créosote, 0 gr. 06; acétamine, 0 gr. 75).

Le NÉOGAÏACOL LUMIÈRE permet donc d'administrer Créosote et Galacol « en nature ».

Injecté par voie sous-cutanée ou intra-musculaire, il ne détermine aucune réaction locale ni générale. L'absorption est rapide.

Le NÉOGAÏACOL LUMIÈRE s'applique, avec succès, au traitement des affections les plus diverses des voies respiratoires.

**Indications.** — Traitement des Affections pulmonaires de toute nature. Aucun des inconvénients ni des contre-indications de la médication créosotée administrée par voie buccale, rectale ou par injections huileuses.

Action thérapeutique intense et rapide.

Absorption parfaite (sans réactions locales ni générales).

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 ampoules chaque jour en injections sous-cutanées, ou mieux intra-musculaires.

Chez l'enfant : une injection par jour pendant quinze jours. Après un repos d'une semaine reprendre une série de 15 injections.

Chez l'adulte : trois séries de 15 injections, avec un repos de quatre jours entre les séries.

Laboratoires LUMIÈRE, 45, rue Villon — LYON.

## NÉO-GRANULÉ DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Polyvitamine.

Récalcification, Carence vitaminique, Etats dépressifs, Tuberculose.

**Composition.** — Hypophosphite de chaux, Extrait de rate, Vitamines A, B, C, D.

**Nourrissons :** 1/2 cuillerée à café par jour.

**Enfants :** 3 cuillerées à café par jour.

**Adultes :** 2 cuillerées à bouche par jour.

(De préférence au début des repas.)

**Prix :** 20 fr. 40 (66 fr. 30 la quadruple boîte).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 225-17.

Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien,

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Did. 74-02.)

## NÉO-GYNERGÈNE

Association stable de tartrate d'ergotamine et de tartrate d'ergobasine.

**Propriétés.** — Le Néo-Gynergène, stimulant du tonus utérin, combine les effets rapides de l'ergobasine à l'action prolongée, mais plus tardive de l'ergotamine. Le Néo-Gynergène n'a pas d'action sur la tension artérielle, contrairement aux extraits hypophysaires.

**Indications.** — Hémorragies de la délivrance par atonie utérine, Opération césarienne, Subinvolution utérine, Hémorragies gynécologiques.

**Posologie.** — *Gouttes*: XV à XXX, 1 à 3 fois par jour. *Ampoules*: Injection de 1/2 cc. à 1 cc. (voies sous-cutanée et intramusculaire).

### PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

Laxatif.

**Composition.** — Suc d'orange et manne.

**Forme.** — Sirop.

**Indications.** — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.  
Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

### Posologie.

*Enfants* du premier âge: 1/3 à une cuil. à café.

*Enfants* de 3 à 5 ans: une à deux cuil. à café.

*Enfants* de 6 à 14 ans: une à deux cuil. à entremets.

*Adultes*: une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

Prix: 17 fr. 25.

Laboratoires CHAPOTOT  
56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Montmartre 28-90 et 30-65.)  
R. C. 231917 B.

## NÉOL BOTTU

**Composition.** — Solution stabilisée de persulfates alcalins d'origine électrolytique et représentant une réaction chimique autogénératrice d'oxygène naissant ozonisé.

**Propriétés.** — N'a aucune toxicité, ni action irritante. Par son oxygène, il est à la fois décongestif dans les inflammations tissulaires; par son ozone, il est vitalisant et bactéricide véritable régénérateur des tissus dans tous les cas d'ulcérations cutanées ou muqueuses.

**Indications.** — Affections bucco-pharyngées. Pansement de plaies. Brûlures. Affections gynécologiques.

**Mode d'emploi et posologie.** — *En gargarismes*: prophylactique et curatif de toutes les infections bucco-pharyngées: une cuillerée à potage par verre d'eau avec ou sans adjonction d'une pincée de bicarbonate de soude.

*En pansements au 1/5* (Néol 1 partie, eau 4 parties): brûlures par feu, radium, soleil ou froid (adjuvant en cryothérapie).

*En injections, grands lavages*, dans toutes les infections génito-urinaires: 6 cuillerées à soupe par litre d'eau.

*Comme détartrant* des appareils de prothèse dentaire: 2 cuillerées à soupe par verre d'eau.

Prix: Le flacon G. M.: 12 fr. 90. — P. M.: 7 fr. 60.

### Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## NÉOLIDES HB

**Composition.** — Comprimés gynécologiques à base de persulfates alcalins et d'essences antiseptiques.

**Propriétés.** — Dissous dans l'eau chaude, constituent un antiseptique gynécologique à la fois bactéricide, émollient et décongestif. Présentent l'avantage de ne pas tacher le linge et la peau, d'être agréablement parfumés, et sans la moindre toxicité.

**Indications.** — Hygiène intime journalière, Leucorrhées, Métrites, Infections gynécologiques diverses. Après applications de radium.

**Posologie.** — Hygiène intime: 2 Néolides par litre d'eau.

Dose thérapeutique: 4 Néolides par litre d'eau aussi chaude que possible.

Prix: 16 fr. 40 la boîte de 60 comprimés.

### Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## NÉOLYSE

Composé silico-magnésien.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant nucléaire, équilibrant physiologique, corrige la carence minérale du terrain néoplasique.

**Indications.** — Néoplasmes, verrues, asthénie et troubles de fatigue générale, adénome prostatique, adjuvant aux opérations chirurgicales pour s'opposer aux récidives.

**Présentation et mode d'emploi.** — *Cachets* : 1 cachet aux trois repas, pendant 20 jours.

Boîte de 60 cachets : 29 fr. 90.

*Ampoules* de 2 cc. : 1 injection intramusculaire sous-cutanée ou intratumorale tous les 2 jours. Série de 16 injections.

Boîte de 4 ampoules : 15 fr. 20.

**Laboratoire G. FERMÉ**

22, rue de Turin — PARIS (VIII°).

(Tél. : Europe 49-50.)

**Z. N. O. : PETRIER, 30, rue Créqui — LYON.**

## NÉO-MORUBILINE

**Composition.** — Extrait concentré d'huile de foie de morue. Contient tous les principes actifs de l'huile de foie de morue : composants chimiques (graisse, phosphore, iode, brome, soufre), vitamines A et D, associés au glycérophosphate et à l'hypophosphite de chaux.

**Mode d'action.** — Active la croissance, fixe le calcium, assure l'équilibre nutritif.

Facile à administrer sous un petit volume, sans goût ni odeur désagréables, ne provoque pas de troubles digestifs.

**Indications.** — Croissance, lymphatisme, scrofule, rachitisme, grossesse, allaitement, convalescences, anémies, chlorose, fractures.

**Mode d'emploi.** — Comprimés.

*Enfants* jusqu'à 12 ans : 1 comprimé. — *Enfants* au-dessus de 12 ans et chez l'adulte : 2 comprimés, avant chacun des principaux repas.

**Laboratoires de la NÉO-MORUBILINE**

84, boulevard Garibaldi — PARIS (XV°).

## NÉO-OLBIA

**Solution huileuse de Bismuth.**

(Bismuth oléosoluble.)

Spécifique de la Syphilis.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes, Spirillose, Spirochètose.

**Formes :**

1° Ampoules de 2 cc. pour injections intramusculaires indolores (0,08 de Bimétal par ampoule.)

2° Ampoules de 1 cc. pour injections intramusculaires indolores (0,04 de Bimétal par ampoule.)

**Posologie :**

*Adultes* : Injecter dans la région fessière une ampoule de 2 cc. tous les 4 jours.

*Enfants* : Injecter dans la région fessière une ampoule de 1 cc. tous les 4 jours.

**Établissements MOUNEYRAT**

**Docteur MOUNEYRAT**

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,  
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

Formes. — Gouttes, Granules, Ampoules injectables.

Indications thérapeutiques :

Traitement de fond des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

**ASTHME - GRIPPE**

**RHUME DES FOINS**

**OORYZAS SPASMODIQUES**

**TOUX QUINTEUSES**

**OOQUELUOHE**

Accidents respiratoires et digestifs post-anesthésiques au cours des opérations.

Manifestations anaphylactiques.

**URTICAIRES - EOZÉMA**

Mode d'emploi :

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

Doses moyennes :

Gouttes : *Enfants* : III à X gouttes.

— *Adultes* : VIII à XV gouttes.

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

Granules : *Adultes* : 1 granule 3 à 4 fois par jour, après les repas.

Ampoules : *Adultes* : Commencer toujours par 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée. 1 ou 2 amp. par jour.

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foin, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de RHINO-FLUINE.

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

Prix : Gouttes, Granules : 21 fr. 80.

Ampoules : 26 fr. 70.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris.

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

(Tél. : Auteuil 35-25.)

## NÉO-PANSEMENT TULASNE

Se rapproche très sensiblement par son action du BISMUTH TULASNE, dont il constitue le meilleur succédané.

Composition :

Alumine hydratée colloïdale..... 2 gr. 50

Silicate d'alumine hydraté naturel..... 7 gr. 50

Propriétés. — Cette association nouvelle et originale de sels d'alumine insolubles forme, au contact des sucs digestifs, une gelée muclagineuse extrêmement adhérente, donc bien isolante et favorisant la cicatrisation. Cette propriété est complétée par l'action anti-acide de l'alumine hydratée colloïdale, puissant fixateur de l'acide chlorhydrique. La gelée formée dans l'estomac ne se dissocie pas dans le milieu intestinal et poursuit ses effets bienfaisants sur tout le trajet de la muqueuse qu'elle protège, calme et cicatrise.

Indications. — Ulcurs, Gastrites, Hyperchlorhydries, Dyspepsies, Colites, Diarrhées, Fermentations.

Posologie. — 1 à 3 sachets par jour dans un demi-verre d'eau. Ni goût, ni odeur.

Présentation et prix. Boîte de 10 sachets de 10 gr. : 18 fr. Enregistré Lab. Nat. Contr. Méd. n° 91-4.

## NÉO-PANSEMENT TULASNE QUINOLÉ

Composition :

Alumine hydratée colloïdale..... 2 gr. 25

Silicate d'alumine hydraté naturel..... 7 gr. 50

Bismutho-8-oxyquinoléine..... 0 gr. 25

Lorsque les effets du pansement doivent être complétés par une action bactéricide ou parasiticide, le NÉO-PANSEMENT TULASNE QUINOLÉ est spécialement indiqué.

La bismutho-8-oxyquinoléine se décompose dans le tractus digestif en bismuth naissant, désinfectant extrêmement actif, et oxyquinoléine, également désinfectant puissant, ne coagulant pas les albumines, stimulant les réactions de défense et parfaitement bien tolérée.

Indications. — Entéro-colites, Colites bactériennes, Diarrhées infectieuses, Fermentations et putréfactions anormales, Tox-infections, Colibacillose, Diarrhées des tuberculeux, Oxyurose, etc.

Posologie. — 1 à 3 sachets par jour selon les symptômes. *Enfants* : demi-dose.

Oxyurose. — *Adultes* : 1 sachet matin et soir. *Enfants* : 1 sachet le matin. *Enfants en bas âge* : 1/2 sachet le matin à jeun. Quel que soit l'âge : 1 BISMU-CONE le soir au coucher (voir BISMU-CONES). Aucun régime spécial. Cure 5 jours, repos 5 jours. Purgation entre les cures.

Présentation et prix. — Boîte de 10 sachets de 10 gr. : 22 fr. Enregistré Lab. Nat. Contr. Méd. n° 91-5.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01)



## NÉO-PASSIFLORINE

(Comprimés.)

Médication symptomatique et causale  
des états vago-sympathiques.

### Composition :

Un comprimé contient :

Extrait sec de Passiflora incar-	
nata.....	0,10
Extrait sec de Salix alba...	0,10
— de Crataegus ...	0,03
Gluconate de Calcium .....	0,10
Vitamine D pure cristallisée..	1 000 unités intern.
Peptones polyvalentes .....	0,05
Hyposulfite de magnésium ..	0,02

**Action.** — Les comprimés de *NEO-PASSIFLORINE* ne sont pas destinés à remplacer la *PASSIFLORINE*, mais ils trouvent leur emploi dans les cas rebelles ou lorsqu'interviennent des causes profondes : troubles du métabolisme du calcium, modifications humorales, phénomènes anaphylactiques, déficience hépatique, chaque fois en somme qu'il faut modifier le terrain et installer une médication symptomatique et causale.

**Indications.** — Toutes les indications de la *PASSIFLORINE* et tous les syndromes vago-sympathiques d'origine obscure, en particulier les syndromes de neurotonie intriquée.

**Posologie.** — 1 ou 2 comprimés avant chaque repas.

Prix : 23 fr. 50.

**G. REAUBOURG et Cie,**  
Docteur en pharmacie,  
115, rue de Paris  
BOULOGNE-SUR-SEINE  
R. C. Seine 265.702 B.

## NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires :  
Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas  
Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injectons intramusculaires tous les 2 jours  
du contenu total d'une ampoule n° 1 et de  
1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 104 fr. la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉO-PHYSIO

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Soluté injectable leucogène.

**Indications.** — Infections de moyenne intensité (1) : Angines, Furunculose, Grippe, Métrite, Salpingite, Toxémies gastro-intestinales, etc.

**Injectons.** — Intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy.

**Doses.** — 1 à 3 ampoules chaque jour (cas aigus),  
ou tous les 2 ou 4 jours (cas moyens ou chroniques).

**Forme et prix.** — Boîte de 8 ampoules de 5 cc. :  
33 fr. 90.

(1) Infections graves : Voir *Physiosthénine*.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## NÉOPLASTEX

Bandes extensibles, lavables en filés Lastex  
Faisant office de  
Bandages de **CONTENTION** par enroulement.

**TROIS QUALITÉS** (*Bien préciser la qualité prescrite.*)

- 1° **EXTRA-MINCE** (ou 3259) pour tous soutiens :  
a. Des membres, en largeurs 4, 6, 8, 10 cm. sur 2 m. 50 de long ;  
b. De l'abdomen, en largeurs 15, 20, 25, 30 cm. sur 2 m., 2 m. 50, 3 m. de long.

### Indications.

- a. Varices, Phlébites, Hydarthroses, etc. ;  
b. Ptoses, Suites d'Opérations et d'Accouchements, etc.  
Petites bandes pour pansement ombilical, chevilles, poignets.

- 2° **RENFORCÉE** (ou 3400) en largeurs 8 et 10 cm. sur 2 m. 50 de long, pour plus fortes contentions des membres.

- 3° **EXTRA-FORTE** (ou 3464) en largeurs 8 et 10 cm. sur 3 m. de long, pour très fortes contentions : traitement ambulatoire des **Ulcères variqueux**, Hémostases, Fractures de côtes, etc.

### SANGLE-CEINTURE NÉOPLASTEX

« du Dr BONNET »,

en qualité NÉOPLASTEX EXTRA-FORTE  
assure par ENROULEMENT  
le traitement mécanique le plus rationnel  
des **PTOSES**.

Bandages { toujours propres et hygiéniques  
(lessivables) ;  
Économiques par leurs prix, leur  
durée, leur résistance.

Toutes les bandes Néoplastex sont munies pour leur fixation d'attaches élastiques, inoxydables Néoplastex.

### NÉOPLASTEX

71, fg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél.: Bot. 18-72.)  
Dépôts : tous grossistes de Paris et de province.  
Détail : toutes pharmacies.

## NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

### Composition :

Sulfogalaicolate de potasse .....	1,00
Benzoate de sodium .....	1,50
Extrait thébaïque .....	0,02
Dionine .....	0,02
Teinture de belladone .....	0,65
— de drosera .....	0,65
— de grindelia .....	0,65
Sirop de baume de tolu .....	15,00
Excipient aromatique... Q. s. p. 100 cc.	

Indications. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 18 fr. 10.

Laboratoires **RICHER**

Docteur en pharmacie.

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien, PARIS.  
(Tél.: Provence 34-87.)

## NÉO-RHÉNium

du Docteur **Louis FOURNIER**

Principe actif. — Sel rhénio-sodique de préparation spéciale.

Indications thérapeutiques. — Traitement des néoplasmes, carcinomes, fibromes, cancers et de toutes tumeurs bénignes ou malignes.

Forme. — Ampoules de 10 cc.

Chaque ampoule contient 0 gr. 10 de perrhéate de soude chimiquement pur et indolore.

Boîte de 6 ampoules : 205 fr. 30.

Posologie. — Injection quotidienne (intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée) de 10 cc. au minimum. Traitement à continuer pendant 16 à 24 jours.

Envoi de toute documentation sur demande.

Laboratoires du Néo-Rhénium

de **RIVE**, Pharmacien

82, 84, rue de Belleville — PARIS (XX<sup>e</sup>).  
(Tél. Mén. 69-04.)

## NÉO-RHOMNOL

Rhomnol strychno-arsénié (Nucléinate de strychnine et Cacodylate de soude).

Injections hypodermiques et comprimés.

**Indications thérapeutiques.** — Hypertension artérielle, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité), Amyosthénie. Corps nouveau défini à effets réguliers et constants.

**Mode d'emploi.** — Ampoules : tous les jours une ampoule (en injections intramusculaires de préférence), deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire. Comprimés : un comprimé à chaque repas ; avaler sans croquer.

Prix de vente au public :

Ampoules : 24 fr. 40. Comprimés : 22 fr. 50.

Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI°).

(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## NÉO-RIODINE

C<sup>1</sup> H<sup>1</sup> O<sup>4</sup> I S Na

**Composition.** — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

**Formes.** — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action immédiate et intensive. Aucune intolérance.

**Indications.** — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée a résultats rapides est indiquée.

**Doses et mode d'emploi.** — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

**Prix :** b. de 10 amp. : 24 fr. ; b. de 5 amp. : 12 fr. 80.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

## NÉOSALIODE

Huile Iodo-Salolée injectable Indolore

**Composition.** — Chaque ampoule de 5 cc. contient :

Iode .....	0,10
Salol.....	1,00
Camphre.....	0,02

Huile d'olive purifiée à l'éther : Q. S.

**Indications.** — Toutes les affections rhumatismales chroniques.

**Posologie.** — Une ampoule tous les deux jours en injection intramusculaire profonde. Séries de 10 injections séparées par un repos d'un mois.

Prix :

La boîte de 5 ampoules : 31 fr. 90.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).

(Tél. : Alésia 23-48.)

## NÉO-SALYL

du Dr Martinet (Ex-Sodisalyne).

**Composition.** — Salicylate de soude purifié.

**Indications.** — Spécifique du R. A. A. Antisep-tique général puissant, Cholagogue de choix, Antinévralgique fidèle.

**Formes.** — Dragées enrobées : 2 dragées = 1 gr. de Salicylate de Na.

Gouttes concentrées : L gouttes : 1 gr. de Salicylate de Na.

Ampoules : Intramusculaires de 10 cc. à 20 p. 100. Intraveineuses de 10 cc. à 10 p. 100.

**Posologie.** — 2 à 10 gr. par jour de salicylate de Na : Dragées, 1 heure avant les repas de préférence ; Gouttes, pendant les repas ; Ampoules, 1 à 2 piqûres par jour.

**Prix.** — Le flacon de 60 dragées ou 60 cc. : 22 fr. 50. Ampoules : 25 francs la boîte de 6.

Enregistré au L. N. C. n°s 759-3-4-5-6.

Laboratoires du Dr PILLET

222, boulevard Pereire — PARIS.

## NÉO-SETI

Solution buvable de Soufre et d'Iode.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'association de Soufre et d'Iode permet le traitement *per os* de toutes les maladies relevant de la Sulfoiodothérapie (A. Léri et Dedet).

**Indications.** — Rhumatismes Chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle, Asthme et périphlébites.

**Mode d'emploi.** — Prendre de XX à XXX gouttes 2 fois par jour, aux repas, dans un verre d'eau pure ou sucrée.

Laboratoires BRISSON

D<sup>r</sup> DEDET et Cie, Pharmaciens

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## NÉOSOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth.

**Indications.** — Le Néosolmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

**Mode d'emploi.** — 2 injections intramusculaires de une ampoule par semaine.

**Présentation :**

En boîtes de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (la solution contient 4 cg. de Bismuth métal par cc.).

Prix de vente au public :

34 fr. 60 la boîte de 12 ampoules 1 cc.

42 fr. 85 la boîte de 12 ampoules 2 cc.

L. N. C. 463-3.

Laboratoires L. LECOQ

14, rue A.-Briand. — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## NÉOSPLÉNINE

Ampoules buvables.

La première synergie d'extraits désalbuminés de rate, foie, muqueuse gastrique.

**Indications.** — Toutes anémies, Dyspepsies, Déficiences organiques, Hémorragies, Anorexies.

**Présentation.** — Une ampoule buvable de 5 cc. correspond exactement à 62 gr. 50 d'organes frais sélectionnés.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une ampoule buvable le matin à jeun ou avant le repas du midi et du soir dans un demi-verre de liquide. (Gazeux de préférence.)

**Avantages.** — Cet extrait concentré, préparé avec des organes frais non congelés ni d'importation, privé de ses albumines et lipolides, peut être donné même aux malades à qui ces organes sont interdits : Goutteux, Brightiques, Azotémiques, Entériques.

10 ampoules buvables — 31 fr. 60.

8 à 10 jours de traitement.

Laboratoires Français de Gastro-Entérologie

71, rue Saint-Anne — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Richelieu 19-26.)

Dépôt général O. C. P. France et tous grossistes.

Afrique du Nord : FELISSARD

ALGER et CASABLANCA.

## NÉOSULFA

Solution non caustique de Sulfamide éphédrinée.  
Pour usage nasal.

*La Sulfamide en thérapeutique nasale locale.*

**Indications.** — États congestifs inflammatoires et infections du Rhinopharynx et des cavités annexes, Rhinites hypertrophiques, mucopurulentes, Ethmoidites, Adénoidites, Catarrhes tubo-tympaniques, Coryzas.

**Mode d'emploi.** — Pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur nasal. Donner de 12 à 20 coups de poire dans chaque narine, 2 à 4 fois par jour et plus.

**Instillations.** — V à VI gouttes dans chaque narine, 2 à 4 fois par jour, en renversant la tête.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-3.

Laboratoire du GASTRHEMA

17, Avenue de Villiers — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 91-99.)

## NÉOSULINE

Régulateur biologique général  
par hormonisation cytotatique.

### Principes actifs :

1° Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des  
flots de Langerhans ;

2° Extrait de moelle diaphysaire d'os jeunes.

**Présentation.** — Comprimés de couleur rouge.

**Posologie.** — 3 comprimés 3 fois par jour, *strictement*  
une demi-heure avant les repas.

**Indications.** — Préventif et palliatif de l'anarchie cellu-  
laire, des lésions à tendance maligne, néoplasmes,  
dystrophies, hypotrophies, régulateur de la croissance  
infantile.

**Observation.** — Pour les plaies et ulcérations, conju-  
guer les deux traitements *Néosuline* (buccal) et *Derma-  
suline* (local).

Prix : 55 francs.  
L. N. C. 353-6.

**Laboratoires THAIDELMO**  
45, avenue Mozart — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Auteuil 01-46.)

## NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES  
et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) pos-  
sèdent, en applications externes, de remarquables  
qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs  
(A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET,  
DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies  
atonies, et principalement dans le traitement des ulcé-  
rations du col de l'utérus et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale  
de ces affections, en effet :

Énergiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent  
rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en  
quelques jours les phénomènes douloureux et fluxion-  
naires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cica-  
trisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils  
sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on  
peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médica-  
tion, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la  
disposition du Corps Médical les quatre préparations  
suivantes à base de Néodyme et de Thorium stable  
d'activité pratiquement illimitée.

### Ovules Néothorium Millot.

**Métrites :** un tous les jours, puis tous les deux jours.

### Crayons Néothorium Millot.

**Endométrites :** 2 à 3 par semaine.

### Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de  
l'eau chaude en irrigation.

### Tampons Néothorium Millot.

**Ulcérations du col :** un tous les jours, puis tous les deux  
jours.

### Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII°).

(Tél. : Étoile 29-54.)

## NÉO-TRÉPOL

Bismuth métalloïdique pur (insoluble) en suspension dans l'eau.

### Traitement de la syphilis.

Les Ampoules sont de 2 cc. Chacune contient 0 gr. 16 de Bismuth, soit 0 gr. 08 par centicube.

**Posologie.** — Une injection intramusculaire profonde deux fois par semaine. Commencer par au moins 5 injections de 1 cc. seulement. Enfin monter à un et demi, un trois quart, puis 2 cc.

Totaliser pour une série de 15 à 20 injections un poids total de 2 à 3 gr. de Bismuth.

Prix de la boîte de 6 ampoules adultes : 23 francs.

Prix de la boîte de 6 ampoules enfants : 18 francs.

### Laboratoires TORAUDE

J. ROUX, Docteur en médecine, Pharmacien  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92).

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## NÉOTROPE AGUETTANT

Plomb colloïdal électrique stable et non toxique, en ampoules injectables.

### Le Plomb colloïdal dans le traitement des Cancers.

Nos recherches entreprises en 1924, avec le Professeur Duroux, nous ont fourni une documentation qui s'enrichit encore chaque jour (action du Néotrope seul ou associé au traitement par les rayons X).

Nous sommes à la disposition des Médecins pour leur exposer l'état de la question et leur faciliter des expérimentations personnelles.

L'électro-colloïde de Plomb, que nous sommes seuls à savoir obtenir stable, n'est pas toxique et ne donne pas de choc.

Les injections sont suivies d'une hémopoïèse importante; jamais nous n'avons observé d'anémie saturnine.

**Dose.** — 5 cc. par jour ou 10 cc. tous les deux jours, en injection intramusculaire ou mieux intraveineuse. Après 12 injections, cesser 6 à 7 jours et reprendre la cure. Enreg. au L. N. de C. des M. sous le n° 130-1.

### Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.)

## NÉOTROPINE CRUET

Colorant bactéricide puissant

**Composition.** — 2-butyloxy-2'-6'-diamino-5'-5'-azopyridine.

**Indications.** — Toutes infections aiguës ou chroniques des voies urinaires et de leurs annexes. La NEOTROPINE constitue également un excellent adjuvant dans le traitement de la blennorragie aiguë et chronique.

**Posologie.** — Une dragée 3 à 5 fois par jour après les repas. Dans les traitements prolongés, intercaler 2 à 3 jours de repos tous les 5 jours.

**Présentation.** — Flacon de 30 dragées à 0 gr. 10  
Prix..... 21 fr. 20

### Laboratoires CRUET

89, avenue de la Bourdonnais — PARIS (VII°).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE  
87, avenue de Saxe — LYON

## NÉPHRACTIVE

Diurétique, à base de Théobromine française très pure. Tolérance parfaite. Activité constamment puissante.

**Formes.** — Cachets de 0 gr. 50 de Théobromine pure ou associée : caféine, digitale, lithinée, magnésienne, phosphatée, scillitique, arbutinée.

Étant données les circonstances, voici les formules les plus faciles à prescrire et les plus répandues en pharmacie :

**Néphractive B**, à l'Arbutine, retirée de l'uva-ursi. Chaque cachet contient : Théobromine pure dosée physiologiquement, 0 gr. 10. Pariétaire, 0 gr. 20. Nitrate de potasse, 0 gr. 10. Solidago, 0 gr. 10. Arbutine, 0 gr. 02.

**Néphractive B. Scillitique.** Même formule que la Néphractive B, mais chaque cachet contient en sus 0 gr. 05 de Scille stabilisée.

**Néphractive C.** Chaque cachet contient : Pariétaire, 0 gr. 20. Nitrate de potasse, 0 gr. 10. Solidago, 0 gr. 10. Arbutine, 0 gr. 02.

**Néphractive C. Scillitique.** Même formule que Néphractive C, mais chaque cachet contient en sus 0 gr. 05 de Scille stabilisée.

**Indications.** — Diurétique idéal des cirrhoses, Œdèmes, Cardiorénaux, Albuminuriques, Hydropisiques, Artérioscléreux.

**Doses.** — 2 à 4 cachets par jour.

Prix : 16 à 25 francs.

Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques,  
10, rue du Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)

## NÉPHRALBINE

Cachets.

Adjuvant du régime lacté et lacto-végétaro-fritarien.

**Composition.** — Lactate de Strontium, Gluconate de Calcium, Salsepareille Tampico, Poudre de Reins, Diurétiques lénitifs végétaux.

**Indications.** — L'insuffisance rénale : Albuminuries, Néphrites, etc., Maladies infectieuses, Manifestations anaphylactiques, Arthritisme, Déminéralisation, Diabète rénal.

**Posologie.** — 3 à 6 cachets par jour pour les adultes. 1 à 3 pour les enfants, de préférence avec une tasse de lait.

La boîte de 30 cachets : 27 fr. 60.

Laboratoire de la Néphralbine.

**R. FAURE, Docteur en Pharmacie,**  
2, rue Carnot — MELUN (S.-et-M.).  
(Tél. : 179.)

## NÉPHRYLAN

du Dr Lobry (Comprimés)

**ALBUMINURIE, OLIGURIE  
COLIBACILLURIE**

et toutes affections des voies urinales.

**Composition.** — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Poudre de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloïa, d'Uva ursi.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 20 fr. 80.

**Laboratoires du Docteur LOBRY**  
6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Dorian 49-31).

## NEPTAL

Hydroxy-mercure-propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

*Indications :*

**Oligurie des affections cardio-rénales, Œdèmes, Anasarque, Ascites, Hydrothorax, Arthrites, Syphilis cardio-aortique.**

**Présentation :** Boîte de 3 ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 5 (sol. à 9,2 p. 100).

Boîte de 10 ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 5 (sol. à 3 p. 100).

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 g. Traitement des syphilis vasculaires par la solution à 3 p. 100.

Le Neptal peut être injecté par voie intraveineuse (Neptal à 3 % en cas de nécessité, ainsi que dans la cavité péritonéale (Neptal à 9 %) en cas d'ascite).

Prix de vente :

La boîte de 3 ampoules : 13 fr. 80.

N. à 3 p. 100. La boîte de 10 ampoules : 17 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marque Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Balzac 22-64.)

## NERGINE

**Composition.** — La Nergine est une farine de germe de blé dégraissée. Le germe de blé riche en un sel de calcium et magnésium associé à un acide phospho-organique : l'acide phytinlique, et en sels de fer, calcium, manganèse, réalise un produit reconstituant et reminéralisant d'une activité considérable, rapide et constante.

**Indications.** — Aliment qui constitue un appoint extrêmement utile dans les régimes destinés à lutter contre un état de déficience ou de fatigue de l'organisme : enfants en période de croissance ou de dentition ; surmenés, convalescents, tuberculeux, nourrices.

**Mode d'emploi.** — Pour les adultes : 4 à 6 fortes cuillerées à café à prendre par jour en plusieurs fois dans un peu d'eau sucrée ; pour les enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu de lait.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue de Saint-Germain — NANTERRE (Seine)  
2 et 4, chemin Feuillant — LYON (Rhône).

## NERVANTYL MILUC

Changement de nom.

Ce produit s'appelle désormais :

« **LOTUPHAR MILUC** »

Voir à ce nom.

## NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT  
HÉPATOCITHINE

**Ampoules buvables, Dragées, Sirop.**  
(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

**Composition et formes.** — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

*Hémoglobine et Extrait de Foie frais* activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément.

Tout mauvais goût supprimé.

Nervocithine non hépatisée, ampoules injectables.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable).

*Enfants* : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Prix : Taxe d'état comprise :

Sirop : 22 fr. 55 — Dragées : 16 fr. 90.

Ampoules injectables non hépatisées : 16 fr. 45.

Ampoule buvable : boîtes de 6 : 14 fr. 10

— — — de 12 : 28 fr. 15.

Laboratoire du Docteur TISSOT

C. COMBE, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

## NERVYL ROUSSEAU

Comprimés dragéifiés.

Médication à prédilection vago-sympathique.

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

Extrait mou de Cratægus .....	0 gr. 05
— de Gelsemium .....	0 gr. 005
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 02
Extrait mou de Passiflore .....	0 gr. 05
de Cimicifuga .....	0 gr. 01
Phényléthylmalonylurée.....	0 gr. 01

**Indications.** — Tous déséquilibres vago-sympathiques, Insomnies, Asthme nerveux, Emotivité, Anxiété, Irritabilité, Spasme, Angor, Eréthisme cardiaque, Troubles cardiaques, Séquelles d'Hystérectomie.

**Doses.** — 2 à 9 comprimés par jour (doses fractionnées).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1732-1.

Laboratoires ROUSSEAU

SENS (Yonne).

## NERVYL ROUSSEAU

Concentration 3

Comprimés dragéifiés.

**Composition :**

Extrait mou de cratægus .....	0,050
— de passiflore.....	0,050
— de gelsemium ....	0,005
— de cimicifuga ....	0,010
Phényléthylmalonylurée.....	0,030

Pour un comprimé.

Mêmes indications que pour le Nervyl Rousseau.

**Doses.** — 1 à 6 comprimés par jour (doses fractionnées).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1732-2.

Laboratoire du Docteur ROUSSEAU

Pharmacien à SENS (Yonne).



## NESAL

Régulateur du Système nerveux.

**Composition.** — 1 mesure contient :

Tartrate Borico-Potassique	
Bromuré .....	0,80
Phényléthylmalonylurée.....	0,03
Extrait Hydroalcoolique Stabilité de Belladone.....	0,01

**Propriétés.** — Calmant, Sédatif, Hypnotique, Anti-épileptique.

**Indications.** — 1° Insomnie.

2° Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Troubles nerveux au moment des règles, du retour d'âge, de la puberté, Migraines, Céphalées, Chorée, Tremblements nerveux, Gastrites nerveuses, Hyperexcitabilité, États hypochondriaques, Névroses cardiaques, Pollakiurie, Incontinence nocturne d'urine, etc.

3° Épilepsie.

**Avantages.** — Produit synergique. Sédatif puissant, mais sans danger, d'une tolérance parfaite, sans accoutumance lors des cures de longue durée.

**Forme.** — Présentation nouvelle : Granulés à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau, additionnée d'un ou deux morceaux de sucre ou dans une infusion.

**Posologie.** — 1° Insomnie : 1 mesure avant le coucher. (Dans les cas rebelles, ajouter une mesure vers 18 heures.)

2° Névroses, 2 à 3 mesures par jour.

3° Épilepsie, 3 à 5 mesures par jour.

Flacon petit modèle : 50 doses environ.

Flacon grand modèle, spécial pour cures, 100 doses environ.

### Produits POLYPHARMA

Concessionnaire **L. BRUN, Pharmacien**

92, rue Bobillot — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## NESEPTOL BENGUÉ

**Composition.** — Synergie médicamenteuse à base d'Essence de Pin maritime, Huile de parafine, Éphédrine et Menthol.

**Propriétés et Indications.** — Astringent, Décongestionnant, Antiseptique. Rhumes de cerveau, Rhume des foins, Rhinite chronique, Pharyngite, Angine, Amygdalite, Prophylaxie des affections rhino-pharyngées.

**Forme.** — Flacon verre breveté, comportant un bouchon à cupule dit Neillère, à la fois verseur et obturateur. Il supprime l'emploi du compte-gouttes et de la cuiller.

**Posologie.** — Verser deux fois par jour, matin et soir, le contenu de la cupule dans chaque narine, en inclinant la tête.

**Prix :** 15 fr. 80. — L. N. C. M., n° 516-5.

Laboratoires du Docteur **BENGUÉ et Fils,**  
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trin. 85-60.)

## NESTAMINE

Lait concentré sucré Nestlé enrichi en Vitamine D naturelle.

**Composition.** — Lait concentré sucré Nestlé enrichi de 185 Unités Internationales de Vitamine D pour 100 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique du Rachitisme des nourrissons et, en général, de toutes les anémies infantiles.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1816-1.

*La situation économique actuelle ne permettant pas l'approvisionnement régulier en matières premières, la vente de NESTAMINE est momentanément suspendue.*

**L.-J. MOUNIER, Pharmacien**

18, place de Laborde — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 64-90 à 64-95.)

## NESTOGÈNE

Lait en poudre Nestlé.

Lait en poudre demi-gras et sucré (saccharose et maltose-dextrine) obtenu par le procédé du « brouillard ».

### Composition :

Matière grasse.....	12	p. 100
Matières protéiques.....	20	—
Lactose.....	30	—
Maltose-Dextrine.....	15	—
Saccharose.....	15	—
Cendres.....	4,7	—
Eau.....	3,3	—

432 calories par 100 gr.

Riche en vitamines, y compris vitamine C, de conservation parfaite, de haute valeur alimentaire et de grande digestibilité.

**Indications.** — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants aux laits crémeux, des prématurés et des dystrophiques.

Prix : au cours.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 64-40.)

## NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

**Caractéristiques.** — Association de paraaminobenzoates d'éthyle et de butyle sans aucune toxicité Antiseptique, non irritant.

**Propriétés.** — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension) soit naturellement (muqueuse).

Suppression rapide et inoffensive de toute douleur ou démangeaison qui provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

**Formes de présentation.** — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Solution huileuse au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Suppositoires au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Ovules au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Pommade : Prix : 17 fr. 60.

Ovules, Suppositoires. Prix : 20 fr. 70.

Solution huileuse. Prix : 18 fr. 70.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 90-46.)

## NESTROVIT

**Composition.** — Association des 4 vitamines indispensables A, B<sub>1</sub>, C, D en proportions minutieusement étudiées et parfaitement équilibrées, permettant un dosage exact, un contrôle sûr, une administration agréable et ne présentant aucun danger même à hautes doses.

**Indications thérapeutiques.** — Hypo- et Avitaminoses, états de dénutrition, d'inappétence, d'anorexie, déminéralisation provenant d'un régime trop uniforme ou insuffisant, rachitisme et lymphatisme, troubles de la digestion et de l'assimilation, diarrhée et constipation chroniques, grossesse, allaitement, convalescences, troubles de la croissance, cicatrisation insuffisante des plaies, retard de la formation du cal après les fractures.

**Avantages.** — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue, se dose facilement et est très bien accepté par tous les estomacs, même les plus délicats. Son goût est délicieux, ce qui représente un grand avantage chez les enfants.

**Posologie et modes d'emploi.** — Pour nourrissons : 1 cuillerée à café par jour ; pour enfants : 2 ; pour adultes : 3, à mélanger au lait du biberon ou à la bouillie ou à prendre au moment des repas.

**Enfants de plus de 4 ans et adultes :** 2 tablettes par jour à croquer telles quelles ou à laisser fondre lentement dans la bouche.

## NESTROVIT

Tablettes. Boîte de 20.

Liquide. Flacon de 125 cm<sup>3</sup>.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 504-77 (liquide) et 504-78 (tablettes).

Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## NEURÈNE

### Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore, de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

### Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° La solution, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° Les comprimés : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

### Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Prix : 23 fr. 50.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE  
(Tél. : Molitor 34-16.)

## NEURÉOL

**Présentation et composition.** — Association soluble de Véronal, Valériane, Cratægus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif, Hypnotique, Antispasmodique.

**Avantages.** — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Prix : 18 fr. 85.

Dépôt Général :

J. LAFARGE, Docteur en pharmacie

62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX

## NEURIDOR

### Élixir.

Tonique et Sédatif du Système nerveux.

**Formule.** — Extraits fluides de Piscidia, 3,30 ; de Saule blanc stabilisé, 6,60 ; de Passiflore, 8,80 ; de Valériane, 16,50 ; titré de Gelsemium, 0,11 ; Alcoolatures de Ballote, 4,40 ; d'Anémone, 2,20 ; de Bignonia Catalpa, 4,40 ; Teinture de Cratægus, 6,60 ; Excipient aromatisé au cassis, Q. S. pour 100 cc.

**Indications thérapeutiques.** — Insomnies, Troubles du Sympathique, Névralgies, Neurasthénie.

**Posologie.** — Adultes : de 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Le NEURIDOR ne peut être administré aux enfants.

Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée inodore, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée (10 gr. 15 par comprimé ou cuillerée à café de solution).

**A. Dose et mode d'emploi.** — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir avec un peu d'eau sucrée : 2° Hypnotique : de 1/2 à 4 cuillerées à café ou de 1/2 à 4 comprimés le soir au coucher.

Les petits enfants supportent bien la NEURINASE.

**Solution.** — Doses maxima : Enfants de 6 mois : 2 demi-cuillerées à café par 24 heures en plusieurs fois.

**B. Indications.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délirés toxiques, Éréthisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatoses d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 20 fr. 70 — Comprimés : 14 fr. 40.

Laboratoires A. GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.  
(Tél. : Mail. 17-77.)

## NEUROCALCIUM

### Antispasmodique physiologique.

**Sirop**, par cuillerée à café :

Gluconate de Calcium ..... 0 gr. 10

Chlorure de Calcium..... 0 gr. 10

Bromure de Calcium..... 0 gr. 05

**Granulé**, par cuillerée à café arasée  
(3 grammes environ) :

Gluconate de Calcium ..... 0 gr. 20

Phényléthylmalonylurée ..... 0 gr. 01

Bromure de Calcium..... 0 gr. 10

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à café et plus suivant l'âge et les indications.

Le sirop s'adresse plus particulièrement aux enfants du premier âge.

**Indications.** — Tous les syndromes nerveux, Insomnies, Terreurs nocturnes, Convulsions, Instabilité, Troubles de la dentition, Spasmodophilie, Enurésie, Tics, Eréthisme cardiaque, etc.

**Laboratoires Biologiques  
de l'ILE-DE-FRANCE**

A. DÉTROIS, Pharmacien

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>)

## NEUROFÉRYL

Traitement de base des déséquilibres vazo-sympathiques et des dépressions psychiques.

**Composition.** — Atropine, Esérine, Phényléthylmalonylurée, Fer Manganèse, Cuivre, Boldo.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action synergique sur les deux systèmes par l'administration simultanée de paralytants du vague et du sympathique. Action spécifique du fer sur les troubles de la nutrition et du système nerveux, liés ou non à des symptômes anémiques.

*Le médicament le plus complet des états nerveux, à la fois sédatif, tonique et fortifiant.*

**Principales indications.** — Anxiété, Obsession, Mélancolie, Neurasthénie, Spasmes et angoisses, Neuro-anémie, Psycho-anémie, Troubles endocriniens, Symptômes nerveux post-opératoires, Syndromes solaires, Troubles digestifs d'origine nerveuse, Dépressieux.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour.

Prix : 23 fr. 70 le flacon de 40 comprimés dragéifiés.

**Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETREFA »**

R. GOÛIN et J. COULET, Pharmaciens.

H. LUZUY, Docteur en Pharmacie.

Administr. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Élys. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## NEUROFLORINE

**Sédatif Nervin,  
Antispasmodique, Cardiotonique.**

**Présentation.** — Solution et Comprimés.

**Composition.** — Synergie phytothérapique non toxique, de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Cratægus.

**Avantages.** — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux.  
*Il reconstruit la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins. Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Nervosisme, États spasmodiques et anxieux, Insomnies.

**Posologie.** — *Dose sédatrice* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

*Dose hypnotique* : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

**Laboratoires OROSNIER**

199, avenue Michel-Bizot — PARIS. (Tél. : Did. 04-53.)

## NEUROGALÈNE

Agréable au goût.

Formule établie d'après les enseignements de M. le Dr HENRI LECLERC, ex-président de la Société de Thérapeutique.

**Composition.** — Extraits aqueux, sans alcool et sans sucre.

Une cuillerée à café contient :

Chélidoine majus .....	0 gr. 02
Crataegus oxyacantha .....	0 gr. 10
Lycium Européum .....	0 gr. 01

**Propriétés.** — Sédatif de l'excitation psychique, des états de dépression et d'anxiété. Équilibrant des fonctions neuro-végétatives. Spécifique des spasmes vasculaires et des plexalgies cardiaques.

**Indications.** — Tachycardie, Cardialgies, Vertiges, tous états névropathiques : angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. Enfants agités, instables, troubles nerveux de la vie génitale, etc.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les repas de midi et du soir.

**Contre l'insomnie :** 1 ou 2 cuillerées à café avant le coucher, dans un peu d'eau ou infusion.

Echantillons et littérature à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale  
SOPHYTA

61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

J. LOISEAU, pharmacien.

(Tél. : Laborde 16-15.)

## NEUROGASTRINE

Sédatif nerveux, régulateur des fonctions gastro-hépatiques, antiseptique intestinal et urinaire.

**Composition.** — Granulé fondant contenant par cuillerée à café :

Charb. act. 0,50	Phényléthylmalonylurée. 0,015
Urotropine 0,15	Bromure de Potassium. 0,10
Cit. de soude. 0,10	Extrait de Valériane... 0,025
Ext. de boldo 0,05	Extrait de Jusquiame... 0,01

**Indications.** — Pesanteurs gastriques, Aérophagie, Vertiges, Migraines, Insomnies, Angor réflexe, Spasme du pylore, Dyskynésies vésiculaires, Cholécystites, Ulcères gastro-duodénaux, Fermentations, Entérites, Pyélonéphrites, Dermatoses, Prurits.

**Mode d'emploi :**

**Adultes :** Une cuillerée à café avant les principaux repas.

**Enfants :** Demi-dose à partir de 10 ans.

Prix : 23 fr. 60.

Laboratoires E. et G. GLOMAUD

12, bd Saint-Michel - PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél. : Dan.92-66.)

## NEUROKABRYL (gouttes)

Reconstituant général et intégral du système neuromusculaire.

Formule complète, équilibrée, active, effets durables.

**Composition.** — Phosphate de manganèse, de soude, de magnésie, hypophosphite de fer et de soude, Hypophosphite de soude et de chaux, et Acide orthophosphorique.

**Indications.** — Asthénies, dyspepsies, atonies, formations uro-calcaires du système cardio-vasculaire, azotémies, phosphaturies, lithiases, déficiences du pH urinaire, dermatoses, parasitismes, tuberculoses, décalcifications, surmenages, amnésies, affaiblissements neuro-glandulaires et musculaires.

**Posologie.** — 20 à 100 gouttes dans un peu d'eau, de vin ou de bière, au cours des repas, aucune contre-indication.

Spécialité ne renfermant aucun produit toxique.

Seul produit associant l'action des hypophosphites et des pyrophosphates à l'action de l'acide orthophosphorique.

Laboratoire E.-M. DAUMAS

1, rue Méhul — PANTIN (Seine). (Tél. : Nord 97-08.)

## NEUROPHOS

**Forme.** — Gouttes.

**Composition :**

Acide phosphorique .....	33 gr.
Glycérophosphate de soude, potasse, magnésie..... aa	10 —
Extrait désalbuminé de glandes orchitiques .....	20 —
Extrait désalbuminé de glandes interstitielles .....	20 —
Catalyseur d'oxydation (sel de manganèse spécial).....	2 —
Excipient glyciné et aromatisé. Q. S. p. 100 —	

**Indications.** — Asthénie, Dépression nerveuse, Dépression physique, Fatigue, Surmenage, Dyspepsie hyposthénique, Diabète.

**Doses.** — XXV à LXXX gouttes (1 à 3 compte-gouttes pleins) dans un grand verre de boisson au cours de chacun des deux repas.

**Prix :** 24 fr. 40 le flacon pour une durée d'un mois environ.

Laboratoires DAGONNOT — CANNES

## NEUROSINE PRUNIER

(A base de Phospho-Glycérate de Chaux pur,  
Procédé G. Prunier.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant du Système nerveux et tonique général.

**Mode de présentation.** — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

**Indications.** — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Prétuberculose, etc.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café de granulé par jour ; 2 à 3 cachets par jour. Chaque cuillerée à café de granulé et chaque cachet contiennent 0 gr. 30 de Glycéro phosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Le flacon ou la boîte :

Prix en France : 000.

**CHASSAING, LE OOO et Oie**

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

## NEUROSOLÈNE

(Comprimés enrobés)

**Composition :**

Pilules de Méglin.	{	Extrait de Jus- qu'ailame .....	0 gr. 017
		Extrait de Valé- riane .....	0 gr. 017
		Oxyde de Zinc.	0 gr. 017
		Phényl-éthyl-malonylurée ..	0 gr. 010

**Indications.** — Sédatif du système vago-sympathique.

**Posologie :**

Avaler sans croquer.

États nerveux : 2 à 4 comprimés par jour.

Insomnie : 2 à 4 comprimés le soir au coucher.

Prix : 18 fr. 85.

**LABORATOIRES D'ANALYSES  
BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

## NEUROSTHÉNOL

Reconstituant général, neurotonique. Résultats immédiats. Action durable.

**Forme.** — Gouttes.

**Composition.** — Extrait total de substance cérébrale, strychnine, acide orthophosphorique, glycérophosphates titrés de sodium, magnésium, calcium et manganèse.

**Propriétés.** — Tonique rationnel du système neuromusculaire. Modificateur actif des troubles de la nutrition et de l'élimination.

**Indications.** — Toutes les dépressions (physiques, nerveuses, mentales), surmenage, usure, sénilité, convalescences de maladies infectieuses.

Manifestations alcalosiques (phosphaturie, arthritisme). Auto-intoxication, scléroses.

**Posologie.** — *Adultes* : XV à XXX gouttes dans un grand verre de liquide, midi et soir, en mangeant.

Prix : 19 fr. 50

Durée de traitement d'un flacon 12 à 15 jours.

**Laboratoire Marcel RICHARD**

AUBENAS (Ardèche). — Tél. : 2-79.

## NEUROTENSYL

Troubles fonctionnels d'origine sympathico-endocrinienne.

**Présentation.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Chlorhydrate de papavérine, Extrait de gui, Sulfate de spartéine, Extrait de Cratégus, Anémone pulvérisée.

**Indications.** — Troubles sympathiques à la grossesse, à la ménopause, à la puberté, Angoisse, Bouffées congestives, Troubles cardio-vasculaires, Arythmie, Anxiété, Emotivité, Hyperexcitabilité, Tics et spasmes, vertiges.

**Mode d'emploi.** — Prendre, sans croquer, 2 à 3 comprimés avant les principaux repas.

**Laboratoires J.-P. PETIT et C<sup>ie</sup>**

72, boulevard Davout. — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. Diderot : 55-01.)

## NEUROTROPHÈNE

Sérum minéral selon la formule de Ringer rendue injectable.

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. et 10 cc. pour injections hypodermiques.

**Indications.** — Tous états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire. Adynamie. Neurasthénie. États cachectiques. Entérite et gastro-entérite des nourrissons. Asthénies des convalescents. Athrepsie. Grossesse (appauvrissement du sang en Ca pendant la gestation).

**Doses.** — Une à deux injections de 10 cc. par jour. Pour les enfants, on pourra employer l'ampoule de 5 cc.

**Prix.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 19 fr. 90.  
Boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 15 francs.

### Laboratoire de l'ÆTHONE

35, rue Boissonnade — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Danton 92-10.)

## NEUROTROPHOL BYLA

Élixir, Granulé, Dragées.

À base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique et de glycérophosphate de soude.

**Doses et mode d'emploi.** — Élixir : 1 verre à liqueur pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants.

Granulé : 1 cuillerée à bouche pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

Dragées : Adultes, 4 à 8. Enfants, 2 à 4 par jour. Après chaque principal repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition. Indiqué dans les états de fatigue ou d'épuisement, l'anémie, le paludisme, les convalescences, etc.

**Indications.** — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Épuisement, Psychoses génitales, Chlorose.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée.

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Danton 08-11.)

## NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de ..	Thyroïde .....	0 gr. 0025
	Ovaire .....	0 gr. 10
	Ext. valériane stabilisée Dausse...	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives..	Hydrastis .....	0 gr. 10
	Gossypium .....	0 gr. 10
	Viburnum .....	0 gr. 10
	Hamamelis .....	0 gr. 30

**Posologie.** — 1<sup>o</sup> Troubles par hypofonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2<sup>o</sup> Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n<sup>o</sup> 233-1.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>):

## NEUTRACÉTYL

### NEUTRACÉTYL CHOCOLATÉ

acétylsalicylate d'aluminium

0,60 par comprimé ou par tablette chocolatée.

Tous les avantages de l'acide acétylsalicylique.

Aucun de ses inconvénients.

Évite troubles digestifs (gastralgies, algèurs), sueurs, adynamie.

Action régulière et prolongée par élimination lente.

Absorption facile : comprimés sans aucune saveur ; tablettes chocolatées divisibles et aimées des enfants.

Atoxicité aux doses thérapeutiques usuelles.

**Indications.** — Toutes celles de l'aspirine, spécialement chez les enfants, les dyspeptiques, les hyperchlorhydriques, les tuberculeux. Fièvres, grippe, rhumatisme, chorée, algies.

**Posologie.** — 3 à 4 fois par jour, avaler 1 à 3 comprimés ou tablettes chocolatées.

Enfants : 1 à 4 fois par jour : 1/4 (à un an) à 1 (à 12 ans) tablette chocolatée.

**Présentation.** — NEUTRACÉTYL : étui de 12 ou boîte de 40 comprimés.

NEUTRACÉTYL chocolaté : boîte de 12 tablettes.

Laboratoire M. LEFEBVRE

25, boulevard de Latour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 60-77.)

## NEUTROSES-VICHY

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

Sels extraits des eaux du Bassin de Vichy (Deuto-carbonates naturels) ..	0,008
Carbonate de calcium .....	0,27
Carbonate de bismuth .....	0,06
Carbonate de magnésium .....	0,114
Saccharose pure .....	0,55
Essence de menthe Mitcham .....	0,0001

**Forme.** — Comprimés de 1 gramme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de la fonction digestive par excellence.

**Indications.** — Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'hyper et de l'hypo-Chlorhydrie.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 5 comprimés, croqués de préférence, 2 heures après chacun des repas, ou bien au moment où l'on sent un malaise.

*Enfants* : 2 à 3 comprimés.

Laboratoire Médico-Pharmacologique de Vichy

1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier).

## NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets)

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges.

**Indications.** — Grippe — Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques — Rhumatismes — Migraines — Zona.

**Doses et mode d'emploi.** — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : La boîte de 12 cachets, 14 fr. 50.

La boîte de 6 cachets, 7 fr. 50.

Enreg. au Lab. Nat. Cont. sous le n° 955-1.

Laboratoires CORNAUD et BROSSARD

E. CORNAUD, successeur,

Ex-pharmacien Chimiste, en chef de la Marine,  
Licencié ès sciences — Expert des tribunaux.

LA ROCHELLE

Échantillons sur demande des Docteurs.

## NÉVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

**Composition.** — Teinture de Cratægus, Passiflore, Gentiane, Alcoolature de ballote.

**Action.** — L'action bien connue du Cratægus, de la Passiflore et de la Gentiane est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principale sur l'irritabilité neuro-végétative).

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, Incontinence d'urine, etc.

**Doses.** — Action sédative : 80 à 100 gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : 30 à 50 gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## NÉVROSOL

Remède-type de l'élément douleur.

Formule :

Diméthylamino-antipyrine ...	0,30	Carb. de chaux.	0,12
Phénacétine....	0,20	Caféine .....	0,03
Chl. quinine....	0,10	Chl. d'amyleine.	0,003

« Aucun hypnotique. »

**Spécificité.** — Ne provoquant jamais d'hyperchlorhydrie, de nausées, ni de crampes.

*Névrosol*, particulièrement indiqué chez les malades porteurs d'ulcus gastriques ou dont l'estomac est sensible.

**Indications.** — Algies, céphalées, migraines, névralgies, grippe, rhumatisme, goutte, lumbago, sciatique. Douleurs menstruelles.

**Posologie.** — 1 à 3 cachets par jour.

Prescription strictement médicale.

Boîte de 10 cachets : 11 fr. 50 (autorisation 2099).

Laboratoires ROGERMA

19, rue du Sec-Arembault — LILLE (Nord).



## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

**Forme.** — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic ni strychnine ; XX gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie, éléments de constitution et d'entretien des tissus nerveux.

**Dose.** — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

**Propriétés.** — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Neurasthénie, Paralyse générale. Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.  
**N. B.** — Se fait également sous forme d'ampoules.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.

## NÉVROVITAMINE 4

*Spécifique des troubles nerveux de l'Enfance et de l'Adolescence.*

**Composition.** — Association des éléments modificateurs du « terrain » (Vitamine B-1, B-2, D, E, hypophyse), des éléments sédatifs nervins végétaux (salix alba, passiflora incarnata), de la phényléthylmalonylurée, à petite dose.

### Indications :

**Avant 3 ans :** Agitation habituelle nocturne et diurne, spasmodique.

**Après 3 ans :** Onychophagie, Tics, Terreurs nocturnes, Incontinence d'urine, Onanisme, Émotivité, Instabilité, Troubles de la puberté.

**Forme.** — Granulé sucré.

### Posologie :

**Avant 3 ans :** 2 cuillerées à café par jour.

**Après 3 ans :** 3 cuillerées à café par jour (1 cuillerée avant chacun des trois repas).

Prix : 25 fr. 10.

## NÉVROVITAMINE 4-ADULTES

*Équilibrant Vitaminé et Endocrinien du système nerveux.*

**Caractéristiques.** — Aucune toxicité. Pas d'accoutumance. Pas d'accumulation.

**Composition.** — Acide L. ascorbique (Vitamine C), Amide Nicotinique (Vitamine P. P.), Acétate de Tocophérol (Vitamine E), Aneurine (Vitamine B-1), Orchitine, Gardénal, Bromure de Camphre, Extrait de Passiflore, Extrait de Crataegus, Gluconate de Calcium, Gluconate de Magnésium.

**Indications.** — Tous les troubles nerveux chez l'homme et la femme : Insomnies nerveuses, Irritabilité, Hyperémotivité, Neurasthénie, États hypocondriaques, États anxieux, Tics, Troubles nerveux commotionnels, Séquelles de polymyélite, Névralgies, Névrites, Polynévrites, Myélites, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, etc.

**Forme.** — Comprimés.

**Posologie.** — 6 à 8 comprimés par jour, à prendre par 2 à la fois, matin, midi et soir. (Avaler sans croquer, aucun goût.)

Prix : 25 fr. 10.

**Laboratoire D'ACTINO-BIOLOGIE**

LAURENÇON et Cie

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Z. O. : 1, rue Benoît-Sourigues — BAYONNE (B.-P.)

## NICOBION

Vitamine P. P.

### Composition :

Amide nicotinique..... Ampoules. Comprimés.  
10 cg. 5 cg.

### Propriétés :

L'activité impressionnante de l'amide nicotinique se manifeste dans toutes les formes, très variées, de l'avitaminose nicotinique.

Les effets du NICOBION sont rapides, notamment dans les carences se révélant par une symptomatologie digestive, cutanée ou mentale.

Le NICOBION est un facteur essentiel de la croissance. Enfin, il est doué d'un effet tonique, il intervient dans le métabolisme des porphyrines et favorise l'action de certaines chimiothérapies et physiothérapies.

Le NICOBION est dépourvu de toxicité, même après un emploi prolongé.

### Indications et posologie :

Doses fortes : { Maladie des rayons et du radium,  
40 à 80 cg. par jour. { porphyrinuries, pellagre.

Doses moyennes : { Régimes sans viande, grossesse,  
20 à 40 cg. { aphtes, pyorrhée, stomatites,  
par jour. { dyspepsies, colites, rectites, uré-  
trites, vaginites.  
{ Acné, séborrhée et érythème,  
hydroas.  
{ Syndromes dépressifs et confu-  
sionnels, asthénie des hépato-  
biliaires.  
{ Troubles dus aux sulfamides.

Doses faibles : { Troubles de la croissance, affec-  
2 à 10 cg. par jour. { tions digestives de l'enfance.

Boîte de 6 ampoules et flacon de 40 comprimés : 25 fr. 80

### NICOBION ACIDE

Comprimés de 1 cg. d'acide nicotinique utilisés dans la prophylaxie des carences en vitamine P. P.

Adultes : 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 2 comprimés par jour.

Nourrissons : 1 comprimé par jour.

Boîte de 200 comprimés : 25 fr. 80.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — Paris.)

## NIGÉRINE VINCENT

*Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.*

Fixateur par excellence des toxines et alcaloïdes.

Forme. — Poudre ou granulé.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

## NISAMÉLINE TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco (*Aristolochia cymbifera*) et de *Siegesbeckia orientalis* ; à employer *intus* et *extra*.

Action physiologique : à l'intérieur, sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur, sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

**Indications.** — Prurits sans lésions (Prurit sénile, Prurit vulvaire, etc.).

Dermatoses avec prurit (Eczéma, Urticaire, Prurigo, etc.).

Zona.

### Traitement interne :

**Pilules Nisaméline « Trouette-Perret ».**  
2 à 5 pilules à chacun des 2 repas. Prix : 21 fr. 20.

**Sirop Nisaméline « Trouette-Perret ».**  
1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des 2 repas. Prix : 25 francs.

### Traitement externe :

**Poudre Nisaméline « Trouette-Perret ».**  
1/2 flacon ou 1 flacon pour un grand bain.  
1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède pour lotions, compresses, etc. Prix : 21 fr. 20.

**Pommade Nisaméline « Trouette-Perret ».**  
En onctions pour prurits et dermatoses.  
Prix : 13 fr. 50.

### Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## NITIUM-CRAYON

**Composition.** — Bromure de radium suractif, enrichi en rayonnement alpha.

**Présentation.** — Boîte de 1 crayon, dosé à 6 microgrammes de bromure de radium.

**Propriétés.** — Action stimulante sur les leucocytes, les cellules muqueuses et les cellules de revêtement. Analgésique, hémostatique.

**Indications.** — Métrites chroniques, métrites hémorragiques, hémorragies utérines (ménopause, fibromes, etc.).

**Posologie.** — Appliquer un crayon dans le canal cervical. Répéter au besoin 2 ou même 3 fois le traitement en laissant une semaine de repos entre les applications.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

### THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## NORGANGINE

Solution hydro-alcoolique des Glucosides totaux de Rheum officinale, des Glucosides de Matricaria camomilla avec adjonction d'acide salicylique.

**Indications.** — Toutes les inflammations de la bouche et du pharynx.

**Action.** — Utilise les propriétés antiphlogistiques remarquables des Glucosides anthraquinoniques.

Son pouvoir de pénétration lui permet d'agir non seulement en surface, mais dans la profondeur de la muqueuse. Rapidement les phénomènes inflammatoires et leur corollaire, la difficulté de la déglutition, s'atténuent pour disparaître.

**Emploi.** — Une demi-cuillerée à café dans un demi-verre d'eau pour bain de bouche ou gargarisme, badigeonnages ou vaporisations. De préférence toutes les demi-heures.

Prix : 23 fr. 50.

### Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien  
201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64-36.)

## NORMACOL

Mucilage évacuant  
puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

**Action.** — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

**Forme.** — Granulé dragéifié très menu.

**Dose** (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

**Différentes préparations :**

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Normacol et Charbon : Voir CARBOMUCIL.

Prix : Petit modèle : 16 fr. 30.

Grand modèle : 52 fr. 50.

Laboratoires **NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64-36.)

## NORMALAX

produit français

Mucilage Type.  
Régulateur Intestinal.

Non irritant, non toxique, non fermentescible.

**Propriétés.** — Déclenche le péristaltisme par action mécanique, augmente le bol intestinal.

Pas d'accoutumance. Tolérance parfaite pour les intestins les plus délicats.

**Indications.** — Tous les troubles de la fonction intestinale.

**Constipation,** Atonie intestinale.

**Doses moyennes.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas. Avaler, sans mâcher, avec un peu de liquide.

**Enfants :** demi-doses.

**Deux préparations.** — Normalax simple : mucilage pur. — Normalax au Cascara : Mucilage pur + Cascara 2 p. 100.

**Présentation.** — Boîte de 200 gr. : 26 francs.

Laboratoires **Henri SCHÉHADÉ**

9, impasse Thoréton — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NORMOGASTRYL

Tous dyspeptiques, aérophages, petits hépatiques

un comprimé	Bicarbonate de soude.....	0 gr. 60
	Sulfate de soude sec.....	0 gr. 285
effervescent	Phosphate de soude sec.....	0 gr. 195
de 2 gr.	Bromure de sodium desséché.....	0 gr. 25
Excip. citrique. Q. s. pour 1 comprimé effervescent de 2 gr.		

**Particularités.** — Présence de bromure de sodium sédatif de l'aérophagie et de l'état général. Apparition de citrate de soude à la dissolution.

En une solution agréable au goût, le dyspeptique trouve l'activation de ses digestions et la disparition de son aérophagie, s'il la prend avant le repas; une sédation de ses brûlures et malaises s'il la prend après, dans 1/2 verre d'eau, de préférence tiédie.

**Emploi.** — 1 comprimé avant les repas (hyposthéniques, aérophages) ou après ceux-ci (hypersthéniques) dans 1/2 verre d'eau, matin, midi et soir.

**En tous lieux, avec agrément et commodité, un comprimé de Normogastryl est une dose qui réalise une solution de Bourget bromurée citratée.**

Inscrit au Labor. National de Contrôle n° 412-14.

J. OLIVE — 14, rue des Minimes — PARIS

## NORMUCYL

*Granulé.*

**Produit français. Le mucilage de Plombières.**

Mucilage gommeux pur enrobé, ni sucré, ni parfumé. Créé et expérimenté avec succès à Plombières-les-Bains.

**Mode d'action.** — Laxatif doux agissant progressivement grâce à son très grand pouvoir de gonflement. (Il absorbe 40 fois son volume d'eau.) Lubrifie la muqueuse. Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

**Particularité.** — PUR. Ne contient ni phénolphtaléine, ni produits drastiques, ni agar-agar. Ni digestible, ni fermentescible, ni putrescible. Plus encore, il s'oppose à l'alcalinisation trop forte du contenu colique et par suite aux putréfactions intestinales.

**Indications.** — Constipations, fausses diarrhées.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café à chacun des deux principaux repas. Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

### Prix:

La boîte renfermant 150 gr. de granulé : 21 fr. 50.

La boîte renfermant 400 gr. de granulé : 49 fr. 90.

Cette dernière permet un traitement de 30 à 40 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1232-3.

Existe également sous forme de :

**NORMUCYL BELLADONE** (chaque cuillerée à café renferme cinq gouttes de teinture de Belladone). Boîte renfermant 150 gr. granulé.

**NORMUCYL BOURDAINE** (4 p. 100 de Bourdaine). Boîtes renfermant 150 gr. et 400 gr. granulé.

**BOLDOMUCYL** (Boldo, Artichaut, Charbon végétal activé, Normucyl). (*Voir à cette rubrique.*)

**Laboratoires M. CHATRON,**

docteur en pharmacie,

146-150, rue de la République,

MONTLUÇON (Allier).

## NOVALGINE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Phényl-diméthyl-pyrazolone-méthyl-amino-méthane-sulfonate de sodium.

**Propriétés et indications.** — Analgésique, antipyrétique et antirhumatismal. Rhumatisme musculaire, polyarthrites, lumbago, sciatique, névralgies, céphalées. Grippe et affections à *frigore*. Toutes algies.

**Posologie.** — Par voie buccale : 1 à 6 comprimés par jour.

Par voie intramusculaire : 1 à 2 cc., deux à trois fois par jour.

Par voie intraveineuse : 1/2 à 2 cc. une à deux fois par jour.

**Présentation.** — Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50. Boîte de 5 ampoules de 2 cc. (Solution à 50 %.)

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## NOVALIBUT

(ex « HALIBUT »)

Association et concentrations naturelles des vitamines A et D.

Puissant antirachitique biologiquement contrôlé.

**Deux formes.** — Gouttes et pilules (vanillées et chocolâtées).

**Composition.** — Huile naturelle, non irradiée, de foie de poisson *Hippoglossus Hippoglossus* L., présentant des teneurs considérables de vitamines A et D.

**Concentrations.** — 1 gramme d'huile contient : 50 000 U. I. vitamine A ; 6 250 U. I. vitamine D.

**Propriétés.** — Puissant antirachitique par la vitamine D ; puissant anti-infectieux par la vitamine A.

**Indications.** — Rachitisme (traitement spécifique et prophylaxie), tous troubles de l'ossification (ostéomalacie, caries dentaires, etc.), tuberculose, pré-tuberculose, maladies infectieuses (traitement curatif et préventif), déminéralisation dans la grossesse, etc...

Fabrication et vente suspendues provisoirement, faute de matière première de qualité.

Enregistrés au L. N. C. sous les n° 689-30 et 689-31.

**Laboratoire DU GLEFAN**  
348, rue Saint-Honoré — PARIS.

## NOVALIBUT LOCAL LOCALIBUT

*Antiseptique, analgésique, biologique, à base de vitamines A et D naturelles pour traitements externes et locaux.*

**Composition.** — A base d'huile pure d'Hippoglossus Hippoglossus L à très hautes concentrations de vitamines A et D naturellement associées (NOVALIBUT). (*Voir ce mot.*)

**Propriétés.** — Anti-infectieux, analgésique, stimule la réparation des tissus (cutané-muqueux, osseux).

**Indications.** — Traitements externes (Plaies, Brûlures, Ulcères, Affections et Suppurations cutanées, etc.).

**Traitements locaux :** Otorhinolaryngologie (Rhinites, Sinusites, suites d'Otitis et Mastoïdites), Ophtalmologie (Kératites, Blépharites, etc.).

*Fabrication et vente suspendues provisoirement, faute de matière première de qualité.*

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 689-37.

Laboratoire du GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS.  
(Tél. : Opéra 90-85.)

## NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin  
à l'oxyeyanure d'hydrargyre indolores.

**Composition.** — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxyeyanure d'hydrargyre : 1 cgr. ; Novocaïne : 1 cgr. ; Eau distillée : 1 cc.

**Propriétés.** — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

**Indications.** — Accidents syphilitiques.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.  
(Tél. : Littre 26-92.)

## NOVARSÉNOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfocylate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions neutres injectables exclusivement par voie veineuse.

*Indications :*

**Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.**

**Présentations :** Ampoules unitaires de 0 g. 15, 0 g. 30, 0 g. 45, 0 g. 60, 0 g. 75, 0 g. 90. Prix suivant dosage.

**Posologie et mode d'emploi.** — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 g. 15 à 0 g. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le Novarsénobenzol Billon est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## NOVHEPAR

**Indications.** — Anémies, convalescences, Traitement auxiliaire de la tuberculose, Insuffisance hépatique.

**Composition.** — Extrait de foie.

**Forme.**—Ampoules buvables, 3 présentations :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. .... 22 fr.

Anémies, convalescences : adultes.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc. .... 19 fr. 60

Anémies, convalescences : enfants.

Insuffisance hépatique : adultes et enfants.

**Posologie.**

Une ampoule de 10 cc. par jour, dans de l'eau sucrée avant le repas.

Une ou deux ampoules de 3 cc. par jour.

L. GUÉRET, pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).  
(Tél. : Per. 11-01.)

## NOVIGEL

### Traitement mercuriel et ioduré.

Sous les trois formes :

**Élixir** (Prix : 27 francs.

	A bouche.	A entremets.	A café.
Par cuillerée.....	0,006	0,004	0,002
Bi-iodure de Mercure.	0,15	0,10	0,05
Iodure de Potassium..			

Dans un véhicule liquide et aromatisé spécial.

#### Posologie :

**Adultes :** 2 cuillerées à bouche par jour aux repas.

**Enfants, jusqu'à 10 ans :** 2 à 3 cuillerées à café par jour.

De 10 à 18 ans : 2 à 3 cuillerées à entremets par jour.

**Suppositoires** (Prix : 22 fr. 10) :

**Adultes :** Hg. vif. 0,04 par suppositoire.

**Enfants :** Hg. vif. 0,015 par suppositoire.

**Posologie.** — 1 suppositoire le soir au coucher pendant 15 jours.

**Globules** (Prix : 22 fr. 10) : Sulfophénate Hg. : trente milligrammes pour un globule.

**Posologie :** { **Adultes :** 4 à 6 globules par jour.

{ **Enfants** (Au-dessus de 10 ans) : 2 à 4 globules par jour.

**Indications.** — Cure d'impregnation mercurielle entre les séries de piqûres. Traitement de consolidation et d'entretien :

*Hérédo-Syphilis, Dermatoses, Arterio-Sclérose.*

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1660-1.

Laboratoire du NOVIGEL

24, rue de Lesson — ROCHEFORT-SUR-MER (Ch.-Inf.). (Tél. : 1-00.)

## NOVISMUTH

**Composition.** — Sous-nitrate de bismuth pur, très léger, très couvrant, peu chargé en acide nitrique combiné.

**Propriétés.** — Adsorbant, sédatif, protecteur des muqueuses gastriques et intestinales.

**Indications et posologie.** — C'est au médecin traitant seul qu'il appartient de fixer la posologie du Novismuth.

Le Novismuth est en général constipant à faible dose et laxatif à haute dose.

Les indications que nous donnons ci-dessous sont d'ordre général :

**Ulcers gastriques ou duodénaux :** 3 à 10 gr., 1/2 h. avant chaque repas.

**Dyspepsies, Crampes, Aérophagie :** 3 à 5 gr. 3 à 4 fois par jour.

**Colites, Constipation :** 20 gr. par jour, pendant 20 jours le matin à jeun.

**Fermentations et Infections intestinales, Entérites, Helminthiase, Colibacillose :** 3 à 5 gr. au réveil à chacun des principaux repas et le soir au coucher.

Chez les enfants, réduire les doses de moitié ou des 2/3 suivant l'âge.

En cas de selles blanches ou grisâtres, suspendre momentanément la médication.

**Prix :** Novismuth pur, 20 sachets de 10 gr. : 82 fr. 10 (Prix public.)

Novismuth kaoliné, 10 — 10 gr. : 42 fr. 20 —

Novismuth kaoliné, 10 — 10 gr. : 63 fr. 30 —

Novismuth kaoliné, 10 — 10 gr. : 32 fr. 80 —

POINTET & GIRARD.

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 03-29.)

## NOVOBAR MERCK

**Composition.** — Sulfate de baryum chimiquement pur « Merck », fabriqué d'après un procédé spécial.

**Propriétés.** — Produit opaque aux rayons X, absolument dépourvu de toxicité.

**Indications.** — Radiographie du tube digestif, œsophage, estomac et intestin, par remplissage total ou pour l'examen de la muqueuse.

**Avantages.** — Emploi économique, conservation parfaite ; préparation facile, pas de sédimentation de la bouillie ni de formation d'écume, forte opacité, puissant pouvoir adhésif aux parois de la muqueuse, saveur agréable.

**Présentations.** — Dans les pharmacies : en boîtes de 150 gr. ; pour les radiologistes : en vrac par 2 kg., 8 kg. 500 ou 25 kg.

Prix avantageux.

**Posologie.** — Estomac : 150 gr. pour 300 gr. d'eau. Intestin : 3 à 400 gr. pour 750 cc. à 1 litre d'eau.

Consulter la brochure : *Les préparations radiologiques Merck.*

Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques MERCK

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes,  
avec addition de lupulin et de phosphates.  
(Bromure non spécifié.)

Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

**Indications.** — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

**Mode d'emploi et dose.** — Ecraser les tablettes de Novo-Brol dans une tasse d'eau bouillante, pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. Na Br chim. pur desséché 1 gr par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux :* 1/2 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Contenance : 30 tablettes. — Prix : 27 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaures — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Molitor 34-16.)

## NOVOCAÏNE-CORBASIL

« BAYER »

**Composition.** — Solutions injectables de chlorhydrate de Novocaïne additionnées de Corbasil (chlorhydrate de O-dioxyphényl-propanolamine).

**Propriétés et indications.** — Corps chimiquement voisin de l'adrénaline, le Corbasil s'en distingue par un pouvoir vaso-constricteur plus faible. Il n'a pas d'action secondaire sur la circulation et ne provoque pas de chute brusque de la tension artérielle.

**Anesthésique local** pour la petite chirurgie et l'art dentaire chez les cardiaques, les vieillards et les sujets à fonctions circulatoires déficientes.

**Présentation.** — Solutions E à 2 % et M à 4 % en boîtes de 20 et 100 ampoules de 2 cc.

Solutions EE à 2 % et MM à 4 % en boîtes de 20, 100 et 250 cartouches de 1,8 cc. spécialement destinées à être utilisées avec la seringue « Carpuie ».

Solution E à 2 % de Novocaïne additionnée de Corbasil en flacon de 25 cc.

**Produits « BAYER »**

S. A. R. L.

16, rue d'Artois — Paris (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Elysées 79-93.)

## NOVOCAÏNE-SUPRARÉNINE

« BAYER »

**Composition.** — Solutions injectables de chlorhydrate de Novocaïne additionnées d'adrénaline.

**Propriétés et indications.** — Anesthésique local, non irritant et de faible toxicité, universellement apprécié.

Pour la petite chirurgie et l'art dentaire.

**Présentation.** — Solutions E à 2 % et M à 4 % en boîtes de 10, 20 et 100 ampoules de 2 cc.

Solutions AA à 2 % et CC à 4 % en boîtes de 20, 100 et 250 cartouches de 1,8 cc. spécialement destinées à être utilisées avec la seringue « Carpuie ».

Solution A à 0,50 % de NOVOCAÏNE additionnée de SUPRARÉNINE en flacon de 25 cc.

Tube de 10 comprimés A à 0 gr. 125 de NOVOCAÏNE additionnée de SUPRARÉNINE.

**Produits « BAYER »**

S. A. R. L.

16, rue d'Artois — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Elysées 79-93.)

## NOVOCORTEX ISCOVESCO

Extrait de la partie corticale de la glande surrénale  
en gouttes

**Hormones antitoxiques et antiasthéniques.**

**Indications :**

*Toutes les maladies infectieuses.*

*Toutes les convalescences.*

*Toutes les asthénies.*

Hypotension. Troubles végétatifs du système nerveux. Vomissements de la grossesse.

*Aucune contre-indication.*

**Posologie générale.** — XXX gouttes par jour au minimum en deux prises dans un peu d'eau à jeun. Ces doses doivent être augmentées dans les cas graves, afin de permettre l'administration de plus grandes quantités d'hormones corticales.

**Posologie infantile.** — De 2 à 6 ans, X à XX gouttes par jour; — au-dessus de 6 ans : dose normale.

**Laboratoire ISCOVESCO**

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 04-39.)

## NOVOLACTOL DAGUIN

**Forme nouvelle.** — Afin d'assurer un dosage rigoureux, le granulé est remplacé par des comprimés se délayant facilement dans l'eau sucrée.

**Composition.** — Papaine extractive; Citrate de soude; Benzonaphthol.

**Dose :**

**Nourrissons :** 2 à 3 comprimés par jour.

**Enfants 15 mois à 2 ans :** 3 à 4 comprimés.

Et au-dessus, 5 par jour.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons; éruptions cutanées. Intoxication alimentaire.

**Prix :** 14 fr. 95 la boîte.

*Échantillons sur demande aux :*

**Laboratoires DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 32-17.)



## NOVOLAX

**Cholagogue. Laxatif.**

**Rééducateur opothérapique du péristaltisme intestinal.**

**Composition.** — Ferments lactiques du *Leben*, Extrait de glandes intestinales, Extraits biliaires, Extrait de Combretum, Scammonnée, Jusquiame.

**Indications.** — Atonie intestinale liée à une insuffisance hépatique, Colibacillose. (Nos ferments lactiques du *Leben* sont nettement antagonistes de la flore intestinale pathogène et en particulier du colibacille.)

Constipation habituelle par insuffisance de sécrétion glandulaire intestinale. Stase intestinale chronique. Troubles dérivant de la constipation (auto-intoxication digestive).

Rééduque l'intestin sans provoquer d'accoutumance.

**Posologie.** — 2 dragées le soir au potage.

(Augmenter ou diminuer les doses suivant effet produit.) Ne contient pas de belladone.

Adjuvant des cures hydro-minérales.

**Prix:** 15 francs.

Laboratoire des **SPECIALITÉS CABASSON**

**A. GROS-CAVALIER, Pharmacien,**  
183, rue de Rome — MARSEILLE.

## NOVOLUG

**Composition :**

Arrhénal .....	0,002
Hydrargyrophénoldisulfonate de soude. ....	0,042
(Soit 1,5 centigramme Hg métal.)	
Sirop aromatisé à la groseille framboisée. Q. S.	
pour 1 cuillerée à soupe.	

**Indications :**

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

**Posologie :**

Adultes .....	2 cuillerées à soupe.	par jour.
3 à 6 ans .....	2 —	à café —
6 à 14 ans .....	3 —	à café —
14 à 20 ans .....	2 —	à dessert —

(A prendre aux principaux repas.)

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

**Observation importante :**

Goût très agréable. Étiquette discrète.

Les Laboratoires **NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## NOVOPLASMINÉ

**1<sup>o</sup> Dragées à noyau glutinisé**

(En boîte de 3 tubes.)

**Composition.** — *Éléments hémopoïétiques et catalyseurs* (extraits de foie, extrait d'antra pylorique, carotène, vitamine D). — *Éléments reconstituants des hématies* (globinates de fer, de manganèse, de cuivre). L'action des globinates dans le traitement de l'anémie secondaire n'est plus à démontrer, depuis les travaux de G. Fontès et de L. Thivolle. Ils permettent de faire ingérer, en même temps que le fer, le manganèse et le cuivre, le groupement prosthétique de l'hémoglobine « la globine », et par suite de refaire très rapidement les hématies et l'hémoglobine que réclame tout anémique. — *Éléments nerveux* (fluorophosphate de calcium et de magnésium associé à la noix-vomique).

**Indications.** — Anémies graves (Biermer et autres) ; anémies secondaires (grippe, tuberculose, cancer, paludisme, etc.) ; anémies post-hémorragiques, par hémolyse ; anémies de la puberté et de la grossesse ; anémies provoquées par certains traitements (curiethérapie, rentgénéthérapie, bismuthothérapie, chrysothérapie, etc.) ; convalescences, asthénie, surmenage, etc.

**Posologie.** — 1<sup>o</sup> *Adultes* : 2 à 3 le matin ou le midi, et 2 à 3 le soir aux repas. 2<sup>o</sup> *Enfants* : 2 à 3 par jour en 2 ou 3 fois.

**2<sup>o</sup> Solution injectable**  
(en ampoules de 1 cc.)

**Présentation.** — Novoplasmine A (solution faible pour commencer le traitement des adultes et pour les enfants). Novoplasmine B (exclusivement pour les adultes en cours de traitement).

**Composition.** — Complexe nucléino-strychniné associé au chlorhydrate de choline.

**Indications.** — Tuberculose sous toutes ses formes (pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, génitale, abcès froids, lupus, etc.). Une seule contre-indication : la tuberculose pulmonaire en poussée évolutive.

**Action.** — Bactéricide, antitoxique, leucocytochrome. L'action est quelquefois si rapide que l'on est étonné du changement radical qui survient presque brutalement : retour de l'appétit, disparition des troubles gastro-intestinaux, de la toux, de l'insomnie, des sueurs nocturnes, de l'affaiblissement nerveux, augmentation régulière du poids (jusqu'à 1 kilogramme par semaine).

**Doses.** — *Adultes* : de 1/2 cc. de Novoplasmine A à 1 cc. de Novoplasmine B. *Enfants* : ne se servent que de Novoplasmine A. Pour la technique des injections, consulter la notice placée à l'intérieur de chaque boîte. Brochure sur demande.

Laboratoires **LINDEUX**

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

(Tél. : Tremblay 25-33.)

## NOVOSPASMYL

Antispasmodique. Sédatif nerveux.

### Composition :

Extrait de belladone titré .....	0,002
Extrait de jusquiame titré ....	0,01
Phényléthylmalonylurée.....	0,01
Extrait de cratægus stabilisé ...	0,04
Bromhydrate de quinine .....	0,04
pour 1 comprimé dragéifié.	

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels reconnaissant une origine spasmodique ou nerveuse.

**Posologie.** — De 2 à 6 comprimés par jour, à prendre au début des repas, en 2 à 3 fois, avec un peu d'eau.

Avaler sans sucer ni croquer.

**Prix :** 24 fr. 75.

**Laboratoires HENRI FRILLEY**

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NOVOTYOL

**Composition.** — Pommade dont la consistance crémeuse est due à un excipient spécial utilisé pour la première fois en dermatothérapie et qui sert de support aux principes actifs : Chlorophylle, Acide isolinoléique, Vitamines A et D.

**Indications.** — Favorise la cicatrisation, arrête la formation des exsudats, stimule l'épidermisation.

Eczémas aigus ou chroniques, brûlures, engelures, gerçures, crevasses et toutes les irritations du revêtement cutané.

**Mode d'emploi.** — Application en couche épaisse à renouveler toutes les 24 heures.

**Présentation.** — Le tube : 14 fr. 10.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> F. DEBAT**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## NOVURIT

Diurétique mercuriel-purique.

Suppositoires. Ampoules de 1 et 2 cc.

**Composition.** — Sel de sodium de l'allylamidométhoxytriméthylcyclopentane-dicarbone hydroxy-mercure à raison de 0 gr. 10 pour 1 cc. + 0 gr. 05 de Théophylline ; 0 gr. 50 pour un suppositoire.

**Action.** — Diurétique très énergique, rénal et surtout tissulaire, sans toxicité aux doses indiquées. Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Tous les œdèmes, tous les épanchements. Sous ses deux formes : Œdèmes cardiaques, rénaux, etc. Hydrothorax, Pleurésies, Toutes ascites (cirrhotiques ou autres), Stase pulmonaire, Œdèmes postphlébiques, Eczéma aigu, Obésité hydrophile, Hydramnios, Anuries, Réflexes post-opératoires, etc...

Les suppositoires sont spécialement indiqués, chaque fois que l'état du malade demande une thérapeutique active et cependant prudente :

- 1° Au début de l'insuffisance cardiaque, stade pré-œdémateux ;
- 2° En traitement de consolidation, permettant de maintenir un régime hydrique suffisant et d'éviter le recours à la théobromine ;
- 3° Dans les indications mineures : Obésité hydrophile, etc.
- 4° Si les intraveineuses et intramusculaires sont impossibles.

**Contre-indications.** — Glomérulonéphrites, Azotémie élevée, Fièvre élevée, Cachexie, Tendance au collapsus. Pas de suppositoires en cas de diarrhée, rectite, hémorroïdes, fissure anale.

### Posologie :

**Suppositoires :** 1 tous les 3 à 7 jours, deux heures environ après défécation spontanée ou obtenue par purgation douce. Les introduire profondément. Pas de lavement.

**Ampoules :** 2 cc., intraveineuse ou intramusculaire ou dans le liquide d'épanchement (voir notice), mais jamais hypodermique. Laisser au moins 48 heures entre les injections.

**Adjuvants :** Tonicardiaques en cas de décompensation cardiaque. *Chlorammonie* pour renforcer la diurèse : 9 à 12 dragées par jour durant les deux jours qui précèdent chaque administration de Novurit. (Voir annonce.)

### Présentations :

5 ampoules de 1 cc. ; 5 ampoules de 2 cc. ; 5 suppositoires.

**Laboratoire M. LEFEBVRE**

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 60-77.)

## NUCIPHOS

Agent incomparable de la suractivité cellulaire avec phagocytose exaltée entraînant une réparation des tissus, modifiant le terrain d'évolution de toutes affections microbiennes.

Injection indolore pendant et après la piqûre.

**Indications.** — Asthénie, Cachexies de toutes origines, Neurasthénie, Surmenage, Amaigrissement, Prétuberculose, Gripes et Convalescences, Anémie, Suite d'interventions chirurgicales, Anémie sénile.

**Doses.** — Le traitement est de trois séries de 10 piqûres à raison d'une ampoule tous les deux jours avec repos de dix jours entre chaque série.

Prix : 32 fr. 80.

Durée d'une série : 20 jours.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 00-15.)

## NUCLÉARSAN

(Élixir)

Tonique analeptique et puissant reconstituant favorise le métabolisme organique.

**Formule.** — Arrhénal, Acide nucléinique, Formiate de soude, Acide Phosphorique, Glycéro de Soude et de Magnésie, Teintures de Kola et de Damiana dans excipient aromatisé.

**Indications.** — Prétuberculose, Asthénie, Cachexie, Dépression nerveuse, Chlorose, Convalescence, etc.<sup>2</sup>

**Posologie :**

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 21 fr. 70.

**Laboratoire RIOHER, Docteur en Pharmacie**

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

## NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée (Voir *Nucléatol*) avec le méthylarsinate de soude.

*Granulé. Comprimés. Ampoules injectables.*

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesures, 5 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

**Indications.** — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon et 08-55 38-75.)

## NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et de nucléinate de soude.

*Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude et nucléinate de soude. — Injectable : glycérophosphate de soude pur et nucléinate de soude.*

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesure de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

**Indications.** — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## NUCLÉOCARDYL

Traitement des troubles cardio-vasculaires  
par l'ADENOSINE

extraite de muscles d'animaux jeunes.

(Communication à l'Académie de médecine, séance du  
18 janvier 1938 ; communication à la Société de  
Cardiologie Royal, 17 Juillet 1938.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique physiologique à action directe sur l'innervation vasomotrice.

**Trois formes :** Ampoules injectables, gouttes, comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Angor, Coronarite, Asthme cardiaque, Tachycardie, Tachyrythmie, Névroses cardiaques, Refroidissement et Asphyxie des extrémités, Claudication intermittente, Hypertension.

### Posologie :

**Traitement d'attaque :** Ampoules : 1 ou 2 ampoules par jour en injection sous-cutanée ou intramusculaire.  
**Gouttes :** 2, 4 ou 6 prises par jour (chaque prise est de LX gouttes).

**Traitement d'entretien :** 2, 4 ou 6 comprimés par jour

Laboratoire A. DEFFARGE

S. Chenilleau, Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. 91-609.)

## NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Levure de Bière (Vitamines B1, B2), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux, Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

**Posologie.** — *Adultes :* 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

*Enfants :* à partir de huit ans, une cuillerée à café. Prix : 23 fr. 30.

Laboratoire BIOSEDRA

Clément MAHOUT, Pharmacien

60, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 19-13, 19-14.)

## NUTRI-VITA

### Composition :

*Vitamines* (B1, C et D).

*Minéraux* (Calcium et Phosphore dans le rapport Ca/P le plus favorable ; fer, manganèse, magnésium).

*Polypeptides* (Acides aminés essentiels).

*Facteur hémapoïétique* (Moelle osseuse rouge).

### Propriétés thérapeutiques :

Corrige les insuffisances qualitatives de la ration alimentaire actuelle par un apport convenable des « principes nutritifs protecteurs ». Régulateur de la nutrition et du fonctionnement des centres nerveux.

**Recalcifiant. Reconstituant. Hématogène.**

### Indications thérapeutiques :

Préventif et précieux adjuvant curatif des désordres dus aux carences calciques et vitaminiques. Troubles de la croissance. Rachitisme. Anémies et chloroses. États asthéniques et dépressifs. Tuberculoses et pré-tuberculoses. Cachexies. Convalescences. Dérivations de la grossesse et de l'allaitement. Caries dentaires.

### Avantages :

Produit très complet, bien équilibré et d'une grande stabilité. Atoxique, sans contre-indications, sans accoutumance, peut être utilisé d'une façon continue et prolongée.

### Présentation :

Comprimés dragéifiés en tubes de 48. Tablettes en boîtes de 24.

### Posologie et mode d'emploi :

*Comme complément alimentaire :* 1 comprimé au début de chaque repas ou 1 tablette au début du repas du soir.

*Comme agent thérapeutique :* doubler ces doses.

*Enfants :* demi-doses au-dessous de 4 ans.

Le comprimé pouvant être facilement écrasé et incorporé dans l'alimentation s'impose dans l'usage infantile.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 1500-10 et 1500-15,

Laboratoires NUTRI-VITA

24, rue de la Paix — PARIS (II<sup>e</sup>).

## NUTROMALT

Dextro-Maltose.

Sucre nutritif pour le biberon d'après la formule de Soxhlet.

**Composition.** — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H<sub>2</sub>O 2 %. Sucre nutritif peu fermentescible. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

**Forme.** — Poudre soluble dans l'eau chaude.

**Indications.** — Maternise le lait de vache, s'emploie avec profit contre les selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

**Mode d'emploi.** — Une demi-cuillerée à café par biberon (soit 5 grammes environ) pendant les 3 premières semaines, puis une cuillerée à café par biberon (soit 10 grammes environ). Durée de consommation : 10 jours.

Établissements **WANDER**

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## NUXEOL

Élixir physiologique complet.

Tonique, reconstituant, reminéralisant, digestif.

**Composition :**

Juglan Regia, ext. mou...	0.15	Chl. manganèse.....	0.10
Noix de kola, ext. mou...	0.10	Ac. phosphorique off....	0.05
Ec. oranges am., ext. mou.	0.10	Phosphate disodique....	0.05
Noix vomique, ext. sec...	0.007	Excip. généreux aromatisé	100 cc.

**Indications.** — Anémie, Débilité, Convalescence, Pré tuberculose, Tuberculose, Neurasthénie, Inappétence, Dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Tous États asthéniques et atoniques, Maladies de la nutrition.

*Ne contient pas d'arsenic.*

Très bien toléré par les hépatiques et les malades du poulmon.

**Forme.** — Élixir très agréable au goût. 450 cc. environ : 24 francs.

**Posologie.** — 2 à 3 fois par jour, prendre avant les repas.

**Adultes :** une cuillerée à soupe.

**Enfants :** au-dessus de 10 ans, 1 cuillerée à entremets ; de 6 à 10 ans, 1 cuillerée à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

Dépôt général :

Laboratoires **BORDELAIS**,

47, rue Maleret — BORDEAUX.

## OBSOR

(Dragées.)

**Présentation.** — En étui de 50 dragées. (21 fr. 65.)

**Principes actifs.** — Iodure d'amidon, Glandes thyroïdes desséchées, Extrait de fucus, Extrait de Bourdaine.

**Indications.** — Obésité, disparition de la graisse, augmentation des forces sans modification de régime.

**Mode d'emploi.** — Prendre 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-18.

Laboratoires **PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## OCRÉINE GRÉMY

**Composition.** — Corps jaune de l'ovaire pris à l'état frais.

**Formes.** — Pilules = 0,20 de corps jaune frais par pilule. Gouttes = 1 gr. de corps jaune frais pour XX gouttes. Ampoules = 1 gr. de corps jaune frais par ampoule.

**Indications.** — Troubles ovariens d'hypo et d'hyperfonctionnement, Aménorrhées, Hypoménorrhées, Hyperménorrhées, Obésité, Bouffées de chaleur, Migraines ovariennes, Vomissements incoercibles, Avortements à répétition.

**Posologie.** — Pendant les 10 jours qui précèdent les règles : 4 à 6 pilules par jour, ou X à XXX gouttes 2 fois par jour, ou 1 injection intramusculaire par jour.

**Prix.** — Pilules, étui de 50..... 25 fr. 80  
Gouttes, flacon de 20 cc..... 25 fr. 80  
Ampoules, boîte de 8..... 32 fr. 80

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle  
sous le n° 608-56-66.

Laboratoires **GRÉMY**

J. ROY et Cie, Pharmaciens

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 48-43.)

## OCTENSANOL

Solution à 1 p. 10.000 d'alcool octylique primaire.

**Indications.** — Hypertension artérielle et ses conséquences.

**Formes thérapeutiques.** — Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

Boîte de 12 ampoules.

Perles glutinisées, Boîte de 42.

**Posologie.** — 1 ampoule tous les deux jours (série de 12). 3 à 6 perles par jour.

**Bibliographie.** — Clerc, R. Paris, J. Stern, *P. M.*, 25 nov. 33; F. Pezzangora, *C. R. Soc. Biol.* 1935, 119, 1931; M. Loeper, Mougeot et Aubertot, *Presse méd.*, 1934, n° 42, 857.

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

## ODARSOL

Opiat dentifrice antispérochétosique, contenant 0 gr. 50 p. 100 de Sulfo-Tréparsénan, parfumé aux essences de menthe et de badiane.

**Indications.** — Préventif et curatif des infections buccales : Pyorrhée alvéolaire, polyarthrite alvéolo-dentaire, ulcérations buccales, amygdalites, angines de Vincent.

Peut être utilisé journellement pour l'hygiène dentaire.

**Forme.** — Tube de 35 grammes.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## CENOPHOS

Acides hydroéthylène-phosphorique.

Reminéralisation phospho-dolomitique.

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

**Formes.** — Elixir, granulé, gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (Voir *fiche DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physiques et nerveux, cancer, tuberculose.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « DOLOMA ».

Prix et n° Enregistrement L. N. C. M.

La boîte granulé (Cenophos). 22 fr. — L. N. C. M. 216-7.

Le flacon gouttes — 18 fr. 40 — L. N. C. M. 216-8.

— élixir — 24 fr. 40 — L. N. C. M. 216-6.

**Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.**

29, place Bossuet — DIJON.

(Tél. : 16-42.)

## ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré  
achloruré et bromuré  
associé à une solution de Folliculine  
titrée physiologiquement.

Boîte de 15 tablettes.

1 tablette { NaBr..... 1 gramme.  
contient : { Folliculine .... 100 unités internationales

**Mode d'emploi et doses.** — 1 à 2 tablettes 2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre 1 ou 2 tablettes : on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il convient d'absorber le plus chaud possible.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les troubles nerveux accompagnant une dysfonction ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout Ménopause.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-62.

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Archives 91-10.)

## ŒSTROGLANDOL « ROCHE »

Hormone œstrogène titrée biologiquement

Une ampoule ou 1 comprimé ou 1 gramme d'onguent  
= 1.000 unités internationales.

**Indications.** — Tous les troubles dus à une insuffisance ovarienne. Troubles de la Puberté et de la Ménopause, Acné, Prurit vulvaire, Céphalée, Vertiges, Dysménorrhée, Aménorrhée, Hypoplasie génitale, Retard des règles, Ménopause précoce.

**Doses et modes d'emploi :**

Comprimés (flacon de 20) : 1 à 2 par jour.

Ampoules (boîte de 6) : 1 à 2 par jour, deux à trois fois par semaine.

Onguent (tube de 20 g.) : en applications suivies d'un léger massage matin et soir.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les n°s 504-73 (ampoules), 504-74 (comprimés), 504-75 (onguent).

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Archives 91-10)

## ŒSTROMÉNINE MERCK

**Composition.** — 4-4'-Dioxy- $\alpha$ ,  $\beta$ -diéthylstilbène.

**Propriétés.** — Mêmes effets biologiques que la folliculine, mais beaucoup plus active par voie buccale.

**Indications.** — Dysménorrhée, oligoménorrhée, hypoplasie génitale, troubles de la ménopause. Pour arrêter la lactation.

**Présentations.** — Gouttes, flacons de 20 cc.

Tubes de 20 comprimés à 1 mgr.

Ampoules, boîtes de 5 ampoules à 1 mgr.

**Posologie.** — De V à XX gouttes, 2 à 3 fois par jour ou encore 1/2 à 1 comprimé 1 à 2 fois par jour. Commencer le traitement par de très petites doses et les augmenter progressivement. En injections intramusculaires dans l'aménorrhée secondaire et pour prévenir ou arrêter la lactation.

**Laboratoires SANOMEDIA**

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## OKAMINE Simple

Formule N° 2 du D<sup>r</sup> Dani Hervouët :

Glycocolle.....	0 gr. 025
Monométhylglycocolle.....	0 gr. 0175
Monométhyl N Leucine gauche.....	0 gr. 01
Solvant isotonique.....	Q. S. p. 1 cc.

Boîte de 10 ampoules de 2 cc.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

**Indications.** — Toutes tuberculoses courantes. Toute déficience organique. Supprime les vomissements gravidiques.

## OKAMINE Dragées

Glycocolle, 0 gr. 10; Sarcosine, 0 gr. 01; Leucine, 0 gr. 01, pour 1 dragée. En flacon de 40 dragées.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 avant le petit déjeuner.

**Indications.** — Prolongent et renforcent les ampoules. Toute affection broncho-pulmonaire.

Enfants adénopathiques.

## OKAMINE Cystéinée

Formule N° 3 du D<sup>r</sup> Dani Hervouët.

Boîte de 20 ampoules pour 10 injections.

10 ampoules N° 1 de 2 cc.

Okamine simple en solvant spécial.

10 ampoules N° 2 de 1 cc.

Cystéine (0 gr. 05) en solvant spécial.

Le mélange des deux ampoules dans la seringue est neutre.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule tous les deux jours en injection sous-cutanée. — Plus puissante que l'Okamine simple.

**Indications.** — Tuberculoses graves ou rebelles pour traitement tenace.

Laboratoire Contrôle 1997  $\begin{matrix} < 1 \\ & 2 \\ & 3 \end{matrix}$

**Laboratoire d'OXYAMINOTHÉRAPIE**

P. BUGEARD, Pharmacien

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## OLCANFRAL

**Composition.** — Deux formes :

A	B
Capsicum.	
Formol.	Même formule, moins le
Essence d'Eucalyptus.	Capsicum.
Alcool camphré.	
Glycérine.	

### Propriétés :

- A. Antiseptique, antiprurigineux, cicatrisant.  
B. Désodorisant.

### Indications :

- A. Traitement curatif et préventif des engelures ulcérées ou non.  
B. Hyperhydrose et bromhydrose plantaires.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une application matin et soir. Sèche très rapidement.

Prix : 12 fr. 70 le flacon de 30 cc.

**Laboratoires MARTIN**

2, rue du Débarcadère — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie et Calcithérapie par injections de suspension huileuse.

L'Oléochrysinine Lumière est une suspension dans l'huile d'aurothiopropanol sulfonate de calcium, teneur en or 35 p. 100, taux calcique 4,52 p. 100.

L'Oléochrysinine Lumière présente le considérable avantage de n'exercer aucune agression brutale à l'égard du rein et autres émonctoires ou organes, le calcium accroit encore la tolérance.

Une injection intramusculaire tous les 4 ou 5 jours réalise une imprégnation continue. Absorption lente, régulière, acquise totalement en un temps variant entre 96 et 120 heures.

Tuberculose sous ses diverses formes et, au premier chef, Tuberculose pulmonaire.

Dans les Tuberculoses dites externes : cutanées, osseuses, laryngées, ganglionnaires, articulaires, des résultats satisfaisants sont atteints par l'usage de l'Oléochrysinine Lumière.

Rhumatismes et, plus particulièrement, la grande polyarthrite chronique infectieuse.

Maladi s infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'Oléochrysinine Lumière.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse (l'or franchit la barrière méningée).

L'Oléochrysinine Lumière est livrée en ampoules de 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30.

**Laboratoires LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON

## OLÉOCHRYSOS LUMIÈRE

(CH<sub>2</sub> S Au CHO<sub>2</sub> SO<sub>3</sub> Sr)

Suspension dans l'huile

d'Aurothiopropanol-sulfonate de strontium  
Teneur or 47,9 % — Taux du strontium 10,6 %

L'Oléochrysos Lumière est un sel hydro-soluble, à hydrosolubilité restreinte (0,9%) de sel d'or et de strontium en combinaison sulfo-organique. L'Oléochrysos Lumière est totalement absorbé, lentement et avec régularité.

Tuberculose — En particulier, poussées évolutives.  
Rhumatismes et tout particulièrement la grande polyarthrite chronique infectieuse.

Affections des yeux qui s'apparentent au Rhumatisme.  
Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.  
Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis.  
Maladie de Nicolas Favre.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse. L'or franchit la barrière méningée.

L'Oléochrysos Lumière est livré en ampoules dont le dosage est indiqué en Or élément.

Les dosages sont 25 milligrammes, 50 milligrammes et 100 milligrammes d'Or-métal

L'index toxique de l'Oléochrysos Lumière est inférieur à celui de l'Oléochrysinine et à celui de l'Allochrysinine, d'où possibilité d'usage de doses plus élevées qu'avec l'un et l'autre de ces produits.

Pas de contre-indications formelles. Cependant il est préférable de s'abstenir chez les sujets présentant un trouble profond des constantes hématiques, une albuminurie importante, une diarrhée persistante.

**Laboratoires LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON

## OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint, l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec efficacité et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagréation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire. Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagréation.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtell-Guyon, Vals, etc.).

Prix : 19 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Nota. — Pour éviter toutes confusions, prescrire toujours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

**Etablissements SOUDAN**

48, rue d'Alsée — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

Voir également : OLÉOSODINE.



## OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

### Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre .....	0,20
Hexaméthylène tétramine.....	0,25

**Indications.** — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

**Présentation.** — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Traitement pour 10 jours. Prix : 16 fr. 40.

### Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés **CORBIÈRE S. A.**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Carnot 78-11.)

## OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

*Huile d'Éphédra à 1 p. 100 d'éphédrine sans analgésique, ni oléate.*

La moins irritante des huiles éphédrinées. Pour **pulvérisations** nasales contre rhinites, sinusites, rhume des foins, coryzas, surdités catarrhales, céphalées sinusiennes, etc...

Utiliser de préférence l'éphédriseur **BÉRAL**, pulvérisateur de poche, étui métal : 30 fr. 50.

**Prescrire :** OLÉOPHÉDRINE BÉRAL.

Un flacon : 14 fr. 70

### Laboratoire BÉRAL

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## OLÉOSODINE

Oléate de soude Paul Thibault.

**Composition.** — Capsules dosées à 0 gr. 30 d'oléate de soude anhydre, chimiquement pur.

**Propriétés.** — Produit parfaitement toléré par les estomacs digérant mal les corps gras, exaltation de la sécrétion biliaire, désagréation et expulsion des calculs de cholestérine, sédation des phénomènes douloureux.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholestérinémie, Coliques hépatiques.

**Posologie.** — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir, dans un peu d'eau minérale tiède (Vichy, Vals, Châtel-Guyon).

Prix : 19 fr. pour 6 à 8 jours de traitement environ.

### Établissements SOUDAN

48, rue l'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 218-20.

(Voir également **OLÉUCIDASE**.)

## OLÉOVIT

Huile de foie de gadidés naturelle, contenant :

2 000 Unités Internationales Vitamines A.

100 unités internationales Vitamine D par gramme.

Contrôlées par examen spectrographique et spectrophotométrique.

**Indications.** — Tous les troubles de l'ossification, du développement et de la croissance. Lymphatisme, Adénopathies, Rachitisme, Grossesse, Surmenage, Convalescences.

**Présentation.** — Flacons-tubes.

### Posologie :

Nourrissons : II à VI gouttes.

Enfants : X à XXX gouttes.

Adolescents et adultes : 1/2 cuillerée à café par jour.

### Laboratoires FOURNIER Frères

Pierre FOURNIER, Pharmacien,

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## OLÉOVULES

**Ovules gynécologiques de formule entièrement originale.**

**Acide picrasalique :** Nouveau succédané de l'Acide Picrique dépourvu de ses inconvénients (ne colore pas les téguments, ne détermine, même à haute dose longtemps continuée, aucun accident toxique) (M. Marchand, *Thèse Paris*, 1935).

**Rubacrine ou Rouge d'Acridine :** puissant antiseptique, non irritant (S. Lurid, *Thèse Paris*, 1934).

**Sulfostérol :** Composé organique soufré remplaçant l'Ichtyol (inodore et ne tachant pas).

**Avantages.** — Efficacité. Propreté. Fusion parfaite.

**Indications.** — Infections de toute nature des voies génitales inférieures (Blennorrhagie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.) et principalement : Métrites, Cervicites, Ulcérations et érosions du col, Vaginites.

**Posologie.** — 2 à 3 ovules par semaine.

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules : 20 fr. 25.

**Littérature.** — Thèses de G. Donet et de M. Marchand ; Communication à la Société de Gynécologie ; travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thiery, Fuchs, Fayot, de Manet, etc.

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Carnulienne — SAINT-DENIS (Seine). (Tél. : Plaine 13-31.)

## OLFAMIDE

Chimiothérapie Antibactérienne  
du Rhino-Pharynx.

**Formule :**

Paraminophényl-sulfamide...	0,35	p. 100
Isoamylhydrocupréine...	0,05	—
Éphédrine .....	0,75	—
Chlorhydrate d'amyléline...	0,40	—
Émulsion parfumée.....	Q. S.	

**Propriétés physiques :**

La forme ÉMULSION offre l'avantage d'assurer le tapissement prolongé et la désinfection profonde de la muqueuse.

**Indications :**

Coryzas, Rhinites, Adénoïdites, Sinusites, Otites.

**Mode d'emploi :**

V à VI gouttes, en instillation, dans chaque narine, à répéter 4 ou 5 fois par jour.

Prix : 21 francs.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires Roger ROLLAND**

1, rue Nélaton — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 02-42.)

## OLICAL

Combinaison oléocalcaire antiseptique et calmante

**Formule.** — Stéarate de chaux, 3,15 ; Huile de Millepertuis, 7,65 ; Huiles végétales, 40 ; Eau de chaux, 47,65 ; Essences antiseptiques (Essence de Niaouli rectifiée et désaldéhydée, Eucalyptus, Serpolet, Fenouil, Girofle 2).

**Indications thérapeutiques.** — Brûlures, Coups de soleil, Eczéma suintant, Dermites aiguës, Prurits aigus, Prurits vulvaires et autres, Zona, Érythèmes divers.

**Posologie.** — Verser l'Olical sur une gaze stérile. Appliquer directement sur la plaie, recouvrir de coton. Renouveler le pansement toutes les 6 heures.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## OLIPAN

« Tout l'Olivier ».

**Composition.** — Glucosides et principes actifs totaux de l'olivier. (Communication à l'Académie de Médecine du 25 juillet 1939.)

**Indications.** — Hypertension, urémie.

Les indications de l'Olipan s'étendent jusqu'aux cardiorénaux ; son action favorise la diurèse, fait régresser rapidement les œdèmes et, résultat tout à fait remarquable, diminue le taux d'urée sanguine.

Son action se prolonge même après arrêt du traitement.

**Doses et mode d'emploi.** — Le matin, à jeun XX à XXV gouttes. Le soir, quelque temps avant le dîner : XX à XXV gouttes également.

A prendre dans un peu d'eau sucrée ou non, ou dans une infusion (queues de cerises, camomille, verveine, etc.). Médication phytothérapique sans aucune toxicité pouvant être poursuivie un long temps avec de brèves interruptions, sans aucun inconvénient.

Le flacon de 30 cc. : 29 fr. 30.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Molitor 34-16..)

## OLIPHÉDROL

Antiseptique des voies respiratoires, sans Menthol, sans Cocalne.

**Formule :** Ess. Vég. Ant. 4 + Camphre 1 + Ephédrine nat. 0,5 + Siovaline 0,1 + Huile végétale neutre purifiée.

**Indications.** — Coryza, Rhume des Foies, Rhinites, Sinusites, Pré-servation des maladies contagieuses : Grippe, Rougeole.

**Propriétés. Avantages.** — Vaso-constricteur, Sédatif, Antiseptique Sans menthol. Ne contenant que des essences naturelles.

Ne rancit pas. Non irritant, odeur agréable.

### Présentation :

Solution	Flacon de 30 cc. avec comp're-gouttes .....	16 fr. 30
	Flacon de 30 cc. avec pulverisateur.....	28 fr. 05
Capsules, boîte de 24 .....		16 fr. 30

**Mode d'emploi.** — Pulvérisations, Instillations (VI à VIII gouttes ou une capsule) dans chaque narine et plusieurs fois par jour.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments 1170-1.

Pour les personnes à muqueuses très sensibles et chez le nourrisson employer l'Oliphédrol B. B. — Ephédrine 0,3 — adrénaline 0,05 — chloréthane 0,5 — essences 2 — huile quantité suffisante p. 100.

### Laboratoire de l'OLIPHÉDROL

25, Bd. Edgar-Quinet — COLOMBES — (Tél.: Cha. 27-86).

## OLIRICYL

### EX-OLIRICIN

**Composition.** — Chaque comprimé dragéifié contient:

Huile de Ricin saponifiée..	0,025	Bile dépigmentée .....	0,03
Huile d'Olive saponifiée..	0,025	Soufre pur .....	0,02
Belladone pulv. ....	0,015		

**Originalité.** — Utilisation des sels de l'huile de ricin et de l'huile d'olive, actifs sous un faible volume, sans aucun des désagréments des huiles (nausées, renvois, indigestions, etc.). Sans drastiques.

**Posologie.** — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir au moment du coucher.

Commencer par 2 comprimés le soir.

Augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Avaler sans mâcher.

**Indications.** — Toutes les formes de constipation. Stimulant hépatobiliaire sans réactions. Lithiase biliaire. Cholagogue.

**Présentation.** — Tube de 40 comprimés assurant 15 à 20 jours de traitement.

Laboratoire National de Contrôle: n° 1.555-3.

### Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux

22, rue François Bonvin — PARIS (XV). Tél.: Ségur 19-21.

## OLISOL ÉPHÉDRINÉ

Traitement des affections du nez et des voies respiratoires.

**Composition.** — Éphédrine (1 p. 100), Essences antiseptiques végétales, Huile d'olive.

**Formes.** — Liquide et capsules.

**Indications thérapeutiques.** — Rhinites, Sinusites, Coryza, Laryngites, Trachéites.

**Mode d'emploi.** — Instillations et pulvérisations avec l'Olisol liquide. Auto-injections nasales avec les capsules.

### Laboratoires de V. BATTUT

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.



## OLIVÉOL

### Acide oléique β

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants), X à XL gouttes suivant l'âge.

### SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire, se retrouve dans la bile hypersécrétée, dissout le calcul de cholestérine.

Prix : Globules-Gouttes : 16 fr. 20.

Prix : Pilules : 18 fr. 40.

L. N. C. M. : Pilules, 1208-3 ; Globules, 1208-4 ; Gouttes, 1208-2.

### Lab. OLIVÉOL et HÉPATICOL ÉTIÉVANT

L. BORNET, Docteur en pharmacie,

Licencié ès sciences,

5, boul. des Brotteaux — LYON.

## OLIVIASE

**Composition.** — Extrait total liquide sans alcool des feuilles d'olivier (procédé spécial).

**Propriétés.** — Désintoxicant, désagrège et élimine les résidus azotés toxiques de l'organisme, qu'il rajeunit. Action « décrassante » très nette.

**Indications.** — Auto-intoxication, hypertension, Cinquantaine.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude le matin à jeun et le soir au coucher. 3 semaines par mois pendant 3 mois ou plus.

**Laboratoire GMET**

**A. LOROT, Pharmacien**

1, avenue du Lycée-Lakanal — BOURG-LA-REINE (Seine).

(Tél. : Robinson 15-67.)

(Voir : GMET).

## ONCTION ANGELINI

**Curacare**

**Guérison de la Gale même infectée.**

**Sans bains.**

**Sans frotte** — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

**Traitement des maladies rebelles de la peau.**

L'Onction Angelini, à base de soufre et huile de cade, est en usage dans les hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon, Bizerte.

Prix au public : 12 fr. 75.

**Angelini, Pharmacien,**

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous

les commissionnaires et droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

## ONOGO

(Pilules.)

**Présentation.** — En étui de 50 pilules. (23 fr. 90.)

**Principes actifs.** — Extrait de Piper methysticum, Extrait de Buchu, Bi-Carbonate de soude, Salol.

**Indications.** — Affections des voies urinaires, Blennorrhagie, Métrites aiguës et chroniques.

**Mode d'emploi.** — 8 à 10 pilules par jour. Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-28.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## OPOBYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-3.

**Forme.** — Pilules.

**Composition.** — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques. Excitant physiologique du péristaltisme intestinal.

**Indications.** — Hépatites. — Ictères — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 pilules au début ou à la fin des repas.

L'étui de 50 pilules : 17 fr. 50.

**Laboratoires A. BAILLY**

(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30.)

## OPOCALCIUM DU D<sup>r</sup> GUERSANT

Reminéralisation. Polyopothérapie.

**Composition.** — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

**Formes.** — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

**Propriétés thérapeutiques.** — La décalcification et, d'une façon générale, la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

**Indications.** — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 3 à 5 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre. Durée du traitement : minimum 10 jours.

**Opocalcium arsénisé** (avec 1 cc. de méthylarsinate disodique). — Une seule forme : cachets.

*Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**Opocalcium gaisacolé** (avec sulfo-gaisacolate de potasse). — Antisepsie pulmonaire et reminéralisation associées.

*Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**Opocalcium irradié.** — (Voir plus loin.)

**Opoferrine** (avec fer organique et extraits organiques). (Voir notice plus loin.)

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

**Prix.** — Cachets : 20 fr. 10. — Comprimés : 20 fr. 10,

Granulé : 21 fr. 90. — Poudre : 21 fr. 90,

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : Mémilmontant 62-81 et 62-82.)

## OPOCALCIUM IRRADIÉ DU D<sup>r</sup> GUERSANT

**Composition.** — Vitamine D pure cristallisée titrant 40 millions d'unités internationales au gramme, associée au complexe endocrinominéral de l'Opocalcium.

**Formes.** — Cachets, Comprimés, Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Opocalcium irradié assure une reminéralisation intégrale. Il fixe le calcium et le phosphore dans les tissus.

**Indications.** — Rachitisme, Croissance, Carence minérale, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 1 cuillerée à café.

Durée du traitement : minimum 10 jours.

**Prix** : Cachets : 28 fr. 20 ; Comprimés : 28 fr. 20 ; Granulé : 29 fr. 30.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : Mémilmontant 62-81 et 62-82.)

## OPOCALCYL

Composition :

Méthylarsinate de soude .....	10 egr.
Nucléinate de manganèse .....	0,20
Fluorure de calcium .....	0,0025
Glycérophosphate de fer .....	1
Glycérophosphate de chaux .....	2
Phosphate tricalcique .....	2
Inositolphosphate de chaux et magnésie .....	5
Oxyhémoglobine .....	1
Hypophyse .....	0,10
Parathyroïde .....	0,02
Surrénine .....	0,30
Thymus .....	1
Extrait noir vomique .....	5 egr
Extrait cola .....	2
Salicylate de soude .....	2
Vitamine A 250 U .....	1
Vitamine C 250 U .....	1
Ergostérine irradiée 10 000 U .....	1
Excipient .....	Q. S. p. 100 gr. de granulé.

**Présentation.** — Granulé.

**Posologie.** — 2, 3 ou 4 cuillerées à café par jour, loin des repas.

**Indications.** — Asthénie, Déficiences.

Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## OPOCARBYL

Spécifique des infections gastro-intestinales.

**Composition.** — Granulé associant des charbons actifs, Hexaméthylène-Tétramine et Benzoate de Naphtyle à des Extraits opothérapiques (Bile sèche; Entérokinase; Extrait de foie) et à la Vitamine B<sub>1</sub>.

**Propriétés.** — Antiseptique au pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Régulateur des fonctions gastro-intestinales et hépato-biliaires. Ne constipe pas (Benzoate de Naphtyle).

**Remarque.** — La présence de la Vitamine B<sub>1</sub> (facteur d'équilibre neuro-endocrinien) potentialise l'action synergique des différents composants.

**Indications thérapeutiques.** — Affections gastro-intestinales (Dyspepsies, Constipation, Entéro-Colites, Aérophagie). Affections hépato-biliaires (Insuffisances hépatique et biliaire; Cholécystites; Angiocholites; Cholémie; Ictère; Cirrhose). Maladies de la nutrition: Arthritisme, Goutte, Hypercholestérolémie.

**Posologie.** — *Adultes*: 1 à 3 cuillerées à café après les repas (croquer ou délayer dans un peu d'eau).  
*Enfants*: 1/2 dose. Prix: 20 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 2 262-4.

**Laboratoires Charles ROUX.**

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).  
(Tél.: Alésia 12-55.)

## OPOCÈRES : Comprimés friables

(SIMPLE & VITAMINÉ)

A base d'hormones associées au complexe manganoferrique et au phosphore embryonnaire.

Reconstituant biologique général.

Poudre d'orchitine.....	0 gr. 05
— Lobe antérieur de l'hypophyse ...	0 gr. 02
— Surrénale.....	0 gr. 01
— Oxalate de fer.....	0 gr. 04
— Chlorure de manganèse.....	0 gr. 02
— Inositohexaphosphate de calcium et magnésium. Q. S.....	0 gr. 20
Excipient pour un comprimé de.....	0 gr. 20

**Indications.** — Développement tardif, surmenage, convalescence, dépression, neurasthénie, dénutrition, asthénie, anorexie, rachitisme, déminéralisation, déglobulisation.

**Doses et mode d'emploi.** — *Enfants*: 1 demi-comprimé au milieu des deux repas, écrasé dans la confiture.  
*Adolescents*: 1 comprimé. *Adultes*: 2 comprimés.  
A avaler dans une gorgée d'eau ou à prendre délayé dans un peu d'eau sucrée ou boisson habituelle, suivant avis du médecin traitant.

Boîte de 40 comprimés. Prix: 24 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 1315-4 et 1315-6.

## OPOCÈRES : Ampoules buvables

(SIMPLE & VITAMINÉ)

Inositohexaphosphate mixte de calcium et de magnésium.....	0 gr. 50
Extrait orchitique correspondant à 10 fois son poids d'organes frais....	0 gr. 10
Extrait de surrénale correspondant à 10 fois son poids d'organes frais....	0 gr. 025
Extrait de lobe antérieur d'hypophyse correspondant à son poids d'organes frais.....	0 gr. 02
Glycérophosphate de fer.....	0 gr. 02
— de manganèse.....	0 gr. 02
Teinture de noix vomique.....	IV gouttes.
Acide orthophosphorique.....	0 gr. 30

Pour un tube scellé de 5 cc.

La boîte de 10 ampoules: 28 fr. 20.

Une à deux ampoules par jour, au début du repas du matin et de midi, à prendre dans un demi-verre d'eau sucrée.

**Laboratoires de l'AÉROCID**

20, rue de Péetrograd, PARIS (VIII\*). (Europe 52-89.)

R. DERAMBURE, pharmacien.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 1315-5 et 1315-7.

## OPOCHOL

### Médication complète, polyvalente du foie et de la vésicule.

Oléate de soude, bile dépigmentée et décholestérinée, extrait total hépatique, extrait de kinkélibah (*Combretum*), extrait de boldo.

Comprimés glutinisés, dragéifiés, solubles seulement en milieu intestinal.  
Sans drastique.

Médication cholagogue, antilithiasique, régulatrice et d'entretien.

Stimule la cellule hépatique, augmente la chasse biliaire.

Agit doucement, progressivement.

**Indications.** — Toutes affections hépatobiliaires en général et tous troubles avec participation du foie.

**Posologie.** — 2 comprimés midi et soir, au milieu ou à la fin du repas.

**Prix:** Le flacon de 50 comprimés : 20 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 553-4.

**Laboratoire de  
MÉDECINE EXPÉRIMENTALE**

BEAUVAIS (Oise).

## OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

**Composition.** — Extraits embryonnaires, albumoses et sérum hémoépithétique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent spécifique de l'épidermisation.

**Indications.** — Plaies atones, Pertes de substances chirurgicales ou diathésiques, Engelures, Brûlures, Érythèmes, Crevasses du sein, Prurits, Dermatoses.

**Mode d'emploi.** — Application permanente en couche épaisse.

**Présentation.** — Tube de 40 gr. environ.

Prix au public : Le tube : 15 fr. 20.

**Les Laboratoires du Dr Roussel.**

Laboratoires Gobey.

S. A. au capital de 880 000 francs.

R. C. Seine 223.195 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 58-43.)

## OPO-DINITRA

Sans ovaire. Sans thyroïde

*Dinitrophényl-lysine, Lobe antérieur « hypophyse, Extrait hépatique.*

Le *Lobe antérieur d'hypophyse*, par ses hormones adipolytique, gonadotrope et thyrotrope, est une médication synergique de la dinitrophénazine.

L'*Extrait hépatique* réduit les intolérances idiosyncrasiques et facilite le travail du foie si souvent déficient chez les obèses dysendocriniens.

*Opo-Dinitra* est le médicament des obésités d'origine endogène (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause syndrome adiposogénital), *Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine exogène (sédentarité, polyphagie). Voir *Dinitra*.

OBÉSITÉ DE LA MÉNOPAUSE } 1 comprimé par 10 kgs  
OBÉSITÉS ENDOCRINIENNES } de poids corporel.

LASSITUDE MENSTRUUELLE : 2 à 4 comprimés par jour 3 jours avant et pendant les règles.

FRIGIDITÉ GÉNITALE masculine ou féminine, 4 à 6 comprimés par jour.

Société d'Application. Pharmacodynamiques.

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-c0, 43-61, 43-62.)

## OPOFERRINE VITAMINÉE

Thérapeutique anti-anémique.

**Composition.** — Association des Peptonates de fer et de manganèse à l'extrait hépatique (méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

**Action.** — Agent de régénération sanguine; stimulant l'hématopoïèse.

**Indications.** — Anémies de toute nature (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), chlorose, altérations et affections sanguines, déficiences spléno-hépatiques, états post-opératoires, convalescence, surmenage, intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaire, etc...), amaigrissement.

**Forme.** — Granulé.

**Doses journalières.** — Adultes : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. Aucune action toxique.

Prix : 22 fr. 60.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Mémilmontant : 62-81, 62-82.)

## OPO-IODAMÉLIS LOGEAI

**Composition.** — Iodotantin de l'Iodamélis neutre, stable et sans iode libre sous forme d'un extrait sec associé à l'organothérapie masculine ou féminine et présenté sous forme de comprimés glutinisés et enrobés.

**Propriétés.** — Associe les effets stimulants de l'Iodamélis sur le métabolisme général, à l'action compensatrice et régulatrice des extraits endocriniens stabilisés et des hormones; action synergique, douce et progressive par stimulation de l'ensemble du tractus génital.

### DEUX FORMULES

M	{ Iodotantin de l'Iodamélis .....	0 gr. 10
	{ Orchitine.....	0 gr. 10
	{ Ante-hypophyse.....	0 gr. 005

**Indications.** — Obésité, troubles circulatoires, hypertension solitaire de la cinquantaine, insuffisance testiculaire transitoire, impuissance, neurasthénie, retard du développement sexuel chez l'homme, syndrome adipo-génital, adénome prostatique, sénilité, stérilité, troubles vagotoniques ou amphotoniques du système nerveux chez l'homme et chez la femme.

**Doses.** — De 2 à 6 dragées par jour.

F	{ Iodotantin de l'Iodamélis .....	0 gr. 10
	{ Ovaire .....	0 gr. 05
	{ Ante-hypophyse.....	0 gr. 005
	{ Benzoate de dihydro-folliculine ..	40 U. I.

**Indications.** — Retard de puberté, infantilisme utérin, dysendocrinies de la jeune fille et de la femme, dysménorrhées, règles trop espacées, règles traînantes, douleurs menstruelles, stérilité, vaginites, leucorrhées, pertes blanches, menstruations fétides, ménopause, hypertension solitaire de la cinquantaine, troubles vaso-moteurs et bourdonnements d'oreilles, bouffées de chaleur, migraines, obésité, troubles psychiques.

**Doses.** — De 2 à 6 dragées par jour.

Laboratoires JACQUES LOGEAI

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)



## OPONUCLYL

**Synergie opo-organo-minérale (Vitamine D).**  
Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.

**Composition.** — Lipofides spléniques et médullaires, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de fer et de manganèse, *Vitamine D*.

**Indications.** — Amaigrissement, Asthénie, Démonéralisation, Rachitisme, Troubles de la Croissance, Anémie, Convalescence.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.  
*Enfants* : 1 sphérule à chaque repas.  
Prix : 21 fr. 20.

### Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## OPOPHOS

**Composition.** — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie ; Gluconate de calcium ; Phosphates de magnésie, de manganèse ; Protexalate de fer, Splénine, Thymsine, Parathyroïdine.

**Indications.** — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Démonéralisation, Caries dentaires.

**Forme.** — 1° Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique, l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bébés. — 2° Cachets (pour adultes).

**Doses.** — 1° *Bébés* : 1/4 de cuill. à café 2 fois par jour. — 2° *à 5 ans* : 1/2 cuill. à café 2 fois par jour. — 5 à 15 ans : 2 cuill. à café par jour. — 2° *Adultes* : 2 cachets par jour.

Prix : 17 fr. 50.

### Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## OPO-PLASMA

**Composition.** — Extraits de Foie, Rate, Muqueuse gastrique, Pancréas, Rein, Surrénale, Glande mâle, Extrait de Malt et Peptone de muscle (Acides aminés totaux) en Plasma marin synthétique, hypertonique par les facteurs Ca, Mn, Mg, Cu.

**Indications.** — *Maladies chroniques*, déglobulisantes et consomptives : Anémies, Lymphatisme, Rachitisme, Avitaminose, Athrepsie des Nourrissons ; *Tuberculose* dans toutes ses manifestations, rhumatismes chroniques, Paludisme, Cachexies, Néoplasies, etc. *Maladies aiguës toxi-infectieuses ou septicémiques*. Fièvres éruptives, broncho-pneumonies, diphtérie, états typhoïdes et puerpéraux, pyosepticémies chirurgicales, etc... Toutes convalescences.

**Présentation.** — Ampoules buvables (non injectables) de 20 cc.

Prix : 54 fr. 90 la boîte de 10 ampoules.

— 30 fr. 50 — 5 —

(Par voie buccale.)

*Adultes* : 1 à 4 ampoules par jour dans un peu d'eau ordinaire ou gazeuse avant ou loin des repas. *Enfants* : 1 à 2 ampoules suivant l'âge.

(Par voie rectale.)

Mêmes doses étendues d'un volume égal d'eau bouillie tiède ou, mieux, incorporées dans un « goutte à goutte » de sérum physiologique ou glucosé.

L. BÉLIÈRES,

19, rue Drouot — PARIS.

## OPOSLÉRINE VERGELOT

Traitement de l'arthritisme et de l'artério-sclérose par les extraits opothérapiques.

**Composition.** — Extrait ovarique, Extrait orchitique, Peptone iodée, Extrait thyroïdien.

**Propriétés.** — Synergie opothérapique par association d'extraits de glandes génitales au corps thyroïde et à l'iode, agissant sur tous les éléments concourant à la production de l'artério-sclérose. Abaisse le taux du cholestérol sanguin. Abaisse la tension artérielle. Action antiscclérose sur les tissus et les vaisseaux. Augmente la force musculaire.

**Indications.** — Arthritisme, Artério-sclérose, Goutte, Asthme, Hypertension, Rhumatismes chroniques et de la ménopause.

**Présentation et mode d'emploi.** — Dragées : 2 à 4 par jour, avant chaque repas, 20 jours par mois, suspendre et recommencer.

Prix : 20 fr. 80 le tube de 40 dragées.

### Laboratoires Ch. VERGELOT

Docteur en Pharmacie,

163, rue de Flandre — PARIS (19<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 48-22.)

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-1.

## OPO-SIGMAL

Traitement opo-arséno-mercuriel dissimulé.

**Forme.** — Solution en flacon compte-gouttes.

**Composition.** — 40 gouttes représentent :  $\text{HgI}^2$  0,01,  $\text{AsI}^3$  0,01, Glucose 0,10, Extrait de Foie 0,10, d'Hypophyse 0,05, de Surrénales 0,02, de Thyroïde 0,01.

**Indications.** — 1° *Syphilis acquise* (Traitement d'entretien). — 2° *Hérédo-syphilis* (Traitement de base). — 3° *Trophylaxie de l'avortement splénique* (Protection de l'embryon contre l'imprégnation).

**Posologie.** — 1° *Adultes* : 40 gouttes dans un peu de liquide, 2 fois par jour, aux repas. — 2° *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge, 2 fois par jour. — 3° *Nourrissons* : 1 à 2 gouttes 2 fois par jour dans le biberon.

**Avantages.** — Par l'adjonction d'extraits opothérapiques, l'OPO SIGMAL est une préparation originale en rapport avec les travaux récents des pédiatres (V. Hutinel, E. Lesné, etc.) — les glandes semblant plus exposées aux effets de l'infection (V. Hutinel).

Par l'association hydrargyre et arsénic, le traitement donne des résultats sérologiques que l'on n'obtiendrait pas avec une médication exclusivement Arsenicale ou exclusivement Mercurielle (Lacapeyre et Pasteur Valléry-Radot).

La présence du glucose jointe à l'opothérapie hépatique met le foie dans les meilleures conditions de résistance à l'action toxique de l'arsenic (Thèse de Max Vauthey, 1928. Recherches cliniques et expérimentales sur le Foie et sur l'Arsenic).

Sa présentation permet un traitement dissimulé.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Maronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).  
(Tél. : Tremblay 25-33.)

Cachets

OPOSSÉINE

Granulés,

Polyendocrinienne, Polyionisée, Polyminéralisée, Vitaminée. Polyopothérapie, Hémopoïèse, Polyionothérapie, Minéralisation.

**Composition.** — Vitamine D — Parathyroïde — Os — Rate — Thymus — Ions : Phosphore, Calcium, Magnesium, Sodium, Polyglycérophosphates.

**Indications.** — Minéralisation, Hémopoïèse, Déminéralisation, Croissance, Rachitisme. Toutes anémies, Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses, Phosphaturies, Prétuberculose, Tuberculose. Fractures, Grossesse, Dentition, Allaitement. Toutes déficiences organiques ou endocriniennes, Polyopothérapie, Polyionothérapie.

**Recommandation.** — Prière de considérer : OPOSSÉINE granulé comme forme *infantile*, OPOSSÉINE cachets comme forme *adulte*, et de vouloir en conséquence, réserver GRANULÉ OPOSSÉINE aux *bébé*s et tous *jeunes enfants*, CACHETS OPOSSÉINE aux *adultes* et *grands enfants*.

Un cachet correspond à deux cuillerées à café de **granulé**.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 3 cachets par jour. *Adolescence* : 1 à 2 cachets par jour.

*Deuxième enfance* : 2 à 3 cuillerées à café de granulé ou 1 cachet par jour.

*Première enfance* : 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour.

**Action.** — Réalise intensément reminéralisation et hémopoïèse. Favorise la nutrition de la cellule nerveuse et osseuse. Remédie aux spoliations phosphorées et aux carences calciques. Régularise le métabolisme des ions et des stérols. Assure l'équilibre minéral et acido-basique. Supplée à toutes déficiences organiques et endocriniennes.

**Prix** : granulé : 27 fr. 50 ; cachets : 29 fr. 50.

Toutes taxes comprises. Ar. 2099 du 6/2/42. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-3 et 1407-8.

OPOSSÉINE FERRO-ARSÉNIÉE  
(voir : FER-OPOSSÉINE)

Laboratoires OPOS-TOULOUSE

HOMPS, Pharmacien,  
13 et 13 bis, rue Matabiau.  
Tél. : 253-97.)

OPOSTYL

Auxothérapie Opoorinienne des Asthénies.

**Composition.** — Cortico-Surrénale + Arsenic organique, Moelle osseuse + Hypophosphites, Thymus + Magnésium et Rate + Fer.

**Indications.** — Réunit ainsi 4 associations en synergie du sel minéral et de la glande qui le fixe dans l'organisme.

1° Stimule puissamment le pouvoir anti-infectieux et l'hématopoïèse ; 2° rend possible la création de réserves consommables, même sur le terrain peu favorable d'un organisme déprimé ; 3° restaure le tonus nerveux.

Épuisement des réserves, convalescences, épuisement nerveux.

**Formes.** — Dragées, Liqueur.

Posologie et mode d'emploi :

**Liqueur :** 2 à 4 cuillerées à café par jour avant le repas de préférence dans un peu d'eau sucrée.

**Dragées :** 2 à 4 par jour à avaler avant les repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BAZIN

SUCS ORGANIQUES BAZIN

Extraits totaux glycerinés d'organes frais (méthode de Brown-Séquard.)

Simple macération glycerinée suivie d'expression de l'organe frais, ces préparations constituent l'idéal opothérapique. Journallement et uniquement préparés avec des glandes fraîches, il n'entre dans leur fabrication aucun organe frigorifié d'origine américaine.

**Opothérapie simple.** — Suc ovarien, orchitique, thyroïdien, hépatique, pulmonaire, rénal, surrénal, hypophysaire, thymique, para-thyroïdien, pancréatique, cortico-surrénal, gastrique, intestinal, amygdalien, mammaire, placentaire, prostatique, splénique, médullaire, ocrébrine, cardine, ouline, sérum de porc anticolibacillaire, etc.

**Opothérapie associée.** — Suc thyro-ovarien, thyro-orchitique, surrénal-ovarien, surrénal-orchitique, hypophyso-ovarien et orchitique, triglandulaire M. et F., pluriglandulaire M. F. et toutes formules que MM. les médecins voudront bien nous indiquer.

**Mode d'emploi.** — Deux à quatre cuillerées à café dans un peu d'eau pure ou d'eau minérale et suivant avis du médecin.

1 cuillerée à café correspond à 1 gr. d'organe frais.

**Présentation.** — 1° En flacons de 90 cc. au prix de 14 francs les uniglandulaires et 15 fr. 25 les pluriglandulaires ;

2° En ampoules (boîte de 10 ampoules de 10 cc.) au prix de 23 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Laboratoire Spécial BAZIN

Autorisé par l'État après avis favorable de l'Académie de Médecine pour préparation des Extraits organiques.

H. GARRAUD, Pharmacien.

Ancien assistant de la Faculté, Lauréat, Médaille d'or.  
9, cours Victor-Hugo — BORDEAUX (Gironde). Tél. : 927-61.

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond à basse température et présentés en dragées (préparées à froid et permettant une conservation indéfinie) ou en ampoules de 1 et 3 cc.

**Thyroidine :** (0 gr. 10 de corps thyroïde), Obésité. Myxœdème.

**Ouigénine :** (0 gr. 12 d'ovaires), Ménopause naturelle ou artificielle.

**Gastrozymase :** Comprimés effervescents de suc gastrique de porc, Dyspepsies, embarras gastrique.

**Liqueur de la Thyroidine :** 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséchée, Myxœdème infantile.

**Globépal :** Poudre de foie frais.

**Opostyl :** Voir 1/2 page spéciale.

Triglandine :

Thyroidine.....	0 gr. 08	{ Asthénies endocriniennes féminines.
Hypophyse .....	0 gr. 05	
Ovaire .....	0 gr. 10	

Triglandol :

Thyroidine.....	0 gr. 08	{ Asthénies endocriniennes masculines.
Hypophyse .....	0 gr. 05	
Testicule.....	0 gr. 10	

Biliol, Séquardine, Hépatine, Surrénaline, Néphrine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS

## OPOTHÉRAPIE BYLA

Présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE  
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyne deux comprimés concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipode correspondant (procédé breveté).

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° **Les « EXO » BYLA**, sucs totaux inaltérables, préparés par exolyse des organes frais (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° **Les GLANDULESBYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur. *Conservation indéfinie.*

Prescrire : GLANDULES DE SURRENINE BYLA.

**Posologie.** — (4 à 8 par jour.)

4° **Les AMPOULES BYLA** : préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.  
Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.

**Posologie.** — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire  
et panglandulaire.*

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

Concessionnaires des Marques des

**ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>)  
(Tél. : Danton 08-11.)

## OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO — Exolyses — Glandules — Ampoules.

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine... 0.10 Orchitine... 0.60	Infantilisme masculin. Dystrophie des adolescents.
2	Hypophysine... 0.10 Ovarine..... 0.20	Infantilisme féminin, troubles de la ménopause. Syndromes adipo-génitax
3	Orchitine... 0.60 Thyroidine... 0.025	Myxœdème. Infantilisme masculin.
3 bis	Ovarine... 0.20 Surrénine... 0.10	Hypotension et asthénie de la ménopause.
4	Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Hypertension et Troubles de la méno pause naturelle ou opératoire. Obésité
4 bis	Ovarine.... 0.15 Orchitine... 0.30	Carence sexuelle féminine.
5	Surrénine... 0.10 Hypophysine... 0.10	Myasthénies. Insuffisance surrénale Hypotension.
6	Surrénine... 0.10 Thyroidine... 0.025	Retards de croissance. Etats thyroïdiens avec hypotension. Fatigabilité.
7	Hypophysine... 0.10 Thyroidine... 0.025	Infantilisme Obésité. Sénilité précoce.
7 bis	Placentine... 0.25 Mamelline... 0.25	Galactogue.
8	Surrénine... 0.15 Hypophysine... 0.05 Thyroidine... 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Syndrome adipo-génital. Infantilisme.
8 bis	Ovarine..... 0.15 Surrénine... 0.05 Hypophysine... 0.05	Troubles de la puberté et de la méno pause. Syndromes adipo-génitax.
9	Hypophysine... 0.05 Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Retards de la puberté. Troubles de la ménopause et de la puberté. Syndromes adipo-génitax.
9 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine... 0.05 Thyroidine... 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Etats dépressifs avec hypotension.
10	Hypophysine... 0.05 Orchitine... 0.60 Thyroidine... 0.025	Développement tardif. Infantilisme. Syndromes adipo-génitax.
11	Hypophysine... 0.05 Thyroidine... 0.025 Surrénine... 0.05 Orchitine... 0.10	Infantilisme masculin. Syndromes adipo-génitax. Sénilité précoce.
12	Hypophysine... 0.05 Thyroidine... 0.025 Surrénine... 0.05 Ovarine..... 0.10	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la méno pause. Obésité.

14	Splénine....	0.15	Reconstituant général dans toutes les anémies.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine....	0.15	
	S. H. P.		
15	Duodénase..	0.15	Excito-régulateur des diverses sécrétions commandant la digestion duodéno-hépatopancréatique — Troubles du carrefour sous-hépatique. Syndromes digestifs mal définis.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine....	0.15	
	D. F. P.		
16	Hépatine....	0.15	Puissant reconstituant général dans toutes les formes de l'anémie.
	Gastérase..	0.15	
	Splénine....	0.15	
	Surrénine... 0.05		
F. E. R. S.			
Les dosages indiqués sont ceux des CACHETS OPO.			

**Traitement de l'obésité :** Cachets Amaigrissants Byla, n° 21 (sans thyroïde).  
**Traitement de l'oxypuriose :** Glandules n° 20 (gastérase-entéropancréatine-hépatine-bile).

**Posologie :**  
Cachets Opo Byla. 2 à 4 par jour. Exos Byla (suos). 2 à 4 cuill. par jour  
Glandules (dragées). 4 à 8 par jour. Ampoules Byla. 1 tous les 2 jours

**MÉDICATION PANGLANDULAIRE**  
contenant toutes les glandes en proportion normale  
**PANGLANDULAIRES BYLA :** Masculins, Féminins, Infantiles.  
28, av. de l'Observatoire, Paris-14°  
(Tél. : Danton 08-11.)

# OPOTHÉRAPIE CARRION

Les produits opothérapiques CARRION se distribuent en plusieurs catégories :

## I. — Préparations uniglandulaires, pour la vole buccale.

1<sup>re</sup> *Comprimés dragéifiés* de poudres d'organes, dont les principaux répondent aux dosages suivants :

Corps Jaune.....	0,10	Ovaire .....	0,10-0,20
Foie.....	0,50	Parathyroïde .....	0,01
Glande Mammaire.....	0,50	Substance grise.....	0,20
Hypophyse totale .....	0,10	Surrénale totale ....	0,10-0,20
Hypophyse lobe ant.....	0,10	Thymus .....	0,50
Orchitique .....	0,20	Thyroïde....	0,01-0,05-0,10-0,20

La gamme réalisée comporte également des comprimés de cœur, fiel de bœuf, muqueuse gastrique, muqueuse intestinale, moelle osseuse, pancréas, placenta, prostate, rate, rein.

Boîtes plates de 24 comprimés. Prix divers.

**Posologie.** — En général, 2 à 4 comprimés par jour.

2<sup>es</sup> *Cachets*, aux dosages précédents, et à tous autres dosages, sur demande.

Boîtes de 24 cachets. Prix divers.

**POSOLOGIE.** — En général, 2 à 4 cachets par jour.

## II. — Préparations uniglandulaires injectables :

1<sup>re</sup> *Per-Extraits*, obtenus selon une méthode particulière, dosés à 1 gr. d'organe frais par ampoule de 2 cc. et à 2 gr. 50 par ampoule de 5 cc. (sauf Per-Parathyroïdien, à 0,05 p. 1 cc.).

Per-Corps Jaune .....	2 cc.	Per-Ovarien.....	2 cc.
Per-Cortex .....	2 cc.	Per-Parathyroïdien .....	1 cc.
Per-Hépatique ....	2 et 5 cc.	Per-Rénal .....	2 cc.
Per-Hypophyse tot.....	2 cc.	Per-Splénique .....	2 cc.
Per-Hypophyse lobe ant.	2 cc.	Per-Surrénalien.....	2 cc.
Per-Mammaire .....	2 cc.	Per-Thymique ....	2 et 5 cc.
Per-Orchitique .....	2 cc.	Per-Thyroïdien .....	2 cc.

Voir dans ce Dictionnaire : Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Thymique.

Il existe, en outre, des per-extraits de moelle épinière, moelle osseuse, myocarde, pancréas, placenta, prostate, utérus.

La boîte de 6 amp. de 2 cc. : 32 fr. 30; la boîte de 6 amp. de 5 cc. : 52 fr. 40.

**Posologie.** — 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

2<sup>es</sup> *Extraits* dosés à 0,10 de poudre d'organe par ampoule de 2 cc. (sauf Parathyroïde à 0,002 pour 1 cc.).

La boîte de 6 amp. de 2 cc. : 20 fr. 10.

**Posologie.** — 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

3<sup>es</sup> *Extraits de lobe postérieur d'hypophyse*, titré à 2, 5, 10 unités internationales par ampoule. Voir plus loin : Rétropituitine. →

### III. — Préparations pluriglandulaires, pour la voie buccale.

1° *Comprimés dragéifiés*, désignés par les initiales des constituants.

T. O. S. H.	Thyroïde ..	0,02	T. O. S.	Thyroïde ....	0,02
	Ovaire.....	0,10		Ovaire.....	0,10
	Surrénale... 0,10			Surrénale....	0,10
T. A. S. H.	Hypophyse. 0,03		T. S. H.	Thyroïde ....	0,02
	Thyroïde ..	0,02		Surrénale....	0,20
	Orch. (A.).. 0,10			Hypophyse ..	0,05
T. O. H.	Surrénale... 0,10		O. S. H.	Ovaire.....	0,15
	Hypophyse. 0,03			Surrénale....	0,05
	Thyroïde ..	0,02		Hypophyse ..	0,05
S. H.	Ovaire.....	0,10	T. O.	Thyroïde ....	0,03
	Hypophyse. 0,05			Ovaire.....	0,20
	Surrénale... 0,20			Ovaire.....	0,20
T. A.	Thyroïde ..	0,03	O. M.	Ovaire.....	0,20
	Orch. (A.).. 0,20			Mammaire (glande) ..	0,30

En boîtes plates de 24 comprimés. Prix : 26 fr. 90 (T. A. 20 fr. 10).

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour.

2° *Cachets* T. O. S. H. — T. A. S. H. — T. O. H. — S. H. — T. A. — T. O. S. — T. S. H. — O. S. H. — T. O. — O. M.

En boîtes de 24 cachets, mêmes prix et posologie.

3° *Cachets* suivant toute formule mixte, sur ordonnance.

### IV. — Préparations pluriglandulaires injectables.

1° *Extraits injectables* T. O. S. H. — T. A. S. H. — T. O. H. — S. H. — T. A. — T. O. S. — T. S. H. — O. S. H. — T. O. — O. M.

En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. Prix : 26 fr. 90.

2° *Extraits injectables* suivant toute formule mixte sur ordonnance.

### V. — Associations opothérapiques portant une dénomination spéciale, et décrites dans ce Dictionnaire :

**Antasthène** : extraits cérébral et spinal, glycérophosphates divers a et b.

**Evatmine** : extraits surrénal et hypophysaire.

**Hépanème** : extrait concentré de foie, oxalate de fer, phosphate de sodium.

**Pancréatokinase** : extraits pancréatique et duodénal.

**Phlébosine** : extraits thyroïdien, surrénal, hypophysaire, orchitique (ou ovarien) et extraits végétaux.

### VI. — Opothérapie non glandulaire.

**Dyspeptine** : suc gastrique du porc vivant.

**Hémakothyroïdine** : sang d'animaux éthyroïdés.

### Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

## OPOTHÉRAPIE CHOAY

I. **EXTRAITS TOTAUX CHOAY**, poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques égales à celles des pulpes fraîches correspondantes.

**Formes pharmaceutiques.** — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

**Posologie moyenne.** — 4 à 6 par jour.

**Nomenclature et dosage** des produits les plus couramment utilisés.

Cachets et comprimés :	Hépatiques .....	25 et 50 cgr,
	Hypophysaires .....	5 —
	Mammaires .....	25 et 50 —
	Orchitiques (ou Androïques) ..	25 et 50 —
	Ovariens .....	10 à 25 —
	Pancréatiques .....	25 et 50 —
	Spléniques .....	25 et 50 —
	Surrénaux .....	10 et 20 —
	Thymiques .....	25 et 50 —
	Thyroïdiens ..	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

Boîtes de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. **EXTRAITS INJECTABLES CHOAY** : Solutions aqueuses désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

**Formes pharmaceutiques.** — Ampoules de 1 à 5 cc.

**Nomenclature et dosage**, exprimé en organe desséché, des solutions les plus utilisées :

Extrait Hépatique.....	10, 20, 50 cgr.	1 tous les jours
		1 et 10 gr.
— Hypophysaire :		
(lobe antérieur).....	20 cgr.....	1 tous les 2 jours.
(lobe postérieur).....	Voir « Post-Hypophyse Choay »	
Extrait Mammaire.....	20 cgr.....	1 tous les 2 jours.
— Orchitique .....	20 — .....	—
— Ovariens .....	20 — .....	—
— Splénique.....	20 — .....	—
— Surrénal .....	10 — .....	—
— Thymique .....	20 — .....	—
— Thyroïdien .....	10 — .....	—

Boîtes de 6 ampoules.

**OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE** : Voir « SYNCRINES CHOAY »

**Laboratoire CHOAY**

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

# OPOTHÉRAPIE du D<sup>r</sup> FRAYSSE

(Associations)

**THYRODOSE.** — Pastilles chocolatées contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

**Doses.** — Adultes : 2 à 3 pastilles par jour.

**Indications.** — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc. — Trait<sup>t</sup> : 3 sem.

**NEURODOSE.** — Comprimés contenant : orchitine 0,20, substance grise 0,10.

**Doses.** — Adultes : 4 par jour.

**Indications.** — Épuisement nerveux sous toutes ses formes. — Surmenage. — Incontinence d'urine, etc.

Traitement : 15 jours.

**PLACENTODOSE.** — Granulés de Placenta et de mammaire.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Insuffisance lactée. — Flaccidité atrophie des seins, etc.

Traitement : 15 jours.

**SPLENODOSE.** — Comprimés dragéifiés composés de : Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine. — Osséine.

Méthode de Whipple renforcée.

**Doses.** — 4 à 6 par jour.

**Indications.** — Déminéralisation. — Chlorose. — Anémie, etc.

Traitement : 15 jours.

Laboratoires du D<sup>r</sup> FRAYSSE

21, r. de Neuilly — NANTERRE (Seine). (Tél. : 12-88.)

Notices et échantillons sur demande.

(Voir aussi *Folli-Lobine, Révitalose, Hépatoplasmine.*)

# OPOTHÉRAPIE E. VERGELOT

AMPOLASES

**Composition.** — Extraits totaux de glandes fraîches

Par ampoule.

Ampolases	O	Ovaire	.....	1 gr.	
—	G	Testicules	.....	1 —	
—	R	Rate	.....	1 gr. 66	vitaminé,
—	F	Foie	.....	1 gr. 66	vitaminé.
—	T	Thymus	.....	0 gr. 20	
—	Para N	Parathyroïde	.....	0 gr. 005	

**Indications.** — Troubles des fonctions génitales.

Dépression, Déminéralisation, Anémie, Débilité, etc.

**Présentation.** — Ampoules buvables.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 ou 2 ampoules par jour.

**Durée du traitement.** — 12 jours au moins par mois.

Prix : la boîte de 6 ampoules : 25 fr.

OPOLASES

**Composition.**

Opolases	G	Testicules	.....	0,25	Par comprimé.
—	N	Hypophyse lobe antérieur	.....	0,10	
—	M	Glandes mammaires	.....	0,25	
—	O	Ovaires	.....	0,20	
—	OT	Ovaires	.....	0,15	
		Thyroïde	.....	0,005	
		Ovaires	.....	0,10	
—	P	Hypophyse totale	.....	0,05	
		Surrénale totale	.....	0,10	
		Thyroïde	.....	0,01	
		Testicule	.....	0,10	
—	PM	Hypophyse totale	.....	0,02	
		Surrénale totale	.....	0,02	
		Cervelle	.....	0,06	
—	S	Surrénale totale	.....	0,10	
—	T	Thyroïde	.....	0,005	
—	Ttt	Thyroïde	.....	0,0001	
—	Para	Parathyroïde	.....	0,0001	

Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques, dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 à 2 dragées par jour.

Prix : la boîte de 24 dragées, 20 fr.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments.

**Considérations générales.** — Les extraits de glandes sont préparés par les Laboratoires d'Organotechnie situés à proximité des abattoirs de la Villette, où sont recueillies les glandes; elles sont desséchées par le froid et l'air sec, ce qui permet de conserver inaltérés leurs principes actifs et leur confère ainsi une activité remarquable.

Laboratoires Ch. VERGELOT

Docteur en Pharmacie

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 48-22.)

# OPOTHÉRAPIE FOURNIER

LES ENDOCRISINES  
Extraits totaux d'organes frais. — Hormones

TOUTES LES GLANDES  
Prescrire : ORCHITINE FOURNIER, etc...

Cachets dosés en extrait sec. Ampoules dosées en glande fraîche,  
(L'extrait sec représentant 5 fois le poids de la glande fraîche).

Exécution rapide de toutes les Prescriptions magistrales.

## 1<sup>o</sup> GLANDES PRINCIPALES ET SÉCRÉTIONS

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION
<b>FOIE</b> Glande totale	Insuffisances hépatiques. Cirrhoses — Dermatoses. Hémophilie.	Cach. à 0,50 Comp. à 0,30 Amp. de 2 cc. à 1 gr.
<b>*Foie</b> Buvable	Toutes les anémies: Méthode de Whipple pour thérapeu- tique infantile.	Amp. b. de 10 cc. (150 gr. de foie frais) Amp. b. de 2 cc. (30 gr. de foie frais).
<b>BILE</b> ou <b>BILEYL</b> Sels biliaires dépigmentés et décholesté- rines.	Affections biliaires et hépatiques. Cholécystites. — Ictères. Entérocolites. Constipation.	Globules keratinisés.
<b>HYPOPHYSE</b> Glande totale	Hypotension, myocardites, toxi-infections. Syndrome adipo-génital. Neurasthénie-Otosclérose.	Cach. à 0,05, 0,10 et 0,20 Compr. 0,05 et 0,10 Amp. de 2 cc. à 0,25
Lobe antérieur	Retards de la croissance — Obésité Insuffisances ovariennes et génitales. — Ectopie testiculaire. — Énurésie.	Cach. à 0 gr. 05, et 0,10 Comprimés à 0,10 Amp. de 2 cc. à 0,25
Lobe postérieur	Ménorragies et Hémorragies viscérales. — Céphalées. Diabète insipide.	Cachets à 0,10 Tubes de poudre à priser à 0,15
<b>PHYSOCRI- SINE</b> Hormone post-hypo- physaire ocytocique	Inertie utérine. Ménorragies de la délivrance. Ménorragies et Hémorragies viscérales. Diabète insipide. Atonie gastro-intestinale. Hémoptysies des tuberculeux.	Amp. 1 cc. à 5 U. I. (inj. sous-cutanée) Amp. 10 cc. à 5 U. I. (inj. intravein.)
<b>OVAIRE</b> et dérivés Glande totale	Troubles de la ménopause, de la grossesse et de la puberté. Troubles psychiques. Rhumatismes chroniques. Obésité.	Cach. à 0,05 Cach. à 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50. Comp. à 0,10 et 0,20. Amp. 2 cc. à 0,50
Corps jaune (sans folliculine)	Troubles des fonctions menstruelles. — Ménorragies. Stérilité. — Vomissements de la grossesse.	Cach. à 0,05 0,10 et 0,20 Amp. de 2 cc. à 0,50

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION
<b>VIT - E - LUTÉINE</b>	Menaces d'avortement. Avortements à répétition. Troubles de la grossesse. Stérilité féminine. Hyperfolliculinisme.	Comprimés. Ampoules injectables, solution éthéro huileuse indolore
Lipides de Povaire ou MINOVA- RIUM	Hypovarivie. Hémorragies menstruelles. Puberté précoce.	Pilules à 0,15
<b>FOLLI- CULINE</b> et <b>*FOLLIDI- MYL</b>	Hypo-ovaire. Aménorrhées. Oligoménorrhées. Dysménorrhées par hypoplasie ovarienne. Troubles de la ménopause et de la castration. Artérites oblitérantes. Enfants prématurés et atrophiques.	Amp. de 1 cc. en solution huileuse, pour injections intramusculaires. Dosages : 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 (Follidimyl), 50 000 U. I.
<b>PARATHY- ROIDE</b>	Tétanie — Spasmophilie — Ulcus gastrique. Décalkification — Otosclérose Maladie de Parkinson.	Cachets à 1, 2 milligrammes, 0 gr. 01, 0 gr. 02. Comprimés à 1 et 5 milligrammes. Amp. inj. s. dem.
<b>RATE</b> Glande totale	Paludisme. Anémie. Tuberculose.	Cach. à 0,50 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.
<b>SPLÉNO- CRISINES</b> Extraits dé- saubimés de Rate à haute concen- tration	Eczémas. Dermatoses rebelles et prurigineuses. Asthme vrai. Tuberculose.	Amp. de 3 cc. à .15 gr. » — — 30 gr. » — — 60 gr. (inj. intramusc.)
<b>REIN</b>	Néphrites. — Urémie. Albuminurie.	Cachets à 0,25
<b>SURRÉNALE</b> Glande totale	Maladie d'Addison. Choc opératoire. Adynamie des syndromes infectieux malins. Collapsus. — Asthénies. Décalkifications.	Cach. à 0,10 et 0,25 Comp. à 0 gr. 10 Amp. de 2 cc. à 0,50
Cortico-Sur- rénale (exemple d'a- drénaline)	Intoxications. — Adynamies. Hypotension. — Troubles psychiques et Neurasthénie. Choc opératoire. — Alopecies. Vomissements gravidiques.	Cach. à 0,10 et 0,25 Amp. de 2 cc. à 0,50
<b>ADRENA- LINE</b> Hormone surrénale	Asthénie — Hypotensions — Collapsus — Mort apparente. Asthme. Shock anaphylactique.	Flacon de 15 gr. sol. à 1 p. 1 000. Amp. de 1 cc. à 1 p. 1 000.



GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION
<b>TESTICULE</b> ou <b>ORCHITINE</b> Glande totale	Infantilisme génital. Obésité. Troubles sexuels masculins. Neurasthénie sexuelle. Hypertrophie de la prostate. Stérilité.	Cach. à 0,20 et à 0,50  Comp. à 0,30 Amp. de 2 cc. à 0,50
<b>ANTAGONYL</b> Extrait orchitique dissimulé	Médication complémentaire chez la femme - Troubles physiques et psychiques par carence sexuelle. Ozène.	Comp. à 0,33  Amp. de 2 cc. à 1,50
<b>THYMUS</b>	Troubles de la croissance et du dévelop. intellectuel de l'enfant. Ectopie testiculaire. Enurésie.	Cach. à 0,50 Comp. à 0,30 Amp. inject. sur demande.
<b>THYROÏDE</b>	Myxoedème — Obésité — Rhumatismes chroniques. Infantilisme et retards de la puberté. — Athrepsie infantile. — Migraines. Ichtyose. — Séanlité précoce. Dysménorrhées.	Cach. à 1, 2, 5, 20, 25 milligr. à 0,05, 0,10 et 0,20, à 0,25 et 0,50. Compr. à 1 et 5 milligr., à 0,025 et 0,10. Amp. de 2 cc. à 0,025
<b>UTÉRUS</b> ou <b>HORMUTER</b>	Troubles liés à la ménopause oblrurgicale et à l'hypo- généisie utérine. Dysménorrhées essentielles. Douleurs menstruelles. Frigidité féminine. Fibromes utérins.	Comp. à 0,30.  Amp. de 2 cc. à 2 gr.
<b>2° AUTRES GLANDES</b>		
Amygdale Bulbe Cerveau Cervelet Cœur Corps ciliaire Épiphyse	Ganglion grand sympathique Ganglion lymphatique Mamelle Moelle épinière Moelle osseuse Muqueuse gastrique Muqueuse intestinale	Os Pancréas Placenta Poumon Prostate Rein Rétine

Cachets et ampoules injectables sur demande.

## 3° ASSOCIATIONS ENDOCRINIENNES

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION
<b>S. H. A.</b> (sol. inj. : sur- rénale, hypo- physe et adrénaline)	Crises d'asthme.	Ampoules.
<b>PLURI- GLANDU- LAIRES F. et M.</b>	Troubles de la puberté. Déficiences endocriniennes des deux sexes.	Cachets. Comprimés. Ampoules.
<b>Bivalents</b>	<i>O. T. — O. H. — O. S.</i> <i>A. T. — A. H. — A. S.</i> <i>T. H. S. — T. H. O. — T. P. F.</i> <i>T. O. S. — H. O. S. — T. H. A.</i> <i>T. A. S. — H. A. S.</i> <i>E. I. P. F. — H. T. S. O.</i> <i>H. T. S. A.</i>	Cachets Comprimés (associations soulignées).
<b>Trivalents</b>		
<b>Quadriva- lents</b>		
<b>CRINO- STHÉNYL</b>	Asthénies. Convalescences. Déficiences physiques et psychiques.	Comprimés. Amp. inj. Sirop.
<b>Glandes de l'énergie</b>		
<b>CRINO- TENSYL</b>	Hypertension artérielle. Artério sclérose. Troubles circulatoires et spasmes vas- culaires. Troubles de la ménopause et de la cinquan- taine.	Comprimés.
<b>CRINO- MENSTRYL</b>	Aménorrhées. Dysménorrhées. Troubles de la puberté et de la ménopause. Obésité.	Comprimés. Amp. injectables : Hormone gonadotrope et Folliculine séparés.
<b>Régulateur ovarien</b>		

Exécution en Cachets et en Ampoules de toutes les prescriptions  
magistrales sur ordonnance médicale.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet, PARIS (XIIe).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

## OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO

(Lipoides H. I.).

**Définition.** — “Les Lipoides sont les supports ou les enveloppes des hormones spécifiques des organes dont ils sont extraits”.

### Nomenclature :

Extrait ovarien .....	Gynocrinol.
Extrait orchitique.....	Androcrinol.
Extrait de la glande surrénale débar- rassé d'adrénaline .....	Adrénol Total.
Extrait du corps jaune .....	Gynolutéol.
Extrait du cerveau .....	Cérébrocrinol.
Extrait du foie .....	Hépatocrinol.
Extrait de la rate .....	Splénocrinol.
Extrait du cœur .....	Cardiocrinol.
Etc...	

**Présentation.** — Pilules dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique (tube de 60). Ampoules injectables (solution huileuse, neutre, indolore), dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique par ampoule (boîte de 12).

### Mode d'emploi :

**Per os :** Minimum 9 pilules par jour, en trois prises avant chacun des principaux repas.

**Voie injectable :** une injection hypodermique quotidienne ou trihebdomadaire.

### Opothérapie associée.

Ovaire-Hypophyse..... Gynohypophysol.

### AUTRES PRÉPARATIONS

Yo-Androl. } Voir à Yo-Androl.  
Yo-Gynine. }

**OPOPÉDOL** (granulé thyroïdien à l'usage infantile).  
**ANDRO-GOUTTES** fractions hydro et lipo-soluble de la glande orchitique. (Voir à Andro-Gouttes.)

**GYN-O-GOUTTES**, solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la totalité des principes actifs de l'ovaire. (Voir à Gyno-Gouttes.)

**NOVOCORTEK**, extrait de la partie corticale de la glande surrénale en gouttes. (Voir à Novocortex.)

### Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 04-39.)

## OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

Fabrication **LAURIAT** (Procédé breveté).

Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

### FOIE DE VEAU

Cachets de 0 gr. 50

**Dose d'entretien :** 1, 2, 3 cachets par jour.

**Dose maxima :** de 8 à 10 cachets par jour.

**Indications.** — Anémies graves et pernicieuses. Déchéances organiques. Convalescences. Troubles hépatiques.

Boîte de 20 cachets. — Public : 29 fr. 70.

### COMPLEXE F

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'ovaires.....	0,10
— d'hypophyses .....	0,05
— de thymus.....	0,05

**Dose normale :** 1 cachet matin et soir.

**Indications.** — Arriération féminine. Retard des signes de la puberté. Syndromes adipo-génitaux. Faiblesses générales. Surdité, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 29 fr. 70.

### COMPLEXE H

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'orchitine.....	0,10
— d'hypophyses .....	0,05
— de thymus.....	0,05

**Dose normale :** 1 cachet matin et soir.

**Indications.** — Infantilisme masculin. Développement retardé. Syndromes adipo-génitaux. Surdité. Boîte de 20 cachets : Public : 29 fr. 70.

### OVARINE COMPOSÉE

Cachets de 0,10

Poudre d'ovaires .....	0,075
— d'orchitine .....	0,025

**Dose normale :** 1 cachet matin et soir, 5 jours avant la date présumée des règles.

**Indications.** — Insuffisance ovarienne. Ménopause. Troubles menstruels. Règles insuffisantes. Aménorrhée. Dysménorrhées, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 fr. 80.

Exécution de toutes formules sous notre propre marque

## OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

Fabrication LAURIAT (Procédé breveté)  
Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

### RATE

Cachets de 0,35 (Poudre de rate de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 1 cachet matin, midi et soir.

Indications. — Paludisme. Cachexie palustre. Hypertrophie de la rate. Toutes les anémies. Hémorragies utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 fr. 80.

### REINS

Cachets de 0,25 (Poudre de reins de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Accidents urémiques. Insuffisance de l'activité rénale. Néphrites aiguës, infectieuses et toxiques. Brightisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 fr. 80.

### ORCHITINE COMPOSÉE

Cachets de 0,20

Poudre d'orchitine ..... 0,175

Poudre d'ovaires..... 0,025

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir ; 15 jours par mois.

Indications. — Insuffisance organique. Impuissance fonctionnelle. Débilité sénile. Asthénie musculaire et nerveuse. Infantillisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 fr. 80.

### MAMMAIRE

Cachets de 0,40 (mamelles de vaches).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Stimulante de la sécrétion lactée chez les nourrices insuffisantes. Régulatrice d'un fonctionnement utéro-ovarien excessif. Congestions utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 29 fr. 70.

### THYMUS

Cachets de 0,50 (Poudre de thymus de veau).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Maladies de Basedow. Goitre simple. Enfance débile. Troubles de la croissance et de la nutrition.

Boîte de 20 cachets. — Public : 29 fr. 70.

### Laboratoires LAURIAT

31, av. Foch — LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

magistrales (Produits opothérapiques)  
"Isorgane". — Voir à Isorgane.

## OPOTHÉRAPIE MONCOUR

En Sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous les extraits totaux préparés avec des glandes fraîches par dessiccation à froid dans le vide profond.

Dosage. — Suivant les extraits.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

Prix : de 17 à 25 francs l'étui de 30 à 60 sphérulines, suivant les extraits et les dosages.

### NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Opothérapie fraîche préparée de suite au reçu de la prescription médicale, avec des glandes fraîches pour être ingérées fraîches.

Préparations datées.

Tous dosages, organes, associations et nombre de prises formulés.

Formes. — Cachets et glutubes.

Posologie. — Thyroïde et hypophyse, dose moyenne quotidienne de 0 gr. 20 à 0 gr. 30. Pour toutes les autres glandes, la posologie moyenne est de 1 gr. de glande par jour.

### Laboratoires MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

(Tél. : Molitor 01-14.)

## OPOTHÉRAPIQUES « CRINEX-UVÉ »

Pour chaque syndrome, les produits à essayer successivement sont classés selon l'ordre de fréquence de chaque étiologie.

Les produits sont désignés par des initiales :

**A.** : CRINEX OREX (médication Ambohormonale).

**C.** : CRINEX (ovaire).

**F.** : FRÉNOVEX (extrait mammaire, corps jaune).

**FI.** : FLAVEX (corps jaune).

**M.** : MÉTREX (utérus).

**O.** : OREX (testicule).

**P.** : PANPHYSEX (hypophyse totale).

<i>Acné juvénile</i> .....	<b>O.</b>
<i>Anorexie</i> .....	<b>P.</b>
<i>Aménorrhée primitive</i> .....	<b>P. A. C. O. F.</b>
<i>Aménorrhée secondaire</i> .....	<b>C. P. O. A.</b>
<i>Asthénies psychiques et somatiques</i> .....	<b>O. P.</b>
<i>Avortements à répétition</i> .....	<b>FI. F.</b>
<i>Castration</i> .....	<b>A.+M. ou A.+FI.</b>
<i>Cryptorchidie</i> .....	<b>P. O.</b>
<i>Dépression nerveuse</i> .....	<b>O.</b>
<i>Dermatoses (acrocyanoose, érythrocyanoose, eczéma, etc.)</i> ...	<b>O.</b>
<i>Dysménorrhées</i> .....	<b>M. C.</b>
<i>Dysménorrhées rebelles</i> .....	<b>O. A. M.</b>
<i>Engelures</i> .....	<b>O.</b>
<i>Fibromes, polypes (hémorragies des)</i> .....	<b>F. FI.</b>
<i>Frigidité féminine</i> .....	<b>C. P. F.</b>
<i>Hémorragies utérines</i> .....	<b>F. FI.</b>
<i>Hypoplasie utérine</i> .....	<b>M. A.</b>
<i>Hyperfolliculinie (Troubles par)</i> .....	<b>FI. F. O.</b>
<i>Hypergénéralisme</i> .....	<b>O. F.</b>

<i>Hyperhidrose</i> .....	<b>O.</b>
<i>Insuffisance hypophysaire totale ou partielle</i> .....	<b>P.</b>
<i>Maigreux hypophysaire</i> .....	<b>P.</b>
<i>Mastopathies douloureuses</i> ...	<b>O. FI. F.</b>
<i>Menaces d'avortement</i> .....	<b>F. FI.</b>
<i>Méno-métrorragies de la puberté et de la ménopause</i> ...	<b>F. FI.</b>
<i>Ménopause</i> .....	<b>C. A. FI.</b>
<i>Obésité</i> .....	<b>P. O. C.</b>
<i>Oligoménorrhées primaires</i> ...	<b>A. P. M.</b>
<i>Oligoménorrhées secondaires</i> ...	<b>C. O. P.</b>
<i>Ovarite scléro-kystique</i> .....	<b>FI.</b>
<i>Polyménorrhées</i> .....	<b>F. FI.</b>
<i>Prurit vulvaire</i> .....	<b>O.</b>
<i>Puberté (Voir Aménorrhée, Oligoménorrhée primaire)</i> ..	
<i>Retard de développement somatique et psychique</i> .....	<b>P.</b>
<i>Rhumatismes ovariens</i> .....	<b>O. A.</b>
<i>Stérité féminine</i> .....	<b>C. FI. P. O.</b>
<i>Syndrome adiposo-génital</i> ...	<b>PO. PC.</b>
<i>Troubles psycho-génitiaux et neuro-psychiques</i> .....	<b>O. FI.</b>
<i>Troubles (légers) de la glyco-régulation (certains)</i> .....	<b>O. P.</b>
<i>Troubles des métabolismes (eau, graisse, etc.)</i> .....	<b>P.</b>

Pour la posologie et le mode d'emploi, se reporter à :

CRINEX OREX	FLAVEX
CRINEX	MÉTREX
FRÉNOVEX	OREX
	PANPHYSEX

**Laboratoires CRINEX-UVÉ**

1, avenue du Docteur Lannelongue  
PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Alésia 28-51.)

## OPOTONIQUE MERCK

**Composition.** — Extrait de foie, sels solubles de fer, manganèse, cuivre et divers stomachiques.

**Propriétés.** — Élève le nombre de globules rouges et le taux de l'hémoglobine, augmente le poids, stimule l'état psychique et physique.

**Indications.** — Anémies de toutes sortes, asthénie, convalescence, épuisement physique et nerveux, suites de la tuberculose et des maladies infectieuses.

**Présentations.** — Flacons contenant 180 gr. d'un liquide de goût agréable.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 fois par jour, 1 cuillerée à dessert. *Enfants et adolescents* : 3 fois par jour, 1 cuillerée à café, pendant ou après les repas.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-ÉMULSION

### Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1<sup>o</sup> L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar-phthaléinée).

**Indications.** — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas. Prix du flacon : 20 fr. 70.

2<sup>o</sup> L'autre, émoulinante : **Vacuoline-Émulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

**Indications.** — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas. Prix du flacon : 17 fr. 50.

### Laboratoires DECHOSAL

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine). (Tél. : 65.)

## OPO-VEINOGENE

12 ampoules buvables de 3 cc.

A base de *Vigne rouge* et extraits opothérapiques.

Traitement neuro-endocrino-sympathique des Troubles de la Circulation.

Assure l'Équilibre cataménial.

1 ampoule par jour, à jeun, dans un peu d'eau.

La boîte de 12 ampoules buvables : 35 fr. 60

### Laboratoire BIOSEDRA

Clément MAHOUT, pharmacien,

60, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 19-13 et 19-14.)

## OPOZONES LUMIÈRE

Préparation à base de glande fraîche.

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

**Constitution.** — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

**Propriétés.** — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues : 1<sup>o</sup> Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-déssiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale.

Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2<sup>o</sup> Avec rapidité (Inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3<sup>o</sup> La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs. Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparée depuis fort longtemps, demeurent inodores. Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.

**Doses courantes.** — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

**Formuler.** — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON

## OPTALIDON

**Forme et composition.** — *Comprimés dragéifiés* renfermant : Isobutylallyl-malonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

**Suppositoires :** teneur en principes actifs 3 fois plus élevée que pour les dragées.

**Propriétés.** — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats.

**Indications.** — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

**Posologie.** — De 2 à 6 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 3 dragées 1/2 heure avant le coucher.

**Suppositoires :** 1 à 3 par jour.

**Enfants :** 1 à 3 dragées ou 1/2 à 1 suppositoire par jour, à partir de 5 ans.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## OPTICURA BENGUÉ

### Composition :

Alcool à 90°.....	3 gr. 75
Sulfate de zinc.....	0 gr. 45
Novocaïne.....	0 gr. 30

Pour 100 grammes.

**Indications.** — Collyre en flacon compte-gouttes, de conception spéciale. Le liquide ne peut être ni altéré, ni souillé : pas de contact de compte-gouttes ni atmosphérique. Conjonctivite, Blépharite, Larmoiement, Fatigue oculaire produite par le travail à la lumière, par le soleil, par les poussières, par le vent.

**Forme.** — Flacon compte-gouttes. Les gouttes sont obtenues par la dilatation de l'air dans le flacon, sous l'influence de la chaleur de la main.

**Posologie.** — Une goutte dans chaque œil deux ou trois fois par jour.

**Prix :** 15 fr. 80. — L. N. C. M., n° 516-6.

**Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils**  
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trin. 85-60.)

## OPTIPLASTE

**Composition.** — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

**Forme.** — Occlusive ou perforée, en rouleaux de :  
1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ;  
5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de largé.

**Avantages.** — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

**Indications.** — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>, S. à. r. l.**  
VIBRAYE (Sarthe).

Agence à PARIS :  
104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 92-52.)

## OPTRAEX (Bain oculaire).

**Composition.** — Extraits végétaux : Hamamelis, borates, etc...

**Propriétés.** — Décongestif, antiseptique léger, vaso-constricteur, régulateur circulatoire. Sans aucun toxique.

**Indications.** — Inflammation de la conjonctive et des paupières. Surmenage oculaire. Préventif pendant les maladies infectieuses.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 3 bains par jour, selon les cas, en utilisant l'ocillère fournie avec le flacon. Durée de chaque bain : une minute environ.

**Prix.** — Le flacon ordinaire : 15 fr. 50 ;  
Impôt compris.

**Laboratoires FAMEL**  
16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## ORARGOL-AMICROS

Complexe colloïdal électrique ou et argent.  
Anti-infectieux général.

### 1° ORARGOL INJECTABLE (0,05 p. 100).

Boîte de 6 ampoules de 5 cc.  
Tube de 1 ampoule de 10 cc.

**Indications.** — Septicémies, Grippe, Fièvres. Traitement pré et post-opératoire.

**Posologie.** — 5 à 20 cc. intramusculaires ou intraveineux, tous les jours ou tous les 2 jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. Dès le début d'une infection, seul ou combiné à la vaccino ou sérothérapie.

### 2° ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 p. 100).

Voir Gouttes d'Orargol, Rhino-Orargol.

## COLLYRE-ORARGOL

Solution isotonique à 0,2 p. 100.

Boîte de 4 ampoules ou flacons compte-gouttes : 17 francs.  
Toutes les indications de l'Argent colloïdal en ophtalmologie.

Laboratoire AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS.

## ORCALCINE

(Granulé)

Régénérateur complet du sang et recalcfiant intégral. Véritable régénérateur organique. Résultats cliniques remarquablement constants et durables.

**Composition.** — Extraits hépatiques et spléniques concentrés.

+ Fer, Phosphore, Calcium.  
+ Chlorophylle et Carotène. Vitamines A et B.  
+ Sels d'or à dose homéopathique.

### Posologie :

Enfants : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Adultes : 2 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix : 23 fr. 20.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Dépôt à Paris : 2, rue Jobbé-Duval (XV<sup>e</sup>).

Laboratoires de l'Orcalcine

E. FOCHE, Pharmacien,

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

## OREX

**Médication orchitique à formule dissimulée pour prescription chez la femme ou chez l'homme.**

**Composition.** — Extrait orchitique total standardisé (procédé Biosymplex), contient toutes les hormones du testicule.

**Gouttes :** Solution hydro-alcoolique, 1 cc. (40 gouttes) correspond à 2 gr. de glande.

**Dragées à croquer :** 1 dragée = 5 gouttes.

**Ampoules injectables :** Solution aqueuse isotonique, indolore. 1 cc. correspond à 2 gr. de glande.

### Mode d'action :

Chez la femme, il rétablit l'équilibre ambocrinien, freine l'hypersécrétion folliculaire.

Chez l'homme, stimule ou remplace la sécrétion orchitique déficiente.

Dans les deux sexes, exerce un effet tonique sur le psychisme ; régularise les métabolismes.

### Indications :

**Chez la femme.** — Certains troubles menstruels ou généraux par déséquilibre ambocrinien, rebelles à l'opothérapie homologue ; Hyperfolliculinie, certaines Aménorrhées, Stérilité, Mastite chronique, Ménopause, Castration, etc...

**Troubles cutanés et trophiques d'origine génitale :** Prurit vulvaire, Eczéma, Acné, Engelures, Acrocyanose, Hyperhidrose, Livedo, etc...

**Troubles psychiques d'origine génitale :** Irritabilité, Insomnies, Perte de mémoire, Sénilité précoce, Psychasthénie, Nymphomanie, Troubles psycho-sexuels (célibat de fait).

**Chez l'homme.** — Retard intellectuel, Psychasthénie, Surmenage nerveux et intellectuel, Sénilité précoce, Hypertrophie de la prostate.

### Posologie :

**Gouttes :** Doses moyennes quotidiennes : 20 à 50 gouttes (hommes) ; 20 à 30 gouttes (femmes), en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas, dans un peu d'eau.

**Dragées :** 4 à 10 (hommes), 4 à 6 (femmes) par jour, croquer et non avaler.

**Ampoules injectables :** Tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter une ampoule seule ou associée à l'autohémothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-4.

### Prix :

Gouttes ou dragées ..... 21 fr.  
Boîte de 6 ampoules ..... 36 fr. 50

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Alésia 28-51.)

## OREXYL

**Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants, ranime l'appétit.**

**Composition.** — Persulfates alcalins, métavanadate de soude, fluorure de sodium, tannate d'orexine, glycérophosphate de chaux.

**Formes.** — Granulé et comprimés.

**Indications.** — L'Orexyll est indiqué dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme : Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenages, physique ou intellectuel, Fractures, Convalescences.

**Posologie.** — *Enfants* : Une cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, quelques instants avant les deux principaux repas, ou un comprimé. *Adultes* : Une cuillerée à soupe de granulé, ou deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chaque repas.

**Prix** : Le flac., granulé : 23 fr. 50, 15 j. de trait. p. enfants comprimés : 27 francs, 15 j. de trait. p. adultes.

L. N. C. M. N° 714-16.

Paul PHILIPPE

Docteur en Médecine — Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.  
5, rue Mazard — LYON (Rhône). — (Tél.: Franklin 76-20.)

## ORGADYNE

Synergie opothérapique équilibrée complexe : rate, moelle rouge, enterokinase, hypophyse totale, thyroïde, épiphyse à doses excitatrices faibles, suivant les travaux de Zondek.

**indications thérapeutiques.** — Asthénies, Anémies, Déséquilibre et, en général, toutes déficiences, quelles qu'en soient les causes. Aucune contre-indication. Le traitement peut s'appliquer aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

D'autre part, l'action d'ORGADYNE est rendue certaine par les catalyseurs biochimiques qu'elle comporte et qui mettent l'organisme en état de réagir immédiatement.

**Présentation.** — Boîte de 20 cachets.

**Posologie.** — 1 cachet midi et soir pendant 8 jours. Arrêt 8 jours et reprise du traitement.

Laboratoires du

COMPTOIR GÉNÉRAL PHARMACEUTIQUE

J. MAUNAND, Docteur en pharmacie,  
146, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél.: Archives 15-85.)

## ORGANESIUM

Médication stimulante — Tonique — Réparatrice — Association Opo-minérale.

**Forme** : Granulé de goût agréable.

**Formule** :

Lobe antérieur hypophyse.....	0, 15
Extrait de glandes orbitiques.....	1, 20
Extrait de glande intersilliale.....	0, 40
Inosito-hexaphosphate de magnésium et de calcium.....	3, 00
Nucléinate de magnésium.....	0, 125

Excipient, Q. s. pour 100 gr.

**Action et indications thérapeutiques.**

1<sup>o</sup> Action stimulante sur l'état général. — Anémies, convalescences, états dépressifs, surmenage physique.

2<sup>o</sup> Action tonique sur le système nerveux et neuro-musculaire. — Troubles nerveux, asthénie, fati ue cérébrale et certains phénomènes séniles, tremblements, crampes, contractures.

3<sup>o</sup> Action reminéralisante et fixatrice du calcium. — Croissance, rachitisme, convalescence des maladies infectieuses.

**Doses :**

*Enfants.* — 1 cuillerée à café.

*Adultes.* — 1 cuillerée à soupe avant les deux principaux repas.

**Mode d'emploi.** — Mettre directement la cuillerée de granulé dans la bouche en une ou plusieurs reprises, avaler ensuite une gorgée d'eau.

Grossistes dépositaires : O. G. P. et C. N. P. F.

Laboratoires DOUETTEAU Frères  
20, faubourg Saint-Honoré — PARIS

## ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINÉ

**Opothérapie stimulante.**

Granulé de Calcium soluble et Phosphore organiques associés à une synergie glandulaire et aux vitamines A, B et D. Assimilable par voie gastrique. Association médicamenteuse très active, répondant aux plus récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

**Indications.** — Déficiences glandulaires, neurasthénie, pré-carcènes (troubles entériques, asthénie, anémie), Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la croissance. Toutes déminéralisations, convalescence, surmenage, débilité, Grossesse, allaitement, Tuberculose, Rhumatisme chronique, Aérophagie.

**Posologie.** — *Nourrissons* : 1/2 cuillerée à café par jour; *enfants* de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café; de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café; *adultes* : 3 cuillerées à dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine, ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 25 francs. (Durée minimum 10 jours.)

Laboratoire National de Contrôle : 196-3.

Laboratoires du VIOPHAN

44, Grande-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.). Tél. 506.



## ORGANI-CALCION SIMPLE

(Gluconate de Ca).

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium (saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique, les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique, coagulant. Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale, pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (œdème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire, rhume des foins, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

Boîtes de 30 cachets dosés à 0 gr. 50 (2 à 10 par jour).  
Prix : 18 fr. 70.

Forme injectable :

Boîtes de 5 ampoules 5 cc. : 16 fr. 30.

Laboratoire National de Contrôle : 196-4 et 5.

Laboratoires du VIOPHAN

44, Grande-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.). Tél. 506.

## ORGANOTIOL S. S.

Soufre naturel organique non oxydé.

Dérivé Thiophénique naturel soluble dans l'eau. En gouttes ou en injections.

**Composition.** — Le Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de soude est un Soufre vital fossilisé extrait de dépôts organiques riches en Plancotons. Ce Soufre se présente sous la forme Thiophénique naturelle, c'est-à-dire la plus apte à l'absorption par l'organisme.

L'Organotiol est atoxique, sans choc et parfaitement assimilable. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Les Carences soufrées. Rhumatismes aigus et chroniques, Catarrhes oto-rhino-trachéo-bronchiques, Bronchorrhées, Bronchites chroniques desarthritiques, Dilatation des bronches, Ictères infectieux, Surrénalites, Diathèses colloïdo-clasiques, Accumulations métalliques Hg, Bi, As, Acnés, Eczémas, Psoriasis.

**Formes.** — L'Organotiol S. S. existe sous trois formes :

### 1<sup>re</sup> Forme gouttes.

Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de soude.....	13 gr. 33
Essence d'orange.....	1 gr. 65
Alcool à 95°.....	8 cc.
Eau distillée, Q. S. P.....	100 gr.

**Posologie.** — XL gouttes d'Organotiol S. S. contiennent 0 gr. 9 de Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de soude, soit 0 gr. 09 de Soufre naturel organique non oxydé.

Adultes : prendre avant les 2 repas XXV à XL gouttes dans un verre d'eau sucrée.

Enfants : demi-dose.

### 2<sup>de</sup> Forme sous-cutanée profonde.

Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de soude.....	0 gr. 20
Glucose desséché.....	0 gr. 20
Eau bi-distillée, Q. S. P.....	5 cc.

**Posologie.** — Une ampoule de 5 cc. par jour en injections sous-cutanées profondes indolores.

Enfants : demi-dose.

### 3<sup>de</sup> Forme intraveineuse.

Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de soude.....	0 gr. 30
Glucose.....	0 gr. 30
Eau bi-distillée, Q. S. P.....	10 cc.

**Posologie.** — Injection lente d'une ampoule de 10 cc. tous les 2 jours.

Prix en France :

Organotiol S. S. en gouttes. Le flacon.....	25 fr. 80
6 ampoules de 5 cc.....	26 fr. 90
6 ampoules de 10 cc.....	35 fr. 60

Laboratoires de Spécialités scientifiques LOGEALS

Produits Pharmaceutiques LOGEALS

J. GOBERT, Pharmacien.

22 bis et 24, rue de Sully — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : Molitor 39-50.)

## ORIGANYL

Médication phytothérapique.

Spécifique de la COQUELUCHE et des TOUX REBELLES.

**Composition.** — *Origanum glandulosum* et *Origanum floribundum*.

**Propriétés.** — Antispasmodique (action vagotonisante). Fluidificateur bronchique. Antiseptique puissant et décongestionnant. Diurétique et Sudorifique.

**Avantages.** — Action immédiate, saveur agréable, aucune toxicité. Ne détermine ni dyspnée, ni stase pulmonaire.

**Indications.** — Coqueluche. Toux spasmodiques rebelles. Toux dites nerveuses des trachéites, bronchites, trachéo-bronchites, etc.

### Formes :

- 1° Sirop : Adultes, Enfants jusqu'à 1 an.
- 2° Gouttes : Adultes (C gouttes = 1 cuillerée à soupe). Enfants. Nourrissons.

### Posologie :

**Adultes :** 4 à 5 cuillerées à soupe par jour.  
C gouttes 4 à 5 fois par jour.

**Enfants :** 10 ans et plus, 4 à 5 cuillerées à dessert par jour; L gouttes 4 à 5 fois par jour.  
Moins de 10 ans, selon âge, par gouttes ou par cuillerées à café.

**Nourrissons :** 2 gouttes par mois d'âge, 4 à 5 fois par jour.

**Prix :** sirop ou gouttes..... 18 fr. 20

**G. ROUX, Docteur en pharmacie,**

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).  
(Tél. : Alésia 12-55.)

## ORTÉDRINE

Sulfate de phényl 1-amino 2-propane.

*Composé organique stimulant l'activité du système orthosympathique et du système nerveux central.*

**Indications.** — **Dépresseurs physiques et psychiques.** Maladies de Parkinson post-encéphalitique, Narcolepsies, Hypersomnies.

**Présentation et posologie.** — Tubes de 20 comprimés dosés à 0 g. 005 (divisibles en deux). Posologie variable suivant les sujets. Posologie variable suivant les cas. Commencer par 1 comprimé et augmenter, au besoin, par 1/2 comprimé, la dose totale journalière étant généralement comprise entre 1 et 3 comprimés.

L'Ortédrine doit être absorbée de préférence le matin.

**Prix de vente :** Le tube de 20 comprimés, 14 fr. Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## ORTHOCYNOL

### Dragées.

Médication de stimulation hépato-spléno-rénale à base de *Cynara*, d'*Orthosiphon*, d'*acide ascorbique* (Vitamine C) et de *Quinquina*.

**Propriétés.** — Sollicite les sécrétions hépato-biliaires, Mobilise et élimine la cholestérine en surcharge. Active les sécrétions rénale (aqueuse, azotée, chlorurée). Combat la sclérose viscérale et l'arthritisme. Corrige les dyscrasies sanguines.

**Indications.** — Insuffisance hépatique (ictère, troubles digestifs, manifestations cutanées, troubles liés à l'imperméabilité rénale).

**Foie colonsal.** Brightisme. Oligurie. Hépato-néphrites aiguës. Scléroses viscérales et vasculaires. Diathèse arthritique. Diathèse hémorragique. Trouve ses applications tant en médecine d'adulte qu'en chirurgie et en pédiatrie.

**Posologie.** — De 6 à 12 dragées par jour, au cours des repas avec une tasse d'infusion chaude 1/2 dose pour les enfants.  
Cure : 10 à 20 jours par mois.

**Laboratoires R. BOUTIN**

Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Paris.  
8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 09-63.)

## ORTHO-GASTRINE

### Formule :

Sulfate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude .....	0 gr. 10
CITRATE de Soude .....	0 gr. 10

Pour 1 paquet n° 30.

**Avantages.** — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

**Indications.** — Toutes celles de la solution alcalinosodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 4 paquets par jour.

*Enfants* (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 11 fr. 75.

**Laboratoire A. LEBLOND**

Pharm. de 1<sup>re</sup> classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

## ORTHOGÉNOL

**Traitement de Base des Maladies  
de l'Age mûr.**

**Formule de redressement biologique (1)  
du Docteur A. VERNIER**

**Composition.** — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiол.)

+ Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).

— Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

**Indications.** — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique. Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique. Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

**Présentation.** — Actuelle : *Cachets seulement.*

**Posologie.** — L'ORTHOGÉNOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec Anasarque, Hydropisie, Asystolie), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les *Débâcles libératrices* sous l'action conjuguée des *Dépureurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (1).

(1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazauric (*Thèse de Montpellier*, 1931).

(2) Dermo-révlulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

Prix : 44 fr. 60.

**Laboratoires BÉLIÈRES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ORTHOLAXINE

Laxatif d'action successive et synergique sur l'estomac, le foie et l'intestin. Ne provoque ni spasme, ni colique, ni irritation, ni accoutumance.

**Composition.** — Chaque dragée comporte :

Revêtement externe soluble dans l'estomac.	Extrait de Cascara Sagrada privé d'amertume.....	0 gr. 035
	Extrait de bourdaine.....	0 gr. 050
	Poudre d'aloès.....	0 gr. 025
	Évonymine brune.....	0 gr. 015
	Extrait de belladone.....	0 gr. 005
Noyau central ne se dissociant que dans l'intestin.	Poudre de belladone.....	0 gr. 005
	Poudre de muqueuse d'intestin grêle.....	0 gr. 05
	Extrait inaltérable de fiel de bœuf.....	0 gr. 05
	Extrait pancréatique.....	0 gr. 03
	Ferment lactique.....	0 gr. 05
	Essence d'anis.....	0 gr. 025

**Posologie.** — Deux dragées avant le dîner, 3 ou 4 dans les constipations rebelles.

Prix : 19 fr. 50 l'étui de 36 dragées.

**Laboratoires GRIMAULT**

Fondés en 1856.

51, rue François-1<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Bal. 20-70.)

## ORTHONEUROL

**Stimulant physiologique général.**

**Formule :**

Acide phosphorique.....	20 gr.
Glycérophosphate de soude .....	18 —
Glycérophosphate de magnésie ..	3 —
Glycérophosphate de manganèse ..	2 —
Sérum physiologique... Q. S. P.	100 —

**Indications.** — *Tonique nervin. Stimulant général qui trouve son application dans tous les cas de Faiblesse générale et nerveuse, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Phosphaturie, Alcalose, etc.*

**Forme.** — Gouttes.

**Posologie.** — XX gouttes à chaque repas dans la boisson.  
*Enfants* : demi-dose.

**Durée du flacon** : 15 jours environ.

**Prix au public** : 19 francs.

Enregistré au L. N. C. M.

**Laboratoires SOURIGUÈRE**

ANGOULÈME (Charente).

(Tél. : 2-42.)

## ORTHOPHORINE

**Composition.** — Granulé soluble, d'un goût agréable sans acidité brutale, pouvant se croquer pur.

Acide orthophosphorique.....	7 gr.
Phosphate disodique crist.....	14 gr.
Sucre .....	20 gr.
Lactose .....	Q. S. P. 100 gr.

Une cuillerée à café = VI gouttes PO<sup>4</sup>H<sup>3</sup> libre.

**Indications.** — Troubles de la nutrition, Lithiase phosphatique, États alcalosiques, Dermatoses, Dyspepsie, Céphalées, Prétuberculose, Phosphaturie, Démoralisation, Oxalémie, Arthritisme, Anémie.

Tonique du système nerveux, Asthénie, Mélancolie, Surmenage physique et intellectuel.

**Mode d'emploi.** — Se prend au milieu des repas, peu ou dans un peu d'eau.

*Adultes* : 3 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : jusqu'à 12 ans, 1/2 dose.

**Prix** : Traitement pour 7 jours, 18 fr. 75

**Laboratoires A. LEBLOND**

15, rue Jean-Jaures — PUTEAUX (Seine).  
(Tél. : Longchamp 07-36.)

## ORTHOSIPHÈNE

**Composition.** — Solution concentrée et titrée des principes actifs extraits des feuilles de l'orthosiphon *stans* neus, sans toxicité.

**Propriétés.** — *Médicament hépato-rénal, stimulant de la dépuraction urinaire, abaisse le taux de l'urée sanguine. Antiurique, Désintoxicant.*

**Forme.** — Extrait aqueux en ampoules buvables de 10 cc. (Boîte de 8 amp.) contenant tous les principes actifs de 6 gr. de feuilles sélectionnées de la plante.

**Indications.** — A prescrire au cours des Insuffisances hépato-rénales, Azotémie, Uricémie, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Affections cardio-vasculaires.

**Posologie.** — Diluer le contenu d'une ampoule dans un demi-litre d'eau, sucrer à la convenance la tisane ainsi préparée, l'absorber en 4 ou 5 prises au cours de la journée, et dans l'intervalle des repas.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-St-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## OSMOLAX

Laxatif végétal, naturel. Régulateur Intestinal.

**Composition.** — Graines de psyllium triées, enrobées de sucre et aromatisées.

Exempt de tout produit chimique purgatif.

**Propriétés.** — Par le mucilage qu'il forme avec l'eau, l'Osmolax provoque l'hydratation du bol fécal, facilite le glissement du contenu intestinal et permet le contact du bol fécal avec la muqueuse, stimulant ainsi le péristaltisme du gros intestin.

**Indications.** — Constipation sous toutes ses formes — Paresse intestinale — Soins pré- ou post-opératoires — Constipation des hémorroïdaires — Entérite.

D'un goût agréable, non toxique, l'Osmolax est applicable à la constipation des enfants, des femmes enceintes et des nourrices.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas (soit 3 à 6 cuillerées par jour), au début du repas; les avaler à sec, en absorbant quelques gorgées de liquide.

Prix : 18 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-14.

**Laboratoires SECLO**

G. COGNÉ, Pharmacien.

6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## OSMOLÉINE

Pommade antiseptique pour pansement de la muqueuse des fosses nasales.

**Composition.** — Camphre, Benzoate de soude, Soufre précipité, Acide borique, Menthol traces, Essence de géranium rosat.

**Propriétés.** — Désinfection de l'auvent nasal, de la filière nasale jusqu'à sa partie postérieure.

**Indications.** — Toutes les affections subaiguës ou chroniques des fosses nasales : l'ozène avec sécrétion et croûtes fétides, les séqueilles de sinusite maxillaire et frontale.

**Emploi.** — Après avoir mouché l'une et l'autre narine alternativement, mettre le volume d'un pois dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour.

**Présentation.** — Tube d'étain avec embout fixe.

Prix : 10 francs.

L. N. C. 314-35.

**Laboratoires ECHÉMAN**

26, rue des Moines — PARIS.

## OSMO-VACCINS BRÉANT COLIBACILLES

Vaccins par voie buccale, par pansements ou par installations vésicales.

**Composition.** — 200 milliards de germes :

Colibacilles.....	150 milliards.
Entérocoques.....	30 —
Bacillus proteus.....	10 —
Staphylocoques.....	10 —
Endo et exotoxines en milieu osmotique.	10 cc.

**Indications.** — Infections intestinales (colites, entérocolites, etc.), Syndrome entéro-rénal, colibacillurie, soins pré et post-opératoires, etc...).

**Posologie.** — Une ampoule, le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau.

Boîte de 8 ampoules de 10 cc..... 44 fr.

Boîte cure de 18 ampoules de 10 cc..... 63 fr. 25

**N. B.** — Existents :

Les Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques.

Les Osmo-Vaccins Bréant Rhino (ampoules).

Les Osmo-Vaccins Bréant Staphylo (ampoules).

**LABORATOIRES D'ANALYSES BRÉANT**

11, rue de Clichy. — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

## OSSYL

Reminéralisateur et reconstituant vivant directement assimilable.

**Composition et propriétés.** — Poudre d'os frais, non calcinés (os fœtaux). — Produit vivant à maximum d'activité, contient les vitamines naturelles.

**Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie.** Phosphore organique naturel, extrait de l'embryon de blé. Contient les Vitamines A et B.

**Nucléinate de manganèse.** — Provoque une réaction de défense hyperleucocytaire.

**Silicate de magnésium** — Agent de reminéralisation et d'ossification.

**Fluorure de calcium.** — Reminéralisateur. Stabilise la cellule nerveuse. Règle le fonctionnement des glandes endocrines.

**Poudres de surrénale et de thymus.** — Anti-toxique et anti-rachitique. OSSYL renferme les vitamines : A. B. E. G. P.

**Indications :** Troubles de croissance, rachitisme, fractures, états tuberculeux, tuberculose, grossesse, lactation, anémie, convalescence.

**Forme et posologie :** Caechets et granulé fondant à prendre au début des repas.

**Adultes :** 3 caechets par jour ou 3 cuillerées à dessert.

**Adolescents :** 2 caechets par jour ou 3 cuillerées à café.

**Enfants :** 2 cuillerées à café de granulé par jour.

**Prix :** Caechets : 21 francs. — Granulé : 22 francs.

Enreg. au L. N. C. M. N° 1542 et 1542-2.

**Laboratoire de l'OSSYL**

D<sup>r</sup> F. VASSEUR, Ph<sup>a</sup>, Anco

r. GLAGEON (Nord) : Tél. 20.

## OSTÉOPEPTINE

**Composition.** — Poudre de moelle osseuse rouge. Pepsine extractive. Phosphate tricalcique.

En dragées chocolatées, facilement acceptées par les enfants.

**Indications.** — Dyspepsie et anorexie infantiles. Insuffisance de poids et de taille. Convalescence des maladies infantiles aiguës.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés par jour avant les repas.

**Prix :** 21 fr. 10 la boîte de 30 comprimés.

**LES LABORATOIRES DRAPIER**

RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

## OSTRÉIODE

Eau de mer, biologiquement suriodée ; procédé Salles-D<sup>r</sup> Loubatie.

**Composition.** — Eau de mer naturelle iodoactivée par un procédé respectant les lois de la nature et le cycle de l'iode dans les océans.

Présence de quantités d'iode importantes par rapport à la teneur en iode du milieu marin et sous ses diverses formes dont la forme thyroxinienne. Teneur : 80 milligrammes par litre, d'iode assimilable.

**Indications.** — Lymphatisme sous toutes ses formes. Croissances difficiles. Asthénie des convalescents. Inappétences. Dépressions. Anémies. Grossesse. Rachitisme. Dysthyroïdies.

Toutes les cures marines à domicile.

**Posologie.** — *Adultes* : 4 cuillerées à bouche par jour.

*Enfants au-dessus de 5 ans* : demi-dose.

*Enfants au-dessous de 5 ans* : 2 cuillerées à dessert. Au début des repas, pure ou dans un liquide tiède ou froid. (Eau, lait, bouillon).

**Prix :** 20 fr. 80 le flacon d'un demi-litre.

## OSTRÉIODE Injectable

**Composition.** — Eau de mer iodoactivée biologiquement par le procédé Salles-D<sup>r</sup> Loubatie. Procédé permettant le maintien de la vie marine en milieu directement isotonique, au sérum sanguin.

Teneur en iode : 50 milligr. par litre.

**Indications.** — Toutes les indications du traitement marin enrichi en iode vital. Effets extrêmement rapides dans les carences minérales.

Prétuberculose, rachitisme, croissance, lymphatisme, suites opératoires, surmenage, anémies secondaires, infections, convalescences, paludisme, séquelles coloniales.

**Mode d'emploi.** — Série de 8 injections — une tous les deux jours. Voie sous-cutanée. Interrompre 10 jours et reprendre.

**Présentation.** — Boîte de 8 ampoules de 10 cc.

**Prix :** 31 fr. 20.

**Laboratoires de l'OSTRÉIODE**

**D<sup>r</sup> J. SOUTERBIOQ**, Pharmacien, D<sup>r</sup> en Médecine.  
344, boulevard de la Plage — ARCACHON  
(Tél. : 0.64.)

Agent général de vente : S. I. T. S. A.  
15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

## OSTRICALCIUM

Remède de base dans le traitement de tous les états de déminéralisation, dans les asthénies et les convalescences.

**Ostricalcium** présente une microdose d'origine biologique de calcium assimilable accompagnée de ses facteurs de fixation (parathyroïdes). L'assimilation est également favorisée par l'apport des vitamines A, E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, etc. Enfin les éléments énergétiques: extraits de céréales, levure de bière, complètent l'action certaine d'Ostricalcium.

**Indications.** — Tuberculose, Prétuberculose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Allaitement, Amaigrissement, Carie dentaire, Fractures, Grossesse, Asthénie, Fatigue cérébrale, Phosphaturie, Asthénie post-infectieuse, Surmenage scolaire.

### Posologie:

**Comprimés:** 2 à 3 comprimés avant les deux principaux repas.

**Granulés:** Enfants:

Jusqu'à 2 ans: 1 cuillerée à café le matin.

De 2 à 5 ans: 1 cuillerée à café matin et soir.

De 5 à 10 ans: 1 cuillerée à café aux trois principaux repas.

Adultes: 2 à 3 cuillerées à café avant les deux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-6.

### Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BÉTHUNE.

## OTALGOLEX

**Tube instillateur** de soluté neutre glycéринé rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

**Composition.** — Sol. d'adrénaline, stovaine, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

**Propriétés.** — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

**Indications.** — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

**Mode d'emploi.** — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube: 14 francs  
pour 15 jours de traitement.

Dépôt général pour la France.

**Laboratoire ASEPTOR**

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12°).

## OTODRAINS

Mèches capillaires de drainage pour oreilles, stérilisées en milieu humide à 120°.

**Forme.** — Mèches cylindriques hydrophiles à mailles lâches, uniquement longitudinales, permettant le drainage par capillarité des sécrétions les plus visqueuses.

**Présentation.** — Présentées en boîtes métalliques de 24 mèches disposées par 4 dans des sachets cellulose-siques.

Pour l'approvisionnement médical, il existe des boîtes de 100 mèches aseptiques en vrac, à prix médical.

**Mode d'emploi.** — Introduire la mèche dans le conduit avec une pince, sans tasser. Renouveler tous les jours, ou plus fréquemment, selon l'écoulement.

**Indications.** — Otites, oto-mastoïdites, et généralement toutes les fois qu'il y a lieu de réaliser un drainage otologique.

### Laboratoires de la FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT

5, Grande-Rue — MONTPELLIER.

(Tél.: 54-93.)

## OTOMIDE

### Chimiothérapie des Affections de l'Oreille.

#### Formule:

Dérivé sodé de l'acide sulfonamidobenzène-paraaminosuccinique.....	1 gr.
Paraaminobenzène-sulfonamide.....	2 gr. 5
Isoamylhydrocupréine.....	0 gr. 05
Chlorhydrate d'amyléine.....	0 gr. 50
Alcool à 60°.....	40 gr.
Glycérine.....	Q. S. P. 100 gr.

La première SOLUTION GLYCERO-ALCOOLIQUE sulfamidée pour le traitement de toutes les affections auriculaires.

#### Indications:

Otites, Otorrhées chroniques, Suppurations persistantes, Prophylaxie des maladies infectieuses.

#### Mode d'emploi:

Une dizaine de gouttes d'OTOMIDE dans l'oreille douloureuse, à répéter plusieurs fois par jour.

Prix: 21 francs.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires Roger ROLLAND**

1, rue Nélaton — PUTEAUX (Seine).

(Tél.: Longchamp 02-42.)

## OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif pur cristallisé et invariable  
du *Strophanthus Gratus*. Étalon international.

### Propriétés :

Cardio-tonique énergique et d'urgence. Diurétique puissant.

### Indications :

Insuffisances cardiaques, notamment quand le pouls est régulier ou lent. Œdème aigu du poumon. Insuffisance ventriculaire gauche. Myocardites.

### Formes :

Ampoules au 1/4 de mgr. (1 cc.) pour injections intraveineuses.

Ampoules au 1/2 mgr. (2 cc.) pour injections intramusculaires.

Comprimés à 2 mgr. 5 (4 comprimés = 10 mgr.).

Solution à 1/100 (L gouttes = 10 mgr.).

### Doses :

L'**Ouabaïne Arnaud** ne s'accumulant pas, le traitement peut être poursuivi aussi longtemps qu'il est nécessaire.

**Voie parentérale.** — Injecter par jour : soit 1/4 de mgr. (1 cc.) d'une ampoule intraveineuse, soit 1/2 mgr. (2 cc.) d'une ampoule intramusculaire.

**Per os.** — Doses moyennes : 5 à 15 mgr. par 24 heures, soit 2 à 6 comprimés à 2 mgr. 5, ou XXV à LXXV gouttes de solution à 1/100, en 2 prises.

### Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 31-21, 3 lignes.)

## OUATAPLASME

du D<sup>r</sup> Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet  
Instantané, aseptique, émollient.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Abscs, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

**Mode d'emploi.** — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquore de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Il existe également un **Ouataplasme antiseptique** au **Chromosol** (sel sodique de la Dibromo-Oxymercure-Fluoresceïne), tout spécialement destiné au traitement des Furoncles, Anthrax, Abscs, et toutes manifestations cutanées d'origine microbienne, qui se prépare également par simple immersion dans l'eau préalablement bouillie.

Échantillons médicaux sur demande.

Établissements **SABATIER-EMPTOZ**

10, rue René-Bazin — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 06-40.)

## OVA-CRINE

Dragées.

### Composition :

Hormone ovarienne lipodique acéto-soluble	0,01
Ovarine .....	0,05
Hypophysine .....	0,01
Hépatine .....	0,05
Phényléthylmalonylurée .....	0,01

Pour 1 comprimé dragéifié.

**Mode d'action.** — Supprime l'hypo-activité ovarienne. Médication endocrinienne d'appoint.

**Indications.** — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne et des troubles qui l'accompagnent. Troubles de la puberté. Troubles de la menstruation. Aménorrhée. Dysménorrhée. Règles douloureuses. Ménopause naturelle ou artificielle. Stérilité. Obésité.

**Posologie.** — De 2 à 4 dragées par jour en 2 fois, loin des repas, pendant 10 à 20 jours par mois.

**Prix :** 26 francs.

Laboratoires **Henri SCHÉHADÉ**

9, impasse Thoréton — PARIS (XV°).



## OVOCYCLINE ET OVOCYCLINE P

Hormone folliculaire cristallisée.  
ŒSTRADIOL ET DIPROPIONATE D'ŒSTRADIOL  
CIBA

L'Œstradiol (OVOCYCLINE) est une forme de l'hormone folliculaire se prêtant à l'absorption par la voie digestive (comprimés). Le dipropionate d'Œstradiol (OVOCYCLINE P) est une autre forme de l'hormone folliculaire dont l'action, très énergique et très prolongée, se manifeste après administration parentérale (présentation exclusivement en ampoules).

L'action physiologique de l'Ovocycline a été étudiée par des méthodes de dosage assez analogues à celles antérieurement utilisées pour l'hormone orchitique (PÉRANDRONE) et permettant une appréciation comparée avec d'autres substances. Ces essais physiologiques sont basés sur les tests de l'œstrus provoqué chez l'animal castré et sur le test de croissance de l'utérus. Les deux tests mettent en évidence la grosse supériorité de l'Ovocycline sur les préparations extractives.

Les effets thérapeutiques de l'Ovocycline sont extrêmement nets dans tous les cas où la fonction ovarienne est inhibée, supprimée ou gravement perturbée. Son action conjuguée avec celle de l'hormone du corps jaune (LUTOCYCLINE) est indiquée dans les cas d'hypoplasie, de stérilité, les troubles marqués de la ménopause naturelle et surtout provoquée (voir Lutocycline).

**Indications.** — Tous les troubles résultant d'une déficience caractérisée de la fonction ovarienne :  
*Persistence du stade infantile.*

*Aménorrhée primitive avec hypoplasie de l'utérus. Aménorrhées secondaires liées à l'inhibition de l'ovaire.*

*Oligoménorrhées et hypoménorrhées.*

*Troubles vasculaires et nerveux de la ménopause naturelle ou provoquée.*

*Manifestations dépendant du déficit ovarien : prurit vulvaire, vaginite sénile, frigidity, dépression psychique, nervosisme.*

**Deux présentations :**

OVOCYCLINE : comprimés d'Œstradiol dosés à 0 mgr. 04.  
OVOCYCLINE P : ampoules de dipropionate d'Œstradiol à 1 mgr. et 5 mgr. (solution huileuse).

**Doses.** — Comprimés Ovocycline à 0 mgr. 04 : 6 à 10 par jour.

Ampoules Ovocycline P à 1 et 5 mgr. : 1 à 25 mgr. et plus par semaine.

**Formuler :**

1 flacon de 50 comprimés Ovocycline.

1 flacon de 100 comprimés Ovocycline.

1 boîte de 5 ampoules Ovocycline P à 1 mgr.

1 boîte de 1 ampoule Ovocycline P à 5 mgr.

1 boîte de 5 ampoules Ovocycline P à 5 mgr.

Laboratoire CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## OVOMALTINE

Aliment naturel équilibré.

Source abondante de vitamines et de diastases.

**Composition.** — Extrait préparé sous vide à basse température, à partir du malt, du lait et du jaune d'œuf frais, aromatisé par une trace de cacao.

**Forme.** — Paillettes solubles.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment d'épargne, complet, tonique, riche en diastases, sels minéraux et vitamines. Auxiliaire de la digestion. Galactagogue.

**Indications.** — Diète liquide. États fébriles, états post-opératoires, anémies, convalescences, grossesse, suralimentation. Affections de l'appareil digestif : abcès dentaires, phlegmons de la gorge, angines, ulcères, troubles gastro-intestinaux, carences frustes.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à soupe à faire dissoudre dans une tasse de lait, eau, café, thé, ou toute autre boisson chaude. Ne pas faire cuire.

Société Anonyme des Établissements WANDER  
CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## OVUCRIDINE

Ovules au « Ricogonol ».

**Composition.** — Acridine, Cristal violet, Chlorure de platine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, Antigonococcique, Décongestif, Sédatif du système nerveux génital.

**Indications.** — Blennorrhagie et ses complications. Dans le traitement conjugal de la blennorrhagie à utiliser dans tous les cas.

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules.

**Mode d'emploi.** — Un ovule tous les deux soirs.

**Remarque :** Les taches pouvant résulter de leur emploi disparaissent après simple savonnage.

(N° du L. N. C. M. 795-7.)

Laboratoire LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie  
52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS.  
(Tél. : Flandre 00-55.)

## OVULAMIDES

Utilisent les propriétés antibactériennes polyvalentes du paraminobenzène-sulfamide (1162-F). 0,25 par ovule.

**Indications.** — Toutes les vulvo-vaginites, même celles qui sont sous la dépendance du *Trichomonas vaginalis* : les ulcérations du museau de tanche non cancéreuses, les endocervicites quels que soient les microbes rencontrés au cours de l'examen bactériologique.

**Mode d'emploi.** — Le soir au coucher : introduire l'ovule le plus profondément possible et mettre une garniture.

Un ovule tous les deux soirs suffit.

**Laboratoire Angelini**

61, rue de Seine — PARIS.

(Tél. : Danton 92-73.)

## OVULES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Abscès du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatations, etc.).

**Posologie.** — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays chauds où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

Prix : 20 fr. 70 la boîte de 6 ovules.

L. N. C. 581-4.

**Laboratoires P. BAUDE**

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 96-46.)

## OVULES AU PARAIODE

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Paraïode*. Chaque ovule contient 1<sup>er</sup>,50 de Paraïode.

**Indications.** — Assèche rapidement vaginites, métrites et toutes leucorrhées. Est également indiqué dans les salpingites et salpingométrites.

**Mode d'emploi.** — Un ovule le soir suivi le lendemain matin d'une injection.

La boîte de 6 ovules.

Enregistré au L. N. C. 1484-4.

**Laboratoire du PARAIODE**

**R. HARAND, Pharmacien**

23, rue Doudeauville — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 19-70.)

## OVULES CHAUMEL

à la Glycérine solidifiée.

**Indications :**

**Aménorrhée.** — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

**Antisepsie.** — Ovules Chaumel acide borique.

**Congestions.** — Ovules Chaumel simples et ichtyol.

Ovules Chaumel borate de soude.

**Douleurs.** — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

**Inflammations.** — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

**Leucorrhée.** — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

**Métrites.** — Ovules Chaumel ichtyol.

Prix : 22 fr. 60.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 applications.

**Crayons CHAUMEL**

Très appréciés pour leur fusion et la facilité avec laquelle le médecin les pose.

Prix : 22 fr. 60.

**Établissements FUMOUEZ**

A. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

## OVULES HYSTAN

du Dr L. Lafay

Ovules *astringents*, d'action asséchante.

### Formule :

Plomb, zinc colloïdal .....	âa 0,005
Acétate de plomb.....	0,15
Sulfate de zinc.....	0,08
Molybdate de plomb.....	0,02
Excipient Q.S.....	16

**Indications.** — Tous exsudats vagino-utérins, microbiens ou non, même gonococciques. Aucune toxicité.

**Mode d'emploi.** — Chaque soir, ou tous les deux soirs suivant avis du médecin, introduire un ovule après toilette.

*Cure moyenne* : 12 ovules.

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules. Prix : 24 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1090-3.

### Laboratoires du Dr L. LAFAY

F. FERRAND, Docteur en pharmacie.

69, rue de Provence — 54, Chaussée d'Antin  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 21-06.)

## OVULES INSÉVA

Traitement des affections gynécologiques par vaccinothérapie locale.

Les Ovules Inséva sont à base de cultures microbiennes de colibacilles, entérocoques, streptocoques, staphylocoques, bacilles d'Hoffmann.

**Indications.** — Toutes les affections gynécologiques, les leucorrhées, métrites.

**Action.** — Supérieure à celle des antiseptiques, modifie la nature de l'écoulement, le tarit rapidement.

**Mode d'emploi.** — Après une injection d'eau bouillie, introduire soir et matin, si possible, un ovule dans la cavité vaginale.

**Présentation.** — La boîte de 6 ovules : 22 fr.

### INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE DE GARCHES, INSÉVA

151, 153, 155, rue de Buzenval — GARCHES  
(S.-et-O.).

### Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## OVULES OAPE

**Présentation.** — En boîte de 6 ovules sous cupules. (26 fr. 70.)

**Principes actifs.** — Ichtyol, Extrait d'Hamamelis, Baume de San Salvador.

**Indications.** — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, Salpingites, etc...

**Mode d'emploi.** — Applications locales. Laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-45.

### Laboratoire PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## OVULES " PHYTOVULES "

**Composition.** — Rosa Centifolia, Hypericum perforatum, Malva sylvestris, Chenopodium, Thymus vulgaris en macération alcoolique — 1 gramme par-ovule, Beurre de cacao, Q.S.

**Propriétés.** — Émollient, astringent, adoucissant, cicatrisant, décongestif, sédatif, antiseptique.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes métrites, leucorrhées, vaginites, suites de couches, salpingites, ovarites et toutes affections gynécologiques.

**Avantages.** — Facilité d'introduction par leur petite dimension et leur rigidité. Fusion totale extrêmement rapide — quelques minutes — assurant ainsi une action constante des principes actifs sur les parties malades pendant toute la nuit. Ne tache pas.

**Mode d'emploi.** — Introduire un ovule le plus profondément possible, tous les soirs ou tous les deux soirs, en se couchant (suivant avis du médecin). Se garnir pour la nuit.

Le lendemain matin prendre une injection, soit avec de l'eau bouillie simple, soit introduite d'une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude.

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules.

### Laboratoires RICHOU

S. DESCOUTS, pharmacien.

39, rue Taitbout — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trinité 46-12.)

## OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

**Composition.** — A base de terres radioactives et de Terpinéol : d'une radioactivité égale à une unité uranique.

**Action.** — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

**Indications thérapeutiques.** — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix au public : 24 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 466-2.

**Laboratoires RHEMDA**  
Fondés en 1914.

**S. MOGAN, Pharmacien**

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-39, 18-41. — R. C. Seine 255-068-B.)

## OVULES SAPOREX

Fondants-Glycérinés, Saponiques.

**Formule :**

Essences Saporex :	
— Lavande .....	0,075
— Thym.....	0,021
— Citronnelle.....	0,013
— Verveine .....	0,011
— Santal.....	0,011
Thymol .....	0,010
Pâte Saporex (savon spécial neutre) ..	0,85
Glycérine solidifiée, Q. S. pour un ovule de .....	16 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestifs, cicatrisants, résolutifs, désodorisants, diminuant les exsudats vaginaux.

**Indications.** — Métrites, leucorrhées, vaginites, ulcérations, tumeurs, abcès, prurit vaginal, etc...

**Mode d'emploi.** — Un ovule le soir ; le lendemain matin une injection au Saporex (voir rubrique Saporex).

Boîte de 6 ovules : 21 fr. 65.

**Laboratoires SAPOREX S. A. R. L.**  
184, route de Genas — LYON (III<sup>e</sup>).  
(Tél. : Villeurbanne 93-88.) Chèques Post. Lyon 96-04.

## OVULES SÉDO-HÉMOSTATIQUES

du Dr JOUVE

Les ovules Sédo-Hémostatiques à excipient gélatino-glycériné véhiculent comme principes actifs l'antipyrine et le chlorure de calcium, médicaments hémostatiques et sédatifs qui ont fait leurs preuves. Ils sont fusibles à la température du corps, ne tachent pas et n'irritent pas les muqueuses. Nullement toxiques, ils peuvent être renouvelés à volonté.

**Composition.** — Les doses pour un ovule sont les suivantes :

Gélatine officinale lavée et séchée.....	1 gr.
Glycérine officinale.....	10 gr.
Antipyrine.....	1 gr. 50
Chlorure de calcium.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	2 gr.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le n° 1050-1.

Une triple action :

a) Analgésique. — (Métrites, Vaginites, Règles douloureuses, etc.)  
b) Hémostatique. — (Métorrhagies, Ulcérations, Règles prolongées, etc.)  
c) Décongestive. — (Ils s'associent heureusement à la Diathermie gynécologique.)

Les Ovules sédo-hémostatiques remplacent avantageusement les « tampons locaux » utilisant des préparations magistrales d'exécution plus ou moins délicate et d'action variable.

Une indication précieuse. — Pour éviter les douleurs menstruelles, utiliser les Ovules Sédo-Hémostatiques 3 ou 4 jours avant l'apparition des règles.

**Mode d'emploi.** — Introduire l'Ovule aussi profondément que possible se garnir et rester étendue.

Prix de vente : 22 francs.

Laboratoire du Dr JOUVE,

16 bis, rue Dufrénoy — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Trocadéro 69-87.)

## OVULES STÉRIGYNE

**Ovules secs spumeux à base d'Octylhydrocupréicine (0 gr. 01 par ovule).**

Traitement nouveau, pratique et propre des leucorrhées, pouvant être prolongé sans inconvénient, même à titre d'hygiène habituelle.

Les ovules secs Stérigyne décongestionnent et désodorisent. Ne coulent pas. Ne tachent pas. Inutile de se garnir.

**Posologie.** — Introduire le soir au coucher un ovule aussi profondément que possible. Un ovule Stérigyne coûte environ trois fois moins qu'un ovule classique.

La boîte de 16 ovules : 22 fr. 20.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS  
(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## OVULES-VACCINS « INAVA »

Pansement Gynécologique.

(Vaccin Inava M.)

Antipolymicrobien (aérobies et anaérobies),

Efficace, Propre, Commode.

Asepsie les Voies génitales féminines.

### Indications.

Métrites, Salpingites, Leucorrhées, Vaginites,  
Préventif des Infections Puerpérales.

**Mode d'emploi.** — Introduire l'ovule profondément et se garnir. Ne procéder à la toilette ordinaire que 12 heures après.

Prix : 21 fr. 85 la boîte de 6 ovules.

Enregistré L. N. C. M. : 760-2.

**Laboratoires INAVA**

ASNIÈRES (Seine).

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS, 23, rue des Moines.

## OXÉMO

**Forme.** — Lotion.

**Composition.** — Complexe de chloral, chlorénone et acide borique, scurocaine, scuroforme, essences de géranium et de vetyver des Indes.

**Propriétés.** — Antiseptique, détersif, antiprurigineux, kératoplastique.

**Indications.** — Pyodermites, eczémas suintants, impétigos, gourme, acné, herpès, intertrigos, sycosis, prurits, prurigos, zona, urticaire, piqûres d'insectes, brûlures, escarres, érythèmes fessiers, érythèmes solaires, sudaminas.

**Mode d'emploi.** — En lotions, compresses ou vaporisations. Laisser sécher sans essuyer. De 2 à 10 fois par jour.

**J. CRIBIER, Docteur en Pharmacie,**  
19, rue de la République — ORLÉANS.

## OXNOL

(Comprimés dragéifiés d')

### Composition :

Gélose pure.....	0,05
Extrait de bile total.....	0,05
Ferments lactiques sélectionnés.....	0,05
Résine et gomme.....	Q. S. P. 0,40

**Propriétés thérapeutiques.** — Rééducatrice intestinal convenant à toutes les formes de la constipation.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans croquer 1/2 à 4 comprimés pendant le repas du soir ou au coucher. Commencer le traitement par 1/2 à 2 comprimés en augmentant ou en diminuant le nombre suivant l'effet obtenu, le résultat étant différent suivant le tempérament de chaque personne.

**Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie**  
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Provence 34-87.)

## OXYDOTHYRINE PÂRIS

**Composition.** — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial.

**Indications.** — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goitre et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

**Forme.** — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

**Posologie.** — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : le flacon 24 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-5.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 55-12.)

## OXYDOVARINE PÂRIS

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

**Forme.** — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

**Posologie.** — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

**Indications.** — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : le flacon 24 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-6.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 55-12.)

## OXYFUGE

**Cachets.**

**Composition :**

Chenanthol .....	0 gr. 09
Thymol .....	0 gr. 45
Calomel chimiquement pur .....	0 gr. 45
Semen contra pulv. ....	2 gr. 70
Pyréthrum flor. pulv. ....	2 gr. 70

Pour 9 cachets.

**Indications.** — Destruction et expulsion des parasites intestinaux : ascarides, ankylostomes, tricocéphales et tout particulièrement des *oxyures*.

**Mode d'emploi.** — (Adultes seulement.) Pendant 3 jours consécutifs, faire prendre le matin à jeun avec une infusion 3 cachets, chacun de 1/2 heure en 1/2 heure. N'absorber aucun aliment jusqu'au repas de midi, qui sera normal.

**Présentation.** — Tube aluminium renfermant 9 cachets.

Prix : 18 fr. 40.

**Laboratoire CASTEL**

1, place Bouquerie — NIMES.

**A. CASTEL, Pharmacien,**  
Ingénieur-chimiste, Licencié ès Sciences.

## OXY-INJECTEUR DU D<sup>r</sup> FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

**Indications.** — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphyseme, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Bronchopneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

**Avantages de l'appareil.** — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 150 francs.

**Pharmacie du D<sup>r</sup> FIALIP**

23, av. de La Motte-Picquet — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 00-91.)

## OXYLÉINE

Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Antiseptique. Antidiarrhéique. Anthelminthique.

### OXYLÉINE ADULTES

#### Indications

*Troubles intestinaux* : Diarrhées saisonnières, des tuberculeux, Côlites, Fermentations, Dysenteries amibiennes et bacillaires, Intoxications alimentaires, Vers et tous parasites intestinaux, excepté le Ténia, Convalescence de typhoïdes.

*Troubles des voies biliaires* : Cholécystites.

*Troubles des voies urinaires* : Colibacillose et toutes infections (Pyérites, Gonococcie et ses complications).

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Doses moyennes.** — A prendre à chaque repas (midi et soir).

Plus de 20 ans : 3 à 4 comprimés.

De 13 à 20 ans : 2 à 3 comprimés.

De 7 à 13 ans : 1 à 2 comprimés.

De 4 à 7 ans : 1 comprimé.

Ne pas croquer pour éviter le goût désagréable. Pour l'enfant qui ne pourrait l'avaler, casser le comprimé et le faire prendre dans de la confiture.

**Prix** : 21 fr. 50 le flacon de 50 comprimés.

### OXYLÉINE ENFANTS

#### Indications

*Troubles intestinaux* : Diarrhées saisonnières, des nourrissons, Fermentations, Dysenteries, Intoxications alimentaires, Vers et tous parasites intestinaux, excepté le Ténia, Convalescence de typhoïdes.

*Troubles des voies urinaires* : Colibacillose et toutes infections.

**Forme.** — Comprimés solubles.

**Dose moyenne.** — A prendre aux tétées ou aux repas. 1 comprimé par 6 mois d'âge et par jour, dissous dans une cuillerée à soupe d'eau avec 1 ou 2 morceaux de sucre et 1 ou 2 cuillerées à soupe de lait.

**Prix** : 15 fr. 70 l'étui de 70 comprimés.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## OXYMENTHOL

(Tablettes et pâtes.)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaïne, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes*, 6 à 10 par jour à sucer ; *Enfants*, 3 à 6 par jour à sucer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires et de la gorge. Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

**Prix au public** : Tablettes, 7 fr. 10; Pâtes, 6 fr. 60. pour 8 à 10 jours de traitement.

Fabrication assurée.

### Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## OXYPLASTINE

**Thérapeutique Chirurgicale post-opératoire.**

Protection intégrale de la peau avoisinant toute plaie suppurante aiguë ou chronique.

Résistance absolue à l'attaque des sécrétions (pus et liquides organiques).

**Forme.** — Crème onctueuse aseptique, adhésive, ne séchant pas, ne s'écaillant pas (s'enlève par simple essuyage à la compresse).

**Indications.** — Opérations abdominales avec drainages, Anus artificiels, Fistules biliaires, duodénales, pancréatiques, Fistules du grêle, *Pleurésies purulentes*, *Cystostomies*, Adénites et abcès froids fistulisés, Arthrotomies, *Ostéomyélites*, Mastoïdites, Brûlures, Ulcères variqueux, Escarres.

**Indications spéciales.** — Améliore la cicatrice opératoire, *Esthétique des cicatrices*.

**Présentation.** — Tube G. M., dit tube chirurgical, 140 gr. : 29 fr. 20 ; tube médical, 70 gr. : 20 fr. 50 ; tube P. M., 40 gr. : 16 fr. 40.

### Laboratoires de l'OXYPLASTINE

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Marcadet 61-96.)

## OXYTHYOL

du Docteur P. Bourgraff.

**Composition.** — Ichtyol titré d'origine strictement naturel gisements autrichiens. — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

**Propriétés.** — Grâce à la teneur rendue constante de tous ses éléments composants, la pâte *Oxythylol* permet d'obtenir des résultats toujours identiques. Ses propriétés kératoplastiques et antiphlogistiques font de cette pâte un élément précieux de l'arsenal thérapeutique du dermatologiste et du praticien.

**Indications.** — Dermites variqueuses, eczémas secs et suintants.

**Mode d'emploi.** — Demander les brochures des docteurs P. et R. Bourgraff : « Ulcères variqueux » et « Eczémas pré et post-ulcéreux ».

**Présentation.** — Pâte grise en pot :

Grand modèle.....	32 fr. 40
Petit modèle.....	17 fr. 50

L'*Oxythylol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN,

HUSSIGNY-GQDBRANGE (M.-et-M.).

Filiale : Place St-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## OZOBIASE

**Principes actifs.** — Facteur oxydant, acides aminés et vitamines de la levure.

Ne remplace pas la ration alimentaire, mais permet d'en tirer le meilleur parti en augmentant le coefficient d'utilisation des substances énergétiques.

**Indications.** — Alimentation déficiente, Amaigrissement, Anorexie, Hypotrophie de l'enfance, Prétuberculose, Diabète, Infections liées à un mauvais état général, Furunculose, etc...

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Doses moyennes.** — Adultes : 2 à 3 comprimés midi et soir.

Enfants : demi-dose.

**Prix :** 26 fr. 80 la boîte de 60 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## OZOL

Traitement rationnel de la blennorrhagie.

**Composition :**

Résorcine .....	0,40	} pour 100 grammes
Sel marin .....	0,70	
Goudron végétal pur.....	1	

**Indications.** — Blennorrhagie chez l'homme et chez la femme.

**Avantages.** — Propriété osmotique du milieu. Pénétration dans les espaces sous-muqueux contact assuré avec les cellules infectées. Pas d'action coagulante, adjuvant précieux de la thérapeutique sulfamidée.

**Posologie.** — Chez l'homme : 4 à 5 injections de 10 cc. par jour, à conserver 5 à 10 minutes. En cas d'intolérance de l'urètre, dédoubler les premières injections avec de l'eau bouillie.

Chez la femme : Tamponnements à l'Ozol pur et injections de 2 litres d'eau bouillie contenant 4 à 5 cuillerées à soupe d'Ozol. Lorsque la maladie s'étend à l'urètre : petites injections d'Ozol pur dans l'urètre. Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments, n° 572-2.

**Forme.** — Liquide.

Prix du flacon : 21 fr. 50,

Laboratoire de l'OZOL

6, place des Ternes — PARIS (XVII\*).

(Tél. : Roquette 09-35.)

## OZOLASE

Antiseptique gynécologique en comprimés.

**Composition :**

Trioxyméthylène .....	0,008	} pour 1 comprimé
Peroxyde de magnésium .....	0,030	
Sulfophénate de zinc.....	0,075	
Sulfate de zinc.....	0,075	
Sel marin.....	0,145	
Alun .....	1,172	

**Indications.** — Métrite, leucorrhée, vulvite, prurit, toilette intime et par dégagement d'oxygène et d'acide carbonique, action calmante sur le réseau nerveux utérin : insomnie, excitabilité, irritabilité.

**Avantages.** — Solubilité immédiate, odeur discrète et non persistante, innocuité absolue, usage quotidien sans inconvénient.

**Forme.** — Comprimés de 2 gr. 25, parfumés au thym.

**Posologie.** — Pour la toilette intime : 1 comprimé par litre d'eau. Etats inflammatoires : 2 comprimés par litre d'eau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 572-1.

Prix de la boîte (40 comprimés) : 15 fr. 80.

Laboratoire de l'OZOL

6, place des Ternes — PARIS (XVII\*).

(Tél. : Roquette 09-35.)



# OZOTHINE

Ozonide d'Essence de térébenthine en SOLUTION AQUEUSE isotonique fixant 1.15 mgr. d'OZONE par 10 cc. (Procédé F.SAUVAGE).  
Dépourvue de tout élément irritant.

**Action.**— Antipyrétique, Antitoxinique, Bactéricide, asséchante et désodorisante, Oxydant de l'Hémoglobine, Puissant modificateur du terrain.

## Indications:

**Médicales:** Maladies des voies respiratoires, infections généralisées ou obstétricales. Pneumopathies aiguës, subaiguës ou chroniques, Pleurésies purulentes, Bronchites aiguës ou chroniques, Dilatations bronchiques, Gripes et suites post grippales, Asthme et emphyseme, Broncho-pneumonies infantiles (suites de rougeole, coqueluche, etc.). Rhumes, Trachéites, Toux, Laryngites. — Stimulant cellulaire.

**Chirurgicales:** Préventif des complications pulmonaires post-opératoires.

## Formes:

Ampoules pour injections intramusculaires, intraveineuses, intratrachéales, intrabronchiques ou intrapleurales totalement indolores, sans réaction locale ou générale.  
10 cc. adolescents et adultes;  
5 cc. enfants jusqu'à 10 ans;  
2 cc. nourrissons 1<sup>er</sup> âge.  
Gouttes, Capsules, pour traitement oral.  
Composé: Inhalations, Fumigations.

## Posologie:

### Ampoules.

a) *En médecine.* Adultes: 10 cc. 1 ou 2 fois par jour avec éventuellement association de gouttes ou de capsules.

Dose pouvant être augmentée sans danger dans les cas graves.

*Nourrissons:* injection intramusculaire de 2 cc., en augmentant selon état jusqu'à 5 cc. ou plus.

*Au-dessus de 1 an:* de 2 cc., augmenter rapidement à 5 cc. ou plus.

### b) En chirurgie:

1 injection de 5 cc. avant l'opération et après l'opération.

Continuer les injections pendant quelques jours après l'intervention.

### Gouttes.

*Adultes:* Le matin à jeun et le soir avant de se coucher de XL à LX gouttes dans un peu d'eau sucrée. *Enfants:* 1/4 jusqu'à 1/2 dose.

### Capsules.

*Adultes:* 4-6 capsules au début des principaux repas. *Enfants:* 1/4 jusqu'à 1/2 dose.

### Composé:

*Inhalations, Fumigations:* de V à XXX gouttes dans un bol d'eau chaude.

## Aucune contre-indication.

## Présentation:

Boîtes de 6 ampoules de 10 cc.      Ozothine Capsules.  
Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.      Ozothine Composé (Inhalation,  
Boîtes de 12 ampoules de 2 cc.      Fumigation).  
Ozothine Gouttes.  
Présentation spéciale pour le Corps médical, les hôpitaux et cliniques.  
Boîtes de 25 ampoules, 50 ampoules et 100 ampoules.

## Laboratoire de l'OZOTHINE

J. POMPANON, Ph<sup>en</sup>, 23, rue Sébastien-Mercier — PARIS (XV<sup>e</sup>).

# PADÉRYL

## Composition. — Dragées de:

Bromhydrate de papavérine.....	0,03
Bromhydrate de codéine .....	0,02
Extrait de valériane stabilisée .....	0,10
— de jusquiame stabilisée .....	0,035

## Propriétés et indications:

*Calmant de la toux:* toux pharyngolaryngée, toux rebelles et persistantes des affections pleuro-pulmonaires chroniques, toux coqueluchoïdes, toux réflexes au cours des insufflations du pneumothorax artificiel, toux incoercibles et émetisantes de certaines affections pulmonaires aiguës ou tuberculeuses.

*Sédatif nerveux* sans action hypnotique, troubles fonctionnels d'origine nerveuse et neurovégétative: *surmenage, troubles nerveux menstruels, insomnies* (qu'il jugule sans causer de troubles au réveil).

**Posologie.** — De 1 à 4 dragées par jour et plus selon prescription médicale. Tubes de 20 dragées.

## Laboratoires CLIN, COMAR ET Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

# PADUTINE

Nom déposé. Licence Bayer.

## Composition. — Hormone circulatoire d'origine pancréatique.

**Propriétés et indications.** — Nettement différente de l'acétylcholine. Vaso-dilatateur des vaisseaux périphériques, pulmonaires, encéphaliques et coronaires.

Hypertension et spasmes vasculaires. Syndromes de Raynaud et de Buerger, claudication intermittente, artérites oblitérantes, ramollissement cérébral, acroparesthésies, acrocyanose, spasmes rétiens, troubles circulatoires et trophiques de la ménopause et de la vieillesse (amnésie et diminution du tonus psychique, fatigabilité, sensation de froid aux extrémités, prurit et gangrène séniles), plaies atones, ulcères variqueux, engelures.

**Posologie.** — Par voie buccale: 10 gouttes ou 1 dragée trois fois par jour, à jeun ou avant les repas.

Par voie intramusculaire: de 1 à 4 ampoules par jour. En injections intraveineuses lentes: demander la documentation spéciale.

L'action de la Padutine est lente, mais durable, et certains échecs doivent être attribués au fait que le traitement n'a pas été poursuivi avec assez de persévérance.

**Présentation.** — Tube de 20 dragées à 3 unités.

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 4 unités.

## Société Générale d'Applications Thérapeutiques

### THERAPLIX

98, rue de Sévres — PARIS (VII<sup>e</sup>)  
(Tél.: Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PAINS DE RÉGIME HEUDEBERT

Les Pains de régime Heudebert ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain ordinaire est interdit.

### Diabète.

Pain de gluten : 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime très sévère.

Pain d'aleurone : 15 à 20 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime sévère.

Diabético-Biscotte } 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés.

Special-Diabetic } Régime normal.

Pain essentiel : 55 à 60 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime léger.

Biscottes au gluten, Flûtes au gluten : 60 à 65 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime de repos.

### Albuminurie-Arthritisme.

Régime de désintoxication.

Pain désazoté . 2,93 % mat. azotées. Régime très sévère.

Pain hypoazoté. 8,12 — — — — — normal.

Pain de Vittel . 7,80 — — — — —

Biscottes, Gressins } sans sel, 12,50 % mat. azotées.

Longuets. } Régime léger.

Pains de Contrexéville, d'Evian, de Saint-Nectaire.

### Cœur et vaisseaux.

Mêmes pains, appauvris en matières azotées, que dans le régime de désintoxication.

Pain de Royat.

Pain de Bains-les-Bains (artères).

### Constipation.

Pain complet (frais).

Biscottes de pain complet. | Pain de son (frais).

Pain de Châtel-Guyon. | Baguettes de pain complet.

Pain de Plombières.

### Dyspepsie-Entérite.

Biscottes de pain grillé, longuets, gressins.

Pain de Vichy.

### Foie et voies biliaires.

Pain hypoazoté.

Biscottes, longuets, gressins.

Pains de Vichy, de Vittel.

### Obésité.

Pain essentiel.

Gressins.

Pain de Brides.

D'une haute valeur nutritive, tous ces pains ont une composition rigoureusement constante, placée sous le contrôle permanent du Laboratoire.

### Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue de Saint-Germain, à NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin Feuillat, à LYON (Rhône).

## PALPITINE

**Sédatif d'effet constant non déprimant.**

**Composition.** — Association de *sédatifs à doses faibles* (Phosphate de codéine, 0,006 ; Phényléthylmalonate juré, 0,01) et d'un *tonique* (Méthylarsinate, 0,008, Guaranine, 0,01). 50 dragées par tube.

**Indications.** — Nervosité habituelle ou occasionnelle, Emotivité, anxiété, éréthisme cardiaque, palpitations, algies précordiales qui les accompagnent souvent, Dépression due aux préoccupations de la vie courante, Troubles nerveux qui précèdent les règles ou la ménopause. Hyperexcitabilité sous toutes ses formes.

La *Palpitine* apporte le calme, régularise le travail et facilite le sommeil.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 dragées avant chacun des 3 repas, pendant trois semaines environ. *Doses faibles* : 4 dragées par jour. *Dose moyenne* : 6 dragées par jour. — La *Palpitine* peut être prise ou renouvelée sans danger d'accoutumance.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-10.

**Laboratoires BEAUX-LAGRAVE**

72, quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

## PANBILINE

**Formes.** — Pilules et Solution.

**Définition.** — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

**Composition.** — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les Cholago-cholérétiques sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre ni alcool.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

**Doses moyennes.** — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. *Enfants* : Demi-dose.

**N° d'Enregistrement au L. N. C.** : 469-1-2.

**Prix au public :**

17 francs la boîte de 50 pilules de Panbiline.

25 francs le flacon de Panbiline liquide.

**Laboratoires du Docteur PLANTIER**

ANNONAY (Ardèche).

## PANBIOL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Calcium et phosphore organiques. Vitamine D. Acides aminés. Manganèse et fer organiques.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Fixateur des sels de chaux. Complément phospho-calcique équilibré vitaminé de la ration alimentaire.

**Indications.** — Déminéralisation. Retards de croissance. Troubles de la dentition. Rachitisme. Troubles de la nutrition. Amaigrissement. Anémie. Surmenage physique ou intellectuel. Grossesse. Allaitement. Convalescences.

**Posologie.** — De 2 à 10 dragées par jour.

**Prix.** — L'étui de 60 dragées : 20 fr. 60.

**Laboratoires A. BAILLY**

(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 62-30.)

## PANCALCION

**Chlorure de Calcium d'action rapide.**

**Composition.** — Solution halogénée titrée de chlorure de calcium cristallisé, stable et pur. XL gouttes = 1 gr. de  $\text{CaCl}^2$ .

*L'adjonction de traces d'halogènes et de P, qui sont les satellites habituels du  $\text{CaCl}^2$  dans l'organisme, lui assure une orientation biologique qui explique sa rapidité d'action (ces corps fixent le calcium à la manière des catalyseurs).*

**Indications.** — *Recalcifiant* : croissance, rachitisme, fractures, lymphatisme, tuberculose, grossesse, allaitement. *Anti-hémorragique* : Préventif et curatif de toutes les hémorragies. *Diurétique-déchlorurant* : pleurésie, ascite, œdème, néphrites, albuminuries. *Anti-anaphylactique et redressant humoral* : accidents du sérum, urticaire, asthme, spasmophilie, tétanie.

**Doses.** — Se souvenir que XL gouttes = 1 gr. de  $\text{CaCl}^2$ .

Dose quotidienne pour *adultes*, à prendre dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Recalcifiant : 1 gr. (2 fois XX gouttes).

Hémostatique : 2 à 4 gr. (4 fois XX gouttes ou 4 fois XL gouttes).

Diurétique déchlorurant ou anti-anaphylactique : 3 à 6 gr.

*Enfants* : V à X gouttes par année d'âge suivant les cas.

**Laboratoire LE BRUN**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 71-33.)

## PANCODINE

Le succédané le plus actif de la morphine, sans accoutumance ni toxicité, sans action nuisible sur les centres respiratoires.

**Composition.** — Chl. de Dihydrooxycodéine stabilisé.

**Indications.** — États douloureux chroniques, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections respiratoires, Névralgies, Douleurs postopératoires, Dysménorrhées, États spasmodiques, Prostatites, Syndromes cancéreux, etc.

**Posologie :**

*Par voie hypodermique* : 1 à 3 fois par jour 1/2 à 1 ampoule de 0.02 gr.

*Par voie rectale* : 1 à 3 fois par jour 1 suppositoire de 0.02 gr.

**Présentation :**

10 ampoules à 0,02, la boîte : 38 francs.

10 suppositoires à 0,02, la boîte : 35 fr. 65.

**Laboratoire de la PANCODINE**

**G. DUBŒUF, Pharmacien-Biologiste**

4, rue Raymond-Poincaré — NANCY.

**Produit français.**

## PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

**Caractéristiques.** — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

**Indications.** — Digestions difficiles et prolongées, Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

**Chez le nourrisson.** — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

**Doses.** — *Enfants* jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. *Grands enfants* ou *adultes* : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Littérature et Échantillons :

**Laboratoires DEFRESNE**

19, rue Jacob — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## PANCRÉATINE (Pilules Philippe)

### Pilules Kératinisées.

La pilule *Pancréatine Philippe*, grâce à sa gaine de Kératine, traverse la fraction du trajet digestif, dont le milieu est très notablement acide, sans subir de dommage qui détruirait ou entraverait son action. La pilule en arrivant ainsi intacte à l'intestin peut donner toute son action.

**Indications.** — Pancréatite chronique, insuffisance pancréatique, traitement d'entretien, du diabète, diarrhée et entérite rebelles, troubles de la motricité intestinale.

**Posologie.** — 4 à 8 pilules par jour, soit 2 à 4 pilules au moment des deux principaux repas.

**Prix :** 19 fr. 90.

(Prière spécifier Pilules Philippe Pancréatine.)

**Produits du Dr Henri PHILIPPE**

36, Quai Fulchiron — LYON.

## PANCRÉATOKINASE CARRION

**Composition.** — Poudre de pancréas et de muqueuse duodénale desséchés dans le vide.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Indication.** — Dyspepsies intestinales. Constipation.

**Posologie et mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés à chaque repas. *Enfants* : 1 à 2 mesures.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 50 comprimés : 20 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. n° 514-57.

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## PANCRÉBILE

(Pancréas total (ext. spécial) . . . .	0 gr. 10
Bile dépigmentée, décholestérinée. . . .	0 gr. 20
Glandes de l'intestin (ext. pulv.) . . . .	0 gr. 05
Oléate de soude . . . . .	0 gr. 05

Carbonate de chaux, Q. S. p. 1 dragée glutinisée.

**Propriétés.** — Stimulant et régulateur hépato-pancréatique. Cholagogue. Anti-infectieux, Laxatif doux.

**Indications.** — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

**Posologie.** — 1 dragée avant ou après les repas. Avaler sans croquer. Constipation : 3 dragées le soir au coucher.

**Nota.** — PANCRÉBILE n'est pas un laxatif irritant, mais un cholagogue doux. Son action est augmentée par la présence du carbonate de chaux qui neutralise l'Acidité et dont le Calcium agit comme Auxo-ferment ou Zymosthénique.

PANCRÉBILE s'administre 1 heure avant les repas si on désire un effet excito-sécrétoire : 1 heure après si on veut suppléer à la sécrétion pancréatique déficiente.

Commencer le traitement par une dragée à chaque repas. Augmenter suivant l'effet obtenu.

**Prix :** 21 fr. 20 (15 jours de traitement).

**Laboratoire du Docteur E. AUBERT**

71, rue Saint-Anne, PARIS (11<sup>e</sup>) — (Richelieu 19-26.)

App. pharm. et Dépôts France : O. C. P. — PARIS et tous Grossistes.  
Afrique du Nord : **FELISSARD** — ALGER-CASABLANCA

## PANCRÉPAR

### Médication eupeptique.

Association en proportions définies d'extraits pancréatique et hépatique, de bile de bœuf, de boidine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication eupeptique régularisant les fonctions hépato-biliaires et pancréatiques.

**Indications.** — Manifestations digestives dues à un trouble d'assimilation. Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Constipation d'origine hépatique, Anaphylaxie digestive, insuffisance pancréatique.

**Forme.** — Dragées glutinisées.

**Doses et mode d'emploi.** — Au début de chacun des trois repas : 2 à 3 dragées.

*Enfants* à partir de trois ans : moitié de ces doses. Au-dessous de trois ans, s'abstenir sauf avis contraire du médecin.

**Prix au public :** 21 fr. 40.

Fabrication assurée.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

**Dr. E. PERRAUDIN, Pharmacien.**

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 29-29.)

## PANCRÉPATINE LALEUF

**Composition.** — Extrait spécial de Pancréas activé par addition de Suc hépatique et analgésine.

Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

**Propriétés et indications.** — Ophothérapie du Diabète par médication interne. Sous l'influence de la PANCÉPATINE, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal;
- 4° Disparition des troubles secondaires, soit, polyurie, prurit, etc.
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

**Forme.** — Capsules glutinisées.

**Posologie et mode d'emploi.** — Les capsules de PANCÉPATINE LALEUF doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures, suivant prescription médicale.

**Durée moyenne des unités de vente.** — 12 à 18 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 capsules : 31 fr. 70.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## PANCRÉPEPTAL

**Traitement des manifestations de l'insuffisance hépatique et pancréatique.**

Antianaphylactique, désensibilisant de l'organisme en cas d'anaphylaxie alimentaire. Indiqué dans tous les cas de " choc protéinique ; Asthme, *Coryza spasmodique*, Rhume des foins, Urticaire Eczéma, Migrations.

**Composition.** — Association de pancréatine, peptone, papaine, lactate de chaux et bicarbonate de soude.

Le Pancrépeptal supplée à l'insuffisance des sucs digestifs, permet une désintégration plus complète de la molécule albuminoïde et, de ce fait, une meilleure assimilation.

**Deux présentations.** — Granulé et cachets (2 cuil. à café de granulé correspondent à 1 cachet).

**Posologie :**

**Adultes :** 2 cuil. à café de granulé dans un peu d'eau au début des 2 principaux repas, ou 1 cachet (en mangeant) au commencement ou au milieu des 2 repas. (Ne pas prescrire de cachets en dehors des repas.)

**Enfants :** 1 cuil. à café de granulé dans un peu d'eau au début des 2 principaux repas.

L. N. C. M. n°s 2011-1 et 2011-2.

H. PERRIN, pharmacien,

55, rue Auguste-Comte — LYON

## PANCRINOL

Complexe d'extrait désalbuminé et délipodé de foie rate, rein et surrénale.

**Indications.** — Toutes les anémies, anémies banales ou secondaires, en particulier celles s'accompagnant d'état asthénique. — Toutes les convalescences des maladies aiguës ou infectieuses. — Toutes les dépressions physiques ou nerveuses, le surmenage, etc.

**Action.** — Réapparition des forces, augmentation du nombre des globules rouges et du taux de l'hémoglobine, élévation du poids.

**Posologie :**

**Adultes :** 2 à 4 ampoules de 7 cc. par jour.

**Enfants :** 1 à 3 ampoules de 3 cc. par jour.

**Présentation :**

**Adultes :** Boîte de 10 ampoules de 7 cc. : 32 francs.

**Enfants :** Boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 22 fr. 50.

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## PANDRÉNALINE JULIEN

**Gouttes. — Suppositoires.**

**Composition.** — Extrait total désalbuminé et stabilisé de glandes surrénales contenant, en solution exactement titrée et stable :

— Un pour mille d'adrénaline naturelle extraite de la zone médullaire.

— Tous les principes extractifs antitoxiques contenus dans la zone corticale (Hormone, etc.).

**Indications.** — Insuffisances surrénales au cours des maladies infectieuses et toxiques, asthénie et états neurasthéniques, hypotension, collapsus et choc, affections digestives, vomissements graves, hémorragies, intoxications aiguës.

**Posologie.** — XV gouttes 2 fois par jour sur un morceau de sucre à sucer lentement.

3 suppositoires par jour. Chaque suppositoire contient X gouttes de Pandrénaline.

Prix : gouttes, 16 fr. 50 ; suppositoires, 23 fr. 30.

Echant. gratuit sur demande

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie  
105, rue de Rennes, PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél. : Littre 80-76.)

## PANFLUINE

### Comprimés.

Combinaison organique dissimulée d'iode, avec les tanno-glucosides de vaso-constricteurs et plastifiants veineux.

**Indications.** — Régulateur circulatoire, Affections phlébotiques et artérielles, Hémorroïdes, Varices, Hypertension, Troubles congestifs, Formation de la jeune fille et troubles de la quarantaine chez les deux sexes, Rhumatismes diathésiques et infectieux, Arthritisme, Hyperviscosité sanguine, Dépuratif.

**Formule comprimés.** — Ex. Hydrastis Canadensis, 4 ; Sol. Intrait Marron d'Inde stabilisé, 2 ; Extrait fl. Viburnum Prunifolium, 2 ; Extrait fl. Hamamelis Virginica, 8 ; Extrait fl. Rhamnus Frangula, 2 ; T. Cupressus Sempervirens, 2 ; Teinture d'Iode combiné, 2 pour 100 cc.

**Doses.** — 3 à 5 comprimés par jour, selon les indications du médecin.

Prix : 20 fr. 30.

## PANFLUINE

### Liquide concentré.

**Formule liquide.** — Solution d'Intrait de Marron d'Inde stabilisé, 5 gr. ; Extrait fluide de Châtaignier, 10 gr. ; Alcoolature de Lycium, 5 gr. ; Benzoate de Folliculine crist., 1 250 U. I. ; Extrait fluide Rhamnus Frangula, 3 gr. ; Teinture de Cupressus Sempervirens, 10 gr. ; Orthoiodobenzoate de Soude, 0,50 ; Di-iodhydrate de Spartéine, 0,005 ; Alcoolature d'Anémone, 3 gr. ; Extrait fluide Yohimbee, 0,75 ; Extrait fluide de Seneçon, 10 gr. ; Teinture de Teskra, 2 gr. Pour 100 cc.

**Mode d'emploi.** — XV à XXV gouttes avant les principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou de tisane, et selon les indications du médecin.

Prix : 20 fr. 30.

*Diffusion strictement médicale.*

**Laboratoires M. DE RIVE.**

A. de RIVE, pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Lévert  
PARIS (XX<sup>e</sup>).

## PANGADUINE

### Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

**Composition.** — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécitines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

**Indications (Fatigue générale).** — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause.

C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

**Action.** — La *Pangaduine* agit :

1<sup>o</sup> Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2<sup>o</sup> Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement, on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

**Adultes :** Pangaduine Elixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Prix, le flacon de 310 cc. : 22 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-25.

**Enfants :** Pangaduine granulée, 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Prix, le flacon de 95 grammes : 12 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-24.

**Docteur H. MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 39-44)

## PANGASTROL

Pansement de l'estomac.

**Composition.** — Kaolin, bismuth, belladone, codéine, carbonate de chaux, magnésie.

**Forme.** — 15 sachets de 10 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

**Indications.** — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsie, Diarrhées, Fermentation.

Prix : 14 fr. 90.

Enregistré L. N. C. n° 62-2.

**Laboratoire STOULS**

G. TRONCIN, Pharmacien,

156, avenue Victor-Hugo, PARIS.

(Tél. : Passy 68-14.)

## PANGESTYL NARTY

**Nature et action.** — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

*PANGESTYL (qui digère tout).*

**Indications.** — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhée, Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

**Formes et Mode d'emploi.** — *Granulés* ou *Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

**Laboratoires Georges TINARD**

134, boulevard Péreire — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Gal. 92-44.)

## PANGLANDINE

Synthèse opothérapique complète.

**Composition.** — Ensemble des glandes et tissus à fonction endocrinienne assurant le développement et le bon équilibre somatique et intellectuel, la fixation du calcium, l'assimilation générale et la régénération sanguine.

**Présentation.** — Deux formes : *Adultes* : capsules à absorption intestinale (50 par flacon) ; *Enfants* : liquide glyciné et aromatisé, à prendre par gouttes, 45 c. par flacon.

**Indications.** — Retards ou arrêts de développement physique ou intellectuel ; puberté ; troubles ovarien, ménopause ; asthénie générale et génitale, surmenage, sénilité, convalescences.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 8 capsules par jour avec repos d'une semaine par mois. *Enfants* : X à LX gouttes par jour dans un peu de liquide avant les repas. Prescrire : *Panglandine capsules* ou *Panglandine liquide*.

**Prix.** — Capsules : 33 fr. 50. Solution : 36 fr. 60.

Durée du traitement : Capsules 5 à 25 jours.

Solution 10 jours à 3 mois.

**LABORATOIRES COUTURIERX**

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## PANLUTÉINE VOGELIN

Association de 0,05 extrait total ovarien et de 0,005 extrait thyroïdien.

**Indications.** — Dans tous les cas où il y aura carence de l'organisme en extrait total ovarien. Elle réussit merveilleusement dans tous les cas de castration chirurgicale ou spontanée, troubles de la ménopause, obésité de la ménopause.

**Posologie.** — 2 comprimés avant les 2 repas 10 jours par mois. Le flacon : 21 fr. 10.  
Traitement de 10 jours.

L. N. C. n° 475-9.

**Laboratoires VOGELIN**

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV<sup>e</sup>)

(Tél. : Danton 83-24.)



## PAN-NEUROL

Stabilisateur et régulateur du système nerveux.  
Traitement biologique de toutes les Neurotonies.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Phényléthylmalonylurée, Passiflore, Phosphoglycérates, Bromure de camphre.

**Indications.** — États anxieux et émotifs, Palpitations, Insomnies rebelles, Dépression nerveuse, Neurotonies cardio-vasculaires et gastro-intestinales.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés en 24 heures, de préférence au moment des repas.

**Prix:** 17 francs, l'étui de 40 comprimés.

Enregistré L. N. C. n° 62-4.

**Laboratoire STOULS**

G. TRONCIN, Pharmacien.

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

(Tél. : Passy 68-14.)

## PANOSAN

**Tonique général.**

Reconstituant énergétique, de goût agréable.

**Composition.** — Élixir complexe à base de vins généreux contenant entre autres des hypophosphites, de la créosote, du gaiacol, des extraits hépatiques, pancréatiques et spléniques, de l'huile de foie de morue prédigérée, de l'extrait de malt, de la gentiane et de la noix vomique.

**Indications.** — Toutes les convalescences et en particulier celles des maladies pulmonaires. Anémies, Déficiences organiques, Asthénie post-grippale.

**Mode d'emploi.** — *Adultes:* 1 cuillerée à soupe 3 fois par jour, avant ou après les repas. *Enfants:* De 3 à 5 ans, 1 cuillerée à café. Au-dessus de 5 ans, jusqu'à 2 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-8.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. Guérault, Docteur en Pharmacie

13, rue Pages — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

## PANOSTYL

**Régénérateur total**

à base de sang pur de pur sang bouillonné.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoré.

**Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.**

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour aux repas.

*Aucune contre-indication.*

Prix de vente au public: 21 fr. 80.

Laboratoire N. de C. des M. n° 1018-1.

**PHARMACIE BIOLOGIQUE**

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV°).

Adr. télég. Ibacépède-Paris 102.

(Tél. : Ségur 11-40.)

## PANPHYSEX

**Biosymplex hypophysaire total.**  
Actif par voie buccale.

**Composition.** — Extrait hydroalcoolique d'hypophyse totale (procédé Biosymplex). 1 cc. (35 gouttes) de solution correspond à 0 gr. 25 de glande.

**Mode d'action.** — Panphysex possède toutes les activités hormonales de l'hypophyse, ce « cerveau endocrinien », qui agit sur la croissance, la morphogénie, le fonctionnement des gonades, régularise les métabolismes de l'eau, des lipides et des glucides ; stimule le fonctionnement de toutes les glandes endocrines (thyroïde, etc.)

**Avantages.** — A l'encontre des produits purifiés strictement injectables et dont l'action exclusivement substitutive cesse avec l'administration du produit, Panphysex est actif per os à faibles doses ; Panphysex remplace ou stimule les sécrétions absentes ou déficientes.

**Indications.** — Toutes les insuffisances hypophysaires : Troubles de croissance : Retards de développement statural et pondéral, Syndromes adipo-génitaux, Acromicrie.

Troubles génitaux divers : Infantilisme, Aménorrhées. Dysménorrhées, Oligoménorrhées, Impuissance masculine, Cryptorchidie.

Troubles des métabolismes : Polyurie cryptogénétique, Diabète insipide ; Maigreurs, obésités hypophysaires.

Retard de développement psychique : Attention, Mémoire, Langage, Arriération mentale, Mongolisme.

**Posologie.** — 5 à 20 gouttes en 2 ou 3 prises. Absorber les gouttes 1/2 heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre qu'on laissera fondre lentement dans la bouche.

Commencer par 1 à 2 gouttes par jour et augmenter peu à peu pour atteindre la dose utile au bout d'une semaine de traitement (chez les malades très sensibles, diminuer légèrement la posologie en cas de nervosisme).

Dans la plupart des cas, appliquer le traitement par période de 15 jours, espacées de périodes de repos de 8 à 15 jours.

Ne pas interrompre brusquement le traitement, diminuer graduellement la posologie.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-12.

Prix : le flacon 32 fr. 50.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).  
(Tél. : Alsia 28-51.)

## PANSARCINE FOUCHÈRE

**Indications.** — Asthénie, Anémie, Surmenage physique et intellectuel, Croissance, Suite d'opérations.

**Ampoules buvables. — Composition.**

Chaque ampoule de 10 cc. renferme :

Suc musculaire .....	2 gr. 50
Ext. muqueuse duodénale à 1/10 .....	0 gr. 50
— viande à 1/10 .....	0 gr. 50
— rate à 1/10 .....	0 gr. 50
— thymus à 1/10 .....	0 gr. 25
— surrénale à 1/10 .....	0 gr. 05
Chlorure de manganèse .....	0 gr. 025
Méthylarsinate de fer .....	0 gr. 025
Glycérophosphate de soude crist. ....	0 gr. 25
Alcool à 95° .....	0 gr. 735

1 à 2 ampoules par jour aux repas dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire de Thérapeutique générale du S. E.  
A. FOUCHÈRE, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER.

## PANSTOMASE

1° Ampoules buvables ; 2° Dragées à noyau mou.  
Méthodes de Castle et de Whipple associées.

**Composition.** — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'autre pylorique et de jejunum de porc. Renferme donc à la fois tous les principes antianémiques et tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécérétine.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Apepsies, Asthénies, Cirrhoses du foie, Cholécystites, Tuberculoses, Achylies, Dyspepsies, Gastrites chroniques hypoacides, Entérocrites, Diarrhées.

**Posologie.** — Ampoules buvables : de 1 à 3. Dragées, de 2 à 6 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 42 fr. 70.

24 Dragées : 27 fr. 40.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).  
(Tél. : Mail. 17-77.)

## PANSULINE

■ (Ex-Insuline Buccale FORNET.)

Principe actif :

Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des îlots de Langerhans.

Présentation :

Concentration I (faible) : *Pilules vertes*.

Concentration III (forte) : *Pilules rouges*.

**Posologie.** — 3 pilules 3 fois par jour, *strictement* une demi-heure avant les repas, l'estomac parfaitement vide.

**Indications.** — *Tous les cas justiciables de l'Insuline* (cas graves exceptés). Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoercibles et acétoniques, eczéma, psoriasis, artérites oblitérantes, dysménorrhées, hypertension, cardiopathies.

**Observation.** — Toujours recourir à la concentration forte (concentration III, pilules rouges) au début du traitement.

Prix : 32 francs et 55 francs.

L. N. C. 353-7, 353-8.

Laboratoires THAIDELMO

45, avenue Mozart — PARIS (XVI\*).

(Tél. : Auteuil 01-46.)

## PANTAMINE

Composition et forme :

Granulé dosimétrique renfermant :

1<sup>o</sup> Vitamine A (Huile d'Halibut). 2<sup>o</sup> Vitamine D (Stérols marins).

3<sup>o</sup> Vitamine C (Extrait de Cyathodori).

4<sup>o</sup> Hydrolysat de levures (Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Acides aminés et diastases).

**Indications :**

1<sup>o</sup> **Nourrissons :** États de dénutrition, d'hypotrophie, d'anorexie.

2<sup>o</sup> **Enfants :** Toute la période de croissance. Rachitisme et Lymphatisme.

3<sup>o</sup> **Adultes :** Affections saisonnières. Insuffisance de régimes. Grossesse et lactation.

**Avantages :**

1<sup>o</sup> **Origine naturelle** et équilibre biologique des Vitamines.

Les Vitamines naturelles sont plus actives, mieux assimilées et moins toxiques que les Vitamines synthétiques. Une proportion judicieuse est indispensable pour éviter les antagonismes.

2<sup>o</sup> **Totalité des Vitamines et des Acides aminés.**

Les Avitaminoses simples sont pures ; par contre, les carences relatives sont extrêmement fréquentes. Les acides aminés, les diastases et les bases hexoniques sont les éléments catalytiques indispensables à une bonne assimilation.

3<sup>o</sup> **Concentration maxima et administration facile.**

Granulé à grains très fins, d'absorption très facile, même pour les nourrissons. Action très rapide.

**Posologie.**

**Nourrissons :** 1 mesure de 1 gramme par jour, en 2 ou 3 fois, qu'on peut faire dissoudre dans un peu de lait tiède.

**Enfants et Adultes :** 2 mesures de 1 gramme par jour.

Prix : 29 fr. 30.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII\*). (Tél. : Inv. 20-60.)

## PANTAVOINE

CORBIÈRE

Principes excito-toniques de l'avoine employés pour la première fois en thérapeutique.

**Composition.** — Complexe lipido-protéique, huile essentielle aromatique, hormone, alcaloïdes de l'avoine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action excito-tonique sur le système neuro-musculaire.

**Indications.** — Asthénies de toute origine, Insomnie, Oligurie, Impuissance sexuelle, Diabète, Anémie et asthénie des coloniaux, Surmenage des intellectuels.

**Posologie.** — 6 à 10 comprimés par jour, avant les repas.

**Présentation.** — Comprimés. Boîte de 60.

Prix : 19 fr. 40.

Produit naturel, puissant, dénué de toute toxicité.

Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés Corbière, S. A.

27, rue Desrenauds — PARIS (XVII\*).

(Tél. : Carnot 78-11.)

## PANTOCAÏNE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Chlorhydrate de p-butylaminobenzoyl-diméthylaminoéthanol.

**Propriétés.** — Anesthésique local non irritant, d'action intense, rapide et de longue durée. La PANTOCAÏNE est environ dix fois plus active que la cocaïne et ne figure pas au tableau B. Sa solution aqueuse supporte l'ébullition prolongée et peut être additionnée de Suprarinine (adrénaline).

**Indications et dosage des solutions.** — Pour l'anesthésie des muqueuses. En O. R. L. : 1 à 2 %. En urologie : 0,10 à 0,20 %. En ophtalmologie : 0,25 à 1 %.

**Présentation.** — Tube de 10 comprimés à 0 gr. 10 pour la préparation des solutions (éviter toute trace d'alcali dans la verrerie).

Flacon de 25 cc. d'une solution à 2 %.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII\*).

Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 g. 01 de Pantopon « Roche »,  
= 0 g. 50 de teinture d'opium,  
= 0 g. 025 d'extrait d'opium,  
= 0 g. 005 de morphine.

**Posologie et modes d'emploi.**

Voie buccale :

### PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0 g. 01 de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

*Adultes* : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

*Enfants* : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

### PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(Flacon de 20)

(1 comprimé = 0 g. 01 de Pantopon « Roche ».)

*Adultes* : 1 à 3 par jour et plus.

Voie Hypodermique :

### PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cm<sup>3</sup> = 0 g. 02 de Pantopon « Roche ».)

Boîtes de 6 et 12 Ampoules.

*Adultes* : 1 à 2 par jour et plus.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n° 504-25 (poudre), 504-26 (sirop), 504-23 (comprimés), 504-22 (ampoules),

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## PANVIALOR

(Plaquettes de chocolat vitaminées A, B, C, D.)

**Composition.** — Les plaquettes de chocolat de PANVIALOR contiennent les facteurs liposolubles A et D et les facteurs hydrosolubles B et C.

**Indications.** — Toutes les avitaminoses et toutes les carences alimentaires.

**Présentation et posologie.** — En boîtes de 20 plaquettes, dont : 10 plaquettes de vitamines lipo-solubles, enveloppées de papier à bande rouge, dosées à 0 mgr. 58 de vitamine A et 0 mgr. 0025 de vitamine D crist. par plaquette ; — 10 plaquettes de vitamines hydro-solubles enveloppées de papier à bande bleue, dosées à 0 mgr. 4 de vitamine B, crist. et 25 mgr. de vitamine C crist. naturelle par plaquette.

Une plaquette à croquer chaque jour, en alternant : une jour une plaquette rouge, le lendemain une bleue et ainsi de suite. On peut augmenter la dose.

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

**Concessionnaires des Marques des ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Danton 08-11.)

## PANVITA

**Vitaminothérapie Intégrale.**

**Composition.** — Vitamines A, B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup>, C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

**Indications.** — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences vitaminiques, Diabète.

**Deux formes : Comprimés.**

*Liquide* (chaque boîte contient :

Flacon n° 1 : Vitamines hydrosolubles ;

Flacon n° 2 : Vitamines liposolubles.

**Posologie.** — *Nourrissons* : 2 comprimés ou XX gouttes de chaque solution par jour. *Enfants* : 4 comprimés ou XL gouttes. — *Adultes* : 6 comprimés ou LX gouttes de chaque solution.

**Laboratoire A. DEFFARGE,**

**S. Chenilleau, Docteur en pharmacie**

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-608)

**PANXYLON LOGEAIS**  
**INJECTABLE**

**Auto-défense de l'organisme par Immunisation indirecte contre les infections aiguës, subaiguës et chroniques.**

Injections sous-cutanées profondes, atoxiques, indolores et alternées de :

- 1° Cinnaméine (amp. A) :**  
Cinnaméine totale du Miroxylon  
Pereiræ..... 0 gr. 07  
Oleum olivæ neutrum déshyd ... 1 cc.
- 2° Campholine (amp. B) :**  
Camphorate de choline ..... 0 gr. 01 p, 1 cc.

**Pharmacodynamie :**

La Cinnaméine totale **LOGEAIS** est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et naturels.

La Cinnaméine a une action immunogène et leucocytaire intense (Brown-Séquard).

La Campholine joint à son pouvoir cholestérinogène une intense action toni-cardiaque et sympathico-tonique ainsi qu'une augmentation considérable des globules rouges. L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse réalise l'auto-défense de l'organisme.

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Infections aiguës et post-grippales des voies respiratoires, Convalescences médicales et chirurgicales, Traitement adjuvant des affections pulmonaires spécifiques.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule chaque jour, en alternant les ampoules A et B. Dans les cas aigus, injecter simultanément les 2 ampoules A et B.

Avant injection, faire tiédir l'ampoule Cinnaméine et Campholine.

**PANXYLON L 24 % :** Injections modificatrices locales, Fistules, Adénites, Pneumothorax, Plaies atones.

**PANXYLON GRANULÉ :** entre les séries de **PANXYLON** injectable.

**Forme et prix au public :**

- 12 amp. 2 cc. 5 (6 amp. A, 6 amp. B) . 36 fr. 30  
**PANXYLON GRANULÉ.** La boîte 23 fr. 30  
**PANXYLON L** (6 amp. 2 cc. 5).... 29 fr. 30

**Laboratoires**

**des Spécialités Scientifiques LOGEAIS**

22 bis et 24, rue de Sully — **BOULOGNE-SUR-SEINE**  
(Tél. : Molitor 39-50.)

**PAPAINE TROUETTE-PERRET**  
**(Papayol)**

Ferment digestif énergique, extrait du Suc de Carica Papaya ; digère les produits azotés, quelle que soit la réaction de l'estomac, acide, neutre, ou alcaline.

**Indications :**

Dyspepsies sous toutes les formes, Gastro-entérite des nourrissons, Diarrhées.

**Adultes :**

**Élixir** « TROUETTE-PERRET » à la Papaine. Prix : 24 fr. 40.

Un verre à liqueur après chaque repas.

**Cachets** « TROUETTE-PERRET » à la Papaine. Prix : 19 fr. 50.

Un à deux cachets à chaque repas.

**Comprimés** « TROUETTE-PERRET » à la Papaine. Prix : 19 fr. 50.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

**Enfants :**

**Sirop** « TROUETTE-PERRET » à la Papaine. Prix : 24 fr. 40.

**Enfants :** 1 cuillerée à dessert ou à café, suivant l'âge, après chaque repas.

**Nourrissons :** 1/2 ou 1 cuillerée à café avant les tétées ou biberons.

Bien formuler : **Élixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET à la Papaine.**

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — **PARIS (XI<sup>e</sup>)**  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## PAPAVÉRINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, avec effet électif sur les *muscles striés* de tout l'organisme. Dilatateur énergique des coronaires, hypotenseur. Stimulant respiratoire. Équilibrant du système végétatif.

**Indications.** — Angine de poitrine. Spasmes artériels en général. Migraine. Spasmes gastro-intestinaux (constipation, vomissements, hyperchlorhydrie). Spasmes œsophagiens. Asthme, coqueluche, toux quinteuses et émetisantes.

**Présentation.** — Granules titrés à 2 cgr. de chlorhydrate de Papavérine pur.

**Posologie.** — 5 à 12 granules par jour. Chez l'enfant (coqueluche, diarrhées infantiles), débiter par 1/4 de centigramme par année d'âge *pro die*, pour arriver progressivement à 1 cgr. 1/2.

**N. B.** — Le raisonnement sévère appliqué aux alcaloïdes de l'opium oblige les Laboratoires Houdé à restreindre leurs livraisons de granules de Papavérine Houdé.

### Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).  
(Tél. : Nord 40-58.)

## PAPAVÉRYL

Chlorhydrate de papavérine chimiquement pur.

Toxicité extrêmement faible. C'est le moins toxique des alcaloïdes de l'opium. Tableau A.

**Indications.** — Tous les spasmes musculaires lisses. Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc.

**Présentation.** — 1° *Comprimés* à 4 cgr., tube de 20 : prix 25 francs; 2° *Ampoules* de 2 cc. (4 cgr. par ampoule), boîte de 6 : prix 19 francs; boîte de 12 : prix 30 francs. 3° *Suppositoires* à 4 cgr., boîte de 6 : prix 16 francs.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 6 comprimés par jour et plus. 1 à 4 ampoules par jour, en injections sous-cutanées ou intramusculaires. 2 à 5 suppositoires par jour. *Enfants* : 1 cgr. par jour et par année d'âge.

### Laboratoires SAUVAGEON

18, rue Mademoiselle — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 95-13.)

## PAPIER IODOGÈNE EYMONNET à l'iode naissant.

*Toute la révulsion. Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.*

Remplace : Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé. Aucune contre-indication. Non toxique pour le rein.

**Mode d'action.** — La feuille de révulsif est formée de plusieurs papiers accolés, imbibés de produits qui, au contact de l'eau, se décomposent en libérant de l'iode.

**Mode d'emploi.** — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

*Durée d'application* : 2 à 5 minutes : Rubéfaction.

5 à 10 minutes : révulsion simple, égale aux ventouses et sinapismes.

10 à 20 minutes : révulsion moyenne.

30 à 40 minutes : révulsion forte, légère vésication.

Au delà : vésication avec soulèvement de l'épiderme.

**Indications.** — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbagos, sciatiques. Médication sans égale, très aimée de la clientèle. (*Adjuvant de la Chimiothérapie.*)

**Prix** : La pochette deux feuilles : 8 francs.

### Laboratoire du PAPIER EYMONNET

14, Grande-Rue — PONT-DE-VAUX (Ain).

## PAQUETS VÉDÉ

**Antigastralgiques du Docteur de Montmorot.**  
Hyperchlorhydrie et affections du tube digestif.

Réalisant une chimiothérapie saturante totale de l'acidité gastrique. Les résultats obtenus ne sont nullement comparables à ceux enregistrés avec une poudre de saturation quelconque, les produits entrant en composition étant d'une pureté chimique absolue.

Hydrate de magnésie extra-blanc et pur, Bicarbonate de soude sursaturé raffiné n° 1, Carbonate de chaux « précipité extra-léger », Kaolin pur blanc lavé, Essence d'anis de France.

2 à 4 paquets par 24 heures aux repas.

Boîte de 18 paquets : 13 fr. 90 pour 8 jours.

Boîte de 36 paquets : 23 fr. 20 pour 18 jours.

Boîte de 100 paquets : 55 fr. 10 pour 45 jours.

**Société des Laboratoires de MONTMOROT**

G. de MONTMOROT, pharmacien

12 bis, rue Keppler — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## PARADOLINE

### AMPOULES BUVABLES

**Indication.** — *Syndrôme Douleur* (Douleurs d'accouchement, Nausées de la grossesse, Toutes Coliques, hépatiques et néphrétiques principalement. Crises rhumatismales.)

**Posologie.** — Absorber le contenu d'une ampoule tous les quarts d'heure jusqu'à sédation complète de la douleur. Une heure maximum.

**Composition.** — Romarin stabilisé, Boldo, Buchu, Pichi, Uva-Ursi, Piscidia, Chirette, Mais, Carbonate acide et Salicylate de Soude, Artichaut.

**Contenance.** — 5 ampoules de 10 cc. **Prix** : 28 fr. 80.  
L. N. C. 1270-6.

### ÉLIXIR

**Indication.** — *Cure d'entretien hépatique*, complément des stations thermales.

**Posologie.** — *Enfants* : de 2 à 4 ans, XX à XXX gouttes par jour en 2 fois ; 4 à 6 ans, XL gouttes par jour en 2 fois ; 6 à 8 ans, LX gouttes par jour en 2 fois.

*Cadets* de 8 à 15 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour  
*Adultes* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

La PARADOLINE LIQUIDE se prend le matin à jeun et avant le repas du soir, diluée dans 6 fois son volume d'eau minérale.

**Composition.** — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate, Salicylate de Sodium chimiquement purs ; Boldo, Chirette, Artichaut, Romarin.

**Contenance.** — 100 cc. **Prix** : 22 fr. — L. N. C. 1270-5

### PARADOLEX

(Paradoline externe).

Liniment concentré en flacon stilligoutte.

S'emploie en applications concurremment avec la Paradoline ampoules buvables, dont il renforce considérablement l'action dans les douleurs rhumatismales, rénales, génito-urinaires.

Analgésique externe O. R. L.

**Contenance** : environ 20 applications. **Prix** : 17 fr. 60.  
L. N. C. 1270-4.

Distribution assurée.

**Laboratoire P. CHEVILLON**

Rue de la Paix — CROIX-DE-VIE (Vendée).

## PARAIODE

Association du complexe  $\text{NaIO}_3$ . 5NaI avec des sels stabilisateurs.

**Propriétés.** — Antiseptique incolore, dépourvu de toxicité. Agit en libérant de l'iode naissant, uniquement au niveau des foyers infectieux à l'exclusion des tissus sains. N'est jamais irritant et réussit rapidement et sûrement dans de très nombreux cas où les autres antiseptiques ont échoué (leucorrhées rebelles, cystites sénilles, etc.).

**Indications.** — Chirurgie générale : Désinfection et désodorisation des plaies. Urologie : Urétrites, cystites, etc. Gynécologie : Vaginites, métrites, toutes leucorrhées. Voir aussi : **Ovules au Paraïode.**

**Doses.** — Le Paraïode est délivré sous forme de solution concentrée (à 10 p. 100). Il s'emploie à la dose de 1 à 5 cuillerées à dessert par litre d'eau.

Formuler un flacon de *Paraïode*.

Enregistré au L. N. C. n° 1484-4.

**Laboratoire du PARAIODE**

**R. HARAND, Pharmacien**

23, rue Doudeauville — PARIS (XVIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Montmartre 19-70.)

## PARATOXINE du Prof. LEMOINE

Contre la Tuberculose (Lipoides biliaires).

**Deux formes** : 1° Boîte de 15 ampoules 1 cc. *Paratoxine A* et en boîte de 8 ampoules 2 cc. pour injections sous-cutanées ;

Boîte de 30 pilules de 0 gr. 20 pour médication interne.

2° *Paratoxine B*, en boîte de 6 ampoules de 5 cc. pour injections intralaryngées ; Capsules pour médication interne.

**Action thérapeutique et usages.** — Préconisée aux diverses périodes de la tuberculose en injections sous-cutanées ou intralaryngées, modifie le terrain et constitue le traitement de choix de la tuberculose.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Paratoxine A* : En injection sous-cutanée de 1 cc. ou 2 cc. par jour et plus. En pilules 2 à 6 par jour comme adjuvant de la médication sous-cutanée.

*Paratoxine B* : En injection intralaryngée tous les 2 jours pour laryngite bacillaire. En capsules dans les cas de diarrhée bacillaire.

La *Paratoxine* présente le grand avantage d'être inoffensive. Les hautes doses sont en général inutiles. Chez les enfants au-dessous de 12 ans, les doses doivent être diminuées de moitié.

Les injections doivent se faire assez profondément sous la peau à la limite de la couche graisseuse et du muscle.

**Prix** : Ampoules de 1 et 2 cc., 34 fr. 80 ; 5 cc., 25 francs ; Pilules : 19 fr. 70.

Enregistrée au L. N. C. M. sous les n°s 240-9 à 240-10.

**Laboratoires DUCATTE**, 191, rue Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Opéra 68-80.)

## PARATYRONE

**Composition.** — La Paratyronne est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insuffisances parathyroïdiennes, tétanies, états spasmodiques, ulcères digestifs, syndromes spasmodiques douloureux, rhumatisme chronique, certains troubles psychiques, épilepsie, chorée, tics, cataracte, oto-spongieuse, otite scléreuse, ulcères variqueux, etc.

**Présentation et posologie.** — La PARATYRONE est présentée en flacons de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. Les flacons, destinés en principe aux injections, s'utilisent aussi par voie orale (XXXV-VL gouttes = 1 cc.). Ampoules (boîte de 12) à 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée. Suppositoires (boîte de 10), un par jour. Solution pour pulvérisations nasales.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA, dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 08-11.)

## PARAVEININE

Gouttes.

**Composition.** — Iodoépine, Extraits fluides de Marron d'Inde, Hamamelis, Cupressus, Alcoolés de Piscidia et d'Anémone Pulsatille.

**Indications.** — États variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Varicocèles, Artério-sclérose, Accidents de la Puberté et de la Ménopause.

**Posologie.** — XXV gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau.

Prix : 18 fr. 10.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharm<sup>ie</sup>  
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

## PARÉMANOL

Pâte médicamenteuse cicatrisante.

**Composition.** — Sous-nitrate de bismuth et benzoate de cholestérine, dans un excipient spécial.

**Propriétés.** — Kératinisant et antiprurigineux. Préventif et curatif. Ni caustique, ni toxique. Ne contient pas d'anesthésique.

**Indications.** — *Accidents post-radiothérapeutiques*: desquamation sèche, radioépidermites.

*Accidents post-héliothérapeutiques*: coups de soleil, érythèmes après exposition aux rayons U-V. Brûlures du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>e</sup> degré, eschares, intertrigo, engelures et crevasses.

Laboratoires BRUNEAU et Cie

Docteurs en Pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 61-46.)

## PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le Paroxyl n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse ni stupéfiante.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action régulière et sûre.

Effet non seulement calmant, mais curatif.

**Indications.** — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

**Posologie.** — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an	...	X à XXX	gouttes.
— de 1 à 5 ans	.....	XX à LX	—
— de 5 ans et au-dessus	..	XX à C	—
Adultes	.....	XXX à C	—

Prix : 14 fr. 70.

THIRIET et Cie

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

(Tél. : 40-65.)



## PARULCINE

**Composition.** — Pepsine injectable en solution neutre.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 10 de Pepsine.

**Indications.** — Ulcus gastro-duodéal. Lithiase biliaire. Asthme.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires, à raison de 3 par semaine (commencer par 1/4 de cc., en augmentant de cette quantité, jusqu'à 2 cc.) série de 15 injections.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## PASSIBROMINE

### Composition :

Bromure de calcium .....	0,20
Bromure de sodium .....	0,40
Phényl-éthylmalonylurée.....	1 cgr.
Tio cratægus .....	0,15
Extrait fl. passiflore .....	0,25
Extrait fl. valériane .....	1,50
Pyramidon .....	0,02
Extrait fl. de serpolet.....	0,02
Extrait fl. de houblon .....	0,01
Glycérine, sirops écorce orangeamère et valériane aa... Q. S. p. 1 cuillerée à café.	

**Présentation.** — Sirop.

**Posologie.** — Comme *équilibrant du système nerveux* : 1 cuillère à café à chaque repas. Comme *sédatif des insomnies* : 1, 2 ou 3 cuillères à café le soir au coucher dans une infusion ou du lait.

**Indication.** — Nervosisme.

Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE  
20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## PASSICARBONE

Charbon animal purifié. Charbon végétal.

Charbon végétal activé.

Extraits sédatifs végétaux (Passiflorine).

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que, suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine, ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer des charbons d'origine variée. C'est à cette formule que répond le *Passicarbonate*.

D'autre part, les affections gastro-intestinales s'accompagnent souvent de réactions spasmodiques, de troubles neuro-végétatifs ou de troubles psychiques. L'addition aux charbons des sédatifs végétaux qui ont fait le succès de la *Passiflorine Réaumur* font du *Passicarbonate* un remède complet dans tous ces cas.

**Composition.** — Le *Passicarbonate* est un granulé fondant dont 5 grammes (soit pratiquement une cuillerée à café) contiennent 2 grammes, soit 40 p. 100, de charbons sélectionnés et actifs et la valeur d'une cuillerée à café de *Passiflorine*.

### Usages :

*Aérophagie* et formes diverses des dyspepsies flatulentes.

*Dyspepsies nerveuses.*

*Gastrites diverses.* — Gastrites infectieuses, gastrites post-anesthésiques, gastro-entérites, etc.

*Ulcères.*

*Affections intestinales.* — Colites ou typhocolites, Colibacillose, diarrhées diverses, entérites, grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, fermentations intestinales.

*Affections hépatiques* (Ictère, lithiase biliaire, etc.).  
*Intoxications.*

**Doses.** — 1 ou 2 cuillerées à café aux repas.

La boîte : 21 fr. 10.

G. RÉAUMOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie

115, rue de Paris — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
R. C. Seine 265.702 B.

## PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états  
névropathiques.

**Composition.** — Une cuill. à café contient  
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*  
*nata* ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;  
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*  
*cantha*.

**Action.** — La *Passiflore* diminue la tension  
artérielle, régularise l'influx nerveux dans  
le domaine du grand sympathique et est un  
sédatif et un antispasmodique de premier  
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la  
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin  
que les auteurs américains ont comparé  
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-  
tion tonocardiaque et équilibrante du sys-  
tème nerveux est bien connue (Huchard,  
Renon, H. Leclerc, etc.).

**Indications.** — Tous états névropathiques :  
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-  
sommie nerveuse, troubles fonctionnels du  
cœur d'origine nerveuse (palpitations,  
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la  
vie génitale, etc.

**Posologie.** — Comme médicament équi-  
librant du système nerveux : une cuillerée à  
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois  
cuillerées à café le soir.

Prix : 21 fr. 20.

**G. RÉAUBOURG et Cie,**

Docteur en Pharmacie,

115, rue de Paris,

BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

## PASTILLES DRYVA A LA PROBIAMIDE

Formule :

Para-amino-phényl-sulfamide. cinq milligr.  
Chlorhydrate d'amylocaïne.. cinq dixièmes de milligr.  
Alcoolature de racines d'aconit. Trois milligr.  
Sulfo-gaiacolate de potasse.. 0 gr. 005

Pour une pastille de 1 gr. n° 40.

Les Pastilles DRYVA à la Probiamide unissent les  
produits techniques et pectoraux classiques au para-  
amino-phényl-sulfamide, dont les propriétés sont  
bien connues.

Elles forment un bonbon agréable au goût, facilement  
accepté par les enfants comme les adultes. Elles sont  
recommandées contre la grippe, les rhumes de cer-  
veau, les maux de gorge, les bronchites, etc...

La boîte de 40 pastilles : 11 fr. 15.

Inscrit au Laboratoire national de Contrôle]  
des Médicaments sous le n° 900-58.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## PASTILLES HOUDÉ au Chlorhydrate de cocaïne.

Pastilles dosées à 1 milligramme de Chlorhydrate  
de cocaïne.

**Indications.** — Stomatites, angines, pharyngites  
aiguës. Calmant des gastralgies, des vomisse-  
ments. Excellent sédatif des toux nerveuses et  
des hoquets. Calmant des irritations laryngées.  
Véritable gargarisme sec.

**Doses.** — 6 à 12 pastilles par jour, suivant l'âge.

**Formes diverses.** — Cocaïne simple ; Cocaïne et  
chlorate de potasse ; Cocaïne et borate de soude ;  
Cocaïne et menthol ; Cocaïne, borate et chlorate ;  
Cocaïne, borate et menthol.

N. B. — La pénurie de Cocaïne oblige les Laboratoires  
Houdé à exécuter les commandes partiellement en  
Pastilles Houdé à la Stovaine.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 40-58.)

## PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille renferme les principes actifs suivants :

Chlorhydrate de cocaïne .....	0,0002
Chl. d'amyléine (stovaine) .....	0,0003
Menthol .....	0,005
Borate de soude .....	0,02
Chlorate de potasse .....	0,06

Boîte de 5 paquets de 12 (enveloppement automatique).

**Mode d'action.** — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

**Indications.** — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...).

**Mode d'emploi.** — 8 à 10 pastilles par jour.

Durée : 7 à 8 jours.

Prix : 6 francs.

**Établissements GOY**

23, rue Beautreillis, PARIS (IV<sup>e</sup>). — Tél. : Archives 34-68.)

## PASTILLES SÉCLO

Formule provisoire :

Carbonate de chaux .....	0 gr. 15
Kaolin lavé .....	0 gr. 09
Carbonate acide de sodium .....	0 gr. 18
Pepsine .....	0 gr. 018
Excipient sucré aromatisé .....	Q. S.

pour une pastille de 1 gramme.

**Propriétés.** — Calme les douleurs d'estomac, dues soit à un déséquilibre du système sympathique, soit à l'hyperchlorhydrie, soit à une congestion locale pouvant être le début d'un ulcère. Favorise la digestion.

**Indications.** — Mauvaise digestion. Lourdeurs et brûlures stomacales. Ballonnements. Eructations. Hyperchlorhydrie.

**Posologie.** — 2 à 5 pastilles au moment des crises.

À titre préventif : 6 à 9 pastilles par jour.

**Emploi.** — Ne pas croquer, laisser fondre lentement dans la bouche.

Prix :

Le tube de 10 pastilles .....	5 fr. 80
La boîte de 50 pastilles .....	16 fr. 30
La boîte de 100 pastilles .....	28 fr. 20

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-5.

**Laboratoires SÉCLO**

O. COGNÉ, Pharmacien.

6, rue Adophe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## PASTILLES VITA-BCD

**Composition.** — Association phospho-vitaminée répondant à la formule suivante :

Glycérophosphate de chaux .....	0 gr. 03
— de fer .....	0 gr. 002
Inositolphosphate de chaux et de magnésie .....	0 gr. 02
Vitamine B <sub>1</sub> .....	0 gr. 000025
— C .....	0 gr. 005
Ergostérol irradié du Codex français .....	0 gr. 00001
Excipient aromatisé .....	Q. S.

Pour une pastille.

**Mode d'action.** — Reconstituantes, reminéralisatrices, toniques du système nerveux.

Antinévritiques, antiscorbutiques, antirachitiques.

**Indications.** — Asthénie, Neurasthénie, Convalescences, Déchéances organiques, Carences diverses, Décalcification ou rachitisme, Parésies, Gingivites, Hémorragies.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 3 comprimés au milieu de chacun des 2 principaux repas.

Enfants : une demi-dose.

**Laboratoires Français**  
de Produits Chimiques et Pharmaceutiques  
40-42, rue François-1<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PÂTE A L'EAU ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.  
Pâte à l'eau stable, poreuse, aseptique, porphyrisée. Ne renferme ni vaseline, ni corps gras, souvent mal tolérés, facile à enlever.

Deux formes :

**Aloplastine simple.**

**Indications.** — Eczémas suintants, dermatites irritables, érythèmes fessiers, etc.

**Aloplastine Ichthyolée à 5 p. 100.**

**Indications.** — Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermato-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures.

**Laboratoires Biologiques de**  
**L'ÎLE-DE-FRANCE**

A. DÉTROIS, Pharmacien

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## PÂTE GINGIVALE A L'ACÉTYLARSAN

Préparation où se trouvent associés l'ACÉTYLARSAN spirillicide bien connu, et le ricinoléate de sodium, savon bactéricide, antitoxinique et générateur l'anti-virus.

**Indications.** — Traitement préventif des infections fusospirillaires, des gingivites et des stomatites aiguës ou chroniques. Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Prévention de la carie dentaire.

**Mode d'emploi.** — Dans les cas de lésions pyorrhéiques tendues ou importantes, appliquer la pâte sur les gencives pendant 15 minutes 1 fois par jour, après brossage préalable à l'aide d'une brosse dure.

Dans les cas légers ou à titre prophylactique, employer la pâte gingivale comme une pâte ordinaire, suivant les règles habituelles.

**Présentation.** — En tube d'étain.

Prix de vente, le tube : 9 fr. 90.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulsen Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## PATE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.  
(Voir à Sirop Mireille.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : Chlorhydrate d'amyléine et chlorate de potasse). Même saveur plaisante.

Prix au public : 7 fr. 50.

**Laboratoires LEGENDRE**

Section D.-S. — B. P. COURBEVOIE (Seine).

Dépôts généraux pour la vente en gros,  
France, Colonies et Protectorats :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,  
à Bruxelles-Maritime.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle  
des Médicaments sous le n° 1045-1.

## PATE VITAMINÉE HALIVITE

Pansoment biologique éclaircissant aux vitamines naturelles.

### Composition

Huile de foie de poisson enrichie en vitamines A et D.....	23 gr. 90
Borate de soude.....	6 gr. 80
Oxyde de zinc.....	34 gr. 10
Excipient glycérolé et parfum. Q. S. pour 100 gr.	

**Présentation.** — Pâte molle, onctueuse, facile à étaler et à enlever.

**Propriétés.** — L'huile de foie de poisson, par sa composition même et par ses vitamines, est un facteur indéniable de cicatrisation, de kératinisation normale des tissus, en favorisant la prolifération cellulaire.

**Indications.** — Plaies de toutes natures, plaies atones, ulcères, plaies mastoïdiennes, suppurations nasales et palpébrales, engelures, brûlures, coupures, crevasses et plaies à cicatrisation difficile, eczéma.

**Emploi.** — Nettoyer la plaie avec un peu d'alcool ou d'éther, étaler la pâte largement, couvrir d'une gaze, puis d'une bande, garder le pansoment 12 heures. Refaire les applications en opérant de la même manière jusqu'à amélioration.

Prix : 16 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 610-12.

**Laboratoires SECLO, G. COGNÉ, Pharmacien.**  
6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).

## PAVERINOL LALEUF

**Composition.** — Chaque capsule contient très exactement :

Papavérine Chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

**Propriétés et indications.** — Puissant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire.

Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

**Forme.** — Capsules glutinisées.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 à 12 capsules par 24 heures.

**Durée moyenne des unités de vente :** 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :  
Étui de 60 capsules : 25 fr. 80.

**Laboratoires LALEUF**

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie  
51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Trocadéro : 62-24.)

## PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium.)

*Hypnotique, sédatif, analgésique.*

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlor-hydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.  
0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.  
Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

**Indications.** — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

**Formes et posologie.** — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

*Dose* : 1 ampoule à la fois ; 2 par jour.

*Dragées de Pavéron* dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. —

*Dose* : 1 à 2 dragées à la fois.

### Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## PAVONOL

Alcaloïdes totaux de la Jusquiame associés à la Morphine et au Camphre.

**Composition.** — Morphine (Chlorhydrate) 0 gr. 01, Codéine (Phosphate) 0 gr. 01, Extrait hydro-alcoolique de Jusquiame 0 gr. 02, Sulfo-camphonate de sodium 0 gr. 10, Sérum physiologique camphré Q. S. pour une ampoule de 2 cc.

**Propriétés.** — Sédatif du système nerveux, Toni-cardiaque, Neutralisation des phénomènes douloureux en toutes circonstances.

**Forme et posologie.** — Une à deux ampoules de 2 cc. par 24 heures en injections hypodermiques.

Ce médicament s'emploie également par voie buccale ou en petit lavement à garder, par voie anale.

Boîte de 8 ampoules de 2 cc. Prix : 31 francs.

### Laboratoire CASTEL

1, Place de la Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien,

Ingénieur-chimiste, licencié ès sciences.

## Gastro-Entéro PECTINE-GALLIER

Modificateur de la Flore Intestinale par agglutination des microbes pathogènes.

**Indications.** — Toutes affections gastro-intestinales des nourrissons, des enfants et des adultes.

**Mode d'action.** — Agit à la fois par sa grande capacité de gonflement, d'où action sur le péristaltisme intestinal, son pouvoir agglutinant remarquable vis-à-vis des bactéries de la flore intestinale pathogène, son pouvoir d'adsorption considérable, son action désintoxicante, son action hémostatique.

**Forme liquide :** Solution colloïdale, visqueuse et inaltérable de Pectine pure de pommes titrée à 8 % de principes pectiques : flacons de 125 cc. et 250 cc.

**Forme poudre :** légèrement sucrée, titrant 16 % de principes pectiques : boîtes de 60 gr. et 120 gr.

**Posologie :** Voie buccale — voie rectale.

AGE	PAR DOSE.	
Jusqu'à 2 semaines	1/2 cuillerée à café.	Doses à répéter 3 à 4 fois par jour.
De 2 semaines à 1 mois	1 cuillerée à café.	
De 1 mois à 4 mois	2 cuillerées à café.	
De 4 mois à un an	1 cuillerée à soupe.	
Au-dessus de 1 an	1 à 2 cuillerées à soupe.	
Adultes	2 à 3 cuillerées à soupe.	

**Prix : Forme liquide** { Flac. de 125 cc : 21 fr. 10  
Flac. de 250 cc : 37 fr. 55

**Forme poudre** { Bte de 60 gr. : 21 fr. 10  
Bte de 120 gr. : 37 fr. 55

### Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII°)  
(Tél. : Sufren 46-57.)

## PECTINE OBERLIN

Une cuillerée à soupe contient :

Benzoate de soude.....	0 gr. 50
Eau de laurier-cerise.....	0 gr. 20
Sulfogaïacolate de potasse.....	0 gr. 50
Sirop de morphine.....	6 gr. 60
Sirop de punch.....	Q. S. P. 20 gr.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires.

1 cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par 24 heures.

**Sous réserve**  
des possibilités de fabrication.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. Trudaine 14-73.

## PECTOCANFOR

ou COMPRIMÉS DE SIROP AU SOLUCAMPBRE

**Composition.** — Même formule que le Sirop au Solucampbre : Solucampbre, Ipéca, Codéthyline, Codéine, Ephédra, Séné.

**Actions thérapeutiques.** — Calme immédiatement la toux, relève le cœur et facilite la respiration. Favorise l'expectoration.

**Indications.** — Les indications sont les mêmes que celles du Sirop au Solucampbre, c'est-à-dire : toux nerveuses, toux infectieuses, toux des tuberculeux, asthme, emphysème et rhume des foin.

**Posologie.** — Deux comprimés *Pectocanfor* valent une cuillerée à soupe de Sirop au Solucampbre.

**Adultes :** 2 à 8 comprimés par jour, suivant les cas, avec un peu d'eau ou de tisane.

**Enfants :** 1 à 3 comprimés par jour suivant l'âge.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Régnauld — COURBEVOIE.

## PECTOGÈNE MONSÉGU

**Une seule forme : Sirop.**

Antiseptique pulmonaire.

Puissant calmant de la toux.

**Composition.** — Eucalyptol, bromoforme et codéine purs, belladone, eau laurier-cerise, éphédrine, teinture d'aunée et de primevère (expectorants).

**Caractéristiques.** — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces dans le traitement de la toux. Effet rapide, souvent surprenant, tolérance parfaite.

**Indications.** — Coqueluche, Grippe, Asthme, Toux des tuberculeux, Bronchites, Toux rebelles.

**Posologie.** — *Adultes :* 4 cuillerées à soupe par jour.  
*Enfants 8 à 10 ans :* par cuillerée à dessert. Au-dessous de 5 ans : par 1/2 cuillerée à café.

Prix de vente : 18 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1495.

Littérature et échantillons.

**Laboratoires Pharmacologiques de Guyenne.**

E. MONSÉGU, pharmacien,

PONT-DE-LA-MAYE, près Bordeaux (Gironde).

(Tél. : 32. Le Pont-de-La-Maye.)

## PECTORAL FOUCHÈRE

**Composition.** — Dionine, Sulfogaïacolate de potasse, Aconit, Belladone, Droséra, Écorces d'oranges amères, Laurier-cerise, Tolu.

**Posologie :**

*Adultes :* 3 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* Au-dessus de 10 ans, 3 cuillerées à dessert par jour.

**Indications.** — Toutes affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande.

**Laboratoire de**  
**Thérapeutique Générale du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,**  
**RIVE-DE-GIER.**

## PECTORAL GOBEY

Sans opium.

**Composition.** — Sirop à base d'extraits végétaux, sans aucun dérivé opiacé.

**Indications.** — Bronchite, Laryngite, Grippe, Séquelles de Coqueluche.

**Présentation.** — Flacon de 150 cc.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe.

*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

*Nourrissons* : 1 à 2 cuillerées à café.

Prix au public : Le flacon : 14 fr. 70.

**Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

Laboratoires Gobey

S. A. au capital de 880.000 francs.

R. C. Seine 223-195 B.

39, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## PECTOSÉDYL

**CALMANT DE LA TOUX**

**Composition :**

Dionine .....	0 gr. 004
Codéine .....	} aa 0 gr. 005
Extrait de jusquiame ..	
Hélénine.....	0 gr. 003
Benzoate de soude .....	0 gr. 20

pour un comprimé glutinisé.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës ou chroniques de l'appareil respiratoire. **Particulièrement indiqué chez les Tuberculeux pulmonaires qu'il soulage sans danger d'hémoptysie.**

**Posologie.** — Dose moyenne chez les adultes : 4 à 10 comprimés par 24 heures.

**Présentation.** — Boîte de 24 comprimés.

**Prix de vente :** 18 fr. 70.

**Laboratoires du Pectosédyl.**

Madame ALCHINGER, Pharmacien

2 bis, rue Arthur-Rozier

PARIS (XIX<sup>e</sup>)

(Tél. : NORd 06-96.)

## PÉDIOZÉMA

(Granulés)

**Composition.** — Médication oposéotherapique à base de plasma sanguin de jeunes bovidés et d'organes frais de jeunes animaux.

**Propriétés.** — Désensibilisation. Libération des émonctoires. Brassage endocrinien.

**Indications.** — Eczéma infantile. Erythème fessier.

**Présentation et posologie.** — Boîte de granulés aromatisés à prendre à jeun, dissous dans un peu de lait, à raison de 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Prix :** 15 fr.

**Laboratoire biologique VALTRY**

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

## PÉLARGON DE NESTLÉ

Lait en poudre pour nourrissons,  
entier et acidifié,

destiné à l'alimentation régulière ou diététique du nourrisson bien portant ou du nourrisson délicat ou malade.

C'est le lait en poudre antidyspeptique par excellence.

Deux formules :

**Pélagon ORANGE**, additionné de sucre et de farine ; pour l'alimentation régulière du nourrisson bien portant. Tout prêt, n'exige aucune cuisson, à étendre d'eau bouillie tiède et battre au fouet.

**Pélagon VERT**, sans sucre ni farine ; pour l'alimentation diététique des nourrissons malades, le dosage des hydrates de carbone étant laissé à l'appréciation du médecin.

**Indications.** — Alimentation des prématurés, dystrophiques dyspeptiques, vomisseurs, eczémateux ; et des coquelucheux, pneumoniques, cysto-pyélitiques.

Vente réglementée (tickets de la carte de lait concentré).

Prix :

Pélagon Orange, la boîte de 500 gr... Au cours.

Pélagon Vert, la boîte de 250 gr..... Au cours.

**Société NESTLÉ**

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

## PELVICONES

Suppositoires sédatifs, antispasmodiques, décongestionnants. Coliques néphrétiques, Cystites, Cystalgies, Troubles prostatiques, Règles douloureuses, Hémorroides.

Sans toxique, ni barbiturique.

**Composition :**

Chlorhydrate de papavérine.....	0,03
Extrait stabilisé valériane.....	0,10
— kawa-kawa .....	0,05
— d'Esculus.....	0,05
— ciguë .....	0,01
— cypressus .....	0,02
— jusquiame .....	0,01

**Posologie :**

Un à deux suppositoires par 24 heures.

Se conformer aux prescriptions du médecin.

**Prix :** 25 fr. 50 la boîte.

Enregistré au Laboratoire Nationale de Contrôle des Médicaments sous le n° 2000-3.

**Laboratoires J. FUMOUZE**

156, boulevard Ney — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Marcadet 55-39.)

## PÉPIONE

Gouttes.

**Formule.** — Iode pur, Peptone, Essence citron, Eau distillée.

**Présentation.** — En flacon compte-gouttes.  
(19 fr. 50.)

**Indications thérapeutiques.** — Contre le lymphatisme, scrofule, asthme, emphyseme, goitre, obésité, artériosclérose, affections du cœur et des vaisseaux, goutte, rhumatismes.

**Mode d'emploi :**

**Adultes :** XX gouttes 2 fois par jour.

**Enfants :** V à X gouttes 2 fois par jour, suivant âge.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-21.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26 05, 26-06.)



## PEPSINACID

(Granulé)

La médication chlorhydrique-pepsique, présentée sous une forme stable, d'un goût agréable, de conservation parfaite et d'activité contrôlée par digestion artificielle.

**Composition.** — 1 cuiller à café (3 gr. de granulé) renferme : V gouttes HCl dilué, 0,25 de pepsine.

**Indications.** — Troubles gastriques liés à l'Hypochlorhydrie, Pesanteurs, Anorexie, Troubles sympathiques post-prandiaux.

Troubles intestinaux : diarrhée par insuffisance gastrique, colites.

Traitement complémentaire dans les anémies graves. Dénutrition. Anachlorhydrie des néoplasiques.

**Mode d'emploi.** — 1 cuiller à café de granulé dissous dans la boisson habituelle, tout au début et pendant les repas.

Laboratoire LACHARTRE

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (V°).

(Tél. : Gob. 77-81.)

## PEPSINE-FERMENT

**Solution de suo glandulaire gastrique.**

Possède, comme tout produit glandulaire, une action d'ordre général. Il engendre, par l'intermédiaire des centres nerveux, un réflexe régulateur sur le débit pepsique et excite la fonction hépatique.

D'où son efficacité constante et sûre dans toutes les :

**Dyspepsies, Hyper et Hypo**

(Inappétence, Flatulence, Gastralgie, Hépatisme).

A employer comme agent de la suralimentation.

**Emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau une demi-heure avant chaque repas.

**N. B.** — Bien spécifier une demi-heure avant le repas, afin que le Pepsine-Ferment introduit dans la circulation puisse produire son maximum d'effet au moment même de la digestion.

Prix du flacon : 25 francs (12 jours de traitement).

Inscrit au Laboratoire national de Contrôle.

Produits SAMY

Laboratoire LÉCUIER

5, place Lévis — PARIS (XVII°).

(Tél. : Carnot 49-51.)

## PEPSO-PANCRÉ-MALT WANDER

**Composition.** — Pepsine, pancréatine glutinisée, extrait de malt (diastases, vitamines B).

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Insuffisances digestives ; digestions pénibles, dilatation et pesantier de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

**Doses.** — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas, dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

P. BASTIEN, Pharmacien

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## PEPTALMINE

**Peptones de Viande et de Poisson**

**Extraits d'Œuf et de Lait**

**Farine de blé dans l'enrobage.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

**Indications.** — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulé, une heure avant chacun des trois repas.

*Enfants* : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 21 fr. 30 ; granulé : 21 fr. 80.

Pour 10 jours de traitement.

Fabrication assurée.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

## PEPTALMINE MAGNÉSÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholestyrites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillerées de café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

*Cholagogue* : 2 cuill. à café de granulés le matin à jeun. Répéter cette dose 1/4 d'heure après la première.

*Enfants* : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées, 21 fr. 30 ; granulés, 21 fr. 80.

Pour 10 jours de traitement.

Fabrication assurée.

Laboratoire des produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

## PEPTARGYL AGUETTANT

Srop peptoné à teneur élevée

d'Argent colloïdal

Anti-infectieux, Antitoxique, Antithermique,

très actif,

à grande facilité d'emploi.

Aucun des inconvénients des sels d'Argent.

**Indications.** — Etats infectieux buccopharyngés et du tube digestif. Etats septicémiques. Gripes, amygdalite, sinusite, bronchite, congestion pulmonaire, colites, gastro-entérites, dysenteries, fièvre typhoïde, phlébites, dyscrasies sanguines. Staphylococcies : furonculose, anthrax, acné.

La pénétration parfaite de l'argent colloïdal étend son action à tout l'organisme.

**Dose.** — *Préventive* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

*Curative* : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Une demi-heure avant les repas, avec un peu d'eau.

Particulièrement indiqué pour les enfants, ils en sont friands ; on leur donne 1/2 dose.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-3.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

## PEPTICOL

**Formes.** — Elixir de goût aromatique, très agréable, absorbé sans répugnance, même par les tout jeunes enfants.

Granulé aromatisé, permettant un usage plus commode aux personnes prenant leurs repas hors de leur domicile.

**Composition.** — Peptones de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de farine de blé. Glycérine, Alcool.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-choc complète ; spécifique des intoxications d'origine alimentaire ; excite l'appétit et facilite la digestion en augmentant et régularisant les sécrétions des glandes salivaires, des muqueuses gastriques et intestinales ; favorise les sécrétions et le péristaltisme du gros intestin.

**Indications.** — *Urticaire, Manque d'appétit, Mauvaises digestions, Intolérances stomacales, Prurits, Somnolences après les repas, Flatulences, Asthme, Orgelets.*

**Posologie :**

Liquide ou granulé.

*Enfants* : une demi-cuillerée à café.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café, 15 minutes avant les repas.

**Prix au public :**

*Elixir*, le flacon : 17 fr. 60.

*Granulé*, la boîte : 17 fr. 60.

Laboratoire du PEPTICOL

13, avenue du Maréchal-Foch,

DAMMARIE-LES-LYS (S.-et-M.).

## PEPTODIASE

**Stimulant gastrique.**

**Forme.** — Gouttes.

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Association de :

- Chlorure de calcium,
- magnésium,
- sodium,

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2<sup>o</sup> **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

**Propriétés thérapeutiques :**

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

**Indications.** — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérophagie.

Anorexie.

**Posologie.** — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

**Enfants :** IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 20 fr. 10.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie.  
Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Diderot 28-96.)

## PEPTO-FER JAILLET

**Composition.** — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

**Avantages.** — Le fer dans le PEPTO-FER du D<sup>r</sup> Jaillet est animalisé par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine est rapidement augmenté, sans aucune fatigue ni pour l'estomac ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle anti-anaphylactique.

Le PEPTO-FER du D<sup>r</sup> Jaillet n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

**Indications.** — Anémies.

**Forme pharmaceutique.** — Elixir.

**Doses.** — *Adultes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café après les repas dans un peu d'eau.

**DARRASSE**

13, rue Pavée — PARIS.

## PEPTOGIL

**Peptones gastriques et pancréatiques.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication antianaphylactique polyvalente, spécifique des anaphylaxies protéiques.

**Indications.** — Urticaires, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin, asthme, coryza et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

**Conditions d'emploi.** — 3 fois par jour, 1 heure avant les repas, croquer 1 à 2 dragées. *Adultes* : 2 dragées.

*Enfants* : jusqu'à 12 ans, 1 dragée.

Prix de la boîte de 56 dragées : 19 fr. 40.

**Établissements JACQUEMAIRE**

Société Anonyme au capital de 12.800.000 fr.  
VILLEFRANCHE (Rhône).

**P. PHILLIPPE**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

## PEPTO-KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable à base de Glycérophosphates et de Kola.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

**Indications.** — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, Stimulant pour les sportifs, etc.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

## PEPTOMALTONE DÉJARDIN

**Composition.** — Aliment sucré et solubilisé, résulte de la digestion de diverses céréales et légumineuses par le malt.

Ne contient pas d'œufs.

**Propriétés.** — Très digeste, nourrissante et tonique par sa concentration en extrait de malt, la PEPTOMALTONE favorise l'acidification du milieu intestinal.

Préparée sous trois formes :

**Peptomaltone « A »** (arome vanille). véritable soupe de Terrien, d'emploi instantané pour biberons ou bouillies maltées des nourrissons atteints de troubles digestifs.

**Peptomaltone « B »** (arome cacao) ; **Peptomaltone « C »** (arome café).

Premier aliment de l'opéré, déjeuner hygiénique et galactogène de la nourrice. Aliment de choix de l'enfant et des hépatiques. C'est en outre l'aliment spécifique des colites alcalines.

La boîte de 250 gr. **Prix : 13 fr. 80.**

**É. abaissements DÉJARDIN**

A. LOUTROUX, Pharmacien.

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## PEPTONAL RÉMY

**Composition.** — PEPTONE de viande intégrale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

**Action.** — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

**Indications.** — Traitement préventif et curatif des migraines, urticaires, intoxications alimentaires, asthme d'origine digestive.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés dragéifiés, — Granulé.

**Dose.** — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou deux cuillerées à café de granulé.

Enfants  $\frac{1}{2}$  dose

**Prix :**

Comprimés : Le tube, 20 fr. 70.

Granulé : La boîte, 20 fr. 70.

### Laboratoires SITSA

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).  
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

## PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone et de fer associée au gluconate de fer.

Gouttes concentrées. Élixir. Vin.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes :*

X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur d'Élixir ou de vin à chaque repas. *Enfants :* 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstitution des hématies.

**Indications.** — Tous les états anémiques et chlorotiques.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique .....	15 cgr.
— entéro-pancréatique ..	15 —
— hépatique .....	15 —
— biliaire .....	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

PER-ABRODIL

Nom déposé. Licence Bayer.

Composition. — 3,5 di-iodo-4-pyridone-N-acétate de diéthanolamine.

Propriétés et indications. — Produit de contraste pour l'examen radiologique des voies urinaires, des territoires vasculaires, des articulations et des fistules. Contre-indiqué dans l'hypersensibilité à l'iode et les troubles graves de l'état général accompagnés de lésions rénales. Le Per-Abrodil « fort », en solution à 50 %, donne de meilleurs contrastes et s'élimine moins rapidement.

Posologie et mode d'emploi. — Pour la pyélographie, injecter l'ampoule de 20 cc. à 35 % par voie intraveineuse en 3 à 5 minutes. Les meilleurs clichés sont obtenus 8 à 20 minutes après. Le PER-ABRODIL peut également être utilisé pour la pyélographie ascendante.

Présentation. — Boîtes de 1 et 5 ampoules de 20 cc. à 35 %.

PER ABRODIL « fort » : boîtes de 1 et 5 ampoules de 20 cc. à 50 %.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

PERANDRONE

Propionate de testostérone.

CIBA

HORMONE ORCHITIQUE DE SYNTHÈSE.

Propionate de testostérone préparé synthétiquement. Représente, à l'heure actuelle, la substance possédant l'activité hormonale la plus élevée, telle qu'elle est révélée par la méthode des tests.

Indications :

Chez l'enfant et l'adolescent : Les troubles du développement sexuel, tels que puberté retardée, infantilisme, eunuchoïdisme, cryptorchidie, adiposité, anomalies morphologiques (gynécomastie) et psychiques résultant de ces troubles.

Chez l'adulte : L'insuffisance testiculaire, avec ses répercussions physiologiques et psychiques, affaiblissement ou cessation prématurée de la fonction sexuelle, eunuchoïdisme, pusillanimité, adiposité, sénilité précoce.

Chez les prostatiques : A toutes les périodes les troubles urinaires sont très améliorés et, au premier stade, disparaissent souvent complètement. L'état général est toujours relevé ; même chez les sujets qui ne sont plus justiciables que de l'intervention, l'invigoration et la résistance accrue favorisent l'acte opératoire et son pronostic.

Dans les affections chroniques par déficience endocrine : Tels certains états d'asthénie, de psychasthénie avec affaiblissement de la mémoire, l'obésité, lorsqu'elle traduit la carence testiculaire.

Chez la femme : Les mastopathies, les fibromes et certains troubles menstruels relevant d'un état d'hyperfolliculénémie habituelle sont très heureusement influencés.

Présentation.

Solution I.	Boîte de 4 amp. à	5 milligr.
Solution II.	—	5 — 10 —
Solution III.	—	2 — 25 —

qui permettent des traitements moyens et plus ou moins intensifs.

Traitement moyen : 1 Amp. Sol. I, 2 ou 3 fois par semaine.

— intensif : 1 Amp. Sol. II, tous les 2 ou 3 jours.

— très intensif : 1 Amp. Sol. III, 2 ou 3 fois par semaine et davantage.

PERANDRONE A

Acétate de testostérone.

CIBA

Boîte de 5 ampoules de 10 milligr.

Boîte de 1 ampoule de 40 milligr.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## PÉRASUROL

Éliminateur des déchets uriques.

### Composition :

Salicylate de lithine.....	2 grammes.
Phénylcinchoninate de soude .....	2 —
Tartrate de diméthylpipérazine.....	3 —
Anhydrométhyl. citr. d'urotropine..	3 —
Phosphate de soude.....	4 —
Excipient effervescent aromatisé pour 100 gr.	

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Indications.** — Rhumatismes, goutte, lithiase rénale, arthritisme, coliques néphrétiques, gravelle.

**Doses :** 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 8 à 10 jours.

**Prix.** — 23 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1081-2.

**G. BAETZ, Pharmacien**  
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).  
(Tél. : 21.)

## PERCAÏNE

Chlorhydrate de la diéthyléthylène-diamide  
de l'acide  $\alpha$ -butyloxycinchoninique

### OIBA

### ANESTHÉSIQUE LOCAL

Action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface, chirurgie et médecine (algies, viscéralgies).

**Anesthésie par infiltration.** — Solution de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

**Anesthésie rachidienne.** — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1.500 (JONES), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (QUARELLA).

**Anesthésie des muqueuses.** — *En oto-rhino-laryngologie :* Solution à 2 p. 100 et mélange de Bonain à la Percaïne. — *En urologie :* Solution de 1 à 3 pour 1.000.

### Doses :

Solution à 1 p. 1.000 : 60 à 120 cc.

— à 2 p. 1.000 : 2 à 40 cc.

— à 2 p. 100 : 1 ou 2 cc. uniquement en surface.

### Formuler :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés.

Ampoules de divers titres et contenances pour infiltration et rachi.

(Nous demander notice : TITRES ET DOSES.)

## PERCAÏNAL CIBA

ONGUENT ANALGÉSIQUE ET ANTIPRURIGINEUX,  
A BASE DE PERCAÏNE.

Calmé la douleur et la démangeaison dans toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau et des muqueuses. Assure le repos et le sommeil. Favorise la guérison des lésions.

**Indications principales.** — Eczéma, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

**Prescrire.** Un tube Percaïnal.

**Laboratoires OIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## PERCALCINE

**Composition.** — Association d'arrhénal, de divers sels de chaux (en particulier du silicate), de fennegrec et de girofle (qui supprime les inconvénients du fennegrec.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant intensif. Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

**Indications.** — Amaigrissement, Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures. Grossesse et allaitement.

### Mode d'emploi :

A prendre 20 jours par mois.

*Adultes* : 3 cachets par jour au milieu des repas.

*Enfants* : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

Prix : 19 fr. 90. La boîte de 30 cachets.

Laboratoire du **DELTA** (Tél. : Tru. 45-18.)

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Préparateur des SUPPOGLANDINES

## PERCORTÈNE

Acétate de désoxycorticostérone.

CIBA

HORMONE CORTICO-SURRÉNALE DE SYNTHÈSE.

Cette hormone synthétique du cortex surrénal est nettement spécifique et permet d'obtenir la survie indéfinie des animaux surrénalectomisés.

**Indications.** — Tous les états d'insuffisance surrénale, qui ne sont pas rares au cours de nombreuses affections et des états pathologiques les plus divers.

L'indication princeps est la grande insuffisance progressive de la maladie d'Addison. Mais, à côté de cette grande insuffisance, il existe de nombreux états d'hypofonction déterminant des troubles divers, dont les plus apparents sont l'hypotension artérielle, l'adynamie, l'extrême fatigabilité et la mélanodermie. Indépendamment de ces signes majeurs, de nombreux sujets sont en état de petite insuffisance avec symptômes atténués, au nombre desquels on relève tousjours l'asthénie, puis certains troubles des différents métabolismes. Mentionnons enfin les toxicoses de la grossesse (d'origine hypophyso-surrénale) et certaines affections cutanées.

Indépendamment de sa grande indication, l'*Addisonisme*, le Percortène est donc susceptible de rendre d'éminents services dans un grand nombre d'états pathologiques, tels que les suivants :

*Asthénie et adynamie constitutionnelle. Convalescence des maladies aiguës et infectieuses* (en particulier la diphtérie, la grippe, la pneumonie, la fièvre typhoïde qui atteignent toujours les surrénales). *Toxicoses de la grossesse. Etats de choc après les grands traumatismes ou opérations graves. Plaies infectées et brûlures étendues lentes à cicatriser. Cirrhose alcoolique. Intoxications chroniques professionnelles.* Chez les enfants, la maladie cœliaque, la dystrophie hypophysaire.

**Présentation.** — Le Percortène est présenté sous forme injectable uniquement, en ampoules de 1 cc. renfermant une solution huileuse titrée à 2, 5 mgr. et 10 mgr. par ampoule.

### Posologie :

Grande insuffisance..... 5 à 10 mgr. par jour.  
Moyenne insuffisance..... 2 mgr. tous les 2 ou 3 jours.  
Petite insuffisance..... 2 mgr. par semaine.

### Formuler :

Boîte de 4 ampoules à 2 mgr.  
Boîte de 4 ampoules à 5 mgr.  
Boîte de 4 ampoules à 10 mgr.

Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## PERGLANDÈNE HÉPATIQUE

Extrait de Foie injectable, délipoidé, désalbuminé.

**Indications.** — Cirrhoses, ictères, dyspepsies, insuffisances hépatiques au cours des maladies aiguës et chroniques, en particulier de l'intoxication éthylique. Toutes manifestations anaphylactiques, cutanées, respiratoires, nerveuses, etc. Dépression mélancolique et manifestations convulsives.

**Formes et composition.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

**Conduite du traitement.** — Une injection par jour ou tous les deux jours de 1 cc. Séries de 15 injections espacées de 15 à 20 jours.

Prix de la boîte : 42 fr. 80.

Prix du tube : 39 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-28.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRINE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

## PERGLANDÈNE ORCHITIQUE

Extrait d'Organe injectable, délipoidé, désalbuminé.

**Indications.** — Chez la femme : troubles de la ménopause et de la puberté, anxiété génitale, troubles liés à la continence, aménorrhée rebelle. Chez l'homme : infantilisme, impuissance, sénilité précoce. Dans les deux sexes : obésité, engelures, acrocyanose.

**Formes et composition.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

**Conduite du traitement.** — Une injection tous les deux jours de 1 cc. ou suivant prescription médicale.

Prix de la boîte : 25 fr. 20.

Prix du tube : 22 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-30.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRINE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

## PERGLANDÈNE OVARIEN

Extrait d'Ovaire injectable, délipoidé, désalbuminé.

**Indications.** — Insuffisances ovariennes, troubles de la puberté, de la ménopause naturelle ou opératoire, aménorrhée ou dysménorrhée.

**Forme et composition.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

**Conduite du traitement.** — Une injection par jour, ou tous les deux jours, de 1 cc. Séries de 20 ou de 10 injections en dehors de la période menstruelle.

Prix de la boîte : 46 fr. 30.

Prix du tube : 44 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-29.

**Laboratoire de l'ENDOPANCRINE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

## PER-HÉPATIQUE CARRION

**Composition.** — Extrait spécial de foie désalbuminé correspondant à 1 gramme ou 2,5 gr. d'organe frais par ampoule.

**Forme.** Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

**Indications.** — Insuffisance hépatique au cours des maladies aiguës et chroniques (tuberculose notamment). Intolérance à certaines médications (chryso et arsénothérapie), Cirrhoses.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Présentation et prix.**

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 32 fr. 30.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 52 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. n° 514-26.

**Produits biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)



## PÉRICOLS DU D<sup>r</sup> LEGROS

**Présentation.** — Conglomerés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde, d'élasticité parfaite.

**Avantages.** — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

**Composition.** — Péricols bellado-iodurés au collargol.

**Indications.** — Toutes les affections gynécologiques.

En boîte de 6  
(ou de 20 sur commande spéciale).

**Laboratoires G. LESOURD**  
88, rue Duhesme — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## PÉRISTALTINE

CIBA

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE.

Glucoside pur du *Rhamnus purshiana* agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

**Indications.** — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire ; injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

*Comprimés — Cachets — Ampoules.*

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 3 cachets ou comprimés, 1 à 3 ampoules. — *Enfants* : Quart ou demi-dose de l'adulte suivant l'âge. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

**Formuler.** — Boîte de 20 cachets.  
Flacon de 20 comprimés.  
Boîte de 5 ampoules.  
Boîte de 20 ampoules.

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## PERLES RÉDUCTRICES

Traitement végétal de l'obésité.

**Composition.** — Extraits mous de *Fucus vesiculosus*, de Cascara et de Belladone associée au sel de Vichy. Sans Thyroïdine ni Nitrophénols.

**Présentation.** — Boîte à tiroirs, contenant 200 perles.

**Posologie.** — Une perle 2 fois par jour, pendant 10 jours. Deux perles 2 fois par jour les 10 jours suivants. Repos 10 jours et recommencer.

Perte de poids de 3 à 8 kg.

Prix au public : 18 francs.

**Laboratoires BARDIAUX**  
39, rue de Reims — VICHY (Allier).

## PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Prix : 19 fr. 65.

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.**  
à PRÉMERY (Nièvre).

## PERMYASE

**Composition.** — Suc désalbuminé et stérilisé de larves de *Lucilia sericata*.

**Formes :**

**PERMYASE LIQUIDE :** Ampoules de 5 cc., et de 2 cc., de suc de larves dilué dans du sérum physiologique, résorciné à 1/1 000.

**PERMYASE GÉLIFIÉE :** Tube de 50 gr. de gelée à base de suc de larves, résorcinée à 1/500.

**Indications.** — Toutes les suppurations ouvertes, aiguës ou chroniques.

**Chirurgie :** Pansements post-opératoires dans la chirurgie septique.

Anthrax, furoncles, panaris, abcès divers.

**Médecine :** Ulcères variqueux, eczéma suintant, brûlures s'accompagnant de sphacèle.

**Oto-rhino-laryngologie :** Ozène, otites, pansements post-opératoires.

**Mode d'emploi.** — Applications locales en méchages ou pansements, à renouveler selon les cas deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux ou trois jours jusqu'à nettoyage et bourgeonnement de la plaie.

Prix de la boîte de 5 ampoules de 5 cc. : 31 fr. 70.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 25 fr. 20.

Prix du tube 25 fr. 20.

L. N. C. n° 234-25-2, 234-25-1, 234-26.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 07-70.)

## PER-OVARIEN CARRION

**Composition :**

Extrait spécial d'ovaire total, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule.

**Forme :** Ampoules de 2 cc.

**Indications.**

Insuffisances ovariennes, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhées.

**Posologie et mode d'emploi :**

1 ampoule en injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 ou 12 ampoules.

**Présentation et prix :**

La boîte de 6 ampoules : 32 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. n° 514 29.

**Produits biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## PERQUINOL

Sulfate double d'ortho-oxyquinoléine et de potassium.

**Quatre formes.**

**A. VOIE EXTERNE :**

1° **Perquinol comprimé** de 0 cgr. 50.  
Boîte de 20 comprimés.

**Prix : 18 fr. 30.**

Antiseptique puissant.

Gynécologie, Urologie, Oto-Rhino-Laryngologie-Stomatologie-Hygiène en général.

Ni toxique, ni caustique, désodorisant, très soluble, inaltérable.

S'emploie en solution de 0,50 à 2 p. 1 000.

2° **Perquinol ovules.** Boîte de 6 ovules,

**Prix : 18 fr. 30.**

3° **Perquinol pommade.**

**Prix du tube : 12 fr. 20.**

Rougeurs, Écorchures, Eczémas, Herpès, Engélures, Brûlures, Pyodermite.

**B. VOIE INTERNE :**

**Perquinol dragées.** Boîte de 35 dragées dosées à 0 gr. 10.

4 à 6 dragées par jour, les avaler, ne pas les croquer.

Affections gastro-intestinales, Colibacilloses, Grippe, Ictère catarrhal, Cystites, Blennorrhagie, Tuberculose (remplace la créosote).

**Prix : 18 fr. 30.**

**Laboratoires MIALHE**

8, rue Favart — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Ric. 35-10.)

## PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

**Constitution.** — Préparation stable à base de Persulfates alcalins purs, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

**Propriétés.** — Active le métabolisme général, elle crée le besoin de saliments, elle réalise véritablement l'oxygénothérapie interne, par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs.

La Persodine Lumière est un apéritif par action secondaire, son mode d'action est profond, il stimule les besoins organiques et ne crée pas seulement l'envie de réplétion gastrique. Les aliments ingérés avec faim sous l'influence de la Persodine Lumière sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde. Particulièrement précieux chez les tuberculeux.

**Indications :** Anorexie, Hypo-nutrition.

(Tuberculose, Chloro-Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Neurasthénie, Convalescence, etc.)

Éviter l'usage de la PERSODINE LUMIÈRE chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

**Doses courantes.** — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

**Adultes :** 3 comprimés.

**Enfants de 8 à 14 ans :** 2 comprimés.

**Enfants de 2 à 7 ans :** 1 comprimé.

**Formuler.** — Flacon de comprimés de PERSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

## PER-THYMIQUE CARRION

**Composition.** — Extrait spécial de thymus, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. et à 2 gr. 50 d'organe par ampoule de 5 cc.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

**Indications.** — Ectopies testiculaires. Troubles de croissance et de nutrition du jeune enfant. (Insuffisance de la première dentition.) Syndrome adipo-génital, Infantilisme, certaines Dysménorrhées ou Aménorrhées.

**Posologie et mode d'emplol.** — 1 Injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 à 12 injections.

**Présentation et prix :**

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 32 fr. 30.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 52 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. n° 514-32.

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°)  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## PÉRUBORE (Comprimés)

Inhalations — Gargarismes.

**Composition**

Chaque comprimé contient :

Baume du Pérou.....	0 03	Borate de soude .....	0 60
Essences aromatiques ....	0 025	Bicarbonate de soude.....	0 30

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza, grippe.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

*Pulvérisation* : dissoudre 2 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Prix : 18 fr. 20 (8 jours de traitement).

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI°). — Tél. Passy 51-12  
A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

## PERVOSINE

**Composition.** — Extr. stabilisés de marron d'Inde, de gaul, de sénéçon, Bourse à Pasteur, Bourdaine, Passiflore, Cratægus, Anémone, NaBr.

Sans alcool.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Tous les troubles de la circulation du sang aussi bien chez l'homme que chez la femme.

**Doses.** — XV à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, trois fois par jour avant chaque repas.

Prix du flacon, réglementé : 19 fr. 40.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle  
sous le n° 1081-3.

**G. BAETZ, Pharmacien**

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 21.)

## PHAGOLYSINE

Médication tonique type  
de toutes les convalescences

et de tous les états de déficience organique.

**Composition.** — Par cuillerée à café : 1/2 mgr d'endotine ; 1/4 de mgr. d'arsenic ; 5 mgr. de fer assimilable.

**Indications.** — Préventif et curatif des affections pulmonaires, pré tuberculose, anémies, adénopathies, convalescence des chroniques et des surmenés, affections ganglionnaires de l'enfance, croissance, rachitisme, lymphatisme.

**Contre-indications.** — Période menstruelle, température élevée, formes congestives, hémoptysies, formes trop avancées des affections pulmonaires.

Pendant le traitement, éviter les Acidités et les Crudités.

**Doses maxima, prophylactiques et toniques :**

*Enfants*, 5 à 10 ans : par 1/2 cuillerée à café (dans un peu d'eau, immédiatement avant les deux repas).

*Enfants*, 10 ans : par cuillerée à café (dans un peu d'eau, immédiatement avant les deux repas).

*Jeunes gens*, 16 ans : par cuillerée à dessert (dans un peu d'eau, immédiatement avant les deux repas).

*Adultes* : par cuillerée à soupe (dans un peu d'eau, immédiatement avant les deux repas).

*Vieillards, femmes enceintes ou suites de couches* : par cuillerée à dessert (dans un peu d'eau, avant les repas).

Le médecin traitant débutera par de faibles doses ; ces quantités seront progressivement augmentées jusqu'au maxima des doses prophylactiques.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 365-1.

**Laboratoires de la PHAGOLYSINE**

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-27.)

## PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoïétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

**Formule :**

Cacodylate de soude pur .....	20 centigr.
— de magnésie pur .....	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique .....	5 cc.

**Indications.** — Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescence, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Cachexies.

**Emploi.** — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les 2 jours. Se vend en boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 26 fr. 70.

**Phagosthyl infantile** pour enfants de 8 à 15 ans, 12 ampoules de 2 cc. : 18 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-3.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).  
(Tél. : Ségur 55-12.)

## PHAGOSTHYL MANGANÉ

(*Pour adultes.*)

(Exempt de strychnine.)

**Formule :**

Cacodylate de manganèse .....	2 centigr.
— de soude .....	10 —
— de magnésie .....	8 —
— de calcium .....	10 —
Eau distillée .....	5 cc.

**Indications.** — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

**Emploi.** — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions usuelles d'usage. Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 26 fr. 70.

**Phagosthyl Mangané Infantile** : 12 ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans.

Prix : 18 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-4.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, r. de La Motte-Picquet — PARIS (XV°). (Tél. : Ség. 55-12.)

## PHANODORME

(et Phanodorme-Calcium)

**Composition.** — Acide cyclo-hexényl-éthyl-barbiturique ; le PHANODORME-CALCIUM est le sel calcique de cet acide.

**Propriétés.** — Procure un sommeil rapide, tranquille et profond, suivi d'un réveil agréable. Résorption rapide et élimination à bref délai par l'organisme.

**Indications.** — Insomnies de toutes sortes ; préparation des maladies à l'anesthésie.

**Présentations.** — Tubes de 10 comprimés PHANODORME ou PHANODORME-CALCIUM à 0 gr. 20. Flacons de 50 comprimés.

**Posologie.** — 1/2 à 1 ou 1 comprimé 1/2, le soir dans une boisson chaude.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## PHANODORME ET PHANODORME-CALCIUM

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Cyclohexényl-éthyl-malonylurée et son sel de calcium.

**Propriétés et indications.** — Hypnotiques non toxiques assurant un sommeil paisible et un réveil agréable. L'action du PHANODORME-CALCIUM est plus rapide et plus profonde que celle du PHANODORME. Insomnies de toute nature, nerveuses ou liées à la douleur, celles des lésions cérébrales et de l'encéphalite épidémique. Etats d'excitation, névroses cardiaques, tremblements. Ces deux préparations ne passent pas dans le lait maternel et peuvent être prescrites aux femmes qui allaitent.

**Posologie.** — 1/2 à 1 comprimé dans une boisson chaude, 1/2 heure avant le coucher.

**Présentation.** — Tube de 10 et flacon de 50 comprimés à 0 gr. 20.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PHARYNGASEPTYL

**Composition.** — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

**Forme.** — Poudre.

**Indications.** — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

*Enfants* : 1/2 cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 219-14.

**Laboratoires CALMEL-DOMERGUE**

S. A R. L. au capital de 300.000 francs.

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

## PHÉNÉDRINE

Dragées dosées à 0 gr. 003 de Sulfate de phénédrine ou sulfate de  $\beta$ -Phénylisopropylamine.

**PROPRIÉTÉS.** — Corps synthétique proche de l'adrénaline et de l'éphédrine, c'est :

- 1° Un stimulant du système nerveux central (action euphorisante) ;
- 2° Un sympathicomimétique actif (effet antispasmodique sur les fibres lisses, action modérément hypertensive).

**POSOLOGIE ET INDICATIONS.** — La dose utile est assez variable suivant les sujets et les affections ; les doses indiquées peuvent être facilement dépassées, la phénédrine étant très peu toxique ; elle provoque parfois une réaction passagère (rougeur de la face, sécheresse de la gorge, etc.), qu'on évitera en tâtant la susceptibilité individuelle par une faible dose de début. Les dragées seront administrées de préférence le matin, l'action stimulante pouvant amener une certaine insomnie après prise trop tardive. L'accoutumance au produit ne semble pas à craindre.

### A. CHEZ LE SUJET SAIN :

De façon temporaire, dans un but précis, pour un effort physique ou intellectuel limité (épreuve, concours, fatigue transitoire, trac, etc.) : 2 dragées avant midi.

### B. A L'ÉTAT PATHOLOGIQUE :

- 1° **Asthénie, dépressions psychiques et physiques :** a. *fatigue intellectuelle ou physique des surmenés* ; b. *dépression constitutionnelle, neurasthénie, psychasthénie* ; c. *dépression alcoolique en général* : 1 à 4 ou 6 dragées par jour en deux prises au début de la matinée.
  - 2° **Affections nerveuses :** a. *Narcolepsies* : 3 à 10 dragées par jour en plusieurs prises espacées suivant les besoins ; b. *Syndromes parkinsoniens post-encéphalitiques* : 6 à 10 dragées par jour en deux prises, au réveil et à midi ; c. *Miyasthénies* : 4 à 6 dragées par jour en deux prises, au réveil et à midi (comme adjuvant).
  - 3° **Hypotension artérielle idiopathique** : 4 à 6 dragées en une ou deux prises dans la matinée.
  - 4° **Dysménorrhées en apparence essentielles** : 5 dragées.
  - 5° **Spasmes gastro-intestinaux** : 2 à 8 dragées selon l'âge et le poids, en une prise pour lever le spasme (action surtout utile pour les examens radiologiques). Tâter auparavant les susceptibilités individuelles par une dose d'essai de 2 dragées.
- CONTRE-INDICATIONS.** — 1° Les états anxieux mélancoliques et d'excitation maniaque ; l'épilepsie, la maladie de Basedow.
- 2° L'hypertension artérielle, l'artériosclérose.
  - 3° La tuberculose et les états de dénutrition.
  - 4° L'insomnie.

**PRÉSENTATION.** — Tubes de 30 dragées : 18 fr. 70.

### Laboratoires GRIMAULT

Fondés en 1856.

51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Bal. 20-70.)

## PHÉNIODINE BOUCHEREAU

### E. IODO. PHÉNATE DE FORMINE

Nouveau dérivé iodé atoxique, cristallisé, hydrosoluble. Sédatif puissant du névraxe et du système neuro-végétatif, il possède, en plus de son pouvoir antiseptique, une nette action vasomotrice aux doses thérapeutiques et se montre expérimentalement un antagoniste de l'adrénaline, dont il empêche l'action hypertensive de se manifester. (Société de thérapeutique, juin 1939. Thèse G. Lefranc, 1939.)

**Indications.** — Maladies cardio-vasculaires, Artériosclérose, Hypertensions, Sciatiques, Rhumatismes infectieux.

**Forme.** — Ampoules de 10 cc. dosées à 0 gr. 50 en intramusculaires profondes ou intraveineuses. — 1 chaque jour ou chaque 2 jours.

Boîte de 6 ampoules. Prix public : 49 fr. 50.

### Laboratoire de CHIMIE THÉRAPEUTIQUE.

P. BOUCHEREAU, docteur en pharmacie,  
Lauréat de la Faculté de Paris,

57, boulevard A.-Briand — CHAMPIGNY (Seine).  
(Tél. : Pompadour 1-97.)

## PHILENTÉROL

### Vaccin polyvalent buvable.

**Composition.** — Association d'une émulsion de colibacilles avec des filtrats : colibacillaire, entéroccocque, staphylococque.

#### Emploi préventif.

**Vaccination pré et post-opératoire.** — Grossesses, accouchements. Pyélonéphrite, phlébites, septicémies.

Huit jours avant l'intervention, prescrire une ampoule par jour pendant les six premiers, et deux par jour pendant les deux derniers. Après l'opération : 1 ampoule par jour.

#### Emploi curatif.

Rétablissement de l'équilibre humoral intestinal et des fonctions hépato-rénales et gastriques, antisepsie des voies génito-urinaires.

**Indications.** — Gastro-entérites, colites, diarrhées, grippe intestinale, syndrome entéro-rénal, appendicites, fièvres typhoïdes. 1 ampoule par jour pendant dix jours. Reprendre la cure si nécessaire après un repos de huit à dix jours.

La boîte de 10 ampoules : 31 fr. 40.

Boîtes de 50 pour MM. les Chirurgiens, les cliniciens et hôpitaux.

### Laboratoires du D<sup>r</sup> P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS. — (Tél. : Auteuil 24-52.)

# PHLEBOGEV

(ex-ARGYRINE)

Principe actif du Marron d'Inde.

## Forme. Composition :

*Granules* : Argyrine, cinq milligrammes; *Pommade Suppositoires* : Argyrine associée au benjoin et au Borate de soude. Ni belladone. Ni adrénaline.

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique et vaso-constricteur rapidement efficace dans les douleurs et hémorragies hémorroïdaires.

Apporte un soulagement et une amélioration durables dans les troubles circulatoires.

**Mode d'emploi.** — *Granules* : 1 à 2 avant chacun des 3 principaux repas.

*Suppositoires* : 1 le soir au coucher.

*Pommade* : en onction, le soir de préférence.

**Prix** { *Granules* ..... 18 fr. 20.  
          *Pommade* ..... 15 francs.  
          *Suppositoires* ..... 17 francs.

## Laboratoires GEV

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 77-70.)

# PHLEBOS

**Forme.** — Dragées et Gouttes.

**Composition.** — 2 dragées ou XV gouttes correspondent à :

Extrait de marron d'Inde Dausse.....	0,006.
Extrait fluide de Berberis.....	0,20.
Extrait fluide de Seneçon.....	0,20.
Alcoolature de Ficaire.....	0,20.
Alcoolature d'anémone.....	0,10.
Extrait de noix vomique.....	0,02.

**Actions thérapeutiques.** — Vasoconstricteur périphérique énergique, sédatif puissant, régulateur, emménagogue, décongestif, hémostatique et tonique vasculaire.

**Indications.** — Spécifique des hémorroïdes, varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorragies viscérales et utérines, hémoptysie, Dysménorrhée, Aménorrhée.

**Posologie.** — XV gouttes ou 2 dragées avant les deux principaux repas.

**Prix** : 16 fr. 50 (dragées et gouttes).

Voir *Suppléons*, spécifique des règles douloureuses.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

## Laboratoire LA GOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

(Tél. : Moncey 14-35).

# PHLÉBOSINE CARRION

Association de produits opothérapiques et d'extraits végétaux.

## Composition :

*Phlébosine M.* : Thyroïde, Orchitique, Surrénale, Hypophyse, Hamamelis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

*Phlébosine F.* : Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Hamamelis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Varices, Hémorroïdes, Hypotonie vasculaire.

**Posologie et mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour au repas. Bien spécifier M. ou F.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 24 comprimés : 25 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. n° 514-58 et 59.

## Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

# PHLOGIPLASMINE

## Pâte Antiphlogistique.

**Composition.** — Essences aromatiques (Pin, Romarin, Eucalyptus, etc.). Pâte à l'état colloïdal conservant la chaleur pendant 10 à 15 heures.

**Action.** — Chaleur prolongée. Hyperémie et phénomènes osmotiques favorisant les échanges au niveau de la peau. (Adsorption des micro-organismes, favorisée par l'état colloïdal des composants.) Action balsamique.

**Indications.** — Toutes les affections nécessitant une chaleur prolongée. Affections des voies respiratoires : pneumonies, pleurésies, angines, etc. Affections inflammatoires : phlegmons, anthrax, panaris, etc. Affections gynécologiques : cataplasme abdominal sédatif (règles douloureuses, etc.), goutte, rhumatismes, etc.

La Phlogiplasmine a une action double :

1° *Physique* : par la chaleur et les propriétés osmotiques.

2° *Médicamenteuse* : par l'absorption cutanée des principes balsamiques à l'état de vapeur.

La boîte de 250 gr. environ : 22 fr. 50.

## Laboratoires MÉDICO-SCIENTIFIQUES J. A. D.

G. LECLERCQ, Pharmacien.

1, 3, rue de l'Arsenal — BORDEAUX (Gironde).

## PHORYX

Reconstituant organique et vitaminé.

**Formes.** — Ampoules buvables, dragées.

**Composition.** — *Ampoules*: Peptone de Viande, Viande embryonnaire, Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.  
*Dragées*: Peptone de Viande, Hémoglobine, Acide phosphorique, Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

**Indications.** — *Ampoules*: Suralimentation, Augmentation de poids.

*Dragées*: Dépressions nerveuses, Neurasthénie.

**Posologie.** — *Ampoules. Adultes*: 2 par jour.  
*Enfants*: 1.

*Dragées. Adultes*: 4 par jour. *Enfants*: 1 à 2.

Contenance et prix:

La boîte de 6 ampoules buvables: 20 francs.

L. N. C. N° 1270-12.

La boîte de 20 dragées: 20 francs.

L. N. C. N° 1270-11.

Distribution assurée des 2 formes.

**Laboratoire P. CHEVILLON**

Rue de la Paix — CROIX-DE-VIE (Vendée).

## PHOSBIOGE (Codex)

Inosito-hexaphosphate mixte de calcium et de magnésium.

Produit naturel retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux: 11 p. 100.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient 20 p. 100 environ de phosphore, associé intimement aux ions magnésium et calcium en une molécule organique complexe, dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

**Indications.** — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémies, Neurasthénie, Tuberculose, Convalescences longues et difficiles, Grossesse, Allaitement, Surmenage.

**Présentation:**

*Granulé à 10 %*: la boîte de 11 gr.: 21 fr. 90.

*Cachets*: dosés à 0 gr. 50, la boîte de 24 cachets: 17 fr. 30.

*Comprimés*: dosés à 0 gr. 25, la boîte de 50 comprimés: 18 fr. 30.

*Poudre pure*: le flacon de 30 gr.: 30 fr. 60.

**Posologie.** — *Poudre*: 0 gr. 50 à 2 gr. par jour.

*Comprimés* { *Enfants*: 2 par jour.  
                  *Adultes*: 4 par jour.

*Cachets*: 2 par jour.

*Granulé* { *Bébés*: demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

*Enfants*: 2 cuillerées à café par jour.

*Adultes*: 4 cuillerées à café par jour.

Se prend de préférence avant les repas.

**Laboratoires BOYER et Cie**

18, rue de la Perle — PARIS (3<sup>e</sup>).

## PHOSCAMINE

**Granulé recalcaifiant hémotogène,**  
**Activateur de la nutrition.**

**Principes actifs.** — Phosphore, calcium, acides aminés, (provenant de l'hydrolyse des hématies).

**Indications.** — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance, Hypocalcémie.

**Doses:**

*Adultes*: 2 cuillerées à café avant chaque repas.

*Enfants*: 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix: 17 fr. 90.

**Laboratoire MAUCHANT**  
à GENNEVILLIERS (Seine).  
(Tél.: Grésillons 05-21.)

## PHOSCLÉINE

**Forme.** — Comprimés de 0 gr. 50.

**Composition:**

Cluconate de Calcium .....	0 gr. 25
Fluorure de Calcium .....	0 gr. 01
Hypophosphite de Magnésium .....	0 gr. 10
Sulfate de Manganèse .....	0 gr. 04
Vitamine D crist. ....	1 000 U.I.

**Posologie.** — **A avaler sans croquer ou écraser dans un liquide sucré.**

*Adultes*: 3 comprimés par jour (dose moyenne) au début des repas.

*Enfants*: à partir de 2 ans (1/2 dose).

**Indications.** — Croissance, Rachitisme, Convalescence, Tuberculoses chroniques, Déminéralisation, Grossesse, Carie dentaire, Décalcification, Surmenage, etc.

**LABORATOIRES BIOLOGIQUES**  
**DE L'ILE-DE-FRANCE**  
**A. DETROIS, Pharmacien**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).



## PHOSIDIANE

**Stimulant physiologique général.  
Modificateur de la nutrition.  
Neurotonique.**

*Phosidiane* réunit deux principes : la médication phosphorée et phosphatée représentée par l'acide orthophosphorique combiné au phosphate disodique, d'une part, et, ce qui en fait l'originalité, un ferment soluble, la *pepsine*, d'autre part.

**Indications thérapeutiques.** — *Tonique* général très actif (asthénie, dépression nerveuse, surmenage intellectuel, convalescence, grossesse).

Réménérant (phosphaturie).

Modificateur du pH urinaire.

Régulateur des fonctions gastriques (hyperchlorhydrie, hypochlorhydrie).

**Forme.** — Solution de goût très agréable.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cuillerées à café à chaque repas dans un grand verre de boisson.

*Enfants* : 1 cuillerée à café à chaque repas.

**Prix** : 25 fr. 80 le flacon pour 2 semaines de traitement.

**Laboratoires PRIJAC**

CHATEAU-THIERRY (Aisne).

## PHOSMA

**Puissant reconstituant général  
Composition :**

Acide phosphorique off.....	1 gr.
Chlorure de magnésium pur.....	1,20
Teinture de noix vomique.....	0,05
Teinture de cannelle.....	0,50
Teinture d'écorce d'oranges amères.....	1 gr.
Carbonate de lithine.....	0,005
Pour 100 gr.	

**Indications thérapeutiques.** — Anémie, Asthénie, Chlorose, Surmenage, Croissance, Convalescence, Inappétence, Stimulant du Système nerveux.

**Avantages.** — Bien toléré par les hépatiques et les tuberculeux. Saveur très agréable.

**Présentation.** — Forme Elixir, flacon de 310 cc., de 10 à 20 jours de traitement. Prix : 22 francs.

**Posologie :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe avant ou pendant les repas, pur ou coupé d'eau.  
*Enfants* (à partir de 5 ans) : 1 à 2 cuillerées à café avant ou pendant les repas, coupé d'eau.

Dépôt général :

Laboratoires PHOSMA, M. LABROUSSE, Pharmacien  
47, rue Maleret — BORDEAUX.

## PHOSOFORME GOUTTES

Le réapprovisionnement en grands flacons étant devenu impossible, le PHOSOFORME SOLUTION est remplacé par la forme concentrée.

**Bibliographie.** — Prof. Bégouin, Bordeaux ; Prof. Bing, Bâle ; Prof. Cavalié, Bordeaux ; Prof. Escat, Toulouse ; Prof. Jeanbrau, Montpellier ; Prof. Laignel-Lavastine, Paris ; Mercadal y Peyri, Barcelone ; Prof. Papin, Bordeaux ; Prof. Rémond, Toulouse ; Prof. Spillmann, Nancy, etc...

**Principes actifs.** — Acides esters éthyolphosphoriques (phosphore assimilable).

**Indications.** — Spécifique des états hypo-acides. *Correcteur des troubles de la nutrition.* Dyspepsies. États alcalosiques (dermatoses, asthme, etc...). *Déminéralisation* (décalkification, rachitisme, grossesse, allaitement, phosphaturie, carie dentaire) ; insuffisances hépatiques, azotémie, colibacillose, rhumatisme chronique. Insuffisance phosphorée de l'alimentation.

*Tonique général et nerveux* : Neurasthénies, Convalescences, Fatigues cérébrale et musculaire, anémie, anorexie, tuberculose.

**Doses journalières** (1/2 à chaque repas).

Plus de 20 ans : CC gouttes.

De 13 à 20 ans : CXXX gouttes.

De 7 à 13 ans : C gouttes.

De 3 à 7 ans : LXX gouttes.

C gouttes Phosoforme gouttes = 1 cuillerée à soupe Phosoforme solution.

**Mode d'emploi.** — Chaque dose doit toujours être diluée dans un grand verre de la boisson habituelle (eau, vin, etc...), sucrée ou non et absorbée au cours des repas de midi et du soir.

**Prix** : 28 fr. 80 le flacon 45 cc.

55 fr. 20 le flacon 90 cc.

**Durée.** — 12 à 15 jours.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

(Tél. : Mal. 00-32.)

## PHOSO-MAGNÉSIUM

Calcique vitaminé D

Du D<sup>r</sup> J.-P. CLARY.

**Composition.** — Composé nettement défini de phosphate double de magnésium et de calcium, additionné de 2 centièmes de milligramme de vitamine D cristallisée par 10 gr. de granulé.

**Indications.** — Toutes celles du phosphore, du calcium et du magnésium. Reconstituant osseux et nerveux par excellence. Tonique général. Entièrement assimilable. Dépourvu de toute toxicité.

**Posologie.** — *Adulte* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour, 10 jours par mois.

*Enfant de 5 à 10 ans* : 2 à 3 cuillerées à café.

*Jusqu'à 5 ans* : 1 à 2 cuillerées à café et moitié de cette dose chez le *nourrisson*.

Prix de la boîte : 23 fr. 40.

Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS.

## PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

**Indications.** — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour. S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Prix :

1 cc. : 23 fr. 75 — 2 cc. : 28 fr. 20 — 3 cc. : 31 fr. 10.  
Supp. : 23 fr. 75.

Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.

à PRÉMERY (Nièvre).

## PHOSPHAN CADUCIA

Acidifiant — Sténique — Récalcifiant.

Première utilisation des acides organiques

Mono et diméthylphosphoriques associés au Calcium.

Solution stable et contrôlée par une nouvelle technique de dosage.

*Bulletin de la Société Chimique*, t. XIX, 1898.

*Journal de Pharmacie et de Chimie*, 8<sup>e</sup> série, t. XX, 1934.

**Formule.** — Acides Mono et Diméthylphosphoriques et Calcium.

**Forme.** — Gouttes.

**Avantages.** — Acidité la plus élevée (0 gr. 75 d'acides organiques libres par LX gouttes).

Tolérance parfaite. Action tonique et immédiate.

Utilisation de l'ion Calcium ne pouvant se fixer qu'en combinaison phosphorique.

**Indications.** — Asthénies, Alcaloses, Déminéralisation.

**Posologie.** — Traitement de 10 jours par mois.

*Adultes* : LX gouttes au cours des repas du midi et du soir, dans un verre d'eau additionnée d'un peu de sucre ou de vin.

*Enfants* : demi-dose.

Prix : 27 fr. 10.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Docteur en Pharmacie

78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 33-78.)

## PHOSPHARSOL

**Composition.** — Préparation phosphoarsénisée organique combinée à la strychnine. Correspondant à 2 mgr. cacodylate de strychnine et 15 mgr. glycérophosphate par tablette.

**Indications thérapeutiques.** — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, la déficience organique, la tuberculose, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser la dose de 8 comprimés par jour.*

**Prix en France** : 19 francs la boîte.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1369-2.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en Pharmacie

38, rue Capitaine-Ferber — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : MENII 52-83.)

## PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os  
en particules infinitésimales  
en suspension dans un liquide isotonique.

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à potage.

*Enfants et Nourrissons* : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 17 fr. 60 le flacon pour 10 jours de traitement.

## PHOSPHATE DE CHAUX IRRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard  
et « Vitamine D » cristallisée.

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 cuillerées à potage. *Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 24 fr. 40 le flacon pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

## PHOSPHIGEM

Réalise sous forme de granulés fondants d'un goût très agréable, en  
combinaison stable et inaltérable, la formule de Joulie :

Acide orthophosphorique .....	50 gr.
Phosphate acide de soude .....	100 —
Granulés fondants, Q. S. ....	1 000 —

**Propriétés et indications.** — Tonique général et nerveux, reminéralisateur, correcteur des troubles de la nutrition, le Phosphigem est indiqué dans :

Neurasthénie, Impuissance, Anémie, Anorexie, Convalescence, Déminéralisation, Etats Alcalosiques et leurs manifestations : Dermatoses, Rhumatisme chronique, Dyspepsies, Phosphaturie, Lithiase phosphaturique, Congestion hépatique.

**Présentation.** — Granulés d'un goût exquis, en boîte métal. (150 gr. environ).

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe après les repas.

*Enfants et vieillards* : 1/2 dose.

Innocuité absolue, aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments  
sous le n° 1244-4.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,  
38, rue du Louvre — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél. : Central 01-35.)

## PHOSPHOBIOL

**Forme.** — Solution aromatisée au sirop de curaçao et de citron.

**Formule.** — Une cuillerée à café contient :

Chlorh. quinine .....	0,05
Hypoph. de Manganèse .....	0,05
Hypoph. de chaux .....	0,05
Citrate de fer .....	0,025
Sulf. de strychnine .....	0,001

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant reconstituant général, Accélérateur de la nutrition. Favorise l'augmentation de poids et provoque l'appétit.

**Indications.** — Toutes dépressions organiques : Croissance, Anémies, Surmenage, Neurasthénie, Convalescences, etc...

**Mode d'emploi.** — Dose moyenne : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau deux fois par jour au début des repas.

**Prix** : 18 fr. 25. — Durée du traitement : 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

## PHOSPHOBROM

**Composition.** — Bromure, Phosphate, Citrate alcalin.

**Forme.** — Granulé fondant soluble, de goût agréable.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoire SERINDAT

4, rue Lecomte-de-Nouv — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Jasmin 53-48.)

## PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue. Reconstituant physiologique, de goût agréable.

**PHOSPHOLÉOSE A : Composition.** — Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

**PHOSPHOLÉOSE B :** même composition, mais sans arsenic.

**Indications.** — Lymphatisme, pré tuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

**Présentation.** — Une seule forme : liquide.

**Posologie.** — De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas. Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

**PHOSPHOLÉOSE C :** Traitement arseno-mercuriel dissimulé associé à l'iode.

**Composition.** — Une cuillerée à soupe de **Phospholéose C** contient : 0,01 cgr de Hg + 0,01 cgr. de As + 0,50 cgr. d'iode + 0,10 cgr. de phosphate.

**Posologie.** — **Adultes :** 2 à 4 cuillerées à soupe. **Enfants :** par cuillerées à café.

Prix : **Phospholéose A et B :** 20 fr. 10.

**Phospholéose C :** 22 fr. 50.

**Laboratoires Docteur DEMASLES**

8, rue du Musée — VIENNE (Isère), (Tél. : 9-71.)

## PHOSPHONEUROL

Un polyphosphate phosphorique sans excipient ni alcaloïde.

**Formule :**

Acides éthyl-phosphoriques.....	22,50
Phosphate de soude.....	45,00
Biphosphate de chaux.....	22,50
Glycérophosphate magnésique.....	10,00
	100 gr.

**1° Par sa richesse en acides éthyl-phosphoriques et phosphate de sodium :**

**Phosphoneurol** est donc indiqué :

a. Dans tous les cas de déperdition phosphatée.

**Dépresseurs nerveux** (Neurasthénie, Psychasthénie, etc.).

**Fatigue, surmenage,** surtout avec insomnie.

**Maigrissement.**

**Convalescence** de maladies infectieuses ou d'actes opératoires.

b. Dans l'arthritisme, les rhumatismes subaigus ou chroniques.

c. Dans toutes les dyspepsies.

d. Dans la **colibacillose**, comme adjuvant de l'urotropine.

**2° Par son phosphate de calcium :**

a. Dans les troubles de l'ossification (croissance, rachitisme).

b. Dans la cure de la tuberculose en général.

**3° Par son phosphate de magnésium :**

Dans la cure et la prophylaxie des tumeurs malignes.

**Présentation.** — Une seule forme : **Gouttes.**

**Posologie** { **Adultes :** XXX à XL gouttes.  
**Adolescents :** XV à XXX gouttes.  
**Enfants :** V à X gouttes.

A prendre à l'un des principaux repas (de préférence à celui de midi), dans un verre d'eau sucrée ou de boisson.

Prix : Le flacon (traitement pour un mois), 23 fr. 50.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**

23, rue du Parc,  
**FONTENAY-SOUS-BOIS** (Seine).  
 (Tél. : Tremblay 12-04.)

## PHOSPHOPINAL JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique avec la tétrébutine du pin.

**Indications.** — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

*Fluateur des sels de chaux.* — *Aliment de la cellule nerveuse* Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

**Formes et doses moyennes.**

<b>Capsules :</b> adultes : 4 à 6 par jour.	Contenance du flacon : 50 capsules.	Prix : 20 fr.
enfants : 2 à 3 par jour.	Contenance du flacon : 90 grammes.	Prix : 20 fr. 20.
<b>Élixir :</b> adultes : 2 cuil. à café par j.	Contenance du flacon : 40 grammes.	Prix : 20 fr.
enfants : 1 cuil. à café par j.		
<b>Gouttes :</b> adultes : 40 à 60 par jour.		
enfants : 20 à 30 par jour.		

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Le PHOSPHOPINAL JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

**Nouvelle forme. Ampoules injectables :**

2 cc. adultes : 1 ampoule tous les 2 jours	Contenance de 10 ampoules,
1 cc. enfants : 1 ampoule tous les 3 jours	chaque boîte : 10 ampoules,

**Prix :** 25 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> : 121-2, 121-3, 121-5, 121-10.

**Laboratoire JUIN-GUIRAUD**

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 94-28.)

## PHOSPHORINE VILLARD

**Trois formes :**

**GOUTTES :** Ac. orthophosphorique, Biphosphates de Na, K, Fe, Mg, Mn.

**Indications.** — Alcalose, Arthritisme, Déminéralisation, Grosseesse, Neurasthénie et toutes déficiences du système nerveux.

**Posologie.** — Progressivement de X à XX gouttes à chacun des 2 repas, dans un grand verre d'eau.

**Présentation.** — Flacon de 30 cc.

**COMPRIMÉS :** Glycérophosphates de Ca, Fe, Mg, Mn (0,225 par comprimé).

**Posologie.** — 1 ou 2 comprimés à chacun des 2 repas.

**Présentation.** — Boîte de 40 comprimés.

**GRANULÉ SUCRÉ :** Glycérophosphates de Ca, Na, K, Mg, Mn (5 %).

**Posologie.** — 1 cuillerée à café 2 ou 3 fois par jour.

**Présentation.** — Boîte de 125 gr.

Prix uniforme : 17 fr. 60.

**Laboratoire G. VILLARD**

3, place Sainte-Claire — GRENOBLE.

## PHOSPHOSODINE

*Médicament des troubles de la Digestion et de la Nutrition.*

*Tonique général et nerveux*

**Composition :**

Cephælis Ipécacuanha Tre. Rac. ....	4
Croton Eluthéria Teint. Ec. ....	10
Ac. ortho-phosphorique off. ....	15
Phosphate disodique pur. ....	30
Excipient hydro-glycériné. ....	Q. S. P. 100 cc.

**Indications.** — Dyspepsie hypochlorhydrique, Atonie gastrique, Fermentations anormales, Lithiases, Phosphaturie, Oxaluries, Colibacilloses, Rhumatismes chroniques, États alcalosiques, Dermatoses, Neurasthénie, Fatigue, Convalescences, Etc...

**Forme.** — Solution concentrée. Le flacon de 125 cc. environ : 19 fr. 95.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un verre de boisson, à boire en mangeant, midi et soir (sauf indication contraire du médecin).

**Remarque :** Chaque dose doit être prise au cours du repas, diluée dans un grand verre d'eau ou de boisson, sucrée au besoin.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Dépôt général :**

**Laboratoires BORDELAIS**  
47, rue Maleret — BORDEAUX.

## PHOSPHO-STRYCHNAL LONGUET

**Composition :**

Strychnal (Sulfate d'éthylbétaine de l'acide strychnique) .....	0,005
Acide phosphorique officinal .....	0,15
Glycérophosphates crist. de NA .....	0,20
— CA .....	0,02
— K .....	0,015
— Mg .....	0,0025
Chlorure de manganèse .....	0,005

Pour XX gouttes.

**Indications.** — Action tonique non excitante du Strychnal à faible dose. Action tonique, réacidifiante, anti-dyspeptique de l'acide phosphorique. Action réconstituante des glycéro-phosphates. Action catalytique du manganèse. Anorexie, Asthénie, Convalescences

**Forme.** — Gouttes.

**Posologie :**

**Adultes :** XX à XL gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

**Enfants :** V à XX gouttes par repas, suivant l'âge.

**Prix :** 19 fr. 40 (15 jours de traitement).

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>)

## PHOSPHOXYL

*voir*

## FOSFOXYL CARRON

**Phosphore colloïdal.**

## PHOSTHÉNINE

**LINDEUX**

dans un flacon compte-gouttes.

**Composition.** — Ester MONO éthylophosphorique pur, (débarrasé d'acide diéthyl inactif et d'alcool) associé au Fluophosphate de Calcium et de Magnésium et à de faibles doses d'extraits d'organes (Surrénales, Hypophyse).

Le Fluophosphate de Ca et de Mg représente, par le fluor de son acide (Armand Gautier) et le Magnésium de sa base, les fixateurs du phosphore dans l'organisme. Son rôle dans le métabolisme du calcium est capital : l'expérience a montré qu'une faible quantité était suffisante pour assurer la fixation de doses élevées de calcium.

### Avantages de la Phosthénine :

- 1° Elle apporte à l'organisme, sous une forme parfaitement assimilable et remarquablement tolérée, l'aci. phosphorique indispensable.
- 2° Elle facilite l'assimilation du calcium par le Fluophosphate de Ca et de Mg, qui joue le rôle de catalyseur en présence de l'apport calcique alimentaire ou thérapeutique.
- 3° Elle représente donc un élément de premier ordre dans l'équilibre phospho-calcique et elle contribue au maintien du pH sanguin.
- 4° Son action particulièrement rapide se manifeste dès les premiers jours du traitement, grâce au remarquable pouvoir de diffusion de sa fonction acide-éther.
- 5° Sa tolérance parfaite, sa forte concentration (60 gouttes représentent 1 gramme d'aci. phosphorique libre) facilitent l'administration de doses élevées, sous un faible volume, fait important au cours d'une médication intensive.
- 6° De saveur très agréable, elle constitue un désaltérant délicieux, en dehors des repas (quelques gouttes dans un verre d'eau pure ou sucrée) ; en outre, elle calme efficacement le besoin impérieux qu'éprouvent certaines personnes de boire à tout moment.
- 7° Enfin, sa pureté est absolue. Elle ne contient aucune substance susceptible de gêner ou de diminuer son action (ni acide diéthyl. inactif, ni alcool).

### Indications :

*Chez l'adulte :* États dépressifs, Asthénie, Neurasthénie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences des maladies fébriles (Grippe, etc...), Tuberculose sous toutes ses formes.

Colibacillose et ses diverses manifestations (Cholécystite, Pyélonéphrite, etc...).

Troubles du Métabolisme, Azotémie, Diabète, Goutte, Arthritisme, Artério-sclérose, Adénome.

États dyspeptiques et tous les cas d'hypotonie gastrique.

*Chez la femme :* dans la lassitude anormale aux époques de la formation et de la ménopause, pendant les règles, pendant la grossesse et après l'accouchement.

*Chez l'enfant :* dans la Phosphaturie, l'Enurésie, et pour remédier aux perturbations du développement et de la croissance, en même temps qu'aux états languissants et apathiques.

*Chez tous,* dans tous les cas de carence phosphorée et plus particulièrement dans les régimes hypocarnés et dans tous les états alcooliques.

### Mode d'emploi (Sauf avis du médecin) :

1° *Adultes* (au-dessus de 16 ans) : 40 à 60 gouttes, 2 fois par jour, au moment des repas, dans un verre de liquide au choix (eau pure ou sucrée, eau rougie, bière, cidre, etc.).

2° *Enfants* (au-dessous de 16 ans) : 2 gouttes par année d'âge 2 fois par jour.

### Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

(Tél. : Tremblay 25-33.)

## PHYLLA

**Chlorophylle pure solubilisée.**

Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé et solubilisé, est actif et assimilable, contrairement à la chlorophylle des légumes verts, crus ou cuits.

### Indications :

*Anémies hypochromes, anémies post-hémorragiques.*  
*Anémies néoplasiques.* — (La chlorophylle relève le taux de l'hémoglobine et peut suppléer à l'opothérapie hépatique.)  
*Anorexies des nourrissons.* — *Anorexies des tuberculeux* — (La chlorophylle augmente l'appétit sans altérer la muqueuse gastrique.)  
*Asthénies* — *Surmenage* — *Convalescences* (tonique dépourvu de toute toxicité).  
*Hypotensions artérielles* (idiopathique, permanente, symptomatique).  
*Acrocyanoses* (adynamie circulatoire).  
*Adynamie des Cancéreux et des Tuberculeux.*  
*Hypotrophies* — *Rachitisme* — *Carences solaires.* [La chlorophylle sensibilise l'organisme aux radiations (X et U. V.) et à l'action des médicaments irradiés.]

### Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas, 15 jours par mois.  
 Comprimés : 2 à 3 comprimés avant chaque repas.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques.**

39, bd. de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
 (Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## PHYSIOSCYAMINE

**Médication du vague et du sympathique.**

**Composition.** — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

**Indications.** — Troubles nerveux ressortissants à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique, tel que : vertiges, congestions postprandiales, migraines gastriques, palpitations de cœur d'origine digestive, tremblements, somnolence, bâillements, constipation d'origine sympathique, etc...

**Posologie.** — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

**Présentation.** — Boîte de 30 cachets. Prix de la boîte : 20 fr. 70.

Dépôt général :

**Laboratoires BORDELAIS**

47, rue Maleret — BORDEAUX. — (Tél. : 843-22.)

## PHYSIOSTHÉNINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Soluté injectable leucogène.

**Indications.** — Toutes infections graves (1) : Angines, Broncho-pneumonies, Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Fièvre puerpérale, Gripes, Pleurésies, Septicémies, etc...

**Doses et mode d'emploi.** — *Injectons* : intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy, 1 à 3 ampoules chaque jour (cas aigus) ou tous les 2 ou 4 jours (cas moyens ou chroniques).

*Lavements* : 1 à 4 ampoules diluées dans un volume égal d'eau tiède, distillée de préférence, au besoin une demi-heure à une heure après un lavement évacuant.

### Formes et prix :

*Adultes* : Boîte 4 ampoules 20 cc., 62 fr. 30.

*Enfants* : Boîte 4 ampoules 10 cc., 61 fr. 60.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
 RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

(1) Infections de moyenne intensité : voir *Néo-Physio*.

## PHYTINE

**Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie.**

**CIBA**

**TONIQUE, RECONSTITUANT, DYNAMOGÉNIQUE.**

Phosphore organique végétal 22 p. 100.

Calcium 12 p. 100. Magnésium 1,50 p. 100.

Préparation phosphorée extraite des graines végétales. Le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés.

**Indications.** — Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé, 4 à 8 comprimés. *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

**Formuler.** — Boîte de 20 cachets.  
 Flacon de 40 comprimés.  
 Flacon de granulé.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**  
 103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
 (Tél. : Moncey 43-26.)

## PHYTOCALCINE CAUBIN

M. D. 184-944. Paris 16-10-1919.

**Composition.** — Phosphates végétaux, Calcium d'huîtres et Vitamine D2 qui les fixe, Vitamine B1 tonique nerveux, Vitamine C élément de défense de l'organisme.

**Indications.** — Asthénie, amaigrissement, grossesse, allaitement, caries dentaires, croissance, maladies par carence.

**Formes.** — Cachets : boîtes grand modèle de 48 à 0 gr. 50. Boîtes petit modèle de 30 à 0 gr. 50. Poudre BB-en étuis pour enfants et nourrissons.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n° 2316-1 et 2.

**Posologie.** — *Jeunes gens et adultes* : 3 à 5 cachets par jour aux repas.

*Enfants et nourrissons* : 3 à 5 cuillerées à café par jour à incorporer aux bouillies, purées, confitures des repas.

**Laboratoires des Phosphates vitaminés CAUBIN**

**H. FONTENAY, Pharmacien.**  
39, rue Camille-Godard, Bordeaux.

## PHYTOCHOLINE

*La Phytocholine double la Cholérèse.*

Puissant cholérétique à base de **Curcuma Xanthorhiza**.

**Composition.** — Poudre et extrait de **Curcuma Xanthorhiza**, extraits d'orthosiphon, de Berberis, de Combretum.

**Propriétés.** — *Double la Cholérèse*. Puissant diurétique, Cholestérolitique.

**Indications.** — Dans tous les cas où il convient de recourir à une médication à la fois *Cholérétique et Diurétique*.

1° Insuffisances hépatiques, ictères, angiocholite, lithiase biliaire, cholestyite, cholémie, foie colonial ;

2° Urémie et états hyperazotémiques, hypercholestérolémie (cellulites) affections de la peau d'origine hépatique (urticaire prurit, herpès). Aucune contre-indication. Aucune accoutumance.

**Posologie.** — *Enfants* (à partir de 6 ans) : de 1 à 2 dragées par jour au moment des repas.

*Adultes* : de 2 à 4 dragées par jour, au moment des repas.  
*La Phytocholine existe uniquement en flacons de 40 dragées.*

Prix : 23 fr 20.

**Laboratoires LACROIX**

**MEROBIAN et FILS, Successeurs**

37, rue Pajol — PARIS (XVIII°).  
(Tél. : Nord 54-57.)

## PHYTOGERMINE VITAMINÉE

**Composition :**

Vitamine A .....	Par comprimé 15 U. I.
Vitamine D .....	200 U. I.
<b>INOSITOPHOSPHATE DE CALCIUM</b>	
et de <b>MAGNÉSIUM</b> extrait du germe de Blé (Germe) .....	
	25 cgr.

**Propriétés.** — Puissant reminéralisateur ; prévient toutes les conséquences de la sous-alimentation, permet à l'organisme de regagner son poids normal. Stimule la nutrition et rétablit le métabolisme.

**Indications.** — **SOUS-ALIMENTATION.** Dénutrition. Anémies, Convalescences. Surmenage et Dépressions. Troubles de la grossesse et de la lactation.

**Posologie.** — *Adultes et Adolescents* : 4 à 8 comprimés *pro die*.

*Enfants et Bébés* : 2 à 4 comprimés.  
Pour les enfants : écraser les comprimés, puis délayer la poudre dans un peu de lait, confiture ou potage.

**Laboratoire LE BRAZIDE**

1, rue Moncey — PARIS (IX°).  
(Tél. : Trinité 41-80.)

## PHYTOGYL

Médication reminéralisatrice.

**Composition.** — Vitamine D<sub>2</sub> cristallisée chimiquement pure, associée aux sels de phosphore, chaux, magnésium, assimilables.

**Indications.** — Toutes décalcifications : Anémies, Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses, Lymphathisme, Pré tuberculose, Stimulant de la nutrition.

**Présentation.** — Comprimés à faire fondre dans la bouche : en tube de 25 comprimés.

1 comprimé contient 1/10 de mgr. de Vitamine D<sub>2</sub> et 0 gr. 22 de sels minéraux.

**Posologie.** — De la naissance à 1 an : 1 comprimé par jour. De 1 à 10 ans : 2 comprimés par jour.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 3 comprimés. La cure peut être continuée pendant 2 ou 3 mois.

Prix au public : Le tube : 21 fr. 90.

**Les Laboratoires du Dr ROUSSEL.**

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, r. du Cherche-Midi — PARIS (VI°). (Litré 58-43.)



## PHYTOJAVA

**Composition.** — Extrait de *Temoe Lawag* (*Curcuma zanthorrhiza*) associé à l'*Orthosiphon stamineus* (plantes originaires de Java).

**Indications.** — Le *Temoe Lawag*, cholérétique, augmente la sécrétion de la bile sans provoquer de spasmes ni de coliques.

L'*Orthosiphon*, diurétique hépato-rénal favorise l'excrétion de l'urée et des chlorures.

(D<sup>r</sup> Leclerc, *Presse médicale*, 9 nov. 1935; *Courrier médical*, 30 mai 1935; J<sup>al</sup> Méd. et Chir. pratiques, mars 1937.)

(D<sup>r</sup> Decaux, *Presse médicale*, 22 mai 1935; Communication *Société thérapeutique*, janv. 1936.)

Ictères, Cholécytites, Congestion du foie, Cholestéri-némie.

**Formes.** — Comprimés dragéifiés. Gouttes.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés avant chaque repas. X à XXX gouttes avant chaque repas.

Enfants: gouttes 1/2 dose.

Prix: 18 fr. 70 (10 jours de traitement).

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## PHYTO-KOLA

Toni-stimulant complet. Association de phosphore organique d'origine végétale Hexa-inosito phosphate de calcium et de magnésium, *Suractivée* par les Noix fraîches de Kola.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Reminéralisateur, excitant puissant du métabolisme. Stimulant de l'activité cérébrale, donnant des résultats rapides et très constants, dans toutes les déficiences organiques, toutes les convalescences: médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions: Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

**Présentation.** — Boîte de 60 comprimés en trois tubes.

**Posologie.** — Croquer 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants: 1/2 dose.

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-2.

**Laboratoires R. et M. GUIGNARD**

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (I<sup>er</sup>).

(Tél.: Central 01-35.)

## PHYTOLAX

Laxatif-cholagogue végétal.

Stimulant des fonctions hépatiques et intestinales. A base d'extraits de végétaux, rigoureusement exempt de phénolphtaléine et de laxatifs chimiques.

**Composition.** — Artichaut, Cascara, Podophylle, Bourdaine, Hydroxyde d'alumine colloïdal.

**Avantages.** — Évacuation rapide et totale sans colique et sans irritation surajoutée.

Apport d'hydroxyde d'alumine colloïdal qui tapisse la muqueuse sensible d'un véritable pansement mucilagineux doux et protecteur.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés par 24 heures pris *ad libitum*.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale: lipolides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et pro-vitamine A.

**Propriétés.** — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

**Indications.** — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie, Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

**Présentation.** — En granulés aromatisés ou en dragées également aromatisées.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les n°s 82-7 et 82-8.

**Posologie.** — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers:

*Nourrissons:* 1 cuiller à café de granulé.

*Enfants:* 2 cuillères à café de granulé ou 2 dragées.

*Adolescents et adultes:* 3 cuillères à café de granulé ou 3 dragées.

Prix: 22 fr. 60.

**Laboratoires J. PLÉ**

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3<sup>e</sup>).

## PHYTOVEINOL

(Gouttes.)

Formule entièrement originale, exclusivement végétale, très bien supportée par les voies digestives.

**Composition.** — Alcoolature de racines de Ficaire, Teinture de racine de Seneçon, Alcoolature de sommités fleuries d'*Achillea Millefolium*, Alcoolature d'Anémone, Intrait de Marron d'Inde Dausse.

**Indications.** — Insuffisance veineuse dans ses diverses manifestations, Hémorroïdes, Varices, Phlébites, États congestifs de la ménopause.

**Mode d'emploi.** — Crise hémorroïdaire aiguë : XX gouttes toutes les 2 heures, jusqu'à CC gouttes toutes les 24 heures (ces hautes doses sur indication médicale exclusivement).

Continuer 5 à 6 jours en moyenne et employer des doses décroissantes dès que l'amélioration se fait nettement sentir.

Traitement d'entretien : 20 jours par mois, XXV gouttes aux repas.

**Laboratoires LACHARTRE**

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (V°).  
(Tél. : Gob. 77-81.)

## PHYTO-VITAMINES PLÉ

Solution non huileuse des vitamines A et D étonnées à l'état colloïdal associées aux vitamines B, à la chlorophylle pure, soluble, et aux acides aminés.

**Propriétés.** — Haute activité vitaminique en synergie. Aucune toxicité. Est miscible directement à l'eau. Saveur agréable.

**Indications.** — A titre prophylactique : chez les enfants en fin d'hiver et au printemps, régimes alimentaires, femmes enceintes et allaitantes, nourrissons ; à titre curatif : comme adjuvant aux traitements anti-infectieux, le lymphatisme, les anémies, états ganglionnaires, chez les prématurés, les athrepsiques ou hypotrophiques, les troubles du métabolisme phospho-calcique.

**Présentation.** — Liquide aqueux d'emploi aisé avec son « Compte-gouttes Doseur ». Une dose = XX gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-9.

**Posologie :** Avant les deux repas :

Nourrissons : 1 dose. Enfants : 2 doses. Adolescents et Adultes : 3 doses.

Prix : 22 fr. 30.

Littérature et échantillons aux

**Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III°).

(Tél. : Archives 83-52.)

## PICRICOL

Réparateur des tissus.

Antiseptique, Kératoplastique, Lénifiant.

**Composition.** — Acide Picrique (0 gr. 06 par c.), Sulfate de Zinc Amidon.

En comprimés parfumés, très solubles (usage externe).

**Indications.** — Cicatrisation des plaies et muqueuses.

**Plaies chirurgicales.** — Lavages, pansements, 2 à 3 comprimés par litre.

**Gynécologie.** — Hygiène et traitement des affections vaginales, Vulvite, Infections gonococciques, Pertes blanches, Sécrétions fétides, Métrites du col avec ou sans ulcérations, Métrites en général, Salpingites, Ovarites.

Injections (4 à 5 comprimés pour 2 litres d'eau).

**Plaies accidentelles.** — Coupures douloureuses et souillées, brûlures (2 à 4 comprimés par litre).

**Gargarismes antiseptiques et cicatrisants.**

**Emploi.** — Faire dissoudre les comprimés dans l'eau bouillante chaude, utiliser la solution atténuée.

Pas de réactions douloureuses. — Pas d'irritations.

Action sédatrice très réelle.

**Remarque.** — Le borax fait disparaître facilement les taches de Picricol. Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-15.

**Laboratoire N. AGUETTANT**

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

## PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 20, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée et boldo.

Ne renfermant aucun drastique ni laxatif.

Affections hépatiques. Lithiasse biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

**Dose.** — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Durée moyenne : 25 jours.

Le flacon de 100 pilules : 20 francs.

— 50 — 11 fr. 10.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI°).

## PILULES DU DOCTEUR SIMTHS

**Composition.** — Damiana, Muirapama, Phosphure de zinc, Noix vomique.

**Propriétés.** — Stimulant du système nerveux. Tonique général. Indiqué dans l'amaurose et dans la déficience glandulaire.

**Indications.** — Impuissance sexuelle, Asthénies, Anaphrodisie neurasthénique, Surmenage intellectuel, Perte de mémoire.

**Présentation et prix.** — Flacon de 40 pilules : 30 francs.

**Posologie.** — Traitement de 1 à 3 mois. Une pilule matin et soir avant les repas. Maximum : 4 pilules par jour.

S'abstenir d'alcool, pas d'abus de tabac, pas d'excès

**Laboratoire F. PARAT**

SAINT-LEU-LA-FORÊT (Seine-et-Oise).

## PILULES LEMARY

Ces pilules kératinisées suivant le procédé du Dr Henri Philippe constituent un traitement mercuriel discret très tolérable et efficace.

**Indications.** — Traitement d'entretien (malades éloignés des centres médicaux) très utile pour le praticien dans les affections douloureuses ou réelles d'origine spécifique (cœur, yeux, système nerveux), pour les organismes usés supportant mal les traitements d'attaque.

**Formule A.** — Dupuytren du Codex. Bichlorure de mercure à 0,01 cgr. : 19 fr. 90.

**Formule B.** — Ricord du Codex. Iodure mercurieux à 0,05 cgr. : 19 fr. 90.

**Formule C.** — Bi-iodure Hg 0,005 mgr. et KI à 0,25 cgr. (formule de Gibert) : 22 fr. 20.

A et B : 2 à 4 pilules par jour.

C : 2 pilules par jour (avant chaque repas).

Le flacon porte une étiquette discrète.

**Produits du Docteur Henri PHILIPPE**

36, quai Fulchiron — LYON.

## PILULES MYOSOTIS

**Molles**

**Composition :**

Bichlorure de Hg .....	0,005
Poudre d'opium .....	0,005
Poudre fraîche de coca .....	0,15
Extrait de gentiane .....	0,04

**Indications.** — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le Dr Vernes.

**Emplol :**

1<sup>re</sup> semaine : 1 pilule par jour au repas du midi.  
2<sup>e</sup> semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.  
3<sup>e</sup> sem. : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.  
4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> sem. : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.  
6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> sem. : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.  
8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> sem. : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.  
En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Prix : Flacon de 40 pilules, 12 fr. 50.

**Laboratoires NORGAN**

**Pierre ALEXANDRE, Pharmacien**

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64-36.)

## PILULES PHILIPPE

**Kératinisées.**

Iodure de Potassium (KI) à 0,10-0,20-0,50 ..	22 fr. 20
Iodure de Sodium (NaI) à 0,10-0,20-0,50.....	22 fr. 20
Iodure de Lithium, 0,25.....	25 fr. »
Philippe Harlem (Voir <i>Harlem Philippe</i> )....	19 fr. 90
Philippe Pancréatine (Voir <i>Pancréatine Philippe</i> ) .....	19 fr. 90
Kérasalicyl, salicylate 0,50 (Voir <i>Kérasalicyl</i> )..	19 fr. 90
Kéraspirine, aspirine kératinisée, 0,25-0,50 ..	10 fr. »
Pilules Lémary (Voir <i>Pilules Lémary</i> ).....	
Pilules Philippe Dupuytren (Codex) :.....	19 fr. 90
— — Ricord (Codex).....	19 fr. 90
— — (Bi-iodure HgKI) .....	22 fr. 20
Antidote Malaria, Quinine, Extrait biliaire, Méthylarsinate disodique, Oxalate de fer...	22 fr. 20

**Produits du Dr Henri PHILIPPE**

36, quai Fulchiron — LYON.

## PILULES V.-E. DOUMER

### Formule :

Chaque pilule contient 5 cgr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

### Doses :

De 3 à 8 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

### Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

**Laboratoires BOMEL**  
ANNONAY (Ardèche) — France.

## PINEOLEUM

**Composition.** — *Forme simple* : Eucalyptus, Pin Pumilionis, Cannelle, Camphre, Menthol, Huile de Paraffine pure.

*Forme éphédrinée* : même formule + éphédrine.

**Propriétés.** — Antiseptique spécifique des affections rhino-pharyngées.

**Formes.** — *Pulvérisateur* vendu garni de PINEOLEUM.

*Applicateur* avec compte-gouttes spécial. *Grand flacon* pour recharger le pulvérisateur ou l'applicateur.

**Important.** — Chacune de ces trois formes existe en deux formules :

*Simple* ou *éphédrinée*.

Prix :	( Pulvérisateur garni. 27 fr. 40 )	Simple ou éphédrinée.
	Applicateur ..... 17 fr. 10	
	( Grand flacon ..... 24 fr. 40 )	

**Laboratoire PHYGIÈNE**

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).  
(Tél. : Charlebourg 39-70.)

## PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine,  $\text{NH} \begin{matrix} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 \end{matrix} \text{NH}$ , alcalin organique du groupe des Pyridines inscrit au Codex français 1908.  
Granulé effervescent, dosé à 0 gr. 20 de PIPÉRAZINE pure par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique ; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

**Indications.** — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseau).

**Prix :** 24 fr. 50. — **Durée du traitement :** une semaine.

**Laboratoires MIDY**

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## PIPÉRAZINE SOLENS

**Forme.** — Granulé effervescent à 4 p. 100 de Pipérazine pure.

**Dosage.** — Une cuillerée à café de granulé = 0 gr. 20 de Pipérazine.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes manifestations arthritiques, Lithiase rénale, Goutte chronique ou aiguë, Coliques hépatiques et néphrétiques, Rhumatisme, Sciatique, Artériosclérose, etc.

**Posologie.** — De 2 à 5 cuillerées à café par 24 heures, chaque cuillerée de granulé Pipérazine Solens dissoute dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## PIPERITOL

Combinaison nouvelle assurant un drainage parfait de l'organisme par dissolution et élimination de l'acide urique et des urates.

**Formule.** — *Comprimé blanc.* — Tartrate de pipérazine : 0,075. Benzozate Lithine : 0,075. Masse effervescente Q. S. pour 1 comprimé terminé à 0,50.

*Comprimé bis.* — Anhydrométhylène éltrate hexaméthylène-tétramine : 0,075. Condurango pulv. : 0,01. Théobromine : 0,025. Phosphate de soude : 0,05. Masse effervescente Q. S. pour 1 comprimé terminé à 0,50.

**Indications.** — Anti-arthritique de choix.

Goutte. Rhumatisme. Sciatique. Artériosclérose. Gravelle. Calculs. Coliques néphrétiques et biliaires. Eczéma. Diabète.

Toutes les infections hépato-rénales.

Colibacillose. Cholécystite. Pyélite. Hémorragie aiguë et chronique, etc. Hydropisie cardiaque et néphrétique. Néphrite chronique.

Modificateur du terrain dans les maladies héréditaires et acquises.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés blancs dans un demi-verre d'eau au début des repas du midi et du soir.

1 à 2 comprimés bis dans un demi-verre d'eau à la fin du repas du midi et du soir.

Si nécessaire, il est possible de prendre ensemble les comprimés blancs et bis au début du repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 2007-1.

Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BETHUNE.

## PIVADORME

(Bromopivalyl-carbamide.)

Composé organique bromé non barbiturique sédatif doux du système nerveux, ne créant aucune accoutumance.

**Indications.** — Insomnies légères, surmenage intellectuel, anxiété, instabilité nerveuse.

**Présentation. Posologie.** — Comprimés à 0 g. 50 (tubes de 20).

1 à 3 comprimés par 24 heures, la plus forte dose étant absorbée au repas du soir, à l'aide d'une infusion.

Prix de vente : 12 fr. 40.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## PLACIDOL

**Thérapeutique neuro-vasculaire rationnelle.**

**Indications :**

Tous États névropathiques, Angoisse, Anxiété, Neurasthénie, Insomnie, Ménopause, Migraines, Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Puberté, Congestion pelvienne, États congestifs.

**Formule :**

Chloraldiméthylamino-antipyrine, Extrait glyciné d'ovaire et de pancréas, Extrait fluide de gui, marron d'Inde, Hamamelis, Passiflore, Teinture de cratægus.

**Mode d'emploi :**

Le *Placidol* se présente sous forme d'Élixir agréable, à prendre, il n'est pas toxique.

**Doses :** 1 cuillerée à café au déjeuner de midi et le soir en se couchant.

Prix : 17 fr. 65.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## PLASMA DE QUINTON

*Nom déposé en 1907.*

**Composition.** — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite ; transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

**Le Plasma de Quinton** (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

**Bibliographie.** — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2<sup>e</sup> éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

### Indications :

**Traitement prénatal.** Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'arme plus puissante. On sait qu'il a été fondé (D<sup>r</sup> ARNULPHI, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1<sup>o</sup> de conduire à terme le produit conçu ; 2<sup>o</sup> de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3<sup>o</sup> d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

**Entérites des adultes et des grands enfants.** Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

**Gastro-entérites des nourrissons.** Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

**Intolérance lactée, Athrepsie.** L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsie s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

**Maladies de la peau** (Acné, Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées) ; **Maladies du Système nerveux** (Névralgies, Énauresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie) ; **Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.**

**Régimes, doses d'Injections.** — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine par le *Plasma de Quinton*, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

**Présentation.** — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

**Renseignements et littérature** (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance ; envois de notices sur les applications et la posologie du *Plasma de Quinton*) : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 514-60.  
Commandes et ordres d'expéditions :

**Produits Biologiques CARRION**

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45 et 46.)

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

## PLASMARINE

**Analeptique marin polyminéralisé.**

**Composition.** — Calcium en combinaisons minérale et organique assimilables ; Phosphates et acide phosphorique calco-manganique ; Iode en solution marine ; Manganèse glycérophosphorique assimilable ; éléments en combinaison et solution dans le Plasma Marin naturel isotonique.

**Action thérapeutique :**

- 1° Réveil immédiat de l'appétit.
- 2° Reminéralisation intégrale intensive.
- 3° Action tonique et réparatrice.
- 4° Action dépurative.
- 5° Modification favorable du terrain.

Energique, agréable, atoxique.

**Posologie :**

**Adultes :** 2 à 3 cuillerées à soupe.  
**Grands enfants :** 2 à 3 cuillerées à dessert.  
**Petits enfants :** 2 à 3 cuillerées à café.  
 Soit au début, soit à la fin des repas.

Prix : 21 fr. 40.

**Laboratoires « LA BIOMARINE »**  
 DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

## PLEXALGINE LALEUF

**Composition.** — Extraits spéciaux de : muscle strié, myocarde, pancréas, foie et rein, parathyroïde, phényléthylmalonylurée, extraits végétaux (datura, mandragore, jaborandi, lobélie).

**Propriétés et indications.** — Sédation et suppression des désordres causés par le déséquilibre vaso-sympathique. La **Plexalgine** agit non seulement sur les effets (algies et spasmes), mais aussi sur les causes (carences métaboliques, spasmophilie).

Spécialement indiquée dans : douleurs précordiales et solaires, aéro-phagie, palpitations, spasmes, angoisses, dysthyroïdie, troubles de la ménopause.

**Forme.** — Dragées.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 2 à 6 dragées par 24 heures, de préférence en plusieurs prises.

Prix : 23 fr. 50 l'étui de 50 dragées (de 10 à 30 jours de traitement).  
 Se tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

**Laboratoires LALEUF**  
**Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie**  
 51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Trocadéro 62-24.)

## PLEXAMINE

**Indications.** — Sédatif des plexus sympathiques, Douleur des règles, Rhumes des foins, Ulcères gastro-duodénaux, Épigastralgies, Angine de poitrine, Syndrome de Raynaud, Hypertension artérielle. Toutes les algies (Névrites, Zona, etc.).

**Composition.** — La Plexamine est une solution de chlorhydrate d'histidine à 4 p. 100, présentée en boîtes de 6 ampoules de un centicube avec l'aiguille spéciale pour l'injection intradermique.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection intradermique du contenu d'une ampoule chaque jour.

Prix : boîte de 6 amp. : 23 fr. 10. Cure : 6, 12, 18 jrs.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M. — n° 111-5.

**Laboratoire LAURENT-GÉRARD, Pharmacien.**  
 40, rue de Bellechasse, 1 et 3, rue Las-Cases  
 PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

## PLEXINE FUMOUE

Instabilité neuro-végétative, Spasmes viscéraux,angoisses, Insomnies.

**Composition :**

Bromure de sodium .....	0,10
— de strontium .....	0,05
— d'ammonium .....	0,10
Phosphate de soude .....	0,01
Narcéine .....	0,005
Extrait de saule .....	0,02
— d'anémone .....	0,02
— de levure .....	0,03

**Posologie :**

4 comprimés par jour en moyenne.

Dans tous les cas, se conformer à l'avis du médecin.  
 Comprimés dragéifiés (flacon pour 8 jours de traitement).

Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 2000-2.

**Laboratoires J. FUMOUE**  
 156, boulevard Ney — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Marcadet 55-39.)

## PLEXOSÉDOL A & B

Sédatif régulateur du système nerveux.

**Composition.** — PLEXOSÉDOL A : Élixir contenant par cuillerée à café : 0 gr. 125 d'extrait mou de valériane stabilisée ; 0 gr. 25 d'extrait mou de Salix Alba ; 0 gr. 50 d'extrait fluide de Passiflora incarnata ; 0 gr. 50 d'extrait fluide de Crataegus.

PLEXOSÉDOL B : Même association que le Plexosédol A, renforcé par 0 gr. 02 de gardénal par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Sédatif du système vago-sympathique. Traitement des états anxieux et des Dystonies organo-végétatives, Antispasmodique, Hypnotique, Tonocardiaque, Sédatif pelvien.

**Indications.** — Angoisses, Vertiges, Douleurs angineuses, Tachycardie, insomnies, aérophagie, bourdonnements d'oreilles, Neurasthénie, Tics, Hoquet, Épilepsie et toutes instabilités nerveuses.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prescrire : Plexosédol A ou Plexosédol B, 1 flacon.

Laboratoire du PLEXOSÉDOL

J. BATTEUR, Pharmacien  
HAUBOURDIN (Nord).

## PLURIBIASE

**Indications.** — Cholagogue doux. Antiseptique intestinal. États anaphylactiques, Urticaire, Cholécystites, Laxatif léger. Rééducateur intestinal.

**Composition.** — Comprimés à 2 noyaux.

Noyau externe.		Noyau interne.	
Pepsine T. 500.....	0,05	Extr. Boldo .....	0,005
Extr. de Belladone .	0,001	Bile dépigmentée et	
Extr. de Jusquiame.	0,001	décholestérinée ...	0,10
Sucre.....	0,20	Pancréatine T. 200.	0,10
		Poudre de muqueuse	
		intestinale.....	0,20
		Ferments lactiques	
		concentrés .....	0,03
Gluten.....	0,05		

**Doses.** — 2 comprimés avant chaque repas, 20 jours par mois.

Anciens Laboratoires ODINOT

Robert COLAS, Docteur en Pharmacie

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Vau. 48-10.)

Laboratoires : 21, rue Violet, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Ség. 69-13.)

## PLURINATRYL

Granulé.

**Composition.** — Benzoate de soude, citrate de soude, hyposulfite de soude, sulfate de soude, phosphate de soude, bicarbonate de Na.

**Posologie :**

**Adultes :** 1 ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

En cas de brûlures d'estomac, 1 ou 2 cuillerées à café au moment des douleurs.

**Enfants :** en général la moitié des doses pour adultes.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Hyperchlorhydrie, Dyspepsie, Constipation, Anaphylaxie (urticaire, eczéma, migraine, asthme), Hypertension artérielle, Obésité, Arthritisme.

Laboratoire LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie

52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS.  
(Tél. : Flandre 00-55.)

## PLURION

**Description.** — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le PLURION augmente l'activité des organes hémapoïétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

**Indications.** — 2 ampoules par jour dans les *anémies graves*, 1 ampoule par jour dans les *anémies des convalescents, paludéens, syphilitiques, cancéreux*, 1 ampoule tous les 2 jours dans les cas plus bénins.

Prix : 40 fr. 30 pour 4 à 16 jours de traitement.

Laboratoires Oh. OOUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

(Tél. : Carnot 18-75.)



## PNEUMOGÉINE RENARD

**Composition.** — Iodure double de caféine et de théobromine.

**Mode d'action.** — Régulatrice respiratoire, cardio-tonique, éliminatrice.

**Indications.** — Tous les états dyspnéiques, Syndrome cardio-rénal.

**Dose.** — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

### Nota.

Nous informons MM. les Médecins que la quantité de PNEUMOGÉINE fabriquée ne permet pas de satisfaire toutes les demandes.

La production de la théobromine en particulier est excessivement restreinte. Nous ne pouvons que constater cet état de chose et espérer une amélioration prochaine.

### Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

(Tél. : Pereire 14-08.)

## PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

**Composition.** — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olive et de chènevis camphrée, débarrassée de ses acides. Quatre concentrations n<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4.

### Mode d'emploi et indications :

**INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES :** Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme. Emphysème.

**INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES :** Tuberculoses laryngées.

**INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES :** Tuberculoses méningées.

**INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES :** Tuberculoses péritonéales.

**INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES :** Pré-tuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires, (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 56-67.)

## PNEUMOSTYL DAGUIN

### 2 Formes :

Ampoules de 2 cc. Injections hypodermiques. Boîte bleue ..... 21 fr. 90

Ampoules de 6 cc. Injections Intra-trachéales. Boîte rouge ..... 29 fr. 25

**Composition.** — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile neutre.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande aux :

### Laboratoires DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 32-17.)

## POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Association du phosphore avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 mgr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

**Indications.** — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

**Sirop.** — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indications du médecin traitant.

Trois formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 60.

Toutes les formes de Poliols se font aussi sans méthylarsinate de strychnine.

### PRODUIT FRANÇAIS

Enregistré au L. N. C. n<sup>o</sup> 225-4.

Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII<sup>e</sup>). (Tél. : Did. 74-02.)

## POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

### Forme et Posologie.

**Sirop:** 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure). ..... 18 fr. 70  
**Poudre:** 1 mesure = 1 gr. de polybromure. 12 fr. 90

Prix  
public

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium, qui est un excellent eupeptique.

**Indications.** — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Durée moyenne de l'unité de vente :  
Sirop : 15 jours. — Poudre : 30 jours.

**Produits GONNON** — J. et C. GONNON, Pharmaciens  
14, rue Victor-Hugo — LYON. (Tél. : Franklin 36-80.)

## POLYCALCION

Solution titrée agréablement aromatisée (gouttes et dragées).

**XL gouttes ou une dragée** correspondent à :  
 Chlorure de calcium..... 0 gr. 40  
 Phosphate di-acide de calcium..... 0 gr. 08  
 Gluconate de calcium..... 0 gr. 04

C gouttes correspondent à 1 cuiller à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antihémorragique, déchlorurant, neuro-sédatif, anti-infectieux, recalcifiant, anti-anaphylactique.

**Indications.** — Hémorragies de toutes natures : épistaxis, hémoptysies, hématomes, hématuries, métrorragies, purpura, hémophilie, hémorragies des maladies infectieuses. États spasmodiques. Tétanie, Cardiopathie, néphrites, œdèmes, épanchements séreux. Décalcification, tuberculose, ostéomalacie. Accidents anaphylactiques, sériques.

### Dose et mode d'emploi:

**Adultes:** XL à C gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée avant les repas : ou 3 à 8 dragées par jour en trois fois.  
**Enfants:** Il est préférable d'employer les gouttes de Polycalcion. X à XL gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée avant les repas. Les doses peuvent être augmentées ou diminuées suivant l'avis du médecin.

Prix au public : le flacon de 100 gr. 20 fr. 60.

La boîte de 60 dragées : 20 fr. 20.

Fabrication assurée.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**  
D'E. PERRAUDIN, Pharmacien,  
21, rue Chapal — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trinité 29-29)

## POLYGLOBINATE GRIMAULT

**Propriétés.** — Médication antianémique de choix, apportant à l'organisme le fer et les antianémiques de complément sous une forme ionisable et assimilable.

**Formule.** — Pour un comprimé :

Globinate de fer .....	0 gr. 170
Globinate de cuivre .....	0 gr. 008
Globinate de manganèse.....	0 gr. 012
Globinate de magnésium .....	0 gr. 010

**Indications.** — Le Polyglobinate est indiqué dans toutes les anémies :

1° A titre curatif dans les anémies normo- ou hypochromes, les plus fréquentes et quelle que soit leur cause (anémies infectieuses, toxiques, post-hémorragiques, chlorose des jeunes filles, chlorose tardive de l'adulte, etc.) ;

2° A titre de complément de l'hépatothérapie, dans les anémies hyperchromes (anémies pernicieuses vraies).

**Présentation.** — Comprimés de 0 gr. 20.

**Posologie.** — Un comprimé au début de chacun des trois principaux repas pour les adultes.

Un comprimé au début du déjeuner et du dîner pour les enfants. Aucune toxicité. Pas de troubles digestifs, en particulier de constipation, même après usage prolongé. Saveur nulle.

Prix : 22 fr. 30 le tube de 30 comprimés.

**Laboratoires GRIMAULT**

51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Bal. 20-70.)

## POLYFERMENTS LALEUF

**Composition.** — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de Magnésium.

**Propriétés et Indications.** — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

**Formes.** — Granulé et tablettes.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

**Durée moyenne des unités de vente :** 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes : 21 fr. 10.

**Laboratoires LALEUF**

**Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie**

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## POLYSALYL

Association de Salicylate de Soude,  
Pyramidon, Lithine,  
Citrate d'Urotropine et Citrate de Caféine.

### Composition :

Salicylate de Soude .....	0 gr. 42
Salicylate de Pyramidon .....	0 gr. 04
Salicylate de Lithine.....	0 gr. 04
Citrate d'Urotropine .....	0 gr. 02
Citrate de Caféine.....	0 gr. 005

Pour une dragée glutinisée de 0 gr. 95.

La présentation actuelle sous forme de Dragées glutinisées permet une assimilation facile et sans intolérance stomacale, tous les Salicylates se dissolvant dans l'intestin.

**Indications.** — Toutes celles des Salicylates.

**Posologie.** — 4 à 16 dragées par jour.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1877-11.

**Laboratoires J. LANDRIER**  
COULANGES-SUR-YONNE (Yonne).

## POLYTONYLE

Médication tonique de la cellule nerveuse et des déficiences de l'organisme.

### Formule :

Iode .....	0 gr. 10
Glycérophosphate magnésium .....	1 gr.
— manganèse.....	1 gr.
— fer.....	1 gr.
— sodium .....	1 gr.
— calcium .....	3 gr.
Phosphate trisodique .....	16 gr.
Acide éthylphosphorique.....	16 gr.
— phosphorique officinal.....	40 gr.
Excipient Q. S. p.	100 gr.

**Particularités.** — Éléments phosphoriques assimilables. Catalyseurs métalliques. Pas de toxiques. Pas de strychnées.

**Doses.** — *Adultes*: XXV à XXX gouttes matin et midi de préférence avant les repas dans un peu d'eau.

*Enfants*: X à XV gouttes matin et midi de préférence avant les repas dans un peu d'eau.

**Indications.** — Fatigue, Anémies, Vertiges, Surmenage, Phosphaturies, Convalescence, Grossesse, Allaitement.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 742 20.

**Laboratoires P. TAVERNIER**  
Docteur en Pharmacie, 82, rue de l'Ouest — PARIS.

## POLYVALINE

du Dr Bayle

**Nature.** — Extrait spléno-surrénal.

**Indications.** — Les maladies infectieuses : Grippe, Typhoïde, Paratyphoïdes. Pneumonie, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

**Emploi.** — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

**Doses.** — *Adultes*: POLYVALINE injectable A (10 cc.). La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

*Enfants*: 1 cc. par année d'âge de POLYVALINE injectable B.

### Polyvaline buvable

2 par jour dans les maladies aiguës, les convalescences, les anémies avec asthénie.

**Comprimés** : à titre prophylactique, à la dose de 4 à 10 comprimés par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 722-20/1  
722-20/2, 722-21.

### Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne)  
PARIS (XV<sup>e</sup>).

## POLYVIATOL

### Composition :

Vitamine B <sub>1</sub> (aneurine) .....	1 mgr.
Vitamine B <sub>2</sub> (lactoflavine) ...	10 y
Catalyseur biologique d'oxydation .....	50 y

**Forme.** — Comprimés.

**Indications.** — Déficience des sous-aliments, Déprimés, Convalescents, Troubles de la nutrition, Myocardies, Polynévrites.

*Fait l'appoint des vitamines.*

Augmente le rendement d'une alimentation insuffisante.

**Mode d'emploi.** — Dans les cas légers, 1 à 3 comprimés par jour avant les repas ; dans les cas plus graves, 3 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoire du Docteur BOUCARD**

30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél.: Auteuil 09-93.)

## POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroides, Brûlures, Engelures, Gercures, Crevasses du sein, Vaginisme, Vulvites, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Chancres, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Dermatoses, Lésions des muqueuses.

**Conditions d'efficacité.** — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion, sous forme de pansement **par exemple**.

**Posologie.** — Aucune limite ni dans les doses ni dans la durée du traitement. Prix : 17 fr. 60. — L. N. C. 581-I.

Laboratoires P. BAUDE,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 96-46.)

## POMMADE BÉBIA

**Composition.** — A base acide benzoïque, oxyde de zinc, acide borique et excipient spécial.

**Caractéristique.** — Pommade blanche, ne tachant pas le linge. Sa consistance, son onctuosité, son homogénéité et sa parfaite adhérence sont obtenues par un procédé de fabrication industrielle spécial.

**Indications.** — Toutes Dermatoses irritées, Erythèmes, Rougeurs de nourrissons, Dermites, Brûlures, Coup de soleil, Engelures, Crevasses, Gercures, Démangeaisons, Feu du rasoir. Contre l'échauffement chez les obèses, les sportifs et les vieillards.

**Présentation et prix.** — La boîte, 7 fr. 50 ; la triple boîte, 17 fr. 40.

Autres **Produits Bébia** :

La Poudre, complément de la Pommade.

La boîte, 8 fr. 70 ; la boîte poudreuse, 5 fr. 60.

Laboratoires **MAUSSION**

5, avenue Émile-Boissier — NANTES

## POMMADE BERNAMONT

A base de peroxyde de zinc, d'oxyde de zinc et d'amidon, la *Pommade Bernamont* constitue le traitement spécifique des Ulcères variqueux et des Plaies atones.

**Indications.** — Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies, Fistules, Crevasses, Eczémas, Maladies de la peau.

**Mode d'emploi.** — Après un nettoyage soigneux à l'éther de la plaie à traiter, appliquer une couche épaisse de *Pommade Bernamont* et recouvrir d'un pansement.

**Prix** : Le pot, 15 fr. 50.

Durée moyenne du traitement : 3 à 4 semaines.

Utilisation : un pot par semaine.

Approvisionnement assuré.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-2.

Laboratoires **BERNAMONT**

**F. BERNAMONT et H. BERTRAND**

Pharmaciens

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS

(Tél. : 0-23 Nevers.)

## POMMADE-CRÈME LUDIN

Spécifique des affections de la peau et du cuir chevelu.

**Composition.** — Hg. + As. + B. du Pérou. + H. de Cade + Soufre + Acide Salicylique + Oxyde de Zinc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dermatophylactique, Antiseptique, Innocuité absolue.

**Indications thérapeutiques.** — Staphylococcies et Streptococcies cutanées, Psoriasis et Eczématides psoriasiformes, Dermatoses sèches et squameuses, Pelade, Plaies atones cicatrisant mal, Dermatoses exotiques d'origine microbienne ou ulcérées, Rougeurs, Affections prurigineuses de cause externe, etc., Erythèmes.

**Mode d'emploi.** — Par massage de quelques minutes, bien faire pénétrer la pommade dans la peau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-4.

Laboratoires **REY** — DIJON (Tél. : 22-12.)

## POMMADE DU D<sup>r</sup> BUTLER

**Composition.** — Précipité blanc (Chlorure mercureux), Acide salicylique, Acide borique, Oxyde de zinc, Excipient spécial.

**Propriétés.** — Anti-prurigineuse, analgésique, cicatrisante. Supprime démangeaisons et douleurs, antiseptique puissant.

**Indications.** — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits avec ou sans lésion cutanée. Psoriasis, acné, folliculite, impétigo, boutons de toutes natures. Prurigo, dartres, brûlures, herpès, ulcères, coups de soleil, érythème fessier. En applications aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

**Emploi.** — En onction douce, massages légers, recouvrir d'une compresse de gaze. Un pansement par jour maximum, ne pas laver la région traitée avant complète guérison, se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge doux.

**Présentation.** — Tube P. M.: 11 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-1.

## POUDRE DU D<sup>r</sup> BUTLER

Mêmes éléments actifs que dans la *Pommade Butler*. Dermatoses sèches et suintantes. Toilette de Bébé: 9 francs, présentée en élégante boîte poudreuse de 150 grammes environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-2.

Laboratoire du D<sup>r</sup> BUTLER — BOGUET, Pharmacien.  
1, rue Bossuet — DIJON (Côte-d'Or).

## POMMADE ET SUPPOSITOIRES INSÉVA

Traitement des affections ano-rectales par vaccino-thérapie locale.

La pommade et les suppositoires **INSÉVA** sont à base de bouillon-vaccin de colibacilles et d'entérocoques, auxquels sont imputables, pour la plupart, les infections hémorroïdaires.

**Indications.** — Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, eczéma anal, ano-rectal ou péri-anal, tumeurs hémorroïdaires.

**Action.** — Guérison rapide des hémorroïdes et tuméfactions hémorroïdaires, sédation du ténesme.

**Mode d'emploi.** — Appliquer localement, ou introduire dans l'anus, au lever et au coucher, et après chaque selle.

**Présentation:**

Le tube : 19 fr. 60.

Le 1/2 tube : 11 francs.

La boîte de 10 suppositoires : 19 fr. 60.

**INSÉVA**

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,  
151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Laboratoires du Docteur F. DEBAT  
60, rue de Mouton — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## POMMADE FORNET

à l'Insuline Fornet. (Pansuline.)

Pour éviter toute confusion avec  
les préparations similaires,  
la Pommade Fornet s'appellera  
désormais:

## DERMASULINE

Voir ce mot.

## POMMADE LENOIR

à la Cinnamoline.

Traitement spécifique des *dartres chroniques*; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux, dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en décapant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enraye la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sébum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plaies séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *syccosis*, la *teigne*, le *javus*.

**Mode d'emploi.** — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>). (Tél.: Dorian 47-00.)

## POMMADE LOGEAIS

### Composition :

Extrait total d'hamamélis.....	6	Cupressus.....	0,29
Sulfocitrylate de soude.....	6	Genêt.....	0,29
Onguent populeum.....	69	Jusquiame.....	1,45
Lanoline anhydre.....	5,70	Teskra.....	1,45
Marron d'Inde.....	0,29	Pour 100 grammes.	

### Propriétés :

**ATOXIQUE :** Ni stupéfiant, ni adrénaline.

**ANALGESIQUE :** Décongestion rapide et durable de la médianeuse.

**ASTRINGENTE :** Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

**ANTISEPTIQUE :** Action antiseptique de l'huile sulfatée sur la muqueuse rectale.

**Indications.** — Hémorroïdes externes et internes. Prurits anal et vulvaire. Prostatites.

**Mode d'emploi.** — Après bain savonneux, onction matin et soir et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

Prix au public : 18 fr. 70.

**Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAIS**  
**GOBERT, Pharmacien.**

22 bis et 24, rue de Sully — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : Molitor 39-50.)

## POMMADE MIDY

(Adrénostyptique).

Adrénaline.....	0,0066
Stovaine.....	1 gr.
Anesthésine.....	1 gr.
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé.....	2 gr. 50
Extrait d'Hamamélis.....	0 gr. 50

Pour 100 grammes de pommade.

**Mode d'emploi.** — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

Prix : 18 fr. 40. Durée du traitement : 10 jours.

**Laboratoires MIDY**

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).  
(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## POMMADE NOËLLINE

**Composition.** — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

**Action.** — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés. Durée d'utilisation : une ou deux semaines suivant gravité.

### Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif :* en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A *titre curatif :* En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube 9 fr. 40.

**Laboratoire de la NOËLLINE**  
**GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.**

## POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET

**Pommades** en tubes à canule dévissable et stérilisable, et à canule fixe, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Écarlate, Culvre (Hémouivre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmiun, Zinc Tumulol, Zinc Ichtyol, Calomel, Pondant (K<sup>+</sup>, CaCl<sup>2</sup>), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Peroxyde de zinc, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Cocaine, Ethylhydrocupréine (O-tocchine), Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence de Niaouli (Goménol), Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet Rose, Colorant Composé, Esérine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adréaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu, Chlormercurobromure. Chloptomercure (Bile Ethylhydrocupréine (Optochin) Chlormercurobromure).

**Radio Bleu** (Radio Activé au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

**Ampoules fondantes chloro-iodo-calciques** (Bains d'yeux pour cataracte). **Cellières Chibret** à rebord caoutchouté.

**Extrait corps ciliaire** en amp. pour inj. et instill.

**Solution composée** en amp. de 1/2 cc. (pour inj. s.-conjonctivales). **Humeur aqueuse artificielle** (pour opération de la cataracte).

**Pommade pour le nez :** Baume du Pérou, Adréaline.

(Voir à *Collyres* la suite des Produits Chibret.)

(Voir à *Chlormercurobromure*, le libellé spécial.)

Enregistrés au L. N. C. M. sous les nos 1471-7 à 1471-21.

**Laboratoires CHIBRET,**

5, Saint-Herem, CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-36.)

## POMMADES PROBIOS

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE

#### Pommade.

**Formule.** — Antivirus et Bactériophages Staphylococciques, Streptococciques et Bacilles Pyocyaniques.

**Présentation.** — En tube d'étain. P. M. 10 fr. 55.

**Indications thérapeutiques.** — Infections cutanées, Acné, Panaris, Furoncles, Anthrax, Abcès, Phlegmons, Pyodermites, Plaies infectées, Eczéma.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

### POMMADE NASALE PROBIOS

**Formule.** — Antivirus-Bactériophages, Antistreptococciques, Antistaphylococciques, Friedlander, Proteus, Antivirus Bac. Pfeiffer, Antipneumococciques.

**Présentation.** — En tube à injection. 9 francs.

**Indications thérapeutiques.** — Coryza, Sinusites, Rhino-pharyngites, Ozone, Grippe et certaines formes d'asthme, Préventif dans la Grippe et le Coryza.

**Mode d'emploi.** — Introduire le produit aussi loin que possible dans les fosses nasales, en aspirant fortement, 2 à 3 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-9 et 10.

#### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06)

## POMMADE VITAMORRHUINE

agréablement parfumée.

A base d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50, associé à la graisse de laine, l'huile d'olive, le stéarate de zinc, les essences de lavande et bergamote.

1 gramme de *Pommade Vitamorrhaine* contient :

4550 unités internationales Vitamines A naturelles.

975 unités internationales Vitamines D naturelles.

**Indications.** — Plaies atones, ulcères, ulcères variqueux, dermatoses chroniques, brûlures, engelures, toutes les irritations de la peau, etc.

### PHARMACIE CENTRALE

DE BELGIQUE, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## POMMADE ZYLOR

Traitement local des hémorroïdes internes et externes et de leurs complications. Prostatite.

Extrait fluide d'hamamélis .....	3 gr.
Extrait fluide de ratanhia .....	3 gr. 90
Extrait fluide de marron d'Inde .....	3 gr.
Extrait de saturne .....	2 gr.
Oxyde de zinc .....	2 gr.
Stovaine .....	0 gr. 10
Solution suprénérine à 1/1 000 .....	3 gr.
Excipient .....	83 gr.

En tube-canule.

**Mode d'emploi.** — Application matin et soir après compresse à l'eau tiède et séchage.

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique, antihémorragique, décongestif, antiseptique, vaso-constricteur. La canule spéciale du tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Prix : 11 fr. 70 le tube.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 825-3.

#### Laboratoires GOUPIL,

171, avenue Aristide-Briand — CACHAN (Seine).

(Tél. : Alésia 21-59.)

## POSTERISAN

(Nom déposé.)

*Traitement spécifique des Hémorroïdes.*

(Pommade et Suppositoires.)

**Composition.** — Antivirus du Colibacille, Acide carbolique.

**Propriétés.** — Action rapide et sans danger. Aucun effet secondaire.

**Indications.** — Remède spécifique des Hémorroïdes et de toutes les maladies cutanées causées par les bactéries intestinales.

**Présentation.** — Boîte de 10 suppositoires. Tube de Pommade avec canule rectale.

**Emploi.** — *Hémorroïdes externes* : Oindre avec la pommade après chaque selle, ainsi qu'au lever et au coucher.

*Hémorroïdes internes* : Introduire 1 ou 2 suppositoires ou de la pommade, à l'aide de la canule qui se visse sur le tube.

#### Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII°).

## POST-HYPOPHYSÉ CHOAY

**Nature.** — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

**Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :**

**Post-hypophyse n° 2.** — Solution *obstétricale*.

☐ Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

☐ **Indication.** — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

**Post-hypophyse n° 4.** — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc. titrées à 10 unités internationales.

**Indications.** — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

**Post-hypophyse n° 5.** — Solution *hémostatique*, diluée dans du sérum.

☐ Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

☐ **Indication.** — Hémophyses des tuberculeux : injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Boîtes de 3 ampoules.

**Laboratoire CHOAY**

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

## POTION ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Sparteine, *Stovaline*, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

**Action thérapeutique.** — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

**Avantages.** — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

**Indications.** — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lumbago, sciatiques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 cuillerées à bouche par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 20 fr.

**Laboratoires ADOL**

G. VIENNOIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

50, rue des Rancy — LYON. (Tél. : Moncey 59-77.)

## POUDRE ALCALINE RAFRAICHISSANTE

**Composition.** — Sel de Vichy, nitrate de potassium, citrate de lithine.

**Propriétés.** — Diurétique, rafraîchissante, préconisée dans la diathèse urique.

**Indications.** — Rhumatismes, goutte, sciaticque, gravelle, lithiase rénale, cystite.

**Posologie.** — Une mesure par jour dans un verre d'eau froide à boire aux repas ou entre les repas.

**Laboratoire A. VINCENT**

DELPORTE, Pharmacien,

8, place Victor-Hugo — GRENOBLE.

## POUDRE ANTI-H

(H = Symbole de l'acidité.)

*Médication stomacale.*

**Composition.** — Silicate double d'alumine et de sodium

**Indications.** — Toute la pathologie gastrique. (Voir également *Ampoules Anti-H.*) D'une façon générale, réserver les *Ampoules Anti-H* aux cas complexes (Maladie de Reichmann, Ulcères et Ulcérations, Hypermotricité, Spasmes du pylore), et la *Poudre Anti-H* aux cas simples (Hyperchlorhydries, Gastralgies, Dyspepsies). Les ampoules peuvent également s'employer en traitement d'attaque et la poudre en traitement d'entretien.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau après les deux repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 20 fr. 50.

**Laboratoires REYGAGNE**

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00.)



## POUDRE BEAU CHLOROFORMÉE

(Ou Éther)

Deux formes : Poudre Beau Chloroformée et Poudre Beau Éther.

### Formule :

Ext. gr. Chanvre Indien .....	0,125
Menthol naturel .....	0,10
Chloroformé (ou Éther) .....	0,50
Bic. de soude chim. pur .....	75
Sucre. Q. S. pour .....	100

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédation immédiate des phénomènes douloureux gastriques. Antiacide. Antispasmodique.

**Indications.** — Hyperchlorhydries, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Ulcères, Vomissements incoercifs et tous les syndromes douloureux de l'estomac.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un 1/3 de verre d'eau après les principaux repas et au moment des douleurs.

Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Prix : 12 fr. 25. — Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. GUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

## POUDRE DIGESTIVE ET RAFRAICHISSANTE

**Composition.** — Sel de Vichy, lactose, peptine, amylacées, citrate de lithine.

**Propriétés.** — Digestive, arrête les souffrances en neutralisant l'hyperacidité et en calmant la muqueuse de l'estomac.

**Indications.** — Gastrite, Gastralgies, Dyspepsies, Aigreurs éruptoires, Ballonnement de l'estomac et de l'intestin, Vents, Coliques, Nausées, Vertiges.

**Posologie.** — Une mesure par jour dans un verre d'eau froide, à boire aux repas ou dans l'intervalle des repas en cas de douleurs.

Laboratoire A. VINCENT

DELPORTE, Pharmacien,

8, place Victor-Hugo — GRENOBLE.

## POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Sels sodiques, Chloramine T et Essence de Lavande, entièrement soluble dans l'eau, Odeur agréable et discrète.

**Indications.** — Décongestionnante, Antiseptique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme.

Hygiène des yeux (blépharites, etc.).

Traitement des plaies.

**Mode d'emploi.** — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Prix : La boîte de 20 sachets, 22 fr. 60.

Durée moyenne de l'unité de vente :

28 à 30 jours.

Établissements FUMOUEZ

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

## POUDRE DU DOCTEUR SOULIGOUX (Poudre laxative de Vichy.)

Composée de principes végétaux et aromatiques, d'un soufre spécialement traité et de sels minéraux, la Poudre du Dr Souligoux s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir avant le repas ou le matin à jeun. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

CHASSAING, LE COQ et Cie

1, quai Aulagnier  
ASNIÈRES (Seine).

## POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmaticques.

**Composition.** — A base de nitre et de solanées les mieux triées (récoltes de 1<sup>re</sup> choix).

**Indications thérapeutiques et formes.** — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

**Mode d'emploi.** — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

**Prix de vente :** 13 fr. 80 (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

L. N. C. n° 322 à 325. Dos. 77.

**Pharmacie TERNISIEN — BAISIEUX (Nord).**  
(Échantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

## POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

**Forme et composition.** — Insuline purifiée de fabrication française ; présentée en poudre et en pommade.

**Mode d'action.** — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

**Indication.** — Ulcères variqueux, plaies atones, cicatrisation rapide de la plaie.

**Mode d'emploi.** — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de la plaie, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

Prix pour 20 pansements : 30 francs.

Prix pour 10 pansements : 16 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous les n° 234-12, 234-11.

**Laboratoire de L'ENDOPANCORINE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Sulfren 07-70.)

## POUDRE HYGIÉNIQUE SATINE

**Composition :**

Stéarates .....	24 gr.
Acide borique .....	6 gr.
Silic. de Magnésie .....	4 gr.
Carbonate de chaux .....	6 gr.

Par boîte.

**Propriétés thérapeutiques.** — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

**Indications.** — Toilette des bébés, irritations cutanées, eschares des malades alités, feux du rasoir.

En vente, toutes pharmacies et grands magasins (Hygiène).

**Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## POUDRE NOËLLINE

**Composition.**

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

**Indications.**

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

**Mode d'emploi.**

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Durée d'utilisation : plusieurs semaines.

Boîte spéciale permettant à la fois le tamisage et l'imprégnation d'une houppette.

Prix : 11 fr. 10.

**Laboratoire de la NOËLLINE**

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

## POUDRE PASTORILOS

**Composition.** — Poudre de sedum telephium, d'hypericum perforatum, produits humiques, excipient Q. S.

**Propriétés.** — Poudre absorbante, bactéricide, hémostatique, cicatrisante, forme un « épiderme » provisoire qui assure la réparation des tissus sous-jacents.

**Indications.** — Pansement idéal de toutes plaies, brûlures graves, etc...

**Forme.** — En boîte stérilisée à 130°.

**Posologie.** — En applications quotidiennes, recouvrir d'une gaze (suivre les prescriptions indiquées sur la boîte).

### Laboratoire DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

## POUDRE PATERSON

### Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, léger. Magnésie calcinée. Sucre pur.

### Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*  
*Saturant gastrique* neutre présenté aussi en pastilles, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Le sous-nitrate de bismuth est momentanément remplacé, à doses égales, par de l'alumine colloïdale.

### Indications :

**Poudre en paquets :** Pansement gastrique, Saturation, Gastropathies douloureuses, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Acidités anormales, Ulcus gastrique et duodénal, Entérites et infections intestinales, Dyspepsies gravidiques, Troubles digestifs du nourrisson.

**Pastilles :** Traitement d'entretien, Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.

### Forme et posologie :

**Paquets :** (2 gr.), 2 à 5 p. jour et plus au moment des crises douloureuses.

**Pastilles :** 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

**Prix au public :** *Poudre :* la boîte (40 paquets), 20 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 11 fr. *Pastilles :* la boîte, 10 fr. 50 ; la demi-boîte, 5 fr. 70.

15-20 jours de traitement environ.

### Laboratoire ARMINGEAT et C<sup>ie</sup>

43, rue de Saintonge — PARIS (Arch. : 15-10).

## POUDRE ROCHER LAXATIVE

### Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

**Composition.** — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

**Posologie.** — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

**Prix :** 8 francs.

### Laboratoires E. FERRÉ

J. LEROY, Pharmacien

142, boulevard Saint-Germain, PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 96-35.)

## PRÉFAGYL

Gastriques fonctionnels. Petites hépatiques.

### Aérophages.

**Particularités.** — Comprimés effervescents de 2 gr. permettant de réaliser immédiatement, en tous lieux, une Solution de Bourget bromurée citratée, avec addition de chlorure de magnésium.

**Indications.** — Tous les gastriques fonctionnels, dyspeptiques, aérophages, hépatiques.

**Emploi.** — Dyspeptiques, hépatiques, nerveux : 1 comprimé effervescent le matin à jeun et avant chaque repas dans un demi-verre d'eau tiédie ou froide.

**Hyperchlorhydrie :** 1 comprimé au moment des douleurs ou des brûlures.

### Formule :

Chlorure de magnésium .....	0,03
Bromure de sodium sec .....	0,25
Bicarbonate de soude sec .....	0,60
Sulfate de soude desséché .....	0,285
Phosphate de soude sec .....	0,195
Excipient citrique .. Q. S. p. 1 comprimé effervescent.	

Boîtes de 3 tubes.

Inscrit au Laboratoire National de Contrôle, n° 742-14.

Laboratoires P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie, 32, rue de l'Ouest — PARIS.

## PRÉLOBAN

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Préparation glandulaire contenant l'ensemble des principes actifs du lobe antérieur de l'hypophyse.

**Propriétés et indications.** — Action somatotrope, gonadotrope, thyrotrope, pancréotrope.

*Chez l'homme :* Atrophie testiculaire, Impuissance.

*Chez la femme :* Aménorrhée secondaire, Oligoménorrhée, Stérilité.

*Chez les deux sexes :* Syndrome adipo-génital, Maladie de Simmonds, Infantilisme, Hypofonctionnement de la thyroïde et du pancréas.

**Posologie.** — Augmenter progressivement les doses de 3 à 6 dragées par jour.

**Présentation.** — Flacon de 20 dragées à 0 gr. 125 d'extrait du lobe antérieur de l'hypophyse, correspondant à 5 unités de maturation.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PRÉMALINE

Médication antipaludique totale.

**Composition.** — Association d'une partie de Rodopraëquine et de 10 parties de Quinacrine.

**Présentation.** — Comprimés dosés à :

Quinacrine .....	0 g. 10
Praëquine (plasmochine) .....	0 g. 005
Rhodoquine .....	0 g. 005

**Indications.** — Traitement du paludisme de rechute. Application des nouvelles méthodes de lutte collective contre le paludisme.

**Posologie.** — Pour 1 journée :

*Adultes :* 3 comprimés.

*Enfants :* Jusqu'à 1 an : 1/2 comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé 1/2 ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés 1/2.

Absorber toujours le médicament *pendant les repas*, avec une alimentation très riche en *fécule*nts.

Vente autorisée seulement en France, aux Colonies françaises, en pays de protectorat français et sous mandat français.

Prix de vente : le tube de 15 comprimés : 22 fr. 30.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## PRESSYL

**Composition :**

	Ampoules.	Comprimés.	Gouttes. (1 cc.)
Camphramine ...	20 cg.	10 cg.	25 cg.
Pressédrine .....	5 —	2 —	5 —

15 gouttes = 1 comprimé.

Injection indolore, grande marge thérapeutique, tolérance générale parfaite.

**Propriétés.** — Tonique cardiaque et respiratoire par la camphramine ; hypertenseur par la pressédrine. C'est le médicament type des défaillances cardio-vasculaires et respiratoires aiguës, des hypotensions chroniques et de l'asthme.

**Indications :**

**Ampoules :** Collapsus hémorragiques et toxi-infectieux, comas, syncopes cardiaques et respiratoires, états de chocs anaphylactique, thérapeutique, traumatique. Crises d'asthme, syncopes anesthésiques, chocs opératoires ou obstétricaux.

**Comprimés et gouttes :** Hypotensions essentielles, hypotension des maladies infectieuses, convalescences, asthme, accidents sériques, intolérances médicamenteuses, coqueluche et bronchite infantiles, cardiopathies chroniques.

**Posologie :**

**Ampoules :** Injection intraveineuse : action rapide et énergique. Injection sous-cutanée ou intramusculaire : effet prolongé ; peuvent être renouvelées toutes les deux à quatre heures.

**Comprimés et gouttes :** Adultes : 2 à 5 comprimés ou XXX à LXXV gouttes par jour.

**Nourrissons :** V gouttes 3 ou 4 fois par jour.

**Enfants de 1 à 5 ans :** X à XV gouttes 3 à 4 fois par jour.

**Enfants au-dessus de 5 ans :** XV à XX gouttes 4 à 5 fois par jour.

**Prix :**

La boîte de 6 ampoules : 26 fr. 20.

La boîte de 36 comprimés ou le flacon de gouttes : 23 fr. 70.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte-90 — Paris.)

## PRÉVALIDINE

**Formé.** — Pommade résorbable en tube gradué.

### Composition:

Camphre.....	20,00
Baume du Pérou.....	4,00
Essence d'Eucalytus..	4,00 pour 100 gr.

**Indications.** — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

**Présentation.** — Tube gradué par onction.

Prix : 18 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-10.

Laboratoires FISCHE et C<sup>ie</sup>, S. & r. l.

VIBRAYE (Sarthe).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.  
(Tél. : Trudaine 92-52.)

## PRÉVARSYL

**Composition.** — Acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

**Indications.** — Arsenic pentavalent pour le traitement *per os* de la Syphilis, Dysenterie amibienne.

**Posologie.** — *Adultes* : doses progressives de 25 à 75 cgr. en plusieurs fois.

*Enfants* : 2 cgr. par année d'âge.

### Prix et présentation :

La boîte de 25 compr. à 0,25.....	22 fr. 50
La boîte de 50 compr. à 0,05.....	12 fr. 50
La boîte de 100 compr. à 0,01.....	8 fr. 80

Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

S. A. au capital de 25 000 000 de francs.

R. C. Seine 235.442 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## PRIOVIT

Nom déposé. — Licence Bayer.

**Composition.** — Association en proportions physiologiques de vitamines hydrosolubles des groupes B (B<sup>1</sup> et B<sup>2</sup> ou Lactoflavine) et C (acide 1-ascorbique et Citrine ou facteur P), sous une forme standardisée et stable.

**Indications.** — Affections s'accompagnant d'une augmentation du métabolisme, par exemple maladie de Basedow, pyrexies et leur convalescence, Hypovitaminoses : a. de la gestation et de l'allaitement ; b. provoquée par une alimentation insuffisante ou défectueuse. Tous efforts physiques (sport et travaux de force) qui se traduisent pour l'organisme par une augmentation des besoins en vitamines.

**Posologie.** — *Adultes et enfants* : 2 dragées par jour.  
*Nourrissons* : 1 dragée par jour.

**Présentation.** — Tube de 20 dragées.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## PROBIAMIDE

Para-amino-phényl-sulfamide (1162 F.).

Comprimés de 0 gr. 25.

Son activité s'exerce cliniquement dans les angines, les amygdalites, les otites suppurées et mastoïdites, les érysipèles, la pyurie colibacillaire, les congestions pulmonaires, les pleurésies purulentes, les septicémies streptococciques (fièvre puerpérale), la fièvre de Malte, les méningites strepto- et méningococciques, la blennorrhagie et ses complications.

**Présentation.** — PROBIAMIDE est présenté en tubes contenant 20 comprimés de 0 gr. 25 de para-amino-phényl-sulfamide.

**Posologie.** — Les doses à employer sont fixées par le médecin traitant, compte tenu de la gravité et de la généralisation des phénomènes infectieux, ainsi que de l'état du sang et des émonctoires (foie et reins) du malade. Il conviendra de n'employer le PROBIAMIDE qu'avec prudence, à doses progressives, chez tout malade présentant de l'insuffisance hépatique ou rénale, ou dont la formule hémoleucocytaire serait anormale, ainsi que chez les personnes sujettes à des poussées asthmatiques ou urticariennes.

a. Infections bénignes : 2 à 4 comprimés *pro die*.

b. Cas de gravité sérieuse : 4 à 12 comprimés.

c. Infections septicémiques graves : jusqu'à 16 à 20 comprimés.

**Mode d'emploi.** — Il est recommandé de faire absorber le PROBIAMIDE à doses fractionnées à intervalles de 1, 2, 3, 4 et 6 heures suivant les doses adoptées. Il sera bon, afin d'éviter les phénomènes d'*acidose*, de faire absorber chaque comprimé avec 1/2 verre d'eau de Vichy.

Les comprimés de PROBIAMIDE peuvent être absorbés au moment ou en dehors des repas.

**Incompatibilités pharmaceutiques.** — Tous produits arsenicaux ou soufrés, les sulfates de soude ou de magnésie sont rigoureusement à éviter en période thérapeutique comportant l'usage du PROBIAMIDE.

**Adjuvants.** — Rappelons que le Bicarbonate de soude à doses égales au para-amino-phényl-sulfamide est indiqué, en vue d'éviter l'*acidose* possible.

**Nota.** — D'autre part, on peut observer des rechutes des maladies microbiennes lorsque, après disparition des symptômes cliniques, la sulfamidothérapie est suspendue.

En vue d'éviter les rechutes, on a conseillé de prolonger la cure chimiothérapique de 8 à 15 jours après guérison apparente. Mais, comme la prolongation de l'imprégnation sulfamidée n'est pas dépourvue de danger, nous conseillons plutôt de faire suivre la guérison apparente d'un traitement par produits biologiques immunisants, tels que l'association Antivirus-Bactériophage, ou les vaccins PROBIOS, auxquels il conviendra encore d'avoir recours en cas d'intolérance aux sulfamides.

Prix : La boîte de 20 comprimés : 22 fr. 25.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-57.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## PROBIOS

Thérapeutique mixte. Antivirus. Bactériophage.

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE

**Présentation.** — 4 ampoules incolores de 5 cc. : Bactériophages 4 ampoules jaunes de 5 cc. : Antivirus. 33 fr. 40. Demi-bouteille : 17 fr. 80.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

**Indications.** — Infections pyogènes : Abscesses, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

**Mode d'emploi :** Buvable, injections locales, pansements.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*).

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-1.

### PROBIOS ANTISTAPHYLOCOCCIQUE

**Présentation.** — 4 ampoules incolores de 5 cc. : Bactériophage, 4 ampoules jaunes de 5 cc. : Antivirus. 33 fr. 40. Demi-bouteille : 17 fr. 80.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

**Indications.** — Acanthosis, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylococcus.

**Mode d'emploi :** Buvable, injections locales, pansements.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-2.

### PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

**Présentation.** — 5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophages, 5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus. La boîte de 10 amp. : 33 fr. 40. La boîte de 6 amp. : 20 fr. 05. De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages, Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer, Pneumococcus.

**Indications.** — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozone, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, Angines, certaines formes d'Asthme Préventif dans la Grippe et le Coryza.

**Mode d'emploi :** Buvable, instillations nasales, Gargarismes.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*).

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-5.

### PROBIOS ANTI B. COLI

**Présentation :**

Adultes :

4 ampoules incolores	5 cc. = Bactériophages.	} 33 fr. 40. 17 fr. 80.
4 ampoules jaunes	5 cc. = Antivirus	
	Demi-bouteille :	

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores de 1 cc. = Bactériophages.	} 13 fr. 05.
3 ampoules jaunes de 1 cc. = Antivirus.	
<b>Principes actifs.</b> — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, B. Coli. Friedländer et Proteus.	

**Indications.** — Toutes infections provoquées par B. Coli, Paratyphoïdique, Friedländer et Proteus, notamment Bactériuries, Cystites, Pyérites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

**Mode d'emploi :** Buvable, instillations vésicales ou dans le bassin.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-3.

## PROBIOS ENTÉRO-RÉNAL

(Voies urinaires.)

Présentation :

Adultes :

Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. }  
(5 ampoules de bactériophage incolores). } 33 fr. 40.  
5 ampoules d'antivirus jaunes.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 20 fr. 05.

Enfants : La boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 13 fr. 30.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages de B. Coli, para B. Coli-typiques et para-typhoidiques, A et B ; B. Friedländer, Proteus, staphylocoques, streptocoques, entérocoques, B. pyocyaniques, B. dysentériques.

**Indications.** — Infections de l'appareil génito-urinaire, urétrites, Cystites, Prostatites, Métrites, Salpingites, Pelvipéritonites, Fièvre puerpérale, Coli-bacillose, Syndromes entérogénital ou entérorenal.

**Mode d'emploi** — Par voie buccale ou par voie rectale, ou en injections vaginales.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-48.

## PROBIOS INTESTINAL

Présentation :

Adultes :

5 ampoules incolores 2 cc. — Bactériophages. } 33 fr. 40.  
5 ampoules jaunes 2 cc. — Antivirus.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 20 fr. 05.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores 1 cc. — Bactériophages. } 13 fr. 30  
3 ampoules jaunes 1 cc. — Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedländer, Proteus, Staphylococques, Streptococciques, Entérococciques, Pyocyaniques.

**Indications.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons ; Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières ; Dysenterie bacillaire.

**Mode d'emploi.** — Buvable, instillations par voie rectale.

Comprimés (Voir *Comprimés Probios*).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-4.

## PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE BUVABLE

Présentation. Traitement complet.

20 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant les Bactériophages.  
20 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps bactériens. La boîte : 133 fr. 60.

Demi-traitement :

10 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant les Bactériophages.  
10 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps Bactériens. La boîte : 77 fr. 95.

**Principes actifs.** — Antivirus Corps Bactériens Antigonococciques, Pseudo-Gonococciques, B. Coli, Entérococciques, Streptococciques, Staphylocococciques, Bactériophages Anti-entérococciques, Streptococciques, Staphylocococciques, B. Coli.

**Indications.** — Urétrites aiguës et chroniques à Gonocoques. Infections urinaires.

**Mode d'emploi.** — Buvable, applications locales, pansements mèches, à demeure.

*Vaccin Probios Antigonorrhéique injectable* (Voir : *Vaccinothérapie Probios*).

Enregistré L. N. C. sous le n° 900-8.

## BUV-AKINTYL

Vaccin Curatif buvable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou.....	1 milliard.
Bacilles de Pfeiffer.....	100 millions.
Bacilles de Friedländer.....	1 milliard.
Bacilles Pyocyaniques.....	500 millions.
Streptocoques.....	100 millions.
Staphylocoque.....	2 milliards
Pneumocoque.....	100 millions.
Micrococcus Catarrhalis.....	500 millions.

Pour un centimètre cube dans un mélange d'Antivirus des mêmes bactéries, en proportions correspondantes.

**Présentation.** — 10 tubes scellés bleus de 2 cc. 33 fr. 40.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement curatif de la coqueluche et ses complications.

**Mode d'emploi.** — Réservé aux cas où, pour des causes diverses, les injections ne sont pas acceptées ou sont pratiquement irréalisables. Le *Buv-Akintyl* sera employé selon les indications du médecin.

Voir Vaccins injectables à *Vaccinothérapie Probios*.

## OVULES PROBIOS

**Présentation.** — En boîtes de 6 ovules sous cupules. 33 fr. 40.

**Principes actifs.** — Extraits mous de mélange d'Antivirus et de Bactériophages de staphylocoques, streptocoques, entérocoques, B. Coli, extrait mou d'Antivirus de Diplococcus de Neisser.

**Indications.** — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, etc.

**Mode d'emploi.** — Application locale, laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

## DENTIFRICE PROBIOS

**Présentation.** — En tube d'étain. 8 fr. 35.

**Indications thérapeutiques.** — Antipyorrhéique, Prévient et guérit toutes les affections inflammatoires de la bouche, des gencives et des dents.

**Mode d'emploi.** — Habituel aux dentifrices.

## PROBIOS CREAM

Antipyrogène

**Présentation.** — En tube d'étain. 10 francs.

En pots : P. M., 13 fr. 65. — G. M., 20 francs.

**Indications thérapeutiques.** — Contre boutons, dartres, crevasses, engelures, rougeurs de toute nature.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

## Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## PROCOLYL

Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Opothérapie hépato-intestinale associée à une action crypto-toxique de premier ordre, douce et très puissante.

**Indications.** — Toutes les affections atoniques du foie et de l'intestin. Toutes les constipations.

**Doses moyennes :**

*Adultes :* 2 comprimés avant le repas du soir.

*Enfants :* 1 comprimé avant le repas du soir.

**Prix.** La boîte de 56 comprimés : 21 fr. 10.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Dépôt à Paris : 2, rue Jobbé-Duval (XV<sup>e</sup>).

**Laboratoires du PROCOLYL**

**E. ROCHE, Pharmacien**

9, rue de la Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

## PROCUTA

Topique au Thiodiméthyl oxyanthranol.

**Propriétés thérapeutiques.** — Topique actif, non odorant, non irritant. Agent de rénovation et de réfection épidermique.

*Le Procuta exerce une action incontestable sur le psoriasis (Dr Brocq).*

**Indications.** — Psoriasis. Pityriasis. Parakératoses psoriasiformes. Kératose pileaire. Dermatoses à formes squameuses.

**Mode d'emploi.** — Étendre le *Procuta* sur la région malade. Protéger par un pansement.

*Procuta et Procuta fort.*

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET et Cie, Pharmaciens**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## PRODUITS BIOS

Littérature et renseignements sur demande.

**Laboratoires BIOS**

10, rue Vineuse — PARIS.

(Tél. : Trocadéro 57-44.)

(Télégraphe : Bios-Paris.)

## PRODYNASE

**Médication Phosphorée, Calcaïque, Magnésifiée.**

**Composition.** — Comprimés comprenant :

Méthylphosphate de Chaux .....	0 gr. 20
Méthylphosphate de Magnésie .....	0 gr. 05

**Propriétés.** — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

**Indications.** — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grosseuse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

**Mode d'emploi :**

*Adolescents :* 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

*Adultes :* 2 comprimés au début des repas, midi et soir.

**Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD**

**Docteurs en Pharmacie**

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)



## PROGASTER

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

**Composition.** — Superoxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale, permettant sa décomposition instantanée, en présence du suc gastrique, en oxygène et en chlorure de magnésium naissants.

**Propriétés.** — Désinfectant remarquable du tube digestif. Amélioration surprenante de l'état général chez tous les chroniques. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant.

**Indications.** — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, convalescents. Tous les chroniques, tous les sédentaires.

**Mode d'emploi.** — Pas de contre-indication, pas d'accoutumance du nourrisson au vieillard.

Chez tous les chroniques : 2 comprimés le matin à jeun.

Dans les troubles digestifs : 2 à 6 comprimés et plus au moment de ces troubles.

Prix : 13 fr. 70.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Dépôt à Paris : 2, rue Jobbé-Duval (XV<sup>e</sup>).

E. ROCHE, Pharmacien.

9, rue de la Platière, LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

## PROGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par le Brun d'Acridine, nouveau dérivé synthétique d'un pouvoir bactéricide supérieur et d'une toxicité extrêmement réduite. (Thèses de S. Lurid et de P. Porret, Travaux de P. Barbellion et J. Fuchs.)

Ampoules de 10 cc. pour inj. intrav. (solution à 2,5 p. 1000). Comprimés Brun d'Acridine assoc. au Kawa et à l'Arbutine.

**Propriétés.** — Ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents hépatiques ou rénaux, ne sclérose pas les veines et ne colore pas les téguments. Utilisé concurremment avec les sulfamides, renforce considérablement l'action de ces derniers et supprime les sulfamido-résistances.

**Indications.** — Affections gonococciques quelles qu'elles soient et leurs complications, septicémies, méningites, méliococcies, érythème nouveau, etc.

**Posologie.** — Ampoules : une injection intraveineuse tous les jours ou tous les 2 jours.

Comprimés : 4 à 8 par jour au moment des repas.

Prix. — Progone ampoules : la boîte de 5 ampoules 10 cc. : 22 fr. 60.

Progone comprimés : l'étui de 30 comprimés : 20 fr. 25.

Laboratoires SFEAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 13-31.)

## PROGYNON liquide CRUET PROGYNON comprimés CRUET

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Hormone dihydrofolliculaire chimiquement pure, exactement dosée en poids.

**Indications.** — Troubles de la ménopause et troubles menstruels (bouffées de chaleur, vertiges, dépression psychique, etc.). Troubles de la circulation tels que mains et pieds froids. Ulcères de la jambe. Arthrites d'origine endocrinienne. Prurit vulvaire.

**Posologie.** — PROGYNON liquide : verser les gouttes dans 1 cuillère à café et mettre en bouche sans diluer ni boire ensuite, V à X gouttes, 4 fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

PROGYNON comprimés : 2 à 4 fois par jour 1 comprimé. Laisser fondre les comprimés lentement dans la bouche sans les avaler ni boire ensuite.

Présentations :

Flacon de 20 cc. à 2 mgr. ....	25 fr.
Flacon de 30 comprimés. ....	25 fr.
Flacon de 60 comprimés. ....	45 fr.

## PROGYNON B huileux CRUET

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Benzoate de dihydrofolliculine en solution huileuse pour injections intramusculaires.

**Indications.** — 1° *Troubles menstruels par carence folliculaire* : Aménorrhée (associé ou non au Proluton) — Hypoménorrhée — Oligoménorrhée — Troubles de la puberté et de la ménopause — Castration (associé ou non au Proluton) — Frigidité.

2° *Grossesse et post-partum* : Inertie utérine primitive — Arrêt de la sécrétion lactée — Dermatoses et mastite puerpérales.

3° *Affections du vagin et du sein* : Vulvo-vaginite des petites filles — Vaginite sénile atrophique — Leucorrhée — Mastopathies.

4° *Sterilité* (associé ou non au Proluton).

5° *Troubles extra-génitaux* : Phénomènes de carence par insuffisance ovarienne — Arthrites et dermatoses endocriniennes — Ulcère gastrique — Recto-colite hémorragique. Troubles circulatoires périphériques — Diabète sénile.

**Posologie.** — Consulter notre brochure détaillée.

**Présentations.** — PROGYNON B huileux.

Boîte de 1 ampoule à 1 mgr. ..	16 fr.
Boîte de 3 ampoules à 1 mgr. ..	43 fr.
Boîte de 10 ampoules à 1 mgr. ..	135 fr.

PROGYNON B huileux fort.

Boîte de 1 ampoule à 5 mgr. ..	49 fr.
Boîte de 10 ampoules à 5 mgr. ..	447 fr. 70

Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74-19)

Z. N. O. : DECODRE, 87, avenue de Saxe — LYON

## PROLAN

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Hormone gonadotrope d'activité anté-hypophysaire.

**Propriétés et indications.** — Hormone sexuelle agissant spécifiquement sur les gonades mâles et femelles pour en provoquer la maturation ou en stimuler le fonctionnement.

*Chez l'homme :* cryptorchidie, azoospermie.

*Chez la femme :* aménorrhée primitive et secondaire, métropathies hémorragiques.

*Chez les deux sexes :* infantilisme.

**Posologie.** — En injections intramusculaires. La posologie variant dans des proportions considérables suivant la nature et la gravité de l'affection, consulter la documentation spéciale.

**Présentation.** — Boîte de 5 ampoules à 100 unités internationales.

Boîtes de 1 et 5 ampoules à 500 unités internationales.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PROLUTON CRUET

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Hormone lutéinique cristallisée et standardisée (progestérone) en solution huileuse pour injections intramusculaires.

**Indications.** — Prophylaxie de l'avortement habituel. Traitement des ménorragies et des métropathies hémorragiques de la puberté et de la ménopause. Cas graves d'aménorrhée après traitement par le PROGYNON B huileux.

**Posologie.** — Dans les ménorragies, les hémorragies de la puberté et de la ménopause, injecter tous les jours 1 ampoule de 5 ou de 10 mgr. Dans l'aménorrhée primaire : dose journalière de 5 mgr. pendant 5 jours, après une cure de PROGYNON B huileux. Dans les avortements habituels, 5 mgr. 2 fois par semaine depuis le début de la gestation jusqu'à l'époque présumée de l'avortement. On prescrira 10 mgr. et le repos au lit dans les avortements imminents.

### Présentations :

Boîte de 3 ampoules à 5 mgr.....	85 fr.
Boîte de 3 ampoules à 10 mgr.....	150 fr.

## PROLUTON « C » CRUET

**Composition.** — Hormone lutéinique active par voie buccale (prégnéninolone).

**Indications.** — Avortement habituel. Vomissements de la grossesse. Dysménorrhées spasmodiques. Métropathies hémorragiques.

**Posologie.** — Suivant les cas, 2 ou 4 fois par jour, 2 dragées avant les repas.

**Présentation.** — Flacon de 25 dragées à 5 mgr.  
Prix ..... 95 francs

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

**E. KELLER, Docteur en Pharmacie**

(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE  
87, avenue de Saxe — LYON

## PROLYSES

(Ovules).

Lysats sodiques à 1/10<sup>e</sup> d'émulsion microbienne de *gonocoques*, *streptocoques*, *staphylocoques*, *B. coli* et *cult communis*.

**Indications.** — *Gynécologie générale*. Métrites, Salpingites et toutes infections microbiennes de l'appareil génito-urinaire chez la femme.

**Présentation.** — Boîte de 6 ovules.

**Prix au public :** 26 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1236-10.

Ch. VERGELOT, Docteur en pharmacie

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## PROMÉTHINE

*Cholagogue et Décongestionnant physiologique.*

**Forme.** — Granulé de saveur agréable.

**Composition.** — Peptone sèche pure, 5 gr.; Sulfate de magnésie anhydre, 22 gr. 80; Salicylate de soude, 0 gr. 80; Extrait fluide de Romarin, 2 gr.; Excipient spécial, Q.S. pour 100 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitant, régénérateur et désinfectant de la cellule hépatique par le romarin et le salicylate de soude.

Cholagogue par la peptone et le sulfate de magnésie.

Action douce quoique puissante.

**Indications.** — *Insuffisances hépato-biliaires*, *Lithiase biliaire*, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère et tous troubles d'origine hépatique.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des cholécystites. Tâter la susceptibilité des lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Prix : 21 fr. 70 la boîte de 100 gr. (durée moyenne : 10 jours).

Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETREFA »

R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZUY, Pharmaciens.

Administr. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)

Agence en zone libre : LE RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## PROMINAL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — N-méthyl-éthyl-phényl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Anti-épileptique dépourvu d'action hypnotique. Sa toxicité est nettement plus faible que celle du Luminal : il ne provoque pas de manifestations cutanées.

Epilepsie essentielle, épilepsie non convulsive. Améliore l'état mental des épileptiques.

**Posologie.** — 1/2 à 3 comprimés par jour (0 gr. 10 à 0 gr. 60). L'action thérapeutique d'un comprimé de 0 gr. 20 de PROMINAL correspond approximativement à celle d'un comprimé de 0 gr. 10 de Luminal. Le PROMINAL ne doit être substitué que progressivement au Luminal (en 8 à 10 jours environ). Il y a d'ailleurs souvent intérêt à associer les deux médications.

**Présentation.** — Tube de 10 et flacon de 50 comprimés à 0 gr. 20.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PROMINALETTES

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — N-méthyl-éthyl-phényl-malonylurée.

**Propriétés et indications.** — Permettent l'administration du Prominal à doses fractionnées. Antispasmodique sans effet hypnotique.

Migraine, Névroses cardiaques, Spasmes vasculaires, Hypertension, Coqueluche, Neurotonies.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par jour. L'action thérapeutique d'une PROMINALETTE dosée à 0 gr. 03 correspond approximativement à celle d'une Luminalette dosée à 0 gr. 015 de Luminal.

**Présentation.** — Flacons de 30 et de 100 comprimés à 0 gr. 03.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Bactériothérapie cutanée.

### Indications :

Toutes plaies suppurantes ou exposées à la suppuration. Furoncles, Brûlures : Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

**Présentation.** — Tubes étain de 30 grammes.

Prix : 13 fr. 80.

**Mode d'emploi.** — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## PROPIDON

**Applications à la Bactériothérapie locale.**

### *Propidon-Pansement :*

Étui renfermant 1 ampoule de 5 cc.,  
1 compresse, 1 coton, 1 imperméable.

Prix : 6 fr. 90.

### *Propidon usage externe.*

Boîtes de 10 ampoules de 5 cc. sans pansement. Prix : 31 francs.

**Indications.** — Plaies cutanées de toute nature, plaies chirurgicales, angines, stomatites.

### *Propidon Stilligouttes :*

Boîtes de 6 ampoules compte-gouttes.  
Prix : 17 francs.

**Indications.** — Oto-rhino-laryngologie (Instillations, méchages).

### *Suppositoires au Propidon :*

Boîtes de 10 suppositoires : Prix : 20 fr. 50.

**Indications.** — Lésions de la région anale, hémorroïdes, rectites.

### *Ovules au Propidon :*

Boîtes de 6 ovules. Prix : 20 fr. 50, avec tampons stériles.

**Indications.** — Affections gynécologiques, métrites, vaginites, pansements post-opératoires.

**Société Parisienne d'Expansion chimique**  
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## PROPIDON

(Bouillon stock-vaccin du Professeur Pierre Delbet.)  
L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

### Indications :

Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Erysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination préopératoire.

### Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule. A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à 3 ampoules. L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

**Présentation.** — Boîte de 3 ampoules de 4 cc.  
Prix : 27 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## PROPIVANE

Propyl-phényl-acétate de diéthylaminoéthanol  
(Chlorhydrate).

**Propriétés.** — Médication spasmolytique agissant électivement sur les éléments nerveux et musculaire, non toxique, n'ayant pas les inconvénients de la belladone.

**Indications.** — Tous les spasmes ; en pathologie digestive, génito-urinaire, pulmonaire, circulatoire ; Maladie de Parkinson, mal de mer.

### Présentations :

Dragées à 0 g. 05 (flacons de 30 dragées) : 29 fr. 30.

Solution à 5 p. 100 (pour injections intramusculaires, boîtes de 10 ampoules de 1 cc.) : 29 fr. 30.

Suppositoires à 0 g. 10 (boîtes de 10) : 29 fr. 30.

### Posologie :

**Voie buccale :** 2 à 3 dragées 2 à 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

**Voie parentérale :** 1 à 2 ampoules par jour.

**Voie rectale :** 1 à 4 suppositoires.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## PROSTAL

### Suppositoires Sédatifs.

**Composition.** — Stovaïne, Benzocaïne, Menthol, Bromure de camphre, Extraits de jusquiame, de ciguë, de ratanhia, Surrénine, Hypophyse, Prostatine.

**Propriétés.** — Suppositoires analgésiques, décongestifs, opothérapiques.

**Indications.** — Affections douloureuses de la prostate et du petit bassin, Hémorroïdes.

**Posologie.** — 2 à 3 suppositoires par jour.  
La boîte de 10 suppositoires : 23 fr. 50.

### Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Invalides 52-73.)

## PROSTALYSE

**Forme.** — Pilules dragéifiées.

### Composition.

Hypophysine...	0,0001	Extrait de belladone...	0,001
Surrénine .....	0,01	— piscidia ....	0,01
Prostatine.....	0,02	— cupressus... ..	0,02
Orchitine .....	0,02	— cœculus ....	0,02
		Phosphate de Magnésie.	0,05

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Stimule et régénère les fonctions de la prostate par une association synergique d'extraits de glandes endocrines, décongestionne la prostate par des extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives.

**Indications.** — Prostatites aiguës et chroniques. Hypertrophie de la Prostate. Congestions pelviennes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 dragées à chacun des deux principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

**Prix :** 20 francs la boîte de 60 dragées pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12<sup>e</sup>).

## PROSTATIDAUSSE

(Chalones testiculaires prostatolytiques.)

**Nature du médicament.** — L'adénome prostatique provient de l'hypertrophie de l'utricule, résidu embryologique femelle inclus dans la prostate.

Cette formation reste atrophiée tant que le testicule fonctionne et exerce son effet de chalone ; quand le déficit testiculaire survient, l'utricule se développe anormalement, écrase le canal de l'urètre et le prostatisme apparaît.

Le *Prostatidause* est un extrait testiculaire de pouvoir chalonique très élevé. Son activité est maintenue grâce à la dissolution de la chalone dans le sérum de taureau. Il est présenté sous forme d'ampoules de 5 cc. à utiliser par la voie buccale.

**Indications thérapeutiques.** — A titre préventif, le *Prostatidause* sera pris par tous les sujets avoisinant la cinquantaine, surtout s'ils présentent un peu de dysurie et de la pollakiurie nocturne.

A titre curatif, il peut être utilisé à toutes les périodes de l'hypertrophie de la prostate, même dans les cas avancés ; il fait parfois réapparaître la possibilité des mictions spontanées.

**Posologie et mode d'emploi.** — Le *Prostatidause* se délivre sous forme d'ampoules buvables et de suppositoires.

**Ampoules,** le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**A titre préventif,** 6 à 12 ampoules par mois.

**A titre curatif,** 12 ampoules par mois, à raison d'une ampoule par jour, pendant 12 jours consécutifs, ou une ampoule tous les deux jours pendant 24 jours.

**Cure d'entretien,** 6 à 12 ampoules par mois, une tous les deux jours.

**Suppositoires,** le soir au coucher, même posologie que ci-dessus.

Le médicament ne provoque aucune réaction, il est bien toléré et ne comporte aucune contre-indication.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

**Composition.** — Ion Hg + (très petite dose) extrait de solanées et de papavéracées, Hamamelis, Hormones prostatiques totales.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques), Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Ténésmes, Contractures, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périméales, Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non (suites opératoires).

**Mode d'emploi.** — Le plus habituel, un le soir au coucher.

(En boîte de dix suppositoires.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-4.

**Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE**

72, quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

## PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

**Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.**

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 cgr. de fer et 5 mgr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 19 fr. 55.

Enregistré au L. N. C. n° 33-2.

**Laboratoire GALBRUN**

10 et 12, rue Guynemer, St-Mandé (Seine).

(Tél. : Daumesnil 10-38.)

## PROSTIGMINE « ROCHE »

Péristaltigène synthétique.

Anti-myasthénique

**Composition.** — Ester diméthylcarbamique du *m*-oxyphényltriméthylammonium.

**Propriétés.** — Action rapide et sûre sans aucun effet sur l'activité cardiaque et la pression sanguine.

**Indications.** — *En Injections* (ampoules de 1 cm<sup>3</sup> dosées à 1/2 mg.). Atonie intestinale post-opératoire, Atonie réflexe post-partum et post-abortionum, Douleurs abdominales, Rétention d'urine post-opératoire, Spasme de l'uretère, Obstruction intestinale du nourrisson intoxiqué, etc.

*En comprimés* (dosés à 15 mg.), Dystrophies musculaires, Myasthénies, Myopathies, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — Pour provoquer l'évacuation des gaz : 1 ampoule de 1 cm<sup>3</sup> le lendemain de l'opération. Pour provoquer l'évacuation alvine : 1 ampoule de 1 cm<sup>3</sup> suivie d'un lavement de 200 cm<sup>3</sup> d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection. **Dans les myopathies** et surtout dans la **myasthénie**, la prostigmine s'administre à des doses variant de 2 à 5 ampoules de 1 cm<sup>3</sup> par voie sous-cutanée 2 à 3 fois par jour ou mieux 2 à 6 comprimés par jour par voie buccale.

**Présentation.** — La Prostigmine « Roche » se présente sous deux formes : *Ampoules* de 1 cm<sup>3</sup> dosées à 1/2 mg. pour injections sous-cutanées ou intramusculaires et *Comprimés* dosés à 15 mg.

Ampoules : boîte de 6. Comprimés : flacon de 20.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N<sup>os</sup> 504-56 (ampoules), 504-85 (comprimés).

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Arch. 91-10)

## PROSYMPAL

(883 F.)

Chlorhydrate de benzo- (diéthylamino-méthyl) dioxane. Médication sympathicolytique agissant électivement sur le plexus sympathique cardio-aortique.

**Indications.** — Angoisse des angines de poitrine, fonctionnelles ou organiques, avec lésions objectives telles que : aortites, médiastinites, insuffisance ventriculaire gauche.

**Présentation-Posologie :**

Comprimés à 0 g. 01 (tubes de 100).

Débuter par 4 cg. *pro die*, puis augmenter progressivement jusqu'à 15 ou 20 cg. Administrier la dose journalière par prises de 2 cg. réparties également dans le courant de la journée. Maintenir la dose optimum 3 semaines avant de réduire la posologie.

Prix de vente : 29 fr. 30.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## PROTARGOL

(Collyre au)

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Combinaison d'argent et d'albumine, non identique au protéinate d'argent du commerce, en solution à 3,3 %.

**Indications.** — Conjonctivites, Blépharites, Ophtalmies des pays chauds.

**Mode d'emploi.** — I à III gouttes dans l'œil, matin et soir.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes de 15 cc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## PROTENSÈNE LEJEUNE

**Composition.** — V gouttes contiennent :

Iode bisublimé .....	1 cgr.
Peptone de cœur .....	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui .....	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt .....	1 cgr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

**Indications.** — Hypertension, artériosclérose, affections cardio-vasculaires.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 21 fr. 50.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142 rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>). Tél. Dorian 47-00.)

## PROTIODYNE DRAGÉES

**Composition.** — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

**Propriété.** — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

**Indications.** — Manifestations anaphylactiques en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocrites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

**Doses et mode d'emploi.** — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées. *Enfants* : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau. Prix : la boîte de 50 dragées Protidyne : 22 fr.

N° Enregistrement L. N. C. M. 216-9.

**Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.**  
29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

## PROTO-GAMBIER

(Comprimés de)

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable.

**Propriétés.** — Antiseptique, désinfectant gastro-intestinal, purgatif, cholagogue et cholérétique, vermifuge, diurétique.

**Indications.** — Toutes celles du calomel ordinaire, dont il n'a aucun des inconvénients.

**Présentation.** — Comprimés de 1 milligramme, 1 et 5 centigrammes. Le tube de 15 comprimés : 8 francs.

Chaque comprimé porte sur l'une de ses faces le nom et le dosage ; sur l'autre, une rainure en croix qui permet de le diviser en 2 ou 4 parties égales.

**Posologie.** — En principe, les doses à employer sont moitié moindres que celles du calomel. Leur administration doit être fractionnée.

*Enfants* au-dessous d'un an : à 2 comprimés de 1 mg. par jour.

*Enfants* de 1 à 4 ans : 1/4 à 1 comprimé de 1 cg. par jour.

*Enfants* de 4 à 7 ans : 1 à 3 comprimés de 1 cg. par jour.

*Adultes et enfants* au-dessus de 7 ans : 1/2 à 3 compr. de 5 cg. par jour.

**Laboratoire ROGER BELLON**

S. A. R. L. au capital de 1.250.000 francs.

**Louis FERRAND, Ex-Interne** Lauréat des Hôpitaux de Paris, Pharmacien-Gérant.

Siège social : 78 bis, av. Marceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tel. : Elys. 16-33.)

Annexe : 24, chemin de Saint-Roch — AVIGNON (Vaucluse). (T. : 19-32.)

Fournisseur de l'Assistance Publique et des Ministères de la Santé Publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



## PROVAC'S

Vaccin polyvalent, injectable par voie sous-cutanée, constitué par les microbes anaérobies pathogènes de la flore bucco-pharyngo-dentaire.

**Composition.** — *Spirochaeta microdentium*, *Spirochaeta macrodentium*, *Leptospira buccalis*, *Bac. fusiformis*, *Bac. ramosus*, *Staphylococcus parvulus*, *Micrococcus foetidus*.

### Indications :

**Préventivement :** avant toute opération effectuée dans la cavité buccale ou ses annexes.

**Curativement :** toutes les affections dues à la flore bucco-dentaire : angines, stomatites, abcès et phlegmons de l'amygdale, adenoidites, sinusites, accidents de la dent de sagesse, arthrites dentaires aiguës et chroniques (pyorrhée), alvéolites, suppurations fétides broncho-pulmonaires.

### Posologie et mode d'emploi :

Lieu d'injection : face postérieure du bras.  
Mêmes doses pour les enfants et pour les adultes  
La grossesse n'est pas une contre-indication.  
Cas aigus : 2 cc. d'emblée et 1 cc. matin et soir.  
Cas subaigus : 0,5 cc. à 1 cc. par jour.  
Cas chroniques : débiter par 0 cc. 1, augmenter lentement, espacer les injections (2-3 jours).

**Précautions.** — Les asthmatiques, les eczémateux, les malades atteints de suppurations fétides broncho-pulmonaires sont quelque fois hypersensibles au Provac's ; il est indispensable de ne commencer leur traitement que par de très faibles doses, 1/20<sup>e</sup> ou 1/10<sup>e</sup> de cc.

**Présentation.** — Boîte de 5 ampoules de 1 cc., pour la vente au public. Boîte de 20 ampoules, pour dentistes et hôpitaux exclusivement.

**Laboratoire Pharmaceutique DAUFRESNE**  
42, rue Thiers — LE HAVRE.

## PROVEINASE MIDY

Comprimés

Type de l'Endocrino-Phytothérapie veineuse.

### Composition :

1<sup>o</sup> Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : *Cupressus*, *Genêt*, *Marron d'Inde*, *Hamamélis* et *Viburnum*.

2<sup>o</sup> Poudres titrées d'organes frais, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : *Thyroïde* 0,005, *Surrénale* 0,025, et *Hypophyse* 0,015.

Ces poudres sont mises en comprimés dès fabrication.

**Propriétés thérapeutiques.** — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

**Indications.** — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

**Mode d'emploi :** États chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

États aigus : 3 à 6 comprimés par jour

**Prix :** 20 fr. 30.

Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## PROVULSIF PROBIOS

Révulsif liquide.

**Présentation.** — En flacon avec pinceau (13 fr. 05).

**Principes actifs.** — Teinture de lavande, Teinture de capsicum, Chloroforme, Essence de térébenthine, Essence de moutarde, Essence de serpolet.

**Indications.** — Contre les affections des voies respiratoires, Névralgies, Douleurs intercostales, Rhumatismes.

**Mode d'emploi.** — Badigeonner le dos et la poitrine ou la partie malade, recouvrir ensuite la partie malade avec une feuille d'ouate hydrophile aspergée d'eau de Cologne.

Enregistré au L. N. C. n° 900-32.

Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## PROXYTOL

**Composition.** — Association des diastases tissulaires des organes de la digestion (foie, estomac, intestin, pancréas).

**Propriétés.** — Régénérateur des fonctions digestives.

**Indications.** — Dyspepsies, Entérites, Insuffisance hépatique, Gastro-entérite des nourrissons.

**Présentation.** — Boîte de 36 comprimés.

**Posologie.** — *Adultes* : croquer de 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

*Enfants* : demi-dose.

*Nourrissons* : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

Prix au public : 17 francs.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires des Proxytases.

S. A. au capital de 1 000 000 de francs.

R. C. Seine 191.657.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 68-22.)

## PRURILYSE

Spécifique du Prurit.

**Composition :**

Chloral, acide acétique, eau distillée double d'Hamamélis, glycérine, eau de menthe.

**Indications :**

Prurit anal, vulvaire, sénile, etc. Urticaire, Herpès, Prurigo, Piqures d'insectes et toutes démangeaisons.

**Mode d'emploi :**

Lotionner les parties atteintes de Prurit, une ou plusieurs fois par jour.

Produit non toxique, ne tache pas, ne graisse pas.

Prix : 19 fr. le flacon.

— 9 fr. le flacon d'essai.

**Laboratoire R. ROUSSEL**

72, Grande-Rue — FLERS (Orne).

## PSORÉAL DRAGÉES

**Traitement interne du psoriasis et autres dermatoses**

**Composition.** — Soufre — Hyposulfites de Na et Mg. — Bi-Tartrate de K. — Résine de Gayac — Rhubarbe.

**Propriétés.** — Médication anti-choc et de désensibilisation. Action du S. sur cellule hépatique et élimination par la peau. Action stimulante de tous les composants sur les glandes de défense : Hépatobiliaires Rénales, Sudoripares.

**Indications.** — Traitement interne du Psoriasis, des Eczémas, Herpès, Prurits, Urticaires et autres dermatoses pouvant provenir d'une auto-intoxication, anaphylaxie, floculation ou d'une imprégnation de l'organisme par des toxines alimentaires, médicamenteuses, etc.,

**Posologie.**

*Adultes* : 1 à 3 dragées au début des 3 repas (moyenne 6 par jour).

*Enfants* : 1 à 3 dragées par jour, suivant l'âge. Durée habituelle du traitement : un mois.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : le flacon de 60 dragées : 22 francs.

**Laboratoire ÉON**

à DINAN (Côtes-du-Nord).

## PSORÈNE GOUTTES

**Traitement interne du psoriasis.**

Gouttes iodo-arsenicales-hydrargyriques-méthylarsinées.

**Propriétés.** — Action spéciale de As — I — et Hg pour combattre l'imprégnation de l'organisme par les toxines microbiennes d'origine suspecte, acquise ou héréditaire (Φ ou Ξ souvent associées).

**Indications.** — Traitement interne du psoriasis (ou d'entretien après piqures ou cures thermales). Affections héréditaires, Déchéance organique hérédos-spécifique, Lupus.

**Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> *Enfants*. I à II gouttes par jour et par année d'âge, en 2 ou 3 fois, à partir de 2 ou 3 ans.

2<sup>o</sup> *Adultes* : X à XX ou même XXX gouttes 2 à 3 fois par jour, soit de XXX à LX ou XC gouttes par 24 heures. Dose habituelle LX gouttes par jour. Commencer par XXX gouttes par jour en augmentant, rester 20 jours à la dose maxima, revenir au point de départ et suspendre 10 jours. Recommencer le traitement.

Mentionner sur l'ordonnance : A renouveler.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : le flacon, 22 francs.

**Laboratoire ÉON**

à DINAN (Côtes-du-Nord).

## PSORÉON

*Traitement externe du psoriasis.*

**Composition.** — Médication Chrysophanique-  
Hydrargyro-Cadique, sous forme pommade en  
tubes.

**Propriétés.** — Spécifique du *Psoriasis*. Réducteur  
complet, antiprurigineux et kératoplastique.  
Spécialité efficace, pratique, non irritante.

**Indications.** — Unique en son genre, ce médica-  
ment est réservé au traitement local du *Psoriasis*  
et des *Affections psoriasiformes*, où sa supériorité  
s'avère indiscutable.

**Mode d'emploi.** — En applications pendant la  
nuit après un sérieux nettoyage des plaques.

**Présentation.** — Tube ordinaire : 25 fr. 30, et  
tube très grand modèle : 62 francs.

(La fabrication du tube grand modèle est momen-  
tanément suspendue jusqu'à la paix.)

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord).

## PSORYL

Dérivé anthranolique employé dans le

### TRAITEMENT EXTERNE

des

#### I. — DERMATOSES NON IRRITABLES

##### Psoriasis.

90 p. 100 de résultats. *Associer le régime sans graisses.* (Ann. dermat. et syphil., juin 1938.)

Parakératoses, Eczémas squameux ou secs,  
non irritables, Lichens plans chr., Lichéni-  
fications secondaires.

#### II. — DERMATOSES PARASITAIRES

**Trichophyties**, **Epidermophyties**, **Erythras-**  
**ma**, **Pythiriasis**, **Eczémas mycosiques**,  
**Teignes**, **Tokeleau**.

#### III. — DERMATOSES DIVERSES

**Pelades** : résultats constants.

##### Formes et mode d'emploi :

1° *Solution* : S'emploie dans le **psoriasis**  
du tronc et des membres (action rapide,  
procédé propre, sans odeur), dans les  
parakératoses, les **pelades**.

Un badigeonnage léger le soir.

2° *Pommade* : Une application légère le soir.

Prix, solution ou pommade : 21 fr. 60.

##### Laboratoire R. SAVOIRE

Docteur en pharmacie,

Ancien Interne des hôpitaux de Paris.

VENDOME

(Téléphone 26.)

## PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

**Indications thérapeutiques.** — Parakératoses psoriasiformes. Psoriasis avec ou sans arthropathies.

**Présentation.** — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

**Posologie.** — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Série de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 39 fr. 80.

Complément des cures : voie buccale, PSOTHANOL comprimés.

*Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire :* Psathanol en ampoule de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 32 fr. 80.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII°).

(Tél. : Europe 49-50.)

Z. N. O. : PETRIER, 30, rue Créqui — LYON.

## PSYLLIUM LANGLEBERT

### Composition :

Semences de Psyllium noir de Provence, sélectionnées et triées à la main, ne renfermant ni pierre ni débris végétaux.

### Indication :

Par le mucilage qu'elles contiennent, les semences de Psyllium Langlebert augmentent le volume du contenu intestinal ; ramollissent les selles dures et agglutinent les selles liquides. Recommandé aussi bien dans la constipation que pour l'entérite.

### Mode d'emploi :

Une à deux cuillères à soupe le soir dans le potage, ou pur, et après, absorption d'un demi-verre d'eau.

Prix de vente au public : 17 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1083-5.

Laboratoires TACHOT et VIGAN

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 04-49.)

## PUÉRICRINE REY

**Complexe Endocrino-arsénical à l'usage des enfants et des adolescents.**

**Présentation.** — Sirop parfumé agréable-ment.

**Composition.** — Extraits hépatique, splénique, médullaire, surrénal, hypophysaire, thyroïdien. Méthylarsinate disodique.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les troubles de la croissance. Toutes les dysendocrinies congénitales ou acquises. Tous les troubles de la puberté, du développement. Toutes les convalescences, toutes les asthénies.

*Puéricrine Rey* est un adjuvant indispensable du traitement des cachexies, tuberculose sous toutes ses formes, anémies, chlorose, lymphadénie, leucémie, toutes les affections chroniques.

### Posologie :

*Enfants au-dessus de 4 ans* : 1 à 2 cuillères à dessert par jour, avant les repas.

*Enfants au-dessous de 4 ans* : 1 à 2 cuillères à café par jour, avant les repas.

(Interrompre le traitement 10 jours par mois.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 302-7.

Laboratoires REY

DIJON

(Tél. : 22-12.)

## PULMOCARDINE SIMPLE

**Indications.** — Affections dyspnéiques pulmonaires et cardio-pulmonaires : *Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Scléroses pulmonaires, Gazés de guerre.*

**Composition.** — *Dragées faciles à prendre.*  
Iodure de Caféine. Grindélia. Lobélia. Quebracho.

**Doses.** — 2 dragées au début des 2 repas.

Traitement pour 8 jours : 21 fr. 30.

### CONTRE TOUTE CRISE AIGÜE DE DYSPNÉE :

Remplacer la Pulmocardine simple  
par **Pulmocardine ÉPHÉDRINÉE**

1 dragée toutes les 1/2 heures, jusqu'à effet.

Soulagement immédiat.

Littérature et échantillons :

Enregistré au L. N. C. M. n° 487-4 et 6.

Les Laboratoires **PERROCHON**

A. ABADIE, D<sup>r</sup> en Pharmacie, TOURS (Tél. 54.65.)

## PULMODION

1<sup>re</sup> Tube de 30 comprimés dragéifiés à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine).....	0,004	Extrait de Marrube.....	0,10
Extrait d'Aconit.....	0,003	Extrait de Drosera.....	0,01
Extrait de Belladone.....	0,003	Terpine .....	0,05

2<sup>e</sup> Sirop à base de Dionine, Sulfogalacolate de potasse, Bromoforme,

**Indications.** — Affections respiratoires, Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans *accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

**Mode d'emploi.** — Par 24 heures :

1<sup>re</sup> Comprimés : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2<sup>e</sup> Sirop : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Contenance du flacon de sirop : 220 grammes.

A prendre le plus loin possible des repas.

Prix : Comprimés, 20 francs ; Sirop, 20 fr. 10.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-7.

Laboratoires **JUIN-GUIRAUD**

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Carnot 94-28.)

## PULMOFLUIDE

Élixir glycéro-alcoolique de *Terpine* et *Terpinol*, associés aux balsamiques : *eucalyptus, tolu, benjoin*, traités par procédé spécial d'extraction. *Ipéca, Aconit.*

Antiseptique, modificateur des sécrétions bronchiques (fluidifie).

Expectorant, décongestif.

**Sédatif** par de faibles doses de belladone et de *Codéine*, le plus sûr et le plus inoffensif des alcaloïdes de l'opium.

**Indications.** — Rhumes, Bronchites, grippe, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonie, Tuberculose pulmonaire et, en général, tous les cas où un **Dégagement broncho-pulmonaire** s'impose rapidement.

Pas de contre-indications. Favorise l'appétit et la diurèse, n'augmente pas la glycosurie.

**Doses.** — 3 petits verres à liqueur par jour, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 16 fr. 90 le flacon de 150 cc. (produit concentré).

## PULMOFLUIDE ÉPHÉDRINE

Même formule que le précédent avec 12 milligrammes de chlorhydrate d'Ephédrine g. par cuillerée à soupe.

— Eupnéique incomparable. —

**Indications principales.** — *Asthme bronchique, Emphysème, Trachéo-bronchite, Bronchite chronique, Oppression, Doublement efficace* chez les tuberculeux hypotendus.

**Contre-indications.** — États hypertensifs. Myocardites. Néphrites. Dans ces différents cas l'on peut alterner avec le Pulmofluide simple.

**Mode d'emploi.** — **Doses :**

*Adultes :* 1 cuillerée à soupe 3 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : 1 cuillerée à dessert 3 fois par jour.

Au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

**Comme préventif et curatif de la crise d'asthme :**

1 cuillerée au début de l'accès, puis de 2 heures en 2 heures, sans dépasser la dose quotidienne.

On pourra prévenir la crise en prenant 1 cuillerée 1 heure ou 2 heures avant son apparition habituelle.

Prix : 18 fr. 60 le flacon de 150 cc. (produit concentré).

Laboratoire **LEURQUIN**.

DREUX

## PULMONE

**Indications.** — Pré-Tuberculose, Tuberculose, Toutes les maladies des voies respiratoires.

Nouvelle entité pharmaco-dynamique dans la thérapeutique antibacillaire formant la première Association médicamenteuse à base phytothérapique, opothérapique et chimiothérapique.

**Composition.** — Groupe phytothérapique : Ail.

Groupe Opothérapique : Poumon-Foie-Rate-Moelle des os rouges-Ovaires-Orchite.

Groupe chimiothérapique : Glycogène-Vanadate et Arséniate de soude-Phosphore-Calcium-Potassium.

**Propriétés.** — Reconstituant général.

**Présentations.** — Elixir-Ampoules-Cachets.

**Posologie.** — Elixir : 1 cuillerée à café avant les 2 repas dans 1/4 de verre d'eau bien sucrée.

(Durée : 22 jours.)

Ampoules (exclusivement par le médecin ou sous sa direction) : 3 séries : la première série, 6 jours de suite 1 inj. sous-cut., repos 4 jours (ou ampoules buvables),

Reprenre pendant 6 jours, repos 7 jours. — Opérer de même pour les séries suivantes. Ces séries seront répétées s'il y a lieu et de la même façon.

(Durée : 6 jours.)

Cachets : Un cachet avant les 2 repas, à faire prendre alternés avec les périodes de repos des piqûres, ou pour remplacer ces dernières suivant le degré de puillanimité du malade.

(Durée : 12 jours.)

Enregistré au Lab. Nat. Cont. 1734-3 à 5.

Laboratoires BIOS

10, rue Vineuse, PARIS (16<sup>e</sup>). — (Tro : 57-44.)

## PULMORECTOL

(Ampoules.)

(Suppositoires adultes, enfants et nourrissons.)

**Forme.** — Ampoules et Suppositoires (adultes, enfants et nourrissons).

**Composition.** — Héléline, Codéine et essences balsamiques pures.

**Indications.** — Bronchites, Pneumonies, Broncho-Pneumonies, Coqueluche, Tuberculose et abcès fistuleux.

**Posologie.** — Une ampoule de 2 cc. à mélanger dans une cuillerée à soupe de lait en lavement à garder, ou Suppositoires.

Prix : { Ampoules : 26 fr. 90  
          { Suppositoires : 22 fr. 90.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, r. des Moines, Paris 17<sup>e</sup>. (Tél. : Mar. 04-02.)

## PULMOREX

(109 M.).

**Traitement des Streptocoques et des Affections broncho-pulmonaires.**

**Composition.** — Paraaminophénylsulfamide méthylène sulfonate de soude, très actif, ne donnant pas d'anémie, sans action nocive sur le sang.

**Indications.** — Bronchites chroniques, Affections du cavum, Affections broncho-pulmonaires aiguës et subaiguës,

**Formes.** — Comprimés, ampoules pour injections intraveineuses.

**Posologie.** — Adultes : 4 à 6 comprimés par jour au milieu des repas. Dans les formes aiguës, 6 à 10 comprimés par jour.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

**Docteur MOUNEYRAT**

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine). (Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## PULMOSEPTINE

Dragées.

**Composition.** — Eucalyptol, Phosphate de Galacol, Terpene, Cinnamal de Soude, Codéine, Lactate de Chaux.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Toutes affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures : Rhino-pharyngites, Laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites aiguës, gripes à forme respiratoire, etc.

2<sup>o</sup> États chroniques : Laryngites chroniques, catarrhe respiratoire des fumeurs, bronchites chroniques, etc.

3<sup>o</sup> Toux nerveuses de toute origine : toux spasmodique, coqueluche et toux coqueluchoïde, accidents mineurs de l'asthme, etc.

**Forme et posologie.** — Un facon de 48 dragées.

Adultes : 6 à 8 dragées par jour dans les états aigus, 3 à 4 dragées par jour dans les états chroniques.

Enfants : demi-doses.

A prendre à n'importe quel moment de la journée (avant, pendant ou après les repas).

Prescrire par exemple : 3 dragées à avaler avant le repas du soir et 3 avec une infusion chaude avant dormir.

Aucune contre-indication. — Ne provoque pas de constipation. N'irrite pas l'estomac.

Prix : 19 fr. 25, taxe comprise.

Laboratoires des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Docteur en Pharmacie,

183, rue de Rome — MARSEILLE.

## PULMOSÉRUM

**Forme.** — Solution.

Solution codéinée de Gaïacol synthétique en milieu phosphorique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antisepsique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, à prendre dans la journée ou au milieu des deux principaux repas.

Le flacon : 22 fr. 50.

**Laboratoires A. BAILLY**

(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Laborde 62-30.)

## PULMOSITOIRES

**Composition :**

Créosote de hêtre purifiée..... 0 gr. 50  
Excipient ..... Q. S.

Pour un suppositoire.

**Mode d'action.**

Antisepsiques pulmonaires, cicatrisants, hypothermiques, antibacillaires. Tolérance absolue.

**Indications :**

Toutes les affections pulmonaires, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, tuberculose pulmonaire. Complications pulmonaires des interventions chirurgicales et leur prophylaxie. Toutes les pyrexies.

**Formes et mode d'emploi :**

Deux formes : Pulmositoires adultes (à 0 gr. 50 de créosote) ; Pulmositoires enfants, qui sont dosés à 0 gr. 30 de créosote.

Un Pulmositoire matin et soir. Pour les bébés, un demi-suppositoire d'enfant sera employé.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

**Laboratoires FALVY**

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PULMOTHOLIOL (Sirop)

**ADULTES : Composition :**

Teint. Lobélie,		Thiocolum .....	5,60
Eucalyptus ..	50	Bromure de so-	
Belladone .....	2,50	dium .....	50
Aconit .....	0,60	Benzoate de soude.	30
Cratægus .....	1,50	Sirops terpine....	90
Drosera .....	3	Déssessartz .....	1
Polygala .....	5	Extr. fl. serpolet..	0,50
Bromoforme ...	XXX gouttes	Extr. fl. hierre ter..	187 cc.
Codéine .....	0,10	Excipient. Q. S. p.	

**Posologie.** — 4 à 5 cuillerées à soupe par jour, de préférence avec une infusion chaude.

**ENFANTS : Composition :**

Teint. Eucalyptus.....	0,50	Sirops polygala .....	20
Grindélia, Belladone ...	1	Terpine .....	20
Drosera .....	2	Déssessartz .....	60
Bromure de sodium .....	2	Teint. de lobélie ...	0,40
Benzoate de soude... ..	2	Extr. fl. de serpolet..	0,40
Thiocolum .....	50	Extrait fl. de Hierre..	0,20
		Excipient. Q. S. p.	125 cc.

**Posologie.** — 4 à 5 cuillerées à café par jour, de préférence avec une infusion chaude.

**Indications.** — Affections pulmonaires.

**Laboratoires d'OPOCHIMIOTHÉRAPIE**

20 bis, rue des Jumeaux — TOULOUSE.

## PULMO-THIORINE

Opothérapie pulmonaire. Extrait trachéo-broncho-pulmonaire. Hypo-sulfite de soude et de magnésie granulé. Thérapeutique de fond de toutes les affections pulmonaires subaiguës et chroniques et de toutes les suppurations de l'arbre respiratoire et de ses annexes.

**Indications.** — Ozone, Sinusites. Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches. Adénites et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites. Trachéo-bronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Gangrène pulmonaire. Catarrhes chroniques. Bronchites persistantes des gazés et des vieillards. Tuberculose pulmonaire (formes torpides et formes sécrétantes). Pneumonies et séquelles de pneumonies. Pleurésies séro-fibrineuses. Pleurésies purulentes de la grande cavité de l'interlobe ou du médiastin. Kystes hydatiques pulmonaires suppurés, fistulisés. Ostéo-arthropathies pneumiques. La cuillerée à café 5 gr. de granules renferme : 0,25 d'extrait pulmonaire, 0,20 d'hypo-sulfite de Na et 0,05 d'hypo-sulfite de Mg.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café 3 fois par jour avant les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Enfants : 1/7 ou 1/4 de dose

Deux formes. — Comprimés et Granulés.

Comprimés : 2 comprimés = 1 cuillerée à café.

**Prix.** — Comprimés : 20 fr. 50 ; Granulés : 20 fr. 85.

**Laboratoire de la SULFO-THIORINE**

J. DEDIEU, Pharmacien,

39, rue Fondaudé — BORDEAUX. (Tél.: 820-04.)

## PULSAMONE

Antiepasmodique végétal.

**Composition.** — Anémone pulsatile, Gui, Passiflore, Saule Blanc, Mélisse, Aubépine.

**Forme.** — Solution aromatique et comprimés sans sucre.

**Propriétés.** — Médication équilibrante du système nerveux central ; action complémentaire efficace dans les névroses liées à l'irritabilité du sympathique.

**Avantages.** — Composition strictement végétale et atoxique ; absence rigoureuse de stupéfiants et de barbituriques.

**Indications.** — Nervosisme, Insomnies, Anxiété, Aéro-phagie, Troubles cardiaques et menstruels d'origine nerveuse, et tous cas de déséquilibre vagosympathique.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à café ou 3 à 4 comprimés. par jour.

Prix : Le flacon, 19 fr. 30.

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Kléber 88-70.)

## PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol (*faible dose*), eucalyptol, terpinol, acide borique et borate de soude.

**INDICATIONS.** — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*  
— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

*Affections respiratoires.* — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

*Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice* en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

**MODE D'EMPLOI.** — Poudre : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche. Contenance du flacon 100 grs.

**Pastilles.** — 8 à 10 par jour. Boîte de 40 pastilles.

Prix : Poudre : 17 fr. 50 — Pastilles 6 fr. 70.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-4.

Laboratoire JUIIN-GUIRAUD

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

(Tél. : Carnot 94-28.)

## PULVI-LACTÉOL

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés ; 176 670 000 000 pour 100 grammes.

**Propriétés.** — *Favorisant de la cicatrisation.* Dès les premiers pansements, les plaies se détergent, sont désinfectées et bourgeonnent activement.

**Indications.** — *Enfants, adultes.*

En obstétrique et en gynécologie : Plaies vagino-péri-néales infectées, Ulcérations du col, Catarrhes vulvo-vaginaux, Suppurations mammaires.

En chirurgie : Plaies suppurées et sphacélées, Plaies atones, Ulcères.

**Présentation.** — Poudre.

**Mode d'emploi.** — Le *Pulvi-Lactéol* s'emploie : soit sous forme de poudre en saupoudrant largement la plaie ; soit sous forme de bouillie lactéolée, obtenue en délayant le produit dans un peu d'eau bouillie refroidie.

Suivant les cas, badigeonner, ou instiller, ou faire pansement avec gaze imbibée.

Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## PULVO-COC CYL

1162 F

Poudre de NÉO-COC CYL-para-amino-phényl-sulfamide.  
Sulfamidothérapie locale.

**Présentation.** — Flacons poudreurs de 10 gr. et 100 gr. Coffret lance-poudre-doseur breveté, modèle chirurgie et gynécologie. Modèle O. R. L.

**Indications.** — Pansements chirurgicaux et stomatologiques, Traitements gynécologiques, Plaies infectées, variqueuses, atones, Mastoidites, Infections rhino-pharyngées, Dermatoses, Impétigos, Chancres mou, Prurit anal et génital, Erythèmes fessiers des nourrissons, Intertrigos infectés.

**Posologie.** — Pulvérisations, 1 à 20 gr. en chirurgie et gynécologie.

**Mode d'emploi.** — Par pulvérisation directe ou sur pellicule de glycérolé d'amidon. Le traitement a souvent avantage à être associé à un traitement buccal au NÉO-COC CYL.

Prix : flacon 10 gr., 23 fr. 50 ; flacon 100 gr., 150 fr.

Admis à l'Assistance Publique et à l'Assistance Médicale Gratuite.

Laboratoires du Docteur PILLET

G. HOÛET, Pharmacien

222, boulevard Pereire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 40-15.)

Adr. télégr. : Houépilllet-Paris. — Serv. garde : MOL. 58-85.



## PULVO-PROBIAMIDE

le PULVO-PROBIAMIDE met en application les propriétés bactéricides du para-amino-phényl-sulfamide *in vitro*. Employé pour désinfection, désodorisation, cicatrisation.

**Formule.** — Para-amino-phényl-sulfamide porphyrisé. 10 gr. Présenté en flacon pulvérisateur.

**Indications thérapeutiques.** — *Dermatologie*: Brûlures et plaies infectées, Gangrène cutanée.

*Vénérologie*: Chancres mou, Vaginite, Balanite, Herpès génital. *Oto-rhino-laryngologie*: Rhinite, Coryza, Otites.

*Stomatologie*: Stomatites, Abscès dentaires, Pyorée alvéolaire, et pour prévenir toutes complications après avulsion dentaire.

**Mode d'emploi.** — Pulvériser 1 à 3 fois par jour la région malade. On peut également en imprégner une mèche.

Prix de la boîte : 27 fr. 70.

Inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 900-58.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## PURARGOL

**Composition.** — Solution stérilisée et titrée d'Argent colloïdal chimiquement pur à 5 p. 100.

**Présentation.** — Ampoule compte-gouttes scellée, très pratique à l'emploi.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique puissant dénué de toute causticité et toxicité. Action surtout catalytique s'opposant au développement des bactéries.

**Indications.** — Antisepsie préventive et curative dans les maladies infectieuses (grippe, scarlatine, etc.) ; en Rhino-Laryngologie (coryzas, sinusites, rhinites, angines, laryngites) ; en Otologie (otites, abcès, écoulements) ; en Oculistique (inflammations et infections oculaires, conjonctivites, blépharites, etc.).

**Mode d'emploi.** — *Rhinologie*: IV à V gouttes dans chaque narine une ou plusieurs fois par jour.

*Otologie*: quelques gouttes dans l'oreille malade deux ou trois fois par jour.

*Oculistique*: introduire deux fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

*Ostologie*: introduire I ou II gouttes dans chacun des yeux du nouveau-né, sitôt sa première toilette faite.

Durée de traitement : 15 à 25 jours.

Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).

## PURGANOL DAGUIN

(C<sup>20</sup>H<sup>14</sup>O<sup>4</sup>)

**Forme.** — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage. Laxatif préféré des nourrices.

Le flacon contient 20 pastilles, soit 40 doses laxatives. Prix: 10 fr. 60. Lab<sup>le</sup> d'essai: 4 fr. 35.

*Échantillons sur demande aux :*

### Laboratoires DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine). (Tél.: Gravelle 32-17.)

## PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyrogène.

**Composition.** — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pommade ni un pansement gélosé. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyrogène (*staphylocoques, streptocoques, b. coli, entérocoques, b. pyocyaniques*).

**Avantages.** — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

**Indications.** — Abscès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Sycois, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

**Mode d'emploi.** — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

En tubes de 70 grammes.

Laboratoires des *Ampho-Vaccins Ronchèse*.

A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III<sup>e</sup>). — Tél.: Tur. 72-34.

## PYOCOLINE

**Acidifiant, Antiseptique urinaire  
Diurétique.**

**Composition.** — Chlorure d'Ammonium, Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine, Terpène.

**Indications.** — Colibacilloses, Cystites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Lithiases (oxaluriques et phosphaturiques), Cystites des prostatiques.

**Forme. Mode d'emploi.** — Comprimés glutinisés, 6 à 10 par jour au milieu des repas.

Prix : 21 fr. 60.

**Laboratoires R. SAVOIRE**

**Docteur en Pharmacie**

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

VENDOME (Loir-et-Cher).

(Tél. : 26.)

## PYODARSÉNOL « INAVA »

**Fuso-Strepto-Vaccin Pyodyl « B »**

associé au Sulfarsénol.

**BACTÉRICIDE — SCLÉROSANT —**

**ANTISPIRILLAIRE.**

*Deux formes :*

**Pâte dentaire bleue immunisante** pour l'hygiène quotidienne (Voir à *Inava*).

**Pyodarsénol gelée** pour massage gingival.

Enregistré L. N. C. M. : n°s 760-12 et 13.

**Laboratoires INAVA**

ASNIÈRES (Seine).

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS, 23, rue des Moines.

## PYODOLYSINE

**Dentifrice antipyorrhéique**

Méthode de désensibilisation des muqueuses buccale et gingivale par l'hyposulfite de sodium.

Action topique et antiseptique (phénol camphré, iode, thymol).  
Action hémostatique, tonique et astringente (acide gallotanique).

**Formes :** 1° *Pâte Gingivale en tube.*

2° *Solution Topique.*

**Mode d'emploi.** — 1°. — A) Brossage biquotidien des dents et des gencives avec une brosse dure ou demi-dure recouverte d'un ruban de pâte.

B) Rinçage de la bouche avec un verre d'eau bouillie auquel on aura ajouté de 30 gouttes à une demi-cuillerée à café de Solution Topique.  
2°. — Attouchements des gencives 2 à 3 fois par semaine avec la Solution Topique pure.

**Particularités.** — Pâte dentifrice colloïdale. Grâce à un excipient spécial, la pâte PYODOLYSINE constitue un Gel maintenant ses principes actifs dans un état moléculaire parfaitement dispersé, ce qui leur assure un meilleur contact avec les muqueuses.

**Indications.** — Pyorrhée alvéolaire, Stomatites mercurielles, Gingivites, aphtes ; Gencives sanguinolentes, tuméfiées ou douloureuses ; Dents déchaussées.

Employé comme Dentifrice courant, assure une parfaite hygiène dentaire.

Prix au public : Pâte : 14 fr. 40. — Topique : 24 fr. 40.

Durée du tube de pâte : environ trois mois.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N°s 1569-2 et 1569-3.

**Laboratoire de la PYODOLYSINE — F. MARTIN, Pharmacien**  
2, rue des Trois-Mages, MARSEILLE. — (Tél. Lycée 60-31.)

## PYODYL INAVA « B »

*Fuso-Strepto-Vaccin injectable.*

**Vaccination préventive spécifique des Infections  
générales d'origine dentaire.**

Moyen prophylactique et thérapeutique applicable :

1° *Aux manifestations locales de l'infection dentaire* (pyorrhée, gingivites, abcès, phlegmons) ;

2° *Aux complications de voisinage* (angine de Ludwig, angine de Vincent, sinusites) ;

3° *Aux complications à distance* (infections broncho-pulmonaires, rhumatismes infectieux, néphrites, endocardites, septicémie, etc.).

**Injections intra-musculaires** de 1/8 de cc. à 1 cc. espacées de 1 à plusieurs jours, suivant l'acuité de l'infection et le degré de sensibilisation du malade.

Boîte de 10 ampoules de 1 cc. : 63 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 760-4.

**Laboratoires INAVA**

ASNIÈRES (Seine).

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS, 23, rue des Moines.

## PYOFORMINE

**Composition.** — Suspension de globules blancs dans une solution physiologique de ferments leucocytaires et d'Uroformine.

**Propriétés.** — Médication biologique pour la prévention et le traitement des états infectieux.

Utilisée précocement, elle fait souvent avorter l'infection.

Associée aux traitements chimiothérapeutiques, elle en renforce l'efficacité.

**Indications.** — Angines, Complications grippales, Infections pleuro-pulmonaires, États puerpéraux, Septicémie, Suppurations, Encéphalites.

**Présentation.** — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

**Posologie.** — 2 à 3 ampoules par jour, en injections intramusculaires ou intraveineuses en cas d'urgence.

*Enfants:* demi-dose.

La PYOFORMINE ne détermine aucune réaction locale ni générale.

Prix au public : La boîte de 4 ampoules : 26 fr. 80.

**Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

Laboratoires Gobey.

S. A. au capital de 880 000 francs. — R. C. Seine 223.195 B.  
(Tél. : Littré 58-43.)

## PYOGÉNOL INAVA

**Pommade. Vaccin antipyogène.**

**Composition et propriétés.** — Vaccination locale antipyogène polyvalente.

Les toxines neutralisées, les filtrats polymicrobiens et le Bactériophage donnent à ce produit un pouvoir immunisant considérable par la diffusion immédiate d'antigènes solubilisés.

**Indications.** — Furoncles, Orgelets, Anthrax, toutes Plaies infectées, Gerçures, Crevasses, Brûlures.

**Mode d'emploi.** — En massage, au pourtour des foyers d'infection, ou à distance, 2 fois par jour, sur la peau saine. Imprégnation de compresses sur la lésion.

Prix : 18 fr. 30 le tube grand modèle.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 760-10.

**Laboratoires INAVA**

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS : 23, rue des Moines.

## PYOREX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-40.

**Forme.** — Pâte dentifrice.

**Composition.** — Arsolithol Bailly (sel de Lithium de l'acide acétylaminoparaoxyphénylarsinique), Lactate d'éthoxydiaminoacridine et Ricinoléate sodique insipide adsorbés par le kaolin colloïdal.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Pâte gingivale antispirillaire, antimicrobienne, antitoxinique polyvalente à pouvoir microbicide extrêmement élevé, parce que ses éléments ont leurs propriétés antiseptiques dirigées sur des groupes d'espèces pathogènes d'origine et de spécificité différentes. Modifie le milieu buccal et le rend impropre à la vie microbienne.

**Indications.** — Gingivites, stomatites, adjuvant au traitement chirurgical de la pyorrhée alvéolaire, préventif des associations fusospirillaires. Hygiène quotidienne de la bouche.

**Mode d'emploi.** — En massages gingivaux dans les gingivites, comme pâte dentifrice dans les caries et les affections dentaires et l'hygiène buccale biquotidienne.

Le tube : 13 fr. 40.

**Laboratoires A. BAILLY**

(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30.)

## PYO-VACLYDUN

**Lysat-vaccin du Docteur Duchon.**

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

**Composition.** — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

**Indications.** — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adéno-phlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson ; pemphigus, etc...

**Posologie.** — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc., les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les 2 jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. Prix : 31 fr. 60.

## PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

**Vaccination locale ampoules de 5 cc.**

**Mode d'emploi.** — Imbibé de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités, introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 5 cc. Prix : 22 fr. 30

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.)

## PYRALLIUM

**Composition.** — Pyrophosphate diacide de calcium colloïdal : 0 gr. 20 par dragée ; Sel phosphorique de calcium entièrement assimilable en raison de son état physico-chimique et de la valeur optimum du rapport du calcium au phosphore.

**Indications.** — Toutes les carences calciques : en particulier l'insuffisance en calcium de la ration alimentaire ; rachitisme ; décalcification ; caries dentaires ; fatigue générale ; femmes enceintes ; nourrices.

**Posologie.** — 4 à 8 dragées par jour à un moment quelconque de la journée, sans les croquer.

Prix, la boîte de 50 dragées : 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 80-7.

### Laboratoires S. COUDER

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. Suffren 02-64.)

Agence Z. N. O. : 2, place Croix-Paquet — LYON

(Tél. : B. 09-83.)

## PYRÉLAÏNE COLLAS

**Composition.** — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 06 de soufre organique combiné non oxydé doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

**Propriétés.** — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre *per os*, la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

**Indications.** — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfarées*. Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, *Cholécystite*, *Rhumatismes chroniques*, *Goutte*, *Dermopathies*, *Parasites intestinaux*.

Pas de contre-indications.

**Forme et posologie.** — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 015 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crisis aiguës : 4 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

En tube de 50 capsules.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-3.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C<sup>ie</sup>, pharmaciens

LONGJumeau (Seine-et-Oise). — (Tél. : 96.)

## PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

**Composition.** — Diméthylaminopyrazoline phénazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

**Emploi et doses.** — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée) 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

**Gouttes.** — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

*Enfants* : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

**Ampoules A.** — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

**Ampoules B.** — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

**Indications.** — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (XXV-L à répéter), chercher la dose-levier ; Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos-Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espace) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

*Gouttes* : (25 cc.) 25 fr. 20.

*Ampoules* { A (2 cc. × 10) } 22 francs.  
                  { B (5 cc. × 6) }

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**  
61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires OAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(Tél. : Gobelins 00-70.)

## PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo- $\alpha$ ' $\alpha$ -diamino-pyridine.)

Corps chimique nouveau. Antiseptique génito-urinaire réellement actif, il agit dans la profondeur des muqueuses et s'élimine en partie par les glandes des voies génito-urinaires.

**Indications.** — Pyérites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Colibacilloses.

1° *Dragées par voie buccale.* Le flacon de 20 dragées 22 fr. 60, 3 à 6 par jour.

2° *En ampoules pour injections intraveineuses.* Traitement d'attaque des affections génito-urinaires graves par la stimulation du système réticulo-endothélial. La boîte de 10 ampoules : 17 fr. 50, 1 à 4 par 24 heures.

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## PYROCUROL

Traitement des brûlures.

**Formes :** Solution et pommade au Tanin.

D'une efficacité remarquable par ses qualités antiseptiques et cicatrisantes, le Pyrocurool possède également de puissantes propriétés anesthésiques dues à l'adjonction d'un produit de la série des éthers de l'acide parainino-benzonique qui en font un excellent remède dans le traitement des infections et lésions cutanées.

**SOLUTION :** recommandée spécialement dans le traitement des grandes brûlures.

Grâce à son procédé de tannage par pulvérisation, la solution Pyrocurool réalise l'application la plus rationnelle et la plus efficace, permettant d'obtenir une guérison rapide en atténuant ou supprimant la douleur et en favorisant la reconstitution des tissus sains.

**Mode d'emploi :** Ouvrir les phytènes et faire l'ablation des tissus mortifiés, puis pulvériser le Pyrocurool une ou deux fois par jour ; bien laisser sécher et recouvrir ou non d'une gaze aseptique.

La solution Pyrocurool est également indiquée dans les cas tels que : escarres, fissures anales, radio-dermites, etc., où l'application par pulvérisation présente des facilités ou des avantages.

Pulvérisateur spécial.

**POMMADE** en tube : non toxique, demi-grasse, très pénétrante : brûlures, engelures, gerçures, plaies diverses, hémorroïdes, ulcères, eczémas, impétigos, prurits, psoriasis, etc.

**Mode d'emploi :** Étendre une couche de pommade sur la partie malade et recouvrir d'une gaze aseptique.

**LABORATOIRES NOLLET**

47, rue Nollet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PYROLÉOL EDET

**Composition.** — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

**Propriétés.** — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

**Indications.** — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermes, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

**Présentation.** — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

**Mode d'emploi.** — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

**Résultats.** — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées, lisses, souples, non adhérentes.

**Pharmacie Centrale de France**

379, av. Président-Wilson, La Plaine-St-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 16-70.)

## PYROSELLINE

Diurétique exclusivement végétal.

Médication Phytothérapique.

**Composition.** — Extraits totaux de *Combretum*, *Chimaphylla*, *Piloselle*.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Infections aiguës et chroniques des voies urinaires (Cystite, Urétrite, Blennorrhagie), Maladies infectieuses aiguës (Septicémies, Grippe, Colibacilloses).

Maladies chroniques : Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Lithiases. Rétention hydrique.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 comprimés au petit déjeuner et 2 au repas de midi.

Les doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Prix : 21 fr. 05.

**Laboratoires CHAPOTOT**

AUBRIOT, Pharmacien

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Mon. 28-90 et 30-65.)

R. C. 231-917 B.

## PYUROL

**Composition.** — C'est une combinaison de l'urotropine avec :

1° Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;

2° Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

**Indications.** — Action antiseptique sur l'appareil urinaire action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse Antiseptique le plus puissant et le moins toxique contre le colibacille.

**Forme et mode d'emploi.** — Granulé soluble.

*Adultes* : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane. prises :

La première à jeun.

La seconde une heure avant le déjeuner.

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures.

*Enfants* : ces doses sont diminuées de moitié.

Dose pour 7 jours. Prix : 18 fr. 75.

**Laboratoire A. LE BLOND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.  
15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).  
(Tél. : Longchamp 07-36.)

## QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

**Indications.** — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

**Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.**

**VIN** : Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 31 fr. 30.

**DRAGÉES** : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes* : 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants* : 1/2 dose. — Prix : 14 fr. 70.

**GRANULÉ** : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes* : 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants* : 1/2 dose. Prix : 14 fr. 70.

**Les Établissements O. DAVID-RABOT**

O. DAVID et ses Fils, pharmaciens  
49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-46.)

## QUINA BARON

Extrait sec et complet de Quinquina frais en solution aqueuse *sans alcool* et *sans sucre*. 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 50 d'extrait sec de quinquina (titrant 18-20 p. 100 d'alcaloïdes).

### Forme :

Solution ; flacon de 310 cc. = 10 jours de traitement.

### Action physiologique :

Reconstituant énergétique, amer, fébrifuge.

### Indications :

1° *Etats dépressifs et asthéniques*. Se prescrit en particulier après les grippez, aux convalescents, opérés, tuberculeux, vieillards, femmes enceintes, accouchées, etc.

2° *Tonique de choix* lorsque l'alcool est contre-indiqué. Régime des albuminuriques, diabétiques, hépatiques, hypertendus, nerveux, etc.

3° *Etats fiévreux, paludisme*. Forme très assimilable de la quinine.

### Dose et mode d'emploi :

1° *Adultes* : 1 cuillerée à soupe avant les 2 repas, pur ou dans de l'eau sucrée.

2° *Enfants* : 1 cuillerée à dessert.

L. N. C. N° 1905-1.

Prix : 21 fr. 10.

Laboratoire du **QUINA BARON**,  
fondé en 1870.

**R. CAILLE**, docteur en pharmacie,

3, place de la Miséricorde — LYON.

(Tél. B. 14-03.)

## QUINACRINE (ATÉBRINE)

### Noms déposés.

Dichlorhydrate de la chloro 2-diéthylamino-pentylamino 5-méthoxy-7-acridine. — Vente limitée à la France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français. — Médication antipaludique essentiellement schizonticide, créant dans l'organisme un état réfractaire contre l'hématozoaire. Tolérance parfaite.

**Indications.** — Toutes les formes du paludisme. Traitements curatifs et préventifs.

**Présentations.** — *Comprimés* dosés à 0 g. 10 de Quinacrine. Tubes de 15 et 30 comprimés.

*Chocolatés* de tannate de quinacrine (pour très jeunes enfants) (Boîtes de 12). Un chocolaté correspond à un comprimé.

*Ampoules* de Quinacrine pour préparation extemporanée de solutions injectables. Boîtes de 5 ampoules à 0 g. 10 et boîtes de 5 ampoules à 0 g. 30 (avec même nombre d'ampoules bidistillées).

### Dose habituelle.

*Adultes* : 3 comprimés par jour.

*Enfants* : jusqu'à 1 an : 1/2 comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé 1/2 ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés 1/2.

Absorber toujours le médicament pendant les repas avec une alimentation très riche en *glucéulents*.

Société Parisienne d'Expansion Chimique « **SPECIA** »

Marques **Poulenc Frères** et **Usines du Rhône**,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>). — (Tél. : Balzac 22-94.)

## QUINDYNOL BIOPHILE

**Composition.** — Réaction complexe de l'extrait de quinquina sur le blé en germination. Contient la *totalité* des principes vitalisants, grande richesse en phosphore organique.

**Propriétés.** — Biodynamique puissant, Fébrifuge, anti-infectieux, Microbicide par stimulation de la phagocytose, Régénérateur nerveux, Tonique cérébral et musculaire, Euphorique, Revitalisant.

**Indications.** — Tous états infectieux et dépressions nerveuses, surmenage, Asthénie, Inquiétude, Paludisme, l'action euphorique est très nette et durable.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à café par jour dans eau ou vin. Dans états infectieux, 1 cuillerée toutes les 2 ou 3 heures.

### Laboratoire GMET

**A. LOROT**, Pharmacien

1, avenue du Lycée-Lakanal — BOURG-LA-REINE (Seine).

(Tél. : Robinson 15-67.)

(Voir GMET.)

## QUINICARDINE

Sulfate de Quinidine pur.

**Forme.** — Comprimés à 0 gr. 20.

**Indications.** — Arythmie complète par fibrillation auriculaire. Arythmie extrasystolique. Tachycardie paroxystique de Bouveret. Flutter auriculaire. Névroses tachycardiques (Basedow).

**Dose maximum.** — 6 comprimés par 24 heures (se reporter à notre littérature).

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 31-21, 3 lignes.)

## QUINIMAX

*Alcaloïdes totaux extraits du Quinquina.*

**Composition.** — Sel complexe obtenu par combinaison des alcaloïdes totaux du quinquina avec un dérivé phénolique activant. (Communication à l'Académie des Sciences, 18 septembre 1936).

**Propriétés.** — Antithermique, antipaludique et reconstituant agissant à faibles doses. Ne provoque aucun des inconvénients de la quinine, ni bourdonnements d'oreille, ni brûlures d'estomac, ni vertiges, ni inflammation locale.

**Indications thérapeutiques.** — Paludisme, Asthénie et Cachexie palustre. Etats fébriles, gripes et toutes indications habituelles de la quinine.

### Formes :

Comprimés à 0 gr. 10.	La boîte de 20.	Prix au public.	15 fr.
—	— 40.	—	28 fr.
Ampoules. de 1 cc à 0 gr. 10.	La boîte de 10.	Prix au public.	20 fr.
—	2 cc à 0 gr. 20	— 10.	25 fr.
—	4 cc à 0 gr. 40	— 10.	32 fr.
Suppositoires Enfants 0 gr. 05.	La boîte de 10.	Prix au public.	20 fr.
— Adultes 0 gr. 15	— 10.	—	26 fr.
Granulé chocolaté pour enfants	.....	28 fr.	

**Posologie.** — Même mode de prescription que la quinine, mais à doses 2 fois moindres.

**Laboratoires DEROL**

34, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## QUININE-CALCIUM-SANDOZ

voir

## CALGLUQUINE

## PRODUITS SANDOZ

**B. JOYEUX, Dr en Pharmacie.**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## QUININE PELLETIER

Marque des Trois Cachets.

**Composition et présentation.** — La Quinine des Trois Cachets se présente sous forme de perles renfermant le sel en nature, légèrement comprimé, sans addition de gomme, sucre, amidon ou poudres inertes. La Quinine Pelletier existe à l'état de sulfate, chlorhydrate, valériante, bromhydrate.

Les perles sont dosées uniformément à 10 egr. et sont présentées en tubes de 10, 20, 50 et 100 unités.

**Indications.** — Spécifique classique du paludisme sous toutes ses formes et à tous ses stades. Pyrexies, en général comme antithermique. Névralgies, migraines. Asthénies et convalescences, comme tonique eupéptique. Stimulation des contractions utérines (l'accoucheur étant seul juge de l'opportunité de la médication et des doses).

**Posologie.** — Variable suivant les indications.

Chaque perle porte, imprimé en noir, le nom de PELLETIER

**Laboratoires GRIMAULT**

Fondés en 1856

51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Bal. 20-70.)



## QUININO-PHYTINE

Inosito-hexaphosphate de quinine.

CIBA

58 p. 100 de Quinine — 9 p. 100 de Phosphore.

Phosphate organique de quinine, très soluble, d'une parfaite tolérance, unissant à l'action spécifique de la quinine l'action tonique et reconstituante du phosphore végétal.

**Indications.** — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

**Doses.** — Même posologie que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine (comprimés à 0 gr. 10).

**Formuler.** — Tube de 20 comprimés.

Flacon de 50 comprimés.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## QUINIO-STOVARSOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-  
l-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

**Indications.** — Paludisme viscéral : hépatite, splénomégalie, anémie et cachexie palustres.

Traitement eutrophique complémentaire des divers traitements antipaludiques. Quinacrine (Atebrine), Rodoprequine — noms déposés. La Quinacrine et la Praquine ne sont vendues qu'en France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français.

**Présentation.** — Tubes de 20 comprimés à 0 g. 25.

**Prix.** — 20 fr. 50.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 comprimés par jour.

*Enfants* : jusqu'à 1 an : 1 demi-comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé et demi ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés et demi.

Société Parisienne d'Expansion Chimique,

« SPECIA »

Marquès Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## QUINO-C

**Formule :** Dragées.

Chinin. hydrochloridum.....	100 mgr.
Ac. acétysalicylic.....	250 mgr.
Ephedrine hydrochl.....	10 mgr.
Ac. ascorbic.....	12 mgr. 5
Amyl.	

Talc, Q. S. pro tabl. compr. una, lacca, accacia gumm., talco, amylo et Saccharo obducta.

**Indications.** — *GRIPPE* et en général, les conséquences infectieuses des refroidissements ; il est même indiqué pour enrayer ces affections à leur début. Comme médication contre le choc humoral, en particulier l'asthme et le rhume des foies, le QUINO-C est nettement indiqué au début des crises.

**Doses (à répéter).** — *Adolescents* : 2 à 4 dragées par jour. —

*Adultes* : 4 à 6 dragées par jour.

Les dragées seront prises de préférence au début du repas avec un peu d'eau. Si le malade est à la diète, il prendra, avec de la tisane chaude, les dragées réparties en 3 ou 4 prises entre 8 ou 9 heures du matin et 9 heures du soir, les doses les plus fortes étant réservées pour la fin de l'après-midi et le soir.

S'il s'agit de prévenir ou d'enrayer une crise d'asthme ou de rhume des foies, le malade prendra 2 dragées à 1/2 heure ou 1 heure d'intervalle dès les premières manifestations. Répéter au besoin cette dose dans le cours de la journée.

**Pharmacie centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## QUINOCARBINE CHARPENTIER

### BISMUTHATE D'ORTHOXYQUINOLÉINE

Charbon végétal suractivé.

**Indications.** — Dyspepsie, Aérophagie, Aérocolie, Entérite, Colites, Dysenteries, Oxyures, Ascarides. *Intoxications alimentaires.*

Deux formes : Granulés, Cachets.

Prix : 21 fr. 10.

**Posologie.** — *Estomac* : 1 à 3 cachets ou cuillerées à café de granulés après les principaux repas.

*Intestins* : 1 à 3 cachets ou cuillerées à café de granulés le matin à jeun et avant les principaux repas.

*Intoxications alimentaires et dysenteries* : Dose massive : 5 à 6 cachets ou cuillerées à café de granulés en une seule fois, au moment de la crise. Même dose toutes les 2 heures jusqu'à disparition complète des symptômes.

*Oxyures* : *uniquement chez les enfants* : 1 à 3 cuillerées à café de granulés, suivant l'âge, le matin à jeun, pendant 3 périodes de 7 jours, espacées chacune de 7 jours de repos.

Aucune toxicité.

Bismuthate d'orthoxyquinoléine... 0 gr. 50  
Charbon suractivé végétal..... 1 gr.  
Excipient.. Q. S. pour 1 cuillerée à café.

### Laboratoire E. CHARPENTIER

7, rue du Bois-de-Boulogne

PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Passy 55-46.)

## QUINOFORME LACROIX

**Composition.** — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1926).

**Avantages.** — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres. Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

**Indications.** — Paludisme, Fièvres malignes, Fièvres intermittentes.

*Ampoules* : 6 et 12 amp. de 0,25, 0,50 1 gr.

*Cachets* : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

*Comprimés* : 10 et 20 compr. de 0,10 à 0,50.

### Laboratoires H. LACROIX

V. MEROBIAN et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 54-57.)

## QUINOÏDINE DURIEZ

Dérivé du quinquina exempt des intolérances de la quinine, supérieur à elle dans les états chroniques. (Communications à l'Académie de médecine de Paris, etc..., littérature sur demande.)

0 gr. 10 principe actif par dragée.

**Indications.** — Grippe, paludisme et leurs séquelles : névralgies grippales ou palustres. Prophylaxie et traitement.

Tonique général : convalescence des maladies infectieuses : diphtérie, pneumonie, typhoïde, etc.

Petites défaillances, nervosité ou irrégularité du cœur, avec ou sans lésion.

**Posologie.** — Comme tonique et préventif, contre les séquelles de grippe ou de paludisme ou en thérapeutique du cœur : selon l'âge et la sensibilité du sujet : 1 à 2 dragées par jour, au début des repas.

Comme fébrifuge et antinévralgique (états aigus) : 2 à 6 dragées par jour, à intervalles égaux, pendant une ou plusieurs semaines, à doses décroissantes.

Prix : le tube : 17 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-1.

DURIEZ — 20, place des Vosges — PARIS.

## QUINOLAX

**Composition.** — A base de cinnamate et sulfate de Quinine; Phénacétine, Aloïne, Podophyllin, Guaranine; Essence de Cannelle de Ceylan.

**Forme :** Comprimés.

**Propriétés.** — Anti-infectieux, anti-thermique, analgésique, laxatif stomachique et cholagogue, tonocardiaque, diurétique et myosthénique, tonique général.

**Indications.** — *Infections :* Grippe, coryza, fièvres infectieuses (préventif et curatif); *Étais douloureux :* céphalées, névralgies, sciatique, lumbagos, rhumatismes, migraines. *Paludisme. Affections hépatiques.*

**Posologie.** — Avaler avec un peu d'eau 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

**Prix :** la boîte de 24 comprimés : 14 fr. 10 (4 à 8 jours).

### Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

## QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée  
en tablettes glutinisées.

### ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

**Calmant immédiat de la Douleur** par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

**Antithermique** par la Quinine.

**Diurétique et Uricolytique** par le Sel de Lithine et la Quinine.

**Spécifique antirhumatismal** par l'ion salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

**Indications.** — Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

**Posologie.** — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures.

*de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.*

*Cas chroniques :* Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

*Enfants :* de 1 à 3 par 24 heures.

**Prix de la boîte :** 17 francs.

### Laboratoire du QUINSAL

R. DIDILLON, Pharmacien

Diplômé de Microbiologie.

GRAY (Haute-Saône) — (Téléphone : 126.)

Échantillon et littérature sur demande.

## QUINTHÉRYL

**Composition.** — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

**Applications.** — *Traitement curatif de la coqueluche, correctif* de toutes les toux quinteuses émettantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

### Présentation :

1° Ampoules de 1 cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

**Posologie.** — Une injection *intramusculaire* (pratiquement indolore), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

**Prix :** Série A : 17 fr. 60.

— Série B : 21 fr. 10.

DÉPOT GÉNÉRAL,  
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS:

R. LÉONARDON, successeur

Pharmacien,

28, place Gaston-Pailhoux, Tours (Indre-et-Loire).

## QUINTI-SUPPOS

**Composition.** — Phényl-éthyl-barbiturate de codéthyline, éphédrine, phényl-éthyl-malonylurée, serpolet.

**Présentation.** — Boîtes de 10 suppositoires en étuis.

*Trois dosages :* Bébés jusqu'à 18 mois, enfants et adultes.

**Propriétés.** — Sédatif de la toux, d'administration facile, surtout chez les enfants et les malades à intolérance gastrique. Supprime les vomissements des coquelucheux.

**Indications.** — *Toutes les toux quinteuses :* Coqueluche, Rougeole, Toux ganglionnaire et rhinopharyngée des enfants. Laryngite, Trachéite, Bronchite aiguë ou chronique, Toux rebelle des fumeurs, Toux émettante des tuberculeux.

### Posologie et prix :

**Quinti-Suppos B.** Prix : 19 fr. 70.

*A partir de 5 mois :* un suppositoire le soir.

*Après 8 mois :* un matin et soir si nécessaire.

**Quinti-Suppos E.** Prix : 19 fr. 70.

*Enfants de plus de 18 mois. Jusqu'à 4 ans :* un suppositoire le soir.

*Au-dessus :* un suppositoire matin et soir.

**Quinti-Suppos A.** Prix : 22 francs.

*Adolescents et adultes. A partir de 15 ans :* un suppositoire le soir.

*Adultes :* un suppositoire matin et soir.

Laboratoires M. PINGUET

38, rue de la République. — MONTLUÇON (Allier).

## QUINTOCOQ

(Gouttes)

Médication spécifique de la Coqueluche et des états anaphylactiques (urticaire, réactions sériques, vomissements de la grossesse). Reconstituant puissant.

### Composition :

Trois médicaments essentiellement antispasmodiques, antitoxiques, sympathicotoniques, reconstituants :

Adréraline (sol. 1 p. 1 000)...	C gouttes.
Chlorure de calcium.....	20 gr.
Chlorure de magnésium .....	2 gr.
Excipient.....	Q. S. P. 60 cc.

### Posologie :

**1<sup>re</sup> année :** I goutte par mois d'âge, 3 fois par jour. *De 1 à 3 ans :* XII à XX gouttes, 3 fois par jour ; *de 3 à 7 ans :* XX à XL gouttes, 3 fois par jour ; *de 7 à 13 ans :* XL à L gouttes, 3 fois par jour ; *de 13 à 20 ans :* L à LXXX gouttes, 3 fois par jour. **Adultes :** C gouttes ou 1 cuillerée à café, 3 fois par jour.

### Observations :

- Une antisepsie rigoureuse du tube digestif est indispensable avec purgation bihebdomadaire ;
- Régime des hépatiques.

Prix : 18 fr. 80.

### Laboratoire du QUINTOCOQ

32, b. J.-Jaurès - BOULOGNE-s/SEINE. (Tél. : Mol. 06-87.)

## QUINTOSÉDYL

Gouttes sédatives et expectorantes.

**Composition.** — Ipéca, Belladone, Drosera, Polygala, Sambucus, Antimonium tartaricum : aa solution à 1 p. 1 000.

**Propriétés et avantages.** — Sédatif absolument atoxique, ne paralysant pas le réflexe de défense. Aucune accoutumance.

**Indications.** — Toutes les toux, nerveuses ou bronchiques. Son innocuité absolue permet de l'utiliser également en médecine infantile.

**Présentation.** — Flacon de 24 cc.

### Posologie :

**Adultes :** X gouttes, 3 à 4 fois par jour, loin des repas.  
**Enfants de 2 à 10 ans :** V gouttes, 3 à 4 fois par jour.  
**Nourrissons :** III à IV gouttes, 3 à 4 fois par jour.

### Laboratoires du

### COMPTOIR GÉNÉRAL PHARMACEUTIQUE

J. MAUNAND, Docteur en pharmacie,  
 146, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Archives 15-85.)

## QUINTOZONE

(Inhalant-Révlusif)

Médication naturelle et externe des maladies de l'appareil respiratoire.

**Formule.** — Essences balsamiques ozonisées (Pin, Eucalyptus, Lavande, Serpolet... etc.), 13 + Benzoate de benzyle, 1 + Iodure d'éthyle, 0,5 + Acétate d'éthyle, 0,2 + Excipient, 85,3.

### Indications et mode d'emploi :

Coqueluche, bronchite, broncho-pneumonie, badigeonnages et frictions sur le thorax. Compresses.

Asthme, Rhume des foies, Coryza : Inhalations fréquentes sur un mouchoir.

Laryngites, trachéites, Angine : Inhalations.

Assainissement des chambres des malades : Vaporisation, Evaporation.

**Propriétés.** — **Avantages.** — Odeur agréable, analgésique, antispasmodique, anticongestif.

Le QUINTOZONE agit par évaporation et endosmose.

**Présentation.** — Flacon stilligoutte pour usage externe.

Prix : 14 francs.

Enregistré au L. C. M. n° 1170-3.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

25, bd Edgar-Quinet, COLOMBES — (Tél. : Cha. 27-88.)

## QUINURYL

Cachets :

Acide quinique .....	0,25
Poudre de scille.....	0,02
Nitrate de K.....	0,05
Poudre Myrtilles (feuilles) .....	0,25 par cachet.

Comprimés :

Acide quinique.....	0,125
Extrait aqueux sec d'Orthosiphon Stamineux .....	0,15
Poudre Myrtilles (feuilles) .....	0,05 par comprimé.

Indications :

Antitürkique, Spécifique de l'Azotémie, Adjuvant du régime hypoazoté. L'Orthosiphon Stamineux est un diurétique hépato-rénal, agissant sur l'élimination de l'urée et des chlorures.

(Comm. Soc. de Thérapeutique, Janv. 1936.)

Symptômes de la petite Azotémie : vertiges, céphalées, éblouissements, bourdonnements d'oreilles.

Arthritisme, Oligurie.

Cachets (Quinuryl), Comprimés (Quinuryl-Ortho).

Mode d'emploi :

2 à 4 cachets ou 4 à 8 comprimés par jour.

La boîte : 21 fr. 70 (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## RADIO-BARYX

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Aliment opaque en poudre, contenant 60 % de sulfate de baryum chimiquement pur.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-1.

**Avantages.** — Facile à diluer. Agréable au goût. Ne provoque aucun spasme réflexe. Expulsion facilitée par l'addition d'une petite quantité de mucilage. Conservation parfaite.

### Posologie :

Estomac..... 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 fois.  
Région cæco-appendiculaire ..... 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit... 400 gr. dans 500 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

**Présentation.** — Boîte de 200 gr. Prix : 19 fr.

Conditionnement spécial réservé au Corps médical et aux Hôpitaux : 4 kg., 8 kg., 18 kg. et 50 kg.

### Laboratoires G.-L. BLIN

Pharmacien-Chimiste de la Faculté de Paris

12, rue Alphonse-Braut — CHOISY-LE-ROI (Seine)

(Tél. : Bel. 06-25.) R. C. Seine 724.667.

Compte chèques postaux PARIS 1857-27.

Commandes pour Paris à Trudaine 55-77.

## RADIOGASTROL

Calme immédiatement les crises douloureuses.

Protège la muqueuse stomacale.

### Composition :

Bismuth oxyquinoléate.

Oxyde de magnésium.

Charbon activé.

Kaolin léger.

**Indications.** — Dyspepsies. Gastralgies. Hyperchlorhydrie. Intoxications. Ulcérations. Pyrosis. Entéro-colites.

### Présentation :

Forme Poudre, la boîte : 19 fr. 50.

Forme Comprimés, la boîte : 12 fr. 20.

**Posologie.** — Poudre : 1 cuillerée à café avant les repas.

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour avant les repas.

Laboratoire **BOYER et Cie**

18, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

## RADIO-OSSÉINE

(Granulé et cachets.)

Augmentation de l'action thérapeutique de la lumière par sensibilisateurs.

**Indications.** — *Sous-alimentation et ses hypovitaminoses*, Déminéralisation, Troubles nerveux, Croissance, Grossesse, Allaitement.

**Particularités.** — *Seul médicament sensibilisant l'organisme à la lumière* (seuil de l'érythème abaissé de 6 à 2 minutes) accélérant la transformation des provitamines de l'organisme en vitamines de fixation calcique et de défense anti-infectieuse, augmentant l'action eutrophique et équilibrante de la lumière.

**Composition.** — *Complexe minéral abondant, complet et équilibré* (P + Ca + Fer + Magnésie + Manganèse) fixé d'une façon sûre et physiologique par *Photosensibilisateurs* (or, urane, nickel, fluor, millepertuis).

### Posologie :

**Nourrissons :** 1 cuillerée à café.

**Enfants :** 2 cuillerées à café.

**Adolescents :** 3 cuillerées à café (ou 1 cachet).

**Adultes :** 2 cuillerées à soupe (ou 2 cachets) par jour.

**Approvisionnement assuré :** Lyonnais et Dauphiné

Laboratoires **A. T. L. A. S.**

M. FORNIER, Pharmacien,

264, route d'Heyrieux — LYON (VII<sup>e</sup>).

## RADIO SALIL

Suractivé.

**Composition.** — Salicylate de Glycol, Salicylate de Méthyle, Capsicine, Menthol, suractivés sous l'influence de la radio-activité du Mésothorium.

**Action.** — Analgésique, réulsive, résolutive. Combat l'élément douleur, efficacement et rapidement, grâce à la suractivation des éléments actifs.

**Indications.** — Toutes douleurs aiguës : rhumatismes, goutte, sciatique, lumbago, névralgies faciales et intercostales, foulures, etc... Comme réulsif, dans la congestion des voies respiratoires.

**Présentation.** — Crayon fondant, pour usage externe, d'un emploi pratique, ne tachant ni les mains ni le linge, et sans odeur désagréable.

**Mode d'emploi.** — Applications *loco dolenti*, non suivies de frictions. Recouvrir légèrement de coton ou de flanelle. Avant chaque application, nettoyer la peau à l'alcool.

Laboratoires **UROMIL - L. BÉLIÈRES, D<sup>r</sup> en Ph<sup>e</sup>.**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Provence 04-00.)

## RADIOTÉTRANE GÉRARD

**Composition.** — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

**Mode d'action.** — Opacifie la vésicule biliaire aux Rayons X.

**Avantage.** — Stable, de composition constante, non toxique, goût agréable.

- 1° A. Forme dragées : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.
- 2° B. Forme colloïdale : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.
- 3° C. Forme poudre : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz.
- 4° Formes ampoules : pour injection intraveineuse.

**Indications.** — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

### Forme et mode d'emploi :

- 1° A. Dragées : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maximale entre la 14<sup>e</sup> et la 16<sup>e</sup> heure : 28 fr. 85.
- 2° B. Forme colloïdale : mélanger le contenu des deux flacons immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 80 cc.) : 28 fr. 85 (dose unique).
- 3° C. Forme poudre : faire dissoudre dans un tiers de verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz ou eau de Perier : 23 fr. 10 (dose unique).
- 4° D. Forme colloïdale grand modèle, créée pour l'application de la méthode Sandström : 57 fr. 65.
- 5° E. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 3 gr. pour application de la méthode de Sandström : 46 fr. 15. Faire dissoudre chaque tube dans 1/3 de verre d'eau et ajouter q. s. d'eau de Seltz ou d'eau de Perier.
- 6° G. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 2 grammes pour application de la méthode de Sandström : 32 fr. Faire dissoudre chaque tube dans 1/3 de verre d'eau et ajouter q. s. d'eau de Seltz ou d'eau de Perier.
- 7° F. Forme intraveineuse : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bidistillée et injecter très lentement : 14 fr. 75.

Enregistrés au L. N. C. M. : Dragées — N° — 111-3.  
Liquide — N° — 111-2. Poudre — N° — 111-8.

**Laboratoire du Dr LAURENT-GÉRARD, Ph<sup>1er</sup>en,**  
40, r. de Bellechasse — PARIS (VII<sup>e</sup>). — (Tél. : Inv. 78-44.)

## RADIO TOPIC. C.

**Composition.** — Émulsion physiologique de lactate d'étain en milieu radio marin camphré éthéré.

### Action thérapeutique :

- 1° Attire à la surface dermique les éléments purulents staphylococciques ;
- 2° Décongestionne, antiseptise les tissus, préparant et facilitant toute intervention chirurgicale éventuelle ;
- 3° Constitue le spécifique externe le plus remarquable des furoncles et anthrax (observations médicales précises et concluantes).

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Folliculites, Abcès, Panaris, Zonas, Suppurations, Lymphangites, etc.

**Laboratoires de Spécialités Marines,**

P. CASTANET, Pharmacien,

PONTAILLAC-ROYAN (Charente-Maritime).

## RANGOL

**Forme.** — Comprimés.

**Formule.** — Gardénal, Tartrate borico-potasique, NaBr, Extraits de datura, jusquiame, gelsemium, cratægus, ballote, passiflore, valériane stabilisée, pancréas.

**Indications.** — Irritabilité du sympathique, angor, névroses, insomnies, spasmes.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par 24 heures par doses fractionnées.

**Prix :** 23 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-26.

**ASSOCIATION TECHNIQUE  
PHARMACEUTIQUE**

T. VINCENT, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## RAPHABIL

Association d'acide déhydrocholique et des principes actifs du suc de *Raphanus niger* fixés sur charbon activé.

*Fabrication provisoirement suspendue.*

## PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## RAPHARÈNE

**Composition.** — Extrait fluide glyciné de *Raphanus sativus* barbiens (procédés d'extraction du D<sup>r</sup> H.-R. Olivier, permettant l'action des principes actifs de la plante à l'état frais).

**Propriétés.** — Étudié par tubage duodénal, il excite la contraction vésiculaire, fait apparaître la bile B, décuple la sécrétion de la bile A hépatique.

**Médication cholagogue et cholérétique au plus haut degré.** — Il combat la constipation chronique essentielle par suppléance de l'insuffisance hépatique biliaire. Aucune accoutumance ni irritation.

**Indications.** — Tous états morbides hépatiques ou vésiculaires (Litiasse et stases biliaires, insuffisance hépatique), Angiocholites, Convalescence des maladies infectieuses. Traitement de choix du foie des colonaux.

**Posologie.** — Une cuillerée à entremets ou deux pilules un quart d'heure avant les deux principaux repas, 10 jours par mois. Pour les enfants, une cuillerée à café ou une pilule dans les mêmes conditions.

**Laboratoires JOURNET**  
18 et 20, rue Vavin — PARIS (VI<sup>e</sup>)  
(Tél. : Danton 70-07.)

## RÉALPHÈNE

**Composition.** — Association de phosphore et d'arsenic. Une cuillerée à café de 5 gr. de granulé contient 0 gr. 62 d'éther phosphorique du glucose et 0 gr. 05 d'acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux.

Une cuillerée à potage d'éllixir contient 0 gr. 02 d'éther phosphorique du glucose et 0 gr. 05 d'acétylamino-oxyphénylarsinate de soude.

**Présentations.** — Flacon de 85 gr. de granulé. Flacon de 300 cc. d'éllixir.

**Propriétés.** — Tonique, reconstituant, stimulant, anti-anémique.

**Indications.** — Asthénie, anorexie, amaigrissement, convalescences, anémies, surmenage, entérites chroniques.

### Posologie :

**Adultes : Granulé :** 2 à 5 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux.

**Élixir :** 2 à 4 cuillerées à potage par jour, pendant une semaine sur deux.

**Enfants : Granulé :** 1 à 2 cuillerées 1/2 à café par jour, une semaine sur deux.

**Nourrissons : Granulé :** 1/2 à 1 cuillerée 1/2 à café par jour, quatre jours sur huit.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**  
98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## RECTAGINE

### Suppositoires décongestifs pelviens.

**Composition.** — Argent colloïdal, Hydrargyre, camphoïdo sulfonate de sodium et Extrait de Jusquiame.

**Indications.** — 1° *Hémorroïdes*, rectites, prurit anal, oxyures.

2° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorragie sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

3° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou inflammatoires de l'utérus, des trompes et des ovaires.

**Posologie.** — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 19 fr. 50.

### Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).  
(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## RECTOPANBILINE

**Formes.** — Solution pour lavement et suppositoires.

**Définition.** — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

**Composition.** — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile grache* additionnée, dans les suppositoires, de glycérine solidifiée.

**Indications.** — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose*, dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

**Autres indications :** Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

**Posologie.** — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — *Enfants* : demi-dose.

N° d'Enregistrement au L. N. C. : 469-3-4.

Prix au public :

17 fr. 40 le pot de Rectopanbiline.

14 fr. 60 la boîte de suppositoires.

**Laboratoires du Docteur PLANTIER**  
ANNONAY (Ardèche).

## RECTO PANSEMENT

### AMBIASINE

Ampoule lavement de 125 cc.

**Composition.** — Le Recto Pansement Ambiasine est un composé gelée Ambiasine à 5 %, d'Agar Agar et 20 %, d'Ambiasine normale.

**Propriétés.** — L'action désinfectante, calmante et cicatrisante de l'Ambiasine y est mise à profit. La gélose maintient l'Ambiasine en contact intime avec la muqueuse rectale congestionnée ou ulcérée.

Calme le ténésme, les coliques intestinales.

Le Recto Pansement : *panse, désinfecte, cicatrise*.

**Indications.** — Rectocolites diffuses ou localisées, hémorragiques ou purulentes, Entérocolite, colites légères ou graves, diarrhées profuses des tuberculeux, des cancéreux, des anémisés, des vieillards. Dysenteries aiguës et chroniques, parasitaires ou microbiennes. Dermatoses d'origine digestive. Eczéma, Colibacilliose, etc. Diarrhées rebelles, ténésme. Rectites de toutes origines.

**Mode d'emploi.** — a. Faire prendre au malade un lavement évacuateur à l'eau bouillie salée à 7 gr. par litre. b. Deux heures après administrer le Recto Pansement comme un lavement après avoir eu soin de liquéfier le contenu de l'ampoule en la chauffant au bain-marie. Une ampoule de 125 cc. en lavement tous les 2 jours. Compléter le traitement local par 3 comprimés d'Ambiasine quotidiennement.

La boîte (une ampoule de 125 cc.) : 14 fr. 70.

(Taxe d'Armement comprise.)

**Laboratoires de l'AMBIASINE**

69, rue de Wattignies — PARIS (XII<sup>e</sup>). (Tél. : Dorian 75-52.)



## RECTOSEPTAL SIMPLE

Suppositoires anti-infectieux permettant de réaliser l'imprégnation crésotée suractivée.  
*Action bactéricide sur toute la flore pathogène.*

### Composition :

	Ad.	Enf.
Crésote pure.....	0 gr. 50	0 gr. 30
Sulfate double d'orthoxyquinoléine et de potassium.....	0 gr. 02	0 gr. 012
Essences antiseptiques.....	0 gr. 04	0 gr. 024
Camphre.....	0 gr. 05	0 gr. 03
Ephédrine base.....	0 gr. 005	0 gr. 003

**Indications.** — Toutes affections broncho-pulmonaires ; prophylaxie des complications pulmonaires de la grippe, de la rougeole et de la coqueluche et des accidents pulmonaires post-opératoires.

**Posologie.** — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

**Supprime toute intolérance gastrique.**

**Aucune action irritante sur la muqueuse rectale.**

## RECTOSEPTAL SULFAMIDÉ

Thérapeutique sulfamidée par la voie rectale.

### Composition :

	Adultes.	Enfants.
Paraminophényl-Sulfamide (1162 F).....	0 gr. 50	0 gr. 32
Crésote pure.....	0 gr. 30	0 gr. 20
Sulfate double d'orthoxyquinoléine.....	0 gr. 01	0 gr. 0065

### Indications :

Toutes maladies infectieuses, Pleurésies purulentes, Septicémies diverses, Méningites, toutes Suppurations.

### Posologie :

2 à 4 suppositoires par 24 heures.

*Enfants* (employer, les suppositoires RECTOSEPTAL

SULFAMIDÉ Enfants) :

2 à 4 suppos. en 24 heures pour enfants de 6 à 12 ans.

1 à 3 — — — — — 2 à 6 ans.

1 à 3 moitiés de suppos. en 24 heures pour nourrissons.

**Évite l'intolérance aux sulfamides.**

**Laboratoires DEROL**

34, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Passy 16-80.)

## RÉNOCARDINE

**Le cardiotonique de la soixantaine.**

**Indications.** — Cardiopathies décompensées, Insuffisance myocardiique, Néphrites et Cirrhoses, Œdèmes et Ascites, Urémie et toutes insuffisances cardio-rénales.

**Ni toxicité. — Ni accoutumance. — Ni accumulation.**

La Renocardine est un cardio-tonique d'entretien et un diurétique rénal aussi actif que la théobromine, mais ne provoquant ni céphalée ni intoxication urique.

**Composition.** — Dragées d'extraits physiologiquement titrés, de plantes fraîches stabilisées :

**Adonis vernalis. Pyrole. Fleur de genêt. Orthosiphon stamineus.**

**Doses.** — Deux dragées au début des deux repas.

Traitement pour 8 jours : 21 fr. 30.

Littérature et échantillons.

Enregistré au L. N. C. M. n° 487-5.

**Laboratoires PERROCHON**

**A. ABADIE, D<sup>r</sup> en Pharmacie.**

TOURS. (Tél. 54.65.)

## RÉSOCAÏNE

Spécifique du Coryza et des affections douloureuses du Nez et des Sinus.

(Sédation et décongestion immédiates.)

**Forme.** — Pommade nasale, en tube spécial pour injections nasales.

**Composition.** — Adrenaline physiologique ; Bismuth sous-gallate ; Essence de Niaouli ; Cocaine ; Chlorhydrate d'amyléine ; Résorcine ; Menthol ; Essence de Thym ; Excipient stérilisé.

**Indications.** — Coryza, sinusites, obstructions nasales, rhume des Foins, ozène, surdité. Antiseptie du nez et de la gorge.

**Doses.** — Gros comme un pois dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## RÉSOLUTIF RUBY

Cataplasme ouaté pour pansements *humides stériles*.

**Propriétés.** — Emollient, analgésique, aseptique, instantané.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Absès, Orgelets, Panaris, Plaies infectées, Fluxions dentaires, Nettoyage des plaies terreuses par agglutination.

Le RÉSOLUTIF RUBY stérilisé en boîtes fer-blanc est le seul moyen rapide d'obtenir un pansement humide rigoureusement stérile.

**Mode d'emploi.** — Imbiber le RÉSOLUTIF avec de l'eau chaude stérile et placer la couche émouillie de gaze en contact avec la partie malade. Recouvrir avec l'imperméable et un bandage de préférence en crêpe.

Prix de vente en pharmacies (mai 1941) :

Carré. Petit. Moyen. Grand.  
10/10 cm. 20/15 cm. 25/22 cm. 50/22 cm.

Résolutif, boîte  
carton. La boîte. » 3 fr. 90 6 fr. 25

Résolutif stérilisé,  
boîte fer-blanc. La boîte de 5 carrés de 7,5/7,5 cm.

### Laboratoires des PANSEMENTS RUBY

M. PACCARD, Docteur en Pharmacie,  
VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

## RÉSYL

Éther glycéro-galacollique  
CIBA

**ANTI-SEPTIQUE PULMONAIRE, ANTICATARRHAL.**  
Non caustique, libérant du galacol à l'état naissant. Puissant modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites, catarrhe bronchique et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

*Sirop, Comprimés, Ampoules.*

**Doses.** — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

*Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures.

*Ampoules* : Une tous les 2 jours.

**Médecine infantile.** — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

**Formuler.** — Flacon sirop grand modèle.

— — petit —

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 12 ampoules.

Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.  
(Tél. : Moucey 43-26.)

## RÉTROPITUINE CARRION

**Composition.** — Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse, titré physiologiquement en unités internationales (*deux, cinq et dix unités* en ce qui concerne, respectivement, la Rétropituite n° 2, n° 5 et n° 10).

**Formes :**

Ampoules de 1 cc. (Rétropituite 2 et 10).

Ampoules de 10 cc. (Rétropituite 5).

**Indications :**

N° 2 : Inertie utérine au cours des accouchements.

N° 10 : Inertie utérine à la délivrance. Hémorragies post-partum. Métrites hémorragiques. Ménorragies. Prévention des hémorragies post-opératoires. Atonie de la musculature de l'estomac, de l'intestin et de l'appareil urinaire. Ulcère gastro-duodénal. Diabète insipide.

N° 5 : Hémoptysies des tuberculeux.

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 cc. (Rétropituite n° 2) ; de 0 cc. 5 à 1 cc. (Rétropituite n° 10). Injection intraveineuse lente (Rétropituite n° 5).

**Présentation et prix :**

La boîte de 1 ampoule n° 2 ou 10 : 6 fr. 70.

— de 4 ampoules n° 2 ou 10 : 23 fr. 80.

— de 6 — n° 2 ou 10 : 32 fr. 90.

— de 3 — n° 5 : 21 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. n° 514-71 et 126.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-St-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## REVITALOSE

du Docteur FRAISSE

(Voir aussi : Opothérapie du Dr Frayssé.)

**Formule :**

Chaque ampoule contient les principes actifs de :

Glande orchitique..... 2 gr.

Glande surrénale..... 2 gr.

Substance grise du cerveau..... 3 gr.

Pour 1 ampoule buvable.

**Forme :** Ampoule buvable 10 cc.

**Indications thérapeutiques :** Épuisement nerveux. Insuffisances glandulaires. Convalescence. Anémie grave, Hypotension, etc.

**Doses.** — 1 ampoule par jour avant le repas.

Puissant régénérateur de la formule leucocytaire.  
Stimulant énergique de la cellule nerveuse.

Laboratoire FRAYSSÉ et Cie

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Malmaison 12-88.)

## RÉVULSIF CHAMBON

(Aux essences aromatiques sélectionnées.)

**Indications.** — Toutes celles de la Révulsion et en particulier toutes inflammations des voies respiratoires : Rhumes, Grippe, Bronchites, Trachéo-bronchites, Congestion pulmonaire, Pleurites, Pleurésies, Laryngites, etc.

**Composition et avantages.** — Essences végétales sélectionnées pour leur propriétés rubéfiantes, balsamiques et antiseptiques associées à des terpènes.

Outre leur action révulsive moyenne mais suffisante, les essences composant le RÉVULSIF CHAMBON produisent, par l'imprégnation de la peau et des vêtements, une véritable inhalation continue de produits balsamiques aseptisant les voies respiratoires.

**Mode d'emploi.** — Badigeonner avec un pinceau ou un tampon de coton une ou deux fois par jour le dos et la poitrine du malade ; quelques secondes après, recouvrir la région badigeonnée d'un morceau de flanelle ou de coton hydrophile.

Pour obtenir une révulsion plus active, appliquer le Révulsif après une bonne friction au gant de crin ou avec un linge rugueux.

Prix : Petit modèle, 12 fr. 80. — Grand modèle, 17 francs.

**Laboratoires CHAMBON**

Place Francheville — PÉRIGUEUX (Dordogne).  
(Tél. : 4-43.)

## RÉVULSIF FISCH

(Anciennement Procipha.)

**Forme.** — Liquide, incolore, aromatique.

**Composition :**

Acétate de Bornyle.....	7,00
Carvacrol .....	2,00
Limonal .....	2,00
Benzylidène Acétone.....	6,00
Thymol.....	1,80
Dipentène.....	10,00
Acétate de Terpényle .....	5,00
Éthanol.....	62,00
Essence de térébenthine rectifiée.....	4,20

Pour 100 grammes.

**Indications.** — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques ; Affections rhumatismales et névralgiques.

**Mode d'emploi.** — Badigeonner avec un pinceau la surface à révulser. Pour bains de pied, 1 à 3 cuillerées à café.

**Enfants :** diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 659-15.

**Prix :** 15 fr. 60.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>, S. à r. l.**

VIBRAYE (Sarthe).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>). (Tél. : Trudaine 92-52.)

## RÉVULSIF FOUCHÈRE

**Formes :**

*Liquide* (adultes).

*Pommade* (enfants et bérés).

**Composition :**

*Liquide :* Benzylidène acétone, Thym rouge, Niaouli. (En badigeonnages.)

*Pommade :* Capsicine, Eugénol, Essence de thym, Essence niaouli, Essence de térébenthine, Gaïacol.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires et rhumatismales.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,  
RIVE-DE-GIER.**

## RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

### Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;  
 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ; 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ; 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ; 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ; 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins ; 7° il n'entre dans sa composition ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

### Indications thérapeutiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; — 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; — 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

### Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ; 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

**Laboratoire BOUDIN**

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 23-15.)

## RÉVULSIF LUG

**Nouveau révulsif liquide, actif, agréable, ne tachant pas,**

### Composition :

Menthol .....	0,50
Caryophyllène .....	5,00
Eugénol .....	5,00
Benzylidène acétone..	6,00
Thymène .....	32,50
Limonène .....	51,00

**Indications.** — Affections des voies respiratoires. Douleurs névralgiques, rhumatismales, etc.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnages quotidiens ou bi-quotidiens du thorax ou du siège de la douleur, avec un pinceau ou un tampon d'ouate imbibé de Révulsif LUG. Recouvrir ensuite d'une couche d'ouate ou d'un linge fin.

**Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## RÉVULSIF MILKO

### Innovation thérapeutique.

**Composition.** — Essences naturelles. Terpènes, Alcool. (Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

**Présentation.** — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 8 fr. 20.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 9 fr. 40.

N° 3. *Pour adultes* : 11 fr. 30.

Le **Révulsif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phytènes. *Ne tache ni n'altère les vêtements*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène ni sternutatoire. Odeur agréable.

**Action secondaire** : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

**Indications.** — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. OLUZEL

80, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or Strasbourg 1927.

## RHÉANTINE LUMIÈRE

### Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

**Constitution.** Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisés et desséchés à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

**Propriétés.** — Seule la méthode vaccinothérapique, qui agit par voie humorale, est susceptible d'assurer la destruction des germes infectieux dans les localisations à distances (vessie, testicules, utérus, ovaires, rein, articulations, etc.), où il est impossible de les atteindre par des médications locales.

Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats.

La **Rhéantine Lumière** est un vaccin anti-gonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre.

**Indications.** — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидидymites, ophtalmies d'origine gonococcique, etc.

**Dose courante.** — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

**Formuler.** — Boîte de **Rhéantine Lumière**.

**VACCINS-AUTOGENES.** — L'expérience a montré que l'efficacité de la **Rhéantine Lumière** est très étendue, mais qu'elle ne saurait s'appliquer à des infections associées à des espèces très éloignées des cultures représentées dans le stock vaccin.

Les Laboratoires Lumière préparent des vaccins autogènes et fournissent le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

**LABORATOIRES LUMIÈRE** — 45, rue Villon — LYON.

## RHIN-ADR-ARGOL

O. R. L.

**Composition.** — Sels d'argent, adrénaline, essences antiseptiques en milieu paraffinique neutre.

**Propriétés.** — Décongestion prolongée. Pénétration. Antisepsie très prolongée sans irritation.

**Indications.** — Médication pré et post-opératoire. Sinusites, rhinites, otites, fièvres éruptives.

**Présentation.** — 2 tubes à canule.

Pour obtenir la forme huileuse, il suffit de tremper la canule du tube pendant quelques secondes dans l'eau tiède avant l'instillation.

Pendant les hostilités, la préparation du RHINADRARGOL est momentanément suspendue, les produits entrant dans sa composition étant épuisés. Les produits de remplacement ne donnant que des résultats médiocres, la fabrication sera reprise dès que les matières premières de qualité se retrouveront sur le marché français.

Laboratoires DORDIN

HARNES (Pas-de-Calais).

Livraisons très réduites.

## RHINADROL

(Baume nasal.)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline huileuse et essences.

**Propriétés.** — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

**Avantages.** — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

**Indications.** — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

**Présentation.** — *En tube* avec embout pour faciliter l'introduction dans les narines. (Tube de 20 gr. environ.)

**Prescription.** — Un tube **Rhinadrol Falvy**.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-Interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## RHINALATOR

### Inhalateur nasal décongestif.

La désoxynoréphédrine est un vaso-constricteur volatil de la série adrénalinique, voisin de l'éphédrine.

**Avantages.** — a) *Cliniques.* — Sa volatilité permet son emploi à l'aide d'un inhalateur de poche et lui assure une pénétration intégrale des cavités nasales et une action douce et uniforme.

b) *Pharmacodynamiques.* — La désoxynoréphédrine agit aussi vite, aussi fort et plus longtemps que l'éphédrine.

c) *Thérapeutiques.* — Le *Rhinalator* arrête l'écoulement nasal, dissipe la céphalée, rétablit le tonus physique et intellectuel.

d) *Pratiques.* — Le *Rhinalator* permet un traitement discret et régulier. Son emploi facile et agréable est particulièrement appréciable chez les *enfants*, qui répugnent aux instillations nasales.

**Indications.** — CORYZA, RHUME DES FOINS, SINUSITES et toutes inflammations de la muqueuse et du rhinopharynx (voir *Corydane*).

**Mode d'emploi.** — 5 à 6 inhalations par jour suffisent à dissiper la congestion des muqueuses.

### SOCIÉTÉ

### D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, bd de La Tour-Maubourg, PARIS (VII\*).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## RHINAMIDE

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 363-56

**Forme.** — Solution.

**Composition.** — Solution anesthésique de para-amino-phényl-sulfamide éphédrinée en sérum physiologique de pH 7.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Chimiothérapie antibactérienne sulfamidée des infections rhino-pharyngées. Antiseptique, décongestionnant, anesthésiant.

**Indications.** — Coryzas, Rhinites, Adénoïdites, Otorrhées tubaires, Réactions sinusiennes et Sinusites.

**Mode d'emploi.** — En instillations ou en pulvérisations nasales très fréquentes (10 à 15 par jour).

**Prix :** Le flacon : 21 francs.

**Laboratoires A. BAILLY  
(SPEBA)**

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII\*).

(Tél. : Laborde 62-3C.)

## RHINAQUINTINE LESCÈNE

### Anaquinquine gouttes nasales.

**Composition.** — Baume du Pérou, Thymoforme, Eucalyptol, Thymal, Ephédrine (à faible concentration). Décoction huileuse de Jaborandi.

**Forme.** — *Flacon avec stili-compte-gouttes stérilisable* à l'alcool comme un thermomètre (brûlé), sans caoutchouc et sans verre, permettant aux gouttes de pénétrer sans pression dans le nez et carum et sans blesser les sujets rebelles. Supprime le compte-goutte qui reporte les germes du nez dans le produit à instiller.

**Indications.** — Rhumes, Rhume des foins, Coryza des nouveau-nés (facilite les tétées). Rhinites, Sinusites, Ozène, Adénoïdites, Tour, Grippe, Coqueluche, Laryngites, Group, Faux-croup.

Désinfection du rhino-pharynx dans les maladies contagieuses. Prophylaxie des contagions. Désinfection du carum avant et après ablation des végétations. Eclaircit la voix des chanteurs et des orateurs.

**Mode d'action.** — Sédatif puissant. Décongestionnant doux. Détersif non irritant. Nettoie les muqueuses, draine les sinus et le carum. Empêche la stagnation du pus. Débouche le nez d'une façon douce et prolongée et facilite l'action des inhalations.

Évite la sécheresse des muqueuses (climats secs, chauffage central). Indiquée en injections intratrachéales dans toux laryngées, asthme, croup, laryngites striduleuses.

**Mode d'emploi.** — Affections aiguës : 2 à 8 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, injections intratrachéales : 2 à 4 cc. en une fois.

Affections chroniques : 2 à 3 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

### Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, r. de Vouillé (Tél. : Va. girard 08-19) et LIVAROT (Calvados).

## RHINO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'ampho-vaccin rhino-pharyngien.

**Composition.** — Le Rhino-Amphogel n'est pas une pommade. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une forte proportion (75 % de bouillon-vaccin rhino-pharyngien) (pneumocoques, pneumobacilles, entérocoques, streptocoques, micrococci catarrhalis, coccobacilles de Pfeiffer, staphylocoques).

**Indications.** — Affections du nez, Rhino-prophylaxie de la grippe et du coryza.

**Avantages.** — La gelée non grasse ne fond pas au contact des muqueuses, elle est absorbée lentement d'une façon remarquable et assure ainsi la protection continue du rhino-pharynx. Sa présentation sous forme de gelée confère à ce produit des qualités d'ordre pratique (badigeonnages faciles à faire dans la journée) et d'ordre économique (le tube assure un long usage).

**Mode d'emploi.** — Le Rhino-Amphogel s'applique en pansement nasal. Introduire le produit dans les narines à l'aide d'un porte-colon joint à la boîte. Par un mouvement circulaire en tapissant les muqueuses. Renouveler l'application 4 à 5 fois par jour.

Très grande activité. — Innoctité absolue.

En tube de 25 grammes environ.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

21, Bd de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III\*). — Tél. : Turb. 72-31.

## RHINO-ANTIPIOL

Crème immunisante pour le traitement préventif et curatif des affections du Rhino-pharynx et le prophylaxie des maladies contagieuses.

**Composition.** — Crème adhérente à base de filtres et autolysats immunisants associés à un complexe calmant, balsamique et décongestionnant.

**Indications.** — Coryza, Rhinites aiguës ou chroniques, Sinusites, Amygdalites, Rhume des foins, Prophylaxie des maladies contagieuses.

**Mode d'emploi.** — Introduire un peu de crème dans les narines, 3 ou 4 fois par jour. Faire pénétrer par un léger massage en reniflant doucement.

Prix : 12 fr. 90 le tube.

Laboratoire de Biologie médicale  
et de Dermothérapie.

8, avenue Walkanaer — NICE.

## RHINO-BOROSTYROL

**Composition :** Huile au Borostyrol: 100 + Ephédrine basique 1 % + Laroïcaine 0,50 %.

**Formes.** — Huile: flacons pour pulvérisation, rhino-capsules.

**Propriétés.** — Analgésique, antiseptique, cicatrisant et vaso-constricteur d'effets durables, malgré que la teneur en éphédrine soit faible.

**Avantages.** — Jamais d'incidents ou accidents dus aux doses élevées d'Ephédrine.

**Indications thérapeutiques.** — Coryza, Sinusites, Rhume des foins.

**Posologie.** — Les pulvérisations nasales 3 à 6 fois par jour donnent les meilleurs résultats; à défaut: Instillations de quelques gouttes dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour.

Prix: le flacon de 25 grammes : 14 fr. 40 (15 jours de traitement).

La boîte de 24 capsules : 14 fr. 40 (8 jours de traitement)

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,

4, avenue Orban.

## RHINOCHROME

Préventif et Curatif  
des infections oto-rhino-laryngologiques.

**Composition.** — Solution aqueuse indolore isotonique et parfaitement stable du sel sodique de la D. O. M. F. combiné à l'éphédrine.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes.

**Indications.** — Préventif et curatif des affections des voies respiratoires supérieures : Coryza — Grippe — Rhinites — Sinusites — Rhumes des foins — Tra-chéites — Laryngites — Otites aiguës et chroniques.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Instillations :* IV à V gouttes dans chaque narine ou oreille, 3 à 4 fois par jour.

*Pulvérisations :* avec un pulvérisateur à solution aqueuse, 4 à 5 pulvérisations par jour.

*Tamponnements :* ne peuvent être faits que par le médecin traitant ou sous son contrôle.

Laboratoire MARTIN

47-49, rue Bonnabaud — CLERMONT-FERRAND  
(Puy-de-Dôme).

## RHINO-COLLOÏDOL

Émulsion nasale antiseptique (Huile dans eau), décongestionnante, calmante et bactéricide.

**Composition.** — Chlorhydrate de phénylméthyl-aminopropanol naturel de l'Ephedra vulgaris, Essences antiseptiques déterpénées, Acide borique, excipient spécial émulsionnant.

**Indications.** — Affections nasales (coryza aigu, rhume des foins, sinusite, ozène et suppurations nasales).

Affections de la gorge (Angines, végétations, polypes, pharyngite).

Affections des bronches (asthme, toux, catarrhe).

**Mode d'emploi.** — Se moucher une narine après l'autre. Mettre ensuite l'émulsion, gros comme un petit pois, à l'entrée de chaque fosse nasale. Masser légèrement et renifler doucement. Remettre de cette émulsion plusieurs fois dans la journée en très petite quantité.

Prix : 18 fr. 30.

Laboratoires VIOPHAN

44, Gde-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.). Tél. 506  
24.

## RHINODROPS BÉRAL

*Capsules nasales à l'huile d'Ephedra chlorétinée.*

**Propriétés.** — Antiseptiques et Décongestifs, Inoffensifs. Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

**Indications.** — Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoldiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.

**Mode d'emploi.** — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

**Formuler :** Rhinodrops Béral, une boîte.

La boîte de 18 Rhinodrops : 13 fr. 40.

**Laboratoire BÉRAL**

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

**Forme.** — Flacon compte-gouttes (instillateur spécial dans les boîtes).

**Indications thérapeutiques.** — Action élective sur les terminaisons sensitives des nerfs trijumeau et pneumogastrique au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

**Rôle essentiel :** Régulation de la sensibilité, des troubles congestifs et sécrétoires.

1° **En Rhinologie.** — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

**Congestions et Obstructions Nasales**  
(Vaso-motrices).

**Rhino-Pharyngites**

**Rhinites Atrophiques — Ozène**

**Rhume des foies**

**et Rhino-Bronchites Asthmatiques**

**Céphalées Rhinogènes**

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foies en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° **En Ophtalmologie.** — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensitives et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

**Mode d'emploi :**

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

*Pour les yeux,* il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

*Pour le nez et la gorge,* les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Prix : 21 fr. 80.

**Laboratoire de Pathologie générale de Paris**  
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Auteuil 35-25.)



## RHINO-GLOTTYL

**Composition.** — A base d'extraits huileux totaux d'Erysimum, Belladone, Euphorbia pilulifera, Ephedra, avec adjonction d'essence de Niaouli et d'Amyléine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique. Puissant décongestif. Antispasmodique.

**Indications.** — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, Maladies infectieuses (grippe, rougeole, scarlatine, etc.), Asthmes, Rhume des foins, Insuffisances respiratoires. Toutes manifestations congestives des voies respiratoires supérieures.

### Formes :

1<sup>o</sup> *Solution huileuse* (Instillations et pulvérisations nasales. Injections intra-trachéales).

2<sup>o</sup> *Capsules nasales* (Couper l'extrémité effilée de la capsule et en vider le contenu dans les deux narines).

Durée moyenne des unités de vente :  
10 à 15 jours.

Prix : 19 fr. 50.

### Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 75-60.)

## RHINO-LACTÉOL

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés : 180 milliards pour 100 grammes.

**Propriétés.** — Il ne provoque aucune irritation, quelle que soit la fréquence des prises. Son innocuité jointe à son efficacité en font une médication de choix.

**Indications.** — *Enfants, adultes.*

Coryza, Suppurations nasales et auriculaires, Rhinites, Catarrhes, Ozène.

**Présentation.** — Poudre.

### Mode d'emploi :

*A titre préventif* : une prise au lever et au coucher et deux ou trois prises dans la journée.

*A titre curatif* : une prise toutes les demi-heures. Commencer le traitement dès les premiers symptômes.

### Laboratoire du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## RHINO-ORARGOL

Complexe colloïdal électrique Or et Argent.

Deux formules :

1<sup>o</sup> **RHINO-ORARGOL simple** (étiquette bleue) : *Orargol*, 0,1 p. 100.  
Flacon de 20 gr.

2<sup>o</sup> **RHINO-ORARGOL éphédriné** (étiquette verte) : *Orargol*, 0,1 p. 100 ; *Ephédrine naturelle*, 0,5 p. 100 ; *Baume du Pérou*, 0,25 p. 100.

Flacon de 20 gr.

**Indications.** — Rhinites aiguës et chroniques. Sinusites. Désinfection du nez et du rhino-pharynx. Prévention des maladies infectieuses.

**Mode d'emploi.** — En instillations ou pulvérisations dans les fosses nasales avec l'instillateur *Amicros* (joint à chaque flacon) ou tout autre pulvérisateur.

## SÉDO-ORARGOL

Baume nasal *Amicros* à base d'*Orargol*, 0,2 p. 100 ; *Ephédrine naturelle* base, 1 p. 100 ; *Baume du Pérou*, 0,50 p. 100.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un pois dans chaque narine une ou plusieurs fois par jour.

Tube de 15 gr. environ

Laboratoire AMICROS

117, rue de Courcelles — PARIS.

## RHINO-SULFORGAN

**Composition.** — A base de soufre organique naturel, à l'état *sulfonique*, c'est-à-dire entièrement neutre, non oxydé.

**Avantages.** — Assimilable, non congestif, non irritant. Le RHINO-SULFORGAN fournit à la muqueuse infectée le soufre nécessaire à sa guérison.

« *Le pus appelle le soufre* », Dr LERMOYEZ.

### Indications :

- 1° Tous états infectieux O. R. L. ;
- 2° Débilité rhino-bronchique ;
- 3° Traitement préparatoire et complémentaire de toute cure thermique sulfurée ;
- 4° Prophylaxie de la grippe et des maladies contagieuses.

### Posologie :

- 1° En pulvérisations nasales, 2 à 8 fois par jour ;
- 2° En tampons d'ouate, imbibés du produit, 2 à 8 fois par jour ;
- 3° Traitements spéciaux : instillations intratrachéales, insufflations tubaires à la sonde d'Itard, méthode de PROETZ, etc.

Prix : 18 fr. 80.

### Laboratoires JATEL

60, rue de la Chaussée-d'Antin  
PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trinité 90-55.)

## RHINO-SULFURYL

Médication sulfurée.

**Forme.** — Solution.

### Composition :

Hyposulfite de soude .....	0,10
Chlorhydrate d'Ephédrine .....	1
Chlorhydrate d'Amyléine .....	0,05
Pour 100 gr.	

**Indications.** — Rhinites aiguës et chroniques, Coryza, Sinusites, Otites.

**Posologie.** — Verser V à VI gouttes de RHINO-SULFURYL dans chaque narine, 6 à 7 fois par jour.

Le RHINO-SULFURYL peut être également employé en pulvérisations fréquentes.

Prix : 21 fr. 50.

### MONAL

Docteur en Pharmacie,  
13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Inv. 52-73.)

## RHINO-VACCIN « INAVA »

(Gelée-Vaccin pour instillations intranasales.)

Moyen commode d'immunisation locale des premières voies respiratoires.

Le *Rhino-Vaccin* contient des corps microbiens et des produits de sécrétion et de lyse des divers agents des infections catharrales et des complications grippales, notamment les toxines streptococciques neutralisées. (*Vaccin Inava A*, anti-bronchitique.)

**Indications.** — Rhinites, Coryza, Sinusites, Gripes et toutes complications auriculaires ou pharyngées.

**Mode d'emploi.** — En applications intranasales, répétées aussi souvent que possible, et en collutoires pharyngées ou amygdaliens.

Prix : 9 fr. 65 le tube à canule.

### Laboratoires INAVA

Décentralisé à LIMOGES (Haute-Vienne).  
Dépôt à PARIS : 23, rue des Moines.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 760-3.

## RHINO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur Duohon.

Vaccination locale.

**Composition.** — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée, détermine une immunité cellulaire locale.

**Indications.** — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

**Posologie.** — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

**Présentation.** — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 22 fr. 30.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat-vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 24 fr. 10.

Laboratoire CORRIÈRE  
et Pansements brevetés CORRIÈRE S. A.  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## RHIZOTANIN CHAPOTOT

**Composition.** — Tanin de rhizome de fraiser extrait à l'eau, évaporé dans le vide à 0°. Phosphates et glycérophosphates de chaux et de magnésie. Cardamome.

**Formes.** — Cachets pour adultes. Granulé pour adultes et enfants.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire. Etats tuberculeux et pré-tuberculeux. Anémies. Bronchites chroniques (diminution des sécrétions et de l'expectoration). Amélioration rapide des accidents diarrhéiques quelle qu'en soit l'origine. Néphrites albuminuriques.

**Posologie.** — Adultes : 4 à 6 cachets ou 2 à 4 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 4 1/2 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix : 17 francs.

Laboratoire CHAPOTOT

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.) — R. C. 231.917 B.

## RHOCYA

Rhodate de potassium pur.

Le rhodate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, sans contenir d'iode dans sa molécule et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Aucune toxicité. Ni intolérance, ni accoutumance.

Pas d'iode, donc pas d'iodisme. (Thèse Géraud, Paris 1936.)

**Indications.** — *Rhumatismes chroniques.* — Puissant effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

*Hypertension artérielle.* — Abaissement des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérome artériel.

*Emphysème.* — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

*Scléroses viscérales.* — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie) ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

*Oreillons.* — Agit sur la localisation parotidienne et sur les localisations secondaires (orchite).

*Éthylisme chronique.* — La cure de Rhocya entraîne le dégoût des boissons alcooliques. (Thèse Daire, Lille, 1939).

**Posologie.** — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Comprimés : 1 ou 2 comprimés avant les 3 repas.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxylate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

*Présentations :*

Doses unitaires de : 0 g. 15 — 0 g. 30 — 0 g. 45 — 0 g. 60 — 0 g. 75 — 0 g. 90. Prix suivant dosage.

*Indications :*

Syphills, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Plan, Protozooses, Charbon, Sodoku.

*Posologie et mode d'emploi.* — Série d'injections graduées de 0 g. 15 à 0 g. 90.

Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et rigoureusement conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## RHODAZIL

Solution alcoolique à 25 % de Benzoate de Benzyle. Antispasmodique non toxique.

*Indications :*

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Hoquet, Coqueluche, Spasmes divers, Mal de mer, Vomissements du nourrisson.

*Présentations :*

Flacon de 30 cm<sup>3</sup>. Prix : 15 fr. 20.

*Posologie :*

*Adultes :* Une demi-cuillerée à café de solution, à renouveler plusieurs fois par jour.

*Enfants :* IV gouttes de solution par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## RHODIACARBINE

**Ex-pâte Specia granulée antidyentérique.**

**Indications.** — Entéro-colites cryptogénétiques, colites diverses. Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

*Présentations.*

Boîte de 150 grammes de granules. Prix : 34 francs.

Tubes de 20 comprimés. Prix : 17 francs.

**Posologie et mode d'emploi.** — Amibiase : Cure de 20 jour : un jour sur deux 1 à 3 cuillerées à café de granules (ou 1 à 3 comprimés) aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical (Stovarsol).

Colites : cures de 4 à 5 jours, 1 à 2 cuillerées à café aux 2 principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## RHODOBORYL

**Présentation.** — Poudre blanche, très soluble dans l'eau à laquelle elle communique une belle couleur rose. Génératrice d'oxygène naissant.

**Mode d'action.** — Antiseptique, astringent, décongestionnant et sédatif.

**Indications.** — Infections des muqueuses : Gorge (angines, pharyngites, laryngites, amygdalites) ; Bouche (stomatites, gingivites, aphtes) ; Nez (coryza, ozène, rhinites) ; Prévention des maladies contagieuses.

**Mode d'emploi.** — En lavages ou en gargarismes : une cuillerée à café par verre d'eau tiède.

Prix : 15 fr.

Laboratoire MAUOHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie.

GENNEVILLIERS (Seine).

## RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 g. 50) et de caféine (0 g. 05) pour un comprimé (tubes de 20) ou un cachet (étuis de 10).

La caféine ajoute à l'aspirine ses propriétés tonocardiaques.

**Indications.** — Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.

**Posologie.** — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Prix de vente :

Tube de 20 comprimés.. 7 francs.

Étui de 10 cachets..... 6 fr. 30

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## RICIGONOL

**Traitement de l'infection blennorrhagique et de ses complications.**

Complexe savonneux d'acridine suractivé par le Cristal violet, et débarrassé des inconvénients par la présence du chlorure de platine.

**Mode d'action.** — Antiseptique puissant très diffusible, action élective à l'égard du gonocoque. Décongestif, sédatif. Aucun accident veineux, pas de coup de soleil, pas de nausée.

Action certaine sur la toxine gonococcique. Disparition rapide de la douleur. Augmente la résistance du malade. Evite l'urétrite postérieure. Permet de commencer plus vite les soins locaux.

**Indications.** — Affections gonococciques et leurs complications, Epididymites, Rhumatismes.

**Présentation.** — Ampoules de 5 cc. en boîtes de 4.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection, de préférence intraveineuse, le premier et le deuxième jour, puis une injection tous les deux jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 795-6.

Laboratoire LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie

52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS. — (Tél. : Flandre 00-55.)

## RIODINE

(C<sup>18</sup> H<sup>38</sup> O<sup>3</sup>)<sub>3</sub> (1 H<sup>2</sup> C<sup>2</sup> H<sup>4</sup>).

**Composition.** — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

**Forme.** — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. Action prolongée et durable sans iodisme.

Pour obtenir une action rapide et intensive, prescrire la Néo-Riodine : mêmes applications.

**Indications.** — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

**Doses.** — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 17 fr. 60

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 24-52.)

## RIVANOL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Lactate de 2-éthoxy-6, 9-diamino-acridine.

**Propriétés.** — Antiseptique puissant, non irritant et très diffusible pour la chimiothérapie des infections à coeci pyogènes. Les solutions de RIVANOL sont stérilisables à 100° ; elles ne doivent pas être additionnées de chlorure de sodium.

**Indications et dosage des solutions.** — Pour la désinfection des plaies, des fractures ouvertes, des foyers de suppuration après ponction, de la cavité abdominale après une intervention septique ; pour lavages, pansements, badigeonnages et instillations en O. R. L., ophtalmologie, stomatologie : solutions de 0,50 à 2 %. En dermatologie : pommade à 1 %, ou poudre à 2 %. En urologie, pour lavages vésicaux : sol. à 1/5.000. Dans l'amibiase et la tuberculose intestinale, lavements avec une sol. de 1/10.000 à 1/3.000 (en association avec les Riva-nolettes).

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés à 0 gr. 10.

Société générale d'Applications Thérapeutiques  
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## RIVANOULETTES

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Lactate de 2-éthoxy-6, 9-diamino-acridine.

**Propriétés et indications.** — Antiseptique intestinal doué de propriétés antispasmodiques et anesthésiques. Amibiase, entérites aiguës et chroniques, gastro-entérites, entérocrites, diarrhées des nourrissons et des enfants, diarrhées des tuberculeux.

**Posologie.** — *Adultes* : 6 à 8 dragées de 0 gr. 025.

*Enfants* (au-dessus de 6 ans) : 3 à 6 dragées de 0 gr. 025.

*Nourrissons et enfants* (jusqu'à 5 ou 6 ans) : 1 à 4 comprimés de 0 gr. 01.

Par jour, à prendre après les repas. Les comprimés seront dissous dans un peu d'eau ou de lait sucré.

**Présentation.** — Tube de 30 dragées à 0 gr. 025.

Tube de 30 comprimés à 0 gr. 01.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## ROB OBERLIN

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure .....	3 mgr.	6 mgr.	1 cgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06
Arséniate de soude	1/2 mgr.	1 mgr.	1 mgr. 1/2

*Adultes* : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

*Adolescents* : 2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

*Enfants* de 5 à 10 ans : 2,3 et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

## ROB CABANÈS

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure .....	1 mgr.	2 mgr.	3 mgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 004	0 gr. 008	0 gr. 012

En moyenne, 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge, soit :

Un an : 1 demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Deux ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Trois ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

Quatre et cinq ans : 1 cuillerée à entremets 2 fois par jour.

Six à sept ans : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

**Leur présentation est discrète.**

*Sous réserve des possibilités de fabrication.*

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

## ROBRODYNE

### Reconstituant général.

Élixir d'un goût agréable, qui pour 100 cc. d'exci-  
pient liquoreux contient :

Teinture de noix vomique.....	0,20
— d'orange amère .....	0,50
— d'orange douce .....	0,50
— cannelle .....	0,50
Métalarsinate de soude .....	0,08
Glycérophosphate de soude.....	1 gr.

**Indications.** — Faiblesse générale ; Convalescence ;  
Anémie, Croissance.

#### Doses :

2 verres à liqueur par jour avant les repas.

**Prix.** — 20 fr. 50.

Enreg. au Lab. Nat. de Contrôle sous le n° 1403-3.

**L. ROBERT, pharmacien.**

Rue des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).  
(Tél. : n° 70.)

## ROGERMA

Traitement cytophyllactique des affections de la  
peau et des muqueuses.

Phagocytogène, reconstituant cellulaire.

**Indications.** — Anthrax, Brûlures, Plaies atones,  
Ulcères variqueux, Blépharites, Conjonctivites,  
Otites externes et moyennes.

Traitement adjuvant de choix des néoplasmes.

**Mode d'emploi.** — Pur et tiède en pansements très  
humides.

**Présentation et prix du 6 février 1942**  
(autorisation 2099)

Flacon courant .....	19 fr. 30
Flacon ophtalmique .....	21 fr. 10
Flacon otorhino.....	18 fr. 75

Documentations.

**Laboratoire ROGERMA**

19, rue du Sec-Arembault — LILLE (Nord).

## ROMARANTYL

**Teinture glycéro-alcoolique de Romarin,**  
**Piscidia, Aphloia, Ononis, Menthe.**

**Indications.** — Médication cholérétique,  
diurétique, antispasmodique. Dans toutes  
affections hépatiques (Insuffisance hépa-  
tique, Congestion du Foie, Ictères par  
Hépatite ou par Obstruction, etc.).

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café avant  
chaque repas.

Prix : 21 fr. 20.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Roquette 87-34.)

## ROMARÈNE

**Présentation.** — Granulé aromatique fondant de saveur agréable.

**Composition.** — Association de végétaux cholériques (*romarin, taraxacum, combretum*) et de sels alcalins (*citrate de soude*).

### Action thérapeutique:

**Cholérétique:** stimule la fonction hépatique, accroît la sécrétion biliaire.

**Cholofluidifiant:** modifie la nature de la bile et facilite son drainage.

**Stomachique:** résout les syndromes gastro-hépatiques.

Favorise la *diurèse* et la *régularité intestinale*.  
Évite les réactions vésiculaires.

### Indications:

**Insuffisances hépatiques** de toutes natures, cholémie, congestion du foie, hépatisme, ictères bénins, cholécystites, asthme hépatique, etc...

**Syndromes gastro-hépatiques**, dyspepsies, gastralgies, flatulences, état saburral, etc...

**Cures d'entretien hépatique.**

### Mode d'emploi :

Croquer ou dissoudre dans une boisson chaude.

*Adultes:* 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Enfants:* 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

*Bébés:* quelques granules dans le lait.

Indications hépatiques: à jeun ou entre les repas.

Indications gastro-hépatiques: après les repas.

Cures d'entretien hépatique: 15 à 20 jours par mois.

Durée de consommation d'une boîte: 8 à 15 jours.

Prix: 21 fr. 90.

### Laboratoire BEAUFOUR

Docteur en Pharmacie,

Licencié ès Sciences,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

DREUX (E.-et-L.).

(tel.: 145.)

## ROSALAX

### Pilules laxatives.

Thiophytothérapie de la constipation et de ses troubles associés.

**Composition et actions.** — Bourdaine, Cascara, Scammonée, Mucilage de Roses (laxatifs synergiques), Hyposulfite de Soude (désensibilisant, cho'agogue, antiseptique intestinal), Belladone à faible dose (antispasmodique), Quinquina (tonique intestinal).

*Le Rosalax entraîne une exonération physiologique douce et régulière.*

**Indications.** — Constipation chronique sous toutes ses formes, Troubles associés de la constipation, Intoxications intestinales et dermatoses inappétence, fétidité de l'haleine, migraines, etc.

**Posologie.** — 1 pilule au repas du soir ou au coucher. 2 ou plus en cas de constipation rebelle et selon les susceptibilités individuelles.

Le Rosalax est un produit de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA, Pharmacien,

Ancien Interne des hôpitaux de Paris,

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél.: Étoile 09-63.)

## ROSASEPTOR

Poudre émolliente, tonique, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire ainsi que de la bouche, des amygdales et du pharynx.

**Indications.** — Conjonctivites, Blépharites lrits, Chalazions, Orgelets, Ophthalmies, etc.

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, tonique et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux et traitement des stomatites, abcès dentaires, angines, pharyngites, etc.

La boîte de 10 sachets: 12 francs, pour 1 semaine de traitement.

La boîte de 20 sachets: 21 fr. 70, pour 2 semaines de traitement.

Dépôt général:

Laboratoire ASEPTOR

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12<sup>e</sup>).



## ROZIODE

**Iode colloïdal organique complètement assimilable.**

Variété d'iode à l'état de molécules extrêmement fines, de diffusion très rapide. — Ni toxique, ni irritant.

**Propriétés.** — D'une assimilabilité organique complète, d'une puissance thérapeutique rapide et augmentée. Agit comme l'iode et les iodures, sans en avoir les inconvénients. Pas d'iodisme.

**Indications.** — États congestifs, Hypertension, Hyperviscosité sanguine, Artériosclérose, Scrofule, Lymphatisme, Asthme, Angine de poitrine, Eczémas, Dermatoses.

**Formes et prix:** Dragées Roziode ..... 22 fr.  
Pommade Roziode à 10 p. 100... 18 fr. 30  
Ovules Roziode..... 26 fr. 90

**Mode d'emploi.** — *Dragées: Adultes:* 4 à 6 par jour. *Enfants:* demi-dose.

*Pommade:* Adénopathies ganglionnaires, Goutte, Goitre, Rhumatismes. Arthrites, Ulcères, Engelures, Hémorroides, Eczémas, Dermatoses. *Ovules:* Un ovule le soir, maintenu par un tampon de coton hydrophile.

**Laboratoires Gaston ROZE,** Docteur en Pharmacie,  
2, allée de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise).

**DÉPOT GÉNÉRAL:**

**Laboratoires Ch. VERGELOT,** Docteur en Pharmacie,  
163, rue de Flandre, Paris (19<sup>e</sup>). (Tél.: Nord 48-22.)  
Enregistré au Labor. de contrôle sous les n<sup>os</sup> 680-7-8-9.

## RUBIADERM

Pommade au Rubiazol.

**Composition.** — Pommade soluble dans l'eau. L'excipient du RUBIADERM, constitué par des phospho-lipides, assure une absorption rapide et totale du Rubiazol dans la profondeur des tissus infectés.

**Indications.** — Plaies superficielles et ulcérées, Dermites, Trajets fistuleux, Furoncles, Anthrax, Brûlures, Ulcères...

**Mode d'emploi.** — Applications en couches épaisses.

Injecter la pommade dans les trajets fistuleux.

**Prix au public:** Le tube de 40 grammes : 19 fr. 50.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**  
Laboratoires Français de Chimiothérapie.  
S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél.: Littré 58-43.)

## RUBIAZOL

**Composition.** — Carboxy-sulfamido-chrysoïdine.

**Propriétés.** — Médication chimique antibactérienne douée d'une haute activité contre le streptocoque, le méningocoque, le staphylocoque et le colibacille. Toxicité pratiquement nulle.

**Indications.** — Prévention et traitement de toutes les affections provoquées par ces germes.

**Présentations.** — Flacon de 40 comprimés dosés à 0,20.

Boîte de 5 ampoules injectables de 5 cc. à 0,25.

**Posologie quotidienne:**

Septicémie, Méningite, Infection puerpérale..... 5 gr. (25 comp.).  
Pleurésies, Arthrites purulentes..... 3 gr. (15 comp.).  
Erysipèle, Otite, Grippe, Abcès chauds et Prophylaxie..... 2 gr. (10 comp.).  
*Enfants:* demi-dose.

**Prix au public:** Le flacon de 40 comprimés : 24 fr.

La boîte de 5 ampoules : 31 fr. 50.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**  
**LABORATOIRE FRANÇAIS**  
**DE CHIMIOTHÉRAPIE**

S. A. au capital de 10 000 000. — R. C. Seine 232.168 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél.: Littré 58-43.)

## RUBROPHÈNE

### Chimiothérapie de la tuberculose et des rhumatismes.

**Composition.** — Triméthoxy-aurine (Triméthoxy-dioxy-oxotritane) =  $C^{22}H^{20}O^6$ , colorant synthétique original, ni azoloïque, ni sulfoné, ni amidé.

**Action.** — Jusqu'ici spécifique des tuberculoses extra-pulmonaires, étend désormais ses indications : 1° aux tuberculoses pleurales ; 2° à certains rhumatismes. Pas de contre-indications pulmonaires.

A lui seul, guérit souvent, améliore toujours. Associé aux cures hélio-marines ou d'altitude, à la physiothérapie, à l'orthopédie, il peut prétendre presque toujours raccourcir de moitié l'évolution normale de la maladie et permet d'adopter des solutions de conservation qu'on n'aurait osé espérer.

De plus : rapide amélioration de l'état général (poids, température, richesse globulaire, sédimentation).

**Toxicité nulle.** Grande marge thérapeutique. Pas de sensibilisation. Parfaite élimination. Pas de cyanose. Le *Rubrophène* colore les urines et parfois le pus.

#### Indications :

- 1° *Tuberculose des parties molles* : tuberculoses pleurales, adénites prises à tous stades ; tuberculoses rénale, vésicale, épiddymaire ; tuberculoses péritonéale, intestinale ; synovites tuberculeuses ; fistules anales.
- 2° *Tuberculoses osseuses* et ostéo-articulaires.
- 3° *Tuberculoses cutanées* : tuberculides, lupus érythémateux et lupus tuberculeux ; acnés indurées, engelures.
- 4° *Tuberculoses oculaires* franches ou dont l'étiologie s'avérerait difficile à affirmer.
- 5° *Tuberculoses nasales* (lupus, etc.)

#### Nouvelles indications :

- 6° *Rhumatologie* : Rhumatismes tuberculeux et polyarthrites subaiguës et chroniques évolutives d'étiologie indéterminée.

#### Conduite du traitement :

Assurer de préférence le traitement général uniquement par dragées et y adjoindre des applications locales chaque fois que possible.

Augmenter les doses jusqu'au seuil d'activité utile. Ne pas s'effrayer des réactions focales possibles, voire même générales, toujours sans gravité et qui, témoins de la spécificité du *Rubrophène*, impliquent un pronostic amélioré.

Pallier aux incidents digestifs éventuels sans cesser le traitement.

Ne pas s'attendre, malgré un emploi correct, à des guérisons immédiates, mais persévérer avec patience. Cures de consolidation pour éviter récidives ou localisations nouvelles.

#### Posologie :

**Adultes : Dragées.** Tous les jours, en une fois, au petit déjeuner, donner d'abord 4 à 6 dragées. Atteindre rapidement 8 ou 10 dragées par jour. En cas de diarrhée, de nausées : potion chlorhydrique, ou bien répartir la dose aux principaux repas ou, provisoirement, la diminuer ou alterner avec les injections.

**Ampoules injectables** pour intraveineuses en cas de diarrhée rebelle, ou pour traitements locaux. 1 ampoule chaque fois. Dissoudre à chaud (sur une flamme) dans 5 cc. d'eau bidistillée. Pousser lentement l'injection une fois la solution suffisamment refroidie. Ne pas injecter à jeun.

**Enfants : Dragées.** Commencer par : Nourrissons, 1 dragée écrasée ; de 3 à 10 ans, 3 dragées ; de 10 à 16 ans, 4 dragées.

**Ampoules :** 1/6, 1/3 ou 2/3 d'ampoule, selon l'âge.

**Traitement local.** — N'est qu'un adjuvant.

Injection de la solution plus ou moins diluée dans les trajets fistuleux, en instillations vésicales, lavages de plèvre, etc...

Application de pommade, au moins la nuit, sur les lésions cutanées.

#### Présentation :

Boîte de 100 dragées à 0 gr. 15.

Boîte de 10 ampoules de poudre, dosées à 0 gr. 30 de *Rubrophène* + Bisulfite de soude, et 10 ampoules d'eau bidistillée.

Tube de 50 grammes de pommade à 5 p. 100.

**Laboratoire M. LEFEBVRE**

25, boulevard de La Tour-Maubourg,

PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 60-77.)

## RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Hypnotique et anti-épileptique succédané du gardénal, destiné aux malades intolérants ou résistants à ce médicament.

### Présentations :

Comprimés à 0 g. 20 (tubes de 20)... 13 fr. 80  
— à 0 g. 05 (tubes de 30)... 8 francs.

### Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, Constitution épileptoïde.

**Posologie.** — *Adultes* : Deux à quatre comprimés à 0 g. 20 par 24 heures.

*Enfants* : Deux à quatre comprimés à 0 g. 05 par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPEOIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc et Adonis vernalis.

Forme : *Gouttes*.

**Propriétés.** — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

**Posologie.** — *Gouttes* : LX par jour.  
Enreg. au Lab. Nat. de contrôle des Médic., n<sup>os</sup> 103-1 et 2.

Prix : 19 fr. Durée 4-6 jours.

**COMTE, Pharmacien**

60, rue Saint-Guilhem  
MONTPELLIER

## SABURRASE

**Présentation.** — Granulé soluble.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède une action légèrement laxative sans modifier brutalement le pH intestinal, comme la plupart des laxatifs salins. A cette action sur l'intestin s'ajoute celle des composés magnésiens sur le foie et les voies biliaires.

Un antiseptique puissant libère progressivement du guéthol dans l'intestin et en assure la désinfection totale, sans troubler la concentration hydrique du milieu.

**Indications thérapeutiques.** — Médicament des affections du tractus digestif, des intoxications générales et des syndromes hépato-biliaires.

(Dyspepsies, Constipation, Gastro-entérites, Insuffisance hépato-biliaire, Intoxications générales, Suites de grippe, etc...)

**Mode d'emplol.** — Prendre le matin, à jeun, une ou deux cuillerées à café dissoutes dans un demi-verre d'eau.

L. N. C. M. n<sup>o</sup> 43-10.

Laboratoires **PÉPIN** et **LEBOUCQ**

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. Défense 09-71.)

## SACERASE

**Sédatif nervin antispasmodique à effets constants.**

Grâce à l'association Caféine-Belladone et Phényl-éthylmalonylurée, la SACERASE suspend les crises, les fait ordinairement disparaître, agit sur les équivalents, le petit mal et les signes nerveux accessoires.

Elle rend les malades moins irritables, leur donne confiance et les fait redevenir des individus normaux.

Ne produit aucune action défavorable sur l'intelligence et la mémoire.

Le malade ne fait pas d'accoutumance, mais il ne faut jamais le cesser brusquement.

### Deux dosages :

Cachets n° 1 .....	0,05 produit actif.
— n° 2 .....	0,10 —

**Indications.** — Épilepsie. Insomnies rebelles. États anxieux. Troubles neuro-cardiaques. Angine de poitrine. Chez les enfants, spasmes divers, Troubles nerveux.

**Posologie.** — 1° Épilepsie. *Adultes* : débiter par 2 ou 3 cachets n° 2, en se rappelant que les doses initiales doivent être continuées très longtemps, et on devra procéder très lentement et par paliers successifs dans la diminution des doses.

2° États anxieux, Troubles neuro-cardiaques, Insomnies. — 1 cachet n° 1 le soir, loin du repas.

**Bibliographie.** — Com. à la Société Médico-Psych. de Paris, 1921, DUCOSTE ; *La Médéc.*, fév. 1922, ROSE ; PERRENS, Prof. agrégé à la Fac. de Bordeaux ; DESPORT, *Gaz. des Sc. Méd. de Bordeaux*, juil. 1921.

**A. ALESSANDRI, Pharmacien**

20, rue du Pré-Saint-Gervais — PARIS (XIX°).

## SACNEL

(Lotion)

**Composition.** — Soufre colloïdal, acide dithiosalicylique, oxydes de zinc et de titane, extrait d'hamamélis, excipient aqueux.

**Propriétés.** — Par son action sur les cellules à cystéine des couches profondes de la peau, le SACNEL remédie aux troubles du métabolisme du soufre, il est antiphlogistique, non irritant.

**Indications.** — Traitement de l'acné (acné juvénile, acné ponctuée, rosacée, séborrhéique) et toutes affections pour lesquelles l'emploi du soufre est indiqué.

**Forme.** — Un flacon contenant 100 grammes environ de lotion très homogène.

**Mode d'emploi.** — Le SACNEL s'applique à l'aide d'un coton le soir avant le coucher. Il sèche, ne tache pas le linge, son odeur est agréable. Enreg. au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments sous le N° 1-11.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, rue du Plâtre — PARIS (IV°).

## SALANTALE

Vaccins polyvalents polymicrobiens antiséptiques.

Antivirus. Antigènes.

Formes et indications :

### AURICULO-SALANTALE

Vaccin glyciné. Flacon pipette auriculaire.

Affections purulentes otogènes.

### CYSTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin. Traitement par frictions cutanées.

Cystites, Pyélonéphrites, Colibacilloles.

### GINGIVO-SALANTALE

Celée-Vaccin pour massage gingival.

Gingivites, Stomatites, Pyorrhées et autres affections buccales.

### OPHTHALMO-SALANTALE

Pommade-Vaccin ophtalmique en tube. Ni irritante, ni caustique, ni toxique.

Ogèlets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

### OTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin auriculaire en tube avec canule pour le conduit auditif. Furoncles et affections purulentes du conduit auditif, Eczéma impétigineux, Otites externes, Pansements postopératoires.

### OVULES SALANTALE

Odeur agréable. Désodorisants. Ne tachent pas le linge.

Leucorrhées et autres affections purulentes des voies génito-urinaires. Pour fillettes : ovule petit format.

### POMMADE-VACCIN SALANTALE

Applications par larges pansements et vaccination par voie cutanée.

Furoncles, Anthrax, Panaris, Plaies infectées, Suppurations postopératoires et autres affections purulentes. Prophylactique de la Mastite.

### RECTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin calmante et décongestive, en tube avec canule rectale. Affections du rectum et de l'anus, Hémorroïdes.

### RHINO-SALANTALE

Pommade-Vaccin nasale en tube avec embout. Soulagement immédiat. Rhumes, Grippe, Sinusites et autres Inflammations rhino-pharyngées.

### SUPPO-SALANTALE

Action calmante et décongestive.

Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

### TRACHO-SALANTALE

Pommade-Vaccin ophtalmique en tube avec canule breveté à l'usage oculaire. Affections trachomateuses.

✓ Échantillons et Littérature sur demande.

Laboratoires SALANTALE — MELUN (Seine-et-Marne).  
Anciennement Strasbourg.

## SALBINE DU D<sup>r</sup> FAYÈS

Pommade réalisant l'action simultanée de ZnO porphyrisé et du Soufre précipité.

**Indications.** — Eczéma, Prurits, Folliculites, Intertrigo, Cicatrisant des plaies ou brûlures superficielles, en particulier après diathermo-coagulation.

Les applications locales deux ou trois fois par jour n'irritent jamais, ce qui permet un usage prolongé.  
Ne tache pas le linge.

### Société

des Laboratoires de MONTMOROT

G. de MONTMOROT, pharmacien

12 bis, rue Keppler — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## SALBRODERM MARCEL LOGEAS

Nouveau traitement des Dermatoses par l'Alcalinothérapie.

**Présentation.** — Solution buvable.

**Composition.** — Complexe alcalin et Extrait épyphysaire.

**Indications.** — Eczéma sous toutes ses formes. Dermites professionnelles, Acné, Dishydroses. Traitement complémentaire de l'ENIRÉINE dans le Psoriasis.

**Posologie.** — Adultes : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : de 8 à 16 ans, 1 cuillerée à dessert ;  
de 4 à 8 ans, 1 cuillerée à café.

2 fois par jour.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café par jour.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

## SALÈNE SALÉNAL CIBA

ANALGÉSIIQUES EXTERNES.

Le Salène, mélange des éthers méthyl et éthylglyco-salicyliques, possède à un haut degré les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

**Doses.** — Le Salène se formule magistralement, pur ou en liniment, par 5 ou 10 gr. (frictions). Le Salénal, onguent au Salène, s'emploie aussi en frictions ou applications *larga manu*.

**Formuler :** 1 flacon Salène.  
1 tube Salénal.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**  
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## SALIBRA

Complexe Phospho-Chloruré  
du tonus en Ampoules.

**Composition.** — Phosphates acides et Chlorures de calcium, magnésium, sodium, potassium, lithium, manganèse.

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Surmenages. Convalescences, Grippe, Fatigues. Tous états Alcalosiques (Dermatoses, Asthme, etc.). Phosphaturie, Colibacillurie, Décalcification. Rhumatisme chronique, Déminéralisation, Grossesse. Rachitisme, Tuberculoses, Sénilité. Tous les états psychiques.

*Tonique général puissant.*

**Forme.** — Ampoules buvables de 4 cc.

**Posologie.** — 1 à 2 amp. p. jour pendant les repas.

**Prix :** 27 francs. Durée : 10 jours.

Enreg. L. N. C. M. n° 1229-3.

**Laboratoires du SALIBRA**  
1, rue des Jardins — ASNIÈRES. (Tél. : Grés. 27-94.)

## SALICYLATE DE SOUDE CLIN

Toutes les préparations de Salicylate de Soude Clin sont à base de Salicylate de Soude recristallisé, d'une pureté chimique absolue.

Dosage rigoureux des solutions, composition toujours fixe, stabilité, excipient adéquat assurant *activité et parfaite tolérance*.

### Formes.

1° *Voie buccale :* Solution de Salicylate de Soude du Dr Clin, dosée à 2 grammes par cuillerée à soupe. Capsules glutinisées de Salicylate de Soude Clin, dosées à 0 gr. 50 par capsule.

2° *Voie veineuse :* Solution glucosée de Salicylate de Soude Clin à 10 %, 10 cc. = 1 gr. de Salicylate de Soude. Ampoules de 10 et 20 cc.

Solution de Salicylate de Soude Clin à 5 %. Ampoules de 20 cc. (1 gr. par ampoule), 40 cc. (2 gr. par ampoule).

3° *Voie intravariqueuse,* médication sclérosante (Méthode du professeur Sicard). Solution de Salicylate de Soude Clin à 20, 30 ou 40 %, en ampoules de 3 cc. (Boîte de 6 ampoules.)

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**  
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## SALICYLATE SURACTIVÉ «ANA»

**Définition.** — Solution, en eau de mer, de Salicylate de Soude chimiquement pur, en milieu calco-magnésien thiosulfaté.

### Présentations :

- a. Solution : 1/2 cuillerée à café (incluse dans chaque boîte) ou LXX gouttes = 1 gr. de Salicylate de Soude ;  
1 cuillerée à café = 2 gr.
- b. Dragées glutinisées à 0 gr. 50 (ne se dissolvant que dans l'intestin).
- c. Ampoules pour injections intraveineuses = 1 gr. par ampoule de 10 cc.

**Indications.** — Toutes les indications du Salicylate de Soude.

**Posologie.** — Identique à celle du Salicylate de Soude.

**Avantage.** — Suractivation (170 p. 100).  
Goût agréable, Tolérance parfaite, Concentration forte.

**Prix adapté** (32 gr. de Salicylate suractivé par flacon) :

Solution .....	20 fr. 90
Ampoules : 4 inject...	20 fr. 90
Dragées : le flacon de 64 dragées.....	20 fr. 90

### Laboratoires «ANA»

**Docteur VENDEL et C<sup>ie</sup>**

16-18, avenue Daumesnil — PARIS  
(Tél. : Dorian 52-12.)

18, rue Lafon — MARSEILLE  
(Tél. : Lycée 50-74.)

## SALICYLNA

Dragées de Salicylate de Soude chimiquement pur, dont le mode de préparation spécial supprime les inconvénients habituels de la médication salicylée.

### Trois avantages :

- 1° *Pureté chimique absolue*, assurant une efficacité régulière maxima ;
- 2° *Tolérance parfaite*, l'enrobage spécial des dragées évitant tout contact avec l'estomac ;
- 3° *Commodité d'emploi*, le dosage rigoureux (0 gr. 50 ou 0 gr. 25) permettant toutes les modalités de prescription.

**SalicylNa**, 0,50. Étui de 80 dragées : 25 fr. 90.

**SalicylNa**, 0,25. Étui de 120 dragées : 25 fr. 90.

**Laboratoire du Docteur LAVOUE**

RENNES (Ille-et-Vilaine).

## SALIFORMIODE BOUCHEREAU

**M. Iodo-salicylate de formine et de sodium**

Nouveau dérivé iodo-salicylé atoxique cristallisé.

C'est un *vaso-moteur bien toléré d'action antiseptique très supérieure à celle de la formine et du salicylate de soude.*

**Indications.** *Spécifique des arthrites inflammatoires, des Rhumatismes chroniques infectieux, des Synovites et des Sciatiques.*

**Formes.** 1° Ampoules de 10 cc. dosées à 0 gr. 70 de produit pur en *intramusculaires profondes* ou *intraveineuses* : 1 chaque jour ou chaque 2 jours.

2° Gouttes contenant 16% de produit actif pour *rhumatismes chroniques et troubles circulatoires* : XXX à LX gtes 2 fois par jour.

## SALIFORMIODE SOUFRÉ

(Iodo-Salicylate + Thiosulfates.)

*Rhumatismes chroniques dégénératifs et Rhumatismes endocriniens.*

1° Ampoules de 10 cc. en *intramusculaires profondes* ou *intraveineuses* : 1 chaque jour ou tous les 2 jours.

2° Gouttes : XXX à LX gouttes 2 fois par jour.

Ampoules, boîte de 6. Prix public : 49 fr. 50.

Gouttes. Prix public : 21 francs.

**Laboratoire de Chimie Thérapeutique.**

**P. BOUCHEREAU, docteur en pharmacie.**

Lauréat de la Faculté de Paris,

57, boulevard A.-Briand — CHAMPIGNY (Seine).

(Tél : Pompadour 1-97).

## SALITROPINE

Contre tous les états infectieux aigus.

**Composition essentielle.** — Salicylate de Soude et Utropine, en milieu glucosé.

**Indications principales.** — Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe aiguë, Encéphalite aiguë et phlegmo-neuse, Fièvre puerpérale, Erysipèle, Rhumatisme polyarticulaire aigu et Maladie de Bouillaud, Infection des voies biliaires et urinaires, Etats typhiques et para-typhoïdiques, Colibacilloses.

### Formes :

**Ampoules** 10 cc. contenant 1 gr. de chaque composant;  
— 5 cc. contenant 0 gr. 50 de chaque composant.

**Comprimés** dosés à 0,165 de chaque composant.

**En pharmacie :** Boîtes de 6 amp. 5 cc.

— 6 — 10 cc.

— 4 tubes de 12 comprimés.

**Posologie.** — **Ampoules :** 1 à 2 par jour de 5 ou 10 cc. en injections intramusculaires ou de préférence intraveineuses, ou par voie rectale. Enfants, demi-dose.

**Comprimés :** dose moyenne, 6 à 8 par jour avant les repas; pour les enfants, demi-dose.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. n° 130-8 et 9.

**Laboratoire du SULFBIOL**

242, avenue Félix-Faure — LYON. (Tél. : Moncey 17-92.)

## SALIX TROUETTE-PERRET

**Teinture glycéro-alcoolique de Salix Nigra.** (Dose : 2 grammes de plantes pour 100 grammes.)

**Indications.** — Action sédative sur le système nerveux général et génital, en particulier.

Remplace les Bromures.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 21 fr. 20.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 87-34.)

## SALSANOS

Complexe sodique.

Minéro-organique effervescent.

**Composition.** — Après effervescence la répartition des sels de sodium est approximativement:

Citrate trisodique naissant ( $C^4H^3O^7Na^3$ )

III<sup>10</sup>O) ..... 50

Tartrate naissant ( $C^4H^4O^6Na^2H^3O$ ) ..... 35

Sulfate ( $SO^4Na^2$ ) ..... 5,5

Phosphate ( $PO^4Na^3$ ) ..... 5,5

**Propriétés.** — Spécifique des troubles de l'équilibre acide-base. Met à la disposition de l'organisme les éléments ioniques et les tampons permettant la reconstitution et le maintien de la réserve alcaline.

**Indications.** — Acidose, Alcalose, Arthritisme, Artériosclérose, Lithiases hépatique et rénale, Goutte, Hyperviscosité sanguine, Constipation.

**Doses.** — Une à deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

**Prix :** Le flacon : 22 francs (15 jours de traitement),

**Laboratoire PHYGIÈNE**

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

## SAL-SODYL

Sal-Sodyl N (Normal).

Sal-Sodyl S (Sulfaté).

Sal-Sodyl B (Bromuré).

**Présentation.** — Boîte de 25 prises de sel anhydre et pur.

**Composition et indications.** — *Sal-Sodyl N*: Phosphate, Citrate, Sulfate et Bicarbonate de Soude. Spécialement indiqué pour le traitement des gastrites, gastro-entérites et surtout hyperchlorhydries.

*Sal-Sodyl S* (Sulfaté) : Pour les hépatiques avec ralentissement des fonctions intestinales. Action particulièrement remarquable dans le syndrome gastro-entéro-hépatique.

*Sal-Sodyl B* (Bromuré) : Pour le traitement des dyspepsies nerveuses et des troubles spasmodiques viscéraux.

**Traitement.** — *Adultes :* à jeun ou au début des repas à la dose de 1 ou 2 prises dissoutes dans un demi-verre d'eau.

*Enfants :* 1 demi-prise.

*Bébés :* 1 quart de prise.

**Prix :** 17 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 496-27.

**Laboratoire du SERPENT.**

5, boulevard Gambetta, à GRENOBLE (Isère).

(Tél. : 16-40.)



## SALUBRINE

(Solution)

Antiseptique puissant.

## Composition :

Formolsulfonate de soude...	6,5	Essence de Thym.....	0,06
Thymol.....	0,02	Alcool à 90°.....	2,40

pour 100 grammes.

## Mode d'action :

Au contact des tissus vivants, la Salubrine possède une action antiseptique supérieure à celle du formol, car, à l'inverse de ce dernier corps, le formolsulfonate de Na n'exerce aucune action coagulante sur les tissus, ce qui facilite la pénétration de l'antiseptique (A. Lumière et Seyewetz).

## Non-toxicité de la Salubrine :

L'administration *per os* au lapin de 1 gr. 50 de formolsulfonate de Na durant 15 jours consécutifs n'entraîne aucun trouble (Loeb).

Le formolsulfonate de Na est préparé dans nos laboratoires à l'état pur suivant le procédé breveté J. Eury (Brevet français n° 673753)

**Indications.** — Traitement des plaies, furoncles, panaris, injections vaginales.

**Mode d'emploi.** — Pour les usages médicaux, chirurgicaux et obstétricaux : 1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau.

La Salubrine existe également sous forme de comprimés.

2 comprimés Salubrine = 1 cuillerée à soupe de Salubrine liquide

Prix : 10 fr.

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en pharmacie  
GENNEVILLIERS (Seine). (Tél. : Grés. 05-21.)

## SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

**Indications.** — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

**Comprimés :** avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

**Adultes :** 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas

**Cachets :** Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

**Adultes :** 2 cachets par jour.

Comprimés : 17 francs.

Cachets : 19 fr. 30.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie  
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Engien — PARIS.  
(Tél. : Provence 34-87.)

## SALVEBYL

(Granulé)

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux : artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, Urticaire, Prurigo strophulus.

**Posologie.** — *Enfants :* 1 cuillerée à café par jour.

*Adultes :* 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires RIOHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Engien —

PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

## SALVUROL

Gouttes.

Silice colloïdale ionisée en grains extrêmement fins.

**Propriétés.** — Élimine l'acide urique.

Rétablit l'équilibre acido-basique.

Prévient la précipitation de l'acide urique dans l'organisme (ainsi que des urates, phosphates et oxalates).

**Indications.** — URICÉMIE, Arthritisme. Goutte et rhumatismes goutteux. Artériosclérose et Hypertension. Névrites (sciatiques, lumbagies, migraines). Lithiase rénale et Lithiase vésicale. MANIFESTATIONS PRÉ-ALCALOSIQUES.

**Posologie.** — 5 à 10 gouttes dans un peu d'eau le matin à jeun, en alternant, pour débiter ; périodes de médication et de repos : 10 jours de Salvurol, 10 jours de repos.

Monter graduellement à 10 et même 20 gouttes dans les manifestations chroniques : lithiases, tophi, rhumatismes déformants.

Ne pas donner les Gouttes Salvurol au cours d'une crise goutteuse.

Laboratoire LE BRAZIDEQ

1, rue Moncey — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 41-80).

## SALYFRÈNE

« **Salicylate de Soude Actif, Toléré, Agréable.** »

*Deux formes* : Solution, Dragées glutinisées.

**Composition.** — Chaque demi-cuiller à café-Mesure (LXXX gouttes) renferme :

Salicylate de Soude ..... 1 gr.

(Recristallisé très pur)

Extrait de Frêne ..... 0 gr. 37

(Plante Fraîche stabilisée)

Extrait de Reine des Prés ..... 0 gr. 03

(Glucosides Salicylés).

Extrait de Pommes Reinettes .... 0 gr. 33

(Laxatif doux).

**Avantages.** — Salicylate extrêmement pur, activé par des extraits végétaux diurétiques. Saveur très agréable remplaçant totalement le goût nauséux du Salicylate. Gouttes concentrées permettant de mieux fractionner les doses.

Prix adapté : 23 fr. 50 les 30 gr. Salicylate.

**Indications.** — Toutes celles du Salicylate de Soude.

**Mode d'emploi.** — De 4 à 10 mesures par jour, toujours bien dilué (Eau alcalinisée ou Lait chaud).

Petites doses : LX gouttes (= 0 gr. 50 Salicylate) de 3 à 5 fois par jour.

**Nouvelle Forme.** — Dragées Glutinisées à 0 gr. 50 Salicylate. Les seules Dragées Glutinisées renfermant des extraits diurétiques « entourant » et « divisant » le Salicylate, et reconstituant la forme. Gouttes dans l'intestin. (Traitements ambulatoires. Cures de complément.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 996-1-2.

**Laboratoires du SALYFRÈNE**

210, Avenue de Toulon — MARSEILLE.

Téléphone : Gar. 01-93.

## SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

**Composition. Propriétés.** — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus, du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone, Aconit, Opium, Hypnal, Excipient glycérino-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

**Indications.** — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

**Formes. Posologie.** — *Élixir (adultes)* : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

*Gouttes (enfants)* : jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

**Laboratoires Georges TINARD**

134, bd Pereire — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Gal. 92-44.)

## SALYSÉRUM

Médication salicylée avec anesthésie locale. (Communication à l'Académie de médecine.)

**Indications.** — Toutes Algies rhumatismales, Rhumatisme aigu ou subaigu, Rhumatisme musculaire, Goutte, Sciatique, Lumbago, Torticolis, Pleurodynie, Rhumatisme gonococcique, Bourdonnements d'oreilles.

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique indolore.

**Doses.** — Algies rhumatismales : 2 à 4 ampoules chaque jour, au point douloureux. Bourdonnements d'oreilles : 1 à 2 cc. tous les 5 ou 6 jours.

**Prix** : 29 fr. 70 la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : Mal. 00-32.

## SALY-SULFITE

Salicylate de Soude, 0,25 — Hyposulfite de Soude, 0,25  
pour un comprimé glutinisé.

(comprimés ne se dissolvant que dans l'intestin).

Les propriétés du Saly-Sulfite sont les propriétés de ses deux composants : le salicylate de soude et l'hyposulfite de soude, avec cette particularité que l'association de ces deux médicaments provoque un renforcement mutuel de leurs qualités propres. L'association du soufre au salicylate représente une médication supérieure à celle du salicylate prescrit isolément.

**Indications.** — Rhumatismes, Infections des voies biliaires, de l'intestin, des voies urinaires, alcaloses urinaires, catarrhes des voies respiratoires.

### Mode d'emploi :

Avaler sans croquer, prendre 2 ou 3 comprimés en mangeant.

**Rhumatismes :** Légers, 4 à 6 par jour ; chroniques, 6 à 10 par jour ; aigus, 10 à 16 par jour.

**Infections urinaires (colibacillose) :** 6 à 12 comprimés par jour.

**Infections hépatiques et intestinales (fermentations, prurits urticaires) :** 6 à 8 comprimés par jour.

**Catarrhe des bronches, sclérose des vaisseaux :** 6 comprimés par jour.

Prix : 18 francs, 66 dragées.

L. N. C. M. sous le n° 1606-10.

Laboratoire MOURE-P. COTARD, Pharmacien

Passage des Princes, PARIS (2<sup>e</sup>). (Tél. : Ric. 82-56.)

## SANARGOL

### Composition :

Argent colloïdal, hexaméthylène tétramine recristallisée dans l'alcool, salicylate de phényle, charbon de peuplier porphyrisé, charbon animal activé.

Une seule forme : granulé friable, aromatisé à l'anis.

### Indications :

Désinfection intestinale, vésicale et biliaire. Fermentations, entéro-colites, flatulence, intoxications d'origine exogène et endogène. **Colibacilliose** Affections rénales, vésicales : cystites, néphrites.

### Posologie :

**Adultes :** 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas.

**Enfants :** 1/3 à 1/2 de la dose.

Un flacon suffit pour un traitement de 15 jours.

Le **SANARGOL** ne constipe pas.

Enr. au L. N. C. M. n° 1389-1.

Laboratoires **BARDOU**

13, quai Ragobert — JOIGNY (Yonne).

## SANAS

### Composition :

Extrait glyciné concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, ne contenant aucune substance irradiée artificiellement.

### Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du **Sanas**, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

### Formes :

Gouttes.

### Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.

Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

### Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

### Posologie :

**Enfants :** Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

**Adultes :** Dose journalière : L à LX gouttes.

### Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 20 fr. 60.

**A. WELCKER** et Cie

22, r. de l'Est — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-39.)

## SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

**Propriétés.** — Assure un sommeil paisible et naturel, d'une durée normale, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite, également par les personnes âgées, les affaiblis, les convalescents.

**Indications.** — Toutes les insomnies.

**Posologie.** — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

**Présentation.** — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

### PRODUITS SANDOZ

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII).

## SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

*Indications :*

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dyménorrhée, Prévention des accidents allergiques.

*Présentations :*

Comprimés à 0 g. 025 (tubes de 20). **Prix : 13 fr. 80**

*Posologie et mode d'emploi :*

Deux à six comprimés à 25 mg. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus et les prostatiques.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cm<sup>3</sup>. renfermant : Sanédrine (0 g. 02), et Rénaléptine (0 g. 0002) — (boîtes de 10 amp.).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## SANEX-INHALANT

**Indications.** — Traitement des Affections aiguës et chroniques des Voies respiratoires supérieures : Coryza, Rhinite, Laryngite, Trachéite, Coqueluche, Grippe, Ozène, Angine, Asthme.

**Composition.** — Essences aromatiques et balsamiques de la région provençale, rendues très volatiles par l'addition d'un solvant : Pin sylvestre, Lavande, Eucalyptus, Thym, Menthe.

**Propriétés.** — Décongestionne et aseptise la muqueuse rhino-bronchique, atténue l'inflammation et réduit rapidement les sécrétions et l'expectoration.

**Mode d'emploi.** — Quelques gouttes sur le mouchoir en inhalations, plusieurs fois par jour.

Prix : 11 fr. 80 le tube.

Echantillon sur demande aux

**Laboratoires PILLIER**

8-10, rue Masséna — NICE (Alpes-Maritimes).

## SANICÉRÈNE

**Marcel LOGEAS**

Imprégnation salicylée buccale.  
Puissante action antiseptique.

**Indications :**

Adjuvant du traitement sérique dans angines diphtériques ou suspectes, et toutes autres formes d'angine.

**Présentation :**

Dragées : 6 à 8 par jour.

Collutoire à 1/10 : un badigeonnage matin, midi et soir.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

**Thiosulfate d'or et de sodium  
et OLÉO-SANOCRYSINE**

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc. Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

Les circonstances économiques actuelles et la raréfaction de plus en plus sévère des matières premières ne permettent plus d'assurer une fabrication et une vente régulières de ce produit.

**Valentin AAGE MOLLER**

57, rue Pierre-Duhem — BORDEAUX

(Tél. 807-85).

Dépositaire pour la France et Colonies :

**Jean DEDIEU, pharmacien**, 39, rue l'ondaudège  
BORDEAUX

## SANOFORMINE

**Composition.** — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

**Forme.** — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

**Indications thérapeutiques et posologiques.** —  
1<sup>o</sup> Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;  
2<sup>o</sup> Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

La boîte de 50 comprimés. Prix : 21 fr. 30.  
15 jours de traitement.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Passy 51-12.

A BRUXELLES :

**LE MARINEL, Pharmacien**,  
4, avenue Orban.

## SANOGLY

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites. Stomatites simples mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 8 fr. 50.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>**, pharmaciens

Marques de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

## SANOQUINOL

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

**CIBA**

MÉDICAMENT ANTI-ARTHRITIQUE.

CURES PROLONGÉES D'ÉLIMINATION URATIQUE.

**Action thérapeutique.** — Exerce sur l'organisme une action lixivante caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, une stimulation des fonctions hépatique et rénale : augmentation de la sécrétion biliaire et diurèse abondante, éliminatrice des déchets de l'organisme.

**Indications.** — Toutes les manifestations de l'arthritisme. A titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, les obèses, hérpétiques et rhumatisants. Après les maladies infectieuses.

**Doses.** — 1 à 4 cuill. à café de granulé p. j. (aux repas).

**Formuler.** — Flacon de 20/30 doses.

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

## SANTAL MIDY

**Composition.** — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Mysore, préférable au Copahu, au Cubébe et à l'essence de térébenthine.

**Forme.** — Capsules.

**Caractéristiques.** — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

**Indications.** — Blennorrhagie. Infections de l'appareil urinaire : urétrites, cystites, pyélonéphrites.

**Doses.** — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties, que l'on prend à distance égale et au moins un quart d'heure avant les repas.

Prix : 25 francs le tube de 40 capsules.

**Laboratoires GRIMAUULT**

Fondés en 1856

51, rue François-1<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Bal. 20-70.)

## SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

**Forme.** — Capsules gélatineuses.

**Composition.** — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques .....	0 gr. 16
Bleu de Méthylène.....	0 gr. 02

**Propriétés.** — Antigénococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique, le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des affections des Voies urinaires.

**Indications.** — Blennorrhagie, Cystites, Pyuries, Prostatites, Colibacillose urinaire.

**Particularités.** — Colore les urines en bleu.

**Doses.** — 6 à 10 capsules par jour.

Le flacon de 50 capsules : 25 fr. 80.

**Laboratoires MONAL**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Invalides 52-73.)

## SANTAMIDE

**Infections à gonocoques, à colibacilles, à streptocoques ou à staphylocoques.**

**Forme.** — Capsules gélatineuses :

**Composition :**

Essence de Santal.....	0,12
Baume de Gurgum.....	0,12
Para-aminophénylsulfamide .....	0,25

pour 1 capsule

**Propriétés.** — Puissant bactéricide, d'action élective sur le gonocoque, analgésique, Balsamique, Décongestif, Diurétique.

**Indications.** — Gonococcies aiguës et chroniques, Pyuries, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Infections à colibacilles, à streptocoques ou à staphylocoques, Cervicités.

**Posologie :**

**Gonococcies :** les 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> jours : 2 capsules 6 fois par jour ;

Les 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> jours : 2 capsules 4 fois par jour ;

Les 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> jours et jours suivants : 2 capsules 2 fois par jour.

**Infections à streptocoques, à staphylocoques et à colibacilles :** 4 à 6 capsules par jour à intervalles réguliers.

**Prix :** 29 fr. 30 le tube.

**Laboratoires MONAL**

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Inv. 52-73.)

## SANTHÉOSE

**Composition.** — Théobromine d'une pureté parfaite, de préparation rigoureusement identique. S'administre seule ou associée.

**Propriétés.** — Diurétique cardio-rénal, complètement inoffensif, d'une efficacité remarquable et d'une fidélité constante.

**Six formules.**

**Santhéose pure.** — Affections cardio-rénales, Artériosclérose, Albuminurie, Urémie. (Dose 0 gr. 50 et 0 gr. 25.)

**Santhéose Caféinée.** — Asthénie, Asystolie, Œdèmes, Maladies infectieuses. (Dose 0 gr. 50.)

**Santhéose Lithinée.** — Presclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle. (Dose 0 gr. 75.)

**Santhéose Phosphatée.** — Sclérose cardio-rénale, Anémie, Convalescences, Intoxications. (Dose 0 gr. 75.)

**Santhéose Scillitique.** — Hydropsies d'origine cardiaque. (Dose 0 gr. 55.)

**Santhéose Spartéinée.** — Etats asystoliques et Atonie cardiaque. (Dose 0 gr. 525.)

**Forme.** — Se présente en cachets ayant la forme d'un cœur. Boîtes de 24 cachets.

**Mode d'emploi** — 1 à 4 cachets par jour entre les repas.

Enregistrée au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 104-1, 2, 3, 4, 5 et 6.

**Traitement.** — Selon prescription médicale.

**Laboratoire de la SANTHÉOSE**

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Arc. 95-60.)

## SANTONIA VENOT

Vermifuge énergique pour la destruction des vers intestinaux, quelle qu'en soit l'espèce (sauf le ver solitaire).

### Formule :

Santonine.....	0 gr. 005
Calomel.....	0 gr. 02
Semen-contrà, riche en essence.....	0 gr. 10

Par comprimé (tube de 12 comprimés). Prix : 8 fr. 10.

**Indications.** — Le SONTONIA VENOT est le remède rêvé pour la destruction des oxyures, ascaris, tricocephales, ankylostomes, etc.

### Mode d'emploi :

Enfants à partir de 3 ans : 1 comprimé le matin pendant 3 jours.

De 6 à 12 ans : 1 comprimé le matin pendant 6 jours.

Adultes : 2 comprimés le matin pendant 6 jours.

Faire plusieurs séries de traitement.

### Laboratoires VENOT

Docteur en pharmacie

139, avenue Émile-Zola. — PARIS (XV\*).

(Tél. : Suffren 68-20.)

## SAPOLAN

Onguent de Naphthé spécial.

Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens. Prix : 12 francs.

**Sapocrème.** — Crème de SAPOLAN, Adoucissante, antiprurigineuse, Dermites aiguës. Prix : 15 fr. 70.

**Sapocade.** — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis, Séborrhée, Sycosis. Prix : 15 fr. 70.

**Lait de Sapolan.** — Erythèmes.

**Lait de Soufre Sapolan.** — Acné. (Prix : 17 francs

**Lait de Cèdre Sapolan.** — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. ) et 26 fr. 30.

**Poudre de Sapolan.** — Dermites aiguës. 15 fr. 70.

L. N. C. M. : nos 20-7, 1, 3, 2, 9, 8, 4, 11.

Laboratoire du Dr R. OAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI\*).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

## SAPOLINOL

Complexe stérile et rigoureusement atoxique de savons purs et huiles essentielles déterpénées.

**Composition.** — Le Sapolinol liquide chirurgical contient en dissolution intégrale 40 % d'essences antiseptiques, sans traces de terpènes.

**Propriétés générales.** — Antiseptique physiologique remarquable, cicatrisant, cytophylactique et absolument inoffensif, quelle que soit la dose employée.

### Présentations diverses :

#### 1° Sapolinol liquide chirurgical :

a. Flacon grand modèle, dit Hôpital. Prix : 25 francs.

b. Flacon petit modèle, dit Normal. Prix : 15 francs.

c. Flacon stilligoutte, dit Toilette. Prix : 17 francs.

2° Sapolinol crème. En tube. Prix : 9 francs.

3° Sapolinol ovules. En boîte de 6. Prix : 15 francs.

4° Sapolinol dentifrice. Flacon-Stilligoutte.

Prix : 15 francs. Demi-flacon. Prix : 8 francs.

### Indications et mode d'emploi :

#### Sapolinol liquide :

1° *Traitement des plaies :* a. Solution de SAPOLINOL diluée à 10 %, en applications recouvertes d'un pansement ; b. Solution à 50 % pour les plaies de petite étendue et très infectées.

2° *Gynécologie et hygiène journalière :* 1 à 2 cuillerées à soupe de SAPOLINOL dans un bock de 2 litres d'eau bouillie, plus ou moins chaude suivant le cas.

**Sapolinol crème :** ne contient aucun corps gras ; indiquée dans toutes les dermatoses, enfants et adultes.

**Sapolinol ovules :** décongestionnant remarquable. En application le soir et suivis le matin d'une injection.

**Sapolinol dentifrice :** quelques gouttes sur la brosse à dents assurent nettoyage et désinfection parfaite de la cavité buccale. Chez tous enfants et adultes, il est indispensable à l'entretien des appareils de prothèse.

### Laboratoires du SAPOLINOL

38-40, cours Richard-Vitton — LYON.

## SAPOREX

(Liquide).

**Composition :** Savon liquide, neutre, stérile, impeccable, associé au THYMOL, glycérine et essences aromatiques naturelles et déterpénées,

**Formule :**

Essence de Lavande.....	0,35	Glycérine chimique pure à 30°.....	5,00
Essence de Thym.....	0,13	Santal.....	0,07
Essence de Citronnelle.....	0,08	Thymol.....	0,10
Essence de Verveine.....	0,07	Savon liquide Q. S. P. 100	

**Indications. — Gynécologie. Obstétrique :** 1 cuillerée à soupe par litre d'eau en irrigations et savonnages.

**Oxyurases :** 1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède, en petit lavement, savonnage de la région anale. (Traitement 5 jours, Repos 5 jours.)

**Désinfection et pansement des plaies :** (Vives, atones, brûlures) : dilution 10 à 20 %.

**Constipation :** Lavement antiseptique et désodorisant. 1 cuillerée à soupe par litre d'eau.

**Séborrhée, grasse et sèche :** 1 cuillerée à soupe pour un verre d'eau.

**Acnés (juvénile et rosacée), Sueurs profuses :** Onction au Saporex pur jusqu'à absorption (application au coucher pendant 8 à 10 jours).

**Prurits, Furoncles :** Dilution 10 % en lavages ou compresses chaudes.

**Toilette intime. Toilette des bêtes (Préventif de l'érythème fessier).**

**Désinfection de la bouche et des dents :** quel. gout. dans un verre d'eau.

Flacon G. M. (500 gr.) : 24 fr. 50. Flacon P. M. (250 gr.) : 14 fr. 50.

**Produits aux principes actifs de Saporex :** *Ovules Saporex* (Voir *Ovules*). *Bloc Saporex* (savon solide). *Dentifrice Saporex*. *Réductif Saporex*. *Baume Saporex*. *Conditions spéciales à M.M. les Docteurs.*

**Laboratoires SAPOREX, S. A. R. L.**

184, route de Genns — LYON (III<sup>e</sup>)

(C. C. Postaux : 96-04 LYON. — Tél. : Villeurbanne 93-88.)

## SAPOSIDE

**Composition. —** Saponine du gayac, non hémolytique et non toxique.

**Indications. —** Fixe la cholestérine, en favorise l'élimination. Accélère la résorption du calcium. Arthritisme, Dermatoses, Sang lourd, hyper-visqueux. Hypertension.

**Formes :**

1<sup>o</sup> Ampoules de 5 cc. à 2/1 000<sup>e</sup>, injectables.

2<sup>o</sup> Flacon de solution à 4 % ingérable.

**Posologie :**

1<sup>o</sup> SAPOSIDE Ampoules : 2 à 3 ampoules de 5 cc. par semaine. 31 fr.

L. N. C. M. : 20-16.

2<sup>o</sup> SAPOSIDE Gouttes : XXV gouttes 2 fois par jour pendant 3 semaines : 28 fr. 70 (3 semaines).

L. N. C. M. : n° 20-17.

**Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS**

29, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Aut. 65-97.)

## SAPROXYL

**Composition et propriétés. —** Complexe glucidique agissant physiologiquement sur les infections, fermentations et putréfactions intestinales, en favorisant le développement de la flore acidogène normale et en plaçant les bactéries de la putréfaction dans un milieu acide défavorable (pH trop bas).

**Forme. —** Comprimés.

**Indications. —** Entérites (aiguës, subaiguës ou chroniques). Gastro-entérites. Côlites (ascendante ou transverse). Fermentations intestinales. Diarrhées. Infections intestinales spécifiques : Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Dysenteries, Salmonelloses, Cholérines, etc.,

**Posologie :**

Trois fois 6 comprimés par jour, avalés avec un peu d'eau avant les repas. Au fur et à mesure de l'amélioration, diminuer progressivement jusqu'à la dose d'entretien : 3 fois 2 comprimés par jour.

Prix : La boîte de 140 comprimés environ (8 à 18 jours) : 18 fr. 90.

**Laboratoire PHYGIÈNE**

7, rue Lucien-Jeannin — LA CARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

## SARCOPTOL

**Solution complexe à base de soufre colloïdal, acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatoluïque, savons, essences.**

**Indications. —** Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit. Prophylaxie de la Furonculose, Parasiticide. Spécifique de la gale en application sans frotte et sans bain.

**Avantages. —** Ne tache ni le linge ni la peau ; d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes

— 120 —

**Laboratoire du Sarcoptol**

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Étoile 29-54.)



## SARIDON

**Composition :** Formule nouvelle :

Phényldiméthylisopropylpyrazolone .....	0 g. 15
Acétylparaphénétidine .....	0 g. 25
Allylisopropylacétylcarbamide .....	0 g. 06
Triméthylxanthine .....	0 g. 05

Pour un comprimé.

**Propriétés.** — Jugule la douleur, supprime les maux de tête, apaise la fièvre, calme l'éréthisme nerveux. Aucune possibilité d'accumulation, aucun danger d'accoutumance, aucun risque de toxicomanie.

**Indications.** — Algies, névralgies, migraine, grippe, rhumatisme, maux de dents, sinusite, otite, etc...

**Posologie.** — 1 à 3 et même 4 comprimés par jour. A prendre avec un peu d'eau ou de liquide quelconque. *Enfants :* 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Boîte de 10 comprimés.

Enr. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 504-63:

**Produits « ROOHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Archives 91-10)

## SAUCHOLINE

**Forme.** — Granulé soluble sucré et aromatisé à la framboise.

**Composition.** — Peptone pure de viande et sulfate anhydre de magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Cholagogue puissant. Agit sur l'ensemble des fonctions hépatiques : biliaire, glycogénique, antitoxique. Assure la sécrétion régulière de la bile et un drainage rationnel des voies biliaires.

**Indications.** — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Ictère, Cholécystite, Lithiase biliaire, Troubles digestifs ayant une cause hépatique, Inappétence, Nausées, Constipation par insuffisance biliaire, Urticaire, Vertiges, Migraine.

**Mode d'emploi.** — Prendre la Saucholine le matin à jeun dans un peu d'eau chaude. S'étendre ensuite pendant 1/4 d'heure sur le côté droit.

*Adultes :* 1 à 3 cuillerées à café.

*Enfants au-dessus de 3 ans :* 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

**Laboratoires de V. BATTU**  
Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL — PARIS

## SCILLARÈNE

*Adopté par les Hôpitaux de Paris.*

**Composition.** — Glucoside cristallisé, principe actif du Bulbe de la Scille.

**Formes.** — Comprimés à 0 mgr. 8 de substance active, solution à 0 mgr. 8 pour XX gouttes ; ampoules pour injections endoveineuses ou intramusculaires profondes de 1 cc. à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 mgr.

**Propriétés.** — Produit pur d'action invariable. Cardiotonique et diurétique général et *azoturique*. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

**Indications.** — 1° Cœur sénile ; 2° maintien de la compensation ; 3° puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai*.

**Posologie.** — 1/2 à 1 ampoule par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour.

**PRODUITS SANDOZ**

**B. Joyeux, Docteur en Pharmacie**  
20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## SCILLITRINE

**Composition.** — Chaque dragée contient : II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100<sup>e</sup>, 2 cgr. d'Extrait de Scille stabilisée, 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Phényléthylmalonylurée.

**Propriétés.** — Antispasmodique par la Trinitrine et la Phényléthylmalonylurée. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

**Noyau mou.** — Ces substances sont réunies dans un noyau mou qui en permet l'absorption *per orale* lorsqu'on *croque lentement* les Dragées. A cette absorption *per orale* succède une action immédiate.

**Posologie.** — Elle est double du fait de l'existence du Noyau mou.

1. *Croquer lentement* de 2 à 4 dragées de Scillitrine en 10 minutes pour juguler les crises.
2. *Absorber*, aux repas, 3 dragées de Scillitrine, *pro die*, pendant 15 jours par mois pour faire disparaître les Troubles fonctionnels des hypertendus.

### Indications :

- 1<sup>o</sup> *Les crises* : Crises d'Angor, d'Hypertension paroxystique, de Tachycardie paroxystique, d'Aérogastrie, d'Aérocolie, d'Asthme, d'Anxiété, Crises des faux cardiaques, des Basedowiens ;
- 2<sup>o</sup> *Traitement d'entretien des hypertendus* chez lesquels l'absorption par voie gastrique fait disparaître les troubles fonctionnels.

**Présentation.** — Boîte contenant 45 dragées. Durée moyenne : 1 mois.

**Prix :** 25 fr. 80.

**Laboratoire PERRIER**

12, rue Henner — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trinité 51-03.)

## SCLERANA

Ancien nomenclature : **SCLEROSERUM ANA**

**MÉDICATION SCLÉROSANTE**

(Formule de Vendel.)

**Composition.** — Solution à diverses concentrations de chlorhydrolactate double de quinine et d'urée ANA.

*Présentations commerciales et concentrations à employer :*

**I<sup>o</sup> Sclerana hydrocèle (30 %).**

*Indications :* Hydrocèles, Hygromas, Bursites, Affections kystiques, Abscesses froids.

**II<sup>o</sup> Sclerana Varices (25 %).**

*Indications :* Varices (dilutions diverses), Fistules (diluer à 10 %), Hydarthroses (diluer à 5 %), Trachomes, Prurit anal et génital (diluer à 2 %).

**III<sup>o</sup> Sclerana O. R. L. (7,50 %).**

*Indications :* Rhinites congestives.

**IV<sup>o</sup> Sclerana Hémorroïdes (5 %).**

*Indications :* Hémorroïdes, Fissures anales.

**Posologie.** — Réclamer aux Laboratoires ANA l'opuscule édité par leurs soins.

**Propriétés.** — Activité, Innocuité, Fidélité des résultats.

**Prix de chaque traitement :**

Varices.....	62 fr. 60
Hémorroïdes .....	42 fr. 40
O. R. L. ....	42 fr. 40
Hydrocèles .....	42 fr. 40

**Laboratoires « ANA »**

**Docteur VENDEL et C<sup>ie</sup>**

16-18, avenue Daumesnil — PARIS  
(Tél. : Dorian 52-12.)

18, rue Lafon — MARSEILLE  
(Tél. : Lycée 5<sup>e</sup>-74.)

## SCLÉROLYSINE DUCATTE

Thérapeutique de l'Artériosclérose et de l'Athérome.

Solution colloïdale de phosphatides organiques. Médication hypotensive dissolvante des dépôts artériels.

**Action thérapeutique.** — Est indiquée dans le cas d'artériosclérose confirmée, chez tous les sujets qui présentent les petits symptômes de la pré-sclérose. Prescrite toutes les fois que la tension artérielle est élevée, la *Sclérollysine* réussit à diminuer l'hypertension puis à la faire disparaître.

**Posologie. Mode d'emploi :**

**Trois formes :** Solution, en flacon de 100 gr. Ampoules de 2 cc., en boîte de 8, Dragées de 1 gr. 25, en flacon de 20.

**Solution :** 2 à 4 cuillerées à café par jour, une demi-heure avant chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

**Ampoules :** une injection sous-cutanée chaque jour pendant 15 jours. Continuer le traitement *per os* avec la solution en alternant l'un et l'autre.

**Dragées :** 2 à 4 dragées par jour, une demi-heure avant les repas. Cette forme facilite l'usage de la *Sclérollysine* et en assure une bonne conservation dans tous les pays chauds.

Aucune contre-indication.

**Durée minimum du traitement :** Séries de 1 à 3 mois.

Prix : Solution ou ampoules, 29 francs ; Dragées, 26 fr. 70.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-11 à 240-13.

**Laboratoires DUCATTE**

191, rue Saint-Honoré — PARIS. (Tél. : Opéra 68-80.)

## SCOPHÉDAL MERCK

Composition :

Bromhydrate de scopolamine..	0 gr. 0005	Éphédrine.....	0 gr. 025
Eucodal .....	0 gr. 01	Eau distillée ....	1 cm <sup>3</sup> .

Par ampoule.

**Propriétés.** — Analgésique et narcotique par l'action combinée de l'Eucodal et de la scopolamine ; la toxicité de cette dernière étant considérablement diminuée par l'addition d'Éphédrine qui prévient la paralysie respiratoire, élève la pression sanguine, stimule l'activité cardiaque.

**Indications.** — Anesthésie de base, préparation des malades à l'anesthésie générale ou locale.

**Présentations.** — Boîtes de 10 ampoules. En vrac, pour les hôpitaux, par 50 ampoules (tableau B).

**Posologie.** — La veille de l'opération, 1 comprimé de PHÉNO-DORME. Le jour de l'intervention, 1 heure 1/2 avant celle-ci, 1 ampoule de SCOPHÉDAL par voie hypodermique ; au besoin, une deuxième injection d'une demi ou d'une amp., également par voie sous-cutanée 1 heure plus tard.

Le SCOPHÉDAL peut aussi être employé en injections intra-veineuses. (Voir littérature détaillée à ce sujet.)

**Laboratoires SANOMÉDIA**

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trinité 14-86.)

## SCOPOLAMINE HOUDÉ ou HYOSCINE HOUDÉ

Granules titrés à 1/5 de milligramme.

Granules de bromhydrate d'hyoscine — ou bromhydrate de scopolamine — ces deux alcaloïdes étant identiques.

**Propriétés.** — *Sédatif du pneumogastrique.* Calmant et antispasmodique aux doses faibles, stupéfiant et paralysant aux doses fortes. Accélérateur du pouls. Vaso-dilatateur. Tonique (chez les parkinsoniens).

**Indications.** — Chorées, myoclonies, tremblements. Parkinsonisme (action élective sur la rigidité). Énurésie. Calmant pour les anxieux et les aliénés.

**Posologie.** — 1 à 5 granules *pro die*. Ne pas prescrire aux enfants, aux vieillards, aux insuffisants cardio-rénaux. Suspendre en cas de vision brouillée.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 40-58.)

## SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

**Solutions :** en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non de Rénaleptine, pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## SÉDABIOS

**Présentation.** — En boîtes de 3 ampoules de 2 cc. (16 fr. 70) et en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (33 fr. 40).

**Principes actifs.** — Bromhydrates des alcaloïdes totaux de l'opium renfermant 50 p. 100 de morphine, bromhydrate de scopolamine et bromure de sodium.

**Indications.** — Préanesthésique puissant, présente de très grands avantages en chirurgie. Analgésique et sédatif du système nerveux, hypnotique puissant. En médecine, est indiqué dans tous les phénomènes douloureux, insomnies, etc.

**Mode d'emploi.** — En injections hypodermiques soit intraveineuses ou intramusculaires à la dose de 1/2 ampoule, soit 1 cc., ou d'une ampoule entière de 2 cc.

En chirurgie, il est bon de faire une injection intraveineuse 45 minutes avant l'opération, et dans le cas où celle-ci se prolonge, en faire une autre 45 minutes après le début de l'intervention.

Tenir compte de ce que l'injection intraveineuse agit beaucoup plus vite que l'injection intramusculaire.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-49.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## SÉDACÔNES

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-38.

**Forme.** — Suppositoires.

**Composition.** — Butyléthylbarbiturate de pyramidon, associé à un spasmolytique; cypressus sempervirens; marron d'Inde.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Spasmolytique, sédatif de la douleur, décongestif, hypnogène.

**Indications.** — Toutes les douleurs du petit bassin et de la région ano-rectale : douleurs des règles et de la zone génitale chez la femme; douleurs prostatiques chez l'homme; spasmes et crises douloureuses de la musculature lisse; assure un sommeil calme et un réveil normal.

**Posologie.** — Un à deux suppositoires par jour suivant l'intensité de la douleur.

La boîte de 6 suppositoires : 17 fr. 50.

### Laboratoires A. BAILLY

#### (SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30.)

## SEDANGOR

Dragées à noyau mielleux.

### Formule :

Érythrite tétranitree.....	0,001
Trinitrine à 1 % .....	0,025
Caféine .....	0,015
Théobromine .....	0,01
Phosphate sodique .....	0,01
Chl. éthylmorphine .....	0,0032
Excipient spécial .....	Q. S.

P. 1 dragée à noyau mielleux.

**Indications.** — Hypertension artérielle et ses manifestations. Angor Pectoris, Asthme cardiaque, Œdème pulmonaire, Aortites, etc. L'érythrite tétranitree renforce et prolonge l'action immédiate, mais fugace de la trinitrine.

**Posologie.** — Croquer les dragées par une à la fois.

Dose maxima : 10 par jour, 3 en cinq minutes.

**Présentation.** — Etui de 60 dragées.

Prix au public : 25 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1025-6.

M. GADREAU, Docteur en pharmacie,  
Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
SAVIGNY-SUR-ORGE (Seine-et-Oise).  
(Tél. : Juvisy 398.)

## SÉDAORTINE

Préventif et curatif de l'angine de poitrine.

**Composition.** — Dragées rouges à noyau pâteux contenant exactement par dragée :

Trinitrine en solution au centième.....	III gouttes.
Codéine .....	I cgr.
Phényléthylmalonylurée .....	15 mgr.
Caféine .....	3 cgr.
Benzoate de soude .....	10 cgr.
Excipient sucré, Q. S. pour une dragée.	

**Propriétés.** — La Sédaortine est un médicament préventif d'abord et toujours curatif de l'Angine de Poitrine, elle calme toutes les douleurs voisines du cœur et de l'aorte.

**Indications thérapeutiques.** — Angine de poitrine, spasmes artériels, aortites, douloureuses, insuffisance ventriculaire gauche (Cf. *Journal de Médecine de Paris*, avril-mai 1935).

**Mode d'emploi.** — Croquer une de ces dragées :

1<sup>o</sup> Le matin dès le réveil.

2<sup>o</sup> Avant tout effort physique.

3<sup>o</sup> Avant l'horaire des douleurs (s'il en existe un).

4<sup>o</sup> Pendant une douleur.

Dose moyenne : 3 à 6 dragées par 24 heures. Après amélioration, continuer pendant un an à prendre 1 à 2 dragées par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-9.

En boîte de 30 dragées.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE  
72, Quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Botzaris 38-78.)

## SÉDARTHRYL

**Médication synergique du rhumatisme articulaire et des arthrites.**

Salicylate de Sodium ..	5 gr. 859	Benzoate de Lithine...	0 gr. 65
Salicylate de Potassium	1 gr. 22	Aspirine .....	0 gr. 08
Salicylate de Calcium ..	1 gr. 432	Azotate de Potasse ....	2 gr.
Teinture de Colchique ..	0 gr. 65	Iodure de Sodium .....	1 gr. 50
Benzoate de Sodium ..	0 gr. 65	Antipyrine .....	1 gr. 58

Excipient Q. S. P. 100 gr.

Flacon pour 10 jours de traitement.

**Particularités.** — Association hyperactive des 3 salicylates, aux diurétiques et à l'iodure de Sodium.

**Emploi.** — *Cas chroniques* : 3 fois par jour 2 cuillerées à café, au milieu des repas.

*Cas aigus* : De 8 à 12 cuillerées à café dans de la tisane ou dans de l'eau. *Dragées* : Salicylate 0 gr. 50 par dragée. Iode, soufre, glycérophosphate de soude et Hoang-Nan surajoutés.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu et surtout chronique, douleurs articulaires. Arthrites rhumatismales et tuberculeuses.

Inscrit au Labor. National de Contrôle N° 742-18.

P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie,  
32, rue de l'Ouest — PARIS

## SEDATAN

(ex-Sédotan)

**Dragées**

**Composition.** — Extrait de Gui stabilisé, Cholélate de Soude, Bromhydrate d'Yohimbine, Phényléthylbarbiturate de Quinine.

**Indications.** — Hypertension ; Spasmes cardiaques douloureux ; Érithisme, palpitations, angoisses, points, céphalées des hypertendus.

**Posologie.** — 4 à 6 dragées par jour, avant les repas ; prendre pendant 10 à 12 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Prix : 20 francs. L. N. C. 1219-3.

**Laboratoire LEDENT**

MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-60.)

## SÉDATIF GOBEY

**Composition :**

Bromure de calcium.....	2
Extrait de valériane.....	0,25
pour 100 grammes de sirop.	

**Indications.** — Tous les états nerveux et spasmodiques de l'enfance.

**Présentation.** — Flacon de sirop de 150 cc.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

*Nourrissons* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : Le flacon : 14 fr. 70.

**Les Laboratoires du Dr ROUSSEL.**

Laboratoires Gobey.

S. A. au capital de 880 000 francs.

R. C. Seine 223.195 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## SÉDATONYL

**Traitement de choix des déséquilibres Vago-sympathiques et Psycho-Endocriniens.**

**Forme. — Gouttes.**

**Composition. — X gouttes contiennent :**

Phényléthylmalonylurée .....	0,01
Hyposulf. de Magnésium .....	0,075
Extrait fl. de Cratægus.....	0,05
Extrait glyc. de Matière Cérébrale .....	0,025
Extrait glyc. de Moelle épinière .....	0,025
Extrait glyc. Orchitique .....	0,020

**Propriétés thérapeutiques.** — Par son action à la fois sédative, tonique et reconstituante du Système nerveux, ainsi que par le choix judicieux de ses composants, le **Sédatonyl** représente la médication la plus complète pour le traitement de toutes les dystonies neuro-végétatives et des états dépressifs. En effet, le **Sédatonyl** réalise dans une même préparation une action sédative par la **Phényléthylmalonylurée**, régulatrice du tonus vago-sympathique et reminéralisatrice par l'**Hyposulfite de Magnésium**, toni-cardiaque par le **Cratægus Oxyacantha**. Il est de plus tonique et reconstituant par la présence d'extraits opothérapiques antiasthéniques (substance cérébrale, moelle épinière, orchitique).

**Avantages.** — La présentation du **Sédatonyl** sous forme liquide et rigoureusement stabilisée permet une absorption plus rapide de la **Phényléthylmalonylurée**, qui se trouve mieux assimilée et agit à des doses moins élevées. De plus, cette forme « gouttes » permet une posologie plus souple et mieux adaptée à chaque cas particulier.

**Indications.** — Anxiété, Hyperémotivité, Angoisses, Palpitations, Troubles cardio-vasculaires, Vertiges, Insomnies et cauchemars, Surmenage, Dépressions nerveuses, Troubles de la vie génitale et toutes Asthénies physiques et psychiques.

### Posologie moyenne.

**Adultes :** XX à XXX gouttes trois fois par jour ;

**Enfants :** V à XV gouttes trois fois par jour suivant l'âge. A augmenter ou à diminuer suivant l'effet produit.

**Prix :** Le flacon de 24 cc. : 28 fr. 60 (toutes pharmacies).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1907-1.

**Les Laboratoires « MÉDICIA »**

L. NEUVILLE, Pharmacien

7, Impasse de la Sous-Préfecture — ROANNE (Loire).

## SÉDATUSSINE

### Composition :

Poudre de racine d'aconit .....	0,03 ctg.
Extrait de Belladone .....	0,01 —
Dionine .....	0,01 —
Bromhydrate de Codéine .....	0,01 —
Extrait de Drosera .....	0,02 —

Pour 1 comprimé.

**Indications.** — Par l'action synergique de ses cinq composants qui agissent sur toute l'étendue de l'appareil respiratoire, c'est le médicament spécifique de la *Toux*, quelle qu'en soit la cause : *Affections du Larynx*, de la *Trachée*, des *Bronches*, des *Bronchites*, crises dyspnéiques asthmatiformes, crises d'asthme ; *Tuberculose pulmonaire* ou *Maladies déterminant des toux réfractes*. C'est le complément indispensable de toute cure hydrominérale à Caunterets, Luchon, Amélie-les-Bains, Le Mont-Dore, La Bourboule, Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes, etc.

### Posologie :

Chez l'*Adulte* : de 2 à 5 comprimés par 24 heures.

Chez l'*Enfant* : au-dessus de 10 ans seulement : de 1 à 2 comprimés suivant l'âge. Prix : 19 fr. 75.

Laboratoires de la **SÉDATUSSINE :**

**A. JOURDIN**

6, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Passy 92-54.)

## SED'HORMONE

*Reconstitution des hormones bromées neuro-sédatives par le Dibromocholestérol.*

**Composition.** — Le Dibromocholestérol est un composé bromé organique ; possédant pour l'hypophyse et les centres nerveux une affinité particulière, il exerce, à la dose de quelques centigrammes, une action neuro-sédative supérieure à celle de plusieurs grammes de bromure. Actif à faible dose, il n'expose jamais aux inconvénients et aux dangers des bromures. Il ne crée pas d'accoutumance. Son action, remarquable dans les grands syndromes d'excitation et contre l'insomnie, vient probablement de ce que son affinité pour l'hypophyse lui permet d'assurer dans les meilleures conditions la reconstitution des hormones bromées d'origine hypophysaire, qui sont la forme active du brome dans l'organisme (Zondek et Bier).

**Indications.** — Hyperexcitabilité nerveuse. Insomnie. Anxiété. Tous les grands syndromes d'excitation. Les manifestations convulsives, et notamment les crises épileptiques et leurs équivalents. L'énurésie.

Le médicament peut encore être utilisé comme anesthésique de base.

**Formes.** — **Dragées** dosées à 2 cgr. de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 6 par jour.  
Le tube de 30 dragées : 21 fr. 10.

**Suppositoires** dosés à 10 cgr. de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 3 par jour.

La boîte de 8 *suppositoires* : 23 fr. 40.

**Sirop** dosé à 0 gr. 017 de Dibromocholestérol, soit 5 mgr. de brome par cuillerée à café.

*Chez le nourrisson* : 1 à 6 cuillerées à café par jour.  
Le flacon de 150 cc. : 29 fr. 30.

**Ampoules injectables** de 8 cc. dosées à 10 cgr. de brome sous forme de dibromocholestérol, 1 à 2 ampoules par injection et 1 à 3 injections par jour.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 46 fr. 90.

**Laboratoires AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4 place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 41-65.)

## SÉDIBAÏNE

**Comprimés glutinisés.**

Sédatif nerveux sans action cardio-dépressive.  
Spécifique des états spasmodiques et anxieux.

**Composition.** — Extrait de Strophantus, Phényl-éthylmalonylurée, Extrait de Jusquiame, Extrait de Cratægus, Extrait de Ballote, Extrait de Valériane, Poudre de Belladone.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour, de préférence avant les repas ou le soir au coucher.

Prix : 23 francs les 33 comprimés.

**COIRRE**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 02-79.)

## SEDLITZ CHANTEAUD

**Composition.** — Granulé effervescent composé de Sulfate de Magnésie parfaitement déshydraté, rendu légèrement effervescent par l'addition d'une petite quantité d'Acide tartrique et de Bicarbonate de soude.

**Indications.** — Dépuratif, Laxatif, Purgatif.

**Doses et mode d'emploi :**

Laxatif : 1 cuillerée à café.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Se prend à jeun dissous dans un peu d'eau.

Prix de vente au public : 14 fr. 40.

**Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD**

**R. RAVAUD, Pharmacien**

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES  
(Seine-et-Oise).

## SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré  
achloruré et bromuré.

**Tablettes.** — 1 tablette = 1 g. NaBr.  
(Boîte de 30)

**Mode d'emploi et doses.** — *Adultes* :  
1 à 5 tablettes par jour.

*Enfants* : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon  
l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait  
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*  
« Roche » : on prépare ainsi instantané-  
ment un bouillon particulièrement savou-  
reux que l'on peut prendre à n'importe  
quel moment de la journée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médica-  
ment sédatif, hypnotique et calmant  
donnant des résultats certains et permet-  
tant d'imposer un *traitement bromuré*  
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-  
ble le régime déchloruré.

**Indications thérapeutiques.** — Insom-  
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,  
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-  
diopathies, migraines, spasmes, convul-  
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des  
Médicaments sous le n° 504-31.

## PRODUITS « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## SÉDO-CARÈNA

**Composition.** — Aminophylline, phényl-éthyl-malonylurée, chlorhy-  
drate de papavérine.

**Propriétés.** — L'*aminophylline* dilate les coronaires et assure l'irriga-  
tion normale du myocarde ;

La *phényl-éthyl-malonylurée*, à *petite dose*, apaise l'irritabilité neuro-  
végétative ;

La *papavérine* calme la fibre myocardique et les spasmes vasculaires

### Indications thérapeutiques :

*Troubles du rythme* : Palpitations, extra-systoles.

*Cœurs irritables* : Instabilité cardiaque, anxiété, insomnies, troubles  
cardiaques réflexes de l'aérogastrie et de l'aérocologie.

*Algies précordiales* : Oppressions douloureuses, barres thoraciques.

*Spasmes vasculaires* : Douleurs des aortites thoraciques et abdominales,  
douleurs des artérites, claudication intermittente.

*Petits signes du brightisme et de l'hypertension artérielle* : Éblouissements,  
céphalées, vertiges.

Tolérance indéfinie, aucune contre-indication.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour.

### SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)



## SÉDOGASTRINE

**Sédatif gastrique.**

**Formes.** — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

**Composition.** — 1° *Substances neutralisantes* :

Hydroxyde de magnésium, Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion* : Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique* : Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

**Propriétés thérapeutiques :**

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

**Posologie.** — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation

Prix : 16 fr. 90.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Diderot 28-96.)

## SÉDO-GYNŒSTRYL

**Composition :**

Di-hydro-folliculine..... 1/5 de mgr.

Bromure de sodium..... 0 gr. 37

Extrait de jusquiame..... 0 gr. 02

pour 1 cc. de solution.

**Indications.** — Troubles neuro-psychiques, Anxiété, Nervosité, Insomnies, États spasmodiques, etc., associés à l'insuffisance ovarienne.

**Présentation.** — Flacon de 10 cc.

**Posologie.** — L gouttes par jour en plusieurs prises, par séries de 10-12 jours, à partir du 10<sup>e</sup> jour du cycle menstruel.

(Voir Gynœstryl, Ecto-Gynœstryl, Benzo-Gynœstryl.)

Prix au public : Le flacon : 25 francs.

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.**

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## SÉDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

**Composition.** — Comprimés de composés organiques nouveaux : le phényl-éthyl-barbiturate de yohimbine et le phényl-éthyl-barbiturate de quinine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Baisse de pression par vaso-dilatation ; action cardiotonique, action sédatrice. Cette préparation réalise pour la première fois un effet hypotenseur artériel concomitant d'un renforcement cardiaque et d'une sédation des troubles nerveux qui compliquent l'hypertension.

**Indications.** — Tous les cas d'hypertension artérielle (artériosclérose, spasmes vasculaires, palpitations, éréthisme cardiaque, extra-systoles, angoisse, angine de poitrine).

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés par jour, 1 avant chaque repas, par périodes de 8 à 12 jours, avec intervalle d'une semaine entre 2 cures.

Pas de contre-indication autre que l'hypotension artérielle.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## SÉDO-INOPHYLINE

Formule par comprimé :

Théophylline-éthylène-diamine .....	0,05
Phényl-éthylmalonylurée.....	0,02
Sulfate de spartéine .....	0,01
Bromhydrate d'homatropine.....	0,0001

**Propriétés.** — Cette association comporte, à côté du vaso-dilatateur coronarien type, des substances sédative, cardiaque ou nerveuse. C'est un vaso-dilatateur périphérique.

**Indications.** — Chez les cardiaques souffrant ou non d'une lésion organique coronaire, mais chez qui prédomine une note de dystonie neuro-végétative : cœurs instables, irritables, anxiété, insomnie, palpitations, oppression, précordialgies par aérophagie, ou aérocolie, fausse angine de poitrine et angine vraie avec gros déséquilibre vago-sympathique. Spasmes vasculaires des membres inférieurs, hypertension, petits troubles du brightisme, bouffées congestives de la ménopause.

**Posologie.** — 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoire MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Étoile 29-54.)

## SÉDOL

**Composition :**

Chlorhydrate de morphine.....	0 gr. 006
Bromhydrate de scopolamine.....	0 gr. 0002
Sérum physiologique spartéine.	
Q. S. p. 1 ampoule de 1 cc.	

**Présentation :**

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.  
Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

**Propriétés et avantages.** — Analgésique, sédatif, hypnotique. Beaucoup plus actif que la morphine employée seule. Ne comporte pas les inconvénients de cette dernière.

**Indications.** — Tous phénomènes très douloureux : cancers, crises tabétiques, maladie de Parkinson, anesthésie chirurgicale, accouchements, suites opératoires, cachexies tuberculeuses.

**Posologies.** — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour. *Enfants* (2 à 12 ans) : de 1/4 à 1 ampoule par jour, suivant l'âge.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sévres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## SÉDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer. »

**Composition.** — Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés :

Comprimés jaunes : Caféine ....	0,015
Comprimés roses : Strychnine....	0,0002

*Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent, avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée.*

Évite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs. Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes, 8 jours les comprimés roses.

**Indications :**

**Déséquilibres vago-sympathiques :** Anxiété, agitation, hyperémotivité, désordres psychiques frustes, Instabilité des basedowiens et des hypertendus, etc.

**Algies paroxystiques :** migraines, angine de poitrine.

**États convulsifs. Épilepsie et ses équivalences :** Maladie de Parkinson et Parkinsonisme, Absences et vertiges, Asthme rebelle, etc.

Chez l'enfant et le nourrisson : manifestations spasmodiques du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, coqueluche, tétanie, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

**Posologie :**

**Déséquilibres vago-sympathiques :** 2 comprimés fractionnés dans la journée.

**États convulsifs. Épilepsie :** Commencer par 4 comprimés et augmenter progressivement la dose jusqu'à suppression des crises.

*Enfants* : 1/2 comprimé par année d'âge.

*Nourrissons* (tolérance parfaite) : 1/2 comprimé jusqu'à 6 mois, 1 comprimé de 6 mois à un an, en deux prises.

Un comprimé = 2 cgr. et demi de phényl-éthyl-malonylurée.

**Laboratoires DEHAUSSY**

50, rue Nationale — LILLE.

## SÉDOPEPTINE

Pansement gastrique sédatif.

**Composition.** — Bismuth, kaolin colloïdal, silice colloïdale, muqueuse gastrique, bromure de sodium, gomme sterculia, hydroxyde d'aluminium colloïdal.

**Indications.** — Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes pyloriques, Pyrosis, Ulcus.

**Posologie et mode d'emploi.** — Croquer 1 ou 2 cuillerées à café de granulé au moment des douleurs. Renouveler la prise, si besoin est, dans les 24 heures.

**Prix :** La boîte, 18 fr. 30.

**Laboratoires de la SÉDOPEPTINE**

**Laboratoires du Dr F. Debat**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## SÉDOPROSTYL

Traitement de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications.

**Composition.** — Association d'Extrait d'Hamamelis et d'Extrait de Belladone, de Chlorure de Magnésium. Agit sur les trois facteurs des troubles : la prolifération adénomateuse, la congestion chronique, l'état spasmodique du sphincter lisse.

**Indications.** — Traitement médical rationnel de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications. Troubles urinaires aigus ou chroniques.

**Posologie.** — De 3 à 5 dragées immédiatement avant le petit déjeuner et de 2 à 4 dragées, si nécessaire, avant le repas du soir.

**Prix :** 25 francs le flacon de 80 dragées.

**Laboratoires GRIMAULT**

Fondés en 1856  
51, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Bal. 20-70.)

## SÉDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

**Indications.** — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

**Trois formes.** — A) *Sedorhinol* mixte comprend dans une même boîte :

1<sup>o</sup> Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaline benzoate de soude, essences aromatiques.

2<sup>o</sup> Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

**Prix :** Comprimés 19 fr. 80 — Pommade : 11 fr. 95 — Mixte : 23 fr. 95  
Durée moyenne du traitement 10 jours.

**Laboratoires A. REGAGNON**

276, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Val-girard 26-30.)

## SÉDORMID « ROCHE »

Le grand médicament des petits insomniaques et des petits anxieux.

**Composition.** — Allylisopropylacétylcarbamide.

**Propriétés.** — Sédatif hypnogène doux, de toxicité atténuée, non barbiturique.

**Indications.** — Toutes les insomnies légères, de quelque nature qu'elles soient (Surmenage, Préoccupation, Convalescence, etc.), Angoisse, Appréhension, Anxiété, Symptômes hypernerveux.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Dose sédatif* : 1 comp. 2, 3 ou 4 fois dans la journée. — *Dose hypnogène* : 1 ou 2 comprimés le soir au moment de se coucher.

Comprimés dosés à 0 g. 25 (boîte de 20).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-32.

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Arch. 91-10).

## SÉDOSINE

### Solution

Association végétale hyperactive.

**Composition.** — Extraits de : Passiflore, Jusquame, Cratægus.

L'action antispasmodique de la Jusquame utilisée à doses minimes est considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus (H. Leclerc).

**Indications.** — Etats spasmodiques, Excitation nerveuse, Insomnie, Neurasthénie, Psychasthénie, Mélancolie.

### Posologie :

**Contre l'insomnie :** 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

**Sédatif nerveux :** Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La Sédosine se prend en nature, ou mieux dans un peu de tisane.

Prix : 23 fr. 60.

### Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## SÉDOTONINE GROS

**Composition.** — Extrait de Strophantus, phényléthylmalonylurée, extrait d'anémone.

**Indications.** — Médication tonocardiaque et antispasmodique. Traitement de l'hypertension artérielle. Sédatif général.

**Forme.** — Dragées.

**Doses.** — 3 dragées par jour, à prendre à intervalles espacés : 1 au réveil et 1 avant les deux principaux repas. A croquer ou à avaler avec un peu d'eau.

Prix : 20 fr. 70.

(Durée moyenne de l'unité : 15 jours.)

### Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.  
(Tél. : 60-55.)

## SÉDOTYOL

Pommade antiprurigineuse et anesthésique.

Pommade non toxique, absolument inoffensive, ne contenant aucun produit du genre de la cocaïne, ni des tableaux A et B.

**Indications.** — Toutes les lésions épidermiques prurigineuses ou douloureuses : prurits, urticaire, piqûres d'insectes, brûlures, éruptions, zona, etc.

**Action.** — Le SÉDOTYOL calme instantanément le prurit et la douleur.

**Mode d'emploi.** — En larges applications *loco dolenti*, renouvelées selon les besoins.

### Présentation :

Le tube : 16 fr. 50.

Le 1/2 tube : 9 fr. 70.

### Laboratoires du Dr F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

## SEIGNET'FRUITS

**Composition.** — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purgé sans nausées ni coliques.

**Propriétés thérapeutiques.** — Purgatif et laxatif.

**Indications.** — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin. Purgation douce (opérations, accouchements).

### Mode d'emploi :

**Adultes :** Purgatif. Un flacon le matin à jeun.

**Enfants :** 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

**Laxatif :** Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

Prix : 9 fr. 40.

### Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

## SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

**Forme.** — Granulé friable.

**Posologie.** — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 13 fr. 20 le flacon.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 64-1.

**Laboratoire ALPHONSE BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

(Tél. : Auteuil 20-21.)

## SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac. Le *Sel d'Ewald* se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le *Sel d'Ewald* trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyroses, Vomissements de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café de granulé délayé dans 1/4 de verre d'eau avant les repas ou au moment des crises.

Le *Sel d'Ewald* ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

**Laboratoires BRAQUEMOND et Cie,**

Docteurs en Pharmacie,

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 05-54.)

## SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

Poudre ultra-tamisée, à l'état moléculaire.

**Forme.** — Poudre. *Tablettes*.

### Composition :

Bic. de Soude sursaturé...	2 gr. 50
Magnésie hydratée.....	0 gr. 50
Carb. de Chaux léger.....	1 gr. 50
Lactose pulv.....	0 gr. 50

Par cuillerée à café ou 2 tablettes.

**Indications.** — Hyperacidose gastrique aiguë. Tous les états dyspeptiques. Vomissements incoercibles.

**Doses.** — *Poudre* : une cuillerée à café après chaque repas dans 1/4 de verre d'eau. *Tablettes* : sucer 2 tablettes après chaque repas et en cours de journée si besoin.

### Anciens Laboratoires ODINOT

Robert COLAS, Docteur en Pharmacie.

133, r. Lecourbe, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Vau. 48-10).

Laboratoires : 21, r. Violet, PARIS (XV<sup>e</sup>). (Ség. 69-13.)

## SÉLÉNIOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le *Sélénol* est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

**Indications.** — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections néoplasiques.

Prix : 48 fr. 80 pour 8 jours de traitement.

**Laboratoires Ch. OOUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## SEL FROS

(Régime déchloruré.)

Mélange de Sels de Calcium (Citrates, Tartrates, etc.) destiné aux malades soumis au régime déchloruré.

Les aliments consommés avec le Sel Fros diminuent ainsi leur fadeur.

**Indications.** — Néphrites, Albuminurie, Œdème et tous les cas qui commandent le régime déchloruré.

Prix : 13 fr. 50.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

61, av. Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 87-34.)

## SELOR

**Complexe auro-médicamenteux assimilable**  
par vole buccale (cachets).

### SELOR N° 1.

**Composition.** — Chlorure d'or, codéine, extrait d'aconit, poudre de belladone, terpine, composé solide contenant du bromoforme, acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique, ergostérine irradiée, extrait de quinquina, pepsine amylacée, sels de chaux.

**Propriétés et Indications.** — Actif, facilement maniable, ne causant pas d'accidents.  
Par sa quadruple action:

1° Spécifique ; 2° Reconstituant ; 3° Calmant de la toux ; 4° Eupeptique ;

est indispensable au traitement de toutes les maladies pulmonaires, aiguës ou chroniques, tuberculeuses ou non.

**Mode d'emploi.** — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 37 fr. 50 la boîte de 30 cachets.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-12.

### SELOR N° 2.

**Composition.** — Est celle du SELOR N° 1, mais sans calmant de la toux.

**Indications.** — Outre le traitement des affections pulmonaires ne nécessitant pas l'emploi de calmant de la toux, les SELOR N° 2 sont employés efficacement dans le traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES.

**Mode d'emploi.** — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 35 francs la boîte de 30 cachets.  
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-13.

**Laboratoires des Produits L. OHAUVIN**

3, rue de Vouillé — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 21-10.)

## SELS DE LITHINE

### EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

**Composition.** — Benzoate, carbonate, citrate ou salicylate.

Granulé effervescent contenant un des principes actifs indiqués ci-dessus.

#### Indications.

**BENZOATE :** coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète.

**CARBONATE :** rhumatisme, goutte.

**CITRATE :** diathèse rhumatismale.

**SALICYLATE :** rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique.

**Doses.** — Chaque flacon est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 0,20 de principe actif.

Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, bière ou lait.

#### Laboratoires LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Trud. 08-73.)

## SELS-MAGS

**Composition.** — Sulfate sec de magnésie, sulfate sec de soude, citrate monosodique, sel halogène du magnésium, phosphate de soude, etc.

**Propriétés.** — Favorise la sécrétion et l'excrétion de la bile, réalise le drainage des voies biliaires.

**Indications.** — Toutes congestions du foie et de la vésicule biliaire, jaunisse, cholécystite, angiocholécystite, dyspepsies, aérophagies, constipation, migraines, hypochondrie, vertiges, prurits, urticaire, langue sale, eczéma, etc.

**Posologie et mode d'emploi.** — 2 comprimés le matin dans un verre d'eau chaude ou dans 1/2 verre d'eau avant le repas de midi. La dose peut être augmentée ou diminuée suivant les prédispositions individuelles. Aucune contre-indication.

**Présentation et prix.** — Une boîte comprimés effervescents.

Faire suivre d'une cure de BOLCITOL.

**G. LESOURD, Pharmacien**

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## SELS POLYALCALINS LARCHEY

Régulateurs des fonctions digestives et calmant des douleurs gastriques.

**Composition.** — Sulfate, phosphate, carbonate de lithine et de soude, tartro-citrate de codéine.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydries, Rhumatisme, Hypertension.

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Posologie.** — Par cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau après les repas ou dans 1 verre d'eau, le matin à jeun.

Prix : 19 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 74-3.

#### Laboratoires LOISEAU

LOISEAU, Pharmacien

119, rue Cardinet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wag. 08-16.)

## SELS SYNTHÈSE DE BRIDES

**Composition.** — Sels minéraux extraits des eaux de la *Source Hybord de Brides* associés au sulfate de soude et de magnésie et au bicarbonate de soude.

**Mode d'action.** — C'est l'action même des eaux de Brides, c'est-à-dire la décongestion du foie, l'évacuation intestinale et l'augmentation du métabolisme.

**Mode d'emploi.** — Un sachet dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun.

Prix : 18 fr. 30.

#### Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en Pharmacie

38, rue Capitaine-Ferber — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : MENil 52-83.)

## SELUNIO

**Sel de fruits. Sel de santé.**

**Composition.** — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

**Forme.** — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

**Propriétés.** — Régulateur simple et efficace de la santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

**Indications et mode d'emploi.** — **Maladies du foie et des intestins.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

**N. B.** — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

**Estomac, impuretés du sang, maux de tête.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

**État bilieux, indigestion, excès de table.** — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

**Désaltérant et rafraîchissant.** — Contre la soif, état févreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

**Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.**

**Obésité.** — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

**Comme breuvage.** — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

**Dans le vin et le cidre :** une pincée combat l'excès d'acidité et produit une boisson de table pétillante.

**Présentation.** — En flacons de 60 grammes : 8 fr. 30.

**SELUNIO, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.**

**Remise spéciale aux Médecins.**

**Laboratoire GLYCO-M.**

**Georges MIQUEL, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

**1, avenue Lowendal — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 16-85.)**

## SEL VIAL

**(Achloruré)**

**Débilité rénale.**

**Affections cardiaques.**

**Affections du Tube digestif.**

**Laboratoires VIAL**

**4, place de la Croix-Rousse — LYON.**

**Tél. : Burdeau 28-07.**

## SEL VITA-D PHOSPHATÉ

**Composition :**

Ergostérol irradié..... 0 mgr. 125  
Phosphate tricalcique précipité... 2 gr.  
Sel fin du commerce.. Q. S. pour 100 gr.

**Mode d'action et avantages.** — Introduit le phosphate de chaux et la vitamine D dans l'organisme. A petites doses répétées, évite les accidents causés par les préparations vitaminées à doses trop élevées.

**Indications.** — Décalcification, rachitisme, convalescences, asthénies, carences.

**Mode d'emploi.** — S'emploie comme le sel ordinaire au moment de la consommation des aliments. A ne pas utiliser en cuisine pour éviter la destruction de la vitamine D par la chaleur.

**Laboratoires Français de Produits Chimiques et Pharmaceutiques**

**40-42, rue François-I<sup>er</sup> — PARIS (VIII<sup>e</sup>).**



## SENEÇONINE

**Mélication régulatrice de la circulation pelvienne.**  
**Décongestif sédatif pelvien.**  
**Équilibrant du système nerveux végétatif pelvien**

### Composition.

Extrait fluide de Senecon ;	Extrait fluide de Gelsemium ;
Extrait fluide de Viburnum ;	Extrait fluide de Cimicifuga ;
Extrait fluide de Piscidia ;	Alcoolature d'Anémone.

**Présentation.** — Elixir de goût agréable, atoxique. Sans analgésique chimiques. Sans opothérapiques.

### Action thérapeutique et indications.

#### Chez la femme :

Calme les douleurs, régularise le flux menstruel, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux.

Troubles de la circulation utéro-ovarienne, *Amenorrhées, Dysménorrhées, Règles déviées, Congestion, Néuralgies pelviennes, Migraines cataméniales, Douleurs du post-partum, Déséquilibre vaso-moteur de la Ménopause, Troubles psychiques.*

#### Doses et mode d'emploi.

**Mélication régulatrice :** 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. Commencer le traitement 10 jours avant la date présumée des règles.

**Mélication sédativ :** Prendre, dès les premiers symptômes précurseurs de la période menstruelle, 3 à 6 cuillerées à café par jour, les premières cuillerées à 3 heures consécutives.

#### Chez l'homme :

Calme les douleurs, relâche les fibres lisses du sphincter vésical, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux. *Prostatisme vasculaire, Inflammation, Hypertrophie et sclérose de la prostate.* Toutes douleurs, ténésme, contractures, spasmes divers, irradiations périnéales, troubles circulatoires, Hémorroïdes.

#### Doses :

Une cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. En cas de crise aiguë, 1 cuillerée à café toutes les heures, maximum 6 par jour.

**Prix.** — Flacon, dose pour un traitement : 21 fr. 20.  
 (Taxe d'armement comprise).

**Laboratoire A. BESNIER**

Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
 1, rue Raynouard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Auteuil 20-34.)

## SÉNOPHILE

**Pommade cicatrisante.**

**Propriétés.** — Protège l'épiderme et hâte la cicatrisation du derme. Calme en peu de temps les phénomènes douloureux.

**Indications.** — Rougeurs des nouveau-nés, érythèmes fessiers, crevasses des seins et des mains, gerçures et engelures, brûlures et coups de soleil, eschares, intertrigo, tous érythèmes et irritations de la peau.

**Les Laboratoires BRUNEAU et Cie**

Docteurs en pharmacie

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 61-46.)

## SEPTAZINE

(48 R. P.)

Benzyl-Amino-Benzène-Sulfamide.

Chimiothérapie antistreptococcique et anti-infectieuse, non colorante, bien tolérée par les voies digestives, non toxique.

**Présentation.** — Comprimés dosés à 0 g. 50 divisibles en deux (tubes de 20). Prix : 16 francs.

**Indications.** — Erysipèle, Angines, Otites, Prévention et traitement de la fièvre puerpérale, des complications de la Scarlatine, Grippe et complications, Colibacilloses.

### Posologie :

**Adultes :** 1 comprimé dans un demi-verre d'eau 4 à 8 fois par jour.

**Nourrissons :** 2 comprimés par jour.

**Grands enfants :** 2 à 6 comprimés par jour.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPEOIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
 21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Balzac 22-94.)

## SEPTICARBONE

**Charbon antiseptique intestinal.**

**Composition.** — Oxyquinoléinate de bismuth, charbon suractivé, gomme Sterculia.

**Indications.** — Diarrhées, Entérites, Colites, Fermentations, Intoxications alimentaires, Infections gastro-intestinales, biliaires et hépatiques, Aérophagie, Flatulence.

**Posologie et mode d'emploi :**

**Affections aiguës :** 4 à 6 cuillerées à café par jour, ou 8 à 12 comprimés.

**Affections chroniques :** 1 à 2 cuillerées à café par jour, ou 2 à 4 comprimés.

Croquer à sec ou délayer le granulé dans un peu d'eau avant ou pendant les repas. Avaler le comprimé sans le laisser fondre.

**Prix :**

Granulé, la boîte..... 22 francs.  
Comprimés, l'étui..... 22 francs.

**Laboratoires du SEPTICARBONE**

Laboratoires du D<sup>r</sup> F. Debat,  
60, rue de Monceau — PARIS (VIII\*).  
(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## SEPTICÉMINE CORTIAL

**Composition.** — Di-formine, iodobenzo-méthylée, corps cristallisé, dialysable, injectable, atoxique, indolore. Aucune réaction locale ou générale.

**Propriétés.** — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal. Agit non seulement dans les infections définies, mais dans les formes associées.

**Indications.** — **Infections aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

**Infections chirurgicales.** — Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

**Forme.** — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Injections intraveineuses ou intramusculaires *indolores*.

**Doses.** — Septicémies à marche rapide, infections graves : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Infections à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

*Chez l'enfant* en lavement à garder, 4 cc. dans 50 gr. d'eau bouillie sucrée.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations, pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes. Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

**Stomatologie :** Pulvérisations alvéolaires et gingivales. Injections intragingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

**Prix :**

La boîte de 8 ampoules de 4 cc. : 32 fr. 25 ;  
de 10 cc. : 55 fr. 15.

La boîte de 4 ampoules de 10 cc. : 28 fr. 15.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS.  
(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

## SEPTICOLINE

**Composition.** — Se prescrit sous deux formes :

Chaque cuillerée à café de granulé fondant contient :

1<sup>re</sup> Forme naphtolée :

Argent colloïdal .....	0,01	Formine .....	0,15
Peroxyde de magnésie .....	0,10	Charbon animal pur .....	0,25
Benzonaphтол .....	0,15	Charbon activé .....	0,25

2<sup>e</sup> Forme simple : même formule sans benzonaphтол.

**Indications.** — Antiseptique gastro-intestinale, biliaire et rénale : Appendicite chronique, Aérophagie, Colibacillose, Colites et Typhlocolites, Entérites, Grippe à forme intestinale, Etats intestinaux infectieux, Fermentations intestinales, Cholécystites, Intoxications, Urticaire, Cystites, Prostatites.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 2 cuillerées à café avant ou après chaque repas. Enfants : 1/2 dose.

**Présentation.** — Deux formes. Prescrire : simple ou naphtolée. Granulé fondant anisé en boîte métallique (8 à 10 jours de traitement par boîte).

Prix : 21 francs.

Enregistré au L. N. C. M. nos 1903-1 et 1903-2.

Laboratoires ROUGEYROLLES

Place de la République et rue Robertie. — GRAMAT (Lot)  
(Tél. : 77.)

## SEPTIDERME

Le traitement Septiderme est un traitement ambulatoire des Ulcères variqueux, d'application facile et indolore, basé sur la théorie actuelle qui considère ces lésions comme microbiennes, surtout streptococciques, à développement favorisé par le déficit circulatoire.

**Composition :**

Septiderme liquide, solution d'Iodobismuthate d'oxyquinoléine, antiseptique, antimycosique.

Pâte Septiderme A vitaminée, poreuse, sans vaseline, à spécificité antistreptococcique et à pouvoir cicatrisant intense.

Pâte Septiderme B également vitaminée, poreuse et antistreptococcique, mais décongestionnante et désenibillissante.

Bande Septiderme d'élasticité très étudiée.

Demander la littérature au

Laboratoire TIXIER

SAINT-QUENTIN (Aisne).

## SEPTOGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par voie buccale.

**Composition.** — Association synergique de l'aminophénylsulfamide et du plus actif des dérivés de l'Acridine, la Brunacrine du Progone (0 gr. 30 de sulfamide et 0 gr. 006 de brun d'acridine par comprimé).

**Propriétés.** — *Activité optima et action antibactérienne polyvalente, l'association d'un organo-soufré (sulfamide) et d'un dérivé acridinique dans une même cure augmentant le potentiel thérapeutique de chacun de ces médicaments et produisant, ainsi que l'ont rapporté Jausion et Marcel à la Conférence Nationale Française de la Blennorragie (29 mars 1938), un effet de summation indubitable.*

**Indications.** — Toutes les affections à gonocoques, streptocoques, méningocoques, staphylocoques, pneumocoques, colibacilles, soit que ceux-ci agissent seuls ou en association avec d'autres germes.

**Posologie (adultes) :** De 4 à 10 comprimés par jour, à prendre par doses fractionnées et selon les indications particulières de l'affection.

Tolérance parfaite, pas de cyanose.

Prix : 20 fr. 25 l'étui de 36 comprimés.

Laboratoires SFEAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).  
(Tél. : PLAine 13-31.)

## SEPTOPLIX

(1162 F ou paraminophénylsulfamide)

### Présentation :

**Septoplax-comprimés** . tube de 20 comprimés, dosés à 0 gr. 50.

### Suppo-Septoplax :

Boîte de 10 Suppo-Septoplax *adultes*, dosés à 1 gr.

Boîte de 10 Suppo-Septoplax *enfants*, dosés à 0 gr. 25.

### Septoplax-injectable :

Boîte de 3 ampoules de 20 cc. dosées à 0 gr. 16.

Boîte de 1 ampoule de 250 cc. dosée à 2 gr.

### EXOSEPTOLIX (Voir à cette rubrique).

**Propriétés.** — Bactériostatique polyvalent, particulièrement actif dans les infections à streptocoques, méningocoques, staphylocoques, colibacille, ainsi que dans les infections pluri-microbiennes.

**Indications.** — Le SEPTOPLIX est très actif dans : érysipèle, gonococcies, chancre mou, infections urinaires, septicémies streptococciques, méningites streptococciques et méningococciques, gangrènes gazeuses, suppurations streptococciques et staphylococciques, suppurations pulmonaires et pleurales, infections puerpérales localisées, dysenterie à B. de Flexner, lymphangites streptococciques tropicales.

Le SEPTOPLIX paraît très actif dans : fièvre de Malte, complications infectieuses de la grippe ou d'autres affections, rhumatismes infectieux secondaires, maladie de Nicolas et Favre.

Le SEPTOPLIX paraît partiellement actif dans : infections puerpérales septicémiques, méningites pneumococciques.

Le SEPTOPLIX paraît légèrement actif dans : affections typhiques, grippe, fièvre aphteuse.

**Posologie.** — Schématiquement trois posologies :

*Faible* : 1 gr. (2 comprimés), à 3 gr. (6 comprimés).

*Moyenne* : 3 gr. (6 comprimés), à 6 gr. (12 comprimés).

*Forte* : 6 à 12 gr. (12 à 24 comprimés) et au-dessus.

### Posologie infantile.

*Nourrissons* : 1/4 de la dose de l'adulte.

3 à 6 ans : 1/2 de la dose de l'adulte.

6 à 10 ans : 2/3 de la dose de l'adulte.

10 à 14 ans : 3/4 de la dose de l'adulte.

### Exemples de posologie :

Érysipèle non compliqué : posologie faible.

Érysipèle compliqué : posologie forte.

Gonococcies, colibacillose, maladie de Nicolas et Favre : posologie moyenne.

Méningites à streptocoques, méningocoques, staphylocoques, pneumocoques : voie d'administration double : *per os*, posologie très forte. En injections intra-rachidiennes : Septoplax-injectable.

Septicémies, fièvres puerpérales, gangrènes gazeuses : posologie très forte.

Dysenterie à B. de Flexner : posologie forte.

Staphylococcies : association Septoplax-Iode (voir Iodo Septoplax).

**Tolérance.** — Rares sont les incidents qui nécessitent l'arrêt de la médication. Seuls les troubles sanguins y obligent.

Pour éviter tout phénomène secondaire : prendre le Septoplax en doses fractionnées (toutes les 4 heures environ), boire abondamment des eaux alcalines ; ne pas lui associer de médicaments soufrés ; rester alité pour les posologies fortes.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## SÉRÉNOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur des troubles de l'hypertonicité nerveuse par déséquilibre neuro-végétatif.

**Indications.** — Emotivité, Etats anxieux, Insomnies, Neurasthénies, Migraines, Vertiges, Palpitations, Syndrome solaire, Certains prurits.

**Formes.** — Liquide, Comprimés, Suppositoires.

### Composition :

Peptones .....	0,03
Hexaméthylène-tétramine .....	0,05
Phényl-éthyl-malonylurée.....	0,01
Teinture de Belladone .....	0,02
Teinture de Cratægus .....	0,10
Extrait fluide d'anémone.....	0,05
Extrait fluide de Passiflore .....	0,10
Extrait fluide de Boldo .....	0,05
Excipient .....	Q. S.

pour une cuillerée à café.

La cuillerée à café contient 1 cgr. de Phényl-éthyl-malonylurée, le comprimé 1/2 cgr. et le suppositoire 3 cgr.

### Doses et mode d'emploi :

*Doses moyennes par 24 heures* : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés ou 1 à 3 suppositoires.

Les doses de liquide et de comprimés indiquées sont des doses moyennes ; elles peuvent dans certains cas, et sur avis médical, être portées dans les vingt-quatre heures à 8 ou 10 cuillerées à café, à 12 ou 16 comprimés, donc à 8 ou 10 centigrammes de Phényl-éthyl-malonylurée si elles sont ordonnées à « doses filées » (Lhermitte, Gallot), c'est-à-dire très fractionnées dans le temps.

### Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## SERICRINE-REY

**Complexe Endocrino-Sérique.**

**Médication Hormostimulatrice,**

**Anti-Hémorragique - Recalcifiante.**

**Présentation.** — Deux formes :

Pour l'adulte : ampoules buvables de 5 cc.

Pour l'enfant : ampoules buvables de 3 cc.

**Composition.** — Extraits hépatique, splénique, médullaire, surrénal, hypophysaire.

Nucléinates de fer et de manganèse.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes anémies, quelle que soit leur origine. Toutes carences et déficiences de l'organisme. Convalescences de maladies aiguës ou infectieuses ; états hémorragiques (préventif et curatif), asthénies avec dépressions physique et nerveuse (neurasthénie, anémie cérébrale), accidents de la croissance et de la puberté, troubles de la calcification, bacilloles et états pré-tuberculeux.

### Posologie :

*Adultes* : 2 ampoules (*adultes*) par jour.

*Adolescents* : 1 ampoule (*adultes*) par jour.

*Enfants* : de 7 à 15 ans : 2 ampoules (*enfants*) par jour ; de 3 à 7 ans : 1 ampoule (*enfants*) par jour.

*Aucune contre-indication.*

*Absence totale d'accidents sérieux.*

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les n<sup>os</sup> 302 6/1 et 302 6/2.

### Laboratoires REY

DIJON (Tél. : 22-12).

## SÉRIFER

*Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.*

**Composition.** — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval. Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

**Indications.** — Toutes les déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, États hémorragiques, Suites d'opérations, Paludisme.

**Forme.** — Délicieux granulé chocolaté.

### Posologie :

*Adultes* : 2 ou 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

Prix : 26 fr. 10.

### Laboratoires d'ACTINO-BIOLOGIE

LAURENÇON et Cie

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Z. O. : 1, rue Benoît-Sourigues — BAYONNE (B.-P.).

## SÉROBIOL

**Forme.** — Ampoules buvables de 5 cc.

**Formule.** — Extraits de foie, rate. Acide phosphorique. Nucléinate de manganèse. Phosphate acide de sodium, Vitamine B tirée des levures. Sérum de cheval. Sérum de mouton.

**Indications.** — Carence, déficiences organiques, anémies, pré tuberculose, convalescences.

### Posologie :

*Adultes* : 1 ampoule matin et soir aux repas, dans un peu de liquide

*Enfants* : 1 ampoule par jour.

Enreg. au Lab. Nat. de Contr. sous le n° 403-8.

La boîte de 10 ampoules : 25 fr. 30.

### ASSOCIATION TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE

T. VINCENT, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## SÉROCALCINE

**Composition.** — Poudre d'os frais, vitamines A et D, rigoureusement titrées en unités biologiques antirachitiques, phosphatides cérébraux, extraits parathyroïdiens totaux, chlorophylle pure à pouvoir phyto-sensibilisateur extrême.

**Propriétés.** — Régulateur rapide du métabolisme calcique, reminéralisant, recalcifiant, activateur de l'uréogénie, anti-toxique.

**Indications.** — Hypo-calcaémie et hypo-phosphaturie, retards de croissance ou d'ossification, dystrophie osseuse, rachitisme, fractures, ulcères gastriques, cataracte post-opératoire.

**Présentation** { 31 francs la boîte de 24 cachets.  
**et prix :** { 31 — — de granulés.

**Posologie.** — Un cachet midi et soir au moment du repas ou 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

## SÉRO-COMPRIMÉS I. M.

Etués de 40 et 100 comprimés de Sérums desséchés.

*Prophylaxie des affections de la gorge* : 3 à 4 comprimés par jour.

*Traitement local des angines courantes, pharyngites, porteurs de germes, etc.* : 1 à 2 comprimés toutes les heures et le soir au coucher.

## SÉROLACTYL

### (Autopulvérisable) I. M.

En pulvérisateurs de 5 gr. de sérums desséchés, lactosés.

*Prophylaxie des affections rhino-pharyngées* : 2 pulvérisations par jour.

*Traitement local des rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, Coryzas tenaces, etc...* : 4 à 5 pulvérisations par jour.

## SÉRO-LIQUIDE I. M.

En flacons de 30 gr. de sérums liquides, glycélinés.

*Prophylaxie des affections oto-rhino-pharyngées* : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

*Traitement local des otites, sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, etc...* : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

N. B. — Dans la diphtérie, les injections de sérum constituant la base du traitement, n'employer ces trois produits qu'à titre complémentaire (prévention et convalescence).

Durée d'utilisation des 3 produits : 10 années.  
La fabrication du Sérolactyl et du Séro-Liquide est provisoirement suspendue.

## TUBERCULINE I. M.

pour cuti et percuti-réaction

(Voir le texte.)

Laboratoires des  
PRODUITS BIOLOGIQUES I. M.

S. SAVIGNEUX, pharmacien.

17, rue Bourgelat — LYON.

## SÉRODAUSSE A

(Sérum activé de taureau.)

Anti-asthénique, en ampoules de 15 cc. non injectables.

Obtenu par l'activation *in vivo* du sérum de jeune taureau, grâce à l'injection de sérum de vieux bœuf qui confère à ce médicament, en plus de toutes les hormones circulantes des jeunes animaux, les anticorps des poisons séniles de Carrel.

C'est donc un *invigorateur puissant* pour toutes les personnes fatiguées ou simplement déprimées par excès de travail physique ou intellectuel, quels qu'en soient l'âge ou le sexe.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose mensuelle de 3 ampoules, prises à raison d'une ampoule tous les deux jours, est suffisante.

## SÉRODAUSSE OVARIEN

(Sérum activé de génisse.)

Ampoules de 15 cc., non injectables.

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Sérodausse A.

## SÉRODAUSSE INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ampoules de 10 cc., non injectables.

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance.

Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé. Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>). (Tél. : Turbigo 63-40.)

## SÉROMA-REY

**Composition.** — 100 grammes de Séroma contiennent :

Protéines sériques .....	90 gr. 90
Calcium .....	0 gr. 05
Fer .....	0 gr. 30
Manganèse .....	0 gr. 15

**Indications.** — Surmenages, Fatigue cérébrale, Chocs Moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies.

### Doses moyennes :

**Adultes :** 1 cuillerée à café de Granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

**Enfants :** demi-doses.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-3.

**Laboratoires REY**

DIJON (Tél. : 22-12.)

## SEROXEMA

*Complexe séro-apothérapique. Traitement par voie buccale.*

**Composition.** — Sérum de jeunes taureaux, activé par transfusion ; organes opothérapiques sélectionnés (dessiccation sous vide à basse température).

**Indications.** — Troubles anaphylactiques, états de déficience hépatique ou de déséquilibre endocrinien, action spécifique sur la plupart des dermatoses : prurits (même généralisés), Eczémas secs, suintants, squameux ; Eczématides, Herpès, Herpès des muqueuses Urticaires, Dartres, Intertrigo, certains Psoriasis, Acné, Prurigo, Erythèmes des enfants, Lichen, Maladie de Quinck, Asthme.

**Présentation.** — Flacons de 60 dragées, pour une cure.

Amélioration sensible dès la première cure ; le traitement complet exige un usage prolongé (repos de 20 jours entre chaque cure).

### Doses moyennes.

De 1 à 2 ans, 2 dragées par jour fondues dans un peu de lait.	
De 2 à 5 — 3 — — —	
De 5 à 10 — 4 — — —	
De 10 à 16 — 5 — — —	
Adultes : 6 — — —	
	{ En 3 fois : le matin à jeun et
	{ avant les 2 principaux
	{ repas.

Nouveau prix en France : 29 fr. 70.

**Laboratoires du SEROXEMA**

**G. BARTHET, Pharmacien**

1, rue de Phalsbourg — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Wag. 02-76.)

## SÉRÚ

*Médication à base d'extrait total et concentré des Galbules de Cupressus Sempervirens.*

**Indications.** — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique efficace, sûr et constant des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles, troubles de la ménopause, bourdonnements d'oreilles, prostatites.

### Présentation et mode d'emploi :

**Gouttes de Sérú :** XXX gouttes 2 fois par jour.

Durée moyenne du flacon : 12 jours. Prix : 17 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 621-1.

**Pommade de Sérú :** Prix : 17 fr. 10.

**Suppositoires de Sérú :** prix : 20 fr. 30.

**Laboratoires TACHOT et VIGAN**

103-105, rue Saint-Lazare — PARIS.

(Tél. : Trinité 04-49.)

## SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

**Composition.** — Le sérum de Heckel a pour base l'adrénaline physiologique des glandes surrénales, stabilisée dans un soluté isotonique.

**Mode d'emploi.** — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

**Action.** — L'excitation du pneumogastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

**Indications.** — Toutes les formes d'asthme au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

**Présentation.** — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 28 fr. 70.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes. Prix : 20 fr. 10.

**Laboratoire CORBIÈRE**

et Pansements brevétés CORBIÈRE S. A.

27, rue Dufournaud — PARIS. — (Tél. : Carnot 78-11.)



## SÉRUM DE JOUSSET

### Sérum antibacillaire.

Sérum de chevaux immunisés contre les toxines du bacille de Koch. Combat l'infection, non les lésions. Traitement de choix des primo-infections (s'aider pour le diagnostic de la cuti-réaction) : enfants : typhobacillose, pleurésie séro-fibrineuse, pleuro-péritonite des jeunes, polyarthrite tuberculeuse aiguë, hémoptysie, spléno-pneumonie tuberculeuse, etc., rechutes survenant parfois au cours d'une tuberculose précocement traitée par l'Allergine. Si après une semaine d'observation la température reste régulière ou peu oscillante, aborder la sérothérapie.

Contre-indication à l'emploi en injections. — Température irrégulière (oscillation atteignant 3°). Asthmatiques, Emphysémateux.

Aucune contre-indication à l'emploi en lavements.

Posologie. — Injections hypodermiques, face antérieure de la cuisse, 3 à 6 cc. par kilog. de poids du sujet, répartis en trois injections à deux jours d'intervalle ou lavements quotidiens à conserver, inoffensifs, de 2 à 3 cc. par kg. pendant 6 à 8 jours, le soir. Fortes doses salicylate si arthralgies 12<sup>e</sup> jour.

Demandez notice explicative aux Dépositaires généraux :

Laboratoires **BRUNEAU et Cie**  
Docteurs en pharmacie.

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Élysées 61-46.)

## SÉRUM FRAISSE FERRUGINEUX

Voir :

**Ampoules Ferrugineuses Fraisse.**

## SÉRUM FRAISSE NÉVROSTHÉNIQUE

Voir :

**Ampoules Névrosthéniques Fraisse.**

## SÉRUM OLIVIÉRO

### Equisérine

Sérum normal de cheval, créé en 1906.

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consumptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brûlures*.

Ampoules buvales de 10 cc., 1 par jour; de 2 cc., 2 à 4 par jour. Peuvent s'employer en pansements. Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

Prix amp. de 10 cc. la boîte : 27 francs.

— 2 cc. — 24 fr. 60.

**Comprimés. — Capsules. — Prix : 24 fr. 60.**  
**Sérum desséché pour pansements. Prix : 17 fr. 60.**

Laboratoire **OLIVIÉRO**

BOULOGNE-SUR-SEINE. Tél. : Molitor 27-06.

## SÉRUM POLYVALENT

de LECLAINCHE et VALLÉE

**Composition.** — Sérum prélevé sur des chevaux immunisés contre des germes de haute virulence, responsables des états septicémiques à streptocoque, staphylocoque, colibacille, pyocyanique, etc...

**Indications.** — Septicémies et pyohémies.

**Présentation.** — Sérum injectable en boîte de 2 ampoules de 10 cc.

**Mode d'emploi et posologie.** — Sérothérapie par voie parentérale (sous-cutanée, intramusculaire ou intra-veineuse) ou rectale, selon la gravité des cas.

Dose d'attaque : 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> jour..... 80 cc.  
3<sup>e</sup> jour..... 60 cc.

Traitement de consolidation..... 30 cc. par jour.

Prix au public : 30 fr. 50.

Les Laboratoires du Dr **ROUSSEL**

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOIÉTIQUE

S. A. au cap. de 15.000.000 de fr. — R. C. Seine 12.384.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 68-22.)

## SÉRUMS CLIN

Les sérums thérapeutiques Clin, antimicrobiens et antitoxiques, sont purifiés par *electro-osmose*, procédé n'altérant en rien leur efficacité et leur conférant les avantages suivants : disparition ou diminution des accidents de choc et des accidents sériques, très grande stabilité et très longue conservation. S'emploient en injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, ou localement.

### SÉRUM CLIN ANTICOLIBACILLAIRE

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

**Indications.** — Toutes les infections à colibacilles ou à association colibacillaire : Colibacillose, pyélonéphrites, appendicite aiguë et ses complications, péritonites (avec le sérum antigangréneux), fièvre urinaire, périostite.

**Doses.** — Variables suivant le degré d'infection (de 10 à 60 cc. par jour pendant 4 à 5 jours).

**Forme.** — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Ce sérum existe également sous forme *non purifiée*, pour l'administration par voie buccale.

### SÉRUM CLIN ANTIDIPHTÉRIQUE

Sérum antitoxique et antimicrobien purifié. Sérum concentré en unités antitoxiques, mais d'une teneur normale en protéides. Hyperimmunisation des chevaux à l'aide de toxine diphtérique et de corps microbiens provenant de diphtéries graves et malignes récentes.

**Formes.** — Délivré en ampoules de 10 cc., sous deux concentrations

1 Ampoules de 10 cc. à 1.000 U. A. par cc., soit 10.000 U. A. par ampoule.

2 Ampoules de 10 cc. à 500 U. A. par cc., soit 5.000 U. A. par ampoule.

3 Ampoules de 2 cc. à 1.000 U. A. par ampoule, en boîte de 2 ampoules pour usage préventif.

**Posologie.** — Se référer à notices plus détaillées.

### SÉRUM CLIN ANTIGANGRENEUX

(Préparé d'après la méthode de H. VINCENT et G. STODEL.)

Sérum antigangréneux multivalent.

**Indications.** — Gangrène gazeuse, phlegmons, abcès gazeux, traumatisme avec gros délabrement musculaire, fractures ouvertes, appendicites graves, péritonite, gangrène pulmonaire, diabétique, etc...

**Doses.** — Préventives : 10 à 20 cc. ; curatives : 20, 30, 40 cc.

### SÉRUM CLIN ANTISTREPTOCOCCIQUE MULTIVALENT

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Sérum équin hyperimmunisé contre les diverses races sélectionnées de streptocoques variés et très virulents.

**Indications.** — Toutes les infections graves, locales ou générales et septicémies à streptocoques.

**Doses.** — Variables suivant la gravité de l'infection, de 20 à 100 cc. (par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

Agir vite, suffisamment longtemps.

**Forme.** — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie  
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (Ve)

## SÉRUM-VÉGÉTAL

Du docteur Ouguillière.

**Composition.** — Le sérum-végétal du docteur Cuguillière à base d'essences d'all rendues indolores par un procédé spécial ne présente aucune toxicité sur l'organisme, tout en possédant un pouvoir bactéricide très puissant contre le bacille de Koch.

Il renferme en outre de la myrrhe lui conférant des propriétés balsamiques remarquables et des sels de chaux à l'état naturel dans les végétaux et de ce fait entièrement assimilables.

\* **Références scientifiques.** — Le sérum a été expérimenté au Château Savignac, à Saint-Denis-de-Piles (Gironde), sous le haut patronage de M. le Marquis de Castellane. Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'éminent vétérinaire M. Faure ; c'est à l'hôpital Bichat que le célèbre anatomo-pathologiste le docteur H. Martin-Roux reconnaît ces guérisons sur les pièces examinées.

L'Académie de Médecine reçoit en séance publique du 10 mars 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum-végétal du docteur Cuguillière. Depuis, le sérum est employé avec le plus grand succès et il recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

**Indications.** — Le Sérum-Végétal du docteur Cuguillière est le traitement de choix et quasi spécifique des tuberculoses osseuses et ganglionnaires. Il guérit souvent en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott remontant à plusieurs années et même compliqués de mauvais état général et de fistulisations. Il donne également des résultats remarquables dans toutes les formes de tuberculoses.

Un traitement de trois mois à raison d'une à deux injections de 5 cc. par semaine, hypodermiques profondes (adultes), et d'une cuillerée à potage de sirop iodotannique associé à de l'arrhenal (et sur spécification « vitaminé » sur l'ordonnance, à 4 000 unités internationales, *pro die*), est suivi :

**Cliniquement** : par une amélioration de tous les signes stéthoscopiques et une reprise de l'état général.

**Radiologiquement** : par une régression des images pathologiques.

**Bactériologiquement** : par la diminution des B.K. parchamp.

**Chimiquement** : par l'élévation du cholestérol et de la courbe de séroflocculation de Vernes.

**Hématologiquement** : par une amélioration très rapide de la formule sanguine.

Echantillons permettant un essai loyal et littérature ouvrage édité par la Lib. Norbert-Maloine de Paris, 10-8°, 140 p. : *Traitement phytothérapique de la Tuberculose*.

Laboratoire de PHYTOTHERAPIE  
du Dr Ouguillière. (J)

Docteur en médecine, Anolen externe des Hôpitaux, Pharmacien de la Faculté de Paris, membre de la Société Rotanique de France  
14, rue Gambetta — TOULOUSE.

# SERVO-FREINYL

Médicament type de la spasmodie et des états spasmodiques.

Propriétés Thérapeutiques. — 1<sup>o</sup> Action sédative purement symptomatique par la *phényléthylmalonylurée*. 2<sup>o</sup> Modificateur humoral par les *borotartrates* et les *ions calciques* et *magnésiens*. 3<sup>o</sup> Régulateur endocrinien par la *parathyroïdine* et de carence par la *vitamine D*.

Indications. — *Enfants difficiles* et *hypomantiques*: Tics. Etats obérésiformes. Instabilité.  
Chez l'adulte: Terrain comitial, équivalents comitiaux. Névroses. Dysphorie. Etats spasmodiques.

Présentation. — Granulé d'un goût très agréable.

## Formule.

La cuillerée à café (5 gr.) correspond à :

Borotartrate de magnésie.....	0,35
Borotartrate de calcium.....	0,35
Carbonate de calcium.....	0,125
Phényléthylmalonylurée.....	0,015
Parathyroïdine.....	1/2 mm.
Ergostérine irradiée.....	500 U. I.
Extrait de piscidia.....	0,005 par cuillerée à café.

Posologie. — *Enfants*..... 3 cuillerées à café.  
                  *Adultes*..... 3 cuillerées à dessert.  
(Doses moyennes que le médecin adapte à chaque cas particulier.)  
Durée moyenne : 10 jours.  
Enregistré au L. N. C.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA  
P. GORDONNIER, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

# SETI

Ampoules jumelées de Soufre et d'Iode  
en milieu magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Les ampoules jumelées SETI permettent d'injecter une solution aqueuse magnésienne de Soufre et d'Iode ; c'est l'application de la méthode de Sulfodothérapie préconisée par André LERI et DEDET pour lutter contre le Rhumatisme chronique et ses complications. Pratique, efficace, sans danger et indolore.

Indications. — Rhumatismes chroniques. Arthrites. Névralgies rebelles. Périphlébites. Asthme.

Mode d'emploi. — Le médecin, dans une seringue de 5 cc., aspirera 2 cc. de chacune des solutions, il agitera le liquide jusqu'à décoloration. Il fera l'injection intramusculaire profonde de la solution incolore obtenue en suivant très exactement la technique indiquée. Le SETI s'injecte aussi par voie intraveineuse.

## Laboratoires BRISSON

D<sup>r</sup> DEDET et Cie, Pharmaciens  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

# SETIPYRINE

Complément du traitement SETI et NEO-SETI.

Le médicament de la douleur.

Antirhumatismal complet.

Deux formes : cachets et suppositoires.

Propriétés thérapeutiques. — Les cachets de *Séti-pyrine* associent la médication de fond à la médication anti-algique : ils combattent l'effet et la cause.

Indications. — Rhumatismes et toutes ses manifestations douloureuses, Névralgies de toute origine, Goutte, Arthrite, Sciatique, Migraines, Lumbago.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets ou 2 à 4 suppositoires par jour.

Dose maximum à fixer par le médecin.

## Laboratoires BRISSON

D<sup>r</sup> DEDET et Cie, Pharmaciens

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

# SICOVAIRE

Indications. — Troubles de la puberté ou de la ménopause chirurgicale ou naturelle.

Aménorrhées, dysménorrhées.

Agit dans tous les cas de déficience ovarienne, avec insuffisance ou excès de folliculine.

Composition. — Extrait d'ovaire.

Forme. — Ampoules buvables.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 19 fr. 40.

Posologie. — Une ampoule par jour avant le repas dans de l'eau sucrée, après les règles, ou la période présumée des règles s'il y a absence de règles.

## L. GUÉRET, Pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).  
(Tél. : Pér. 11-01.)

## SIDÉRANYL

Spasmolytique Magnésien  
(Borotartrate de Magnésium).

**Propriétés Thérapeutiques.** — Le type de la médication à la fois sédative et stimulante, respectant intégralement les fonctions mentales. — Sédatif cortical par le borotartrate. — Spasmolytique par l'action inhibitrice du magnésium sur la fibre musculaire lisse. — Vitalisant, cytophylactique et excito-sécrétoire par le même magnésium.

**Indications.** — Médication de choix des troubles nerveux, relevant à la fois de l'asthénie et de l'hyperesthésie par carence magnésienne. Encéphalopathie avec agitations. — Troubles psycho-névropathiques de la ménopause (éréthisme, états d'excitation). — Dyssomnies (mêtemisme du premier sommeil).

**Et surtout :** para-épilepsie, crises nerveuses fonctionnelles.

**Présentation.** — Solution pour Adultes et Enfants, 15 p. 100.  
Sirop pour Nourrissons, 6 p. 100.

(Durée moyenne : 10 jours)

**Formule.** — Borotartrate de Magnésie.

**Posologie.** — Solution : Adultes..... 2 à 3 cuillerées à soupe.  
Adolescents..... 2 à 3 — à dessert.  
Enfants..... 1 à 2 —

Matin, Midi, Après-Midi.

Sirop Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

Enregistré au L. N. C.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA  
P. CORDONNIER, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

## SILÉNAN

809 sulfamide- $\beta$ -camphosulfonique.

**Propriétés.** — Corps chimiquement défini ( $C^{14}H^{14}O^8S^2N^2$ ) cristallisé, — 1° : 205°, — solubilité unique dans la série des sulfamides.

Antibactérien polyvalent ; antitoxinique ; tonique cardiaque, pulmonaire et rénal ; diurétique ; doué de propriétés antichoc. Exceptionnellement actif dans les infections à bactéries sulfamido-sensibles :

- 1° Supprime les éléments microbiens par son action antigénétique ;
- 2° Relève le tonus de l'organisme et augmente sa capacité d'auto-défense ;
- 3° Agit rapidement et en profondeur en raison de son extrême diffusibilité due à sa très grande solubilité ;
- 4° Présente une tolérance parfaite à doses très élevées.

**Indications.** — Infections simples et associées à : strepto, méningo, pneumo, gonocoques, colibacilles ; Abcès, Phlegmons, Angines, Amygdalites, Erysipèle, Scarlatine, Infections puerpérales, Méningites, Septicémies, Pneumonies, Broncho-pneumonies.

Infections urinaires : Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Gonococcies : Uréthrites, Vaginites, Conjonctivites, Arthrites.

Chancre mou, Maladie de Nicolas-Favre.

Grippe et ses complications.

Chirurgie générale ou spécialisée : le Silénan défend les plaies opératoires contre les dangers d'infection et les infections déclarées.

**Présentation et posologie :**

1° Sulfamidothérapie générale.

**Silénan-comprimés** (dosés à 0 gr. 25 ; 4 comprimés = 1 gr.).

La tolérance absolue du Silénan et ce dosage à 0 gr. 25 permettent d'appliquer au maximum les règles essentielles de la sulfamidothérapie, à savoir :

- a. Frapper fort au début, donner ensuite des doses progressivement décroissantes ;
- b. Fractionner le plus possible la dose journalière, sans se soucier des repas, pour maintenir à un taux constant la concentration dans l'organisme.

TABLEAU DE TRAITEMENT  
Adultes : Infections courantes.

1 <sup>er</sup> jour.	2 <sup>e</sup> jour.	3 <sup>e</sup> jour.	4 <sup>e</sup> jour.	5 jour.	6 <sup>e</sup> jour.	7 <sup>e</sup> jour.	8 <sup>e</sup> jour.	9 <sup>e</sup> jour.
5 gr.	4 gr.	4 gr.	3 gr.	3 gr.	3 gr.	2 gr.	2 gr.	2 gr.

Infections très graves (1).

10 gr.	8 gr.	8 gr.	6 gr.	6 gr.	4 gr.	3 gr.	2 gr.	2 gr.
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 doses adultes.

Enfants au-dessous de 5 ans : 1/4 de doses adultes.

Nourrissons : 1 comprimé pro die par kg. de poids du corps.

(1) Ces doses sont très éloignées des doses toxiques; entre ces posologies extrêmes, le praticien adaptera l'administration du Silénan à l'intensité de l'affection.

**Emploi.** — Avaler les comprimés avec un peu d'eau : pour les enfants et les nourrissons, écraser les comprimés dans un peu de lait ou de confiture.

**Présentation.** — Tube de 40 comprimés 24 fr. 50.

2° Sulfamidothérapie locale.

**Silénan-Poudre pure :** Pour applications en chirurgie générale, Gynécologie, O. R. L., Dermatologie, Stomatologie.

- a. En pulvérisations ou insufflations;
- b. En solutions préparées extemporanément dans l'eau bouillie, à la concentration désirée (en pratique 2 à 20 %) pour : lavages, compresses, mèches (petite chirurgie, Plaies infectées, Impétigo, Sycosis, Eczémas, Intertrigo); en gargarismes et bains de bouche (Angines, Amygdalites, Abcès dentaires, Stomatites).

**Présentation.** — Flacons-poudreurs spéciaux de 30 gr. et 10 gr. de poudre pure impalpable (tamis 200).

N.B. — Les meilleurs résultats sont toujours obtenus en instituant le traitement *per os* (Silénan-comprimés) comme thérapeutique de base; on obtient ainsi une imprégnation sulfamidée générale et d'activité antibactérienne à laquelle se joint l'action tonique propre au Silénan et due à son radical camphosul-fonique.

Laboratoires S. COUDERO.  
S. COUDERC, pharmacien.

Ingénieur chimiste, Licencié ès sciences.  
9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV°).  
(Tél. : Suf. 02-64.)

Agence Z. N. O. : 2, place Croix-Paquet — LYON  
(Tél. : B. 09-83.)

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la lésion initiale et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

**Principe.** — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujst, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffer et Pélissier, Acad. Sciences, Août 1920.)

**Composition.** — Silicates de formule  $\text{Si}^4 \text{O}^{12} \text{Na}^4$  et  $\text{K}^4$  stables solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

**Emploi et doses.** — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

**GOUTTES :** Seule préparation titrée à 25 p. 100 de  $\text{SiO}^2$ , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

**COMPRIMÉS :** Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

**AMPOULES :** Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscleureux, angor.).

**Résultats.** — Abaissement de la tension Mm et Ma, Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée, Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

**Indications.** — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacillose, Consolidation accélérée des fractures. Surdité (ionisation). Etats élastopathiques.

2° Artériosclérose, Hypertension, Aortite, Athérome aortique, Sclérose rénale, Angine de poitrine, Endartérite oblitérante progressive. Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale, Troubles cérébraux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scléreuse, Sclérose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Sclérose cardiaque, Anémie siliceuse.

Gouttes : 32 cc. ....	25 francs.
Ampoules : (5 cc. x 6).....	20 francs.
Comprimés : (50 comp.).....	25 fr. 20
Dragées.....	25 francs.

DÉPOT, Paris : Pharmacie P. LOISEAU  
61, boulevard Malesherbes — PARIS.

LITTÉRATURE

Laboratoire CAMUSET  
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.  
(Tél. : Gobelins 00-70.)

## SILIGONE

**Hypotenseur Antisléreux.**  
Médication Silico-Phytothérapique.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Mode d'emploi.** — 4 à 6 comprimés par jour, 15 à 20 jours par mois, de préférence à jeun et un bon moment avant les repas.

**Composition.** — Silicate sodique, Ballote, Yohimbine (0,00066 par comp.), anémone pulsatille.

**Action.** — Abaisse la tension, régularise la circulation, dilate les artérioles, diminue la viscosité sanguine, s'oppose au processus sclérosant.

**Indications.** — Hypertension quelle qu'en soit la cause, angiospasmies, artério-sclérose, athérome, vertiges, sclérose rénale et auriculaire, angine de poitrine, etc.

**Prix.** — L'étui de 50 comprimés : 18 fr. 70.

Concessionnaires :

**Laboratoires R. BERNARDO**  
47, avenue de la République  
VILLENEUVE-LE-ROI (Seine-et-Oise).

## SILIPLASTINE

Pâte à l'eau.

**Indications :**

Les dermatoses suintantes, les dermites irritatives, toutes les lésions que les pommades grasses « chauffent ».

**Avantages :**

La Siliplastine, très agréable à appliquer, ne graisse pas et ne tache pas le linge ; elle s'enlève facilement à l'eau bouillie tiède.

**Présentation :**

Le tube : 16 fr. 50.

Le 1/2 tube : 9 fr. 70.

**Laboratoires du Dr F. DEBAT**  
60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## SILISODE

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40.

Benzoate de lithine : 0 gr. 10.

**Dose.** — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

**Action.** — Hypotensive, antisléreuse.

**Indications.** — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-sclérose. Aortites, Angine de poitrine, Athérome.

**Laboratoires MICHELS**

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

## SILITHIOSINE

**Indications.**

Traitement de l'Artériosclérose, de l'Hypertension et toutes Scléroses.

Maladies de la Cinquantaine et de la Soixantaine.

**Composition.**

A base de *Thiosinamine*, dissolvant puissant des tissus fibreux et scléreux ;  
d'extrait de Scille,  
de Silicate de soude  
et d'extrait de *Viscum album*.

Ne contient pas de produits toxiques.

Aucune contre-indication.

**Posologie.**

2 dragées matin, midi et soir.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

**Laboratoire ALPHA**

MONTREUX-LE-CHATEAU (Terr. de Belfort).

## SILYMAR

(Pilules)

**Composition.** — Extraits hydro-alcooliques de *Silybum Marianum*, de *Teucrium Scorodonia*, de *Paullinia Cupana*.

**Propriétés.** — Tonique vasculaire dépourvu de toute toxicité, bien toléré par les voies digestives, ne produisant pas d'accoutumance; remède spécifique de l'hypotension, agissant en réparateur parfait du tonus des fibres musculaires lisses, en équilibrant les fonctions neuro-végétatives.

**Indications.** — Toutes les affections causées ou caractérisées par une déficience tensionnelle (hypotension idiopathique permanente, hypotension orthostatique, états vago-toniques, migraines, urticaires, asthme, liés au choc anaphylactique, hypotensions de la tuberculose, des maladies infectieuses, des affections hépato-biliaires, des hémorragies, de la dysenterie, des intoxications digestives, des névroses, des néphrites, des dystrophies endocriniennes. Préservatif de la naupathie.

**Posologie.** — Dose moyenne : 1 pilule avant chacun des 3 repas pendant 10 jours, dose que l'absence de toxicité du *Silymar* permet de doubler et de continuer aussi longtemps que le Médecin le juge nécessaire.

Laboratoire E. LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III. — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané**  
du docteur Jean Faure.

Le premier en date. Le plus régulier.

Le moins cher.

**Mode d'action.** — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

Enveloppe contenant un Sinaplasme double.

Boîte contenant trois Sinaplasmes doubles.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe  
AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

## SINAPOL

**Pommade réulsive aux essences (en tubes)**

**Composition.** — Essence de *Sinapis Nigra*, Teinture d'*euphorbia resinifera*, *Eucalyptol*, *Goménol*, *Gaïacol*, *Menthol*.

**Indications.** — Toutes celles des cataplasmes et enveloppements sinapisés, des sinapismes ou autres applications révulsives. Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires, douleurs, rhumatismes, névralgies, etc...

**Posologie.** — SINAPOL, 1 tube, étendre en onction *très légère*, puis recouvrir de coton cardé ou flanelle. Pour les épidermes spécialement sensibles, étendre au préalable une petite couche de vaseline, puis faire l'application de SINAPOL comme il est dit plus haut.

Laboratoires DEODAX

R. RENAUD \* ☼

ANOULD (Vosges).

## SINUSYL

**Indications.** — Toutes désinfections nasales. Sinusites, Coryza, Rhinites, Ozène, Rhume des foins.

**Composition.** — Résorcine, Camphre, Myrtol, Essence de violettes, Excipient huileux.

**Forme et mode d'emploi.** — Se fait :  
En *huile* pour instillations nasales.  
En *huile éphédrinée* à 1 p. 100, en pulvérisations.

En *pommade* dans un tube spécial ;  
En *rhino-capsules* pour auto-instillations.  
A employer également en période d'épidémie.

Laboratoires VENOT

Docteur en pharmacie

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 68-20.)

## SIPHURYL

(Orthosiphon Longuet)

**Composition.** — Extrait d'Orthosiphon Stamineus, en gouttes aromatisées (LX gouttes = 0,50 extrait sec) ou comprimés (1 comp. = 0,25 ext. sec).

Remplacelatisane impraticque et peu agréable.

**Indications.** — Diurétique hépato-rénal, sans aucune contre-indication.

Éliminateur d'eau, urée, acide urique et chlorures, Oligurie, Arthritisme, Lithiase rénale, obésité.

### Doses :

LX gouttes dans 1/2 verre d'eau, 3 fois par jour ou 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS. (Tél. : Roquette 21-95.)

## SIROP BERTHÉ

**Composition.** — A base de codéine, 15 milligrammes de codéine par cuillerée à soupe de 20 grammes de sirop : 11 milligrammes environ par cuillerée à entremets, 4 milligrammes par cuillerée à café.

**Indications.** — Préparation d'un goût agréable qui s'emploie contre les rhumes et les autres affections des voies respiratoires, maladies nerveuses, souffrance et insomnie dues à une maladie quelconque.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** 1 à 4 cuillerées à soupe, 1 à 6 cuillerées à café.

**Enfants** au-dessous de 3 ans, on prépare une petite potion en additionnant une cuillerée à café de sirop Berthé de deux cuillerées à soupe d'eau. On donne dans les 24 heures autant de cuillerées à café de cette potion à l'enfant que cela est nécessaire pour le calmer.

**Enfants** au-dessus de 3 ans, une 1/2 cuillerée à café par année d'âge.

Prix : le flacon 16 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

**Établissements FUMOUEZ**

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS  
(Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

## SIROP CASSIBOR

Sirop à base de teinture d'aconit, substances pectorales, séné, cassis et borate de soude. Goût agréable, ne fatigue pas l'organisme, ne cons-tipe pas.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** 3 à 5 cuillerées à soupe.

**Enfants :** 1 cuillerée à café par année d'âge.

**Indications.** — Prescrit contre rhumes, angines, bronchites, gripes et névralgies. C'est le sirop type pour les enfants.

On l'emploie également après les opérations chirurgicales chez les malades enrhumés.

Le flacon : Prix : 16 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

**Établissements FUMOUEZ**

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.  
(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

## SIROP D'AUBERGIER

à base de *Lactucarium*.

Propriétés sédatives et calmantes de l'opium sans avoir les inconvénients de ce médicament.

*Médication calmante* spécialement recommandée pour les enfants :

Affections des voies respiratoires : bronchites, rhumes, toux convulsives.

Excitation nerveuse.

**Doses :** *Enfants :* 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Adultes :* 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires CLIN, COMAR et Cie**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)



## SIROP DE GAÏARSOL

**Composition.** — Méthylarsinate de Galacol.

**Indications.** — Calme immédiatement la toux, Désinfecte les voies respiratoires, Stimule la résistance organique. Tolérance absolue, assimilation parfaite.  
La toux, les affections pulmonaires, les complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses.

**Forme.** — Sirop.

### Posologie :

*Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants* de moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillerée, ou fraction de cuillerée à café.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

## SIROP DELABARRE

**Composition.** — Association de Tamarin et de Safran, sans narcotique.

**Indications.** — Souffrances de la première dentition.

**Mode d'emploi.** — Frictionner doucement avec le doigt les gencives des enfants qui font des dents. Faire plusieurs frictions par jour, tout au moins une le matin et une le soir.

Prix : 15 fr. 70.

**Établissements FUMOUCÉ**

H. GLOVER et C<sup>ie</sup>

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

## SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr. ; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

**Dose et mode d'emploi.** — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

**Indications.** — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

**Dépôt : Laboratoires H. NOGUÈS**  
7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges .....	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia .....	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé .....	0 gr. 25

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

*Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.  
Préparation très recommandée aux enfants.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 18 fr. 70.

**Produits GONNON**

**J. et O. GONNON, Pharmacien**

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

## SIROP DÉPURATIF VINCENT

Le régénérateur du sang

**SIROP DÉPURATIF N° 0.** — Sirop de Salsepareille composé, miel d'abeille.

**SIROP DÉPURATIF N° 1.** — Sirop de Salsepareille composé, miel d'abeille, iodure de potassium : 0,77 p. 100.

**Propriétés.** — Traitement rationnel des maladies de la peau et des vices du sang.

**Indications.** — Maladies de la peau, Eczéma, Dartres, Boutons, Démangeaisons, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies de la vessie, Bronchite chronique, Engorgement pulmonaire, Asthme, Emphyseme, Arthritisme.

**Posologie.** — *Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 cuillère à café. — *Enfants*, de 10 à 15 ans : 1 cuillère à dessert. — *Adultes* : 2 cuillères à café.

Ce sirop se prend le matin à jeun, dans un peu d'eau ou de tisane amère.

**SIROP DÉPURATIF N° 2 ET 3.** — Sirop n° 1 + Iodure de potassium à 1,92 et 3,85 p. 100. Mêmes propriétés que le n° 1.

**SIROP DÉPURATIF N° 4.** — Dépuratif n° 1 + Extrait fluide d'Hamamelis : 3,24 p. 100.

**Indications.** — Troubles de la circulation et de la puberté ; malaises de l'âge critique ; toutes les affections du système veineux.

**Laboratoire A. VINCENT**

DELPORTE, Pharmacien,

8, place Victor-Hugo — GRENOBLE.

## SIROP D'EUCALYPTINE

Antiseptique pulmonaire, Calmant de la toux,

**Composition :**

Essence déterpénée d'eucalyptus, phénosulfonate de sodium, camphosulfonate de sodium, galacosulfonate de potassium, bromoforme, codéine, narcéine, teinture de belladone, teinture d'aconit.

**Indications.** — Toutes pneumopathies aiguës ou chroniques, gripes et complications broncho-pulmonaires, broncho-pneumonie, bronchite, coqueluche, trachéo-bronchite, pneumonie, toux spasmodique, abcès du poulmon.

**Posologie :**

*Adultes* : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

*Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café ou à dessert selon l'âge.

**Laboratoire LE BRUN**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI°).

(Tél. : Kléber 71-33.)

## SIROP DUBOIS au CRÉOSAL

**Composition.** — Le Créosal réunit dans sa composition le Galacol, l'Acide Phosphorique et le Calcium, que la Thérapeutique a toujours associés.

**Propriétés et indications.** — Récalfifiant puissant. Accélérateur de la Nutrition. Sédatif de la toux quelle qu'en soit l'origine. L'emploi du SIROP DUBOIS au CRÉOSAL est tout spécialement indiqué au début et au cours des gripes, bronchites, affections pulmonaires.

**Forme.** — Sirop de goût très agréable, malgré haute teneur en principes actifs.

**Posologie et mode d'emploi.**

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

*Enfants* (de 10 à 15 ans) : 2 à 4 cuillerées à café.

Le SIROP DUBOIS au CRÉOSAL se prend de préférence dans une infusion ou de l'eau très chaude, à distance des repas.

**Durée moyenne des unités de vente :** de 5 à 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon : 15 fr. 80.

**Laboratoires LALEUF**

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI°).

(Trocadéro : 62-24.)

## SIROP DU D<sup>r</sup> LAGNOUX

au valérianate de caféine.

Spécifique contre

la **Coqueluche**

et les **Toux** quinteuses.

Grâce à un procédé spécial de fabrication, ce sirop, contrairement à ce qu'on pourrait croire, possède un *goût délicieux* et est accepté par les enfants les plus difficiles.

**Qualités thérapeutiques.** — Antispasmodique, sédatif, tonocardiaque, dépourvu de toxicité.

### Posologie :

*Enfants* : de 6 mois à 1 an : 3 à 4 cuillerées à café par jour ; de 1 an à 4 ans : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Le flacon : 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1689-7.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> J. LEFÈVRE**

Docteur en médecine, Pharmacien,

Ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Paris.

200, faubourg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 01-09.)

## SIROP ET PÂTE PECTORALE ROBIN

(Formule du D<sup>r</sup> Bousquet)

**Composition.** — Chlorhydrate d'éthylmorphine (Méthylcodéine), non stupéfiant. Teintures de Drosera et d'Aconit, Bromoforme, Eau distillée de laurier-cerise.

### Indications :

*Sirop* : Sédatif rapide de la toux et de l'oppression.  
*Pâte* : Pharyngites, Laryngites.

**Formes.** — Sirop et Pâte de goût agréable.

*Sirop* : 1 cuillerée à potage renferme 0 gr. 01 de chlorhydrate d'Éthylmorphine, II gouttes Bromoforme, VI gouttes Teinture de racine d'Aconit, VI gouttes Teinture de Drosera, 0 gr. 75 eau distillée de laurier-cerise.

*Pâte* : 10 grammes renferment 0 gr. 015 de chlorhydrate d'Éthylmorphine.

### Posologie :

*Sirop* : 4 à 8 cuillerées à potage par jour (*adultes*) ;  
2 à 4 (*enfants* au-dessus de 10 ans).

*Pâte* : une vingtaine de bonbons (*adultes*). Moitié pour les *enfants*.

### Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.  
(Tél. : Odéon 08-55,38-75.)

## SIROP FAMEL

**Antiseptique.** — Lactocréosote soluble. Cicatrisant non caustique, bien toléré.

**Calmant.** — Codéine, Aconit.

**Récalcificateur.** — Lactophosphate de chaux.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe le matin avant déjeuner et une le soir au coucher ; dilayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, troisième cuillerée à midi.

*Enfants* : de 3 à 14 ans : par cuillerée à café ; de 5 à 8 ans : par demi-cuillerée à café ; au-dessous de 5 ans : ajouter dans une tasse à café d'infusion de grains d'orge une demi-cuillerée à café de sirop et donner ce mélange à raison de une ou plusieurs cuillerées par jour, suivant les indications du Médecin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches et du poulmon : bronchites chroniques, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

**Prix** : 14 fr. 70.

### Laboratoires FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## SIROP FLAMAND

### Pectoral.

Sirop d'ipécacuanha composé (analogue à la formule dite de Desessart), auquel on a ajouté morphine, dionine, pyramidon, soneryl, chloral.

**Indications.** — Action remarquable dans les affections des bronches et dans l'emphysème.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 19 francs.

**Société des Laboratoires de MONTMOROT**

G. de MONTMOROT, Pharmacien  
12 bis, rue Keppler — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28).

## SIROP GIRARD

### Iodo-tannique

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

### Mode d'emploi :

**Adolescents :** 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.  
**Enfants :** 1 cuillerée à dessert avant chaque repas.

### Propriétés thérapeutiques :

Tonique, reconstituant, reminéralisateur, dépuratif.  
Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

### Indications :

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

Prix : 21 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

### Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 405-3.

## SIROP GRIBELL

**Composition.** — Baume du Canada « Prunus virginianus », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires.

**Mode d'emploi.** — *Adultes :* 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 13 fr. 90.

### PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 5 fr. 10.

### SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé

**Mode d'emploi.** — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 11 fr. 40.

**Laboratoires ÉLIÈRES**  
19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## SIROP HERCELL

### Composition :

Bi-iodure d'Hg.....	0,005
KI.....	0,25
Extrait végétal de Larrey.....	0,20
Par cuillerée à soupe.	

**Forme.** — Sirop stabilisé.

**Indications.** — Toute la thérapeutique par l'Hg dissimulé.

Médicament d'entretien. Tonique et dépuratif bi-iodé.

### Doses :

*Adultes :* 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* par cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 25 fr. 30 le flacon de 310 cc.

Durée du flacon : dix jours environ.

Enr. au Lab. Nat. de cont., sous le n° 1356-1.

**G. MAHÉ, Pharmacien.**

85, rue de Trignac

SAINT-NAZAIRE-PENHOËT (L.-I.) (Tél. : 115.)

# SIROP IODOCALCIUM

*La forme moderne du sirop iodotannique.*

Association iocalcique assimilable.

## Composition :

*Gluconate de calcium*..... 0 gr. 10

*Chlorure de calcium*..... 0 gr. 10

*Iode en combinaison organique*. 0 gr. 01

*Par cuillerée à café.*

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et de la chaux. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, lymphatisme, pré-tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

## Posologie :

**Enfants :** au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café, 2 fois par jour.

**Adultes :** 1 à 2 cuillerées à dessert, 2 fois par jour.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.**

A. DETROIS, Pharmacien

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

# SIROP LAINCAR

 Affections des voies respiratoires.

**Composition.** — Hysope, Codéine, Narcéine, Grindélia, Drosera.

**Propriétés.** — Antiseptique pulmonaire, sédatif de la toux. Saveur agréable bien supportée par tous les malades.

**Indications.** — Toutes affections des bronches et des poumons, Bronchites, Toux spasmodiques, Gripes, Catarrhes, Laryngites, Emphysème pulmonaire.

**Posologie** — *Enfants* de 3 à 8 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* de 8 à 12 ans : 6 à 8 cuillerées à café par jour.

*Adultes :* 4 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Prendre ce sirop, si possible, dans une tisane chaude, 1 heure avant ou 3 heures après les repas.

## LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Élysées 17-46.)

# SIROP LECŒUR

*Rhus aromatica*, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Sauge, Acide phosphorique; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques. *Contre l'incontinence d'urine.*

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

**De 2 à 5 ans :** 1 cuillerée à café le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

**De 5 à 10 ans :** 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

**Plus de 10 ans :** 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

**Adultes :** 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

Prix : 20 francs le flacon de 187 cc.

Enreg. au L. N. C. M. n° 532-2.

**Laboratoires GAVIN, \***

VIMOUTIERS (Orne). — Tél. : 22.

# SIROP MERCK A L'ÉPHÉTONINE

**Composition.** — Éphétonine, Dionine, Sirop de thym composé.

**Propriétés.** — Diminue l'irritation tussigène, dilate les bronches, fluidifie les sécrétions et facilite l'expectoration.

**Indications.** — Formes aiguës et chroniques de la toux ; bronchites, grippe, pneumonie.

**Présentations.** — Flacons contenant 170 gr. environ d'un sirop de goût agréable.

**Posologie.** — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 1/2 cuillerée à café 2 à 3 fois par jour.

*Enfants* au-dessus de 3 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café 3 à 4 fois par jour.

*Adultes :* 1 à 2 cuillerées à café, 4 fois par jour.

## Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

## SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.  
Approbation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris.

**Indications thérapeutiques.** — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

### Posologie :

**Adultes :** 1 cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

**Enfants :** 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans : 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Voir : « **SUFROL** » CROSNIER.  
Comprimés ayant les indications du sirop.

### Laboratoires CROSNIER

199, avenue Michel-Bizot — PARIS. (Tél. : Did. 04-53.)

## SIROP MIREILLE

Le plus agréable au goût, le plus actif pour le traitement polyvalent des affections de l'appareil respiratoire.

Calmant, sédatif de la toux, hypnotique, balsamique, antiseptique, diurétique, expectorant, émollient, sudorifique, à base de bromhydrate de codéine, terpène, aconit, belladone, benzoate de soude, etc...

Se prend à toute heure, aucune contre-indication, pas de toxicité, pas d'intolérance, pas d'accoutumance.

Prix au public : 17 francs.

### Laboratoires LEGENDRE

Section DS — B. P. COURBEVOIE (Seine).

Avec Dépôts Généraux pour la vente en gros :  
France et Colonies :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

Belgique :

### M. RAMLOT

72, rue de l'Escaut — BRUXELLES-MARITIME

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des  
Médicaments sous le n° 1045-2.

## SIROP MORLAS

Pour nouveau-nés et enfants.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, hérédosyphilis, etc.).

### FORMULE

Ions métalliques de poids atomique... 200-0.02  
Solution Kali arsenicosi... 0.25

Pour 100 cm<sup>3</sup>

(Inscrit au Laboratoire de Contrôle sous le n° 1606-9.)

### Doses :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café.

De 6 à 10 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

Le SIROP MORLAS est employé pour les adolescents et les adultes à raison de 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 20 fr. 60.

**Laboratoire MOURÉ, P. COTARD, Pharmacien**

Passage des Princes — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Richelieu 82-56.)

Dépôt général : O. C. P., Paris et ses succursales.

## SIROP NOGUÈS

### Composition :

Alcoolature d'aconit	} aa.....	0,030
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia		0,075
Bromoforme		0,016
Codéine		0,009
Benzoate de soude		0,079
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise		Q. S.
pour une cuillerée à bouche.		

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

**Indications.** — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

### Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SIROP PECTONAX

**Présentation.** — En flacon (22 fr. 25).

**Principes actifs.** — Bromhydrate de codéine, Alcoolature de racines d'aconit, Thiocol (Sulfogaicolate de potasse), Bromoforme, Benzoate de sodium, Sirop d'eau de laurier-cerise.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires, Rhumes, Laryngites, Trachéites, Bronchites aiguës ou chroniques, Bronchopneumonies, Pneumonies, Coqueluche, Grippe et Complications.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-41.

### Laboratoires PROBIOS

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## SIROP PHOSPHO-VITAMINÉ VIAL

Viande, Lacto-phosphate de chaux, Quina-complexe vitaminique B.

**Composition pour 1 cuillerée à soupe (20 gr.) :**

Complexe vitaminique B.....	4 cgr.
Substances extractives de la viande.....	1 gr.
Lacto-phosphate de chaux.....	1 gr.
Quinine.....	0,005
Sirop de Gentiane.....	6 gr.
Sirop de Quina.....	8 gr.
Sirop simple.....	8 gr.

**Posologie.** — Suivant indications et généralement :  
*Adultes* : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* : 1 cuillerée à café, pur ou dilué dans un peu d'eau pure ou minérale, 1/4 d'heure avant les principaux repas.

**Indications.** — Asthénies de toutes espèces, Convalescences, Rachitisme léger, Croissance et puberté, Grossesse, Allaitement, États déficients des vieillards.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 687-2.

**Laboratoires Pharmaceutiques VIAL FRÈRES**

7, rue Damon — VILLEURBANNE (Rhône).  
(Tél. : Vill. 95-11.)

## SIROP POLÉRY

### Composition :

Sirop d'érysimum composé.....	46 gr.	Benzoate de soude.....	1,75
Sirop de polygala.....	23 —	Eau de laurier-cerise ...	5,75
Codéine.....	0,04	Teinture d'aconit.....	0,75
Chl. d'éthylmorphine.....	0,02	Teinture de belladone...	0,95
Bromure de sodium.....	0,40-	Sirop simple Codex. Q. S.	100 gr.

**Propriétés.** — Spécifique des irritations chroniques de la gorge, Antispasmodique, Calmant de la toux, Expectorant, Décongestif de l'appareil pulmonaire supérieur.

**Indications.** — Toux d'irritation, toux rebelles et chroniques, bronchites, grippe, catarrhe, asthme, enrouements, trachéites, pharyngites, laryngites, toux des tuberculeux.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 240 grammes : 19 francs.

### Posologie :

*Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe dans les 24 heures, loin des repas.

*Enfants* : au-dessus de 10 ans, par petites cuillerées à dessert.

L. N. C. n° 1483-2.

*La situation économique actuelle ne permettant pas l'approvisionnement régulier en matières premières, la vente du sirop POLÉRY est momentanément réduite.*

**Laboratoires Biochimiques de l'Est**

J. FRECHIN, Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur, LURE (Haute-Saône).

## SIROP RAMI

**Au Bromoforme. Spécifique de la toux.**

**Composition.** — Bromoforme, Codéine, Aconit, Tolu, Laurier-cerise.

**Mode d'action.** — La formule du sirop Rami, judicieusement équilibrée, en fait un auxiliaire précieux dans le traitement des affections broncho-pulmonaires et un sédatif remarquable du système nerveux et de la toux spasmodique.

**Indications.** — Laryngites, Pharyngites, Trachéo-bronchites aiguës et chroniques, Coqueluche, Toux spasmodiques.

**Doses par 24 heures.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe, une à une, espacées, le plus loin possible des repas.

*Enfants au-dessus de 5 ans* : 3 à 5 cuillerées à café, une à une, espacées, le plus loin possible des repas.

*Enfants au-dessous de 5 ans* : 1 cuillerée à café dans trois cuillerées à café d'eau ou d'infusion, et donner ce mélange par deux cuillerées à café toutes les heures ou toutes les deux heures suivant l'âge.

Prix : 16 fr. 70 le flacon.

**Pâte Rami.** — Hors de chez soi, elle remplace le Sirop. Elle est plus spécialement destinée aux maux de gorge et aux enrouements, et très appréciée pour la souplesse et la sonorité qu'elle donne à la voix.

**LABORATOIRES FOUGERAT**

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine). (Tél. : Pereire 00-32.)

Dépôt pour la Belgique :

Sirop Rami, 53, rue du Poinçon, Bruxelles.

## SIROP « ROCHE » AU THIICOL

1 cuillerée à soupe de Sirop « Roche » = 1 g. de Thiocol « Roche ».  
1 g. de Thiocol « Roche » = 0 g. 52 de gâfacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café selon l'âge.

**Prop. thé.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupéptique, Orexique.

**Indic. thé.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 504-51.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Archives 91-10)

## SIROP SÉDATIF DE L'ENFANCE Neurocalolum

**Composition.** — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du gluconate de calcium.

**Indications.** — Tous les syndromes nerveux, spasmodie, troubles de la dentition, convulsions, cris, terreurs nocturnes, etc.

Gluconate de calcium .....	0 gr. 10
Chlorure de calcium .....	0 gr. 10
Bromure de calcium .....	0 gr. 05
Par cuillerée à café.	

**Posologie.** — *Enfants du 1<sup>er</sup> Age* : 1 à 4 cuillerées à café, *Après 3 ans* : 1 à 4 cuillerées à dessert et plus en cas d'accidents aigus.

Il existe une forme granulée plus active. (Voir Neurocalcium.)

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France  
A. DÉTROIS, Pharmacien

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## SIROP au SOLUCAMPBRE DELALANDE

### Pectoral et Eupnéique.

**Composition.** — Solucampbre, Ephédra total, Codéine, Codéthylène, Constituants essentiels du sirop Desessartz (Ipéca et Séné).

**Actions thérapeutiques.** — Calme immédiatement la toux, relève le cœur et facilite la respiration. Facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toux en général, et en particulier la toux des bronchiteux, la toux spasmodique (coqueluche) et la toux des tuberculeux.

### Posologie :

*Adultes* : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chez les chroniques, des doses moindres suffisent.

*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Même formule sous forme de comprimés.

Voir PECTOCANFOR

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 18-33.)

## SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur.

Médecine du nourrisson.

**Indications thérapeutiques.** — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

**Doses.** — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 9 fr. le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

74, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.



## SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté.

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé .....	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia .....	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux....	2 gr. 25
Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.	

**Posologie.** — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

**Indications.** — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

*Sous réserve des possibilités de fabrication.*

### LABORATOIRE OBERLIN

#### J. TINARDON

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Trudaine 14-73.)

## SIROP VACHERON

au Galacol de Synthèse.

**Composition.** — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de galacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de galacol absolu.

**Avantages.** — Le galacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

**Indications.** — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

**Enfants :** De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 18 fr. 70.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

## SISTOMENSINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN LIPOIDIQUE.

**Action physiologique.** — Régularise la fonction menstruelle et limite le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

### Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.
- IV. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec l'Agomensine).

*Comprimés.*

**Doses.** — 3 à 6 comp. par 24 h.

**Formuler.** — Flacon de 40 comprimés.

Flacon de 100 —

(Voir LUTOCYCLINE.)

**Laboratoires CIBA — D<sup>r</sup> P. DENOYEL**  
103-117, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON  
(Tél. : Moncey 43-26.)

## SODERGYL

Modificateur de la Viscosité sanguine.

### Composition :

Citrate de soude.....	12 gr.
Sulfate de soude sec.....	3 gr. 5
Bicarbonate de soude .....	4 gr.
Phosphate de soude sec.....	6 gr.
Hyposulfite de magnésie .....	1 gr. 50

**Forme.** — Granulé soluble.

**Indications.** — États congestifs, Hypertension, affections du système veineux, migraines, constipation.

### Doses :

Le Sodergyl, *granulé citraté, sulfate sodique et magnésien*, se prend à la dose de 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Durée de la boîte : 10 jours environ.

Prix : 17 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1082-3.

**A. MIRONNEAU, Pharmacien.**

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18.)

## SODERSÉINE

**Indication.** — Coqueluche. Toux spasmodiques.

**Composition.** — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

**Forme.** — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

**Doses journalières :**

<i>Enfants</i> jusqu'à un an .....	100 gr.
— de un an à 3 ans .....	150 —
— de 3 ans et au-dessus .....	200. —

Prix du flacon : 14 fr. 10.

**Laboratoire DEPRUNEAUX**

23, r. du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).  
(Tél. : Tremblay 12-04.)

## SODÉSYL

*Paquets de Bourget.*

**Estomac — Foie — Intestin.**

**Préparation intégrale de la solution de Bourget.**

Sulfate de soude.	} Chaque paquet dosé pour obtenir un verre de la solution de Bourget.
Phosphate de soude.	
Bicarbonate de soude.	

**Forme.** — Paquets.

**Emploi et dose.** — 1 paquet le matin à jeun dans un verre d'eau de Vichy tiédie au bain-marie.  
*Enfants :* demi-dose adultes.

**Indications.** — Toutes les applications de la solution de *Bourget* : insuffisance hépatique, congestion du foie, hyperchlorhydrie, gastro-entérite de l'enfance, intoxication intestinale et toutes affections du tube digestif.

Prix : 14 fr. 50.

« Jamais d'insuccès. »

**Laboratoire du SODÉSYL**

**R. BACQUELIN-JACQUET, D<sup>r</sup> en Pharmacie**  
NEVERS (Nièvre).

*Fabrication toujours assurée.*

## SODOLACTINE

(Estomac.) Δ 0,38.

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle facilite physiquement l'évacuation de l'estomac.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

### Posologie :

Une mesure dans une tasse à thé d'infusion ou d'eau tiède.

*Après les repas :* Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons (1 cuill. à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuill. à soupe de cette solution après chaque tétée)

*Avant les repas* (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

*Remarque importante.* — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : une mesure par tasse à thé de liquide,

(A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

**Laboratoires GERDA — F. GERIN, Pharmacien**

10, rue Jacquard — LYON

## SODOTHIOIOL

Médication hépatotrope et désensibilisante et de toutes carences soufrées.

Solution stérilisée, pure, isotonique, injectable de thiosulfate de sodium (hyposulfite chimiquement pur).

**Ampoules de 2 cc.** : dose moyenne (les plus courantes).

**Ampoules de 5 cc.** : dose forte (cas plus sérieux) et plus particulièrement désensibilisation

pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, et même par voie buccale.

Antilithiasique, solvant, antiseptique, réducteur hépato-biliaire.

**Indications.** — Lithiase biliaire, coliques hépatiques, cholécystite, insuffisance hépatique, ictères, etc.

Lithiase rénale, coliques néphrétiques, rhumatismes chroniques, noueux, déformants. Accidents cutanés récidivants, désensibilisation, états congestifs chroniques des muqueuses respiratoires.

**Posologie.** — Cure d'assaut : 10 injections, 1 par jour.

Cure de fixation : 10 autres injections 15 jours, puis 2 mois plus tard.

Cure d'entretien : 10 injections 6 mois, puis 1 an après la 1<sup>re</sup> série.

**Prix :**

La boîte de 10 ampoules de SODOTHIOIOL 2 cc. : 25 francs.

La boîte de 10 ampoules de SODOTHIOIOL 5 cc. : 34 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 553-5.

**Laboratoire de  
MÉDECINE EXPÉRIMENTALE  
BEAUVAIS (Oise).**

## SOJAMINOL

Antianémique Neurotonique.

### Composition :

Complexe d'acides aminés extraits du soja, riche en Vitamines du groupe B ; Glucosides de Fer et de Cuivre ; Bitartrate d'aminotolulyléthylcarbinol (Ambotolyl).

### Indications :

Anémies et états asthéniques. Anémies par spoliation sanguine, par carence martiale. Anémies consécutives aux maladies infectieuses et parasitoses sanguines et intestinales. Anémies de l'enfance, de la formation, de la grossesse. Toutes déficiences physiques ou nerveuses, déficiences organiques, amaigrissement, surmenage, fatigue générale.

### Présentation :

Comprimés dragéifiés.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 6 comprimés par jour.

*Enfants* : 4 comprimés par jour.

A prendre au moment des repas.

Doses d'entretien pour reconstituer les réserves hématopoïétiques : moitié des doses ci-dessus.

**Laboratoires J.-P. PETIT et C<sup>ie</sup>**

72, boulevard Davout — PARIS (XX<sup>e</sup>).

(Tél. : Did. 55-01.)

## SOJA « SOYOLK »

Farine intégrale de Soja désodorisée et stabilisée.  
Inaltérable. Saveur agréable.

Aliment hyperprotéique de haute digestibilité.

**Analyse :** Caséine végétale, 43 % ; Matières grasses, 18 % ; Hydrates de carbone solubles, 13 % (absence d'amidon), Lécithine.

Vitamines naturelles A, B, D, E.

Valeur alimentaire : 100 gr. = 370 calories utiles,  
1 cuiller à soupe rase (7 gr. 50) = 27 calories.

### Principales indications :

**Nourrissons :** Intolérances au lait, Dyspepsies, Eczéma.

**Adultes :** Pansement gastrique alimentaire de l'ulcère, de l'hyperchlorhydrie et des gastro-pathies douloureuses. Diabète (ration hydro-carbonée restreinte). Infection intestinale. Colites. Putréfactions. Réalimentation des typhiques.

Dans les troubles digestifs chroniques du nourrisson, utiliser le **VÉGÉLACT**, qui est l'**ALIMENT COMPLET DU RÉGIME LACTÉ RESTREINT**.

Vendu en boîtes carton de 250 gr.

## SOJALOSE

Farine biscuitée contenant 45 % de Soja « Soyolk » exclusivement végétale, sans lait, sans sucre.

**Analyse :** Protéines, 27 % ; Hydrates de carbone, 42 % ; Matières grasses, 12 % ; Sels calciques, 6 %.

Valeur alimentaire : 100 gr. = 380 calories.

**Indications.** — Aliment hyperprotéique pour enfants et adultes intolérants au lait. Aliment tonique, permettant de varier l'alimentation des diabétiques. Bouillies, potages, entremets pour Colitiques, Convalescents et Vieillards. Aliment concentré pour sportifs.

Vendue en boîte de 250 gr.

**Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## SOLANTYL

Anti-épileptique non hypnotique.

**Composition.** — Di-phényl-hydantoïmate de soude.

**Propriétés.** — Anticonvulsivant sans action dépressive centrale.

Respecte le psychisme et la rélectivité.

**Indications.** — Épilepsie, Équivalents, Barbituro-résistance.

**Mode d'emploi.** — Le passage de la médication barbiturique au SOLANTYL nécessite un sevrage progressif. Il est recommandé de réduire les doses de barbiturique par paliers de 5 cgr., que l'on remplace chaque fois par une dose de 10 cgr. de SOLANTYL.

Les paliers durent de 3 à 7 jours selon l'importance de la dose initiale de barbiturique.

**Présentations.** — Tube de 25 comprimés dragéifiés dosés à 0 gr. 10. — Tube de 100 comprimés dragéifiés dosés à 0 gr. 10.

**Posologie moyenne.** — **Adultes :** 2 à 6 comprimés de 0 gr. 10 par jour, à prendre au milieu des repas.

**Enfants :** jusqu'à 10 ans, 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 ; au delà, doses normales.

Prix au public : Le tube de 25 comprimés : 25 francs.

Le tube de 100 comprimés : 80 francs.

**Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs. — R. C. Seine 232.188 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## SOLGANAL B huileux CRUET

Chrysothérapie des maladies infectieuses

**Composition.** — Sel d'or organique (aurothiogluco) titrant 50 p. 100 d'or métall en suspension huileuse. Le SOLGANAL B huileux possède l'index thérapeutique le plus favorable de tous les sels d'or ; sa toxicité est pratiquement nulle.

**Indications.** — Rhumatisme infectieux — Tuberculose — Sclérose en plaques — Lèpre.

**Posologie.** — Consulter la notice jointe à l'emballage.

### Présentations :

Ampoules.	Dose	I — 0,01.....	7 fr. 90
—	—	II — 0,05.....	16 fr. 50
—	—	III — 0,10.....	24 fr. 40
—	—	IV — 0,20.....	33 fr. —
—	—	V — 0,30.....	40 fr. 90
—	—	VI — 0,40.....	48 fr. 80
Flacons de	5 cc. à 2 %.....		24 fr. 40
—	5 cc. à 20 %.....		100 fr. —

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74.19)

Z. N. O. DECOUDRE, 87, avenue de Saxe — LYON

## SOLHYSOP

**Composition.** — Solution aqueuse d'huile essentielle d'*Hyssopus officinalis*, additionnée de 1/10 de solution aqueuse de Camphre de Bornéo (Bornéosol).

**Action.** — Antiasthmatique, antidyspnéique.

### Avantages :

Atoxicité complète. Absorption facile. Injection indolore.

Action directe, rapide et durable sur toutes les dyspnées.

**Indications.** — Asthme, emphysème, rhume des foins, bronchite chronique.

### Présentation et prix :

Ampoules. Boîte de 6 amp. de 5 cc. 34 fr. 50  
Gouttes. Flacon de 30 cc. .... 34 fr. 50

### Laboratoires du BORNÉOSOL

DEROME-PINAUD, Pharmacien,  
143 bis, rue Ordener — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 07-76.)

## SOLUBÉOL

**Composition.** — Solution aqueuse d'huiles essentielles provenant exclusivement de produits de distillation de plantes fraîches, sans adjonction d'aucun produit de synthèse.

### Formule par cc. :

*Cupressus sempervirens*..... 0,0175    *Hyssopus officinalis*..... 0,0025  
*Olivus bigaradia* ..... 0,0275    *Lavandula officinalis*..... 0,0025

Sérum physiologique q. s. pour 1 cc.

**Indications.** — Toutes les affections et infections des bronches et des poumons :

a. Affections aiguës : trachéite, bronchite, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, abcès du poulmon, gangrène pulmonaire.

b. Affections chroniques : bronchite chronique, emphysème pulmonaire, dilatation des bronches.

Tuberculose pulmonaire subaiguë et chronique.

Agent de désinfection générale.

### Présentation :

A. Ampoules de 3 cc. Boîte de 8 ampoules.

— 5 cc. — —  
— 10 cc. — —

Injectons sous-cutanées, intramusculaires, ou intraveineuses en cas d'urgence.

B. Gouttes (solution alcoolique).

— (essences pures).

C. Suppositoires Adultes Boîte de 8 suppositoires.

Enfants — —

Bébés — —

### Laboratoires LEBEAULT

FRESINS et C<sup>ie</sup>

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SOLUCALCINE

Chlorure de calcium pur et stable.

**Composition.** — Préparée à partir du calcium et de l'acide chlorhydrique purs, cette solution concentrée est stable et ne présente pas d'oxychlorures, même à la longue.

XXX gouttes de la solution contiennent 1 gramme de chlorure de calcium.

**Action.** — Le chlorure de calcium est un récalcifiant, un antihémorragique, un déchlorurant, un anti-hémoclasique.

**Indications.** — Tuberculose et pré-tuberculose. Hémorragies internes. Hémorragies opératoires, chirurgicales et obstétricales (traitement préventif), Spasmodie, Tétanie, Eclampsie, Urticaire, Asthme, Rhume des foins.

Accidents post-sériques, Ascite, Œdèmes.

**Posologie et mode d'emploi.** — Doses faibles comme récalcifiant.

Doses fortes comme antihémorragique et déchlorurant.

Doses moyennes pour les autres indications.

Doses faibles : 1 gr., soit XXX gouttes par jour, en deux fois.

Doses fortes : 4 à 6 gr., soit CXX à CLXXX gouttes par jour en deux fois.

Faire tomber les gouttes dans 1/4 de verre d'eau très sucrée ou de vin à prendre pendant les repas.

Prix : 19 fr. 50.

COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS. (Tél. : Ségur 02-79.)

## SOLUCALYPTINE LE BRUN

Solution non huileuse se dissociant *in vivo* en donnant les produits du métabolisme intermédiaire normal dans l'organisme, d'où tolérance parfaite évitant les inconvénients des excipients huileux.

### Composition :

Eucalyptol, Gaïacol, Camphre.

### Formes et posologie :

Ampoules de 2 cc. gaïacolées ou non gaïacolées, pour injections sous-cutanées ou intramusculaires selon prescription médicale, doses moyennes :

Adultes : 2 à 4 centimètres cubes par jour.

Enfants : 1 à 2 centimètres cubes —

Nourrissons : 1/2 à 1 centimètre cube —

### Avantages :

Injection facile et indolore.

Tolérance parfaite.

Absence absolue de réaction locale.

### Propriétés et indications thérapeutiques :

Les mêmes que celles de  
l'EUCALYPTINE LE BRUN.

Toutes infections broncho-pulmonaires médicales ou chirurgicales, maladies infectieuses.

### Laboratoires LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 71-33.)

## SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

**Avantages.** — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle. Le Solucamphre à base de Camphosulfonate de pipérazine a une action beaucoup plus prolongée que le camphosulfonate de soude et se rapproche à ce point de vue de l'huile camphrée.

**Action physiologique.** — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

### Mode d'emploi :

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse, 10 à 15 cc. en chirurgie.

Gouttes : XXV à C gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Présentation.** — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc. et 5 cc., gouttes et comprimés.

## SOLUCAMPHRE

### ASSOCIATIONS DIVERSES

**Solucamphre adrénaliné.** — Solution d'adrénaline naturelle à 0,50 p. 1 000 dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et gouttes.

Une ampoule ou LX gouttes correspondent à 0 gr. 001 d'adrénaline, 0 gr. 20 de camphre.

Cardiotonique dans les états dépressifs. Antichoc.

**Solucamphre caféiné.** — Camphosulfonate de caféine, à 15 p. 100 en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et gouttes.

Une ampoule ou LX gouttes correspondent à 0 gr. 20 de Caféine, 0 gr. 20 de Camphre.

Cardiotonique vrai, Augmentation de l'activité fonctionnelle du cœur par meilleure irrigation, Augmentation de la diurèse.

**Solucamphre cholestériné.** — Cholestérine 2,50 p. 100 ; Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

A utiliser en remplacement des huiles Cholestérinées et Lécithinées. Dans le traitement de la prébacillose et dans les états de prédispositions acquises (Asthénie, Surmenage, Amaigrissement, etc.).

**Solucamphre éphédriné.** — Camphosulfonate d'éphédrine naturelle en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc., gouttes et comprimés.

Une ampoule, XXX gouttes ou 2 comprimés correspondent à 0 gr. 04 d'Ephédrine, 0 gr. 20 de Camphre.

Cure et prophylaxie :

- 1° De la crise d'asthme, de la dyspnée et des spasmes bronchiques ;
- 2° De la dépression circulatoire (anesthésie) ;
- 3° Des accidents allergiques (Rhume des foins, urticaire, eczémas aigus, etc.).

**Solucamphre gäicacolé.** — Camphosulfonate de Gäicacolé et de Strychnine, en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.

Une ampoule correspond à 0 gr. 025 de Gäicacolé, 1/2 milligramme de Strychnine, 0 gr. 20 de Camphre.

Traitement des affections des voies respiratoires, bronchites, pneumonies, gangrène pulmonaire, etc...

**Solucamphre quininé.** — Camphosulfonate de Quinine 30 p. 100 en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et comprimés.

Une ampoule ou 3 comprimés correspondent à 0 gr. 418 de Quinine base, 0 gr. 20 de Camphre.

Traitement des grands états fébriles. Traitement spécifique de la pneumonie. Injection seulement par voie intramusculaire.

**Solucamphre spartéiné.** — Camphosulfonate de spartéine en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. Boîtes de 6 ampoules de 5 cc. Gouttes et comprimés.

Une ampoule de 5 cc. correspond à 0 gr. 05 de Spartéine et 0 gr. 50 de Camphre.

Une ampoule de 2 cc., 5 comprimés ou XXX gouttes correspondent à 0 gr. 05 de Spartéine et 20 gr. de Camphre.

Tonicardiaque puissant, particulièrement indiqué dans le traitement des troubles cardiaques d'origine nerveuse (arythmie, asystolie, palpitations, etc.).

**Solucamphre Strychniné.** — Camphosulfonate de Strychnine en solution dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et gouttes.

Une ampoule correspond à 0 gr. 001 de Strychnine, 0 gr. 20 de Camphre. LX gouttes correspondent à 0 gr. 001 de Strychnine, 0 gr. 20 de Camphre.

Toutes les défaillances cardiaques avec asthénie et adynamie, torpeur. Neurosthénique indiqué dans les convalescences.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 18-33.)

## SOLUDAGÉNAN

(dérivé sodé du Dagénan-693)

Antibactérien polyvalent injectable.

**Indications.** — Mêmes indications que le Dagénan (voir ce produit). A utiliser plus particulièrement dans les cas où il y a lieu de ménager la susceptibilité gastrique.

**Présentation.** — Solution à 33,3 p. 100. Ampoules de 3 cc. (1 ampoule = 1 gr. de 693.) Boîtes de 10. Pour hôpitaux et cliniques : boîtes de 50 ampoules.

**Posologie.** — 1° *Dagénan* + *Soludagénan* : à la dose de *Dagénan* la mieux tolérée, ajouter la quantité de *Soludagénan* nécessaire pour atteindre la dose journalière voulue en 693.

2° *Soludagénan* seul (pour le cas exceptionnel d'intolérance complète au *Dagénan*) : 2 à 3 ampoules par jour ou plus dans les cas graves.

Injectations intramusculaires profondes. La voie intraveineuse peut être exceptionnellement utilisée sous réserve de diluer la solution par addition de sérum physiologique de façon à obtenir une concentration de 10 à 5 p. 100

Prix de vente : 35 fr. 20.

Société Parisienne d'expansion chimique

« SPECIA »

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SOLUDERM

Solution.

Usage externe.

**Composition.** — Liquide à base de vétratrol et d'acide salicylique en solution à 2 p. 100 dans un excipient non gras.

**Indications.** — Dermites et épidermites microbiennes ou parasitaires, c'est-à-dire : intertrigos rétro-auriculaires, inguinaux, sous-mammaires ; épidermites, épidermophyties, impétigo, érythème fessier du nourrisson, prurits anaux, pityriasis versicolor et certains pityriasis du cuir chevelu, pieds sportifs, prurits, acné.

**Mode d'emploi.** — Imprégner les parties malades quatre à six fois par jour à l'aide d'un tampon de coton largement imbibé de Soluderm.

**Anciens Laboratoires ODINOT**

Robert COLAS, Docteur en pharmacie

133, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. Van. 48-10.)  
Laboratoires : 21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. Ség. 69-13.)

## SOLUPHÉDRINE

(Solution aqueuse)

Action **décongestive** et **analgésiante** rapide, intense, durable. Toxicité nulle.

Action régulière sans aucun palier sur la muqueuse nasale qui présente à son égard une grande tolérance.

Grande diffusibilité.

**Composition** — 1° Une petite proportion bien déterminée de phényl propionate d'éphédrine ; action immédiate sur la muqueuse nasale ; 2° une proportion plus grande de gluconate d'éphédrine ; action lente et très prolongée ; 3° un mélange à partie égale de phénylpropionate et de gluconate de paraminobenzol diéthyl-amino-éthanol ; action anesthésique rapide intense et de longue durée.

**Présentation :**

Flacon à compte-gouttes nasal intérieur. Prix : 21 fr. 60.

**Mode d'emploi :**

**En instillation :** 4 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour (enfants au-dessous de 5 ans : demi-dose).

**En pulvérisation :** pulvériser dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

**Indications :** Prophylaxie et traitement des affections nasales : Coryza, rhume des foies, sinusites, catarrhe rhino-pharyngien, grippe, états asthmatiformes.

**Publicité strictement médicale.**

Laboratoires M. de RIVE..

A. de RIVE, Pharmacien.

Services Commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS (XX<sup>e</sup>)

## SOLU-PLASTOL

**Composition.** — Mêmes principes actifs que le *Dermo-Plastol* (acide orthoxybenzoïque, huiles essentielles d'origine végétale, huile pyrogénée, tuménol, poudres absorbantes), mais incorporés à un excipient aqueux exempt de corps gras.

**Indications.** — 1° Remplace comme pansement de jour le *Dermo-Plastol* dans les eczémas et les dermatoses analogues ;

2° Spécialement indiqué dans le cas où les corps gras sont mal supportés (intolérance de certains malades à l'égard de la vaseline par exemple).

**Forme.** — En tube de 60 grammes.

**Posologie.** — Appliquer en couche *peu épaisse*. Le nettoyage de la peau s'obtient facilement en lavant l'endroit malade avec précaution, au moyen de coton hydrophile imbibé d'eau tiède (ne pas frotter).

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

## SOLUSEPTAZINE

p(γ phényl-propyl-amino) benzène  
sulfamide α — γ disulfonate de sodium.

Dérivé soluble de la *Septazine*. Solution aqueuse injectable à 6 p. 100 de sel. Toxicité nulle, activité très marquée sur le streptocoque. Médication complémentaire des traitements par la *Septazine*.

**Indications.** — Mêmes indications générales que la *Septazine* : érysipèle, streptococcémies, fièvres puerpérales, scarlatines graves, phlegmons, angines graves, phlébites, gripes compliquées d'infections pleuro-pulmonaires.

**Présentations.** — Ampoules de 5 et 10 cc. (boîtes de 5 ampoules), pour hôpitaux et cliniques (boîtes de 25 ampoules).

**Mode d'emploi et Posologie.** — Injections intramusculaires 10 à 20 cc. en 1 fois ou injections intraveineuses 20 cc. en 1 fois pouvant être renouvelées 2 à 3 fois par jour. Injections intrarachidiennes dans les méningites.

Enfants : 20 à 30 cc. Nourrissons : 20 cc. en 2 fois.

Traitement mixte avec la *Septazine* dans les cas graves.

Prix de vente :

Boîte de 5 amp. 5 cc. .... 18 fr. 70

Boîte de 5 amp. 10 cc. .... 31 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## SOLUTION DU D<sup>r</sup> DEBAT

**Bactéricide et Mitogénétique.**

Cette solution cicatrisante stable possède un pouvoir stimulant sur la multiplication cellulaire comparable à celui des sucs embryonnaires. Cette formule répond aux deux exigences de la réparation des tissus, assurer l'asepsie de la plaie, provoquer une reconstruction rapide.

**Indications.** — Plaies traumatiques ou chirurgicales, Plaies variqueuses et affections cutanées à cicatrisation lente, Ulcérations, Perte de substances, Escarres, Lésions infectées.

**Mode d'emploi.** Nettoyer la lésion à l'eau bouillie, appliquer une compresse imbibée de Solution du D<sup>r</sup> Debat ; renouveler le pansement chaque jour.

Toutefois, pour éviter l'arrachement trop fréquent des bourgeons, on pourra laisser la compresse en place pendant 2 ou 3 jours, en prenant soin de l'humecter avec la solution toutes les 24 heures.

**Présentation :**

En flacons de 250 cc. : 14 fr. 40.

Laboratoires du D<sup>r</sup> F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)



## SOLUTION DU D<sup>r</sup> J. JACOBSON

### Composition :

Solution huileuse d'éther benzyl cinnamique.

Forme : Ampoules de 1 cc.

### Indications :

Lésions inflammatoires tuberculeuses : ganglionnaires, articulaires, testiculaires, buccales, laryngées, vésicales, et non tuberculeuses : salpingites, périviscérites. Trachome, opacités cornéennes, certains cas de surdité

### Posologie et mode d'emploi :

1 injection intramusculaire quotidienne pendant 12 jours. Faire trois séries séparées par deux intervalles de 15 à 18 jours.

### Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 28 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. n° 514-73.

### Produits biologiques OARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

### Anesthésie de surface par contact

Caractéristiques. — Voir à la rubrique Nestosyl.

Indications. — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathédres et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, rectoscopie, changement de pansements, etc. ; et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie et soins cliniques. 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémata rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc.).

Posologie. — Anesthésie des canaux : instiller quelques cmc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmc. (dose générale suffisante : 15 à 20 cmc.). Anesthésie des plaies et muqueuses : nettoyer et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entremets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

Prix : 18 fr. 70. — L. N. C. 581-2.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 96-46.)

## SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition : Par cuillerée (créosote pure de hêtre..... 0 gr. 10  
à potage {chlorhydrophosphate de chaux. 0 gr. 50

Action. — A l'action antitarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydrophosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : bronchite chronique — rhumes — catarrhes — complications de la grippe — pré-tuberculose — tuberculose — Coqueluche

Posologie. — Adultes : 3 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Mode d'administration. — De préférence avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou gazeuse, de café léger ou de bière.

Prix : 23 francs le flacon de 350 cc. (6 à 10 jours de traitement).

### Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 26-47.)

## SOLUTION SCHOUM

(Forme provisoire CONCENTRÉE)

### FOIE, REINS, VESSIE

**Composition.** — Solution chloroformée et glycinée d'extraits de plantes décongestives, cholagogues et calmantes (menthe, bugrane, basilic, corydalis, etc.).

**Propriétés.** — SCHOUM est le spécifique de toutes les affections cellulaires du foie, des reins, de la vessie et de l'utérus comme calmant et décongestif. Il calme en quelques minutes les crises hépatiques, néphrétiques, vésicales ou menstruelles ; il peut même les prévenir.

Décongestif et antitoxique, il donne des *résultats absolus* dans les lithiases biliaires et rénales ainsi que dans leurs complications ; ces résultats sont obtenus par désagréation, puis dissolution des calculs qui se transforment en sable facilement entraîné.

**Mode d'emploi.** — 6 verres à madère par jour pendant 12 jours, puis descendre à 4 verres pendant 1 semaine. Dans les cas graves ou très anciens, prolonger la dose de 6 verres pendant 15 à 18 jours ; enfin, en cas d'urgence, 1 flacon par jour à raison d'un verre toutes les 2 heures, pendant plusieurs jours.

**N. B.** — Douée d'une saveur particulièrement agréable, d'une innocuité absolue et garantie, la SOLUTION SCHOUM a donné depuis 40 ans des résultats remarquables ; elle constitue la boisson de choix, « utile et agréable », des fébricitants et des anuriques. C'est enfin le « préventif » recommandé pour l'appareil hépatique des colonaux.

Le flacon : 15 fr. 50.

### Laboratoire SCHOUM

Maurice PY, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
15, rue de la Sablière — BÉCON-LES-BRUYÈRES  
(Seine).

(Tél. Défense 12-33.)

## SOLUTION TISCH

### CURE HÉPATO-ALCALINE

**Composition.** — Solution alcaline à base de sucres de plantes fraîches, reconnues pour leurs vertus cholagogues, hépatiques et stomacales.

**Originalité.** — Préparation très agréable, ne contient ni alcool, ni opium ou dérivé, ni iodure ou composé iodé.

*Le seul produit du genre réalisé scientifiquement :* solution préparée mécaniquement, remplissage et capsulage automatiques des flacons ; toutes conditions nécessaires à une asepsie rigoureuse.

**Indications et posologie.** — Se prend par verre à madère, soit 50 gr.

*Affections du foie :* de 2 à 6 verres par jour.

*Crises douloureuses (foie, estomac, reins) :* par verre tiédi, de 10 en 10 minutes, jusqu'à cessation des douleurs.

*Stimulant hépato-biliaire :* 1 verre le matin à jeun.

*Eupéptique :* 1 verre 1/2 heure avant le repas.

*Accélération des fonctions digestives :* un verre 2 à 3 heures après le repas.

*En résumé, toutes les indications de la cure alcaline.*

**Présentation.** — Flacon d'extrait dosé pour 1/2 litre de solution TISCH, à mélanger dans l'eau potable non calcaire, bien bouillie et refroidie ou avec une eau très pure (Evian). Y faire dissoudre, en agitant, le contenu du sachet de sel alcalin joint au flacon.

**Le « Tisch » est de prescription strictement médicale.**

Laboratoire National de Contrôle : n° 1.555-4.

### Laboratoires Paul HARDY, Docteur en Pharmacie

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, prix Flon 1922,  
Lauréat de la Faculté de Pharmacie,  
ancien Chef de Laboratoire.

22, rue François Bonvin — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 19-21.

## SOLVURIC

**Forme.** — Granulé effervescent à base de formine, et pyruvate de soude.

**Indications.** — Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

**Doses.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Prix : 20 fr. 50.

**Laboratoire MAUCHANT**  
à GENNEVILLIERS (Seine)  
(Tél. : Grésillons 05-21.)

## SOMNICONES

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antispasmodiques.

**Composition.** — Chaque Somniconne contient :

B.-éthyl.-mal.-urée .....	0 gr. 20
Scopolamine .....	1/10 <sup>e</sup> milligr.
Extrait de Valériane .....	0 gr. 10

**Propriétés.** — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

**Indications.** — Insomnies au cours des affections les plus variées. Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies). Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Préoccupations obsédantes, Nervosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

**Posologie.** — Un Somniconne en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

**Formuler :** Somnicones. Une boîte.

Prix : 17 fr. 60.

**Laboratoire BÉRAL**  
Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

## SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Étienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des D<sup>rs</sup> Perlis, Vullien, Assoignion, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teyssieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délires, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Épilepsie, Tétanos, etc.

### SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Flacon de 12 cm<sup>3</sup>.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de donner à chacun sa dose, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

**Doses habituelles.** — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

**Enfants :** V à X et XV gouttes (selon l'âge).

### SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cm<sup>3</sup> (Boîte de 6)

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.)

Ampoules de 5 cm<sup>3</sup> (Boîte de 3)

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Éclampsie, Tétanos, État de mal épileptique, etc.

Enregistrés au Lab. Nat. de Contr. des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 504-36 (gouttes), 504-35 (ampoules). AL 6224

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 91-10)

## SOMNOTHYRIL

Traitement de l'Insomnie.

### Composition :

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 20
Analgésine.....	0 gr. 05
Thyroidine .....	0 gr. 001
Salicylate d'Esérine.....	0 gr. 0002

Par pilule.

**Caractéristiques.** — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité. Pas d'accoutumance, sommeil calme et réveil agréable.

La diéthylmalonylurée arrive à réaliser, à doses réduites et atoxiques, un effet hypnotique rapide et sûr, grâce à l'action sensibilisatrice de l'esérine, qui prépare l'état vagotonique favorable au sommeil.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes insomnies : Insomnies rebelles, Anxiété, Excitation.

*En psychiatrie :* Mélancolie, Psycho-neurasthénie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans sucer ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou mieux de tisane chaude, une pilule le soir, un peu avant le coucher, 2 heures environ après le repas.

En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à 2 pilules prises simultanément.

**Posologie en deux temps.** — Toutefois, dans certains cas où l'état d'excitation du malade (non fébrile) résiste à l'administration de doses même massives d'hypnotique, on procédera comme suit :

1° Vers les 5 heures du soir, absorption d'une pilule qui agira surtout comme *calmant de l'excitation vago-sympathique*.

2° A l'heure habituelle du coucher, absorption d'une seconde pilule de *Somnothyril*.

Tube de 20 pilules pour 12 à 20 jours de traitement.

## SOMNOTHYRIL-SUPPOSITOIRES

Hypnotiques et sédatifs.

Leur composition est la même que celle déjà éprouvée des pilules, soit : *diéthylmalonylurée* à dose réduite et renforcée par la présence de traces d'*ésérine* et de *thyroidine* sensibilisatrices. Cette association synergique est en outre complétée par un hypnotique actif à très faible dose : le *phényléthylbarbiturate de quinine*, et par un décongestif : le *campho-sulfonate de Ca*.

**Indications.** — Insomnies, États anxieux, adjuvants du traitement de la douleur.

**Posologie.** — Adultes seulement. Un suppositoire le soir au coucher, ou deux sur avis du médecin.

Laboratoires CANTIN  
PALAISEAU (Seine-et-Oise).

## SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

**Indications.** — Insomnies de toute nature, même celle qui sont provoquées par la douleur.

### Présentation :

Comprimés à 0 g. 10, le tube de 20 : 8 fr. 80.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux comprimés à 10 cg. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (adultes) : 6 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## SOPORALOSE

**Composition.** — Chloralose et dérivés cinnamiques.

**Propriétés.** — Agit comme sédatif à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Provoque un sommeil calme suivi d'un réveil euphorisant.

Atoxique, même aux doses très élevées.

Élimination totale et rapide.

Aucune action sur la circulation, la digestion, la respiration.

**Indications.** — Toutes insomnies : des surmenés, des nerveux, des intellectuels, des anxieux.

Pas de contre-indication. Peut être prescrit même aux organismes déficients par suite de sa complète inaction sur le cœur, les reins, le foie, l'estomac.

Convient même aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artério-scléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

**Posologie.** — La dose à prendre varie de 1 à 3 cachets.

Dose moyenne : 1 cachet.

Prix. La boîte de 12 cachets : 14 fr. 70.

POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29.)

## SORBOCALCION

Calcium soluble vitaminé.

Sels calciques solubles (saccharate et sucrate) associés au phosphore végétal organique, à la papaine et à la vitamine D cristallisée.

Médication calcique scientifique respectant les données physiologiques modernes sur la digestion, l'assimilation et la fixation du Calcium.

**Cachets.** — 2 à 3 par jour pendant 15 jours.

**Granulé.** — « La plus haute concentration en sels de chaux réalisée dans un granulé. »

**Enfants :** 2 à 3 cuil. à café par jour.

**Adultes :** 2 à 3 cuil. à soupe par jour aux repas.

**Indications.** — Troubles calciques, Croissance, Allaitement, Rachitisme, Fractures, Pré tuberculose, Hémorragies, Acidose, États neuro-spasmodiques.

**Prix :** cachets (boîte de 36 cachets) ou granulé, 27 fr. 50.

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## SOUTENSA

(Traitement pathogénique des hypertensionns.)

**Composition.** — Association de Nitrate de Pilocarpine et de Silicate de Soude.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit sur le syndrome endocrino-sympathique et parasympathique par l'effet vaso-dilatateur du nitrate de pilocarpine et sur les vaisseaux eux-mêmes et sur les troubles humoraux par le silicate de soude.

Unit l'action vaso-dilatatrice à l'action cardiotonique.

**Indications.** — Toutes les hypertensionns et particulièrement les hypertensionns essentielles, humorales et nerveuses.

Soulagement rapide des troubles des hypertendus.

**Préparation pharmaceutique. Posologie.** — Pastilles contenant chacune :

Nitrate de Pilocarpine..... 2 mgr. 5

Silicate de Soude..... 30 cgr.

Une pastille matin et soir, un quart d'heure avant les repas. Ne pas dépasser 5 pastilles par 24 heures.

Séries de 8 à 10 jours de traitement séparées par un repos d'une semaine.

**Prix,** le tube de 20 pastilles : 18 fr. 75.

**Laboratoire ARMORIL**

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Suffren 53-70.)

## SPARAPLAST FOURNIER

Sparadrap chirurgical à l'Oxyde de zinc.

Adhésif, souple, stable, non irritant.

Conservation garantie sous tous les climats.

Perforé et non perforé. Toutes dimensions.

## PLASTOCRÈPE FOURNIER

Sparaplast élastique.

Pansement articulaire idéal. Coefficient d'élasticité : 80 p. 100.

## URGOPLAST FOURNIER

Pansement instantané pour plaies superficielles.

Urgoplast ordinaire et Urgoplast élastique.

**Laboratoires FOURNIER et Cie**

DIJON.

J. LE LOUS, pharmacien.

## SPARTÉDRINE

La « CAFÉDRINE » des cardiaques (Voir ce texte).

**Forme.** — Élixir.

**Formule.** — Teintures de Lobélie, 3; d'Euphorbe, 2; de Grindelia, 0,50; de Piloselle, 1,50; Iodure de Sodium, 0,50; Chlorhydrate d'Éphédrine, 0,50; Sulfate de Spartéine, 0,25 pour 100 grammes.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Rhume des Foins.

(Sans contre-indication dans les cas de troubles cardio-vasculaires et d'hypertension.)

**Posologie.** — De 2 à 4 cuillerées à café par jour, espacées des repas.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## SPARTÉINE HOUDÉ

**Granules titrés à 2 cgr. de sulfate de spartéine cristallisé** (découvert par A. Houdé en 1885).

### Propriétés :

- 1° **Toni-cardiaque** énergique et progressif. Agit plus rapidement que la digitaline (1/2 heure après l'absorption). Régulateur du rythme cardiaque. Renforce l'impulsion systolique après l'action de la digitale. Pas d'accumulation (POUCHET). Augmente la pression moyenne (SOULA).
- 2° **Sur le rein** : Diurétique déchlorurant (MERCIER, BALANSARD et SIGAL).
- 3° **Action antitoxique et antitoxinique** marquée (BILLARD, PERRIN et CUÉNOT, DUJARRIC DE LA RIVIÈRE).

### Indications :

- a. **Cardiaques** : Insuffisances cardiaques au début (dyssystolie et hyposystolie). Préparation à la cure digitalique. Tonique d'entretien après celle-ci. Défaillances myocardiques des maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie, pneumonie). Palpitations nerveuses, arythmies légères, tachycardies, tachyarythmies. Fibrillation auriculaire. Préventif des troubles cardiaques dans la rachianesthésie (RAMOND).
  - b. **Rénales** : Rétention chlorurée et œdèmes.
  - c. **Générales** : Dans la diphtérie, associée au sérum ou employée seule (Mme FRONTARD). Tétanos. Cure de désintoxication des morphinomanes. Delirium tremens. Intoxications phalloféniques ou par venin de vipère.
- Posologie.** — 4 à 8 granules par jour en 2 ou 4 fois, avant les repas. Sans toxicité, ces doses peuvent être largement augmentées jusqu'à 12 granules et plus, le maximum étant de 20 cgr. *pro die* (Codex 1937).

### Laboratoires HOUDÉ

9, r. Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>) : (Tél. : Nord 40-58.)

## SPARTO-CAMPBRE

**Composition.** — Solution aqueuse de campho-sulfonates de spartéine (à 5 p. 100) et de sodium (à 15 p. 100.) représentant 1,75 p. 100 de spartéine base. Ampoules.

**Propriétés.** — Celles du *camphre* et de la *spartéine*. Réalise une véritable synergie médicamenteuse. Les effets thérapeutiques propres du *camphre* et de la *spartéine* s'y trouvent associés et renforcés. Action immédiate et prolongée.

**Indications.** — Traitement d'urgence du collapsus cardiaque, des états adynamiques des maladies infectieuses, pneumonies, bronchopneumonies, typhoïdes, gripes, etc...

Traitement préventif et curatif des accidents cardio-vasculaires des anesthésies générales, locales et de la rachianesthésie, du choc opératoire.

Indiqué également dans tous les états de déséquilibre du système nerveux vago-sympathique.

**Posologie.** — Injections sous-cutanées ou de préférence intramusculaires, à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

**Formes.** — Ampoules 2 cc. et 5 cc. — Dragées 0 gr. 05.

### Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## SPARTOPHÉDRINE BÉRAL

**Forme ampoules.** — A 3 cgr. d'Éphédrine et 5 cgr. de Spartéine par centicube.

Mêmes indications que les ampoules d'Éphédrine.

**Posologie.** — 1-2 cc. en une fois ; 2 à 4 cc. *pro die*. Injections hypodermiques, musculaires ou veineuses.

**Forme grains.** — A 1 cgr. d'Éphédrine et 1 cgr. Spartéine par grain.

Mêmes indications que les comprimés d'Éphédrine.

1 à 10 grains *pro die*.

Prescrire :

Ampoules de **Spartophédrine Béral**. Prix : 25 fr. 80.

Grains de **Spartophédrine Béral**. Prix : 17 francs.

### Laboratoire BÉRAL

Dépôt : 36, avenue Hoche — PARIS.

**SPASA**

**Comprimés glutinés.**

**Présentation.** — En tube d'aluminium de 25 comprimés. (16 fr. 70.)

**Principes actifs.** — Phényléthylmalonylurée, Extrait de Cratægus, Extrait de jusquiame, Extrait de belladone, Extrait d'anémone.

**Indications.** — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Troubles névralgiques et névrosiques, Spasmes, Asthme, Palpitations, Algies, Insomnie, Migraine.

**Mode d'emploi.** — 1 comprimé au moment de la douleur. 3 par jour si nécessaire. Ne pas prendre plus de 4 comprimés par 24 heures. Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-26.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

**SPASÉDOL**

**Composition :**

Phénylpropionate de morphine .....	0 gr. 004
Isobutyrate de morphine .....	0 gr. 004
Bromométhylate d'homatropine .....	0 gr. 0015
Chlorhydrate de papavérine .....	0 gr. 040

Pour 1 ampoule injectable de 1 cc. Le Suppositoire (SUPPOSASÉDOL) ne contient que 0 gr. 0005 de bromométhylate d'homatropine.

**Présentation.** — Boîte de 12 ampoules de 1 cc. Boîte de 10 suppositoires.  
(Le SUPPOSASÉDOL ne fait pas partie du tableau A.)

**Propriétés et avantages.** — Le phénylpropionate et l'isobutyrate de morphine ont une *toxicité plus faible* que le chlorhydrate, bien que leur *action soit plus puissante*. Enfin, le bromométhylate d'homatropine et le chlorhydrate de papavérine sont des *spasmolytiques remarquablement actifs*.

Le SPASÉDOL, ne provoquant ni nausées ni vomissements et ne diminuant pas la diurèse, doit remplacer la morphine dans toutes les affections douloureuses spasmodiques.

**Indications.** — Coliques hépatiques, néphrétiques, saturnines, spasmes viscéraux, vomissements d'origine spasmodique, crises d'asthme rebelles, dyspnées angoissantes, douleurs angineuses, œdème aigu du poulmon, infarctus du myocarde, hypertension et tranchées utérines, anxiété, etc.

**Posologie :**

**Adultes :** 1/2 ou 1 ampoule (ou suppositoire), à répéter au besoin 2 ou 3 fois par 24 heures.  
**Enfants, nourrissons** (doses à répéter 2 fois par 24 heures si nécessaire). De 5 à 15 ans : 1/2 ampoule ou 1/2 suppositoire. De 3 à 5 ans : 3/10 de cc. 3 ans : 2/10 de cc. Au-dessous de 1 an : 1/10 de cc.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél.: Ségur 13-10.)

## SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

- 1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.
- 2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

**Forme.** — Granulé dragéifié en grains très menus.

**Dosage.** — 1/4 de mgr. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

**Indications.** — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

**Emploi.** — 2 ou 3 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 19 fr. 90.

### Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

201, rue de Grenelle, PARIS (VII<sup>e</sup>). (Invalides 64-36.)

## SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

**Composition.** — 1 ampoule ou 1 comprimé ou 1 suppositoire contient :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 centigramme  | PANTOPON « ROCHE »,<br>(Opium total injectable).  |
| 2 centigrammes | PAPAVERINE « ROCHE »,<br>(Alcaloïde de l'opium le moins toxique à propriétés spasmolytiques spéciales). |
| 1 milligramme  | ATRINAL « ROCHE »,<br>(Ester sulf. d'atropine, sans action sur le centre parasympathique).              |

**Propriétés.** — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine « Roche »* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états *spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante- et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

### Doses et modes d'emploi :

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Voie buccale .....                    | { | Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.     |
| Comprimés<br>(Flacon de 20).          |   | Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.       |
| Voie hypodermique ou intramusculaire. | { | Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.      |
| Ampoules<br>(Boîte de 6).             |   | Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.        |
| Voie rectale.....                     | { | Dose moyenne : 1 à 2 suppositoires par jour. |
| Suppositoires<br>(Boîte de 6.)        |   | Dose forte : 2 à 4 suppositoires par jour.   |

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n°s 504-38 (comprimés) 504-37 (ampoules), 504-67 (suppositoires).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Archives 91-10)



## SPASMIDÉNAL JOLLY

Synergie Phyto-Barbiturée atoxique.  
Sympathoses. et cardiosympathoses.

### Deux formes :

*Comprimés. Suppositoires.*

Extrait Aubépine.	0,02	0,06
Extrait Valériane stabilisée .....	0,08	0,24
Extrait Gelsémium titré .....	0,003	0,01
Complexe de Mé- thylglyoxalidine et de Phényl- éthylmalonylurée.	0,013	0,04

**Formes.** — Comprimés et suppositoires.

### Posologie :

**Hypnotique :** 2 comprimés avant le dîner et 2 au coucher, ou bien 1 à 2 suppositoires.

**Sédatif :** Comprimés en doses filées, 1 toutes les 2 heures, ou suppositoires : 1 matin et soir.

**Indications.** — Grands anxieux ; tous dys-fonctionnements neuro-végétatifs, tachy-arythmies, éréthisme cardiaque, névralgies faciales, tranchées utérines, douleurs du bassin, etc.

### Prix :

La bonbonnière de 50 comprimés : 23 francs.  
La boîte de 10 suppositoires : 20 fr. 50.

### Laboratoires JOLLY

28, avenue Carnot

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (S.-et-O.).

(Tél. : 83.)

L. N. M. C. 40-8 et 40-9.

## SPASMINE JOLLY

Phytothérapie atoxique des névropathies et des cardiopathies.

Combinaison physiologique stabilisée de Valériane fraîche et d'Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Le plus actif des hypnotiques doux.

**Formes.** — Liquide et Comprimés.

### Composition :

Intrait de Valériane.....	0 gr. 10
Extrait d'Aubépine.....	0 gr. 10
Par comprimé ou cuillerée à café.	

### Posologie :

**Sédatif :** 1 à 2 comprimés ou cuillerées à café matin et soir.

**Hypnotique :** 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café le soir.

1/2 dose pour les enfants.

**Action.** — Par l'Aubépine, la Spasmine Jolly exerce sur le sympathique une action inhibitrice qui est prolongée et renforcée par la Valériane ; elle obtient et maintient l'équilibration du système neuro-végétatif et régularise le fonctionnement du muscle cardiaque. Aucune accoutumance. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Angor, anxiété, petits ner-veux, émotivité, éréthisme cardiaque, tachycardies, extra-systoles, hypertension, aérophagie, syndromes solaires, spasmes, prurit nerveux, mal de mer, énurésie, etc.

**Comprimés :** le tube de 30 ..... 15 fr. 50

**Élixir :** le flacon de 25 cuillerées à  
café ..... 21 fr. 50.

### Laboratoire JOLLY

28, av. Carnot — ST-GERMAIN-EN-LAYE  
(S.-et-O.) (Tél. : 83.)

L. N. C. M. 40-1 et 40-7.

## SPASMOCALCYL

Spasmolytique Calcique (Boro-Tartro-Iodo-Bromé).  
États convulsifs de l'enfant.

**Propriétés Thérapeutiques.** — Le plus complet des sédatifs minéraux. Modérateur de l'excitabilité générale et neurotrophique par ses *ions calciques*.

Triplement sédatif. — 1° Par sa molécule *iodée* sur la fonction thyroïdienne; 2° par sa molécule *bromée* sur l'excitabilité nerveuse; 3° par son *borotartrate* sur le cortex et sur l'équilibre acido-basique.

Protecteur de la cellule nerveuse par sa *vitamine B*.

**Indications.** — Médication de choix des états neurotiques, organiques ou fonctionnels, relevant de la diathèse spasmodique. — Crises nerveuses, crises téaniques. — Équivalents omittiaux. — Crises viscérales. — Troubles du sommeil. — Hyperexcitabilité neuro-musculaire. — Alcalose urinaire. — Phosphaturie. — Carie dentaire.

**Présentation.** — Sirop. — Durée moyenne: 15 jours.

**Formule.** — Une cuillerée à café contient :  
Borotartrate de calcium ... 0,20 | Iodure de calcium ..... 0,06  
Bromure de calcium ..... 0,12 | Peptones de levures de Bière (Vit. B.)

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert 2 à 3 fois par jour.

*Enfants* : 1 — café —  
*Nourrissons* : 1/2 — —

Matin, Midi et Soir.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

Enregistré au L. N. C.

**Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA**  
**P. CORDONNIER**, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

## SPASMOCARBINE

(Formocarbine antispasmodique.)

**Deux présentations :**

**Granulé :** aromatisé, friable, très agréable à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

**Comprimés-pastilles :** sucrés, aromatisés, fondants, très agréables à croquer.

*Chaque comprimé correspond en principes médicamenteux à 1 cuillerée à café de granulé.*

En plus des éléments de la Formocarbine naphtholée, chaque comprimé ou cuillerée à café contient : 1/2 cgr. poudre de belladone, 1/2 cgr. extrait de belladone, 1/2 cgr. extrait de jusquiame, 12 cgr. 1/2 bromure de magnésium, 2 cgr. extrait de cratægus, 2 cgr. extrait de passiflore.

Antiseptique interne de choix, antispasmodique, sédatif nervin.

**Indications.** — Toutes formes d'affections ou d'infections gastro-intestinales, biliaires, urinaires, spasmodiques, douloureuses. États névropathiques.

**Posologie.** — 1 à 2 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé après les 2 principaux repas. *Enfants* : 1/2 doses.

**Prix :** La boîte granulé ou comprimé : 18 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 553-7.

**Laboratoire de**  
**MÉDECINE EXPÉRIMENTALE**  
**BEAUVAIS (Oise).**

## SPASMOFLORINE

Comprimés.

Antispasmodique, Sédatif nerveux.

Formule :

Phényl-Ethyl-Malonylurée .....	0 gr. 01
Hexaméthylène tétramine .....	0 gr. 05
Peptone de viande .....	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 01
Extrait de cratægus .....	0 gr. 02
Extrait de passiflore .....	0 gr. 02
Extrait de saule .....	0 gr. 02
Extrait de boldo .....	0 gr. 01
Extrait de valériane .....	0 gr. 01

Pour 1 comprimé.

Indications. — États spasmodiques, Déséquilibre vago-sympathique, Insomnies, Angoisses, Palpitations, Syndromes solaires, Troubles nerveux de la puberté et de la ménopause.

Mode d'emploi. — 1° Comme régulateur du système nerveux : 2 à 6 comprimés par jour, par doses fractionnées au début des repas.  
2° Contre l'insomnie : 2 à 4 comprimés le soir.

Présentation. — Tube de 40 comprimés.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1244-10.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD  
Docteurs en Pharmacie et en Médecine,  
38, rue du Louvre — PARIS (1<sup>er</sup>). (Tél. : Cent. 01-35.)

## SPASMONAL GROS

Composition. — Papavérine, phényléthylmalonylurée, Diurocalcine.

Propriétés. — Analgésique, antispasmodique et diurétique.

Indications. — Hypertension artérielle, Crises douloureuses angiospasmodiques, Tachycardies, Palpitations, Insomnie nerveuse, Troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par 24 heures : 1 au réveil, 1 dans le courant de l'après-midi, 1 au coucher. Avaler avec un peu d'eau.

Prix : 20 fr. 70. Durée moyenne de l'unité : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.  
(Tél. : 60-55.)

## SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux.

(Formule Méglin modifiée.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée...	0,009	Extrait de Valériane.....	0,02
Extrait de Belladone.....	0,001	Extrait de Passiflore.....	0,02
Extrait de Jusquiame....	0,005	Extrait de Cratægus.....	0,02

Pour une dragée friable.

Indications :

Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires. Palpitations, Angor, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

Nervosisme, Anxiété, Angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

Syndromes convulsifs, Spasmodophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

Posologie :

Enfants : 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

Adultes : 1 à 8 par 24 heures (avalé avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 21 fr. 60.

Laboratoire du SPASMONEURAL

Jean LE COULANT, Pharmacien.

239, cours de l'Yser — BORDEAUX. (Tél. : 922-64.)

## SPASMORYL « ANA »

Synergie calco-magnésienne activée.  
Équilibrant minéral, plasmatique et nervin.

**Formule :** Solution en milieu marin de chlorure de calcium fixable et activé par le thiosulfate de Magnésium.

### Toutes les manifestations cliniques du Terrain Spasmogène.

**Syndromes digestifs :** Spasmes œsophagiens, Spasmes gastriques, Spasmes pyloro-duodénaux, Crises d'aérophagie, Spasmes coliques, Constipation spasmodique, Syndromes occlusifs post-opératoires, Spasmes des voies biliaires.

**Syndromes respiratoires :** Asthme et ses équivalents, Spasmes glottiques, Laryngospasmes.

**Syndromes neuro-psychiatriques :** Troubles de l'anxiété et de la psychasthénie, Tics, Chorée, Épilepsie, Tremblements, Troubles nerveux du Parkinson et de la sclérose en plaques, Syndromes algiques, Névralgies faciales, Algies cervico-brachiales, Sciatiques, Algies tabétiques et post-encéphaliques, Zona.

**Troubles anaphylactiques :** Urticaires, Migraines, Eczémas de sensibilisation, Dermites alimentaires, médicaments, professionnelles, Œdèmes de Quincke, Œdème glottique, Purpura, Hémoglobininurie paroxystique.

**Syndromes cardio-vasculaires :** Angoisse précardiale, Arythmie, Extrasystoles, Algies veineuses, Syndrome de Raynaud, Spasmes veineux post-phlébitiques.

**Syndromes génito-urinaires :** Accidents spasmodiques de la lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Urétrites, Prostatites, Cystites, Troubles spasmodiques dysménorrhéiques, Tranchées au cours de la grossesse.

**Crises glaucomateuses.**

Troubles du développement et de la croissance.  
Déméralisation calcique, Alcalose, Vagotonie.

### 2 Présentations :

**Spasmoryl intraveineux.** — Traitement d'attaque : série de 8 à 12 piqûres (en boîte de 8 ampoules de 10 cc.).

**Posologie.** — 3 injections par semaine. Temps d'injection : 2 à 5 minutes.

**Spasmoryl intramusculaire.** — Traitement de consolidation : série de 8 à 16 injections (en boîte de 8 ampoules de 5 cc.).

**Posologie.** — *Adulte :* 3 injections par semaine. — *Enfant :* 1 cc. par 3 années d'âge. En injection profonde.

**Prix :** 42 fr. 40 — 35 francs.

Laboratoires. « ANA »

D<sup>r</sup> VENDEL et C<sup>ie</sup>

16-18, av. Daumesnil — PARIS (Tél. : Dorian 52-12+.)  
18, rue Lafon — MARSEILLE. (Tél. : Lycée 50-74.)

## SPASMOSÉDINE

Sédatif et Antispasmodique cardio-vasculaire.

### Composition :

Phényléthylmalonylurée ..... 0 gr. 015  
Bromhydrate de quinine ..... 0 gr. 05  
Extrait de *Cratægus stabilisé* ... 0 gr. 05  
Excipient Q. S. pour 1 comprimé *glutinisé*.

### Présentation :

Flacon de 40 comprimés glutinisés.

### Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires, en particulier chez les hypertendus (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois).

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

### Laboratoires DEGLAUDE

*Médicaments cardiaques spécialisés.*

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine.

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

## SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

**Composition.** — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

**Indications.** — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse ou rhumatismale.

**Doses.** — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

*Cas chroniques* : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

*Pour les enfants et les vieillards*, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Prix : 49 fr. 20 le flacon de 100 cc.

**Dépôt général :**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS  
(Tél. : Archives 03-92.)

## SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

**Composition.** — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent d'hémopoïèse.

**Indications.** — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragiques, convalescences, déficiences organiques.

**Présentation.** — Sirop agréable à prendre.

**Posologie.** — Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude). Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

**DESCHIEENS, Docteur en Pharmacie**

9, rue Paul-Baudry, Paris (8<sup>e</sup>). — (Tél.: Élysées 40-26.)

## SPHYGMOTOPIQUE

**Pommade à base d'Extrait Surrénal total.**

**Indications.** — Traitement des hémorroïdes internes et externes. Prurit anal.

**Emploi.** — Après lavage, application matin et soir et après chaque garde-robe.

**Action.** — Arrêt rapide des hémorragies. Décongestion et vaso-constriction évitant le retour offensif des hémorroïdes. Antisepsie.

**Laboratoires CHAIX**

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon  
PARIS (XV<sup>e</sup>).

## SPIRALGINE

### Dragées antalgiques.

Tous les syndromes douloureux : céphalées, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, névralgies faciales, oculaires, intercostales, algies cancéreuses et syphilitiques, sciatiques, lombagos, arthrites, réticulites, méningo-encéphalites.

Douleur de toutes les inflammations : panaris, abcès, phlegmons, sinusites, caries dentaires, etc.

Agit aussi comme antithermique dans les gripes, angines, etc.

**Pharmacologie.** — La SpiralGINE est une association de phénylacétamide, de citrate trisodique et d'extrait de cratægus.

La phénylacétamide, dont l'action antalgique est bien connue, surtout dans les pays anglo-saxons, a ses effets secondaires annihilés par le citrate trisodique et l'extrait de cratægus, sédatif nervein, cardio-vasculaire, parfaitement bien toléré, non toxique, et ne s'accumulant pas. La SpiralGINE a une action analgésique et calmante très efficace. Elle procure un apaisement rapide et durable, ne détermine pas d'intolérance gastrique, ne présente pas d'incompatibilité.

**Posologie.** — Les dragées SpiralGINE peuvent être prises à tout moment du jour ou de la nuit.

*Adultes* : 1 à 2 par prise, 6 au maximum par 24 heures.

*Enfants* au-dessus de 8 ans : demi-dose.

La boîte de 20 dragées : 18 fr. 40.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## SPIROCHTAN

Bismuthique à faible dose. hydrosoluble, indolore, associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

### Formule :

Pentanoldioate méthylate de bismuth .....	0 gr. 0333
Oxycyanure de mercure .....	0 gr. 0003
Arséniate de soude .....	0 gr. 00134
Eau distillée, Q. S. pour .....	1 cc.

### Ampoule de 1 cc.

**Posologie.** — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les jours. Traitement d'entretien : 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours. Séries de 20 piqûres.

**Avantages.** — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, permettant une thérapeutique spirillicide intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules : 23 francs.

Boîte spéciale de 10 ampoules au 1/5 pour enfants : 18 francs.

### Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## SPIROGYL

Onguent gingival à base d'Antivirus fuso-spirochététique.

Pour le traitement des stomatites, gingivites rebelles, pyorrhées alvéolaires graves.

A employer 3 fois par jour en massage des gencives.

Prix : le tube : 11 francs.

**H. VILLETTE et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**  
Marque de la Biothérapie

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

## SPLÉNIQUE (Extrait)

du docteur Bayle.

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au D<sup>r</sup> Bayle pour ses travaux cliniques et expérimentaux, sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques (voir **COLLOIDOGÉNINE**).

Maladies infectieuses (voir **POLYVALINE**).

Ces deux produits, préparés selon les indications précises de l'auteur de la méthode, sont **LES SEULS** qui peuvent se réclamer du nom et des travaux du D<sup>r</sup> Bayle.

Ils permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

## SPLÉNOCRISINES

Extraits de rate désalbuminés à hautes concentrations.

Forme. — Ampoules de 3 cc.

Splénocrisine « 15 », « 30 » et « 60 » correspondant à 15, 30 et 60 grammes de glande fraîche par ampoule.

Indications. — Eczémas, Dermatoses prurigineuses, Asthme, Anaphylaxie, Tuberculose.

Posologie. — Une ampoule par jour en injection intramusculaire, par série de 10 à 15 injections.

Affections anciennes : débiter à 15 gr.  
— récentes : à 30 gr.

Laboratoires **FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

## SPLÉNOGASTRINE

Complexe opothérapique gastrosplénique.

La *Splénogastrine* couple en une association judicieusement établie la méthode de Castle et les indications hématopœtiques de l'opothérapie splénique (Travaux de l'Ecole de Toulouse sur la rate (Soula) avec la médication cuivro-ferreuse.

Indications. — Toutes les anémies : graves, secondaires (tuberculose, paludisme, rhumatisme, cancer, saturnisme), légères ou moyennes, consécutives aux accouchements, aux interventions chirurgicales, aux hémorragies, aux traitements radiothérapiques, bismuthiques ou arsénobenzoliques.

Présentation. — Sous les deux formes complémentaires suivantes, réunies dans la même boîte et qui doivent être prises concurremment : 1<sup>o</sup> Complexe opothérapique gastrosplénique : ampoules buvables de 5 cc.

2<sup>o</sup> Pilules de fer et de cuivre.

Posologie. — Dans les anémies graves : 2 ampoules et 4 pilules par jour.

Dans les anémies de moyenne intensité : 1 ampoule et 2 pilules par jour au moment des repas. (La boîte pour 6 à 12 jours de traitement.)

Laboratoires des Lipides **J. OLIVE**, pharmacien.

14, rue des Minimes — PARIS (III<sup>e</sup>). Tél. : Archives 03-94.

Et provisoirement : 9, avenue Frizac, TOULOUSE.

## SPLÉNOMANGANOL

Rate, Vitamine B, Manganèse.

Le **SPLÉNOMANGANOL** se présente sous forme de comprimés facilement assimilables.

Formule. — Extrait Vitamine B, extrait de Rate, Fluorure de calcium, Poudre d'os, Arséniate de strychnine, Nucléinate de manganèse, extrait de Surrénale, extrait hépatique, Protoxalate de fer, Moelle osseuse, rouge Céréaline.

Posologie. — 2 comprimés midi et soir avant les repas.

Indications. — Carences organiques, asthénies, bacilloles pulmonaires et osseuses, amaigrissement, anémies, psychasthénie, lymphatismes, affections ganglionnaires.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n<sup>o</sup> 403-04.

Laboratoires **HOCQUETTE**

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Arc. 47-13.)

## SPLENOMEDULLA

Opothérapie Splénique et Médullaire associée.  
**Indications.** — Anémie, Chlorose, Leucémie, Paludisme, Rachitisme, Lymphatisme, Troubles de croissance, Convalescence.

**Emploi.** — a. Par voie gastrique : Extrait fluide ou sirop. Ampoules buvables.

b. Par voie hypodermique : Ampoules injectables pour injections intramusculaires quotidiennes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénération de la formule sanguine.

Augmentation rapide du poids.

### Doses :

**Adultes :** Sirop 2 cuillerées à soupe par jour.

Ampoules buvables : 1 ampoule, matin et soir.

**Enfants :** Sirop 1 cuillerée à café matin et soir.

Voir la notice pour indications plus détaillées.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 722-4; 722-5, 722-23.

**Laboratoires CHAIX**

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon — PARIS (XV°).

## SPLÉNYL

(Vitaminé.)

**Composition.** — Le SPLÉNYL est un reconstituant général à base de rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B ; sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication réellement active et que son prix de vente très bas rend accessible à tous les malades.

**Indications thérapeutiques.** — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Épuisement, l'Amalgissement, les Maladies par carence, etc...

**Présentation et posologie.** — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : Ampoules ingérables de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et Sirop de Splényl (flacon de 190 cc.).

**Adultes :** 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

**Enfants :** 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV°).

(Tél. : Danton 08-11.)

## STAL-KOSAL

« La poudre qui calme ».

**Coréïne bismuthée.**

Pansement gastro-intestinal.

**Poudre et tablettes.**

**Formule.** — Coréïne (mucilage pur) et carbonate d'bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Co<sup>2+</sup>Ca.

**Indications.** — Toutes les Gastrites et toutes les Colites, Toutes les inflammations du Cœcum.

**Mode d'emploi :**

**Poudre :** Une cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

**Tablettes :** dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Prix : 25 fr. 80.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-MER

(Tél. : Molitor 34-16.)

## STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique.

**Indications.** — Furunculose, anthrax, acné, ostéomyélites, zona et toutes affections d'origine staphylococcique.

**Double supériorité :** Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

**Formes :** Buvable, la plus pratique. Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré. Injectable, la plus rapide et la plus sûre. Une ampoule de 1 cc. par jour.

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts.

Prix : 10 ampoules, 31 fr. 40. — 5 ampoules, 16 fr. 40.

Filtrat : 6 ampoules, 37 fr. 60.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

**Laboratoires du Dr P. ASTIER**

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52.)



## STANION

**Description.** — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

**Capsules :** contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon).

**Ampoules :** contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylocoques, où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

**Indications.** — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylocoques, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

**Capsules :** 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculite, anthrax, phlegmons, paranas, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylocoquiques.

**Prix :** Ampoules : 40 fr. 30 pour 2 à 4 jours de traitement.

Capsules : 33 fr. 50 pour 5 à 12 jours de traitement.

**Laboratoires CH. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

## STANNO-SUFROL CROSNIER

### Composition :

Étain, Oxyde d'étain, Soufre actif, Bardane stabilisée, Extrait splénique.

### Indications :

Furonculose et Affections à staphylocoques.

### Posologie :

2 à 3 comprimés et plus à chaque principal repas.

**Laboratoires CROSNIER**

199, avenue Michel-Bizot — PARIS  
(Tél. : Did. 04-53.)

## STANNOXYL

**Composition.** — Oxyde d'étain et étain métallique absolument purs (d'après les travaux de Frouin).

**Indications.** — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, Acné, Anthrax, Absès du sein chez les nourrices, etc.

**Propriétés.** — Traitement pratique et rapide : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

**Formes.** — Pour l'usage interne : comprimés, ampoules. Pour l'usage externe : pommade.

**Posologie.** — Comprimés : 4 à 8 par jour.

**Autres formes.** — Suivant indications du médecin.

**Prix :** Comprimés : 22 fr. 90

Ampoules : 34 francs

Pommade : 21 francs

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 20-60.)

## STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylocoquique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + *anatoxine*.

**Indications.** — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et infections rebelles à Staphylocoques. *Zona*.

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Les 6 ampoules. Prix : 37 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 514-14.

Littérature et échantillons :

**Produits Biologiques CARRION**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## STAPHYLASE du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

**Indications.** — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

**Doses.** — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'ioduré de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

**Laboratoires LEBEAULT  
BESINS et Cie, pharmaciens**  
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres. Riche en vitamines B.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent de la phagocytose. Abaisse la glycémie.

**Indications.** — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses, Diabète, Acidose.

**Doses et mode d'emploi.**

*Adultes* : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

*Enfants* : Moitié de ces doses au moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution : 20 fr. 70. Comprimés : 20 francs.

Fabrication assurée.

**Laboratoire des Produits SOIENTIA**  
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,  
21, rue Chaptal — PARIS (Tél. : Trinité 29-29.)

## STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les staphylococcies : Furoncles, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

### Posologie et Présentation :

*Adultes* : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou  
1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules ..... 25 fr. 30.

Boîte de 10 suppositoires ..... 21 fr. 50.

*Enfants* : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou  
1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules ..... 18 fr. 30.

Boîte de 10 suppositoires ..... 18 francs.

### Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Europe 49-50.)

Z. N. O. : PETRIER, 30, rue Créqui, Lyon.

## STAPHYLO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur Duchon.

**Composition.** — Lysat de Staphylococques.

**Indications.** — Furunculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylococques, Staphylococcémies.

## STREPTO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat de Streptococques hémolytiques.

**Indications.** — Érysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptococques, grandes infections à Streptococques.

**Posologie.** — Ces lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes à 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 31 fr. 60.

**Laboratoire OORBIÈRE**  
et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Carnot 78-11.)

## STAPROLYSAT

Vaccin neurotrope.

**Indications.** — Tous les accidents du système nerveux, central ou périphérique auxquels on attribue une origine infectieuse. Séquelles des staphylococcies.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névrites, Radiculites, Myélites, Encéphalite et ses séquelles, Sclérose en plaques, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona. Ulcères gastriques et duodénaux.

**Composition.** — Autolysat neurotrope de *Staphylococcus* et de *B. Prodigiosus*.

**Forme.** — Ampoules de 1 cc., à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

**Série I.** — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

**Série II.** — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

**Série III.** — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

**Série P.** — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens *pyocyaniques*.

**Mode d'emploi.** — Une injection *intramusculaire* tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas, sans arrêt, les 3 premières séries et au besoin la série P. Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira les injections *intramusculaires* de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections *intraveineuses* prudentes de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements, voir *Iodassium* et *Iodosulfène*.)

Les trois premières séries sont en général indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Les trois premières séries : 36 fr. 50 l'une.

Série P : 41 francs.

**Nota.** — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.

## STAVAFER

(Ancienne dénomination STOVAFER)

Granulé

Médication reconstituante à base d'acide oxyacétylamino-phénylarsinique, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse.

1 cuillère à café contient 0,05 d'acide oxyacétyl amino-phénylarsinique.

**Indications.** — Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

**Mode d'emploi.** — *Enfants*, à partir de 3 ans : 2 cuillérées à café par jour.

*Adultes* : 3 cuillérées à café par jour.

Prix de vente : 24 fr. 40.

**Laboratoires RICHER**

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien  
PARIS (Tél. : Provence 34-87.)

## STÉRAMINE

Crème antiseptique hydrosoluble.

**Composition.** — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

**Indications.** — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

**Avantages.** — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Échantillons médicaux sur demande.

**Laboratoire Pharmaceutique.**

**DAUFRESNE**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

## STÉRANDRYL

Hormone mâle de synthèse.

**Composition.** — Hormone testiculaire estérifiée de synthèse, cristallisée, chimiquement pure.

**Présentation.** — Solution huileuse injectable de propionate de testostérone en ampoules de 1 cc. dosées à 5, 10 et 25 mgr.

**Indications.** — Titrage à 10 mgr. :

A. Pollakiurie, Asthénie, Puberté masculine tardive, Syndrome adiposo-génital.

Titrage à 25 mgr. :

B. Prostatisme, Senescence, Asthénies graves.

C. Infantilisme, Eunuchoidisme.

D. Impuissance.

**Posologie.** — A. 1 ampoule de 10 mgr. tous les 2 jours pendant 3 semaines.

B. 4 ampoules de 25 mgr. la 1<sup>re</sup> semaine ; 2 ampoules la 2<sup>e</sup> semaine.

C. 1 ampoule de 25 mgr. tous les 2 jours.

D. 1 ampoule de 25 mgr. tous les jours pendant 6 jours.

**Prix au public :** La boîte de 4 amp. de 1 cc. à 5 mgr... 45 fr.

La boîte de 5 amp. de 1 cc. à 10 mgr... 75 fr.

La boîte de 2 amp. de 1 cc. à 25 mgr... 75 fr.

### Les Laboratoires du Docteur ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs. — R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>). (Tél. : Littré 58-43.)

## STÉROGYL

Vitamine D<sub>2</sub> chimiquement pure.

**Composition.** — Solution de vitamine D<sub>2</sub> cristallisée.

**Indications.** — Rachitisme, Déminéralisation, Caries dentaires, Décalcifications de la grossesse.

**Présentation.** — Flacon de 10 cc. contenant 5 mgr. de vitamine D<sub>2</sub>. Chaque goutte de solution = 800 Unités Internationales.

**Posologie.** — Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour.

De 1 à 10 ans : X à XX gouttes.

Au delà : XX à XXX gouttes.

**Prix au public :** Le flacon de 10 cc. : 21 fr. 90.

### Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## STÉROGYL-15

Dose unitaire forte de Vitamine D<sub>2</sub>.

**Composition.** — Solution contenant 15 mgr. de vitamine D<sub>2</sub> cristallisée, chimiquement pure.

**Administration.** — A prendre en une seule fois, par voie buccale, au milieu d'un repas.

### Propriétés thérapeutiques :

**Préventives :** La dose de 15 mgr. assure la prévention de l'avitaminose D pour une durée d'environ 1 an.

**Curatives :** Traitement d'attaque : Rachitisme, Tétanie, Ostéoporose, Ostéomalacie, Tuberculose, Engorgements, Consolidation des fractures.

**Présentation.** — Boîte d'une ampoule contenant une solution titrée à 15 mgr. de vitamine D<sub>2</sub>.

**Posologie.** — Prévention : dose unique.

Traitements d'attaque : se conformer à l'avis du médecin.

**Prix au public :** La boîte de 1 ampoule de 15 mgr. : 35 fr.

### Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL

LABORATOIRE FRANÇAIS

DE CHIMIOTHÉRAPIE

S. A. au cap. de 10 000 000 de fr. — R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

**Présentation.** — En flacons compte-gouttes M.S. à pointe mousse de 30 cc. D'où les avantages suivants :

1<sup>o</sup> **Commodité :** Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.

2<sup>o</sup> **Sécurité :** Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

**Usages.** — **Oculistique :** Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas ; Conjonctivites, Blépharites.

**Absténie :** Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

**Rhino-pharyngologie :** Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

**Affections de l'oreille :** STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

**Pédiatrie :** Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

**Prix :** 1<sup>o</sup>/o, 2<sup>o</sup>/o : 16 fr. 90. — Prix : 5<sup>o</sup>/o, 10<sup>o</sup>/o : 18 fr. 20. 20 jours de traitement.

### Laboratoires MAYOL-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVII<sup>e</sup>). Tél. Passy 51-12.

LE MARINEL, pharmacien

4, avenue Orban — BRUXELLES

## STIMULOL

Reconstituant général sous forme de granulé sucré et vanillé, agréable à prendre. Permet à l'organisme de rétablir son équilibre calcium-phosphore grâce à l'apport de ces éléments sous des formes particulièrement assimilables, et à la présence de Vitamine D qui en assure l'utilisation. Les constituants de la kola, outre leur action tonique propre, accélèrent les échanges des liquides de l'organisme, favorisant ainsi une résorption plus rapide des autres constituants.

**Principes actifs.** — Vitamine D, Lactophosphate de Calcium, Formiate de Calcium, Phosphure de Zinc, Extrait de Kola, Extrait de Bourdaine.

**Indications.** — Le STIMULOL est indiqué comme récalcifiant et tonique dans tous les cas de Neurasthénies, Neurasthénie sexuelle, Surmenage intellectuel, Rachitisme, Caries dentaires, etc.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café par jour pendant 10 jours, puis 6 cuillerées à café. Le STIMULOL se prend à n'importe quel moment de la journée, pur ou avec un peu de liquide, ou mieux encore pour sucrer une infusion.

*Enfants:* 1/2 dose.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS  
(Tél. : 31-10 et 42-06.)

## STINERGYX

Paresse physique et psychique.

**Composition.** — Cortico-surrénale, androïque, cérébral, Thyroïde ; Manganèse, Acide Phosphorique.

**Indications.** — Médication de la paresse physique et psychique, Asthénies dites essentielles, Apathie, Stimulant sexuel.

**Avantage.** — L'acide phosphorique ainsi enrobé est d'une tolérance parfaite pour les muqueuses digestives. Ce complexe bio-chimique tonifie puissamment la cellule nerveuse et élève rapidement le rendement intellectuel.

*Ce produit se classe moins comme un médicament que comme un aliment souvent nécessaire dans les étapes de la vie scolaire et cérébrale.*

**Présentation.** — Comprimés.

### Posologie :

*Enfants:* 1 à 3 comprimés (avaler ou écraser).

*Adultes:* 2 à 4 comprimés (avaler)

*De préférence* 1/2 heure avant les repas.

Enregistré L. N. C.

**Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA**  
**P. GORDONNIER**, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

## STOMAROL

Suc gastrique total en ampoules buvables.  
Extrait organo-thérapeutique d'estomac de porc  
acidifié par HCl.

**Composition.** — La totalité des ferments  
stomacaux : facteur de Castle, pepsine et  
autres ; HCl libre et combiné en quantités  
et proportions physiologiques ; 8 ampoules  
de STOMAROL correspondent, tant en  
ferments qu'en HCl, à la sécrétion diurne  
d'un estomac sain.

**Propriétés.** — Le STOMAROL supplée aux  
sécrétions stomacales déficientes, régénère  
le chimisme gastrique et régularise la  
motricité, active les processus digestifs et  
améliore la nutrition générale avec reprise  
du poids. Excite l'hématopoïèse par la  
présence du facteur de Castle.

**Indications.** — Insuffisances gastriques et  
tous les troubles gastro-intestinaux qui en  
découlent : Anorexie, Dyspepsies doulou-  
reuses ou atoniques, Colites et diarrhées  
gastrogènes, États de dénutrition, Gastro-  
entérostomies et gastrectomies, Anémies,  
y compris l'anémie de Biermer.

**Présentation.** — Ampoules buvables de  
5 cc.

Boîtes de 8 ampoules.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 ampoules par  
jour.

*Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.

**Mode d'emploi.** — Verser le contenu de  
l'ampoule dans un peu d'eau et le boire  
par gorgées pendant les repas.

**Laboratoires Albert ROLLAND**

4, rue Platon — PARIS (XV<sup>e</sup>)

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

## STOPASTHME

Traitement de fond de l'asthme et des dyspnées asthmatiformes.

### Composition :

Lipoides de foie.....	0,10
Extrait biliaire.....	0,05
Chl. d'éphédrine.....	0,01

### Avantages du traitement :

Rééquilibrant du sympathique ;  
Rééquilibrant humoral ;  
Correcteur de l'insuffisance hépatique ;  
Traitement causal, il rééduque le muscle bronchique et modifie le ter-  
rain organique général.

**Indications.** — Le *Stopasthme* constitue un traitement préventif et  
curatif des crises dans :

- a) L'Asthme vrai, simple ou intriqué avec des poussées de bronchite  
chronique.
- b) Les équivalents de l'Asthme : quintes de toux spasmodiques, trachéo  
bronchites, etc.
- c) Le Rhume des Foies.
- d) Toutes les Dyspnées : emphysème, dyspnées d'effort des cardiaques,  
oppression des scléreux pulmonaires, dyspnée d'origine toxique.

**Posologie.** — Comme tous les traitements de fond, le *Stopasthme* devra  
être pris *régulièrement* et ceci à la dose de : une à deux pilules par  
jour chez l'enfant, avalées ou écrasées dans de la confiture ; deux à  
trois chez l'adulte, avant les repas.

En cas de crise nigué chez l'adulte : six pilules par jour.  
Aucune contre-indication. Aucune intolérance.

**Laboratoire des GRANIONS**

M.-L. BARBAN, Docteur en Pharmacie

61, rue Gaston-Lauriau — MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine).

## STOPRAL

Analésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement  
atoxique. Formule établie pour adultes seulement.

Comprimés à avaler ou à déliter dans l'eau auparavant.

**Indications.** — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.  
Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives.

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

**Doses.** — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe  
quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile  
quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et  
constitue la dose maxima.

Prix : 15 fr. 20.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

## STOVÉDRINE

### Pommade. Solution.

#### Pommade nasale atoxique.

#### Formule normale :

Stovocaïne .....	1	p. 100
Éphédrine (Chlorh.) .....	5	p. 100

#### Formule B. B. déconcentrée :

Stovocaïne.....	1	p. 100
Éphédrine (Chlorh.).....	1,25	p. 100

#### Solution aqueuse pour pulvérisations :

#### Formule :

Stovocaïne.....	1	p. 100
Éphédrine (Chlorh.).....	5	p. 100
Chlorétoine .....	1	p. 100

La *Stovédrine* est une association de Stovocaïne (Chlorhydrate d'Amyléine) et d'Éphédrine *naturelle* à un taux de concentration indispensable pour combattre efficacement les affections aiguës et chroniques de la pituitaire.

**Indications.** — Coryza, Sinusite, Céphalées, Obstruction nasale, Asthme, Rhume des Foin.

**Posologie.** — *Pommade*: Introduire gros comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

**Solution**: Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine, la solution de *Stovédrine*.

#### Prix :

Pommade .....	17 fr. 10
Solution avec pulvérisateur .....	30 fr. 50
Solution (flacon rechange).....	21 fr. 10

#### Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon, NEUILLY-SUR-SEINE  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## STOVAR SOL

Acide 4-oxy-3-acétylamino-phényl-1-arsinique.

Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

**Indications.** — Traitement des diarrhées toxi-infectieuses, cryptogénétiques, parasitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliase, Spirochétoses intestinales, Syphilis, Pian.

#### Présentations :

Comprimés à 0 g. 25. Le flacon de 30 ....	27 fr. 60
Comprimés à 0 g. 05. Le flacon de 70 ....	15 fr. 80
Comprimés à 0 g. 01. Le flacon de 200 ....	13 fr. 50

#### Posologie et mode d'emploi :

**Doses moyennes.** — *Adultes* : 50 cg. à 1 g. par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cg. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le *Stovarsol* sodique, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## STREPTODERME

*N'est pas une pommade-vaccin.*

**Traitement des Strepto-staphylocoques cutanés.**

**Formule.** — Résorcine, Ac. salicylique, Oxyde jaune, Ichtyol du Tyrol, Oxyde de zinc, Talc. Excipient gras enlevable à l'eau.

**Indications.** — Pyodermites, Eczéma impétiginé, Dermopérides streptostaphylocoques, Parakératoses, Eczématides microbiennes, Intertrigo, Lichénification infectieuse, Dysidrose streptococcique et même mycosique, Ulcère de la jambe, furoncles, etc.

**Contre-indication.** — *Ne pas associer le Streptoderme à une médication iodée externe (formation de HgI<sup>2</sup>).*

Prix du tube de 50 gr. : 16 fr. 40.

Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

## STRONGÉNOL

**Granulé soluble basé sur des notions de conception nouvelle.**

1° Action anti-anémique des *proto-sels de fer* assurée par des traces de *sels de cuivre*.

2° Augmentation de l'acidité chlorhydrique stomacale par cathion électif. *Développement de propriétés anti-anémiques par cet acide.*

3° Absorption intégrale du *phosphate de calcium colloïdal naissant* et de son *phosphore* en présence d'un sel alcalin à radical organique. *Rétention tissulaire catalysée par la vitamine D.*

**Indications.** — Anémies pernicieuses, Troubles de la croissance et de la minéralisation, Rachitisme, Caries Dentaires, Hypocalcémie et toutes carences calciques, Tuberculose, Faiblesse, Surmenage, Phosphaturie, Convalescence. Fractures.

Grossesse, Allaitement, Neurasthénie, Splénectomie, Traitement préliminaire aux interventions chirurgicales.

**Posologie.** — *Nourrissons et enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Adolescents* : 1 à 3 cuillerées à dessert.

*Adultes* : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Prix : 21 fr. 60.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoires M. de RIVE.

A. de RIVE, Pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert, Paris (20\*).

## STRONTIODE

Le *Strontiode* est une préparation nouvelle, dans laquelle nous avons associé la médication iodée et la médication silicique, en y adjoignant un élément synergique : l'Ion Strontium.

Nous avons pu réaliser une suspension colloïdale stable d'acide silicique d'une très grande dispersion, et par suite facilement assimilable par l'organisme.

**Formule :**

Acide Silicique Colloïdal.....	1 gr. »
Acide Phosphorique.....	0 gr. 30
Chlorure de Sodium.....	1 gr. 20
Iodure de Sodium.....	7 gr. 50
Iodure de Strontium.....	0 gr. 50
Véhicule Q. S. pour.....	100 gr.

Deux gouttes de *Strontiode* correspondent à 0,001 d'acide silicique colloïdal et 0,008 d'iode combiné.

**Indications :** Artériosclérose et ses suites.

Hypertension, Troubles cardiaques, Aortite, Angines de poitrine, Troubles cérébraux (Vertiges, Angoisses, Céphalées; Insomnies, Diminution de la mémoire), Troubles auriculaires (Houddonnements d'oreille, Surdit  , Paresse auditive), Troubles oculaires (Mouches volantes, Affaiblissement de la vue), Troubles de la circulation en g  n  ral et en particulier troubles de la m  nopause, maladie de Raynaud, etc...

**Posologie :** Vigouttes 3 fois par jour, apr  s les principaux repas, dans un peu d'eau pendant six semaines, repos de 15 jours et reprendre la cure 4 semaines.

Prix : 21 fr. 70. — Enr. L. N. C. n  1134-S.

Laboratoires de l'**ATOSPIRINE** et du **STRONTIODE**  
13, rue du Bac — PARIS. (T  l. : Littr   55-03.)

## STROPHANTINE CATILLON

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

   0,0001 de Strophantine cristallis  e extraite de *Strophantus gratus*.

Synonyme : *Ouaba  ne*.

**Indications.** — Affections mitrales, Dyspn  e, Oppression,   d  mes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, L  sions cardiaco-aortiques. Art  rioscl  rose avec ou sans n  phrites.

**Posologie.** — 2    4 granules par jour, comme tonique du c  ur.

Le flacon de 50 granules.

## STROPHANTUS CATILLON

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

   0,001 Extrait titr   de *Strophantus*.

**Indications.** — Asystolie, Oppression, Dyspn  e,   d  mes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

**Posologie.** — 2    4 granules par jour, comme tonique du c  ur, *diur  tique*.

En cas urgent, on peut donner 10    20 granules pour forcer la diur  se.

Le flacon de 50 granules.

Prix de l'Acad  mie de m  decine.

Laboratoire **CATILLON**

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.



## STRY-CALCIUM AGUETTANT

Nom nouveau du

STRYL-CAL AGUETTANT

Première association stable de *Strychnine* et *Gluconate de Calcium*.

Tolérance parfaite de la *Strychnine*.

**Indication.** — Tonique musculaire et recalifiant par l'action stimulante de la *Strychnine* et les propriétés de l'ion Calcium assimilable.

**Action.** — Evite sûrement les effets souvent violents de la *Strychnine*, ne surmène pas le foie. Le *Stry-Calcium* est donc sans danger pour les distoniques sympathiques, nerveux, convalescents, déprimés, particulièrement faibles et sensibles, souvent hépatiques.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour. Commencer par une demi-ampoule.

**Forme.** — Ampoules injectables (2 cc. = 0,002 de *Strychnine*, et 0,20 de *Gluconate*). Conditionnements. et prix spéciaux aux hôpitaux.

Enreg. au lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-10.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, qual Fulchiron — LYON (Rhône).

(Tél. : Franklin 24-63.)

## STRYCHNAL

Sulfate d'éthylbétaine de l'acide Strychnique, 10 fois moins toxique que la *Strychnine*.

Asthénie, Anémie, Anorexie, Paralysies post-diphthériques, Névrites, Surmenage, Paralysie du nerf optique.

Granules à 0,01, 2 à 4 par jour (flacon de 50 : 20 fr.).

Ampoules à 0,01, 1 à 2 par jour (boîte de 12 : 23 fr. 50).

Gouttes (Phospho-Strychnal : association Strychnal, 0,005 ; acide phosphorique, 0,15 ; Glycérophosphates, 0,24 pour XX gouttes), XL à LX gouttes par jour : 19 fr. 40.

Arsi-Strychnal (Strychnal et cacodylate), 1 à 2 par jour : 23 fr. 50.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI°).

## STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable.

Glycérophosphate de soude, nucléinate de soude et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc. par 24 heures.

Indications.

Coup de fouet à l'organisme, Asthénie, Convalescence.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — Paris.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

## STRYCHNEURON

Thérapeutique anti-épileptique Strychno-barbiturique.

**Présentation.** — Gouttes, solution 1/5.

**Composition.** — Phényléthylmalonylurée, Strychnine, Paullinia.

**Indications.** — *Epilepsie* (l'adjonction de Strychnine prévient le Syndrome dépressif barbiturique), agitation éthylique. Démorphinisation, Déprimés anxieux.

**Propriétés.** — Sous forme liquide, le Phényléthylmalonylurée permet une posologie plus souple et, à dose moindre, se montre plus actif. La Strychnine exerce une action tonique sur la cellule nerveuse ; les centres respiratoires et vaso-moteurs sont stimulés. L'extrait de Paullinia tonique et euphorique complète cette action.

**Posologie.** — X... à LX gouttes par 24 heures.

2 gouttes = 0 gr. 01 Phényléthylmalonylurée et 0 gr. 00012 de Sulfate de Strychnine.

Le flacon de 20 grammes, durée moyenne : 20 jours.

Enregistré au L. N. C.

**Bibliographie.** — Communications à la Société Médico-Psychologique de Paris, 2 février 1938, 22 décembre 1938 et 27 février 1939. *Société de Biologie*, 29 janvier 1938. Thèse 1939.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA  
P. CORDONNIER, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

## STRYCHNINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

**Propriétés.** — Exalte l'excitabilité du cortex et de la moelle. Excitant du centre respiratoire, du centre modérateur cardiaque, de la motricité gastro-intestinale. Toni-cardiaque et hypertenseur. Antagoniste de l'alcool et des barbituriques.

**Indications.** — Dépressions générales; convalescence des maladies aiguës, défaillances myocardiques consécutives. Surmenage. Frigidité. Hypotension permanente. Palpitations. Anorexies. Dyspepsies. Constipation atonique.

**Présentations.** — Granules Houdé de Strychnine (basique) à 1 mgr., forme la plus pratique pour ingestion (très peu soluble, assimilation lente, la strychnine ne s'accumule pas dans l'organisme).

**Autres formes :**

Granules Houdé de Sulfate de Strychnine à 1 mgr.

Granules Houdé d'Arséniate de Strychnine à 1 mgr.

**Posologie.** — 2 ou 3 granules par jour avant les repas (dépressions, convalescences).

Dans l'alcoolisme chronique, jusqu'à 8 ou 10 granules par jour (dose maxima *Codex 1937* : 15 mgr. *pro die* Strychnine base, 18 mgr. *pro die* Sulfate de Strychnine).

### STRYCHNOTHÉRAPIE INTENSIVE

**Le traitement des cas suivants :**

*Intoxication barbiturique;*

*Accidents nerveux aigus ou subaigus de l'alcoolisme chronique;*

*Formes toxiques et malignes de la diphtérie, certaines toxi-infections (gripes graves, typhoïde, etc.),*

*repose essentiellement sur l'emploi de la Strychnine injectable à hautes doses (Strychnothérapie intensive) (demander la Notice spéciale aux Laboratoires Houdé).*

**Les Laboratoires Houdé présentent une solution forte de Sulfate de Strychnine, à 2 mgr. 1/2 par centicube, spécialement pour cette thérapeutique :**

**Coffret n° I :** 15 ampoules de 4 cc. (10 mgr. par ampoule).  
— **Coffret n° II :** 20 ampoules de 2 cc. (5 mgr. par ampoule).

**Ce traitement implique la surveillance directe et étroite du médecin.**

Pour commandes urgentes, télégraphier à :  
**GRANULOUDÉ — Paris.**

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 40-58.)

## STRYCHNO - PHOSPHARSINÉES

### INJECTIONS ET GOUTTES CLIN

Association des 3 principaux reconstituants de l'état général du système nerveux : le phosphore, l'arsenic et la strychnine.

#### GOUTTES CLIN

#### STRYCHNO-PHOSPHARSINÉES

XX gouttes correspondent à :

Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 10
Glycérophosphate de potasse .....	0 gr. 04
Métharsinate Clin .....	
Sulfate de strychnine ...	0 gr. 00025
En flacons de 25 cc.	

X à XV gouttes 2 fois par jour, dans un peu d'eau, dix minutes avant le repas.

#### INJECTIONS CLIN

#### STRYCHNO-PHOSPHARSINÉES

3 formules :

N° 596	N° 796	N° 740	N° 940
amp.	amp.	amp.	amp.
1 cc.	1 cc.	2 cc.	5 cc.
Dosage par ampoule.			

	gr.	gr.	gr.	gr.
Glycérophosphate de soude ....	0,10	0,10	0,20	0,10
Cacodylate de soude.	0,05	0,05	0,10	0,25
Sulfate de strychnine.	1/2 mgr.	1 mgr.	1 mgr.	1 mgr.
Boîtes de 6 ou 12 ampoules.				
En injections sous-cutanées ou intramusculaires tous les jours ou tous les deux jours.				
Séries de 12 injections.				

**Laboratoires CLIN, COMAR et C<sup>ie</sup>**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques  
PARIS (V<sup>e</sup>).

## STRYCHNOTONINE

### Composition :

Méthylarsinate de Calcium. 0 gr. 0030

Chlorhydrate de Strychnine. 0 gr. 0005

Pour 1 dragée.

Synergie pratiquement atoxique, très maniable.

**Action.** — Tonique général et nervin, dynamogène, activant la nutrition, favorisant l'hématopoïèse, eupnéique, stomachique.

**Indications.** — Asthénie, Surmenage, Adynamie des vieillards, Convalescences, Etats neuro-anémiques, Polynévrites, Hypotensions, Myocardies, Atonies digestives, Enurésie.

**N. B.** — Souvent les troubles dépressifs relèvent seulement d'un état alcalosique, et alors le Chlorammonie est spécialement indiqué, seul ou en cures combinées, mixtes ou alternées.

**Présentation.** — Flacon de 100 dragées.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées à chacun des 3 repas.

Cures : 3 semaines.

**N. B.** — Des tableaux facultatifs de doses croissantes et décroissantes, échelonnées sur 18 (adultes) à 30 jours (enfants), adaptées selon l'âge, sont annexés au mode d'emploi.

### Laboratoire M. LEFEBVRE

25, boulevard de La Tour-Maubourg

PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 60-77.)

## STYPTOGÉNINE

Poudre antiseptique pour tous usages : urologiques, gynécologiques et O. R. L.

### Composition :

Paraminophénylsulfamide associé à des sels de sodium purs.

### Posologie :

1 à 2 cuillerées à café par litre d'eau bouillie.

Boîtes de poudre. Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 2000-1.

### Laboratoires J. FUMOUEZ

156, boulevard Ney — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Marcadet 55-39.)

## SUCRE ÉDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical. Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

Prix : la petite boîte : 7 fr. 90.

La grande boîte : 20 fr. 80.

### LITHARSYNE

**Indications.** — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

**Posologie :** Gouttes : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Prix : 15 fr. 10.

### Laboratoires E. FERRÉ

J. LEROY, Pharmacien

142, bd St-Germain — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Danton 96-35.)

## SUCRE « VITA D »

### Composition :

Vitamine D..... 0 mgr. 4425

Saccharose..... 100 gr.

Chaque morceau de sucre pèse 2 gr. 8 et contient 500 U. I. de Vitamine D.

**Propriétés.** — Associe les propriétés antirachitiques de la Vitamine D aux propriétés toniques nutritives du saccharose.

**Indications.** — Rachitisme, tous les cas de décalcification et de déminéralisation de l'organisme, Poussées dentaires chez l'enfant, Caries dentaires chez l'enfant et chez l'adulte, Fractures, Grossesse, Allaitement, Convalescences.

**Posologie et mode d'emploi.** — *Nourrissons* : 1 à 4 morceaux par 24 heures dans les biberons. *Enfants de 1 à 10 ans* : 4 à 8 morceaux par 24 heures. *Enfants au delà de 10 ans et adultes* : 8 à 10 morceaux par 24 heures.

**Laboratoires Français de Produits Chimiques et Pharmaceutiques**  
40-42, rue François-Ier — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SUFROL CROSNIER

### (Comprimés.)

**Composition.** — Complexe de Soufre sous ses 3 formes actives : Hydrogène sulfuré naissant, Hyposulfites alcalins, Soufre micellaire ; Térébenthine colloïdale.

**Indications.** — Toutes les indications du soufre, en particulier affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, pharyngites ; lymphatisme ; dermatoses ; arthritisme ; rhumatisme chronique ; goutte.

### Posologie :

*Adultes* : 2 à 3 comprimés au début des deux principaux repas.

*Enfants* : 1/2 dose.

### Laboratoires OROSNIER

199, avenue Michel-Bizot — PARIS  
(Tél. : Did. 04-53.)

## SUISÉRYL

**Composition.** — Sérum normal de porc.

**Propriétés.** — Thérapeutique biologique des infections d'origine intestinale à colibacilles, entérocoques, paratyphiques, protéus, perfringens, pyocyaniques, etc.

**Indications.** — Colibacilloses : Entérites, Entérocolites, Diarrhées infantiles, Diarrhées saisonnières, Pyélonéphrites gravidiques, Pyérites, Cystites.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour, par voie buccale, loin des repas.

Prix au public : 30 fr. 50.

**Les Laboratoires du Dr ROUSSEL.**  
Institut de Sérothérapie Hémopoïétique.  
S. A. au capital de 15 000 000 de francs.  
R. C. Seine 12.384.  
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Littré 68-22.)

## SULFAGONE

### (Nouvelle formule.)

#### Composition :

4-Amino-phényl-sulfamide ..... 0 gr. 25  
Extrait concentré de foie correspondant à pulpe fraîche.... 0 gr. 55  
Pour 1 comprimé.

**Forme.** — Comprimés glutinisés.

**Indications.** — *A titre préventif* : Erysipèles, Phlegmons, Abscès, Otites, Angines, mastoïdites, Septicémies à streptocoques, Méningites à streptocoques et à méningocoques, pneumocoques, infections gonococciques aiguës ou chroniques, Infections dentaires, colibacilluries.

*A titre curatif* : Prévention de l'infection puerpérale et des accidents du post-abortum. Interventions pour affections septiques. Epidémies.

**Posologie** : — (Ne jamais absorber plus de deux comprimés à la fois.)

*Traitement curatif* : 2 à 20 comprimés par jour.

*Traitement préventif* : 2 à 12 comprimés par jour.

*Enfants* : 1/2 dose.

*Nourrissons* : 1/4 de dose.

**Incompatibilités.** — Purgatifs salins (Sulfate Na ou Mg.) médicaments chryso ou arsénotherapiques, antipyrine.

**Présentation et prix.** — Le flacon de 30 comprimés : 27 fr. 60.  
Enregistré au L. N. C. M. N° 514-423.

### Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## SULFAMIDEX

association de para-aminobenzène-sulfamide (1162 F) et de para-aminobenzoate d'éthyle.

**Présentation.** — 1° *Comprimés solubles* à 0 gr. 25 de 1162 F et 0 gr. 025 de para-aminobenzoate d'éthyle. 2° *Poudre dermatologique* à 10 p. 100 de 1162 F et 1 p. 100 de para-amino-benzoate d'éthyle. 3° *Poudre chirurgicale* à 95 p. 100 de para-aminobenzène sulfamide.

**Indications.** — 1° **Comprimés.** *Injections*: métrite, suites de couches, ulcérations du col, salpingite. *Lavages et instillations*: blennorrhagie, urétrite, prostatite. *Gargarismes et lavages*: angines, laryngites, pharyngites, sinusites, rhinites. *Bain de bouche*: gingivite, pyorrhée alvéolaire. *Bain d'yeux*: conjonctivite, blépharite, kératite, trachome.

2° **Poudre dermatologique**: plaies atones et infectées, érysipèle, eczéma, pyodermites, prurit, ulcères variqueux.

3° **Poudre chirurgicale**: plaies accidentelles, brûlures, stomatites, gingivites, adéno-phlegmons, ostéophlegmons, ostéomyélites, rhinites, sinusites, etc.

**Posologie et mode d'emploi.** — Comprimés : faire dissoudre un comprimé dans un litre d'eau bouillie tiède.

### Laboratoires SAUVAGEON

18, rue Mademoiselle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

(Tél. : Vaugirard 95-13.)

## SULFAMIDO-SUPPO

**Composition.** — Association Campho-Sulfamidée par voie rectale.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement préventif et curatif de tous les états infectieux médicaux et chirurgicaux. Septicémies, pneumonies, méningites, gonococcies, cystites, pyélites, colibacillose, angines septiques, etc.

**Présentation.** — Suppositoires:

Adultes. Enfants. Nourrissons.

Paramino-benzène sulfamide .....	0,50	0,25	0,12
Camphre .....	0,05	0,03	0,015

**Posologie.** — 2 à 6 suppositoires par jour.

Médication à appliquer sous surveillance médicale. S'abstenir de prescrire des médicaments sulfatés pendant la durée du traitement ; éviter les aliments riches en soufre.

### Laboratoire REBOUL

A. DELAUNEY, Pharmacien,

Ex-interne des Hôpitaux de Paris. Docteur en médecine.

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

(Tél : Italie 12-24.)

## SULFAMYD

### Paraminobenzènesulfamide.

Comprimés dosés à 0 gr. 25.

**Prix** : Le flacon de 40 comprimés : 18 fr. 40.

**Indications.** — Infections à Streptocoque, Staphylocoque, Pneumocoque, Méningocoque, Gonocoque et Coli-Bacille.

**Posologie.** — Doses moyennes de 8 à 20 comprimés par jour. Cette dose étant fractionnée au cours des 24 heures. Pour les enfants, proportionnez les doses suivant le poids.

Échantillons et littératures envoyés gratuitement sur simple demande.

### Laboratoires LAFFORT

JOUE - LES - TOURS (Indre-et-Loire).

(Tél. 38.)

## SULFAN

**Forme.** — Comprimés à sucer lentement.

**Composition.** — Monosulfure de sodium, Borate de soude, Extrait d'Erysimum, Teinture d'Aconit, sucre et réglisse.

**Propriétés.** — Type par excellence du gargarisme sec fondé sur l'action élective du soufre, de ses vapeurs et de ses dérivés sur les muqueuses et les ganglions des voies respiratoires. Agent essentiel de métabolisme.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des grosses bronches. Tous états infectieux ou toxi-infectieux.

**Posologie.** — 2 à 5 comprimés par jour.

**Prix** : le tube de 24 comprimés : 12 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire DALAYEUN, pharmacien

15, rue de Paris — SANNOIS (Seine-et-Oise).

(Tél. : 19.)

## SULFAPYRIDINE ZIZINE

Médication anti-infectieuse.

**Forme.** — Comprimés dosés à 0 gr. 30 de principe actif.

**Composition.** — Para-aminophénylène-sulfo-2-amino-pyridine. Poudre alcaline pour en faciliter la tolérance.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action bactériostatique directe sur le microbe, et indirecte par ralentissement et suppression de sa fonction de reproduction.

**Indications.** — Toutes les infections en général, mais en particulier : les infections pulmonaires à pneumocoques et germes associés, les gonococcies et leurs complications, les méningites à pneumocoques, méningocoques, bacille de Pfeiffer, les infections à staphylocoques (anthrax, septicémies), les infections puerpérales, les colibacilloses.

**Posologie.** — 1 gr. 50 à 6 grammes suivant la gravité.

Diviser la dose quotidienne en six ou huit prises qui seront administrées à intervalles réguliers, la prise initiale devant être au moins double des prises fractionnées suivantes.

**Incompatibilités.** — Purgatifs salins.

Certains traitements chimiothérapiques (en particulier arsenic et mercure).

Prix : 28 fr. 80.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

4-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>)  
(Tél. : Diderot 28-96 et Dorian 75-52.)

## SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de sodium. Teneur en arsenic : 19 p. 100.

**Injections** (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

**Indications.** — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Angine de Vincent, Aphtes, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Blennorragie, Dermatoses chroniques, Dysenterie amibienne, Eléphantiasis, Enurésie, Erysipèle, Fièvre de Malte, Goitre endémique, Infection puerpérale, Paludisme, Typhoïde, Variole, Zona.

Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 mlgr.	1 cgr.	1,5	2	3	6	12	18	24
5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	36	42	48	54	60	72	84	96 cgr.

Voir *Arsénos-Soloant* :

Durée moyenne des unités vente :

On considère généralement que 12 cgr. sont éliminés en 24 heures.

**Laboratoires de Biochimie Médicale.**

**Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie.**

19-21, rue Van-Looy — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

## SULFARSIODE

**Composition et dosage :**

Iode .....	0 gr. 006	par cc.
Arsenic .....	0 gr. 002	—
Soufre allylique .....	0 gr. 004	—
1 cc. représente XLII gouttes.		

**Indications.** — Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

**Posologie :**

**Bébé**, selon l'âge : VI à XII gouttes par jour.

**Adolescents**, selon l'âge : X à XX gouttes par jour.

**Adultes** : XV à XXX gouttes par jour.

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas, par périodes de dix jours.

**F. GÉRIN, Pharmacien,**

10, rue Jacquard — LYON.

(Tél. : B. 87-18.)

## SULFEUMICTINE

(Eumictine sulfamidée.)

Paraaminophénysulfamide (1162 F)  
Santalol, Salol, Hexaméthylène-tétramine.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes affections urinaires microbiennes. Blennorragies, Pyélites, Urétrites, Cystites, Métrites, Salpingites, Endocervicites, Colibacilloles.

**Doses et mode d'emploi.** — Capsules glutinisées : 6 à 10 par jour.

Prix de vente au public : 24 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Trocadéro 40-42.)

## SULFHYDRAL CHANTEAUD

**Composition.** — Granules contenant chacun 1 cgr. de Sulfure de Calcium pur. Au contact des liquides organiques dégage de l'hydrogène sulfuré naissant.

**Présentation.** — Boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 granules.

**Indications.** — Antiseptique très actif des voies aériennes et digestives. Angine, Grippe, Rhume, Rougeole, Scarlatine, etc.

**Mode d'emploi, doses.** — Sans danger. Non toxique. On peut sucer les granules ou les dissoudre dans de l'eau plus ou moins chaude pour gargarisme ou boisson.

**Enfants :** Jusqu'à 5 granules par jour.

**Adultes :** Jusqu'à 12 ou 15 granules par jour.

Prix de vente : 16 fr. 50.

**Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD**

R. RAVAUD, Pharmacien

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES  
(Seine-et-Oise).

## SULFIODE

**Composition.** — Corps nouveau : Iodométhylate d'Isothiourée ( $C^2H^4N^2S$ ) contenant 58,26 p. 100 d'Iode et 14,67 p. 100 de Soufre.

**Propriétés.** — Très haute activité thérapeutique. Ni accidents d'Iodisme, ni phénomènes d'intolérance ou de biotopisme. Aucune contre-indication. Seuil toxique 50 fois supérieur à la dose thérapeutique.

**Indications.** — Puissant traitement des Rhumatismes chroniques de toutes natures. Algies rhumatismales, Scléroses, Hypertension, Infections, Maladies de peau et toutes les indications du Soufre et de l'Iode, ensemble ou séparément.

**Forme et posologie.** — Ampoules de 2 cc. dosées à 0,10 en solution aqueuse, pour injections intramusculaires ou intraveineuses. Ne provoquent aucune réaction. 3 à 7 injections par semaine. Séries de 12 injections. 3 semaines d'intervalle entre les séries.

**Capsules glutinisées** dosées à 0,03. 2 à 6 par jour. Enregistré au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 1001-19 et 21.

**Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN**

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

## SULFOBIOL "S"

Antianaphylactique, antitoxique, anti-choc.

**Granulé.** — Groupement de soufre et d'Hypo-sulfite alcalin.

**Ampoules.** — Hypo-sulfite Mg à 10 % en solution dans de l'eau de Sain-les-Bains (indolores en intramusculaires), Anti-choc.

**Indications principales.** — Déséquilibres humoraux.

a. Insuffisance hépatique, Foie torpide, Langue saburrale, Inappétence, Lassitude, Maux de tête au réveil, Constipation

Intoxication intestinale et ses conséquences, Acne, Urticaire, Strophulus infantile, Prurigos, Psoriasis.

b. Inflammations chroniques du tube digestif (Pharyngite chronique, Entérococolite), et de l'arbre respiratoire (Asthme, Rhinite, Bronchite catarrhale).

c. Rhumatisme articulaire chronique, Algies musculaires, Névralgies.

**Action.** — Apport au foie de la molécule de soufre nécessaire à sa fonction thiopexique : destruction des indols, scatols et poisons d'origine intestinale. Dissolution des floculats par l'hypo-sulfite.

**Doses.** — Granulé à croquer ou faire dissoudre. Matin et soir, une cuiller à dessert (enfants : une cuiller à café).

**Ampoules** en injection intramusculaire ou intraveineuse, ou en lavement à garder le soir au coucher 3 à 6 par semaine.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous les n<sup>os</sup> 130-11 et 12.

**Laboratoire du SULFOBIOL**

242, avenue Félix-Faure — LYON. — (Tél. : Moncey 17-92.)

## SULFOBORE ROY

**Thérapeutique soufrée.**

**Composition.** — Poudre antiseptique, désodorisante (par l'anhydride sulfureux et le soufre naissants).

### Indications :

*Gynécologie* : Metrites, Leucorrhée, Suites de couches, Toilette intime quotidienne, Prurits (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau chaude).

*Affections de la peau* : Pellicules, Acné, Sueur des pieds, des aisselles (en lavage ou saupoudrage), Coryza, Ozène (en prise ou humage), Maux de gorge (en gargarisme) : 1 cuillerée à café par verre d'eau chaude.

**Avantages.** — N'irrite pas, ne tache pas, n'est pas toxique.

**Laboratoires A. ROY**

**Transférés au Laboratoire LACHARTRE,**  
26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (Ve).

## SULFOBYL

**Forme.** — Dragées glutinisées.

### Composition :

Soufre colloïdal .....	0,02
Extrait de bile .....	0,05
Extrait de foie .....	0,05
Entérokinase .....	0,02
Extrait de pancréas.....	0,02
Urotropine .....	0,05
Alcoïne .....	0,005

Par dragée.

### Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoctasique de Vidal.

### Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

*Enfants* : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 13 fr. 60.

### Dépôt Général :

**J. LAFARGE, Docteur en pharmacie**  
62, rue de la Brauderie, CHATEAUROUX



## SULFO-CHALLES

**Composition.** — Soufre sublimé de Challes, 1 gr.; Aconit, 0,25; Erysimum, 2 gr.; Terpinol, 0,05; Glycyrrhiza, 2,50. Pour 10 pastilles.

**Propriétés.** — Les teneurs importantes de l'aconit et de l'erysimum exercent une action sédative rapide. Le soufre sublimé de Challes a une double action; locale, par des polysulfures diffusibles qu'il dégage sous l'influence de la salive; générale, par ces mêmes dérivés sulfurés: ils enrichissent l'organisme en sulfhydrique, dont l'influence est nette sur divers métabolismes. (Spécialement tangible dans le métabolisme bronchique et celui de la peau.)

**Indications.** — Laryngites, Trachéo-bronchites, Toux d'irritation, Enrouements.

**Forme.** — Pastilles à laisser fondre dans la bouche: 10 à 15 par jour.

Prix: 6 fr. 40 la boîte de 45 tablettes.

### TERCINET ET ROULIER

D. ctuels en pharmacie,  
rue de Maistre et rue l'Avre.

CHAMPÉRY (Savoie).

(Tél.: 0-98).

## SULFOCRÈME LILESS

**Composition.** — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

**Indications.** — Seborrhée, acné et toutes les manifestations des peaux grasses et dermatoses redressables d'un traitement soufré.

**Mode d'emploi.** — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix: 18 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-12.

Laboratoires FISON et C<sup>o</sup>, S. à R. I.

VIBRAYE (Sarthe).

Agence à PARIS: 104, boulevard Poissonnière (X<sup>e</sup>).

(Tél.: Trudaine 92-52.)

## SULFOCURE

Spécifique de toute infection microbienne. Streptococcies, Staphylococcies, Colibacillooses, Pneumococcies, Gonococcies, Septicémies, Angines, Cystites, Urétrites.

**Composition.** — Comprimés dosés à 0,25 de paraminophénylsulfamide pur.

**Posologie.** — Se conformer à l'avis du médecin. Comprimés dragéifiés. Prix: 20 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 2000-4.

### Laboratoires J. FUMOUE

156, boulevard Ney — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél.: Marcadet 55-39.)

## SULFODERMOL FLAHAUT

**Composition.** — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

**Forme.** — Cachets.

**Indications.** — Eczémas, Etats séborrhéiques et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopecies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.


**Mode d'emploi.** — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas. La boîte 30 cachets.

Prix: 16 francs.

### Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél.: Gobelins 39-44.)



## SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommade.

**Doses et mode d'emploi.** — Granulé : 2 cuillères mesures 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 cgr. de soufre colloïdal. — Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires, 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

**Indications.** — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritisme. Syphilis.

**Prix :** Granulé : 18 fr. 05. — Ampoules : 20 fr. 15.

Pommade : 1/15, 2/15 ; 15 fr. 90 ; 12 fr. 75.

**Laboratoires ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

## SULFOLAX

Laxatif doux, toni-hépatique, antitoxique.

**Composition.** — Soufre de l'Ichthyol, Extraits biliaires, Artichaut, Boldo, Combretum, Evonymine verte, Cascara, Agar-Agar.

**Posologie.** — 1 ou 2 comprimés au repas du soir.

**Indications.** — Constipation, Insuffisance hépatique, Auto-intoxications et tendances toxiques, Manifestations du Neuro-Arthritisme.

**Innocuité absolue, Aucun toxique, Aucun drastique.**  
**Pas d'accoutumance.**

**Prix du flacon de 60 comprimés : 12 fr. 25.**

**Laboratoire Biologique VALTRY**

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 28-12.)

## SULFOLIVE

**Composition.** — Pommade à base d'Huile d'Olive concrétisée par catalyse et de soufre en combinaison organique avec l'Huile d'Olive.

**Propriétés et Indications.** — Spécifique du Rhumatisme et de toutes les douleurs articulaires par pénétration du soufre *in loco*. Analgésique. Indiqué également pour les dermatoses dans lesquelles la combinaison Soufre-Huile d'Olive a son application.

**Mode d'emploi.** — Le *Sulfolive* fond aussitôt au contact de la peau et pénètre par léger massage.

Grand tube. — Petit tube.

Enr. au L. N. C. n° 1679-2.

**Les Laboratoires du PUGETOL**

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.  
19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30.)

**ARNOUX-BERENQUIER, Pharmacien.**

(Voir *Boldolive, Suppolive et Dermolive.*)

## SULFOMALÉYL

Maléyl-para-amino-benzène-sulfamide calcique.

**Composition.** — Contenant 60 p. 100 environ de 1162 F. pur, le SULFOMALÉYL est de toxicité pratiquement nulle.

**Action thérapeutique.** — Toujours bien supporté, le SULFOMALÉYL permet d'employer la médication sulfamidée dans des cas où l'affection à traiter ne justifie pas l'utilisation de corps plus actifs, mais aussi plus toxiques.

**Indications.** — Celles des sulfamides en général, et particulièrement : érysipèle, angines, grippe, infections urinaires, fièvre de Malte et maladie de Nicolas-Favre, chancre mou, prévention des infections puerpérales, etc.

**Posologie.** — Variable suivant la nature de l'affection ; en moyenne :

**Adultes :** de 2 à 12 comprimés et plus par 24 heures.

**Enfants :** 6 à 14 ans, de 1 1/2 à 9 comprimés par 24 heures ;

3 à 5 ans, de 1 à 6 comprimés par 24 heures ;

au-dessous, 1/2 à 3 comprimés par 24 heures.

Ne pas associer avec une autre chimiothérapie ; séparer les prises par des intervalles de 4 heures environ.

**Prix :** 25 fr. 60 le tube de 20 comprimés de 0 gr. 50.

**Laboratoires d'Études et de Réalisations  
Pharmaceutiques de Paris « ETRÉFA »**

R. GOÛIN, J. COULET et H. LUZUY, Pharmaciens.

Administr. : 5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Ély. 41-85.)

Agence en zone libre : LÉ RAYOL (Var). (Tél. : 24.)

## SULFORGAN

**Composition.** — A base de soufre organique naturel non oxydé (18 % de soufre à l'état sulfonique).

**Avantages.** — Assimilable, non congestif, non irritant. Le SULFORGAN est parfaitement bien toléré et ne présente aucune contre-indication. Piqûres indolores, sans aucune réaction fébrile.

**Indications.** — Douleurs rhumatismales aiguës ou chroniques, lithiases hépatiques et rénales et leurs complications, maladies de la peau (eczéma, psoriasis, etc.), névrites, zona, infections intestinales, gynécologie, maladies des voies et organes respiratoires (grippe, coqueluche, broncho-pneumonie, états fébriles et toutes maladies infectieuses).

### Présentation. Posologie.

**Ampoules.** — De 2 cc. Une ampoule intramusculaire tous les 2 jours, tous les jours dans les cas aigus, 36 fr. 60 la boîte de 6.

**Pilules.** — *Adultes*: 2 à 6 par jour. *Enfants*: 1 à 2 par jour. 18 fr. 40 le tube de 60 pilules.

**Pommade.** — Sous pansement léger. 15 francs le tube de 35 gr. environ.

**Ovules.** — 1 ovule le soir au coucher. 25 fr. 30 la boîte de 6 ovules.

**Suppositoires.** — *Adultes*: 1 à 4 par jour. *Enfants*: 1 à 2 par jour, au réveil et au coucher. 22 francs la boîte de 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n°s 1279-1-2-3-8-9.

**Laboratoires du SOUFRE ORGANIQUE**

ORSAY (Seine-et-Oise). (Tél.: 00-00.)

## SULFO-RHINOL DU D<sup>r</sup> FAYÈS

Baume nasal au Soufre précipité naissant aromatisé à la teinture de benjoin.

**Indications.** — Affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx; modificateur des sécrétions nasales en particulier dans l'ozène. Préventif en cas d'épidémies.

**Propriétés.** — L'H<sup>2</sup>S naissant, qui se produit dans les voies aériennes supérieures, permet une inhalation prolongée de ces vapeurs à action bactéricide incontestable.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un pois dans chaque narine matin et soir.

**Société des Laboratoires de MONTMOROT**

G. de MONTMOROT, pharmacien

12 bis rue Keppler — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél.: Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## SULFOSALYL

Complexe médicamenteux à base de Soufre, Polysalicylates et Calcium associés à l'Opothérapie. Capsules glutinisées ne se dissolvent que dans l'intestin. Aucune irritation gastrique.

Traitement de fond total des *Rhumatismes chroniques* par modification du terrain.

**Composition.** — Pour une capsule glutinisée :

Salicylate de Sodium...	0,20	Gluconate de Calcium...	0,05
Salicylate de Potassium...	0,01	Thiosinamine.....	0,005
Salicylate de Calcium...	0,006	Poudre de Thyroïde...	0,001
Hyposulfite de Sodium...	0,10	Poudre de Parathyroïde..	0,0001

**Indications.** — Tous les Rhumatismes chroniques, Arthrites, Arthroses, Algies rhumatismales (compléter le traitement par Histalgine en piqûres intradermiques et Sulfiodé en intraveineuses). Rhumatisme Articulaire Aigu (dans les cas de Salicylo-résistance).

**Posologie.** — 8 à 12 capsules et plus par 24 heures. De préférence, pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Traitement très prolongé (plusieurs mois) dans les cas de Rhumatismes déjà évolués.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-16.

**Laboratoires de Thérapentique Antirhumatismale SAREIN**

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél.: Jasmin 00-37.)

## SULFOSINE « LEO »

Pyrétothérapie

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.

(Huile soufrée stérilisée.)

**Indications.** — Paralysie générale, Syphilis nerveuse et autres affections syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la démence précoce, la Schizophrénie, l'Encéphalite épidémique chronique, etc...

**Forme.** — Deux dosages :

1<sup>o</sup> Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre.

2<sup>o</sup> Fort : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 de soufre.

Deux séries : 1<sup>o</sup> Une boîte de 10 ampoules de 10 cc. 2<sup>o</sup> Une boîte de 10 ampoules assorties : 2 de 1 cc.; 3 de 5 cc.; 5 de 10 cc.

**Sulfosine anesthésique** à 1 et 2 p. 100 et comme ci-dessus.

**Mode d'emploi.** — En injections intramusculaires profondes.

**Posologie.** — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier traitement est de 1 à 2 cc.; on augmente ordinairement chaque dose de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc. La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc.

Nous pouvons assurer une livraison régulière de ce produit.

Valentin AAGE MOLLER

57, rue Pierre-Duham, — BORDEAUX. (Tél.: 807-85).

Dépôt pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien, 39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

## SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfite de Soude agréable au goût, granulé

**1° Affections des voies respiratoires (Subaiguës ou chroniques)**  
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Ozène, adénites et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites traitantes. Trachéobronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectations tenaces (la Sulfo-Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermique par les eaux sulfureuses; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

**2° Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :**

Accidents anaphylactiques, acné, eczéma, urticaire, etc.

Léxatif léger. — Désinfectant sûr.

**3° Maladies par ralentissement de la nutrition.**

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc...

**4° Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or, de mercure, de bismuth, d'arsenic.**

Renforce leur action. — Empêche les phénomènes d'intoxication.

### Posologie

**Adultes :** 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

**Enfants :** 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

**Deux formes. —** Comprimés et Granulés (2 comp. = 1 cuil. à café).

**Prix. —** Granulés : 17 fr. 15; Comprimés : 16 fr. 75.

**Laboratoire de la Sulfo-Thiorine**

39, rue Fondaudege — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

## SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

**Propriétés. —** Médication sulfureuse active, régulière, pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

**Quatre formes. — a. Pastilles ; b. Granulé :** composition stable, saveur très agréable, aucun goût sulfureux lors de l'ingestion. **c. Comprimés inhalants :** très fort dégagement sulfureux instantané ; **d. Ampoules buvables :** 1 ampoule permet d'obtenir immédiatement 1 litre d'eau sulfureuse synthétique, très économique.

**Indications. —** Infections du rhino-pharynx. Toutes infections catarrhales, traînantes, rebelles et récidivantes des voies respiratoires. Toutes affections traitées par les médicaments Arsenicaux, Bismuthiques, Mercurielles, etc. (accroît leur tolérance et débloque les réserves toxiques accumulées par l'organisme).

### Posologie :

**Pastilles. —** États aigus : 4 à 10 par jour ; États chroniques : 2 à 5 par jour. **Enfants :** 1 à 5 par jour.

**Granulé. —** 4 à 9 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

**Inhalant. —** 1 à 3 comprimés dans un verre d'eau.

**Ampoule. —** Diluer 1 ampoule dans un litre d'eau : en prendre 1/2 verre matin et soir.

**Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).**

## SULFUR CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

**Composition. —** Soufre colloïdal..... 0 gr. 10  
Pour une ampoule de 10 cc.  
3 ampoules dans une boîte.

**Posologie. —** Agiter légèrement; puis diluer l'ampoule dans 250 cc. d'eau potable (1/4 de litre). Prendre de la dilution des cuillerées à bouche, soit pures, soit dans un peu d'eau.

*Vous pouvez prescrire :*

« Diluer selon le mode d'emploi marqué sur la boîte.

« **LA DILUTION,** prendre N cuillerées à bouche par jour. La posologie habituelle est de 1 à 2 cuillerées à soupe au lever. Même dose au coucher. La dilution sera employée dans la semaine.

**Propriétés. Eta colloïdal certain. —** Activité accrue sans les inconvénients du soufre. Aucune irritation intestinale. Aucune mauvaise odeur. Aucun mauvais goût.

**Modificateur de terrain,** il combat les multiples états pathologiques de l'arthritisme (d'où son étymologie). Il prépare la cure de Dax et en prolonge les effets; mais il ne provient ni des eaux ni des boues de Dax.

**Désintoxicant,** il repose l'organisme des médications antérieures.

**Indications : particulièrement lumbagos et sciaticues,** tous les rhumatismes. — **Voies respiratoires supérieures :** Laryngites (résultats audibles et appréciés dans les 12 heures). Bronchites emphysémateuses. Catarrhes.

La dilution peut être employée pour 3 ou 4 inhalations.

Dermatoses : eczéma, acnés, gales.

Intoxications (saturnisme, intoxicés par AS ou BI).

Spécialité léguée enregistrée au L. N. C. n° 336-2.

**Laboratoire MORELLET.**

J. MORELLET, Docteur en Pharmacie

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

8, place de la Gare — PIERREFITTE (Seine).

## SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

### MÉDICATION SULFUREUSE A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie aux Arts et Métiers à Paris.

**Mode d'action.** — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant.

**Indications thérapeutiques.** — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, **Extinctions de voix**, Fatigue des cordes vocales, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales et en lavements contre les oxyures.

L'effet désensibilisateur et curatif est certain dans l'Eczéma, l'Acné et toutes les affections de la peau. L'emploi simultané de la boisson et du bain sulfureux prévient et guérit les intoxications par métaux lourds (Hg, Bismuth, Plomb, Or, etc.).

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson, en bains et en comprimés inhalants. Il est des plus efficaces en inhalations et pulvérisations.

#### Mode d'emploi :

- 1° *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.
- 2° *Pour oxyures* : 5 jours de suite un lavement de un verre d'eau tiède avec une mesure de poudre sulfureuse ; à garder quelques minutes. Répéter 3 séries de 5 jours avec intervalles de 8 à 10 jours.
- 3° *Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.
- 4° *Pour pulvérisations* : se servir d'un pulvérisateur pour solutions aqueuses.
- 5° *Pour prévenir ou guérir l'intoxication par les métaux lourds* : Hg, Bis, Or, Pb : un verre d'eau sulfureuse le matin ou matin et soir. Bains sulfureux.

### SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix et durée moyenne :

Boisson : 17 francs, 20 jours. — Bain : 8 fr. 50.

Comprimés inhalants : 17 fr. 50, 15 jours.

### Laboratoire POMPANON

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

(Tél. : Trudaine 95-69.)

## SULFURION

**Description.** — Complexe colloïdal isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

**Indications.** — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Prix : 40 fr. 30 pour 8 à 12 jours de traitement.

### Laboratoires Ch. COUTURIER

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

## SULFURYL MONAL

**Médication Sulfureuse. — 2 Usages, 5 Formes.**

**Cinq formes. —** Pastilles, Granulé, Comprimés inhalants, Bain inodore, Savon.

**Usage interne. —** Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

**Usage externe. —** Comprimés inhalants pour gar-garismes, inhalations, pulvérisations, irrigations, lavages, humages, insufflations tubaires gazeuses. Bain tonique inodore; Savon, soins de la peau dermatoses.

**Composition. —** Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

**Propriétés. —** Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges. Permet d'instituer d'une façon active partout, et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

**Indications. —** Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Gale, Etats infectieux et post-infectieux.

**Doses. — Usage interne. — Pastilles:** croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour.

**Granulé:** croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour (forme recommandée pour les enfants).

**Usage externe. — Comprimés inhalants:** mettre un comprimé dans un verre d'eau tiède; dès que le dégagement commence, utiliser le liquide qui est alors chargé de H<sup>2</sup>S naissant.

**Bains:** deux plaquettes pour bains (adulte) et une plaquette bains (enfant).

**Traitement de la gale:** faire d'abord un savonnage au savon Sulfuryl, en frottant énergiquement les régions malades. Prendre ensuite un grand bain au Sulfuryl Monal. Répéter ce traitement 48 heures après si nécessaire.

**Savon:** pour la toilette des peaux délicates.

<b>Prix:</b> Pastilles. Le tube.....	18 fr. 70
Granulé. La boîte .....	18 fr. 70
Comprimés inhalants. Le flacon.	18 fr. 70
Bain (sans odeur). La boîte....	8 fr. 20
Savon. Le pain.....	8 fr. 20

### Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 52-73.)

## SULSOD

Désinfection intestinale par osmose. Carence soufrée. **Comprimés** renfermant 0,44 de SO<sup>4</sup>Na<sup>+</sup> anhydre pur.

**Indications. —** Toutes maladies de l'appareil digestif, et conséquences : constipation, entérite, diarrhée, infections intestinales, aérophagie, affections cutanées. Adjuvant dans le traitement des affections hépatiques, biliaires, rénales, colibacillose, pyélo-néphrites.

**Action. —** Soluble très lentement dans l'intestin, détruisant les bactéries par plasmolyse. Absence de toxicité.

**Emploi. —** Généralement associé au LEPTAB à raison de 5 Sulsod et 1 Leptab à la fin des repas. On peut augmenter les doses si nécessaire.

**Présentation. —** 2 modèles, sous boîtes métalliques :  
11 francs (8 jours) ; 31 fr. 30 (1 mois).  
Enregistré au L. N. C. sous n° 1039-4.

### Laboratoires A. V. E.

81, quai Valmy — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 69-01.)

## SUNALCOL

Solution alcool-acétonique

à 2 p. 100 de Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine.

**Propriétés. —** Puissant antiseptique, stimule dépouvre de toute toxicité et de causticité. Très pénétrant, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

Supplante la Teinture d'Iode dans tous ses emplois antiseptiques et antimycosiques.

**Indications. —** Asepsie du champ opératoire. Désinfection des plaies traumatiques. Traitement des dermites microbiennes, des mycoses, des levurides.

**Stomatologie. —** Tous les usages de la teinture d'iode comme antiseptique et désodorisant.

**Mode d'emploi. —** S'emploie à l'état pur, seulement en applications externes (badigeonnages).

### Présentation :

**Forme normale. —** Non colorée, ne tache pas.

**Forme chirurgicale. —** Colorée, pour la désinfection des champs opératoires.

Flacons de 25 cc., 125 cc., 500 cc.

### Marque R. A. L.

Produits spécialisés des E<sup>ts</sup> KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Service commercial : 15, rue de La Baume — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Elysées 99-51.)

## SUNOXIDON

### Composition :

Salicylate d'oxyquinoléine.....	0 gr. 110
6-Méthyl-5-Sulfo-8-Oxyquinoléine.....	0 gr. 035
5-Sulfo-8-Oxyquinoléine.....	0 gr. 130
Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone.....	0 gr. 160
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 065

pour 4 cachets.

**Propriétés.** — Action calmante et antithermique de la diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone (Pyramidon) associée aux propriétés antiseptiques et anti-infectieuses de l'oxyquinoléine et de l'acide salicylique, sans phénomènes secondaires (sueurs, malaises).

**Indications.** — Élévations thermiques quelle qu'en soit la cause. Algies de toutes natures (névralgies intercostales, douleurs articulaires, algies viscérales et génitales en particulier). Gripes. Angines. Le *Sunoxidon* est particulièrement indiqué comme antithermique et antialgique chez les tuberculeux.

**Mode d'emploi.** — Dose usuelle (adultes) : 2 à 3 cachets par jour (espacés dans la journée). On peut prescrire jusqu'à 4 ou 5 cachets, mais seulement en cas de nécessité.

En cas de cures régulières, interrompre ces cures de périodes d'arrêt de 10 jours par mois.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des **É<sup>e</sup> KUHLMANN**

**S. THIERY**, Pharmacien, 19, rue Franklin. — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Service commercial : 15, rue de La Baume. — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 99-51.)

## SUPAMIDE

### Suppositoires anti-infectieux.

**Composition.** — Sulfamide, 0 gr. 40; Hexaméthylène-tétramine, 0 gr. 20.

**Préventifs** des affections post-opératoires, Chirurgie, Gynécologie, Oto-rhino, Accouchements, etc.

**Curatifs** de toutes les affections microbiennes recelant : strepto, staphylo, pneumo, coli, typhiques, gonos, etc.

### Doses :

**Bébés** : 1/2 à 1 suppositoire par jour.

**Enfants** : 1 à 2 suppositoires par jour.

**Adultes** : 2 à 6 suppositoires par jour.

Très pratiques pour les malades difficiles ou intolérants et pour les enfants.

Existe également en **COMPRIMÉS**

(mêmes dosages).

Laboratoire Coudert

19, avenue Payret-Dortail — Plessis-Robinsons.

et

Laboratoire **G. FERMÉ**

22, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**Z. N. O. : PETRIER**, 30, rue Créqui — LYON.

## SUNOXOL

### Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine.

**Propriétés.** — Antiseptique pour usage externe, non caustique, non irritant. Ne coagule pas les albumines, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

**Indications.** — Antisepsie en dermatologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie, gynécologie, obstétrique.

### Présentation et mode d'emploi.

#### I. Comprimés de Sunoxol à 0 gr. 50.

1 comprimé à 0,50 dans 1 litre d'eau (0,5 p. 1.000) : Asepsie générale, soins intimes.

2 comprimés à 0,50 dans 1 litre d'eau (1 p. 1.000) : Irrigations rhino-pharyngiennes. Lavages des plaies complexes. Injections vaginales. Gargarismes (voir aussi ci-dessous).

2 comprimés à 0,50 dans 100 cc. d'eau (1 p. 100) en lotions, badigeonnages.

Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50.

#### II. Comprimés de Sunoxol à 5 centigrammes pour Bains de bouche.

Sunoxol ..... 5 centigr.

Excipient aromatisé. Q. S. .... P. 1 comprimé.

1 à 2 comprimés par verre d'eau pour bains de bouche et gargarismes.

Flacon de 25 comprimés à 5 centigrammes.

#### III. Ovules au Sunoxol à 0 gr. 20 par ovule.

Boîte de 6 ovules.

#### IV. Pommade au Sunoxol à 1 p. 100.

Impétigo, eczéma, intertrigo, prurits, brûlures, engelures, hémorroïdes.

#### V. Pansements au Sunoxol sur adhésif.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des **É<sup>e</sup> KUHLMANN**

**S. THIERY**, Pharm., 19, r. Franklin—PARIS (16<sup>e</sup>)

Service commercial :

15, rue de La Baume — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élys. 99-51.)

## SUPPABAÏNE

Ouabaïne rectale.

**Composition.** — Ouabaïne pure, un demi-milligramme. Phényléthylmalonylurée et belladone à petites doses.

**Forme.** — Petits suppositoires faits d'un excipient très déliquescent.

**Propriétés.** — Cardiotonique puissant et antidyspnéique.

**Avantages.** — Facilité d'emploi, très grande activité (Thèses de Paris 1922, 1937 et nombreux essais), moins brutale que la voie intraveineuse, absorption en 20 minutes.

**Indications.** — Toutes défaillances cardiaques, affections pulmonaires aiguës s'accompagnant d'une défaillance du myocarde (pneumonie, broncho-pneumonie, asthme, etc...). Maladies douloureuses syncopales (coliques hépatiques, néphrétiques).

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 par jour. Dans certains cas, deux suppositoires à quelques instants d'intervalle.

**Prix :** 20 fr. 75 la boîte de 8.

Laboratoires **RENAUD**

Ed. **RENAUD**,

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie  
2, place de la Duchesse-Anne  
**NANTES** (Loire-Inférieure). Téléphone 112-17.

## SUPPARGYRES

du Docteur **FAUCHER**

**Traitement de la Syphilis** acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grosse, fatigue, voyage, etc.).

**Forme.** — Adultes. — Suppositoires à 0 cgr. 04 de Hg vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons : 0 cgr. 01 et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0 cgr. 02.

**Dose.** — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours. repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

**Nota.** — Hg vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instables. Le seul anti-syphilitique indiscutable et indiscuté. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg actif. On mélange à une solution d'arséno-benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE** les tréponèmes sont foudroyés. Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hépatogènes. (Expériences de Levaditi.)

Prix, Taxe d'état comprise :

Adultes : 19 fr. 70. — Enfants : 16 fr. 90. — Nourrissons : 16 fr. 90.

Laboratoires du Docteur **TISSOT**

C. **COMBE**, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — **PARIS**. (Tél. : Mont. 01-91.)

## SUPPOALGOS

**Composition :**

Extrait de belladone .....	0,015
Extrait de jusquiame .....	0,025
Extrait de piscidia .....	0,025
Pyramidon .....	0,30
Citrophénétidine .....	0,50
Chlorhydrate d'éthyl morphine...	0,03
Beurre de cacao .....	Q. S. pour 3 gr.

**Actions thérapeutiques.** — Spécifique de l'élément douleur. Antispasmodique, Hypnotique, Analgésique, Sédatif, Antithermique.

**Indications.** — Névralgies, Douleurs tabétiques, rhumatismales et utérines. Spécifique des règles douloureuses, Accès d'asthme et d'emphysème, Coliques intestinales, Néphrétiques, Hépatiques, Anglès, Otites, Mastoïdites, Hémorroïdes, Prostatites, Insomnie causée par la douleur.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6 : 17 francs (Impôt compris).

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoires **LAGOUTTE**

85, cours Albert-Thoma. — **LYON**

(Tél. : Moncey 14-35.)

## SUPPO-DOLANTINE

Nom, déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Chlorhydrate de l'ester éthylique de l'acide 1-méthyl-4-phényl-pipéridine-4-carbonique.

**Propriétés et indications.** — Spasmodique et analgésique de synthèse. Succédané de l'atropine et des alcaloïdes de l'opium. Ne figure pas au tableau B, ne crée pas d'accoutumance.

Spasmes du tractus gastro-intestinal, des voies biliaires et urinaires, spasmes vasculaires. Affections gynécologiques. En obstétrique : douleurs de l'accouchement, rigidité et spasmes du col, contractions utérines. Douleurs post-opératoires. Toutes algies.

**Posologie.** — Un suppositoire, plusieurs fois par jour si besoin. Sortir le suppositoire de son enveloppe et le mouiller légèrement avant de l'introduire.

**Présentation.** — Boîte de 5 suppositoires à 0 gr. 10.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — **PARIS** (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)



## SUPPOGLANDINES

Suppriment les piqures et leurs ennuis.

Traitement des déficiences glandulaires par **suppositoires d'extraits d'organes frais** et de **lécithine** (0 gr. 50 par suppositoire) qui tonifie le système nerveux et régularise l'assimilation.

Nos dosages sont en organes frais et non en poudres.

Les boîtes sont de 10 suppositoires : Un au coucher.

Nous exécutons toutes formules sur prescription, avec lobe antérieur, corps jaune, folliculine, mamelle, moelle, rate, etc.

### Formule

1	Ovaire frais..... 1 gr. Lécithine végétale .... 0,50	Insuffisance ovarienne; Ménopause; Ovariectomie.
2	Surrénale fraîche..... 0,25 Testicules frais..... 0,50 Lécithine végétale..... 0,50	Déf. sexuelle, surmenage Toutes psycho-asthénies
4	Testicules frais..... 2 gr. Prostate fraîche..... 0,20 Gl. Interstitielle fraîche. 0,30 Hypophyse fraîche..... 0,20 Yohimb et Nucléin. Mn. 0,001 Lécithine végétale..... 0,50	Impuissance Prostatisme Neurasthénie sexuelle Sénilité précoce
5	Hypophyse fraîche..... 0,25 Thyroïde fraîche..... 0,05 Ovaire frais..... 0,70 Lécithine végétale..... 0,50	Troubles interglandulaires et adipo-génitaux
5	Hypophyse fraîche..... 0,25 Thyroïde fraîche..... 0,05 Testicule frais..... 0,70 Lécithine végétale..... 0,50	Insuffisances orchitiques, obésité, déséquilibre ménopausique
6	Cortico-surrénale fraîche, 0,50 Lécithine végétale..... 0,50	Hypotension, Interv. chirurg.
7	Parathyroïde fraîche.... 0,02 Lécithine végétale..... 0,50	Trouble du Métabolisme calcique, etc.

A	Thyroïde fraîche..... 0,01 Hypophyse fraîche..... 0,10 Surrénale fraîche..... 0,05 Ext. belladone..... 0,01 Ext. Lobelia..... 0,01 Ext. Euphorbia..... 0,04 Chl. Ephédrine..... 0,08 Iodure caféine..... 0,10 Lécithine végétale..... 0,50	Asthme 1 à 2 suppositoires par jour
---	--	--

## SUPPOGLANDINES INFANTILES

J F	Ovaire frais..... 0,20 Hypophyse fraîche..... 0,10 Surrénale fraîche..... 0,10 Lécithine végétale..... 0,25 Caséinates de cuivre + fer aa..... 0,001 Nucléinate de Mn..... 0,001	Troubles et retard de la puberté et de la croissance Insuff. glandul. des fillettes Troubles adipo-génitaux Instabilité et nervosisme
J G	Testicule frais..... 0,15 Hypophyse fraîche..... 0,10 Surrénale fraîche..... 0,10 Lécithine, Caséinate, Nucléinate (Voir J. F.)	Troubles de la puberté des jeunes garçons Adynamie des fillettes Troubles adipo-génitaux Enurésie. Inattention scolaire des nerveux
R I	Thyroïde fraîche..... 0,01 Parathyroïde fraîche... 0,01 Thymus frais..... 2 gr. Hypophyse fraîche..... 0,10 Lécithine, Caséinates. Nucléinate (Voir J. F.)	Retard de développement physique et psychique Cryptorchidie, Ectopie Enurésie, Crétinisme Rachitisme infantile Inattention scolaire des apathiques
As. I	Thyroïde fraîche..... 5 mg Hypophyse fraîche..... 0,10 Surrénale fraîche..... 0,05 Iodure caféine..... 0,02 Chl. éphédrine..... 0,01 Ext. belladone..... 0,002 — lobélie..... 0,007 — Euphorbe..... 0,005 Lécithine végétale..... 0,25	Asthme infantile. Coqueluche. 1/2 à 2 par jour

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS. (Tél. : Trudaine : 45-18.)

## SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

**Forme.** — Suppositoires.

**Composition.** — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénécon, beurre de cacao.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

**Mode d'emploi.** — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un Suppo-Gynal. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

**En raison de leur faible teneur en morphine, les Suppo-Gynals ne font pas partie du tableau B.**

**Prix.** — La boîte de 6 : 19 fr. 90.  
La boîte de 3 : 10 fr. 60.

### Laboratoires LEES

Directeur : **Docteur Pierre ROLLAND**

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).  
(Tél. : Odéon 22-01.)

## SUPPOLIVE

**Composition.** — Le *Suppolive* en suppositoire de 4 grammes n'est que de l'huile d'olive neutre extra-pure solidifiée et saturée par procédé catalytique des *Laboratoires du Pugetol* (Oléostat : nom déposé). Il ne renferme ni glycérine, ni gélatine, ni beurre de cacao.

**Propriétés.** — Réalise le lavement d'huile d'Olive Vierge adoucissant et riche en vitamines. — Pansement intestinal.

**Indications.** — Colites, constipation chronique, amibiase, rectocolites, hémorroïdes, stase intestinale.

**Forme Belladonée :** 1 suppositoire de 4 grammes contient :

Huile d'Olive hydrogénée (Oléostat).....	3 gr. 97
Extrait de Belladone .....	0 gr. 01
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 02
Total .....	4 gr.

### Antispasmodique.

**Dose :** 1 ou 2 suppositoires le soir ou un suppositoire au coucher et un autre le lendemain matin.

Boîte de 12 suppositoires *adultes*. Boîte de 12 suppositoires *enfants*.  
Enregistré au L. N. C. sous le n° 1679.

### Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'huile d'Olive.  
19, rue de Pontevès — MARSEILLE (Tél. C. 71-30).

**ARNOUX-BERENGUET, Pharmacien.**  
(Voir *Boldolive*, *Dermolive* et *Sulfolive*.)

## SUPPONÉRYL

### Composition.

Butyl-éthyl-malonylurée (« Sonéryl », nom déposé). Ogr,20  
Camphre..... Ogr,10  
Beurre de cacao Q. S. P. un suppositoire.

**Présentation.** — Boîte de 10 suppositoires.

**Propriétés.** — Hypnotique, analgésique, calmant, sans aucune action dépressive.

**Indications.** — *Toutes les insomnies* : des vieillards, des anxieux, des maladies fébriles, toutes les insomnies nerveuses tenaces, provoquées ou entretenues par la douleur (suite d'interventions).

*Hypotalgésie opératoire et obstétricale.*

**N. B.** — Le *Supponéryl* ne contenant aucun alcaloïde (morphine ou autre) peut être administré en toute sécurité après les opérations abdominales.

**Posologie.** — *Adultes* : Un ou deux *Supponéryl* par 24 heures. *Enfants* : de 7 à 12 ans, un demi-*Supponéryl* et un entier à partir de 12 ans.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).  
(Tél. : Ségur 13-10.)

## SUPPO-SALYRGANE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Salicyl-allylamide-O-acétate de sodium et théophylline.

**Propriétés et Indications.** — Diurétique mercuriel de faible toxicité et d'effets constants. Soutient l'action des toni-cardiaques.

**Œdèmes, Anasarque, Oligurie des cardio-rénaux, Ascite, Épanchements pleuraux.** Contre-indiqué dans les Glomérulo-néphrites, la Néphrosclérose grave et la Cachexie prononcée.

**Posologie.** — 1 à 3 suppositoires par semaine. Sortir le suppositoire de son enveloppe et le mouiller légèrement avant de l'introduire.

**Présentation.** — Boîte de 5 suppositoires à 0 gr. 40.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## SUPPO-SÉDOL

### Composition :

Chlorhydrate de morphine .....	0 gr. 006
Bromhydrate de scopolamine.....	0 gr. 0002
Spartéine.....	0 gr. 02
Beurre de cacao.....	Q. S. pour 1 suppositoires.

**Présentation.** — Boîte de 10 suppositoires.

**Indications.** — Elles sont identiques à celles du SÉDOL (Voir à cette rubrique) : sédation de la douleur intense, pré-anesthésie et suites opératoires, accouchement.

Les SUPPO-SÉDOL sont, toutefois, plus particulièrement indiqués dans toutes les affections douloureuses des organes du bassin (affections gynécologiques, règles douloureuses, prostatites, cystites, hémorroïdes, rectites), dans les menaces d'avortement, dans le mal de mer.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

*Enfants* (2 à 12 ans) : de 1/3 à 1 suppositoire, suivant l'âge.

*N. B.* — Le SUPPO-SÉDOL ne fait pas partie du tableau B.

### Société Générale d'Applications Thérapeutiques

#### THERAPILIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII\*).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## SUPPOSITOIRES AMIBIASINE

Extrait mou de Garcinia Mangostana .... 0 gr. 0996

Extrait mou de Simarouba..... 0 gr. 0498

Beurre de Cacao ..... Q. S. P. 2 gr.

**Propriétés.** — Calmant du ténésme, du prurit anal, décongestionnant, désinfectant, cicatrisant de la muqueuse ano-rectale, vermicide, anti-helminthique. Non toxique.

**Indications.** — Toutes affections d'origine parasitaire (amibes, lamblas, trichomonas, etc.), oxyures, ascaris, trichocéphales, prurit anal, ténésme rectal, rectites de toutes natures et origines.

### Posologie :

*Adultes* : Un suppositoire chaque soir en se couchant. Série de 10 suppositoires. *Enfants* : Un suppositoire tous les deux jours.

Première série de 5 suppositoires, repos 10 jours.

Deuxième série de 5 suppositoires, un tous les 2 jours.

**Administration.** — Mouiller légèrement le suppositoire et l'introduire le plus profondément possible.

**Remarque.** — La sensation de chaleur ou de fourmillement éprouvée parfois tient à l'action des principes actifs sur une muqueuse altérée. Ne pas s'en inquiéter.

Prix de la boîte de 10 suppositoires : 18 fr. 30.

(Taxe d'armement comprise.)

### Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII\*). (Tél. : Dorian 75-52)

## SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

### Anesthésie superficielle par contact.

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide de la douleur; anti-sepsie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Règles douloureuses, etc.

**Posologie.** — Délai nécessaire à l'action du suppositoire : 1/2 heure environ. Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*. Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutile, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

Prix : 20 fr. 70 la boîte de 12 suppositoires.

L. N. C. 581-3.

### Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII\*).

(Tél. : Ségur 96-46.)

## SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

**Composition.** — A base d'Arsénobenzol.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

**Présentation.** — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.

Prix : 22 fr. 40.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 id.

Prix : 20 fr. 10.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.

Prix : 19 francs.

### Laboratoire CORBIÈRE

et Pansements brevetés CORBIÈRE S. A.

27, rue Desrenaudes — PARIS. — (Tél. : Carnot 78-11.)

## SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

**Adultes. Enfants. Nourrissons.**

Imprégnation créosotée par voie rectale.

**Propriétés.** — Antithermiques, bactéricides (pneumocoques), vermifuges (oxyures).

**Composition.** — *Adultes* : Créosote, 0,25 ; eucalyptol et camphre, aa 0,05 ; stovaine, 0,005 pour 1 suppositoire.

*Enfants* : Le tiers environ de ces doses.

*Nourrissons* : Le quart, mais sans stovaine.

**Indications.** — Affections pulmonaires aiguës ou chroniques, Gripes, Bronchites, Infections à pneumocoques.

**Emploi.** — Un suppositoire matin et soir ou plus.

*La fabrication des suppositoires  
de Camphocalyptol-Quinine est suspendue.*

**Prix** : La boîte, 21 francs.

**Laboratoire ECHEMAN**

26, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE

**Antiseptique pulmonaire,  
Antithermique, Anti-infectieux.**

**Composition.** — Eucalyptol, acide phénique neige, camphre, gaïacol, larocaïne.

**Avantages.** — Remplacent l'injection lorsqu'elle est impossible (notamment chez l'enfant) : éloignement, pusillanimité du malade, etc.

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 4 suppositoires par jour.

*Enfants* : 1 à 4 suppositoires par jour.

*Nourrissons* : 1 à 4 suppositoires par jour.

**Indications.** — Celles de l'*Eucalyptine*, c'est-à-dire les affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires. Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchite, Dilatation des bronches, Gangrène pulmonaire, Abcès du poulmon, Coqueluche, certaines formes de tuberculose, Maladies infectieuses.

### Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 71-33.)

# SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

## 2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit, 0,015 Hg. métal.

**Originalité.** — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très bien tolérés, ne causant ni ténesme, ni diarrhées, ni coliques.

**Présentation dissimulée.** — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

**Posologie.** — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

**Prescription.** — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

**Laboratoires A. DUTEIL**

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

# SUPPOSITOIRES LOGEAI

## Composition:

Marron d'Inde.....	0,04
Genêt .....	0,01
Cupressus.....	0,01
Jusquiame .....	0,012
Teskra .....	0,012
Lanoline anhydre.....	0,015
Extrait total d'hamamelis.....	0,33
Sulfochtyolate de soude.....	0,33

Pour 1 suppositoire.

**Indications.** — Hémorroïdes internes et rectites. Prostatites.

## Propriétés :

**ATOXQUES** : Ni stupéfiant, ni adrénaline.  
**ANALGESIQUES** : Décongestion rapide et durable de la médianeuse.

**ASTRINGENTS** : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.  
**ANTISEPTIQUES** : Action antiseptique de l'huile sulfatée sur la muqueuse rectale.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 suppositoires dans le courant de la journée après onction savonneuse locale.

Prix au public : 17 fr. 20.

**Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI**  
22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : Molitor 39-50.)

# SUPPOSITOIRES MICTASOL

Réalisent la décongestion pelvienne et la sédation rapide des symptômes douloureux du petit bassin subjectifs et fonctionnels.

## Composition :

Malva purpurea, ichtyol, stovaïne, extrait de jusquiame.

**Indications thérapeutiques.** — Prostatisme, congestions utéro-ovariennes, cystites, séquelles de blennorragie, rétentions, incontinence, hémorroïdes.

**Posologie.** — 1 ou 2 par jour.

**Laboratoire du MICTASOL**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI\*).

(Tél. : Kléber 71-33.)

# SUPPOSITOIRES MIDY

## (Adréno-styptiques.)

Adrénaline .....	0 gr. 00015
Stovaïne .....	0 gr. 025
Anesthésine .....	0 gr. 025
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé .....	0 gr. 05
Extrait d'Hamamelis.....	0 gr. 01

Pour un suppositoire.

**Dose et mode d'emploi.** — Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin 1 heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

**N. B.** — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Prix : 18 fr. 40.

Durée du traitement : une semaine.

**Laboratoires MIDY**

67, avenue de Wagram, PARIS (XVII\*<sup>e</sup>).  
(Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées.)

## SUPPOSITOIRES PACHAUT

Huile de Palma Christi, Glycérine,  
Beurre de Cacao.

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

### Présentation :

1° Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.

2° Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1796-1.

### Laboratoires THOMAS

2, rue Sainte-Cécile — 31, faubourg Poissonnière

PARIS (IX<sup>e</sup>)

(Tél. : Provence 49-77.)

## SUPPOSITOIRES PAUTAUBERGE

**Composition.** — Chaque suppositoire contient :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Créosote de hêtre.....	0 gr. 40	0 gr. 125
Para-Amino-benzoate butylique.....	0 gr. 01	Néant.
Camphre du Japon.....	0 gr. 025	0 gr. 01
Gluconate de Calcium.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Excipient au beurre de cacao.....	Q. S.	Q. S.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique puissant et antithermique par sa créosote, reminéralisateur par son gluconate de calcium.

**Indications.** — Affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques de l'enfant et de l'adulte.

Action curative spécifique dans les affections à pneumocoques.

Action préventive des complications pleuro-pulmonaires de la grippe et des complications pulmonaires post-opératoires.

**Posologie.** — *Adultes* : un suppositoire matin et soir.

*Enfants* à partir de 2 ans : un suppositoire d'enfant matin et soir.

*Nourrissons* : 1/2 suppositoire d'enfant le soir.

Prix de la boîte : *Adultes*, 19 fr. 80. — *Enfants* : 17 fr. 40.  
(5 jours de traitement.)

### Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS. (Tél. : Laborde 26-47.)

## SUPPOSITOIRES PELVINAL

Toutes algies pelviennes.

### Composition :

Onguent napolitain.....	0,05
Extrait thébaïque.....	0,02
— de belladone.....	0,01
— de jusquiame.....	0,01

pour un suppositoire.

Triple action rapide, *loco dolenti*. Sédatif, décongestif, antiseptique.

### Indications :

Métrites, Salpingites, Congestion utéro-ovarienne, Cellulites diffuses, Règles douloureuses, Suites de couches, Prostatites, Cystites, Urétrites postérieures, ténésme, etc.

Prix : 13 fr. 30.

### Laboratoire FOSSET

MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

(Tél. : 11.)

## SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)  
pour Bébés, pour Garçonnetts,  
pour Adultes.

## CONSTIPATION. HÉMORROÏDES

La boîte : 20 francs.

La 1/2 boîte : 11 fr. 90.

### Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire.

PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

## SUPPOS LEMARY

**Adultes :** Boîtes de 10 suppos Hg double, 0,04 par suppos.

**Enfants :** Boîtes de 12 suppos Hg double, 0,02 par suppos.

**Nourrissons :** Boîtes de 12 suppos Hg double, 0,01 par suppos.

Un suppositoire chaque jour en se couchant.

**Prix :** 17 fr. 30.

Les suppositoires sont présentés sous double enveloppe de Rhodembal, antiseptie parfaite, étiquette discrète : reconstituants, dépuratifs, toniques.

Autres produits Lémery : **Cartouches Lémery, Ampoules Lémery à 3 dosages.**

Cy-Hg, 0,01 pour 1 cc. de solution stérilisée ;

Cy-Hg, 0,01 pour 2 cc. de solution stérilisée ;

Cy-Hg, 0,01 pour 3 cc. de solution stérilisée.

**Pilules Lémery (Voir Pilules Lémery).**

**Produits du Dr Henri PHILIPPE**

36, quai Fulchiron — LYON.

## SUPPOS SÉDABIOS

**Présentation.** — En boîtes de 3. (11 fr. 15).  
et en boîtes de 10 suppositoires (33 fr. 40).

**Principes actifs.** — Même composition que le SÉDABIOS, mais à doses diminuées.

**Indications.** — Toutes les indications du SÉDABIOS : Préanesthésie et suites opératoires, Affections douloureuses, Prostatite, Cystite, Hémorroïdes, Rétention et affections gynécologiques.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 supposit. par jour.  
Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-50.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

## SUPPOVITA

**Suppositoires à la Vitamine A**

**Composition.** — *Adultes :* 5 000 U. I. Vitamine A par suppositoire. — *Enfants :* 3 000 U. I. Vitamine A ; 1 000 U. I. Vitamine D par suppositoire.

**Propriétés.** — Permet l'assimilation parfaite de la vitamine introduite.

Supprime la perte de Vitamine A et les inconvénients dus à l'administration par voie buccale et par voie intramusculaire.

Remplace l'ingestion d'huile de foie de morue ou d'une huile analogue.

**Principales indications.** — États de dénutrition. Troubles de la croissance. Convalescences. Régénération tissulaire. Affections ulcéreuses du tube digestif. États infectieux. Hyperthyroïdie. Xérophtalmie. Affections des voies respiratoires.

**Posologie.** — Un à deux suppositoires par 24 heures.

**Prix :** La boîte de 10 (*Adultes*) : 34 fr. 50.

La boîte de 12 (*Enfants*) : 34 fr. 50.

**Laboratoires du SUPPOVITA**

260, boulevard Saint-Germain — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Service commercial : 7, rue Frédéric-Sauton — PARIS (V<sup>e</sup>).

## SUPRARHINOL

**Composition.** — Association de **Bornéosol** (solution aqueuse de Camphre de Bornéo) et de **Solhy-sop** (solution aqueuse d'*Hyssopus officinalis*) avec addition de Chlorhydrate d'Éphédrine à très faible dose (0,25 %).

**Action.** — Désinfection des voies respiratoires.

**Avantages :**

Dispersion rapide du pouvoir antiseptique des essences, grâce à leur présentation en solution aqueuse.

**Indications.** — Toutes les affections rhino-pharyngées (coryza et coryza spasmodique, rhume des foins, laryngites, trachéites, sinusites, etc.).

**Présentation et prix :**

Gouttes. Flacon de 30 cc. .... 28 fr. 70

**Laboratoires du BORNÉOSOL**

DEROME-PINAUD, Pharmacien,

143 bis, rue Ordener — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 07-76.)

## SUPRASTHÉNYL

(Élixir)

Arséniate de soude.....	0 gr. 0025
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 0015
Sulfogalcolate de potasse.....	0 gr. 50
Lactophosphate de chaux.....	0 gr. 75
Excipient aromatisé.....	Q. S.

Pour une cuillerée à soupe d'Élixir.

**Indications.** — Convalescence des affections broncho-pulmonaires, Asthénies post-grippales. Asthénies de toutes natures, Tonique des poudrons, Puissant antiseptique des voies respiratoires, Reconstituant énergétique.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas.

*Adolescents* : au-dessus de 15 ans, 2 cuillerées à dessert.

**Prix** : 18 fr. 50.

**N. B.** — Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau.

**Laboratoire OMNITHER**

33, rue Barthou — ANGOULÊME (Charente).

## SUR-BI-CAL

Formule du Dr Martin du Thell.

**Forme.** — Cachets.

**Composition.** — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ; Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour 1 cachet.

**Propriétés.** — Particulièrement assimilable en raison de sa solubilité dans tous les acides faibles, y compris les acides de fermentation.

**Indications.** — Toutes les indications des phosphates de chaux.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cachets par jour au milieu des repas.

*Enfants* : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un peu d'eau ou de lait.

Enreg. au L. N. C. N° 563.

**Laboratoires LAOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

## SURPARINE

Spasmolytique de choix.

**Composition :**

1 comprimé	0 gr. 06 de Perparine	— 0 gr. 002 de Novatropine
1 ampoule	0 gr. 04 de Perparine	— 0 gr. 0015 de Novatropine
1 suppositoire	0 gr. 04 de Perparine	— 0 gr. 0015 de Novatropine
	0 gr. 015 d'acide phényléthylbarbiturique.	

**Mode d'action et avantages.** — L'antispasmodique par excellence, La Perparine, d'effets comparables à ceux de la Papavérine, est 3 fois moins toxique pour une activité triple. Sans action sur le système nerveux central ne déterminant pas d'accoutumance, d'effet prolongé, sans réaction atonique secondaire, elle est administrable par voie buccale. La Novatropine, pour une toxicité 50 fois moindre, produit l'effet total de l'atropine.

**Indications.** — Tous les spasmes. Spasmes du pylore et du cardia, vomissements, ulcus gastriques et duodénaux, hyperacidité, colites aiguës, constipation spasmodique, coliques hépatiques, cholécystites, crises d'asthme, spasme glottique, angiospasmе, dyspnée paroxystique, angoisse, coliques néphrétiques, cystites, spasmes du col vésical, dysménorrhée, etc. Hoquet. Rétention gazeuse post-opératoire.

**Références.** — Communication à l'Académie de Médecine du 19 décembre 1933.

**Posologie.** — Dominée par deux notions : absence pratique de toxicité, nécessité de doses importantes dans les syndromes paroxystiques ;

1<sup>o</sup> *Etat de crises* : essentiellement, ampoules injectables, 3 à 10 *pro die*, associées au besoin à quelques suppositoires ;

2<sup>o</sup> *En dehors des états de crises* :

Comprimés : 3 à 5 par jour.

Ampoules : 1 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Il s'agit là de doses moyennes, qui peuvent être sensiblement augmentées selon les indications du médecin.

**Posologie infantile.** — a. *Nourrissons* : dans les vomissements habituels on donnera 1/4 comprimé dissous dans du lait-avant chaque tétée, ou l'on fera une injection de 0 cc. 2 sous-cutanée. Dans ces deux cas on pourra répéter ces doses 3 à 4 fois par jour.

b. *Enfants* : jusqu'à 1 an, 1/4 comprimé ou 0 cc. 2 en injections sous-cutanées 3 à 4 fois par jour.

De 2 à 5 ans, 2 à 6 demi-comprimés ou 0 cc. 4 en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

De 6 à 12 ans, 2 à 4 comprimés ou 1 cc. en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

**Présentation :**

20 comprimés ; 100 comprimés ; 5 ampoules.

6 suppositoires : 30 suppositoires.

**Laboratoires SYNTHESIS**

45, avenue Trudaine — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 57-72.)



## SURRASTHÉNINE

**Composition.** — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

**Indications thérapeutiques.** — La Surrasthénine, médicament stimulant et tonique par excellence, est le véritable spécifique de toutes les asthénies, et notamment de l'asthénie post-grippale.

**Posologie.** — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

**Laboratoires d'Endocrinologie appliquée**

**Concessionnaires des Marques des  
ÉTABLISSEMENTS BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Danton 08-11.)

## SURTENSINE

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

### Composition :

Chlorhydrate d'Éphédrine .....	0,02
Camphre .....	0,05
Sulfate de Strychnine .....	0,001
Caféine .....	0,03
Extrait de Valériane .....	0,03
Pour 1 comprimé dragéifié.	

**Indications.** — *Collapsus cardiaque et crises hypotensives* : collapsus spontané des cardiaques, post-hémorragique, toxi-infectieux, algidités, état de shock post-opératoire, traumatique, anaphylactique, lipothymies, syncopes.

*Hypotensions chroniques* : constitutionnelle ou symptomatique des cardiopathes, des surmenés, des convalescents, des infections chroniques, des dysendocriens, etc.

**Posologie.** — Un comprimé 2 à 3 fois par jour, avec un peu d'eau. Avaler sans croquer.

Prix : la boîte 26 fr. 50.

**MONAL, Docteur en Pharmacie.**  
13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Inv. 52-73.)

## SURVAL

**Puissant reconstituant général  
dans toutes les formes de l'anémie.**

### Formule :

Extrait surrénal .....	0 gr. 03
Sulf. strychnine .....	0 gr. 0004
Phosphure de zinc .....	0 gr. 0002
Triodure d'arsenic .....	0 gr. 002
Lactose .....	Q. S.

Pour 1 dragée à 0 gr. 30.

**Indications.** — Anorexies, Amaigrissements, Convalescences, Dépressions nerveuses et sexuelles, Retard de croissance, Insuffisance surrénale, Sénilité précoce, fatigabilité.

### Posologie :

12 à 18 ans : 3 dragées par jour.

Adultes : 6 dragées par jour.

Enregistré au L. N. C sous le n° 1965-1.

**Laboratoires KERCKOVE**

Place Charles-Roussel — TOURCOING.

## SYDENHAMINE

Alcaloïdes actifs de l'Opium sous forme de Méconates doubles d'alcaloïdes et d'urée.

*Sédatif — Analgésique — Hypnotique puissant.*

**Posologie.** — Identique à celle des ampoules ordinaires de Chlorhydrate de morphine.

Communication à l'Académie des Sciences (séance du 17 mars 1941). (Procédé breveté France et Étranger.)

**Présentation.** — 10 ampoules injectables à 1 cc.  
Tableau B.

Prix : 42 fr. 50.

**Laboratoires Alf. DANIEL-BRUNET**

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE  
(Tél. : Molitor 34-16.)

## SYLCASE

Silicium, Calcium.

Formule de A. CRETIN.

Rachitisme, Décalcifications, Croissance, Fractures, Carie dentaire, Allaitement.  
Evite l'hypertension.

**Présentation.** — Comprimés, granulés, poudre, ampoules injectables.

**Posologie.** — 1 à 5 comprimés ou cuillers à café par jour suivant l'âge, 1 ampoule par jour.

Littérature et échantillons :

Laboratoires **GRYSA**

A. BOULANGER, Pharmacien.

7, rue Saint-André — LE MANS (Sarthe).

## SYMPATHOCRINE

Élixir et dragées.

Sédatif et Tonique.

Régulateur du système vago-sympathique.

A base de passiflore, ballote, cratægus et extraits opothérapiques.

**Indications.** — Troubles de la tonicité nerveuse, États anxieux, Émotivité, Troubles circulatoires, Palpitations, Vertiges, Rééducation du Sommeil.

**Élixir :** 1 à 2 cuil. à café au moment du coucher. Prix : 23 fr. 30.

**Dragées :** 2 à 6 par jour. Prix : 22 fr. 70.

Laboratoire **BIOSEDRA**

Clément MAHOUT, pharmacien,  
60, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Lab. 19-13 et 19-14.)

## SYMPATHORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance sympathique.

	Salicylate d'ésérine.....	1/10 de mgr
	Lobe postérieur d'hypophyse.....	0,002
	Camphre monobromé.....	0,10
	Glycérophosphate de Manganèse.....	0,02
	Valérianate de Zinc.....	0,025
<b>Formule :</b>	Extrait de Basilic.....	0,01
	Extrait de Ballote.....	0,01
	Extrait de Passiflore.....	0,03
	Poudre de Guarana.....	0,015
	Poudre de Fenugrec désodorisé.....	0,03
	Poudre de Jusquiame.....	0,015

Par comprimé dragéifié.

**Indications.** — SYMPATHICOTONIE, Hyperémotivité, Hyperactivité, Hyperesthésie, Fausse angoisse, Agitation, Tremblements, Sommeil capricieux, Spasmes, Instabilité des fonctions gastro-intestinales, Douleurs épigastriques, précordiales, neurotonie à prédominance sympathique.

**Posologie.** — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 18 fr. 75 (40 dragées par boîte).

Pour les Vagotoniques, voir : VAGORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le N° 988-I

Laboratoire **FOSSET**

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

## SYMPATHYL

Synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications principales.** — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Éréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires et toutes insomnies d'origine neuro-végétative.

### Composition :

Extrait spécial de cratægus .....	0,060
Extrait de boldo .....	0,010
Phényléthylmalonylurée .....	0,012
Hexaméthylènetétramine .....	0,060
Peptone polyvalente .....	0,030

Pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

**Prix :** 22 fr. 30 le tube de 40 comprimés.

## INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)  
ARCUEIL (Seine).

## SYMPAX

Troublés du sympathique, Désensibilisation.

**Propriétés thérapeutiques.** — Céphalées, Asthénie, Dépressions générales, Anxiété, Angoisses, Spasmes, Agoraphobie, Asthme.

**Formule.** — Extrait de Valériane stabilisée, extrait de Passiflore, extrait de Cratægus, extrait de Ballote, extrait de Jaborandi, Phénacétine, Bromhydrate de quinine, Bromure de camphre, poudre de Muguet, Phényléthylmalonylurée, Anémone pulv.

**Forme.** — Le SYMPAX se présente sous la forme de comprimés.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 403-20.

### Laboratoires HOCQUETTE

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III<sup>e</sup>).  
(Tél. : Arc. 47-13.)

## SYNCORTYL

**Composition.** — Solution huileuse injectable d'acétate de désoxycorticostérone.

**Indications.** — Toutes les insuffisances de la fonction surrénale, Maladie d'Addison, Adynamies, États de shock, Asthénies, Déshydratation du nourrisson, Vomissements incoercibles, Intoxications chroniques, Maladies infectieuses.

### Présentations et prix :

Boîte de 4 amp. de 1 cc. titrées à 2 mgr..	80 fr.
Boîte de 4 amp. de 1 cc. titrées à 5 mgr...	160 fr.
Boîte de 4 amp. de 1 cc. titrées à 10 mgr..	290 fr.

(Consulter les monographies éditées par le « Département Scientifique » des Laboratoires Roussel.)

### Les Laboratoires du Dr ROUSSEL

Laboratoires Français de Chimiothérapie.

S. A. au capital de 10 000 000 de francs.

R. C. Seine 232.168 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Littré 58-43.)

## SYNCRINES CHOAY

**Nature.** — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes pluriglandulaires.

### Formes pharmaceutiques et posologie.

**Cachets et Comprimés**, en tubes hermétiques : 2 à 4 par jour.

**Ampoules injectables**, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

### Nomenclature des principales formules :

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 bis..... Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 bis..... Thyro-Surréno-Ovarienne.
- 4..... Thyro-Ovarienne.
- 4 bis..... Surréno-Ovarienne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 5 bis..... Surréno-Orchitique.

Voir **PEPTOSTHÉNINE**

Boîtes de 24 cachets ou de 30 comprimés.  
Boîtes de 6 ampoules.

### Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

## SYNERGYL VADAM

### Granulé reconstituant.

**Composition.** — Phosphore, Arsenic, Strychnine, Écorces d'oranges amères.

**Présentation.** — Boîte de 200 gr. de granulé. Prix : 20 fr. 20.

**Indications.** — Faiblesse générale et Fatigues passagères.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café de granulé croqué pur ou dissous dans un peu d'eau, un quart d'heure avant les repas du midi et du soir.

### Laboratoire DIDRY

JANVILLE (E.-et-L.).

## SYNTHAGÈNE

### Chimiothérapie antibacillaire.

Médication antitoxinique et immunisante. Innocuité absolue. Action rapide. Maximum d'efficacité. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Toutes les formes de la tuberculose : pulmonaire, osseuse, rénale, génitale, ganglionnaire, scrofule, lupus bacillaire, états pré-tuberculeux et toutes déficiences de l'état général : traitement curatif et préventif.

**Posologie.** — Une piqûre intramusculaire par jour en séries de 30 piqûres.

### Prix :

La boîte de 6 ampoules : 47 francs.  
Coffret de 30 ampoules : 222 francs.

### Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès  
BOULOGNE-SUR-SEINE.  
(Tél. : MOLitor 34-16.)

## SYNTHALINE B CRUET

Premier antidiabétique possédant une action spécifique  
« per os. »

**Composition.** — Dichlorhydrate de dodécaméthylène-diguanidine.

**Indications.** — Diabète léger et de gravité moyenne. Le mode d'action de la SYNTHALINE B a de nombreuses analogies avec celui de l'insuline. Ce médicament réduit la glucosurie et la glycémie. Dans les cas légers ou de gravité moyenne, la SYNTHALINE B peut remplacer en partie ou totalement les injections d'insuline. Elle présente le grand avantage de pouvoir être administrée par voie buccale et de rendre moins rigoureux le régime alimentaire des diabétiques, ce qui permet d'obtenir une amélioration notable de la nutrition et de l'état psychique.

**Posologie.** — Consulter la notice jointe à l'emballage.

**Présentation.** — Flacon de 60 dragées à 5 mgr. : 37 fr. 50

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
E. KELLER, Docteur en Pharmacie  
(Tél. : Invalides 74-19.)

Z. N. O. : DECOUDRE, 87, avenue de Saxe — LYON

## SYNTHÉMA

*l'Hématopoïétique intégral.*

**Composition.** — Une dragée contient :

0,150 de muqueuse gastrique spécialement préparée; 0,020 de pro-  
toxalate de fer; 0,0002 de sulfate de cuivre; 0,001 d'hypophosphite  
de manganèse.

SYNTHÉMA réalise ainsi la synthèse des grands principes hématopoïétiques de l'organisme sain.

**Mode d'action et avantages.** — 1° SYNTHÉMA reconstitue et catalyse la fonction hématopoïétique. — 2° SYNTHÉMA augmente la qualité hématique par élévation rapide du taux de l'hémoglobine. — 3° SYNTHÉMA suractive le métabolisme général, et, partant, fortifie l'organisme. Action particulièrement rapide.

**Indications.** — Anémies secondaires de toute origine, médicales, chirurgicales, obstétricales. Asthénies, surmenage, convalescences. Anorexies, amaigrissement, lymphatisme, rachitisme, troubles de croissance. Cachexies.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

**Posologie.** — *Adultes*: 3 à 4 dragées après chac. des trois princp. repas.

*Enfants*: jusqu'à 6 ans : 3 dragées par jour ;

jusqu'à 12 ans : 5 dragées par jour.

**Présentation.** — Boîte de 100 dragées.

Laboratoire M. LEFEBVRE

25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 60-77.)

## SYNTROPAN « ROCHE »

**Composition.** — Phosphate de l'ester-3-diéthylamino-2,2-diméthyl-propylique de l'acide tropique.

**Propriétés.** — Antispasmodique puissant, d'action qualitativement voisine de celle de l'atropine, sans action sur la pupille (mydriase), sur la sécrétion salivaire et sur la pression sanguine.

**Indications.** — Tous les Spasmes, estomac, pylore, cardia, Constipations spasmodiques, Coliques, Dysménorrhée, Ulcères, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — *Comprimés* à 2 cg. : 1 à 3 par jour. — *Ampoules* de 1 cm<sup>3</sup> à 1 cg. : 1 à 3 par jour. — *Suppositoires* à 3 cg. : 1 à 2 par jour selon les cas.

Ampoules (boîte de 6). Comprimés (flacon de 20). Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N<sup>os</sup> 504-66 (comprimés), 504-68 (ampoules), 504-69 (suppositoires).

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Arch. 91-10)

## TABLETTE PERROUD

**Composition.** — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons, contenant chacun 5 gr.

Dans l'impossibilité de continuer la fabrication ancienne, une nouvelle formule à base de mucilage et de kaolin remplace momentanément la

TABLETTE PERROUD.

Dilué dans de l'eau, un sachet donne un lait agréable à boire.

*Hyperchlorhydrie* : 1 sachet avant chaque repas.

*Ulcère* : 1 à 2 sachets, le matin à jeun ou au moment des douleurs.

*Gastrite, Gastralgies, Hypersécrétion* :

1 sachet au moment des malaises.

**Laboratoire GERDA**

(Anciennement 3, rue Sébastien-Gryphe.)

10, rue Jacquard — LYON.

## TABLETTES ZEVA

**Formule.** — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamelis, viburnum, bourdaine, kola. Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

**Présentation.** — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr. 03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

**Posologie.** — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

**Indications.** — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 18 fr. 70.

**Laboratoire H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or Strasbourg 1927.

## TACHYGASTRINE DUCLOY

**Accélérateur physiologique des sécrétions gastriques totales.**

**Forme.** — Ampoules buvables.

**Composition.** — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium-calcium.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Eupeptique complet excitant : des nerfs gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et antinauséux ; de la sécrétion acide par les alcalins choisis ; de la sécrétion peptique par l'albumose.*

**Indications.** — Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :

**Primaires :** Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypopepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

**Secondaires :** Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons ; — anaphylaxies.

**Contre-indication.** — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

### Posologie :

**Adultes :** Une ou deux ampoules avant les repas.

Prendre le médicament dix minutes avant les repas matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demitasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

**Nourrissons :** V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

**Enfants :** De 5 à 12 ans accomplis : VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux, partit de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 36 fr. 50.

**Laboratoires DUCLOY et Cie**  
**ARQUES (Pas-de-Calais).**

## TÆNIFUGE CASTEL

**Cachets**

**Composition :**

**Cachet Rose (Laxatif).**

Cascara sagrada pulv... 0 gr. 40 | Calomel..... 0 gr. 10  
Pour 1 Cachet.

**Cachets Gris (Tœnifuges).**

Oxyde stanneux pur.....	2 gr.	Extrait éthéré fougère	
Etain pulv. pur.....	2 gr.	mâle.....	2 gr.
Podophylline.....	0 gr. 02	Bile desséchée.....	1 gr.
Thymol.....	0 gr. 10	Aspidium pulv.....	3 gr.

Pour 9 Cachets.

**Indications.** — Destruction et expulsion des tœnias de toute espèce.

**Présentation.** — Tube aluminium contenant 1 cachet rose (laxatif) et 9 cachets gris (Tœnifuges).

**Modes d'emploi (Adultes seulement).** — Médicament très bien supporté, efficace et inoffensif. Après un repas du soir peu abondant, prendre le cachet rose avec une infusion. Dès le lendemain matin, l'effec. laxatif obtenu, absorber de 10 minutes en 10 minutes chacun des 9 cachets gris avec un peu de café, d'eau ou d'infusion. Ne prendre aucun purgatif huileux ni aucun aliment avant le repas de midi qui sera normal.

Prix : 28 fr. 75.

**Laboratoires CASTEL, 1, place Bouquerie — NIMES**  
**A. CASTEL, Pharmacien. Ingénieur-Chimiste, Licencié ès Sciences**

## TÆNIFUGE DU D<sup>r</sup> JACQUÈME

### Composition:

Liquide en capsules à base d'*Aspidium Filix Mas* et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

### Indications:

Expulsion radicale du Tænia.

### Avantages:

Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

### Mode d'emploi:

Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

*Effet*: deux heures au maximum.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 641-2.

Préparé par

**E. LARROUYET, Pharmacien**

**Laboratoires CHIARINI**

68, bd du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 3-95.)

## TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU

**Composition.** — Extrait chloroforme-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

**Indications.** — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

**Caractéristiques.** — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt de travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

**Mode d'emploi.** — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec aussi peu de liquide que possible. Action généralement deux heures après. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

**Doses.** — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* de 7 ans à 11 ans: autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 18 fr. 40.

Unité de vente : 1 traitement pour adultes.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU**

**LEGOUX frères, pharmaciens.**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

## TÆNIFUGE KIRN

En capsules

à base de *filicine*, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tæنيفuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pellettérine. (Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

**Capsules Kirn.** — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

**Mode d'emploi.** — 1° Avant-veille, purgation ; 2° la veille, diète presque absolue (lait) ; 3° le matin à jeun l'absorption, de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

*Enfants* : Capsules Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Prix : *Adultes* : 27 francs. — *Enfants* : 21 francs.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-S/S. (Tél. : Molitor 34-16.)

## TÆNIFUGE LIMOUSIN

### Composition :

Extrait éthéré de rhizome frais de fougère mâle.....	50 cgr.
Calomel à la vapeur .....	5 —
(Par capsule.)	

**Forme.** — 16 capsules.

**Indications.** — Expulsion radicale des ténias de toute espèce.

**Mode d'emploi.** — Le jour qui précède l'administration du médicament, ne faire qu'un léger repas à midi et ne prendre qu'une tasse de lait le soir. La dose est de 16 capsules (pour les enfants, 1 capsule par année d'âge), à prendre le matin à jeun, dans un peu d'eau, de 5 en 5 minutes. Le ténia est ordinairement expulsé 1 ou 2 heures après l'administration de la seizième capsule. Dans le cas contraire, prendre, 2 heures après la dernière capsule, 60 gr. de sirop d'éther. *Résultat certain.*

**En cas de nausées,** absorber un peu de café ou de thé. Enregistré au L. N. de C. des M. sous le n° 199-5.

### Laboratoire BROCHON

202 bis, rue de Paris — CLAMART (Seine).  
(Tél. : Mic. 00-62.)

## TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

**Présentation.** — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au séné ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

**Doses.** — Un bonbon le soir en se couchant.

**Enfants :** un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

**Société du TAMAR INDIEN GRILLON**

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TAMARINE

**Délicieuse confiture laxative** à base de Casse muette et de Tamarin, infallible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales. Pas d'accoutumance.

### Posologie :

**Enfants au-dessus de 5 ans :** 1/2 cuillerée à café.

**Adultes :** 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

**Prix :** 14 fr. 75.

### Laboratoire de la TAMARINE

4, av. du Maréchal-Pétain  
LE BOUSCAT, près Bordeaux.

## TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet. (Boîte de 6.)

**Mode d'emploi.** — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

**N. B.** — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine. Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-42.

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Archives 91-10)



## TANNURGYL

du Docteur **LE TANNEUR**  
Sel de Vanadium, non toxique.

Prescrit depuis 40 ans comme Tonique général puissant par modification humorale profonde des terrains morbides les plus divers.

**Indications.** — Asthénie, Phosphaturie, Déminéralisation générale, Colibacillose.

**Posologie.** — 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau au début des deux repas.

**Enfants:** demi-dose.

**Nourrissons:** 1/4 de dose dans le biberon.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 430-4.

Prix : 26 fr. 80 grand modèle, 16 fr. 40 petit modèle.

*Dépôt général:*

**Laboratoires TACHOT et VIGAN**

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

**Forme.** — Cultures liquides.

**Composition.** — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

**Indications.** — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites colibacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) comme agent anti-infectieux.

**Posologie.** — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récidive.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09-83.)

## TARTRATE BORICO-POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique chimiquement pur à faire dissoudre au moment de l'emploi.  
Conservation parfaite.

**Indications.** — Épilepsie, troubles névropathiques.

**Présentation.** — En boîtes de 30 tubes dosés à : 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr.

**Posologie.** — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

**Laboratoires THOMAS**

2, r. Ste-Cécile — 31, fg Poissonnière — PARIS (IX°)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## TAXOL

**Composition :**

Poudre de muqueuse intestinale.....	0,05
Extrait biliaire.....	0,075
Mucilage naturel.....	0,03
Poudre d'aloès.....	0,0245
Extrait d'hyoscyamus muticus.....	0,00215

Pour 1 comprimé.

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 35.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance.

**Indications.** — Constipation, Entérite chronique, Entérocologie, Dermatoses.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par deux comprimés par jour après un des repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

**Laboratoires LOBIOA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI°).  
(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## TEINTURE DE COCHEUX

(Origine 1832)

**Goutte, Arthritisme, Rhumatisme.**

**Composition.** — Teinture alcoolique de colchique d'automne privée de son principe drastique ; c'est la mieux supportée des préparations à base de **Colchicine**. Elle n'occasionne aucun trouble.

Au Congrès de la Goutte, à Vittel, en 1935, plusieurs rapporteurs ont parlé de la « Colchicine, spécifique de la Goutte ».

En reconnaissant, il y a peu de temps, l'action désensibilisatrice très efficace de la Colchicine, on a établi scientifiquement la valeur thérapeutique de la Teinture de Cocheux empiriquement adoptée jusqu'alors.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau sucrée, à jeun. Souvent il est bon de prolonger la cure.

En pharmacie : flacon de 180 cc. et demi-flacon. Enreg. au Lab. Nat. Cont. Méd. sous le n° 130-2.

**Laboratoire N. AGUETTANT**

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-36.)

## TENEbRYL GUERBET

Di-iodo méthane sulfonate de sodium (68,6 p. 100 d'iode). Moyen de contraste organique iodé soluble pour urographie intraveineuse, pyélographie instrumentale et explorations radiologiques diverses.

**Pour urographie intraveineuse.**

*Chez l'adulte :*

Solution A, 50 cc. à 30 p. 100 : normale forte.

Solution B, 25 cc. à 45 p. 100 : normale.

Solution C, 20 cc. à 35 p. 100 : faible.

*Chez l'enfant :*

Solution A à 30 p. 100 : 1 cc. par kilo.

**Pour pyélographie instrumentale.**

Solution D à 20 p. 100, ampoules de 10 et 20 cc. : normale.

Solution A, à 30 p. 100, ampoules de 10 et 20 cc. : normale forte.

**Prix :**

Solution A, 10 cc. : 25 fr. 80 ; 20 cc. : 41 fr.

50 cc. : 93 fr. 80.

Solution B, 25 cc. : 82 fr. 10.

— C, 20 cc. : 70 fr. 40.

— D, 10 cc. : 17 fr. 60 ; 20 cc. : 29 fr. 30.

**Laboratoires A. GUERBET et Cie**

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Montmartre 22-56.)

## TENSÉDINE

Médication sédatrice, antispasmodique et régulatrice du tonus artériel.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Pour un comprimé :

Crème de tartre soluble .....	0,15
Aminophylline .....	0,03
Ether trinitrique de la glycérine .....	1/2 goutte
Phényléthylmalonylurée .....	0,005
Bromure d'acétylcholine .....	0,0025
Extrait de pancréas .....	0,10
Extrait de muscle strié .....	0,05

**Indications.** — Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels. Troubles vaso-moteurs et spasmes vasculaires. Artério-sclérose, Aortites, Artérites. Troubles de la circulation périphérique. Troubles de la ménopause. Maladie de Raynaud.

**Posologie :**

Dose moyenne : 2 comprimés au début de chacun des trois repas. Dose d'entretien : 3 comprimés par jour, une semaine sur deux.

Prix : 25 fr. 80 le tube.

**MONAL**

Docteur en Pharmacie

13, av. de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Inv. 52-73.)

## TENSOL

*Mieux qu'un hypotenseur, le redresseur des fonctions fléchissantes de la quarantaine.*

**Caractéristiques.** — Action progressive. Aucun choc.

**Composition.** — Association synergique de médicaments hypotenseurs (Cholalate de soude, Silicate de soude, Iode organique), Sédatifs antispasmodiques (dérivés barbituriques, Benzoate de Benzyle), Tonocardiaque, Diurétique (Sparteïne, Carbonate de Lithine).

**Indications.** — Artériosclérose, Hypertension, Arthritisme, Asthme et tous les accidents secondaires qui en découlent, d'origine artérielle, cardiaque, rénale, nerveuse et pulmonaire.

**Forme.** — Comprimés.

**Posologie.** — Médication par voie buccale : 4 à 6 comprimés par jour, par 2 à la fois.

L'étui de 48 comprimés : 23 francs.

Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE  
LAURENÇON et Cie

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Z. O. : 1, rue Benoît-Sourigues — BAYONNE (B.-P.).

## TENSORYL

(Médication hypotensive).

**Composition.** — Complexe végétal-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

Silicate de soude .....	0,10
Nitrite de soude .....	aa 0,05
Poudre de scille .....	
Extrait stab. Cratægus .....	aa 0,03
— — Gui .....	
— — Muguet .....	

**Indications.** — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

**Emplol.** — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 27-3.

Prix : 20 fr. 60 l'étui de 60 pilules.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS — (Roq. 49-22.)

**DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,**

Docteur en Pharmacie.

## TERBINTHIOL THOMAS

**Présentation et composition.** — Capsules à base de sulfure de térébenthène ( $C^{10}H^{14}S$ ), soit 19 % de soufre organique, inoxydé (Thèse de Paris, Dr Lefèvre, 11 juillet 1934).

**Propriétés.** — Le TERBINTHIOL apporte à l'organisme du soufre organique inoxydé indispensable au métabolisme cellulaire et à la neutralisation de toxines et déchets.

### Principales indications thérapeutiques :

- Toutes carences soufrées.
- Cholagogue. Cholérétique.
- Infections hépatiques et vésiculaires.
- Lithiases biliaires et rénales.
- Infections de l'appareil urinaire. Gonorrhée. Colibacillose.
- Manifestations anaphylactiques (Asthme, urticaire, rhume des foins).
- Rhumatismes et tous états uricémiques.

**Posologie et mode d'emploi.** — Dans les cas aigus : 6 capsules par jour en trois fois aux repas.

En dehors des cas aigus : 3 capsules par jour en trois fois aux repas, 20 jours consécutifs par mois.

**Remarque.** — Faire continuer le traitement malgré les éructations qui pourraient être signalées et qui ne constituent pas un signe d'intolérance.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 650-10.

### Laboratoires THOMAS

2, r. Ste-Cécile — 31, fg Poissonnière — PARIS (IX<sup>e</sup>)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## TERCODAL

Traitement symptomatique des toux, bronchite, catarrhe, asthme Emphysème.

### Formule :

<i>Sirup.</i>		<i>Comprimés.</i>	
Benzoate de soude.....	4,16	Ephédrine.....	0,003
Codéthyline.....	0,042	Terpine.....	0,10
Anesthésine.....	0,04	Aconit (extrait).....	0,001
Peptone.....	1,666	Codéthyline.....	0,003
Teinture racine aconit...	0,833	Excipient Q. s. p. un	
Teinture drosera.....	0,833	comprimé terminé à ..	0,35
Teinture de belladone.....	0,833		
Sirup de tolu.....	45, gr.		
Sirup capillaire.....	45, gr.		
Excipient.. Q. S. pour...	100 gr.		

Prix : 14 fr. 85.

Prix : 20 francs.

### Posologie :

- Sirup : Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
- Adolescents : 10 à 17 ans, 3 cuillerées à dessert.
- Comprimés : avaler sans croquer 5 à 6 compr. entre les repas par jour.
- Enfants à partir de 5 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

### Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## TERKAL MONAL

### Sédatif de la toux.

**Forme.** — Dragées.

### Composition :

Codéine.....	0,01
Carbonate de gaïacol.....	0,05
Terpine.....	0,05
Nucléinate de soude.....	0,01
Acide benzoïque.....	0,03
Fluorure de calcium.....	0,005

**Propriétés.** — Calmantes, Expectorantes, Antiseptiques, Reminéralisatrices.

**Indications.** — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

**Doses.** — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Le flacon de 30 dragées : 16 fr. 40.

### Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Invalides 52-73.)

## TERPINE BOVEIL

Granulé fondant, entièrement soluble, d'un goût agréable, d'un dosage précis et constant.

Chaque cuillerée à café contient :

Terpine pure .....	0,250
Benzoate de soude de benjoin ....	0,175
Codéine .....	0,005
Orthoforme .....	0,001

**Propriétés.** — Permet, sous un volume réduit, de donner une dose très élevée de produits actifs. Peut être formulée aux enfants, aux nourrices et aux vieillards. Excellent fluidifiant des sécrétions bronchiques. Jugule très rapidement toutes les affections du larynx et de la trachée ; donne complète satisfaction dans le traitement des toux quinteuses et spasmodiques. *C'est le médicament des voies respiratoires.*

**Indications.** — Rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, emphysemes, trachéites, antiseptique urinaire.

**Posologie.** — *Adultes* : 6 à 8 cuillerées à café par jour, à prendre soit pure, à laisser fondre dans la bouche, soit mieux dans un liquide chaud : eau, infusion ou lait. *Enfants* : par 1/2 cuillerée à café selon l'âge.

Prix : 12 fr. 50.

L. N. C. n° 19-3.

Laboratoires A. CARON,  
9, place des Terreaux — LYON.

## TERPINE GONNON

**Présentation et composition.** — *Elixir* : Terpine et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr. 20 de terpine).

*Granulé* : Terpine, Phosphate de codéine, Aconit, Tolu, Polygala, Erysimum et galacosulfonate de potassium.

*Pilules* : Terpine, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

*Pâte* : Terpine, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

*Pastilles* : Terpine 0 gr. 05 et Tolu.

**Propriétés thérapeutiques.** — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

**Posologie :**

**Prix public.**

*Elixir* : 2 à 4 verres à liqueur par jour (pour 8 jours environ). 32 fr. 90

*Granulé* : 5 à 6 cuillerées à café par jour (pour 8 jours environ). 17 fr. 2

*Pilules* : 4 à 6 pilules par jour (pour 12 jours environ). 17 fr. 90

*Pâtes* : 15 à 20 morceaux par jour (pour 4 jours environ). 8 fr. 20

*Pastilles* : 8 à 10 pastilles par jour (pour 6 jours environ). 8 fr. 20

**Indications.** — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphyseme. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

## TERPINE GRANULÉE BARON

**Composition.** — Terpine pure et benzoate de soude.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

**Indications.** — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysemateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

**Doses.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : demi-dose.

Prix : 17 fr. 50 les 125 grammes.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V°).  
(Tél. : Gobelins 39-44.)

## TESTOVIRON CRUET

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — Hormone testiculaire pure, standardisée et étherifiée (propionate de testostérone en solution huileuse pour injections intramusculaires).

**Indications et posologie.** — Manifestations de lassitude intellectuelle et diminution de l'énergie physique (8 à 12 injections de 5 mgr.).

Prostatisme et troubles de la miction (chaque jour 1 injection de 25 mgr.).

Retards pubertaires, eunuchoidisme, cryptorchidie, dystrophie adipo-génitale (2 fois par semaine, 1 injection de 5 mgr.).

Dermatoses endocriniennes (par semaine 3 à 4 ampoules à 10 mgr.).

Diabète (par semaine 3 à 4 ampoules à 10 mgr.).

En gynécologie : mastopathies et comme hormone antagoniste dans les états d'hyperfolliculinémie (5 mgr. par jour dans la deuxième moitié du cycle).

### Présentations :

Boîte de 4 ampoules à 5 mgr.....	45 fr.
Boîte de 5 ampoules à 10 mgr.....	75 fr.
Boîte de 2 ampoules à 25 mgr.....	75 fr.

## TESTOVIRON « T » CRUET

### Hormonothérapie Transcutanée

**Composition.** — Hormone testiculaire pure standardisée. (Un flacon de TESTOVIRON « T » contient plus d'hormone pure que 500 kilos de glandes de taureaux.)

**Indications.** — Le TESTOVIRON « T » ranime les facultés intellectuelles et augmente les forces physiques. Cure complémentaire de la thérapeutique par injections.

**Posologie.** — Verser 2 fois par jour 15 gouttes, en frictionnant, dans le pli du coude.

**Présentation.** — Flacon de 10 cc. à 50 mgr. : 58 fr.

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

**E. KELLER, Docteur en Pharmacie**

(Tél. : Invalides 74-19)

Zone non occupée : DECOUDRE

87, avenue de Saxe — LYON

## TÉTRANITROL ROUSSEL

### Composition :

Comprimés de Tétranitrates d'Érythrol à 1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

### Indications :

Hypertension : Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

### Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Comp. à 1-2-5 mmgr. et 1 centgr.

### Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Élysées 62-27.)

## THALASSOTONINE INFANTILE

Ampoules injectables ou buvables de 10 cc.

**Composition.** — Gluconate de calcium, phosphore et magnésium en milieu marin.

**Présentation.** — Boîte de 5 ampoules de 10 cc. injectables ou buvables. Prix : 20 fr. 15.

**Indications.** — Troubles de la digestion ou de la nutrition : vomissements, gastro-entérites, diarrhée, atrophie, anorexie, chute de poids ou croissance difficile, intolérances alimentaires.

Troubles du métabolisme phospho-calcique : spasmophilie, retard de dentition, fragilité osseuse, maladies de peau, intoxications endogènes et exogènes, syndromes hémorragiques.

**Posologie.** — Injection intramusculaire : 1 ampoule tous les 2 jours.

Par voie buccale : Nourrissons : 1 ampoule par jour dans le biberon ou la bouillie.

Enfants : 1 ou 2 ampoules par jour au milieu du repas, dans un peu d'eau ou de lait.

Grossesse et Allaitement : même dose que pour enfants.

### Laboratoires DIDRY

JANVILLE (E.-et-L.).



## THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au contrôle le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de pureté chimique et d'activité constante.

**Action.** — Diurétique puissant.

**Indications.** — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

**Formes.** — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

**Pharmacie Centrale de France**

379, avenue Président-Wilson,  
La Plaine-Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 16-70.)

## THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé pur.

**Propriétés.** — 1° En raison de sa solubilité, la Théobromose agit plus rapidement que la théobromine et à des doses 4 fois moindres ; 2° En raison de cette solubilité et des faibles doses thérapeutiques nécessaires, elle est toujours bien tolérée.

**Indications.** — Dans tous les cas où l'on veut obtenir une action diurétique (urémie, artériosclérose, etc...).

**Formes.** — Solution 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Comprimés, 2 à 6 par jour.

et **CACHETS DE THÉOBROMOSE « N »**  
(forme nouvelle).

**Formule :**

Théobrominate de lithium .....	0,25
Citrate double de calcium et d'hexaméthylènetétramine .....	0,50
par cachet (1 à 3 par jour).	

**Indications.** — La Théobromose « N » permet d'obtenir, outre une action diurétique puissante, l'antispasme du système réno-vésical et une désintoxication générale.

**Enreg.** au Lab. Nat. de Contr. des Médic. sous les nos 1-7, 1-5 et 1-13.  
**Laboratoires DUMESNIL**  
10, rue du Plâtre — PARIS (IV°).

## THÉOCARDINE LALEUF

**Composition.** — Association : Théobromine et Crino-cardine.

**Propriétés et Indications.** — Diurétique puissant, déchlorurant de premier ordre. Action toni-cardiaque s'exerçant sur la contractilité du myocarde.

Toutes les indications de la **THÉOBROMINE**, en tenant compte toutefois que la **THÉOCARDINE LALEUF** agit mieux, plus vite, à doses beaucoup plus faibles, sans provoquer de phénomènes d'intolérance.

Remède de choix du **CARDIO-RÉNAL**.

**Forme.** — Dragées à noyau glutinisé.

Trois formules différentes : Simple, Digitalique, Sparteinée.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 2 à 8 dragées par 24 heures (suivant avis du Médecin traitant).

**Durée moyenne des unités de vente :** 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 26 fr. 50.

**Laboratoires LALEUF**

**Georges DUQUÉ**, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI°).

(Trocadéro : 62-24.)

## THÉOMINAL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Association de théobromine (0 gr. 30) et de Luminal (0 gr. 03).

**Propriétés et Indications.** — Antispasmodique, vaso-régulateur et diurétique. Artério-sclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Spasmes vasculaires, Troubles circulatoires de la vieillesse et de la ménopause.

**Posologie.** — 2 à 3 comprimés par jour.

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés à 0 gr. 33.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)



# THÉOPHYLLINE BRUNEAU

Médication rénale, cardiaque et pulmonaire.

Théophylline pure solubilisée par un produit non caustique, non toxique et à dessein thérapeutiquement inactif.

L'absence de tout solvant à base d'amines ou de glycols assure à la THÉOPHYLLINE BRUNEAU une tolérance parfaite aussi bien par voie rectale ou buccale que par voie intraveineuse ou intra-utérinaire.

## Indications :

**Affections cardiaques et vasculaires :** insuffisance cardiaque, asthme cardiaque, sclérose pulmonaire, oppression douloureuse des cardiaques.

**Affections rénales :** œdème cardiaque et rénal, oligurie des maladies infectieuses, tous les cas d'insuffisance du débit urinaire.

**Affections pulmonaires :** crises d'asthme, respiration de Cheynes-Stokes, paralysie respiratoire, dyspnée d'origine centrale.

## Posologie :

**Comprimés** (0 gr. 10 de Théophylline pure par comprimé) : 1 ou 2 comprimés 3 à 4 fois par jour.

**Suppositoires** (0 gr. 35 de Théophylline pure par suppositoire) : 1 suppositoire tous les matins pendant 3 ou 4 jours et ensuite 1 suppositoire tous les 2 jours.

**Ampoules** (0 gr. 24 de Théophylline pure par ampoule) :

Voie intramusculaire : 1 ampoule pendant 3 jours et ensuite 1 ampoule tous les 2 jours.

Voie intraveineuse : 1 injection d'une ampoule que l'on peut, en cas d'urgence, renouveler dans la journée.

Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>

Docteurs en pharmacie.

17, rue de Berri. — PARIS (VIII<sup>e</sup>) (Tél. : Élysées 61-46.)

# THÉOPHYLLINE CARÉNA

La théophylline appartient au groupe des xanthines, comme la caféine et la théobromine, et peut les remplacer dans leurs indications diurétiques.

## Propriétés thérapeutiques :

**Antalgique cardiaque** (anémie de poitrine, infarctus du myocarde).

**Tonicardiaque** (insuffisance ventriculaire gauche, arythmies).

**Diurétique sans toxicité** (oliguries, ascite, œdèmes).

**Eupnéique** (dyspnée, asthme, Cheyne-Stokes).

La théophylline-éthylène-diamine est le plus puissant dilateur des artères coronaires (voir **Aminophylline** et **Caréna**).

## Présentations :

**Théophylline-éthylène-diamine :**

Comprimés, gouttes, suppositoires, ampoules intramusculaires et intraveineuses (voir **Caréna**).

**Théophylline calcique :**

Comprimés, ampoules intraveineuses (voir **Caréna-Calcium**).

## Associations :

Avec l'**Ouabaine** (voir **Caréna-Ouabaine**).

Avec la **Popavérine** (voir **Sédo-Caréna**).

Avec la **Trinitrine** (voir **Trinitrine-Caréna**).

**SOCIÉTÉ d'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES**

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

# THÉOSALVOSE

**Composition.** — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

**Propriétés.** — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

**Indications.** — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

**Formes.** — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littre 26-92.)

# THÉOSTÈNE SCILLITIQUE

## Formule :

Théobromine chimiquement pure.....	0,30
Poudre de scille stabilisée.....	0,10
Extrait sec de jaborandi.....	0,02

**Action.** — Diurétique cardio-rénal à action renforcée, puissant et sûr. Agit quand la *Théobromine* se montre insuffisante.

*Ne donne jamais de céphalées.*

**Indications.** — Urémie, Uricémie, Artériosclérose, Albuminurie, Dyspnée cardiaque, Œdèmes, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Scarlatine et toutes les maladies infectieuses, Anurie toxémique, etc.

**Posologie.** — 2 à 3 cachets par 24 heures avant les repas.

## THÉOSTÈNE SIMPLE

Théobromine spéciale chimiquement pure, en cachets dosés à 0 gr. 50.

Toutes les indications de la théobromine.

**Posologie.** — 2 à 4 cachets en 24 heures.

Laboratoires R. BERNARDO

47, avenue de la République, VILLENEUVE-LE-ROI (S.-et-O.).

(Tél. : 202.)

## THÉOVERINE LALEUF

**Composition.** — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure .....	0,15
Papavérine chlorhydrate .....	0,01

**Propriétés et indications.** — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVERINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVERINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement symptomatique). — Artériosclérose. — Insuffisance aortique. — C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

**Forme.** — Dragées.

**Posologie et mode d'emploi.** — De 3 à 6 dragées par jour suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 dragées par 24 heures.

**Durée moyenne des unités de vente.** — 15 à 20 jours.

Prix de vente au public : Etui de 50 dragées : 23 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUE, Docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## THÉOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique en comprimés glutinisés.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais la combinaison, assez instable, est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé ce complexe sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage de gluten, se désagrégeant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi, au cours de la traversée intestinale, une absorption lente et continue de la Théobromine solubilisée par le Phosphate disodique. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

**Composition :** { Théobromine cristallisée pure ..... 0 gr. 25  
 { Phosphate disodique ..... 0 gr. 10  
 { Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.  
 Flacon de 40 comprimés.

**Indications.** — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par jour.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV<sup>e</sup>). (Tél. : Suffren 79-59.)

## THÉRAMINE

**Thérapeutique générale de l'Histamine**

**Première application par les « microdoses »**

*Traitements des états allergiques et des ulcères gastro-duodénaux.*

**Composition.**

Soluté isotonique et de pH constant de bichlorhydrate d'histamine (B-imidazol-éthyl-amine).

Boîtes de 20 ampoules de 1 centicube comprenant 10 ampoules numérotées de 1 à 10, de concentration croissante (0 γ, 01 à 5 γ), et 10 ampoules (n° 11) contenant chacune 10 γ.

Contrôle rigoureux par un dosage double, biologique et colorimétrique.

**Indications.**

**Désensibilisation spécifique des états allergiques :** Asthme, Urticaire, Œdème de Quincké, Migraines, Intolérances digestives d'origine hépatovésiculaire ou colique, etc.

**Traitement biochimique des Ulcères gastro-duodénaux** agissant non seulement sur la crise douloureuse, mais vraisemblablement aussi sur la maladie ulcéreuse elle-même.

**Posologie et mode d'emploi.**

Injection sous-cutanée indolore tous les 2 jours suivant l'ordre numérique des ampoules. Délai de 4 à 12 semaines entre chaque série. L'effet thérapeutique apparaît habituellement entre la 8<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> injection.

**Médication atoxique :** l'activité de la Théramine n'est pas le fait, en effet, d'une concentration élevée en produit chimique, mais elle est liée au pouvoir désensibilisant de doses toutes largement infra-toxiques, progressivement croissantes et calculées pour élever sans heurt le seuil de sensibilité allergique de l'organisme.

Posologie identique à tous les âges.

Aucune contre-indication.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

## THERMOPLASME

Cataplasme révulsif et résolutif.

**Forme et présentation.** — Préparé avec des mucilages et des essences révulsives naturelles, le THERMOPLASME est présenté, prêt à l'emploi, en pochette petit ou grand modèle.

**Mode d'emploi.** — Immerger pendant quelques secondes le THERMOPLASME dans de l'eau tiède ; essorer l'excès d'eau.

Appliquer le THERMOPLASME, le côté coloré sur la partie douloureuse, et le maintenir solidement en place à l'aide d'un bandage.

**Indications.** — Bronchites, Pleurites et tous les états congestifs du poulmon, Névralgies, Rhumatismes, Lumbagos, Goutte, etc...

Laboratoires de la  
**FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS  
DE PANSEMENTS**

5, Grande-Rue — MONTPELLIER  
(Tél. : 54-93.)

## THIAZOMIDE

(2090 R. P.-Sulfathiazol)

p-amino-benzène-sulfamido-thiazol.

Antibactérien polyvalent actif sur les infections à *Gonococcus*, *Staphylococcus*, *Colibacilles*, à *Meningococcus*, *Pneumococcus*, *Streptococcus*.

Bonne tolérance par les voies digestives.

**Indications.** — Blennorragie et complications, Anthrax, Furunculose, Abscès tubéreux, Pyelites, Colibacilloses, Septicémies, Méningites à germes divers, Erysipèle, Pneumonies, Infections et Suppurations chirurgicales.

**Présentation et posologie :**

Comprimés à 0 g. 50 (tubes de 20).

Posologie massive les premiers jours (5 à 7 g. *pro die*), puis dégressive. Environ 20 g. pour un traitement.

Traitements massifs de la Blennorragie (en 1 jour : 9 ou 10 g.).

Pendant toute la durée du traitement, boissons abondantes.

Prix de vente : 24 fr. 30.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

**Indications thérapeutiques.** — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

**Thigénol « Roche »** pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

**Toutes les affections gynécologiques :**

**Thigénol « Roche »** pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

**Ovules « Roche » au Thigénol.**

**Tampol « Roche »**, pansement gynécologique idéal (Voir page spéciale).

Enregistrés au Lab. Nat. de Contrôle des Méd. sous les n<sup>os</sup> 504-46 (liquide), 504-47 (ovules), 504-42 (tampol).

**Produits « ROCHE »**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>). — (Tél. : Archives 91-10)

## THI-LIP AGUETTANT

**Pyréthérapie.**

**Soufre en solution huileuse spécialement préparée.**

**Forme.** — Ampoules injectables dosées à 1 p. 100 de soufre.

**Propriétés.** — Agent pyréthogène sans action nocive. Les injections sont immédiatement suivies d'une élévation de température. Celle-ci peut atteindre et dépasser 39° 5. La fièvre tombe dès qu'on interrompt les injections. Réactions douloureuses très faibles ou nulles.

L'amplitude du choc thermique varie largement avec les individus. Tous les agents pyréthogènes sont soumis à cette relativité.

Les ampoules ne cristallisent pas à la température normale.

**Emploi.** — Injections intramusculaires profondes (dans la cuisse).

On injecte généralement une série de doses progressives allant jusqu'à 10 cc. à des intervalles de 3 à 6 jours. Mais cette règle doit être adaptée aux réactions et à l'état général du malade. On peut prolonger le traitement avec quelques injections de 10 cc.

On reprend le traitement après une interruption de plusieurs mois.

La boîte contient 10 ampoules de 1 à 10 cc.

Sur demande : boîte de 6 ampoules de 10 cc.

(Aux hôpitaux : prix et conditionnements spéciaux.)

Enregistré au Lab. Nat. Cont. des Médic. n<sup>o</sup> 130-14.

**Laboratoire N. AGUETTANT**

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

## THIOBYL BOURCET

**Composition.** — Médication polyvalente (peptones, sulf. magn., hyp. de Na, extr. mou boldo, d'artichaut) enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N<sup>os</sup> 754-3 et 754-4.

**Indications.** — Toutes les affections du foie et des voies biliaires.

**Formes pharmaceutiques.** — Granulé et dragées.

**Mode d'administration du granulé.** —

*Adultes* : 1 cuillerée à café le matin à jeun ou 1/2 cuillerée à café 1/2 heure avant les repas (syndr. hépato-vagotoniques). —

*Enfants* : 1/4 à 3/4 de cuillerée à café suivant l'âge.

**Mode d'administration des dragées.** —

*Adultes* : 4 dragées le matin à jeun ou 2 dragées avant les deux repas. —

*Enfants* : 1 à 3 dragées suivant l'âge en une fois ou à dose fractionnée avant les repas.

Le flacon de granulés a une durée de 20 jours de traitement pour les adultes.

Le flacon de dragées a une durée de 12 jours de traitement pour les adultes.

**Laboratoires du QUINA BOURCET**

Échantillons :

7, avenue du Doyenné,  
LYON-SAINT-JEAN.

Tél. 25-35.

## THIOCITRAN THÉVENOT

Granulé soluble.

**Citrates — Soufre — Magnésium — Peptone.**

**Composition.** — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

**Propriétés.** — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

**Indications.** — Affections du foie et des voies biliaires, Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 19 fr. 70.

**Laboratoire THÉVENOT**  
DIJON.

## THIOCOL « ROCHE »

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 g. de Thiocol « Roche » = 0 g. 52 de gaïacol cristallisé.

### Doses et modes d'emploi :

*SIROP « ROCHE » au Thiocol.*

(1 cuill. à soupe = 1 g. Thiocol « Roche »)  
*Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.  
*Enfants* : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

*CACHETS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 cachet = 0 g. 50 Thiocol « Roche »)  
 2 à 4 cachets par jour.

*COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 comprimé = 0 g. 50 Thiocol « Roche »)  
 2 à 4 comprimés par jour.

### Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eueptique, Orexique.

### Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n° 504-50 (poudre), 504-51 (sirop), 504-48 (cachets), 504-49 (comprimés).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Archives 91-10)

## THIODACAÏNE MIDY

Boîte de 4 ampoules injectables.

### Composition :

Thiocarbamide .....	20 mmg. (42 % de soufre actif, soit 1 cgr.)
Iodazine M .....	100 mmg. (64 % d'iode libre, soit 6 cgr. 4)
Dunacaine .....	100 mmg.

Pour une ampoule de 20 cc.

**Dose et mode d'emploi.** — Série de 1 à 6 injections *localisées*, une injection tous les 2 ou 3 jours. Jamais d'accident de résorption.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédation immédiate et définitive de la douleur rhumatismale.

**Indications.** — Arthrites et péri-arthrites, Algies rhumatismales, Névrites, Lumbagos, Sciatiques, Algies cervico-brachiales, Névralgies intercostales, Coxarthrie, Talalgie, Lipo-arthrite sèche du genou.

**Prix :** 31 fr. 40. Durée du traitement : 10 à 20 jours.

### Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées).



## THIODÉRAZINE MIDY

Ampoules et gouttes.

**Composition.** — Thiocarbamide (soufre organique), Iodazine M. (iode organique), Pipérazine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Amélioration du terrain rhumatismal, Suppression de la douleur et de l'impotence.

**Indications.** — Rhumatisme chronique généralisé, Arthrites, Arthroses. Rhumatisme chronique localisé, Périarthrites, Coxarthrie, Rhumatisme vertébral, Spondylose rhizomélique ankylosante, Rhumatisme déformant des mains et des pieds. Toutes névrites et myalgies rhumatismales.

### Mode d'emploi :

1<sup>o</sup> *Ampoules* : série de 8 à 15 injections tous les jours ou tous les deux jours, intramusculaires, sous-cutanées ou intraveineuses. Jamais d'accident de résorption.

2<sup>o</sup> *Gouttes* : XX à XXX gouttes deux fois par jour. La cure peut être poursuivie sans aucun inconvénient pendant plusieurs mois, avec une semaine d'interruption tous les mois.

**Prix :** Ampoules : 28 fr. 80. Gouttes : 21 fr. 10.

**Durée du traitement.** — 10 à 20 jours.

### Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
 (Tél. : Wagram 51-10, + lignes groupées).

## THIO-GOUDRON

**Composition.** — Pâte de zinc alliée au soufre et au goudron de houille rigoureusement purs.

Antiprurigineux et décongestionnant.

**Indications.** — Eczémas torpides et chroniques, Dartres et dermatoses.

**Emploi.** — Étendre sans masser une couche mince sur les lésions, recouvrir sans serrer d'une seule épaisseur de toile usée ou de gaze. Pour le nettoyage, employer un coton imbibé d'huile de paraffine ou toute autre huile.

**Prix :** 13 fr. 20 le tube de 35 gr.

**Laboratoires CEBE**

J. CHOL, Pharmacien, ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Lyon.

SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

(Tél. : 18.)

Échantillons sur simple demande.

## THIONAÏODINE

(Comprimés glutinisés de)

**Composition.** — Complexe I-S-Mg associé aux sels de Lithine et à la Vitamine B<sub>1</sub>.

**Formule.** — Chaque comprimé contient :

S <sup>2</sup> O <sup>3</sup> Mg.....	0 gr. 20
NaI stabilisé Logeais....	0 gr. 04
Théobrominate de Lithine.	0 gr. 02
Benzoate de Lithine ....	0 gr. 02
Vitamine B <sub>1</sub> .....	45 U. I. = 0 mgr. 15

**Propriétés.** — *Antalgiques* de l'iodure de sodium ; *Neuro-sédatives* de l'ion magnésium ; *Antinévritiques* et *antialgiques* de la Vitamine B<sub>1</sub> ; *Antirhumatismales*, par le soufre labile de S<sup>2</sup>O<sup>3</sup>Mg et l'iode de NaI ; *Désensibilisantes*, antianaphylactiques, neurosédatives, stimulantes de l'activité hépatique par S<sup>2</sup>O<sup>3</sup>Mg ; *Uricolytiques* des sels de Lithine.

### Indications :

- 1° *Toutes algies rhumatismales et rhumatismes chroniques* : cure d'entretien et de complément de la maladie rhumatismale chronique entre les séries de *Thionatodine injectable*, préparatoire à la cure hydro-minérale (eaux sulfureuses) et complément de celle-ci, arthritisme, etc.
- 2° *Voies respiratoires* : pharyngites, bronchites chroniques, scléroses bronchiques, asthme, emphyseme, catarrhe naso-pharyngien, traitement préparatoire à une cure d'eaux thermales sulfureuses et son complément ;
- 3° *Insuffisance hépatique et maladies anaphylactisantes* : diarrhées post-prandiales, désintoxication par formation de sulfo-conjugués, toxémies d'origine intestinale, migraines récidivantes.
- 4° *Maladies de la nutrition*, et en particulier les troubles de la nutrition sulfurée, arthritisme, goutte, auto-intoxications etc.

**Doses.** — De 4 à 6 comprimés par jour aux repas.

**Laboratoires JACQUES LOGEAIS**

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

## THIONAÏODINE LOGEAI

### injectable.

Pour le traitement de la *maladie rhumatismale chronique*, et plus particulièrement de la *douleur rhumatismale*.

**Formule.** — Complexe *iode-soufre-magnésium*, sous forme de combinaison en solution aqueuse de NaI Logeais et de  $S^4O^{6}Mg$ , à l'exclusion de tout autre analgésique et de tout stupéfiant.

1° *Thionatodine A* intramusc. 2 % NaI et 1 %  $S^4O^{6}Mg$ .

2° *Thionatodine B* intrav. 5 % NaI et 5 %  $S^4O^{6}Mg$ .

3° *Comprimés* (voir : *Thionatodine comprimés glutinisés*).

#### Formes :

*Thionatodine A* { 6 ampoules de 5 cc.  
6 — 10 cc.

*Thionatodine B* : 6 ampoules de 10 cc.

**Propriétés.** — Grâce à ses trois principes actifs : antirhumatismal (S), antalgique (NaI) et neuro-sédatif (Mg), la *Thionatodine* réalise la médication injectable la plus puissante de tous les syndromes douloureux aigus ou chroniques et spécialement de la douleur rhumatismale.

*Tolérance parfaite. Atoxicité absolue.*

La *Thionatodine A* en injections intramusculaires lentes est parfaitement indolore et dénuée de réactions secondaires, comme la *Thionatodine B*.

**Indications.** — *Rhumatisme chronique*, et plus particulièrement *douleur rhumatismale*.

*Thionatodine A* : toutes douleurs rhumatismales, sciatiques, rhumatisme chronique, algies rhumatismales, arthrites et périarthrites douloureuses, etc.

*Thionatodine B* : tous syndromes douloureux aigus ou chroniques, zonas, névrites, névralgies faciales, cervico-brachiales, intercostales, algies postencéphaliques, radiculalgies, etc.

#### Posologie :

*Thionatodine A* : de 5 à 20 cc. par jour, dans une masse musculaire quelconque, jusqu'à sédation rapidement obtenue.

*Thionatodine B* : de 10 à 40 cc. par jour, en intraveineuses très lentes. Peut être administrée aux enfants : demi-doses jusqu'à 10 ans ; deux tiers de doses de 10 à 15 ans.

**Contre-indications.** — Celles de l'iode chez certains bacillaires et celles des intraveineuses.

Laboratoires JACQUES LOGEAI

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

## THIOPHAN

(ex RHUMOFAN)

Cachets.

#### Composition :

Acide phénylcinchoninique.....	0 gr. 25
Soufre colloïdal Dausse.....	0 gr. 20
Magnésium (seas).....	0 gr. 15
Lithium (sels).....	0 gr. 10

pour un cachet

**Indications.** — Rhumatismes : goutteux, articulaires, musculaires, aigus ou chroniques ; Arthritisme, Artériosclérose, Sciatique, Névrites et toutes manifestations uricémiques.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cachets par jour progressivement, puis dégressivement, pris seuls ou deux par deux dans un verre d'eau ou d'eau minérale, soit le matin à jeun de préférence (pris à la dose de 1 ou 2 cachets pour traitement de base des états chroniques ; 20 jours de traitement : repos égal et recommencer) ; soit au début des principaux repas de préférence (pris à la dose de 4 à 6 cachets par jour : états aigus).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-2.

Prix : 23 fr. 70 toutes taxes comprises. Ar. 2099-6/2/42.

#### Laboratoires OPOS-TOULOUSE

Pharmaciens HOMPS, 13 et 15 bis, rue Matabiau.

(Té. : 253-97.)

## THIOPHYL

**Composition.** — Association à la médication sulfureuse ( $H^2S$ ) et à l'étain, antistaphylococciques, des équilibrants humoraux Ca, Mg, K, Na, du charbon activé et de la magnésie calcinée légère.

**Avantages :** Disparition rapide de la douleur. Régression des phénomènes inflammatoires dès le 3<sup>e</sup> jour.

**Indications.** — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, Anthrax, Acné, Folliculites.

**Posologie et Mode d'emploi.** — Prendre entre les repas :

3 fois une pilule le premier jour.

Augmenter d'une pilule par jour et par prise, jusqu'à 3 fois 3 pilules par jour du 6<sup>e</sup> au 12<sup>e</sup> jour.

**Présentation et Prix.** — Le flacon de 100 pilules pour une cure complète : 26 fr. 90.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS.

(Tél. : Nord 76-85.)

## THIOPON

*Composé naturel soufré à caractère éthyléno-sulfonique. Catalyseur d'assimilation soufrée et générateur de glutathion.*

Le S du Thiopon est un soufre naturel entièrement neutre non oxydé. Partie intégrante d'une molécule organique, il tire ses remarquables propriétés de l'extrême mobilité de sa molécule, mobilité due à la présence de nombreuses liaisons éthyléniques, ce qui lui confère le pouvoir de fixer son soufre pour ainsi dire à l'état naissant sans réaction ni choc sur la cellule vivante.

Aucune contre-indication. Aucune toxicité. Injections indolores et athermiques.

**Indications.** — Rhumatismes. Affections pulmonaires. Affections des muqueuses : Gynécologie, O. R. L. Traitement préparatoire et complémentaire des cures thermales sulfurées. Décongestif pulmonaire et pelvien. Hypertension. Dermatoses. Insuffisances hépatiques et surrénaliennes. Adjuvant des traitements par les sels d'or, bismuth, mercure, arsenic. Intoxications diverses.

### Présentation. Posologie.

**Ampoules :** Boîte de 6 ampoules de 2 cc. Chaque ampoule contient 48 mgr. de S sous forme d'huile soufrée naturelle éthyléno-sulfonique.

**Prix :** 35 francs.

Injections intra-musculaires tous les 2 jours.

**Pilules :** Boîte de 50 pilules. Chaque pilule contient 3 mgr. 6 de S sous forme d'huile soufrée naturelle éthyléno-sulfonique.

**Prix :** 21 fr. 25.

Adultes : 2 à 6 par jour. — Enfants : 1 à 2 par jour.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n°s 672-2-3-4.

### Laboratoire Émile ROUX

Ancien Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris,

26, rue des Petits-Champs — PARIS (II<sup>e</sup>).

(Tél. : Richelieu 86-09.)

## THIOSÉDAL BORNE

**Composition.** — Sirop et Comprimés.  
1 cuillerée à café contient : Thiocol, 0,10 cgr.; Codéthyline, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame, 0,005 mmg.

1 comprimé contient : Thiocol, 0,10 cgr.; Codéthyline, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame, 0,01 cgr.

**Action pharmacologique.** — Par le Thiocol antiseptique pulmonaire, par la Codéthyline sédatif puissant de toutes les Toux.

**Indications.** — Toutes affections broncho-pulmonaires, Toux nerveuses et d'irritation, Toux des cardiaques, Insomnies, spasmes; Tuberculose, bronchites chroniques, Asthme, Emphysème.

**Avantages.** — Sans accoutumance, sans constipation, sans intolérance gastrique.

### Mode d'emploi :

**Adultes.** — Sirop : 3 fois 2 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 3 fois 2 comprimés par jour.

Toux rebelles :

3 cuillerées à soupe par jour.

3 fois 3 comprimés par jour.

**Enfants :** 2 à 4 cuillerées à café par jour selon l'âge.

**Présentation.** — Sirop : flacon de 30 cuillerées à café : 19 fr. 90.

Comprimés : boîte de poche de 40 comprimés : 18 fr. 70.

**Laboratoires M. BORNE, Pharmacien,**  
Fournisseurs des Hôpitaux et des Ministères  
des Colonies et de la Marine.

24, rue des Ursulines  
SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)



## THIOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

**Propriétés thérapeutiques.** — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** 4 cuillerées à dessert par jour.

**Enfants :** A partir de 3 ans : (4 cuillerées à café par jour, à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

**Nourrissons :** XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Prix : 21 fr. 70.

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.**  
à PRÉMERY (Nièvre),

## THIOXYOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

**Composition.** — Sodium thioélaïdinosulfonate, Zincum Oxidatum calibré chimiquement pur 999 pour 1 000 prix liquida depurata.

**Propriétés.** — Le *Thioxyol*, pâte réductrice très active.

**Indications.** — Eczémas secs, squameux, jambiers pré- ou post-ulcéreux. Eczémas. Psoriasis, parakératoses, prurit circonscrit avec lichénification, trichophytie.

**Mode d'emploi.** — Après déterision à l'éther, appliquer en couche très mince et ne laisser sur les lésions que 24 heures au maximum. Surveiller l'action.

Demandez les brochures des Docteurs

P. et R. BOURGGRAFF :

Ulères Variqueux et Eczémas pré- et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

Filiale : Place Saint-Jacques, à EU (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injections hebdomadaires intramusculaires indolores.

### Ses indications. Sa posologie.

**Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciatique, Spondylose Rhizomélisque :** 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 unités par 50 unités, ne pas dépasser l'activité 300.

**Leucémie. Lymphadénie, Maladie de Hodgkin :** 5 piqûres consécutives à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 unités.

Prix suivant dosage.

Le THORIX (médicament à décroissance rapide) se prépare une fois par semaine.

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris et banlieue, et le jeudi en Province.

Il est donc indispensable de passer les commandes le **lundi au plus tard.**

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 466-11.

### Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-89, 18-41. — R. C. Seine 255-068 B.)

## THYMÉPHÉDRINE

Gouttes nasales à l'éphédrine.

### Formule :

Ephédrine ..... 0,01

Thymol ..... 0,4

Gaïacol ..... 0,05

Essence Niaouli ..... 2

Excipient ..... Q. S. pour 100 gr.

**Indications.** — Toutes les affections rhinopharyngées, rhume, grippe, rhume des foins, coqueluche.

**Posologie.** — IV à VIII gouttes dans chaque narine de 4 à 8 fois par jour. Aspirer fortement.

Prix : 18 fr. 75.

### Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon. 04-61.)

## THYMO-CHROME

**Forme et présentation.** — Pommade Bactéricide, Kératoplastique Cicatrisante, à 2 % de dibromomercuri-fluorescéine, Thymol et Essences Aromatiques.

**Propriétés thérapeutiques.** — Préparé d'après les dernières données de la dermatologie, le THYMO-CHROME contient tous les principes actifs susceptibles d'agir sur la lésion cutanée en tant que : Anti-septique, Modificateur du pH local, Cicatrisant.

**Indications.** — Traitement de toutes les dermatoses infectées, aiguës et chroniques, plaies atones, ulcères, eczémas suintants, érythèmes des nouveau-nés, piqûres d'insectes et en général de toutes les manifestations cutanées dans lesquelles il y a intérêt à détruire les micro-organismes et leurs toxines, à suractiver la régénération des tissus et à hâter l'épidermisation.

Prix : 17 fr. 90.

Laboratoires **SAPOREX, S. A. R. L.**

184, route de Genas — LYON (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Villeurbanne 93-88.)

## THYROCALCINE

Recalcifiant irradié.

**Forme.** — Granulé.

**Indications.** — Rachitisme, Grossesse, Allaitement, Pré-tuberculose, Anémies, etc.

**Formule.** — Inosito-hexaphosphates de Ca et Mg, 3,30 ; Gluconate de Chaux, 7,70 ; Phosphate tricalcique, 15 ; Extrait de Malt, 1 ; Chlorure de Manganèse, 0,02 ; Oxalate de Fer, 0,02 ; Levure de Bière, 0,05 ; Ergostérol, 0,025 ; Adrénaline, 0,006 ; Cacao, 8 ; Sucre, Q. S. pour 100 grammes.

**Posologie.** — *Bébé*s : 1 demi-cuillerée à café par jour dissoute dans un peu d'eau ou de lait.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour dissoutes dans un peu d'eau.

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires de **V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.

MONTREUIL-PARIS.

## THYROÏDINE BOUTY

**Composition.** — Poudre de corps thyroïde desséché à froid sous vide profond. Cette poudre est standardisée et biologiquement contrôlée selon les conditions exigées par le Laboratoire national de Contrôle des médicaments ; il est procédé, pour chaque lot numéroté, aux essais et titrage en iode tyroxinien.

Chaque produit porte le label du contrôle de son lot de poudre.

**Indications.** — Myxœdème, Crétinisme, Hypothyroïdisme, Incontinence d'urine. Certaines formes de somnolence pathologiques, Narcolepsie. Tous les cas où le métabolisme basal doit être activé. Obésité, Rhumatismes.

(Edèmes, Néphrites, Néphroses lipidiques, Troubles de la circulation sanguine, Thrombose, Embolies, Engelures, Erythrocytose).

**Formes.** — Dragées, Ampoules (hypodermie), Liqueur.

### Posologie :

*Adultes* : de 1 à 3 dragées par jour (dosage d'une dragée = 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché).

*Enfants* : prescrire la liqueur, dont une cuillerée à café contient 0 gr. 02 de corps thyroïde desséché.

Laboratoires **BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

## THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

**Ampoules** (boîte de 6) : une ampoule de 1 cm<sup>3</sup> = 1 milligr. de thyroxine.

**Comprimés** (flacon de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

**Solution** (flacon de 15 cm<sup>3</sup>) : 1 cm<sup>3</sup> = 2 milligr. de thyroxine.

### Indications :

Obésité générale, Myxœdème, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

### Modes d'emploi et doses :

**Voie buccale** : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

**Voie intramusculaire** : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 504-52 (ampoules), 504-53 (comprimés), 504-57 (solution).

### Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Archives 91-10)

## TIODINE COGNET

C<sup>4</sup>SN<sup>2</sup>H<sup>11</sup>I

**Propriétés.** — Réalisé l'Association *Iode-soufre*, par la Thiosinamine Iodée, combinaison organique soluble. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Anti-soléux.**

**Composition.** — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %), avec la thiosinamine.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du soufre ensemble ou séparément. **Toutes scléroses.** Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabes, Scléroses médullaires, Asthme, Emphysème, Syphilis, etc.

**Formes et posologie.** — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 3 à 6 par jour. *Enfants* : 1 à 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, de préférence).

**Prix au public :** Pilules — Le flacon : 18 fr. 20.  
Ampoules — La boîte : 20 francs.  
15 jours de traitement environ.

Laboratoires Armingeat et C<sup>ie</sup>

43, rue de Saintonge — PARIS (ARC. 15-10).

## TISANE BORKOU

**Principaux composants.** — Boldo, Chien-dent, Uva Ursi, Frêne, Pariétaire, Bourdaine, Réglisse, Menthe.

**Propriétés.** — Diurétique, Hépatique, Laxative, Digestive, Rafratchissante, Déplicative.

**Indications.** — Congestion du Foie, Constipation, Migraines, Maladies de Peau, Digestions difficiles.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 ou 2 cuillerées à café par tasse d'infusion, le matin à jeun ou après le repas du soir. — *Enfants* au-dessus de 5 ans : un quart ou une demi-cuillerée à café selon l'âge.

Prix : 7 fr. 70.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## TISANE HÉPATIQUE DAUSSE

**Composition.** — Combretum et Boldo, associés aux stomachiques végétaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication cholagogue, provoquant par drainage la désinfection des voies biliaires.

**Indications.** — Lithiase biliaire, cholécystites, congestion hépatique, ictère et tous accidents de l'hépatisme.

**Mode d'emplol.** — 1 à 2 tasses à café, le soir au moment de se coucher.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

## TITANE COIRRE

(Anhydride Titanique pur à 99 %.)

**Thérapeutique gastro-intestinale.**

Préparé spécialement pour l'usage interne, il réalise un pansement gastro-intestinal excellent grâce à son pouvoir couvrant exceptionnel, à sa parfaite insolubilité, à la forme particulière de ses cristaux d'une taille d'environ 1/1000<sup>e</sup> de millimètre à angles arrondis ne pouvant léser la muqueuse.

**Mode d'emploi.** — Délayer avec soin la dose prescrite dans un demi-verre d'eau. Il se forme un lait homogène, que l'on boit immédiatement. Etant parfaitement insoluble, le TITANE ingéré est éliminé par les selles et communique à celles-ci une teinte plus ou moins blanchâtre, qui dure généralement plusieurs jours.

**Indications et Posologie.** — *Affections gastriques* : ulcères gastro-duodénaux, gastrites, aérophagies, dyspepsies.

2 cuillerées à café le matin à jeun, 1 cuillerée à café au début des douleurs.

Traitement d'entretien : 2 cuillerées à café le matin à jeun par période de 15 jours chaque mois.

*Affections intestinales aiguës* : diarrhées, dysenteries, intoxications intestinales.

2 cuillerées à café dès le début de la diarrhée, 1 cuillerée à café aux repas de midi et du soir.

*Affections intestinales chroniques* : entéro-colites, recto-colites, fermentations intestinales.

2 cuillerées à café à jeun tous les matins par périodes de 10 jours séparées par un intervalle de 10 jours de repos.

*Enfants* : Demi-doses.

**COIRRE, Pharmaciens**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Téléphone : Ségur 02-79

## TOLEM LE PERDRIEL

**Composition.** — Émulsion de baume de Tolu titrée à 2 p. 100.

**Indications.** — Traitement des affections des voies respiratoires (laryngites, trachéites, grippe, coqueluche, emphyseme, bronchectasie, bronchorrhée des tuberculeux) et des maladies chroniques de l'appareil urinaire (cystites, pyélonéphrites, bactériurie, troubles entéro-urinaires, complication de l'hypertrophie de la prostate).

**Doses.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau ou de tisane sucrées.

### Laboratoires LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 08-73.)

## TONIBIASE

Véritable pourvoyeur d'Énergie intellectuelle et musculaire.

Aliment vital de la cellule nerveuse.

**Trois présentations :**  
Comprimés, Elixir, Sirop.

Par suite des événements, nous ne pouvons livrer, momentanément, que la forme **Comprimés**.

**Indications.** — Anémies, Surmenage, Dépressions nerveuses et mentales, Neurasthénie, Convalescence, Manque d'appétit, Tuberculose, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Période d'entraînement de préparation à des examens ou concours.

**Comprimés.** — Formule pour un comprimé :

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie .....	0 gr. 25
Globinate de manganèse .....	0 gr. 005
Fluorure de sodium .....	0 gr. 005
Cerveau poudre .....	0 gr. 060
Moelle épinière poudre .....	0 gr. 080
Vitamine B <sub>1</sub> cristallisée .....	30 U. I.
Vitamine D cristallisée .....	200 U. I.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

*Enfants* : 1/2 dose de l'adulte.

La boîte de comprimés assure 10 jours de traitement,

### Élixir.

**Composition.** — Phosphore, iode, manganèse, fluor, matéine, jus de raisin.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe avant chacun des deux principaux repas.

### Sirop.

**Composition.** — Fer, manganèse, arsenic, iode, tanin, phosphate et glycérophosphate de chaux, sirop à la framboise.

Convenant de préférence aux enfants.

**Posologie.** — *Adultes et Adolescents* : 1 cuillerée à soupe, avant chacun des deux principaux repas.

*Enfants* : par cuillerée à dessert ou à café selon l'âge.

TONIBIASE est enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1495.  
Littérature et échantillons.

Laboratoires Pharmacologiques de Guyenne.

E. MONSEGU, pharmacien,

PONT-DE-LA-MAYE, près Bordeaux (Gironde).

(Tél. : 32. Le Pont-de-La-Maye.)

## TONICARDINE GONNON

### Composition :

Par granule.

Adonidine .....	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de Strophantus ...	0 gr. 001
Extrait de Scille .....	0 gr. 004

### Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

### Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

### Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine. Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

### Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas (pour 20 jours environ).

Prix public : 26 fr. 80.

### Produits GONNON

J. et O. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON

(Tél. : Franklin 36-80.)

## TONIKÉINE

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine.....	1 mg.
Cacodylate de soude .....	0,05
Glycérophosph. soude (Codex 1908).....	0,20
Eau de mer diluée, Q. S. P.....	5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer, auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

**Indications.** — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

12 ampoules de 5 cc. Prix : 28 fr. 20.

Laboratoires **LEMATTE et BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél.: Trinité 44-31. Télégr.: Chevrematte-90 - Paris.)

## TONIMALT MONT-BLANC

**Caractéristiques et composition.** — Aliment tonique, stimulant et reconstituant, composé d'extrait de malt, lait frais, sucre cristallisé, miel, cacao et substances minérales diverses.

**Propriétés et avantages.** — Présentation commode, conservation prolongée, dissolution instantanée et complète dans la plupart des liquides chauds et froids, saveur agréable, valeur nutritive incomparable, digestibilité parfaite, pouvoir calorifique élevé (plus de 4 000 calories par kilogramme), valeur biologique indiscutable.

**Principales indications.** — En raison de ses propriétés nutritives, biologiques, digestives, etc., le TONIMALT convient à tous les âges : enfants et adolescents, jeunes mères enceintes et nourrices, personnes fatiguées, surmenées, débilitées, malades et convalescents, personnes âgées, etc.

C'est un aliment complet, concentré, bien équilibré, riche en calories, diastases et vitamines, facilement et totalement assimilable, même par les estomacs les plus délicats. Malgré la présence de cacao il est, grâce au malt qu'il renferme, toujours parfaitement toléré, même par les hépatiques.

**Mode d'emploi.** — Le TONIMALT se consomme suivant le goût de chacun au petit déjeuner, au goûter, ou à toute heure de la journée. Il s'absorbe soit pur, c'est-à-dire en paillettes, soit de préférence dilué dans un liquide chaud ou froid dans lequel il se dissout instantanément. Deux à trois cuillerées à café constituent une dose normale qu'il n'y a aucun inconvénient à augmenter si un régime de suralimentation est indiqué. Sucre à volonté et éviter de faire bouillir.

**Vente.** — Pharmacies, herboristeries, maisons de régime et d'alimentation, en boîtes de 250 et 500 grammes nets.

Littérature et prix sur demande.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT — RUMILLY (Haute-Savoie).

## TONI-PANCRINOL

Tonique neuro-organique.

**Composition.** — Élixir complexe associant aux extraits de foie, rate et rein les éléments minéraux assimilables nécessaires à l'organisme (phosphore, manganèse, arsenic) et l'action excitomotrice et stimulante de l'extrait de Hoang-Nan.

**Indications.** — Asthénie passagère ou persistante, états de fatigue dus au surmenage physique ou cérébral, convalescence, amaigrissement, dépression nerveuse, neurasthénie.

**Mode d'emploi.** — Prendre avant le repas, dilué dans un peu d'eau :

*Pour les adultes :* 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.  
*Pour les enfants :* 1 à 2 cuillerées à dessert suivant l'âge.

**Présentation.** — Le flacon : 20 fr. 20.

Laboratoires du Docteur F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

## TONIQUE du Dr H. FERRÉ

Élixir reconstituant.

**Composition :**

Teinture de noix vomique .....	0,15
Arrhénal .....	0,02
Nucléinate de soude .....	0,04
Glycéro soude .....	0,30
Phosphate de soude .....	0,10
Acide phosphorique .....	0,10
Excipient.....	Q. S. p. une cuillerée à soupe.

**Propriétés et Indications.** — Stimulant des échanges nutritifs. Faiblesse générale, anémie, débilité, surmenage, dépression nerveuse, etc.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe avant les 2 repas.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

M. AUZOUX, Pharmacien

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## TONIQUE NEDA

Composition :

Phosphore ..	{ Nucléinate de soude .....	0,03
	{ Glycérophosphate de soude..	0,20
Arsenic ....	Arséniate de soude.....	0,003
Strychnine .	Teinture de Noix vomique ..	0,30
Caféine .....	Teinture de kola .....	1
Catalyseur...	Sulfate de manganèse.....	0,02
Stomachique.	Elixir de Garus .....	1,50

Par cuillère à soupe.

**Propriétés.** — Tonique, Digestif.

**Indications.** — Asthénie, surmenage, convalescence, anémie, neurasthénie, inappétence.

**Présentation.** — Élixir en flacon de 400 cc. pour 15 jours de traitement : 23 francs.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires DANEY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).  
(Tél. : 27-10.)

## TONIQUE « ROCHE »

**Composition.** — Acide phosphorique, strychnine, kola, arsylène « Roche », manganèse.

**Propriétés.** — Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Redonne entraînement, bonne humeur et optimisme.

**Indications.** — Prétuberculose, Anémies, Convalescences, Asthénie, Neurasthénie, Surmenage, Adénopathies, etc.

**Posologie et modes d'emploi.** — *Adultes :*  
4 à 6 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

*Enfants* (de 8 à 15 ans) : 1/2 dose.

Flacon de 120 cm<sup>3</sup>.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-54.

Produits « ROCHE »

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).  
(Tél. : Arch. 91-10)

## TONISYSTOL

(Dragées Le Brun toni-cardiaques.)

**Composition.** — Ouabaine, Sulfate de spar-téine, Extrait d'Adonis, Extrait de Cra-tégus, Extrait de Scille.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toni-car-diaques, Diurétiques, Sédatives, de l'é-ré-thisme cardio-vasculaire, Sans accumu-lation.

**Indications.** — Insuffisance cardiaque ventri-culaire gauche et droite, Asystolie, Troubles de conduction, Tachycardie, Myocardites, Œdèmes cardiaques.

**Posologie.** — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

**Laboratoire LE BRUN**

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Kléber 71-33.)

## TONOPHOSPHANE

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Sel sodique de l'acide diméthylamino-méthylphényl-phosphinique.

**Propriétés et indications.** — Préparation phosphorée parfaitement assimilable, très active et dépourvue de toxicité. Stimulant des échanges nutritifs et tonique nervein.

Neurasthénie, anémies, anorexie, tuberculose, convales-cences, dépressions nerveuses, surmenage, déminé-ralisation, troubles de la croissance. Dans les cas aigus, la syncope, le collapsus, injecter le TONOPHOS-PHANE « FORTIUS ».

**Posologie.** — Par voie buccale : 1 comprimé après cha-cun des trois principaux repas.

Par voie sous-cutanée : 1 ampoule par jour. (Utiliser, selon les cas, la solution à 1 ou 2 %.)

**Présentation.** — Flacon de 30 comprimés à 0 gr. 10. Boîte de 10 ampoules de 1 cc. (Solution à 2 %, TONO-PHOSPHANE « FORTIUS ».)

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypo-phosphites de chaux et de fer.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 comprimés, 1 cuille-rée à café de granulé avant chaque repas.

**Injectable :** 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les 2 jours en injection intramusculaire profonde.

**Indications.** — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les états de Dénutrition, Surmenages, Troubles de la Croissance, Chlorose et Anémie.

*Fortifie sans provoquer d'excitation.*

**Prix :** Ampoules : 25 fr. 90. — Comprimés : 20 fr. 60.  
Granulé : 21 fr. 10.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-S.-SEINE.  
(Tél. : Maillot 17-75.)

## TOPHOL

(C<sup>12</sup>H<sup>11</sup>N<sup>2</sup>O.)

Acide phénylquinollique <sup>2</sup> carbonique <sup>4</sup>.

**Indications :**

Toutes les manifestations douloureuses de la dia-thèse urique : Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Goutte, Gravelle, Arthrites fébriles et déformantes, Névralgies, Sciatique, Lumbago.

**Posologie et mode d'emploi :**

Présenté en cachets et comprimés dosés à 0 gr. 50. Suivant le cas, le TOPHOL se prend à la dose de 1 à 6 cachets ou comprimés par jour, dans de l'eau alcaline, aux repas.

Dès l'effet obtenu, diminuer progressivement la dose de 1 à 2 cachets ou comprimés par jour.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires du TOPHOL**

3, rue Condillac — GRENOBLE (Isère).



## TORANTIL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Extrait de muqueuse intestinale.

**Propriétés et indications.** — Neutralise les corps de la nature de l'histamine qui provoquent des manifestations allergiques. Colite, Gastrite, Troubles gastro-intestinaux, Hépatiques et Cholangitiques d'origine allergique, Asthme bronchique, Eczéma, Urticaire, Acné.

**Posologie.** — Avaler 3 à 9 dragées par jour, avant les repas.

**Présentation.** — Flacon de 20 dragées à 5 unités anti-histamine.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THÉRAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## TOTAL MAGNÉSIE

**Composition.** — Chlorure de magnésium déshydraté en association synergique avec les sels halogénés du magnésium.

**Indications.** — Sénilité, Asthénies, Adénomes prostatiques, Verrues, Troubles hépato-biliaires, Cytophylaxie.

### Présentation et prix :

**Granulé :** Un flacon de 60 grammes : 18 fr. 30.  
**Comprimés :** Un flacon de 100 comprimés : 20 fr. 20.  
**Dragées :** Un flacon de 100 dragées : 20 fr. 20.

### Posologie :

**Granulé :** 2 cuillères-mesures par jour.  
**Comprimés :** 2 par jour.  
**Dragées :** 4 par jour.  
La cuillère-mesure jointe au flacon de TOTAL MAGNÉSIE représente, pleine, environ 0 gr. 60.

### Laboratoires du Total Magnésien.

24, boulevard Sébastopol — PARIS.  
(Tél. : Turbigo 62-30, lignes groupées.)

## TOTAL VITAL

Un *cachet* ou  
une cuillerée à soupe de *granulé*  
renferment

0 gr. 50 d'inositohexaphosphate de Ca et de Mg, plus des glycérophosphates et des sels organiques de Fer, d'Arsenic, de Manganèse.

**Indications.** — Fatigue, anorexie, amaigrissement, sous-alimentation, troubles de la lactation, tuberculose, rachitisme.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cachets ou 2 cuillerées à soupe de granulé par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café ou à dessert par jour selon l'âge.

Prix : 25 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1689-1.

### Laboratoire du Docteur J. LEFÈVRE

Docteur en médecine, Pharmacien,  
Ex-interne en Pharmacie des Hôpitaux de Paris.  
200, rue du Faubourg-Saint-Martin  
PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 01-09.)

## TOT' COBRA

(Cobra total.)

Soluté colloïdal injectable de venin de cobra non filtré.

**Indications.** — *Traitement des algies en général* (néoplasiques, rhumatismales, sciatiques, trigéminales, radiculaires, etc.).

*Action vaso-dilatatrice des capillaires* (traitement de certaines affections vasculaires du fond de l'œil, de l'hypertension artérielle, de certains syndromes azotémiques et hyperpolypeptidémiques, de la migraine, de l'épilepsie, de l'éclampsie).

*Action sur l'état général des cancéreux et des tuberculeux.*

**Mode d'emploi.** — En injections dans les muscles du triceps brachial, à raison d'une ampoule tous les trois jours.

**Prix :** Boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 30 fr. 45.  
— 12 — 1 cc. : 54 fr. 85.

Contenant chacune 1/10<sup>e</sup> de mmg. de Venin, soit 1 unité souris.

### Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Suffren 46-57.)

## TOT'HAMÉLIS

**Composition.** — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

**Indications.** — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. États congestifs, Hypertension.

**Posologie.** — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Prix :

*Comprimés, Cachets* : 20 francs.  
(pour 15 jours de traitement).

*Suppositoires*  
(boîte de dix) : 20 francs.

## INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

ARCUEIL (Seine).

## TOT'HARLEM

**Forme et présentation.** — Capsules de 0 gr. 15 d'huile de Haarlem vraie, pure, d'origine, associée au Boldo. Artichaut et Salicylate d'hexaméthylène-tétramine.

### Propriétés thérapeutiques :

**Foie** : Antiseptique hépatique, Cholagogue, Cholagène, décongestif, dissolvant les calculs et fluidifiant la bile.  
**Reins** : Antiseptique rénal, diurétique, décongestif, dissolvant les calculs.

### Indications :

**Foie** : Lithiases biliaires, Ictères, Angiocholites, Angiocholécystites, Cholécystites, Colibacilloses.  
**Reins** : Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Gravelle, Goutte, Uricémie, Colibacillurie.

### Posologie :

*Affections aiguës* : 2 à 4 capsules par jour.

*Affections chroniques* : 1 à 2 capsules au milieu des principaux repas.

Prix : 21 fr. 20.

Laboratoires **SAPOREX S. A R. L.**

184, route de Genas — LYON (III<sup>e</sup>).

## TOT'HÉMA

**HÉMATOPOLÉTIQUE TOTAL.**

**Composition.** — *Tot'Héma* renferme sous une forme assimilable la totalité des éléments nécessaires à la régénération sanguine, associés à un tonique de la cellule nerveuse, soit :

- 1° Acides aminés (histidine et tryptophane) obtenus par photoclase d'un lysat globulaire désalbuminé (communication à l'Académie de médecine de Paris, 21 mai 1935) ;
- 2° Caséinates de fer, de cuivre, de manganèse (sels ionisables) ;
- 3° Inositohexaphosphate de chaux et magnésie.

**Indications.** — Toutes les anémies et déficiences organiques simultanées ou consécutives.

**Présentation :**

- 1° Granulé sucré agréable au goût.
- 2° Comprimés friables.

**Mode d'emploi.** — *Granulé* : Dose moyenne : 2 cuillerées à café par jour aux repas. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient (hémorragies). Pour les jeunes enfants elle peut être ramenée à deux demi-cuillerées à café ; pour les nourrissons une demi-cuillerée à café dissoute dans un biberon.

*Comprimés* : Dose moyenne : 6 comprimés par jour.

**Prix :**

*Granulé* (pour 12 jours de traitement) : 27 fr. 60.

*Comprimés* : 23 fr. 50.

**INNOTHÉRA**

(Laboratoire CHANTEREAU)

ARCUEIL (Seine).

## TOT'HÉMA

**Forme COMPRIMÉS.**

(Présentation complémentaire.)

(Voir **TOT'HÉMA granulé**)

**Composition :**

Lysat globulaire photoclase .....	0gr,10
Caséinate de fer.....	0gr,10
— de manganèse .....	0gr,005
— de cuivre .....	0gr,001
Inosito hexaphosphate de chaux et magnésie .....	0gr,10

(Pour un comprimé.)

**Avantages.** — Médication apportant à l'organisme, en proportions équilibrées, sous une forme pratique, la totalité des éléments nécessaires à la régénération sanguine : *histidine, tryptophane* (lysate globulaire), minéraux assimilables.

*Conservation indéfinie sous tous les climats.*

**Indications.** — Toutes les anémies, convalescences, surmenages.

**Mode d'emploi.** — 3 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 23 fr. 50.

**INNOTHÉRA**

(Laboratoire CHANTEREAU)

ARCUEIL (Seine).

## TOTI-PHOS

Équilibre du pH humoral.

Médication phosphorée à base de sels acidifiants ou radicaux acides phosphatés. Complexe qui remplace avantageusement l'acide phosphorique, dont il possède toutes les propriétés et aucun des inconvénients.

**Principes actifs.** — Phosphate di-acide de calcium, Phosphate di-acide de magnésium, Phosphate di-acide de sodium, Phosphate di-acide de lithium. Ne contient aucun antifixateur du calcium (ni manganèse, ni fer).

**Indications.** — *Dépressions musculaires, cérébrales, nerveuses.* Convalescence. Trouble provenant de la déminéralisation : grossesse, allaitement, dentition. Colibacillose. Alcalose. Déséquilibre acido-basique. États arthritiques. Tuberculosés. Anémies nerveuses, neurasthénie, anxiété.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 5 cc. à prendre au milieu des repas dans un verre d'eau sucrée, coupée de vin blanc ou édulcorée par un jus de fruit.

*Adultes :* 2 à 4 ampoules par 24 heures.

*Enfants :* 1 à 2 ampoules selon l'âge.

Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M., n° 403-45.

Laboratoire du TOTI-PHOS

81, rue de la Roquette — PARIS (XI°).

## TOT'OLEA

**Thérapeutique Hypotensive et Diurétique.**

**Composition.** — A base d'extrait total de feuilles fraîches d'olivier préparé à froid.

**Indications.** — Hypertension artérielle et ses manifestations habituelles. Troubles circulatoires de la ménopause et de la cinquantaine.

**Posologie.** — 4 comprimés par jour pris à raison de 2 le matin à jeun et 2 le soir en se couchant : prendre en même temps une grande tasse d'infusion chaude légère.

Éventuellement commencer par 6 comprimés par jour.

Aucune contre-indication.

**Prix :** Le flacon de 50 comprimés : 24 fr. 80.

Laboratoires DERNIS

12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Tru. 09-64.)

## TRAITEMENT AMBULATOIRE

du Praticien.

**Indications.** — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué sur les ulcères de jambes par le médecin. Au moment des périodes aiguës des affections suivantes : phlébites, septicémie veineuse, périphlébites ou ulcères trop infectés, il serait prudent de surseoir à l'application du traitement.

**Propriétés.** — L'application de cette méthode suivant les concepts de P. Bourgraff assure :

- 1° La reprise obligatoire de l'activité du malade dès l'institution du traitement ;
- 2° La suppression complète des douleurs dues à l'ulcère de jambe, et partant la disparition de l'insomnie ;
- 3° La guérison rapide de l'ulcère (dans la généralité en quelques semaines).

**Présentation.** — *En raison de l'interdiction du double emballage, nous avons dû momentanément supprimer notre coffret. Nous prions MM. les Médecins d'ordonner article par article.*

- 1 flacon *Aryol* (Poudre noire) ;
- 1 pot grand modèle *Bioxyl* (pâte blanche) ;
- 1 pot grand modèle *Oxythylol* (pâte grise) ;
- 1 Bande du Praticien.

**Aviz important.** — Chacun des éléments énoncés ci-dessus peut être prescrit séparément. Prière de se reporter aux textes correspondants.

**Technique.** — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué en suivant rigoureusement les instructions de la littérature publiée à ce sujet par les Laboratoires du Praticien.

Cette littérature est tenue par les Laboratoires à la disposition du Corps Médical, auquel elle est strictement réservée.

Les conditionnements ne contiennent aucun mode d'emploi.

Prière d'adresser les demandes, sur papier en-tête, aux

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODERANGE (M.-et-M.).

Filiale : Place Saint-Jacques, à Eu (Seine-Inférieure).

(Pendant toute la durée de la guerre.)

## TRAPHÉINE

**Indications.** — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, prétyphulose.

**Forme.** — Granulé fondant.

**Composition.** — Association synergique : Acide phosphorique-Ko'a caféinée avec catalyseur de chlorure de magnésium par milieu marin.

### Posologie :

**Adultes :** deux fois par jour aux principaux repas, une cuillerée à soupe dans un verre d'eau ordinaire.

**Enfants :** deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune des contre-indications habituelles chez les hépatiques.

Prix de la boîte pour un traitement d'une semaine : 19 fr. 40.

**L. GUÉRET, Pharmacien**

89, rue Martre — CLICHY (Seine). (Tél. : Per. 11-01.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1248-2.

## TRASENTINE

**Chlorhydrate de l'ester diéthylamino-éthyllique de l'acide diphenylacétique.**

### CIBA

**ANTISPASMODIQUE D'ACTION NERVEUSE ET MUSCULAIRE.**

Antispasmodique de synthèse, agissant par voie nerveuse et musculaire, possédant à la fois l'activité physiologique des alcaloïdes de la belladone (atropine) et de la papavérine sans aucun de leurs inconvénients (mydriase, tachycardie, sécheresse des muqueuses) et de toxicité très atténuée.

Traitement très efficace de tous les phénomènes algiques ou des troubles fonctionnels liés au spasme. Sans effets stupéfiants, ne déterminant pas d'accoutumance, la Trasentine peut être administrée aussi longtemps que persiste l'état douloureux ou dysfonctionnel.

**Indications.** — Tous états spasmodiques viscéraux.

**Tube digestif :** Spasme de l'œsophage, du pylore. Gastralgie, entéralgie, cœliergie. Constipation spasmodique, ténisme rectal. Coliques hépatiques, vésiculalgie. Hoquet, cholécystite.

**Voies respiratoires :** Laryngospasme. Asthme bronchique. Toux spasmodique.

**Voies urinaires :** Spasme urétral et vésical. Colique néphrétique. Cystite.

**Gynécologie, Obstétrique :** Dysménorrhée. Hypertonie utérine. Spasme du col. Vomissements de la grossesse. Spasmes vasculaires. Spasmes infantiles. Affections neurologiques.

### COMPRIMÉS — SUPPOSITOIRES

**Doses.** — **Adultes.** — Voie buccale : 1 à 2 comp. 2 à 3 fois par jour. Voie rectale : 1 à 2 suppositoires par jour.

**Enfants.** — 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte suivant l'âge.

**Formuler.** — Flacon de 20 comprimés.  
Boîte de 5 suppositoires.

**Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

## TRÉPALLIX

**Composition.** — Lactate de mercure en solution stabilisée par un procédé de laboratoire, associé à l'arséniate de soude.

**Avantages.** — Le lactate présente sur les autres sels d'hydrargyre les avantages suivants :

Ne s'accumule pas dans l'organisme ;

Est le moins toxique et, en particulier, le mieux toléré par le tube digestif ;

Est anti-diarrhéique.

**Indications.** — Syphilis acquise, ancienne : Traitement d'entretien et de consolidation.

Syphilis héréditaire : Médicament complémentaire. Médication d'attaque dans la syphilis massive du nourrisson, dans la syphilis avec organopathies spéciales (hépatiques, nerveuses, oculaires), dans la syphilis larvée.

**Gouttes Trépallix A** pour adultes, adolescents, enfants jusqu'au poids de 10 kg.

Lactate correspondant à 0,529 de l'ion métal de P. A. 200.

Arséniate de soude : 0 gr. 10 pour 100 grammes.

**Posologie « pro die ».**

Lactate *pro die*. Arséniate de soude *pro die*

*Ad.* 25 à 50 gtttes 1 ctg. à 2 ctg. 0,001 à 0,002

*Adol.* 20 à 40 — 8 mg. à 1 ctg. 6 0,0008 à 0,0016

*Enf.* 5 à 25 — 2 mg. à 1 ctg. 0,0002 à 0,001.

En deux ou trois prises dans un demi-verre d'eau sucrée ou non, aux repas.

Un flacon de *Trépallix A* contient 24 cc., correspondant à 0 gr. 126 de métal et 0 gr. 024 d'arséniate de soude par flacon.

**Gouttes Trépallix N** pour nourrissons jusqu'au poids de 10 kg.

Lactate correspondant à 0,1058 de l'ion métal de P. A. 200.

Arséniate de soude : 0 gr. 01 pour 100 grammes.

**Posologie.** — II à V gouttes par kg. et par jour, en 2 ou 3 prises, dans un peu d'eau sucrée ou dans du lait.

Enfants de	en 2 ou 3 prises <i>pro die.</i>	Lactate Hg <i>pro die.</i>	Arséniate de soude <i>pro die.</i>
3 kg. à 3 kg. 250	8 à 15 gouttes	0 mg. 6 à 1 mg. 2	0,00003 à 0,00006
3 kg. 500	9 à 18 —	0 mg. 7 à 1 mg. 4	
4 kg. 250	10 à 22 —	0 mg. 8 à 1 mg. 8	
5 kg.	12 à 25 —	1 mg. à 2 mg.	
5 kg. 500	15 à 28 —	1 mg. 2 à 2 mg. 2	0,00006 à 0,00011
6 kg.	18 à 30 —	1 mg. 4 à 2 mg. 4	
7 kg.	20 à 35 —	1 mg. 6 à 2 mg. 8	
7 kg. 500	22 à 38 —	1 mg. 8 à 3 mg.	
8 kg.	25 à 40 —	2 mg. à 3 mg. 2	0,0001 à 0,00016
8 kg. 400	28 à 42 —	2 mg. 2 à 3 mg. 4	
8 kg. 700	30 à 44 —	2 mg. 4 à 3 mg. 5	
9 kg.	32 à 45 —	2 mg. 6 à 3 mg. 6	
9 kg. 500	34 à 47 —	2 mg. 8 à 3 mg. 8	
9 kg. 850	36 à 49 —	2 mg. 9 à 3 mg. 9	0,00014 à 0,00016

Un flacon de *Trépallix N* contient 24 cc., correspondant à 0 gr. 025 de métal et à 0 gr. 0024 d'arséniate de soude par flacon.

**Prix.** — 21 fr. 95 le flacon de 24 cc. de chaque préparation, ce qui équivaut à une dépense journalière maxima de :

0 fr. 45 à 1 fr. 50 pour les doses prescrites aux nourrissons.

0 fr. 75 pour la dose de XXV gouttes aux enfants.

1 fr. 20 pour la dose de XL gouttes aux adolescents.

1 fr. 50 pour la dose de L gouttes aux adultes.

**Laboratoires SYNTHÉSIS**

45, avenue Trudaine — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trudaine 57-72.)

## TRÉPARSOL

Acide formyl méta-amino para-oxy-phényl-arsinique.

**Indications.** — Syphilis, à tout âge et à toute période. Hérédosyphilis, Dysenterie amibienne, Protozooses intestinales, Diarrhée des tuberculeux, Entérocôlites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse), Pian et toutes spirochètoses.

### Présentation et Prix :

Tube de 30 comprimés pour Adultes : Prix : 30 fr. 50.  
 — 15 — — : Prix : 18 fr. 75.  
 — 40 comprimés pour Enfants : Prix : 18 fr. 75.  
 — 60 comprimés pour Nourrissons : Prix : 15 fr. 80.

### Posologie et mode d'emploi :

**Adultes :** 1 à 4 comprimés par jour.

**Enfants :** 1 à 2 centigr. par jour et par kilogramme.

Traitement discontinu (3 à 4 jours consécutifs par semaine) et progressif (débuter par des doses faibles).

L. N. C. 463-1.

### Laboratoires L. LECOQ

14, r. Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## TRÉPHONYL

**Composition.** — Foie fœtal, extraits embryonnaires, sérum hémopoïétique.

**Indications.** — Anémies, Déficiences organiques, Troubles de la croissance, Convalescence, Cachexie, Hypogalactie.

### Présentations et prix :

Boîte de 6 amp. de 10 cc. .... 29 fr. 10  
 Boîte de 10 amp. de 6 cc. .... 29 fr. 10  
 Sirop ; flacon de 300 cc. .... 29 fr. 10  
 Coffret de 18 ampoules de 10 cc. .... 80 fr. 80

**Posologie.** — **Adultes :** 1 ou 2 amp. de 10 cc. par jour.

**Enfants :** 1 ou 2 amp. de 6 cc. par jour.

**Sirop :** 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

### Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL.

Institut de Sérothérapie Hémopoïétique.

S. A. au capital de 15 000 000 de francs.

R. C. Seine 12.384.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littre 68-22.)

## TRÉPOSITOIRES

Suppositoires à base de TRÉPOSAN  
 (Succinate de bismuth).

**Indications.** — Syphilis, Tabes, Paralysie générale, Parasitose intestinale, Oxyures.

**Composition.** — **Adultes :** 0 gr. 20 de succinate de bismuth par suppositoire.

**Enfants :** 0 gr. 10 de succinate de bismuth par suppositoire.

**Nourrissons :** 0 gr. 05 de succinate de bismuth par suppositoire.

**Posologie.** — Infections spécifiques : 3 trépositoires par semaine, le soir au coucher.

Parasitose intestinale : 1 trépositoire le soir, pendant 10 jours consécutifs, repos de 5 jours, puis nouvelle série de 10.

**Prix :** les trépositoires sont présentés en boîte de 10.

Adultes : 17 fr. 25 ; Enfants : 14 fr. 95 ;

Nourrissons : 12 fr. 65.

### Laboratoires MARONNEAU-MOREL

107, bd de la Mission-Marchand — COURBEVOIE  
 (Seine).

## TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et magnésie nécessaires à l'organisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, osseuse, Décalcification, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofuleuse, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures, Croissance.

**Doses et mode d'emploi.** — Tricalcine pure.

**Adultes :**

Poudre : 1 cuiller-mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers-mesures.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine opothérapique : 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Tricalcine injectable : 1 ampoule par jour, pendant 12 jours.

**Tricalcine irradiée :** 1 cachet ou 1 cuillerée à café de granulés.

*Enfants :* moitié de ces doses.

**Prix au public :** poudre, granulés, cachets, chocolat : comprimés : de 16 fr. 70 à 20 fr. 30 ; Méthylarsinée, adrénalinée, florée et opothérapique : 22 fr.

Irradiée : 27 fr. Injectable (12 amp.) : 24 fr. 10.

Pour traitement de 3 semaines à 1 mois. (Prière de réserver granulés et comprimés aux enfants.)

*Les derniers travaux sur le Calcium, et particulièrement ceux de H. et M. Hinglais, prouvent que son assimilation tient au rapport Calcium-Phosphore. La Tricalcine répond à ce desideratum. De plus, ce rapport est automatiquement établi par l'addition de vitamine D. La TRICALCINE IRRADIÉE est donc d'une indication toute particulière en des temps où la carence phospho-calcique est redoutable.*

**Fabrication assurée.**

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

Avant  
ou  
pendant  
chacun  
des trois  
repas.

## TRIDIGESTINE DALLOZ

**Composition.** — Ferments digestifs essentiels au maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

**Forme.** — Granulé.

**Indications.** — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

**Dose.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 21 francs.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de La Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

## TRIGLANDINE

**Composition.** — Thyroïde, hypophyse, ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

**Indications.** — Par l'administration de ces trois glandes nobles, rétablit l'équilibre d'ensemble du système endocrinien.

**Asthénies endocriniennes féminines :** Puberté, stérilité, troubles de l'appareil génital, hypertension de la ménopause et des dysendocriniens, rhumatismes endocriniens, troubles de la circulation.

Aménorrhée, oligoménorrhée, ménorrhagies.

**Formes.** — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées (ou 1 ampoule de 1 cc. ou 3 cc.) par jour, pendant 10 jours par mois environ.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.



## TRIGOSTHÈNE

(Cachets bleus apéritifs et analeptiques.)

**Composition.** — Association intime de Trigonelle Fenugrec, Rhubarbe et Gentiane, stabilisée au fluorure de Na et catalysée au sulfate de protoxyde de Manganèse (*procédé spécial*).

**Propriétés.** — Toni-reconstituant de valeur. Convoyeur d'oxygène et fixateur des graisses. Stimulant des fonctions nutritives *permis même aux hépatiques*. Ne constipe jamais.

**Indications.** — Débilisations de toute étiologie. Anémie, Anorexie, Amaigrissement, Etats pulmonaires chroniques, Lymphatisme, Grossesse et Allaitement, Convalescences, Suite d'affections coloniales, etc.

### Posologie :

2-3 cachets et plus par jour aux repas.

Boîte de 30 cachets.

Littérature et échantillons à volonté :

Laboratoire DE LA BARBIFLORE

H. ADAM, pharmacien

4, rue du Rocher — MONACO

## TRINIBAÏNE LALEUF

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine à 1/100..... II gouttes (3 cgr.).

Oubaine cristallisée ..... 1/10 de milligr.

**Propriétés et Indications.** — Remède de la défaillance du ventricule gauche. La *Trinibaïne* réalise à la fois la médication d'urgence et la médication d'entretien. C'est le remède d'urgence par excellence de l'angine de poitrine de décubitus et de l'œdème pulmonaire aigu.

**Forme.** — Dragées rouges à noyau mou.

**Posologie et mode d'emploi.** — Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

**Prix.** — L'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement) : 25 francs.

S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

## TRINITRAL LALEUF

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 cgr.).

Phényléthylmalonylurée..... 0,01

Extrait apocynum cannabinum..... 0,003

**Propriétés et indications.** — Vaso-dilatateur à action immédiate, Sedatif puissant des algies cardiothoraciques et des spasmes vasculaires.

Diurétique et cardiotonique.

Médicament de choix des angoisses précordiales, des crises douloureuses d'origine aortique ou cardiaque, des troubles fonctionnels de l'hypertension, de l'aérophagie.

**Forme.** — Dragées jaunes à noyau mou.

**Posologie et mode d'emploi.** — Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, 1 à 3 fois par jour.

Prix : 25 francs l'étui de 60 dragées (de 20 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le Médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

## TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).

Caféine..... 2 centigrammes.

**Propriétés et indications.** — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme cardiaque, l'œdème pulmonaire.

**Forme.** — Dragées blanches à noyau mou.

**Posologie et mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le Médecin traitant.)

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Trocadéro : 62-24.)

## TRINITRINE-CARÉNA

**Composition** { Trinitrine au centième..... 11 gouttes.  
Aminophylline ..... 5 cgr.

**Propriétés :**

La *trinitrine* est vaso-dilatatrice et hypotensive ; elle agit rapidement, mais assez brièvement.

*Caréna* augmente le débit coronarien et assure l'irrigation persistante du myocarde.

*Trinitrine-Caréna* associe donc l'action instantanée de la trinitrine à l'activité synergique, mais plus prolongée et toni-cardiaque de *Caréna*. Elle calme les algies cardiaques et prévient la grande insuffisance ventriculaire gauche.

**Indications :** Crises intenses d'angine de poitrine, crises algiques des cardiaques ayant des signes de défaillance du myocarde, petits spasmes artériels, extrasystoles et palpitations.

**Posologie et mode d'emploi :**

*Trinitrine-Caréna* est présentée sous forme de dragées à noyau mou, permettant l'absorption per-linguale instantanée de la *trinitrine* et son action immédiate.

**Médication d'urgence :** croquer 1, 2 ou 3 dragées, à quelques minutes d'intervalle, au moment de l'accès ou à titre préventif. Ne pas dépasser 10 dragées par jour.

**Médication d'entretien :** avaler 1 dragée, deux ou trois fois par jour.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques.**

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Invalides 43-60, 43-61, 43-62.)

## TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :  
Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).  
Chte Papavérine ..... 5 milligrammes.

**Propriétés et indications.** — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : Angine de Poitrine, Asthme cardiaque et pulmonaire, Aortites, Artérites, Urémie.

**Forme.** — Dragées roses à noyau mou.

**Posologie et mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et, par là même, une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées à quelques minutes d'intervalle, au moment ou en prévision des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

**Durée moyenne des unités de vente :** De 15 à 61<sup>h</sup> ours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public : Étui de 60 dragées : 25 fr. 80.

**Laboratoires LALEUF**

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Trocadéro : 62-24.)

## TRINITRINE ROUSSEL

**Composition :**

Comprimés n<sup>os</sup> I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100<sup>e</sup>.

**Indications :**

**Hypertension :** Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

**Doses et mode d'emploi :**

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

**Pharmacie ROUSSEL**

10, rue Washington — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 62-27.)

## TRINITRINE SIMPLE LALEUF

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à : Trinitrine à 1/100 : 1 gtte. (1 cgr.5).

**Propriétés et indications.** — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée. Médicament de choix de l'angine de poitrine.

**Forme.** — Dragées blanches à noyau mou.

**Posologie et mode d'emploi.** — La *Trinitrine Simple Laleuf* se recommande par son faible dosage (une goutte par dragée) chez les *sujets très sensibles* à la trinitrine.

**Médication d'urgence :** Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision des crises. Maximum : 20 dragées par 24 heures.

**Médication d'entretien :** Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

**Prix :** 15 francs l'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

**Laboratoires LALEUF**

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

15, rue Nicolo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). (Tél. : Troc. 62-24.)

## TRINIVÉRINE

Angine de Poitrine.

**Forme.** — Dragées vertes à noyau mou.

**Composition :**

Chlorhydrate de papavérine.....	0,005
(Vaso-dilatateur.)	
Caféine.....	0,005
(Antispasmodique.)	
Trinitrine.....	2 gouttes.
(Toni-cardiaque, vaso-dilatateur des coronaires.)	

**Indications.** — Angine de poitrine, Cardialgie des aortiques, des hypertendus, Crises vasculaires, Angio-spasme des artérites, de l'hypertension (éclipses), Asthme cardiaque.

**Mode d'emploi.** — Croquer une dragée pour prévenir ou calmer l'accès. Si nécessaire, croquer 2 ou 3 dragées à quelques minutes d'intervalle. Ne pas dépasser 10 dragées par 24 heures.

Prix : 23 fr. 50.

**MONAL**

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Invalides 52-73.)

## TRISALYL

**Indications.** — Traitement de la maladie rhumatismale. Rhumatisme articulaire aigu et toutes ses complications.

**Composition.** — Salicylates chimiquement purs de sodium, potassium et calcium, associés dans les proportions physiologiques du sérum de Ringer-Loocke.

**Propriétés.** — Le Trisalyl réalise l'association salicylée isotonique au sang, permettant l'emploi massif, continu, sans contre-indications ni intolérance, du Salicylate.

**Formes :**

**Voie buccale :** Solution dosée à 1 gr. 50 par cuillerée à soupe (250 cc.).

Comprimés glutinisés à 0 gr. 50.

**Voie veineuse :** Ampoules I. V.

8 ampoules 10 cc..... 0 gr. 50 par ampoule.

8 — 10 —..... 1 gr. — —

**Posologie :**

**Voie buccale :** à partir de 3 cuillerées à soupe, monter à 6 cuillerées pro die. Pour les comprimés de 4 à 16 en 24 heures.

**Voie veineuse :** d'abord 0 gr. 50, puis 1 gr., puis 1 gr. 50 par injection intraveineuse : 2 injections par 24 heures.

**Traitement d'entretien.** — Moitié des doses ci-dessus ; au bout d'un certain temps, n'employer que la voie buccale.

**TRAITEMENT EXTERNE ADJUVANT**

## BAUME TRISALYL

**Composition.** — Salicylate de glycol, Salicylate d'ammonium, Salicylate d'antipyrine, excipient non gras.

**Indications.** — Traitement externe des rhumatismes, lumbagos, douleurs, etc..

**Propriétés.** — Association d'un éther salicylique, absorbant non irritant, au salicylate d'analgésine, calmant et antipyrétique. Absorption favorisée par salicylate d'ammonium. Excipient non gras. S'enlève à l'eau.

**Mode d'emploi.** — Onctions douces 2 fois par jour, *in loco dolenti*.

**M. PICHON, Pharmacien**  
20, rue Lamarck, AMIENS.

## TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésie, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine et des Colonies après expérimentation.

**Propriétés Thérapeutiques.** — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue. Absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

**Originalité.** — Produit d'une innocuité parfaite assurant, en même temps, l'évacuation des canaux biliaires et la désinfection des voies digestives, biliaires et urinaires. Contient une forte proportion de citrate de soude, lequel agit très heureusement sur le foie et les voies digestives, fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant pour l'intestin, se transforme en carbonate dans l'organisme et, avec les benzoates de soude et de lithine, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le pH biliaire dans le sens de l'alkalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

**Indications.** — Infections des voies digestives, biliaires et urinaires. Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences (cholécystite, colibacillose, lithiase biliaire, entérite, cystites, furonculose, etc...) Séquelles fonctionnelles de la cholécystectomie.

**Posologie habituelle :**

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu de'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Tube de 80 gr. de granulé (10 jours env. de traitement). Prix : 21 fr.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 699-1.

Laboratoires G. LAMBERT, D. & Co, Docteur en Pharmacie  
rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54).

## TRISODYL ROZET

Hypotenseur Antisccléreux.

**Composition (dose quotidienne moyenne) :**

Nitrite de soude chimiq. pur. .... 0 gr. 20

Silicate de soude chimiq. pur. .... 2 gr.

Citrate de soude chimiq. pur. .... 4 gr.

**Forme pharmaceutique et posologie.** — Comprimés : 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

**Action.** — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artérioles et les Capillaires (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (Silicate de soude). Ramène à la normale la coagulabilité et la viscosité sanguines (Citrate de soude).

**Indications.** — Hypertension artérielle, Artériosclérose, États pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, Aortites, etc.

**Prix :** 26 fr. 30 la boîte de comprimés pour un traitement d'un mois environ.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET

BENDERITTER

VENDOME (Loir-et-Cher).

## TROPHOCALCINE

Traitement et cicatrisation des plaies.

Utilisation du pouvoir eutrophique des sels insolubles de calcium à l'état naissant.

Traitement véritablement spécifique des plaies dont on veut activer ou déterminer la cicatrisation : brûlures, gelures, plaies atones, ulcéreuses et cancéreuses, ulcères de toute nature, particulièrement variqueux, escarres, radio-dermites, radionécroses.

Laboratoires DEXO]

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

## TRYNOL

(Comprimés.)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien. (Boîte de 50 comprimés.)

**Propriétés et avantages.** — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères, en empêchant les formations scléreuses.

**Indications.** — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

**Prescription.** — 1 boîte comprimés Trynol.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>). (Tél. : Étoile 18-26.)

## TUBERCULINES DE L'INSTITUT MÉRIEUX

**Cuti-réaction.** — Depuis plus de trente ans, l'Institut Mérieux fournit aux hôpitaux de Lyon la Tuberculine nécessaire pour la cuti-réaction classique de Von Pirquet.

**Percuti-réaction.** — Après quatre années d'expérimentation, l'Institut Mérieux délivre une Néotuberculine spéciale pour percuti-réaction.

Plusieurs communications ont démontré que la percuti-réaction effectuée avec ce réactif donnait des résultats aussi sûrs que la cuti-réaction et était d'un emploi beaucoup plus pratique.

La percuti-réaction s'effectue sur la région sternale, après décapage préalable de la peau à l'éther. A l'aide d'une goutte de Néotuberculine concentrée, il suffit de frictionner la peau pendant une vingtaine de secondes. Les réactions positives se manifestent dans les 2 à 4 jours qui suivent l'application par une éruption caractéristique, alors que les réactions négatives n'amènent aucun changement dans l'aspect de la peau.

**Institut biologique MÉRIEUX**  
17, rue Bourgelat — LYON.

## TUBÉROL

### TUBÉROL (pur)

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

**Indications.** — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

Prix : le flacon, 33 fr. 10 et 21 francs.

### TUBÉROL (onguent).

**Composition.** — Tubérol + Excipient adhésif.

**Indications.** — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

**Mode d'emploi.** — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

Prix : 17 fr. 10.

### TUBÉROL (Oïéo).

**Forme.** — Solution huileuse.

**Composition.** — Tubérol + Huile stérilisée.

**Indications.** — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

**Mode d'emploi.** — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

Prix : 17 fr. 10.

### TUBÉROL (Injectable).

**Forme.** — Ampoules.

**Composition.** — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

**Indications.** — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 amp. par jour suivant gravité.

Prix { ampoules de 5 cc. : 36 fr. 70 ; la 1/2 boîte : 20 fr. 20  
ampoules de 2 cc. : 31 fr. 40 ; la 1/2 boîte : 17 fr. 70

### TUBÉROL (Sirop).

**Composition.** — Tubérol + véhicule.

**Indications.** — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 3 à 4 cuil. à soupe par jour.  
Enfants : 3 à 4 cuillères à café.

Prix : 22 fr. 10.

**Laboratoires E. BOUTEILLE**  
23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Marcadet 04-02.)

## TUBES BLACHE

Toutes formules en pommades pour l'Ophtalmologie.

*Liste des principales préparations :*

Analgo-Contractine, Argovyl, Aristol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Zinc, Compositol, Contractine, Hydrargyre composé, Hydrocupréine (Optochine), Ichto-zinc, Iodoforme, Iodure alcalino-calcique, Mydriatine, Nitrate d'argent, Ophtalmo-Chrome, Organo-Bismuth, Oxyde Hg, Phocéol, Précipité blanc.

### Tubes CHAUVIN

Toutes formules en pommades pour la Dermatologie et la Rhinologie.

Etablissements Alfred CHAUVIN

(Laboratoire des Tubes Blache)

AUBENAS (Ardèche).

## TUBES DULCIS POMMADES ASEPTIQUES

Argolène 1, 5 et 10 p. 100 : Bactéricide, conjonctivites aiguës.

Aristol 1 et 2 p. 100 : Antiseptique.

Asepto-Bismuth 5 p. 100 : Bactéricide puissant, non irritant, inodore.

Atropine 0,50 et 1 p. 100 : Mydriatique.

Bleu de Méthylène 0,50 et 1 p. 100 : Colorant aseptisant, indolore.

Cadmio-Zinc 1 p. 100 : Conjonctivites à diplobacilles.

Calomel 5 p. 100 : Antiseptique, résorbant.

Cuprinol 1, 2 et 5 p. 100 : Conjonctivites chroniques.

Diodéine 2 p. 100 : Lymphagogue, analgésique profond.

Eserine Sulfate 0,50 p. 100 : Myotique.

Ichtyol-Zinc : Blépharites.

Iodo-Calcoïque : Cataracte.

Iodoforme 1, 2 et 3 p. 100 : Antiseptique.

Kilogan : Antiseptique non irritant.

Mercurobrome : Antiseptique colorant.

Mercurioforme 1, 2, 3 et 5 p. 100 (pseudonyme d'oxyde orangé).

Myosine faible : Myotique.

Myosine forte : Myotique puissant.

Mydriatine : Mydriatique énergique.

Novoptine : Ulcères à pneumocoques.

Oxyde Orangé de Mercure 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100 : Antiseptique résorbant.

Ophtalmoforme 1, 2 et 3 p. 100 : Antipurulent.

Pilocarpine 1, 2 p. 100 : Myotique.

**Polyvaccin-Antivirus Dulcis :** Immunisent les cellules en contact et stérilisent le foyer infecté, sans réaction locale ni générale. Pommade Type Ophtalmo et Type Oto-Rhino.

Ampoules de 2 cc. Type Ophtalmo et type Oto-Rhino.

Précipité blanc 1, 2, 5 p. 100 : Antiseptique résorbant.

Sédargol (collyres ampoules) : 2, 5 et 10 p. 100. Toutes les infections.

Sédoleine (Brûlures des paupières et de la conjonctive).

Thiosinamine 1 p. 100 : Opacités de la cornée.

Vitamine A : Avitaminoses.

Xéroforme 5 p. 100 : Antipurulent.

Laboratoire du Docteur FERRY  
MONTE-CARLO

## TUBES FERLUX RATIO

Une gamme thérapeutique complète et rationnelle

Ils s'appliquent à 95 p. 100 des cas de l'ophtalmologie...

Tous les pharmaciens en sont approvisionnés,  
vos ordonnances seront exécutées sans délai.

Une thérapeutique ophtalmologique en 7 formules :

<b>Aseptoforme</b>	Optochin, Bromo-phénate de bismuth, Aristol	Antiseptique Polyvalent : infections banales et à pneumocoques
<b>Hydrargyl</b>	Oxyde jaune et orangé Calomel	Kératites justiciables des sels de mercure
<b>Bléphargyl</b>	Oxyde de zinc, Oxyde jaune Ichtyol, Thigénol, Résorcine, etc.	Blépharites et Conjonctivites
<b>Halo calcine</b>	Iodure de sodium Chlorure de Calcium	Cataractes en évolution
<b>Tracholéal</b>	Huile de chaulmoogra Seis de cuivre	Trachome
<b>Mydriatique Ferlux</b>	Atropine, Scopolamine Duboisine	Mydriatique puissant et sûr
<b>Myotique Ferlux</b>	Pilocarpine-Esérine Adrenaline	Myotique

N. B. — Il existe également des Tubes Ferlux classiques à base de tous les médicaments utilisés en ophtalmologie.

**Docteur G. BOUSQUET**  
à Albi — TARN

## TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore de toutes plaies  
(des plus bénignes aux plus graves).

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

**Constitution.** — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

**Propriétés.** — Évite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

**Présentation.** — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

0m07 × 0m09.	Boîte de 10 compresses.
0m10 × 0m10.	— 10 —
0m10 × 0m10.	— 20 —
0m10 × 0m10.	— 30 —
0m22 × 0m22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

**Mode d'emploi.** — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

**LABORATOIRES LUMIÈRE** — 45, rue Villon — LYON.

## TULLE GRAS RUBY STÉRILISÉ

Pansement gras au Baume du Pérou, remboursable au tarif interministériel.

**Constitution.** — Compresses, deux épaisseurs, à lisières imprégnées d'un excipient gras à base de lanoline, huile d'olive, paraffine, baume du Pérou, essence de Niaouli.

**Indications.** — Cicatrisation rapide des plaies et plus spécialement des brûlures par pansements stériles indolores, sans adhérence.

**Mode d'emploi.** — Placer une compresse sur la plaie désinfectée; recouvrir avec un pansement stérile et un bandage de préférence en crêpe.

**Présentation.** — En boîte fer-blanc, enveloppement cellophane, contenant :

Tarif Interministériel du 5-6-1941.

5 compresses	7 cm. 5 × 7 cm. 5.	
10 —	10 cm. × 10 cm. ....	20 fr. 50.
20 —	10 cm. × 10 cm. ....	"
30 —	10 cm. × 10 cm. ....	"
20 —	15 cm. × 15 cm. ....	"
30 —	20 cm. × 20 cm. ....	"

**Laboratoires de PANSEMENTS RUBY**

M. PACCARD, Docteur en Pharmacie,  
VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

## TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

Constitué par un carré de 13 × 13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélargonium.

Le Tulle Rose Beslier est un cicatrisant énergétique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le Tulle Rose Beslier est livré en boîtes de 10 carrés de 13 × 13.

Prix : 14 francs la boîte.

L. N. C. 508.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**  
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

## UCLARSYL

Novarsénobenzol Codex.

**Composition.** — Novarsénobenzol rigoureusement pur.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes. Traitement d'attaque et d'entretien.

**Présentation.** — Poudre jaune clair, instantanément soluble en ampoules scellées sous vide.

**Doses unitaires titrées à :** 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 0,90, 1,05 et 4,50.

**Prix au public :**

Boîtes unitaires de 0,05 à 4,50 : 2 fr. 50 à 48 fr. 80.

Boîtes traitements :

3/15, 3/30 ..... 25 fr.

2/15, 2/30, 2/45 ..... 31 fr. 80

2/15, 4/30, 3/45, 3/60 ..... 78 fr. 80

Type série :

1/15, 1/30, 1/45, 1/60, 1/75, 1/90. 48 fr. 80

Les Laboratoires du **D<sup>r</sup> ROUSSEL**  
USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES  
FRANÇAIS

S. A. au cap. de 25 000 000 de fr. — R. C. Seine 235.442 B.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## ULCÉOPLAQUE ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

**CICATRISATION** certaine des Plaies aux jambes, Plaies atones, Escarres et des **ULCÈRES VARIQUEUX** même très anciens et trophonévrotiques, sans interrompre le travail ni la marche.

**ULCÉOPLAQUE :** Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. Évite les insuccès des corps gras. Provoque la diaphèse et la régénération cellulaire.

Boîte de 6 pansements pour 20 à 24 jours de traitement.

Deux dimensions :

ULCÉOPLAQUE n° 1, 5 x 6 cm. : 32 francs.

ULCÉOPLAQUE n° 2, 7 x 9 cm. : 48 francs.

Enregistré au L. N. C. : n° 371-1.

Produit délivré à volonté.

**ULCÉOBANDE :** Bande élastique souple spéciale au pansement Ulcéoplaque.

Produit contingenté. Répartitions périodiques. Peut faire défaut.

Prix : 50 francs.

Laboratoire **SÉVIGNÉ**  
76, rue des Rondeaux — PARIS.

## ULCÉOSINE

Poudre soluble.

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

**Indications.** — Artério-sclérose, Hypertension artérielle, Varices, Congestions variqueuses et phlébitiques, Plaies atones, Ulcères variqueux, Rhumatisme chronique, Troubles hépatiques, Hyperglycémie, Diabète.

Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Enregistré au L. N. C. n° 371-2. Prix : 15 francs.

## ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-Sodique-Silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses. Arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume. Font résorber l'œdème et l'empâtement. Guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

La boîte pour 4 bains de jambe. Prix : 11 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 371-5.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS. (Tél. : Roq. 1904.)

## ULRÉMA

« PHYTOCICATRISOL »

**Composition.** — Liquide à base de plantes en macération alcoolique (*Rosa centifolia*, *Hypericum perforatum*, *Malva sylvestris*, *Chenopodium*).

Ne contient aucun produit chimique, irritant ou toxique.

**Indications thérapeutiques.** — Cicatrisant puissant.

Brûlures, Ulcères variqueux, Eczéma, Gomme, Ganglions suppurés, Crevasses, Herpès, Furoncles, Panaris, Plaies diverses.

Également en gynécologie, pour injections.

**Mode d'emploi.** — En pansements humides. Renouveler plusieurs fois par jour.

Dans les brûlures profondes, étendre d'un volume égal d'eau bouillie.

En injections : 2 à 3 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1818-2.

Laboratoires **RICHO**

S. DESCOUTS, pharmacien,

39, rue Taibout — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Tri. 46-12.)



## ULTRACALCINE

Complexe **organo-minéral** vitaminé renfermant : Vitamine D, Poudre de glandes fraîches de : hypophyse, parathyroïde, surrénine, associées au fluorure de Ca et aux glycérophosphates de Ca, Mg, Na et Arrhénal.

**Formes.** — Cachets (pour adultes). Granulé fondant, agréable au goût (pour enfants).

**Indications.** — Troubles de la nutrition, états de déminéralisation, anémie, rachitisme, croissance, anorexie, états pré-tuberculeux.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 cachets par jour avant les repas. *Adolescents* : 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.

Prix : 22 fr. 50 (10 jours de traitement environ).

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 1364-5.

Préparé au Laboratoire du **CRINOFLUX**  
52, rue Germain — LYON.

## ULTRACRINOL

Extraits désalbuminés de Foie, Rate, Moelle osseuse, frais d'animaux jeunes, préparés selon la méthode de Whipple.

Traitement adjuvant des Anémies pernicieuses. Anémies post-hémorragiques. Anémie des maladies infectieuses, Chlorose, Anémies des jeunes enfants. Toutes déficiences organiques, Convalescences.

Ampoules buvables, aromatisées au curaçao.

Boîte de 10 ampoules : 25 fr. 80.

*Adultes* : 1 ampoule 1/4 d'heure avant chaque repas midi et soir dans un peu d'eau ; en cas de besoin, doubler la dose.

*Adolescents* : 2 ampoules par jour.

*Enfants* : A partir de 1 à 2 ans, 1 ampoule à boire par jour dans un peu d'eau sucrée en 2 fois.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 1750-2.

Laboratoires **BIOPHARMAX**  
40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

## ULTRAFORMINE

**B. et S.**

**Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).**

**Composition.** — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

**Propriétés.** — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

**Indications.** — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

**Dose moyenne.** — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

Laboratoire **SAUZE**  
60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

## ULTRA-LEVURE

**Propriétés.** — Levure vivante à température optimum de 37° qui se reproduit d'une façon rapide et continue dans le milieu intestinal, d'où :

a) Élimination de la flore pathogène par concurrence vitale et non par production d'une acidité excessive.

b) Action antimicrobienne polyvalente des complexes antitoxiques libérés par la levure vivante.

c) Action digestive des diastases dont les propriétés catalytiques normalisent la dégradation des amyloses dans le milieu intestinal.

d) Action régulatrice des produits aminés et de tout le complexe des vitamines B (notamment B-1 et B-2) — facteurs d'utilisation nutritive et d'équilibre nerveux et glandulaire — également libérés par la levure vivante.

**Indications.** — *Infections intestinales*, entérites, colites, intoxications alimentaires, colibacilloses, diarrhées infantiles, gripes intestinales, *Furonculose et dermatose* d'origine intestinale.

**Indications des Vitamines B** (notamment B-1 et B-2), névrites, anémies hépato-réfractaires, diabète.

**Mode d'emploi.** — Ampoules buvables à prendre à jeun et loin des repas dans un peu d'eau, sucrée si possible. Débuter le traitement par deux ou trois ampoules les premiers jours, le continuer à la dose d'entretien d'une ampoule par jour.

**L'Ultra-Levure ne comporte aucune contre-indication.**

**N. B.** — La Levure B-17 est l'ancienne présentation de l'Ultra-Levure.

La boîte de 12 ampoules..... 28 fr. 50  
— 30 ..... 63 francs.

Laboratoires **TORAUDE**  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (Ve). (Tél. : Odéon 73-92.)  
Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON

## ULTRAVITAMINE 4

— U 4 —

*Fixateur du Phosphore et du Calcium dans l'organisme. Reconstituant général plus actif et plus régulier que l'Huile de foie de morue.*

**Composition.** — Vitamines, hormones, substances minérales.

**I. Vitamines :** Vitamine A (extrait lipodique de foie, carotène). Vitamine B (extrait frais alcool-acétonique de saccharomyces divers). Vitamine C (acide L-ascorbique). Vitamine D, obtenue par irradiation dans une atmosphère de gaz neutre (procédé spécial empêchant toute oxydation).

**II. Hormones :** Cholestérol, Moelle osseuse, Poudre d'os, Poudre de cerveau, Caséine. Ces cinq substances associent l'action du Cholestérol à celle des hormones.

**III. Éléments minéraux :** Carbonate de Manganèse, Ferment catalytique, Polyphosphates calciques s'ajoutant aux combinaisons biologiques naturelles contenues dans la poudre d'os frais.

**Indications.** — Déminéralisation, Rachitisme. Toutes Carences et Convalescences, Amaigrissement, Dépression nerveuse, Fatigue musculaire, Grossesse, Allaitement, Accidents de la dentition et de la croissance, Déviations osseuses et du vertex : scoliose, cyphose, lordose, etc. Malformations et Caries dentaires chez l'enfant et l'adulte. Fractures, Lymphatisme, Prétuberculose, etc.

ULTRAVITAMINE 4 fait prendre du poids aux tuberculeux.

De prescription systématique en période de restrictions **IMPORTANT.** — 2 Formes : Granulés et Comprimés. Une cuillerée à café de granulé (5 gr.) = 2 comprimés. Prescrire les Comprimés de préférence.

**Posologie.** — La même pour *enfants* et *adultes*. Une cuillerée à café de granulé ou 2 comprimés : le granulé peut être croqué ou dissous dans un peu d'eau froide. Les comprimés peuvent être croqués ou seront écrasés et dissous dans un peu d'eau froide. L'un et l'autre seront administrés un peu avant les deux ou trois principaux repas.

Prix : Granulé, 25 fr. 10. Comprimés, 24 fr. 70.

Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE

LAURENÇON et C<sup>ie</sup>

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

Z. O. : 1. : rue Benoît-Sourigues, BAYONNE (B.-P.).

## URALYSOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

**Indications.** — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

**Forme.** — Granulés.

**Formule.** — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine, anhydro-méthylène-carbonate d'hexaméthylène-tétramine, Sels de lithine.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café, matin et soir, dans un verre d'eau.

Laboratoires **LOBICA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## URASEPTINE ROGIER

**Principes actifs.** — Hexaméthylènetétramine et son citrate, Benzoates de soude et de lithine, Diéthylènediamine.

**Forme.** — Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de matière active par cuillerée à café.

**Action thérapeutique.** — Puissant antiseptique urinaire et biliaire par dédoulement assuré de l'hexaméthylène, Antisepsie générale, Dissout et chasse l'acide urique.

**Indications.** — Pyérites, cystites et toutes affections vésico-rénales, cholécystites, Colibacillooses, maladies infectieuses, diathèse urique, arthritisme.

**Posologie :**

**Adultes :** Antisepsie vésico-rénale : 3 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

**Arthritisme :** 2 à 4 cuillerées par 24 heures par périodes alternées de dix jours longtemps répétées.

**Enfants :** 1/2 à 2 cuillerées à café par 24 heures suivant l'âge.

Le flacon : 18 fr. 60.

Laboratoires **Henry ROGIER**

56, boulevard Pereire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

## UR-CLAR

Antiseptique urinaire.

Forme : Capsules.

### UR-CLAR BLEU

**Composition.** — Bleu de Méthylène, Citraminoxypène, Poudre d'hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

**Indications.** — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

**Mode d'emploi.** — 6 à 9 capsules par jour.

Prix : 24 fr. 40 les 60 capsules.

### UR-CLAR BLANC

Forme : Capsules.

**Composition.** — Santalol citraminoxypène, poudre d'hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

**Indications.** — La blennorrhagie et ses complications.

**Mode d'emploi.** — 9 à 12 capsules par jour.

Prix : 24 fr. 40 les 60 capsules.

Laboratoire M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS. (Tél. : Trudaine 54-69.)

## URÉMIASE

(Comprimés Anti-Urémiques.)

**Composition.** — Produit concret extrait du cerveau de certains poissons (Cadidés), associé à la Rénine (substance corticale rénale).

**Propriétés thérapeutiques.** — L'URÉMIASE rend d'immenses services dans le traitement de l'urémie d'origines diverses et des rétentions azotées. Douée de propriétés anti-uriques et en même temps diurétiques, elle produit un abaissement sensible du taux de l'urée sanguine, une diminution et même la disparition de l'albumine, l'activation de la diurèse dans l'Oligurie. On peut dire que sous son action le rein est débarrassé.

**Indications.** — Crises d'Urémie, Néphrites chroniques, Azotémie, Hypertension, Artériosclérose, Oligurie, Insuffisance rénale, etc. L'URÉMIASE n'agit comme diurétique que dans les troubles fonctionnels du rein, dans tous les accidents de nature urémique, et non chez les sujets normaux.

**Posologie.** — *Adultes, Vieillards* : 3 comprimés dans une cuillerée d'eau toutes les deux heures. Après 5 ou 6 prises ainsi réparties, réduire à deux comprimés toutes les 2 ou 3 heures jusqu'à résolution. *États chroniques* : 6 par jour matin, midi, soir, pendant 2 ou 3 semaines.

*Enfants de tout âge* jusqu'à 14 ans environ : Même mode d'emploi avec 2 comprimés au lieu de 3.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## URÉOL CHANTEAUD

**Composition.** — Granulé contenant par cuillerée à café :

Hexaméthylène-tétramine ....	0 gr. 40
Benzoate de soude .....	0 gr. 30
Benzoate de lithine .....	0 gr. 10

### Indications :

Désinfectant très actif des voies urinaires et biliaires. Manifestations arthritiques, goutteuses, suppurations rénales et des voies urinaires.

### Doses et mode d'emploi :

1 cuillerée à café 2 fois par jour que l'on fait dissoudre dans un peu d'eau.

Prix de vente : 14 fr. 65.

Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD

R. RAVAUD, Pharmacien

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES  
(Seine-et-Oise.)

## URICÉMINE

Excès d'acide urique, diurèse.

Antiseptisme urinaire et biliaire.

Synergie médicamenteuse à doses non floculantes.

**Composition de 2 cuillerées à café :** Salicylate de pipérazine, 0,065 ; benzoate de soude et de lithine, 0,25 ; silicate de soude, 0,025 ; urotropine, 0,25 ; citrate monosodique 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité à l'état naissant par synergie et sans provoquer de précipitation.

**Mode d'action.** — Dissolvant de l'acide urique, antipurinique, anti-floculant, anti-sclérosant, antiseptique.

**Indications.** — Hyperuricémie, lithiase rénale, artériosclérose, athérome, goutte, asthme, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

Prix : 20 fr. 30 le flacon.

Laboratoires TACHOT et VIGAN

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 04-49.)

## URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phényle et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

**Indications.** — Maladies infectieuses des Voies Urinaires : Colibacilloses, Cystites, Pyélites, Blennorrhagie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires **BRISSON**

**Dr DEDET et Cie, Pharmaciens**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## URICOLYSE NOËL

Dissolvant idéal de l'acide urique.  
Puissant antiseptique des voies urinaires.

**Composition :**

Acide thyminique.....	0 gr. 10
Tartrate de Pipérazine.....	0 gr. 35
Hexaméthylène-tétramine...	1 gr.
Benzoate de Lithine.....	1 gr.
Salicylate de Lithine.....	0 gr. 75
Citrate de soude.....	2 gr.
Sucre effervescent. Q. S. P...	100 gr.

**Indications.** — Goutte aiguë et chronique, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilliose, Artériosclérose.

**Forme.** — Granulés.

**Posologie.** — Dose moyenne : 3 à 6 cuillerées par jour avant les repas, dans un verre d'eau. Dans les cas chroniques, arrêter une semaine entre chaque flacon. Peut être employé comme boisson de table, à la dose de 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix : 21 fr. 55 la boîte.

Laboratoires **NOËL**

24, rue Saint-Augustin — PARIS.

## URICURE

Dissolvant de l'acide urique. Anti-rhumatismal.

**Composition :**

Salicylamide.....	0 gr. 08
Carbonate de lithine.....	0 gr. 12
Ortho-oxy-benzoate de colchicine.....	0 gr. 016
Pour 1 comprimé dragéifié.	

**Propriétés.** — Médicament *salicylé* évitant les inconvénients du salicylate de soude. Dissolvant de l'acide urique, grâce à une forte proportion d'un sel de lithine. Spécifique du rhumatisme par sa colchicine.

**Indications.** — Toutes affections rhumatismales. Rhumatismes articulaires, gouteux ou musculaires, Goutte, Sciatique, Lumbago, Lithiases biliaire et rénale, Arthritisme.

**Posologie.** — 2 comprimés 3 fois par jour aux repas. (Ne pas sucer mais avaler avec un peu d'eau.)

Prix : 19 fr. 80.

Enregistré au L. N. de C. des M. sous le n° 610-1.

Laboratoires **SECLO**

G. COGNÉ, Pharmacien.

6, rue Aldolphe-La Lyre, COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 28-71 et 13-34.)

## URISANINE

**Composition.** — Une cuillerée à café représente :  
0,75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine et 0,25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans un excipient balsamique (buchu).

**Indications :**

**Antiseptique :** par le benzoate d'hexaméthylène-tétramine toujours bien toléré.

**Diurétique :** par l'extrait spécial de maïs.

**Sédatif :** par le buchu et l'extrait de plantes balsamiques.

Toutes les affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Solution aromatique concentrée, à prendre par cuillerée à café dans un demi-verre d'eau.

**Posologie :**

1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Enfants :** X gouttes par jour et par année d'âge.

Prix du flacon : 19 fr. 40 (10 jours de traitement).

Laboratoires **LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

(Tél. : Roquette 21-95.)

## UROBLEU VERGELOT

**Antiseptique urinaire.**

**Composition.** — Bleu de méthylène : 0 gr. 03 ; Hexaméthylène-tétramine : 0 gr. 15, pour un comprimé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique des voies urinaires par formation de formol, Tarif les sécrétions purulentes, Détruit les agents de fermentations, Cicatrise les muqueuses urinaires, Dissout l'acide urique, Diurétique, Permet de vérifier la perméabilité rénale.

**Indications.** — Affections des voies urinaires et leurs conséquences : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyuries, Colibacilluries. Aucun des inconvénients des balsamiques.

**Présentation et mode d'emploi.** — Comprimés dragéifiés, à prendre de 1 à 3, trois fois par jour, avant les repas, selon indications.

**Prix :** 20 fr. 80, le tube de 50 comprimés.

**Laboratoires Ch. VERGELOT,**

**Docteur en Pharmacie,**

163, rue de Flandre — PARIS (19<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 48-22.)

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-3.

## UROBOLDINE

**Composition.** — Pipérazinè, Phosphate de soude, Phénylcinchoninate de soude, Carbonate de lithine, Hexaméthylène-tétramine, Chlorhydrate de boldine.

**Présentation.** — Granulé agréable au goût.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dissolvant et éliminateur puissant de l'Acide urique, cholagogue. La Boldine associée aux plus actifs dissolvants actuels de l'acide urique assure à l'UROBOLDINE un pouvoir d'attaque et d'entretien.

**Indications.** — Diathèse urique, Rhumatismes, Gouttes aiguë et chronique, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, artériosclérose, arthritisme, troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires, auto-intoxications.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

*Dans les crises aiguës, 3 à 5 cuillerées à café.*

**Laboratoire du Docteur H. FERRÉ**

**M. AUZOUX, Pharmacien**

15, rue Valentin-Haüy — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## UROCEDROL

### Composition :

Essence de cèdre du Maroc.....	0 gr. 05
Hexaméthylène tétramine recristallisé dans l'alcool.....	0 gr. 05
Extrait sec de stigme de maïs.....	0 gr. 055
Théobrominate de lithium.....	0 gr. 045
Bromure de camphre.....	0 gr. 02

**Présentation.** — Dragées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Désinfectant des voies urinaires, dont l'activité est due à l'association d'*antiseptiques doux* et de *diurétiques*. Balsamique par l'essence de cèdre, qui ne présente aucune intolérance. Décongestionnant. Sédatif génital. Sans contre-indication.

**Indications.** — Affections de la prostate, Cystites, Urétrites, Néphrites, Pyélonéphrites, Catarrhe vésical, Incontinence d'origine vésicale.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 dragées avant chacun des 3 repas.

**Prix** — 20 fr. 30 le flacon pour 7 jours de traitement. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1638-1.

**Laboratoires GALLO, Docteur en pharmacie**

AURILLAC (Tél. : 0-57.)

## UROCLAROL

Antiseptique urinaire et biliaire.

**Composition.** — Urotropine purifiée par recristallisation dans l'alcool, 0,15 ; Benzoate de lithine, 0,10 ; Sulfate de magnésie, 0,25 ; Extrait de belladone, 0,005, pour un comprimé glutinisé dragéifié ou une demi-cuillerée à café de granulé.

**Propriétés.** — Antiseptique des voies urinaires et biliaires par l'Urotropine. Uricolitique grâce au Benzoate de lithine. Cholagogue et légèrement laxatif (sulfate de magnésie). Antispasmodique : l'extrait de belladone agit sur le syndrome colique, siffréquent au cours des Lithiases (biliaires et rénales) et des Suppurations rénales.

**Indications.** — Colibacillose, Coliques néphrétiques et biliaires, Cholécystites, Pyélites, Cystites, Prostatites, Blennorrhagie. Toutes infections urinaires.

**Mode d'emploi.** — Quatre à dix comprimés par jour ou deux à cinq cuillerées à café de granulé.

Il est recommandé de faire alterner les cures d'UROCLAROL et de BUCHOBIEU.

Boîte de 35 comprimés : 23 francs.

Médicament enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1480-2.

**Laboratoires PRUVOST**

117, rue Victor-Hugo — HOUILLES (Nord).

(Tél. : 11.)

## UROCLASE

### Gouttes.

Traitement causal de l'Uricémie et des états pré-alcalosiques. — Anturique vrai (préventif et curatif). Non toxique. — *Acidifiant (chimiquement non acide)*.

### Définition :

L'*Uroclase* agit exclusivement par l'état colloïdal dans lequel ses composants s'y trouvent, comme le prouve sa formule (pour 100 gr. de solution)

Bioxyde de silicium : 0,25, uni par adsorption au Carbonate de K : 0,02, au Chlorure de Na : 0,19, et au Carbonate de Lithium : 0,005. Dispersés en milieu aqueux par procédé spécial.

### Mode d'action :

L'*Uroclase* est essentiellement un *modificateur du terrain*, bien que son action immédiate en fasse également le plus actif éliminateur des dépôts existants d'acide urique. Son efficacité est profonde, progressive et durable.

En effet, par sa forme colloïdale, il permet la self-acidification de l'organisme, corrige progressivement le métabolisme, rétablit l'équilibre acido-basique dévié vers l'alcalose et redresse jusqu'à la normale le pH humoral et tissulaire. La précipitation de l'acide urique endogène et exogène devient ainsi impossible dans l'organisme.

Il agit à la façon des diastases suivant les lois de la physico-chimie des colloïdes, sans altérer l'organisme ni déclencher les réactions alcalines de défense.

### Indications :

1° *Uricémie*: Arthritisme, Goutte et Rhumatisme goutteux, Artériosclérose et son hypertension, Névralgies (Sciatique, Lumbago, Migraines) et tous les troubles de même étiologie (Arthrite alvéolo-dentaire, Bourdonnements, Cataracte uricémique, etc.).

2° *Toutes les manifestations pré-alcalosiques*: Asthénies, Psychasthénies, Surmenage, Sénilité, Phosphaturies, Colibacillurie, etc.

### Posologie :

Son inobservation diminuerait sensiblement l'efficacité du traitement.

**Prescrire** : V à X gouttes d'*Uroclase* à prendre dans un peu d'eau seulement, le matin à jeun (1/4 d'heure avant toute autre ingestion), par décades alternées de cure et de repos.

En bonne règle, commencer par V gouttes seulement (au delà, le traitement peut réveiller au début, tout comme une banale cure hydro-minérale, une légère manifestation arthritique de courte durée), puis atteindre graduellement (dès la 3<sup>e</sup> décade de cure) la dose journalière optima, à savoir : 1 goutte par 10 kg. de poids.

Pas de contre-indication, ni intolérance, ni accoutumance. Inoffensif et sans saveur, il n'a pas d'action nocive sur le cœur ni sur aucun autre organe.

**Pas de régime** (une alimentation variée est à conseiller), mais proscrire l'alcool et tous excès en général.

Pour atteindre pleinement le but visé, la persévérance doit être exigée.

### Contrôle de l'efficacité de l'Uroclase :

**Avant de commencer le traitement** (à instaurer dès terminaison de la période aiguë) :

1° Prendre la tension artérielle ;

2° Faire le dosage de l'acide urique : *a.* dans les urines ; *b.* dans le sang.

#### Au cours du traitement :

##### *a. Constatations immédiates :*

1° Augmentation du taux de l'acide urique dans le sang, et secondairement dans les urines ;

2° Eventuellement, légère manifestation arthritique (sujets fortement uricémiques).

##### *b. Constatations ultérieures :*

1° Chez les hypertendus : abaissement de la tension artérielle ;

2° Diminution du taux de l'acide urique d'abord dans le sang, puis dans les urines (jusqu'à la normale) ;

3° Sensation de légèreté, de souplesse, d'euphorie, de lucidité mentale avec une sorte de rajeunissement, de goût au travail, etc.

## UROCLASE « M »

### GOUTTES

**Diathèses mixtes (uro-oxaliques, uro-phosphatiques).**

Même composition que l'*Uroclase* normal, mais avec micelles colloïdales plus fines ; son emploi doit être réservé aux cas suivants : Lithiase urinaire (rénale ou vésicale), Rhumatismes déformants, Tophi, etc.

**Posologie spéciale.** — Prescrire un traitement prolongé, avec alternances d'*Uroclase* normal et d'*Uroclase* « M ».

Mêmes décades de cure séparées par des repos équivalents.

Commencer par V gouttes journalières, dose à porter progressivement, dès la 3<sup>e</sup> ou la 4<sup>e</sup> décade de cure, jusqu'à XV et même XX gouttes (selon la sensibilité du sujet).

On constate tout d'abord des éliminations de gravelle avec arrêt dans l'évolution des formations calculeuses ; puis, avec le temps, une lente désagrégation de ces dépôts ou calculs (que confirme l'examen radiologique). Ces résultats remarquables s'expliquent par le mode d'action physico-chimique d'*Uroclase*.

#### Prix de vente :

Le flacon *Uroclase* normal (pour 2 mois de traitement)... 28 fr. 70

Le flacon *Uroclase* « M » ..... 31 francs

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-1.

Littératures spéciales et échantillons sur demande aux :

**Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL**

**G. BERTIN, Pharmacien**

95, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>) — (Tél. : Carnot 03-80.)

## UROFLUX

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Composition.** — Extrait rénal, 0 gr. 02, Tartrate de pipérazine, 0 gr. 05. Benzoate de lithium, 1 gr. Benzoate de sodium, 1 gr. Hexaméthylène tétramine, 3 gr. Pipérazine, 0 gr. 50. Excipient effervescent au citron, Q. S. pour 100 gr.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Diurétique, antiseptique des voies urinaires et biliaires, régulateur de l'activité hépatique, dissolvant de l'acide urique.

**Indications.** — Affections urinaires (urétrites, cystites, prostatites). — **Manifestations arthritiques** (goutte, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques).

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dissoute dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour entre les repas.

**Prix :** 17 frapes pour 10 jours de traitement.

**Laboratoire de L'UROFLUX**

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12<sup>e</sup>).

## UROFORMINE GOBEY

**Composition.** — Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure.

**Propriétés.** — Antiseptique d'action générale.

**Indications.** — Grippe, Affections broncho-pulmonaires, Encéphalites, Infections des voies biliaires et urinaires, Colibacilloses.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés simples ;  
4 à 8 comprimés effervescent ;  
1 à 3 ampoules ;  
Par jour.

#### Présentations et prix :

Boîte de 50 comprimés simples à 50 cgr ..... 18 fr.

Boîte de 50 comprimés effervescent à 25 cgr. 18 fr.

Boîte d'ampoules à 25 %, 2 cc. ou 5 cc. .... 20 fr. 70

Boîte d'ampoules à 50 %, 2 cc. ou 5 cc. .... 25 fr. 50

**Les Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**

Laboratoires Gobey.

S. A. au cap. de 880 000 fr. — R. C. Seine 223.195 B.  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

(Tél. : Littré 58-43.)

## UROÏODINE

**Composition.** — Iodoéthylate d'hexaméthylène-tétramine, associé au salicylate de lithine.

L'*Uroïodine* n'est pas une simple association Iodo-urotropine-lithine, mais une combinaison chimique nettement définie.

*Elle ne peut donc être remplacée par une formule magistrale.* Elle contient 43 p. 100 d'iode rigoureusement titré, au lieu de 17 p. 100 dans les iodopectones.

**Propriétés physiques.** — Solution dialysable — se décomposant lentement — s'éliminant dans l'urine, sous forme d'iode alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique, pas d'accumulation.

### Propriétés physiologiques :

1° Par sa molécule iodée : excitateur puissant des fonctions lymphoïdes ;

2° Par sa combinaison iodo-salicylate-formine : agent anti-infectieux particulièrement énergique, antinévralgique et antithermique.

3° Grâce à l'association formine-lithine : diurétique très actif, urisolvant puissant.

**Indications.** — *Dialhèse urique* : Goutte, gravelle, lithiases biliaire et rénale.

*Dialhèse arthritique* : Rhumatismes chroniques et subaigus, sciatique.

Tubercules localisés : osseuses et ganglionnaires ; tuberculose pulmonaire (formes non congestives) ; toutes affections justiciables d'un traitement iodo-ioduré intensif : adénopathies, végétations, asthme, emphysème, scléroses viscérales, artério-sclérose, hypertension artérielle.

Toutes maladies infectieuses, du *Système nerveux* notamment.

L'*Uroïodine* agit sur la douleur et sur la cause.

**Présentations.** — Ampoules de 4 cc., injectables indifféremment en I. M. ou I. V. — sans réaction locale ni choc — résorption parfaite. Comprimés de 0 gr. 50, enrobés de gluten : ne se dissolvant donc pas dans l'estomac, tolérance parfaite.

### Posologie :

Chez l'enfant : au-dessous de 15 ans : 1/2 à 1 ampoule par jour ; 1 à 3 comprimés par jour.

Chez l'adulte : 1 à 3 ampoules par jour, simultanément (à la dose maxima, de préférence en I. V.) ; 4 à 8 comprimés par jour. Avaler les comprimés avec un peu d'eau, sans les croquer, de préférence avant les repas. Chaque ampoule correspond à 148 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Chaque comprimé correspond à 48 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Prix : Ampoules : 28 francs ; Comprimés : 25 francs.

Laboratoires de l'UROÏODINE

17 bis, rue Juge — PARIS (XV°).

(Tél. : Sufren 41-22.)

## URO-MAÏS

Diurétique Hépato-Rénal

Anti-Urique et Anti-Bactériurique.

Comprimés effervescents à base de :

Extrait spécial de Maïs

desséché dans le vide à basse température.

Formule : Extrait spécial de Maïs.

Salicylate de Lithine et de Formine.

### Propriétés :

URO-MAÏS provoque la *diurèse* (il triple le volume des urines).

Il élimine les *déchets azotés* : l'urée, la cholestérine.

C'est un *antiseptique* : biliaire, rénal, urinaire.

Il abaisse la *tension* : chez les arthritiques notamment.

### Indications :

a. *Affections du Foie* (Hépatites, Congestion, Lithiase, Anaphylaxie).

b. *Affections des Reins et Voies urinaires* (Oliguries, Azotémie d'alarme, Brightisme, Néphrites aiguës ou hypertensives, Pyéltés, Cystites, Urétrites, Colibacillose).

c. *Maladies infectieuses* (Grippe, Angine, Fièvres infectieuses).

**Doses** : Un compr. dans un grand verre d'eau (2 à 6 fois par jour).

Laboratoires du Docteur Yves LEDOUX, LE HAVRE

URO-MAÏS — BACTÉRIASE — IODÉMOGLOBINE.

## UROMÉTHYL

**Composition.** — Hexaméthylénététramine chimiquement pure, Citrate d'Hexaméthylénététramine, Bleu de méthylène, Salol.

En association stable.

### Formes et posologie :

a. Cachets à noyau médicamenteux glutinisé (3 à 6 par jour).

b. Dragées glutinisées (6 à 8 par jour).

**Action thérapeutique.** — La libération d'une partie des principes actifs a lieu seulement dans l'intestin : d'où *activité renforcée* et *tolérance parfaite*, même par les estomacs les plus délicats.

**Indications.** — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Affections et infections des voies urinaires et biliaires, Manifestations des diathèses urique et arthritique.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).



## UROMÉTINE

### LAMBIOTTE FRÈRES

*Hexaméthylènelétramine pure.*

**Formes.** — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

**Indications.** — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

**Mode d'emploi.** — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

**Ampoules :** Prix 22 fr. 30. — *Comprimés :* 19 fr. 65.

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES S. A. R. L.**  
à PRÉMERY (Nièvre).

## UROMIL

**Composition.** — Ether éthyl-phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène-tétramine, phosphate disodique.

**Forme.** — Granulés effervescents, instantanément solubles dans l'eau. Solution de goût agréable.

**Action.** — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Possède un pouvoir dissolvant double de celui des pipérazines granulées. Antiseptique urinaire.

Très actif et toujours bien toléré.

Par ses éléments phosphoriques, empêche la néo-formation de purines endogènes. Combat ainsi efficacement la cause même de la diathèse urique.

L'ion H dérivé de ses phosphates acides et le CO<sup>2</sup> qui se développe au moment de son ingestion assurent l'équilibre acido-basique du plasma sanguin.

**Indications.** — Diathèse urique, rhumatismes, goutte, lithiases, coliques néphrétiques, cystite, pyélite.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dissoute dans un verre d'eau.

**Laboratoires UROMIL - L. BÉLIÈRES, D<sup>r</sup> en Ph<sup>ie</sup>**  
19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Provence 04-00.)

## UROPHÉNYL

**Composition.** — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène-tétramine recristallisée.

**Action.** — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

**Indications.** — Goutte et rhumatisme.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Prix : 21 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 2198-1.

**Laboratoires CROUY**

**Docteur en Pharmacie.**

VERNON (Eure).

## UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 363-10.

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Composition.** — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Uricolytique, Diurétique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

**Indications.** — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui : 19 fr. 90.

**Laboratoires A. BAILLY**  
(SPEBA)

15, rue de Rome et rue du Rocher — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Laborde 62-30.)

## UROQUINOL

Antiseptique urinaire et biliaire,  
à l'extraît d'artichaut.

Action :

- 1° Mobilisatrice par le Phénylcinchoninate de Soude.
- 2° Cholagogue par l'extraît d'artichaut.
- 3° Antivisqueux par le citrate trisodique.
- 4° Empêche la formation des purines et entrave la précipitation de l'acide urique par son phosphate de soude.

Formule :

Phénylcinchoninate de soude .....	1
Urotropine .....	3
Tartrate pipérazine.....	1
Phosphate de soude pulvérisé .....	1
Citrate trisodique .....	2
Extrait mou artichaut repris.....	0.50

Pour 100 grammes.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans un verre d'eau, pris le matin à jeun et avant les repas.

Dans les crises aiguës : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

**Présentation.** — Granulé soluble.

Prix : 22 fr. 60.

**Laboratoires DEXO**

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon. 04-61.)

## UROSALYL

Association scientifique Hoxaméthylène-tétramine-Salol stabilisée par un excipient spécial qui augmente son pouvoir cholagogue et lui donne une remarquable activité.

Deux formules :

### I. — UROSALYL SIMPLE

Cachets (boîte à bande rouge).

1 cachet correspond à :

Hexaméthylène - tétra-  
mine..... 0 gr. 40  
Salol..... 0 gr. 50

### II. — UROSALYL-MÉTHYLE

(Sans Urotropine).

Cachets (boîte à bande bleue) :

1 cachet correspond à : Bleu de  
méthylène crist. chimiquement  
pur. 0 gr. 03 ; Salol. 0 gr. 65

**Particularités.** — Grâce à l'heureuse association de ses composants qui retarde la décomposition de l'urotropine dans l'estomac, crée le milieu favorable à son 'dédoublage dans l'intestin et assure son élimination par les urines, l'Urosalyl est bien plus actif que chacun de ses éléments, qu'ils soient pris ensemble ou isolément.

**Propriétés.** — Puissant antiseptique des infections gastro-intestinales, urinaires, biliaires, rhumatismales et toutes maladies infectieuses. Le bleu de méthylène étant un puissant sédatif de l'élément douleur, l'Urosalyl méthylé est particulièrement indiqué dans toutes les affections douloureuses de l'appareil urinaire (cystites et prostatites tuberculeuses), ainsi que dans les crises aiguës de rhumatisme arthritique et toutes les fois qu'il y a intolérance à l'Urotropine.

**Indications thérapeutiques.**

**Infections gastro-intestinales.** — Fermentations intestinales, auto-intoxications, intoxications alimentaires, colibacillose et toutes maladies d'origine infectieuse ou microbienne : agit comme antiseptique général interne par son urotropine, comme antiseptique intestinal par son salol.

**Infections biliaires.** — Angiocholites, cholécystites, lithiase biliaire et toutes les manifestations de l'hépatisme : agit comme antiseptique par son urotropine, comme cholagogue par son salol dont l'excipient renforce son action sur le foie et la bile.

**Infections urinaires.** — Urines troubles, purulentes, microbiennes, toutes infections urinaires, rénales, vésicales, cystites, urétrites, prostatites, pyélonéphrites, syndrome entéro-rénal.

**Rhumatismes.** — Agit par son salol qui se décompose dans l'intestin avec mise en liberté d'acide salicylique, spécifique du rhumatisme.

**Posologie :**

**Doses journalières.** — 2 ou 3 cachets, 4 à 6 dragées, 2 à 6 cuillerées à café de granulé, à prendre au début des repas (le granulé doit être croqué et non délayé dans l'eau).

**Présentation :**

Boîte de 24 et 60 cachets. Étui de 50 dragées. Étui de 150 gr. de granulé. Enregistrés au L. N. C. M. sous les n° 300-1, 300-2 et 300-3.

**NOTA.** — Urosalyl et Urosalyl bleu sont présentés également en cachets **boldo-belladonnés** (c'est à-dire additionnés de 0,10 de poudre de feuilles de boldo et de 0,02 de poudre de feuilles de belladone), sous le nom d'UROSALYL BB et d'UROSALYL BLEU BB, à prendre à la même dose de 2 à 3 cachets par jour. Boldo stimule la fonction hépatique si souvent déficiente ; Belladone calme les spasmes des voies urinaires, biliaires et de l'intestin.

**Les Laboratoires du PUJETOL**

ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien,

19, rue de Pontevès — MARSEILLE

## UROSELECTAN B CRUET

Produit pour contrastes urographiques par injections intraveineuses.

Adopté par les Hôpitaux de Paris

**Composition.** — 3-5 diiodo-4-oxy-N-méthylpyridine-2-6 carboxylate de sodium.

**Emploi.** — La pyélographie par élimination est indiquée dans les rétrécissements ou affections graves de la vessie s'opposant à l'exploration : fistules, fortes hémorragies de l'appareil urinaire, annexites aiguës ou chroniques, hypertrophie de la prostate, tumeurs au niveau de l'urètre.

**Posologie.** — Une injection intraveineuse de 10 à 20 cc. d'UROSELECTAN B permet d'obtenir de belles images de l'arbre urinaire.

*Technique de l'injection et prise du pyélogramme.* — Consulter la notice jointe à l'emballage.

**Présentation.** — Ampoule de 20 cc., solution prête à l'emploi : 90 fr. 30.

### Laboratoires CRUET

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74-19)

Z. N. O. : DECODRE, 87, avenue de Saxe, — LYON

## UROSIPHON

**Forme.** — Infusion, de goût agréable.

**Composition.** — Orthosiphon Stamineux de culture, sélectionné et desséché suivant un procédé spécial, conservant toutes les propriétés et tout l'arôme de la plante fraîche.

**Propriétés.** — Puissant diurétique hépato-rénal, azoturique, déchlorurant, hydrurique, sédatif, stimulant de la dépuration urinaire.

**Indications.** — Oligurie, hyperazotémie, uricémie, hypochlorurie, cystite, pyélonéphrite, rhumatisme goutteux, œdèmes, hépatisme.

**Posologie.** — Chacun des 10 paquets contenus dans la boîte d'Urosiphon sert à préparer un demi-litre d'infusion qui représente la dose quotidienne à absorber en 3 ou 4 prises au cours de la journée.

### Laboratoire de l'UROSIPHON

J. HUCHEDÉ, Docteur en Pharmacie.

F. RICHARD, Successeur

1, rue de l'Odéon — PARIS.

## URTICIDE

Médicament antianaphylactique.

**Composition.** — Pancréatine, Hépatine et 12 peptones (poissons, crustacés, sérum de cheval, caséine, gluten, ovalbumine, etc.).

**Présentation.** — DRAGÉES et LIQUIDE.

Une dragée équivaut à une cuillerée à café d'Urticide liquide.

**Indications.** — Affections aiguës, tous urticaires, Œdème de Quincke, Prurigo strophulus, prurit des fièvres éruptives,

Asthme infantile.

Zona (récent).

Affections chroniques, Eczéma, Prurits divers.

**Obs. importante.** — Dans la posologie ci-dessus, on peut remplacer 2 dragées par 1 cuillerée à dessert d'Urticide liquide.

Vomissements des nour-

Asthme adulte.

**Posologie.** — Adultes : Traitement d'attaque : 2 dragées toutes les heures pendant au moins 6 heures. Les jours suivants, 4 fois par jour, 3/4 d'heure avant les 3 repas et le soir au coucher. — Prolonger le traitement 15 jours.

*Enfants et bêtes :* Même cadence, par cuillerée à café de liquide.

2 dragées toutes les heures le 1<sup>er</sup> jour (20 dragées), toutes les 2 heures le 2<sup>e</sup> jour (12 dr.), toutes les 3 heures ensuite (8 dr.).

Adultes : 2 dragées matin midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

Enfants : 1 cuillerée à café matin, midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

1 cuillerée à café 1/4 d'heure avant les tétées.

1 cuillerée à café d'Urticide liquide 3 fois par jour 3/4 d'heure avant les repas. Dose à ne pas dépasser.

Ch. ROCHE, \* & O, Pharmacien,

Ex-interne, lauréat des hôpitaux de Lyon, ex-pharmacien major de l'armée, ex-chef de travaux de chimie, 2, rue Michelet — ALGER.

Dépôt général O. C. P., 108, rue Picpus, Paris.

L'étui G. M. (80 dragées) ..... 21 fr. 35

Le flacon G. M. (40 c. à café) ..... 13 fr. 40

L'étui P. M. (40 dragées) ..... 13 fr. 40

Le flacon P. M. (20 c. à café) ..... 13 fr. 40

Enregistré au L. N. C. n° 1113-4 et 1113-5.

## UTERSAN

### Décongestif Utéro-ovarien.

**Composition.** — Extrait mammaire, Extrait placentaire, Anémone pulsatile, Bourse à Pasteur, Cimicifuga, Hamamélis, Hydrastis, Marrond'Inde, Viburnum, Sépia.

**Posologie.** — 6 dragées par jour, 10 à 20 jours par mois. Cesser pendant les règles.

**Indications.** — Traitement *per os* des états congestifs, inflammatoires, douloureux et des hyperplasies de l'appareil utéro-ovarien. Métrites. Salpingites. Prolapsus, Rétroversions. Fibromes, Métrorragies et Leucorrhées. Suites de couches.

**Prix de l'étui de 60 dragées argentées :** 18 fr. 35.

Laboratoire Biologique **VALTRY**

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Élysées 28-12).

## UVARGOL

Argent colloïdal irradié. Plus actif et plus constant dans ses effets que l'Argent colloïdal ordinaire. Agit sans effet toxique en raison de la faible dose nécessaire.

**Forme.** — Dragées (à avaler) à 0,01, pour adultes 6 à 8 par jour.

**Prix :** 24 fr. 90.

Comprimés Solubles à 0,01 pour enfants (3 à 5 par jour) ou adultes (6 à 8).

**Prix :** 23 fr. 70.

**Indications.** — Maladies infectieuses de l'intestin et des voies urinaires (Entérites, diarrhées, cystite, Syndrome entéro-rénal, etc.).

Antisepique général.

Les formes Ovules et Pommade sont provisoirement abandonnées pour manque de matières premières.

Laboratoire **MARTINIE**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Tél. : Roquette 86-84.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n<sup>os</sup> 1122-1 et 1122-2.

## UVÉ

(Gouttes.)

**Composition.** — Solution aqueuse de phosphate diacide de calcium, chlorure manganéux, chlorure de magnésium, chlorure ferreux, acide orthophosphorique, actifs.

Ni arsenic ni strychnine.

**Mode d'action.** — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

**Indications.** — Convalescence, Asthénies, Surmenage, Décalcifications, Alcalose. Toutes les anorexies (nourrissons, enfants, adultes), dont elles sont le véritable spécifique.

**Posologie.** — Adultes : 40 à 120 gouttes. Enfants : 20 à 80 gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau pure ou bicarbonatée.

**Nourrissons :** 1 goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; 1 goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n<sup>o</sup> 185-2.

**Prix :** Le flacon :

Petit modèle : 13 francs. Grand modèle : 24 francs.

Laboratoires **CRINEX-UVÉ**

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Alésia 28-51.)

## UVÉCALCION

**Forme.** — Granulé (pour enfants et adultes).

**Composition.** — Glycérophosphate de chaux, fluorure de calcium, hypophosphite de chaux, glycérophosphate de magnésie, vitamine D, sucre et vanille, Q. S.

**Indications.** — Toutes déminéralisations et insuffisances calcique et magnésienne.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à café aux repas.

**Prix :** 25 fr. 80.

**Forme.** — Poudre (pour bêtes).

**Dose.** — De 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge, dans les biberons.

**Prix :** 17 fr. 50.

Laboratoires **DAGONNOT**

CANNES.

## UVÉSTÉROL

**Vitamine D + Cholestérine.**

**Composition.** — Émulsion d'aspect et de goût non huileux; contenant par cc. (35 gouttes):

Vitamine D cristallisée..... 6 000 unités  
antirachitiques  
Cholestérol irradié..... 5 mgr.  
Extrait de levure de bière vitaminé... 1 mgr. 3

**Mode d'action.** — Fixe chaux et phosphore, active la croissance. Antitoxique, bactéricide, hématopoïétique.

**Avantages.** — Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique de la cholestérine.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré, même par les fébricitants. L'absorption du produit dans le lait augmente considérablement son activité (Hess et Wieland).

**Indications.** — Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose, Rachitisme, Tétanie, Décalcification.

**Conservation.** — Activité intacte même après plusieurs années.

**Posologie.** — *Adultes* : 40 à 80 gouttes.

*Enfants* : 15 à 50 gouttes diluées dans une boisson lactée de préférence, ou une eau alcaline, du jus de fruits.

*Chez le nourrisson sain* (action préventive) : 5 à 20 gouttes.

*Chez le nourrisson rachitique* : 20 à 30 gouttes.

**N. B.** — Bien agiter le flacon avant l'usage.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-3.

**Prix.** — Le flacon :

Petit modèle : 13 francs. Grand modèle : 23 francs.

**Laboratoires CRINEX-UVÉ**

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).  
(Tél. : Alésia 28-51.)

## VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

**Composition.** — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

**Indications :**

Bronchites profondes ou épidémiques, Broncho-pneumonies post-opératoires.

Broncho-pneumonies de l'enfant, de l'adulte et du vieillard, Pneumonies.

**Avantages.** — Aucune contre-indication, aucune réaction.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc.

**Posologie :**

*Nourrissons* : 1/3 de cc., puis 1/2 cc., puis 1 cc.

*Adultes* : 1 cc., puis doubler.

Ne pas injecter le vaccin à travers des téguments atteints d'eczéma, d'impétigo, de pyodermites.

**Prix** : 47 fr. 50 la boîte de 6 ampoules ;

27 fr. 50 la boîte de 3 ampoules.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII°).

(Tél. : Inv. 20-60.)

# VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.  
Médication causale naturelle.

## A PRESCRIRE PAR N° ou PAR LETTRES SYMBOLIQUES

Innocuité absolue.

1. Vaccin Ac. Sa (aiguë).....	Cépède.
2. Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
3. Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
4. Vaccin C. E. (coli-antérocoque).....	Cépède.
5. Vaccin C. S. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
6. Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
7. Vaccin E. (entérocoque).....	Cépède.
8. Vaccin E. S. ....	Cépède.
9. Vaccin E. Sa. ....	Cépède.
10. Vaccin G. (gonocoque).....	Cépède.
11. Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
12. Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
13. Vaccin G. C. S. E. S. Psd. ....	Cépède.
14. Vaccin Mo. (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
15. Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
16. Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
17. Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
18. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. ....	Cépède.
19. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otitis, sinusites).....	Cépède.
20. Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
21. Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
22. Vaccin S. (érysipèle).....	Cépède.
23. Vaccin Sa. psau-ostéomyélite) abcès chaux, phlébites).....	Cépède.
24. Vaccin S. E. S. (puerpéralité, phlébites).....	Cépède.
25. Vaccin S. P. E. S. (100 millions).....	Cépède.
26. Vaccin S. P. E. S. (400 millions).....	Cépède.
27. Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
28. Vaccin S. P. E. S. Ca. 100. ....	Cépède.
29. Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.
30. Vaccin Sa. (furoncles).....	Cépède.

Tous eurovaccins atoxiques sur demande  
de MM. les Médecins.

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les eurovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 39 francs au public.  
L. N. C. M. n° 1018-2 à 1018-11.

**Institut de Biologie appliquée**

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Burgue — PARIS (XV°).  
(Tél. : Ségur 11-40.)

Adresse télégraphique : Ibaocépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.  
Adoptée par les Hôpitaux.

# VACCINOTHÉRAPIE PROBIOS

En outre des produits *Ampoules, Pommades, Comprimés* préparés avec des Antivirus et des Bactériophages associés connus sous le nom générique de *Probios* destinés aux *vaccinations locales* (ingestion buccale, instillations, pansements locaux), les **Laboratoires PROBIOS** préparent des émulsions et filtrats microbiens destinés aux injections sous-cutanées. Ces émulsions microbiennes ou vaccins sont préparés de façon à éviter les phénomènes de choc dont les effets souvent inquiétants pour les malades ou leur entourage peuvent détourner la clientèle d'une méthode thérapeutique cependant efficace.

Pour les vaccins buvables, pommades, ovules, crème, etc., voir *Probios*.

## VACCIN PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE

**Formule.** — Gonocoques de Neisser, Synocoques, Bac. de Hoffmann. Staphylocoques (d'origine urétrale).

**Présentation.** — 6 ampoules de 2 cc. : 22 fr. 25.

**Indications.** — Urétrites, Métrites gonococciques et complications.

**Mode d'emploi.** — Injections sous-cutanées, d'abord faibles, puis progressivement croissantes.

Pour la discrétion et la commodité des prescriptions, nous avons le même produit, qui peut être prescrit sous le nom *Vaccin Probios 365*.

## INJECT-APYO

**Formule.** — Filtrat de cultures de :

Staphylocoques.....	50 parties.
Streptocoques.....	30 —
Bacilles Pyocyaniques.....	20 —

**Présentation.** — 6 ampoules jaunes de 2 cc. : 22 fr. 25.

**Indications thérapeutiques.** — Abscès, Phlegmons, Anthrax, Erysipèle, Impétigo, Intertrigo, Staphylocoques, Lymphangites. Toutes les affections à germes Pyogènes.

**Mode d'emploi.** — a. *En injections.* — b. *Applications locales.*

## PRÉV-AKINTYL

**Vaccin préventif injectable.**

**Formule.** — Bacilles de Bordet et Gengou : 100 millions par cc.

**Présentation.** — 3 ampoules claires de 2 cc. : 13 fr. 30.

**Indications.** — Traitement préventif de la coqueluche.

**Mode d'emploi.** — Nous conseillons de faire 3 injections de *Prév-Akintyl* séparées par des intervalles de 5 à 7 jours à des doses différentes selon les âges.

## INJECT-AKINTYL

**Vaccin curatif injectable.**

**Formule :**

Bacilles de Bordet-Gengou.....	100 millions.
Bacilles de Pfeiffer.....	10 —
Bacilles de Friedländer.....	100 —
Bacilles Pyocyaniques.....	50 —
Streptocoques.....	10 —
Staphylocoques.....	200 —
Pneumocoques.....	10 —
Micrococcus Catarrhalis.....	50 —

Par centimètre cube.

**Présentation.** — 10 ampoules jaunes de 2 cc. : 33 fr. 40.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement curatif de la coqueluche.

**Mode d'emploi.** — Il est recommandé de commencer dans tous les cas par utiliser des doses faibles en vue d'éviter les réactions de choc ou les réduire le plus possible.

**INJECT-APLEURYL**

**Vaccins préventif et curatif dans les affections des Voies respiratoires.**

**Formule :**

Filtrats de cultures de Pneumocoques I-II-III.....	3 parties.
Filtrats de cultures Bac. de Friedländer .....	1 partie.
Filtrats de cultures de Streptocoques .....	2 parties.
Filtrats de cultures de Staphylocoques .....	2 parties.
Filtrats de cultures de Proteus .....	1 partie.
Filtrats de cultures Bac. de Pfeiffer .....	1 partie.

**Présentation.** — 6 ampoules de 2 cc. : 27 fr. 85.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, Grippe et ses complications, pleurésie, asthme, emphyseme.

Le Vaccin *Inject-Apleuryl* s'emploie en injections sous-cutanées à doses progressives en commençant par des doses faibles avec les précautions aseptiques d'usage.

**Laboratoires PROBIOS**

4, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 26-04, 26-05, 26-06.)

**VACCINOVOULES**

(Adultes et fillettes).

**Forme.** — Ovules.

**Composition.** — Culture atténuée de gonocoque, synocoque, staphylo, strepto B. d'Hoffmann, Excipient Q.S.

**Indications.** — Métrites, Urétrites, Pertes blanches, toutes affections microbiennes.

**Posologie.** — Pansement gynécologique idéal (ne tache pas).

Prix : { *Adultes* : 28 fr. 10  
          { *Fillettes* : 25 fr. 30

**Laboratoires E. BOUTEILLE**

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Marcadet 04-02.)

**VACCIN R. N.**

Vaccin antipyogène, anti-infectieux

**Forme.** — Ampoules injectables de 2 cc.  
(Boîte de 6 ampoules).

**Propriétés thérapeutiques.** — Les microbes entrant dans la composition de ce Vaccin sont sélectionnés parmi les formes jeunes, ce qui permet d'obtenir un maximum d'action avec un minimum de réaction. Ce Vaccin injectable par voie sous-cutanée s'applique aux infections diffuses et aux suppurations mal collectées, à microbes pyogènes courants (spécialement streptocoques et staphylocoques).

**Indications.** — Abcès, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Anthrax, Furoncles, Pyodermites, Infections puerpérales, Infections grippales, Broncho-pneumonies.

**Posologie.** — Les doses habituelles sont les suivantes :

Premier jour.....	1/4 de cc.
Deuxième jour .....	1/2 de cc.
Troisième jour .....	1 cc.
Cinquième jour.....	1 cc. à 1 cc.5.
Septième jour.....	1 à 2 cc.
Neuvième jour.....	1 à 2 cc.

L. N. C. M. n° 43-11.

**Laboratoires PÉPIN et LÉBOUCQ**

COURBEVOIE (Seine).  
(Tél. : Défense 09-71.)

## VACCINS ANTIBRUCCELLIQUES POLYMICROBIENS

des Docteurs DUBOIS et SOLLIER  
Fièvre Ondulante. Fièvre de Malte

**Composition.** — Constitué par des *brucella abortus* et *melitensis* récemment isolés de l'homme et des animaux et en provenance des différentes régions où sévissent les brucelloses. Ces germes tués par la chaleur sont émulsionnés dans de l'eau de mer naturelle isotonique.

**Indications. Présentation. Mode d'emploi.**

**Vaccin préventif.** — Se prescrit sous deux formes :

1° **Vaccin préventif injectable** (3 ampoules de 1 cc. Prix : 25 fr.).  
Trois injections sous-cutanées à 10 jours d'intervalle.

2° **Vaccin préventif buccal** (3 ampoules de 10 centièmes. Prix : 25 fr.). Pendant trois jours consécutifs, faire avaler le matin à jeun le contenu d'une ampoule.

**Vaccin curatif.** — Se prescrit sous deux formes :

1° **Vaccin curatif injectable** (12 ampoules de 1 cc. Prix : 60 fr.).  
Une injection sous-cutanée tous les deux jours (1/4, 1/2, 3/4, puis 1 cc.).

2° **Vaccin curatif buccal** (6 ampoules de 10 cc. Prix : 35 fr.).

S'emploie à titre d'adjuvant du vaccin injectable dans l'intervalle des injections ou pour remplacer celui-ci en cas de contre-indication.

Faire avaler, le matin à jeun, le contenu d'une ampoule.

Vaccins autorisés par décret N° 95 du 22 décembre 1937. Enregistrés au L. N. C. M. sous les N° 1782 (1, 2, 3, 4).

Laboratoire des « VACCINS en PLASMA MARIN »

17, rue de Sauve — NIMES (Gard)

(Tél. : 36-10. Adr. Télégraph. : Plasmax Nimes.)

## VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins, constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, composition polyvalente.

### Nomenclature et Indications I

**Néo-Dmègon :** Antigonococcique. (Voir ce nom.)

**Néo-Dmesta :** Antistaphylococcique.

**Néo-Dmètyl :** Anticoquelucheux. (Voir ce nom.)

**Aplexil :** Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Balzac 22-94.)

## VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)  
Phrophylaxie — Vaccinothérapie.

**VACCINS :** Antityphloïdique.

— Antistaphylococcique.

— Polyvalents.

— Pneumo-streptococcique.

— Anticoquelucheux.

— Antigonococcique.

— Antistreptococcique.

— Anticollibacillaire.

— Antimélicoccique.

(Injectables en injections sous-cutanées.)

Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines Entérotyphaxine.

Prix : 29 fr. 40. La boîte de 4 amp. de 2 cc.

Anasthmyl, Vaccin antispasmodique I. O. D. .... 58 fr. 80

Rhino-Vaccin, Pansement I. O. D. .... 36 fr. 60

L. N. C. M. n° 1864-1 à 11.

Dépôtaires généraux :

Éts DEFFINS et GRUAT, 40, faub. Poissonnière — PARIS

Laboratoire de Biologie Médicale, 16, rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et HAYAT, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons : 16, rue Dragon — MARSEILLE

## VACCINS BRUSCHETTINI

1° **Antipyogène Polymicrobien Polyvalent** (streptocoques, staphylocoques, pneumocoques, colibacilles, pyocyaniques) ;

2° **Antigonococcique.**

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. pour injection intramusculaire.

### Indications :

1° **Vaccin Antipyogène Polymicrobien Polyvalent :** État infectieux, État grippal, Angines, Vaccination pré-opératoire, Accouchements, Broncho-pneumonie, Pneumonie, Abcès, Phlegmons, etc.

1, 2 et même 3 ampoules par jour en injection intramusculaire.

Aucune réaction générale ni locale, même en thérapeutique infantile ;

2° **Vaccin Antigonococcique :** Applications spécifiques.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)



## VACCINS CARRION

Le nombre de germes est exprimé en millions par centimètre cube.

**1° Vaccins monomicrobiens.** — Ampoules de 1 cc. Colibacillaire à 100 et 500; Coquelucheux à 100 et 500; Gonococcique à 100, 500 et 1 000; Paratyphique A ou B à 100 et 500; Pfeiffer à 1 0 et 500; Pneumococcique à 200, 500 et 1 000; Staphylococcique à 200, 1 000 et 5 000; Staphylo acné à 5 000; Staphylo anthrax à 1 000 et 5 000; Staphylo abcès de l'aisselle à 5 000; Staphylo ostéomyélite à 1 000 et 5 000; Streptococcique à 100, 500 et 1 000; Typhique à 100, 500 et 1 000. L'ampoule de 1 cc. : 6 fr. 30.

Entérococcique à 1 000 :

Labtde 12 amp. : 22 fr. 50. — La bte de 6 amp. : 12 fr. 50. Streptococcique endocardite à 1 000.

L'ampoule : 15 francs.

**2° Vaccins polymicrobiens.** — Vaccin polymicrobien polyvalent; Vaccin polymicrobien anti-gripal; Vaccin coquelucheux mixte à 1 000 et 5 000; Vaccin typhique mixte T. A. B. à 100 et 500. L'ampoule : 7 fr. 50.

Vaccin formule Delbet.

L'amp. de 4 cc. : 9 fr. 90. — La bte de 3 ampoules : 25 fr. Vaccin typhique mixte pour vaccination préventive à 300<sup>0</sup> pour 1 cc.

L'amp. de 1 cc. : 7 fr. 50. — L'amp. de 2 cc. : 9 fr. 90.

**3° Vaccins régionaux.** — Auriculo, Broncho, Intestino, Naso, Oculo, Pell, Pharyngo, Uro, Uréthro et Utero-vaccin : L'ampoule de 1 cc. : 7 fr. 50.

**4° Lysats sodiques (Dr Mauté).** — Colibacillaire, Staphylococcique, Streptococcique, à 1 mgr. pour injections sous-cutanées et à 1/10<sup>e</sup> de mgr. pour injections intraveineuses.

L'ampoule de 1 cc. : 7 fr. 50.

**5° Bouillons immunisants pour pansements.** — En tubes scellés de 5 cc.

Le tube : 6 fr. 30.

La boîte de 6 tubes scellés de 5 cc. : 31 fr. 30.

Naso et Auriculo-Bouillon.

La boîte de 6 tubes scellés de 2 cc. : 25 francs.

**6° Vaccins buvables.** — Tubes scellés de 5 cc. : Colibacillaire, Typhique, Typhique mixte.

La boîte de 6 tubes scellés : 18 fr. 70.

Association coli-entéro.

L'amp. de 12 tubes scellés : 32 fr. 90.

Voir aussi : Entérococcine, Coliflorine.

Entérococcique buvable en tubes scellés de 1 cc. (nourrissons).

La boîte de 12 tubes scellés : 22 fr. 50. — La boîte de 6 tubes scellés : 12 fr. 50.

**7° Anavaccins (Dr Jaubert).** — Voir : Gonagone, Staphylagone, Cardio-Streptine.

Enregistré au L. N. G. n° 514. nos divers.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Anjou 36-45. 2 lignes groupées.)

## VACCINS CLIN

Stocks-vaccins, lysés et détoxiqués, d'une concentration élevée en espèces, microbiennes judicieusement choisies et fréquemment renouvelées.

Constitution constante tolérance parfaite, conservation illimitée.

**Formes :** Vaccins injectables, en ampoules de 1 cc. de concentration microbienne.

**Vaccin Clin antistaphylococcique.**

**Vaccin Clin antigonococcique.** — N° 1 monomicrobien. — N° 2 polymicrobien (gonocoques, staphylocoques, pseudo-diphthériques, Friedlander, microcoques, entérocoques).

**Vaccin Clin antioquelucheux.** — 3 concentrations. 1-2-3 milliards (B. de Bordet-Gengou).

**Pneumo-broncho-vaccin Clin.** — *Adultes, Enfants.* (Pneumocoques, Friedlander, Pfeiffer, streptocoques, staphylocoques, entérocoques.)

**Coli-entéro-vaccin Clin.** Injectable, Buccal.

**Vaccin Clin antistreptococcique.**

**Vaccin Clin pré-opératoire antipyrogène** (streptocoques, staphylocoques, colibacilles, entérocoques, pyocyaniques).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>)

## VACCINS DEMONCHY

A très forte concentration.

**1<sup>o</sup> Vaccin antidiplococcique.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. contenant 25 milliards de gonocoques, de 12 souches différentes.

**Posologie.** — Injections (sous-cutanées) tous les 2, 3 ou 4 jours, la première de 1/4 ou de 1/8 de centimètre cube.

*L'intensité des réactions générale et locale déterminées par chaque injection permettra de fixer la dose suivante, qui pourra ainsi, suivant les cas, être supérieure, égale ou même inférieure à la précédente. Donc, n'augmenter les doses que lorsqu'une amélioration se manifeste et que la réaction générale reste discrète.*

**2<sup>o</sup> Vaccin antidiplo-entéro-staphylococcique.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. contenant 25 milliards de germes.

**Indications :** Vaccin mixte, spécialement destiné aux affections gynécologiques, aux urétries ayant subi de nombreux traitements locaux et à leurs complications.

**3<sup>o</sup> Vaccin anti-staphylococcique.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc. contenant 15 milliards de staphylocoques blancs et dorés de plusieurs souches.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques.

THERAPLIX

98, rue de Sévres — PARIS (7<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10.)

## VACCINS GRÉMY

### IMMUNIZOLS

Enregistrés au L. N. C.

#### I. — IMMUNIZOLS INJECTABLES POUR LA VACCINATION GÉNÉRALE

**Composition.** — Émulsions microbiennes polyvalentes et spécifiques.

##### Indications :

- N° 10. *Furonculose*: Furonculose, Anthrax, Sycosis, Ostéomyélite et toutes Staphylococcies.
- N° 11. *Entérite-Appendicite*: Infections intestinales aiguës et chroniques.
- N° 13. *Asthme*.
- N° 15. *Eczéma-Psoriasis*.
- N° 16. *Bronchites chroniques*.
- N° 17. *Rhumatismes*: Rhumatismes chroniques, articulaires, aigus et subaigus.
- N° 18. *Urétrites*: Urétrites aiguës, subaiguës et chroniques.
- N° 19. *Acné*: Acné juvénile, pustuleuse, nécrotique.
- N° 23. *Grippe*: Infections pulmonaires aiguës, Grippe et complications.
- N° 31. *Abcès*: abcès chauds, Panaris, Phlegmons, Plaies infectées, Infections pyogènes.
- N° 40. *Cystites*: Cystites, Pyélonéphrites.
- N° 41. *Métrites-Salpingites*.
- N° 50. *Otitis-Sinusites*.

**Posologie.** — Injections sous-cutanées à doses progressivement croissantes, espacées de deux à trois jours.

**Cure vaccinale.** — 10 injections.

**Prix :** Ampoules de 2 cc., la boîte de 5 : 32 fr. 30.

Ampoules de 1 cc., la boîte de 2 : 10 fr. 60.

Ampoules de 2 cc., la boîte de 1 : 7 fr. 60.

#### II. — IMMUNIZOLS BOUILLONS-VACCINS POUR PANSEMENTS

**Composition.** — Antivirus provenant de cultures-mono ou polymicrobiennes polyvalentes.

##### Indications :

- N° 10. *Furonculose*.
- N° 24. *Streptococcies*.
- N° 25. *Pneumococcies*.
- N° 26. *Colibacillose*.
- N° 31. *Abcès*.
- N° 35. *Ulcères variqueux*.
- N° 36. *Brûlures*.
- N° 41. *Métrites-Salpingites*.
- N° 50. *Otitis-Sinusites*.

**Posologie.** — Pansements, lavages, instillations, mèches, vaporisations. Aucune contre-indication.

**Prix :** la boîte de 3 ampoules de 10 cc. : 25 fr. 80.

Le N° 50 *Otitis-Sinusites* existe également en boîte de 5 ampoules de 5 cc., au prix de 25 fr. 80. Prescrire : « **IMMUNIZOL-BOUILLON-VACCIN 50 VAPO** ».

#### III. — IMMUNIZOLS COMPRIMÉS

**Composition.** — Corps microbiens tués par la chaleur, desséchés et incorporés à une masse de compression.

##### Indications :

- N° 10. *Furonculose*.
- N° 11. *Entérite*.
- N° 13. *Asthme*.
- N° 15. *Eczéma-Psoriasis*.
- N° 18. *Urétrites*.
- N° 22. *Typhoïde*.
- N° 31. *Abcès*.
- N° 40. *Cystites*.
- N° 41. *Métrites*.
- N° 70. *Pyorrhée alvéolo-dentaire*.

**Posologie.** — 2 pilules de bile le matin à jeun, sauf enfants de moins de 5 ans.

5 à 12 comprimés par jour, selon l'âge, en 2 ou 3 fois, loin des repas.

**Prix :** le flacon de 50 comprimés et 10 pilules de bile : 25 fr. 80.

#### IV. — IMMUNIPEROS

(Bouillons-Vaccins pour vaccination par voie buccale.

**Composition.** — Antivirus et corps microbiens à très forte concentration.

##### Indications :

- N° 10. *Antistaphylococcique*.
- N° 11. *Intestinal*.
- N° 15. *Dermatologie*.
- N° 22. *Typhoïde*.

**Posologie.** — 1 ampoule le matin à jeun, 1 ampoule le soir, loin des repas.

*Enfants*: 1/2 dose.

**Prix :** la boîte de 10 ampoules de 5 cc. : 25 fr. 80.

#### V. — OVULES-VACCIN

**Composition.** — Filtrats de cultures en bouillon peptoné.

**Indications.** — Métrites et Salpingites aiguës, subaiguës ou chroniques, vaginites.

**Prix :** la boîte de 6 ovules : 25 fr. 80.

#### VI. — COLLYRE-VACCIN à l'Immunizol-Bouillon-Vaccin.

**Prix :** la boîte de 10 pipettes compte-gouttes : 29 fr. 30.

#### LABORATOIRES GRÉMY

J. ROY et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens  
14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 48-43.)

## VACCINS « INAVA »

(par voie sous-cutanée).

**Souches sélectionnées. Lyse mécanique. Tyndalisation à froid**  
laissant intacts les antigènes concentrés et solubilisés.

### Affections génitales.

Gynécologique ..... « M » Injectable.  
Ovules-Vaccins ..... « M » (Voir à).

### Affections dermatologiques.

Antipyrétique ..... « P » Injectable.  
Pyogénol-Gelée ..... (Voir à)

### Infections grippales.

Antibronchitique ..... « A » Injectable.  
Rhino-Vaccin Gelée .....

### Infections intestinales.

Vaccin antityphique (dragées).

### Infections bucco-dentaires :

Pyodarsénol (Fuso-Strepto-vaccin et Sulfarsénol) (injectable et en gelée).  
Pâte Dentaire immunisante au Pyodarsénol. (Voir à Inava.)

### Laboratoires (NAVA

ASNIÈRE) (Seine)

Décentralisés à LIMOGES (Haute-Vienne).

Dépôt à PARIS, 23, rue des Moines.

## VACCINS IVAGO

Les vaccins IVAGO se présentent sous trois formes :  
Vaccins injectables. — Vaccins buvables. — Gelées-  
vaccins par pansements.

### Vaccins IVAGO injectables (intradermiques).

Les procédés spéciaux de préparation des vaccins IVAGO,  
polymicrobiens et polyvalents, leur assurent les avan-  
tages suivants :

Haute teneur microbienne et pouvoir antigénique très  
élevé sous le plus petit volume.

Absence de choc et de toute réaction générale.

Efficacité constante, égale à tous les âges, chez le tout  
jeune enfant comme chez le vieillard.

Possibilité d'étendre la vaccinothérapie aux états septi-  
cémiques qui contre-indiquent la voie sous-cutanée.

« Inoculer dans la peau, c'est solliciter un organisme  
de défense considérable, capable, dans tous les cas  
et à tous les âges, de produire activement les élé-  
ments, cellules ou humeurs, dont l'individu a besoin  
pour se libérer des microbes et atteindre l'immunité. »

**Posologie.** — 1/4 cc. à 1 cc. progressivement, tous les  
deux jours (1/2 dose chez le nourrisson). La dose sera  
répartie avantageusement en plusieurs points de la peau.

Aucune contre-indication.

IVAGO « A » (Appareil respiratoire : Grippe, Broncho-  
pneumonies, Bronchites aiguës et chroniques, etc.).

IVAGO « B » (Antipyrétique).

IVAGO « D » (Antistaphylococcique, Anthrax, Furon-  
culose, etc.).

IVAGO « GM » (Génito-urinaire : Urétrites, Métro-  
salpingites, Pyélo-néphrites, Cystites, etc.), Septi-  
cémie puerpérale ou post-abortionum, Rhumatisme  
gonococcique, etc.).

IVAGO « P » (Antipyrétique : toutes infections chirur-  
gicales).

IVAGO « R » (Antioxygène).

IVAGO « U » (Gastro-intestinal : toutes infections aiguës  
et chroniques des voies digestives, Appendicites,  
Colibacillose).

### Vaccins IVAGO buvables.

IVAGO-COLI : Pyélite, Pyélonéphrite, Cystite, Coliba-  
cilliose.

IVAGO-STA : Furonculose, Anthrax, Abcès, Acanthosis, Sycosis.

IVAGO-GRIPPE : Affections broncho-pulmonaires,  
Bronchites, Complications grippales.

IVAGO-PYO : États septicémiques et infections causées  
par les pyogènes communs.

### Gelées-Vaccins IVAGO

Antipyrétique, Antistaphylococcique, Antipyrétique,  
Gynécologique.

OVULES VACCINS IVAGO.

PÂTE DENTIFRICE bleue IVAGO : grand modèle et  
petit modèle.

### Laboratoires IVAGO

L. BELIERES, Docteur en Pharmacie,  
17, rue de Provence — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Prov. 04-00.)

## VACCINS LE MOIGNIC

### Lipo-Vaccins.

Vaccins hypotoxiques en suspension huileuse.

Dans ces vaccins, les microbes en suspension dans l'huile sont embaumés et conservent, de ce fait, durant plusieurs années (2 à 3 ans) leur pouvoir antigénique.

La résorption, beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins, permet d'injecter des quantités considérables de microbes.

Les Lipo-Vaccins permettent d'éviter : les réactions anaphylactiques, le réveil des foyers tuberculeux, les accidents chez les rénaux et les cardiaques.

- N° 1. Lipo-Vaccin T. A. B. (anti-typho-paratyphique).
- N° 2. Lipo-Vaccin Anti-Pyogène (anti-staphylo-strepto-pyocyanique).
- N° 3. Lipogon (anti-gonococcique).
- N° 4. Lipo-Vaccin Anti-entéro-colibacillaire.
- N° 6. Lipo-Vaccin Anti-Grippal (anti-pneumo-staphylo-strepto-pyocyanique).
- N° 9. Lipo-Vaccin anti-staphylococcique.
- N° 10. Lipo-Vaccin anti-streptococcique.
- N° 11. Lipo-Vaccin Anti-Pesteux.
- N° 14. Lipo-Vaccin Anti-Pneumococcique.
- N° 15. Lipo-Antigènes-Lipoïdés (voir Lipo-Antigènes).

Enregistré au L. N. C. n°s 2151 et divers.

Laboratoire des LIPO-VACCINS  
du Docteur LE MOIGNIC

32, rue de Vouillé et 1, rue Santos-Dumont  
PARIS (XV<sup>e</sup>).

## VACCINS RONCHÈSE

### « AMPHO-VACCINS »

#### AMPHO-VACCINS A INGÉRER.

Par cc. lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Amphoprophyl T. A. B. :** (voir ce nom) Vaccin préventif anti-typho-paratyphique.

**Ampho-Quintivaccin :** Traitement efficace de la coqueluche et de ses complications.

**Anti-infectieux :** Toutes infections générales ou locales. Dermatoses. Vaccination pré ou post-opératoire.

**Anti-staphylococcique :** Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

**Antityphoïdique T. A. B. :** Agent curatif remarquable des infections typhique et paratyphiques et, grâce à une association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

**Intestinal :** Auto intoxications d'origine intestinale, entérites, appendicites, cholécystites, syndrome entéro-rénal, certains rhumatismes, insuffisance hépatique, préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux accouchements.

**Pulmonaire :** Grippe, bronchites, pneumonie, bronchopneumonie, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

**Urinaire :** Toutes infections de l'appareil urinaire.

**Présentations. —** Les Ampho-vaccins à ingérer, sauf l'*Amphoprophyl T. A. B.* et l'*Ampho-vaccin intestinal*, sont présentés en : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. :

D'autre part, l'*Ampho-Quintivaccin* et les Ampho-vaccins anti-infectieux pulmonaire et urinaire à ingérer sont également présentés en : Coffrets de 24 ampoules de 2 cc.

L'*Amphoprophyl T. A. B.* (préventif) est présenté en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile.

L'*Ampho-Vaccin Intestinal* à ingérer est présenté :

En boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

En coffrets de 24 ampoules de 5 cc.]

En coffrets de 50 ampoules de 5 cc.

**Posologie moyenne. —** *Ampho-vaccin intestinal* : 1 ampoule par jour, puis 1 ampoule tous les 2 ou 3 jours.

Pour les autres *Ampho-Vaccins* à ingérer : 2 à 3 ampoules par jour.

## AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Anti-Infectieux :** Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

**Anti-staphylococcique :** Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

**Intestinal :** Tous états intestinaux aigus et chroniques.

**Pulmonaire :** Pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite, grippe, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

**Urinaire :** Toutes infections de l'appareil urinaire. Les Amphi-Vaccins injectables sont vendus en boîtes de 6 ampoules de 1,5 cc.

**Posologie moyenne.** — 1 cc. tous les 2 à 3 jours (doses quotidiennes d'essai : 1/4, 1/3, 1/2 cc.).

## AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrats de cultures additionnés par cc. de 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Antipyrétique :** Furoncles, anthrax, abcès, dermatoses infectieuses, interventions abdominales, curetages, cancers du col.

### Trois présentations :

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc.

Coffrets 12 ampoules de 10 cc.

**Amphi-vaccin antipyrétique pour petits pansements,**  
en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

**Rhino-Pharyngien :** Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Présenté en ampoules auto-instillables.

### Présentations :

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.

Coffrets 20 ampoules de 2 cc.

**Rhino-Amphogel (Voir ce nom).** (Gelée à base d'Amphi-vaccin rhino-pharyngien). Rhino-Propylaxie de la grippe et du coryza.

**Amphi-tablettes (Voir ce nom).** (Comprimés à base d'Amphi-vaccin rhino-pharyngien.)

**Pyr-Amphogel (Voir ce nom).** (Gelée à base d'Amphi-vaccin pansement antipyrétique.)

**Amphi-Stomagel (Voir ce nom).** (Gelée-vaccin adhérente.) Étudiée spécialement pour l'usage en odonto-stomatologie.

## Laboratoires des Amphi-Vaccins Ronchèse

**A.-D. RONCHÈSE,** docteur en pharmacie.

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III<sup>e</sup>).

(Tél. : Turb. 72-34.)

## VACCINS « VIRULTRA »

**Anti-Pyrétique chirurgical « Virultra ».** — Pré et postopératoire.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc.

**Anti-Pyrétique général « Virultra ».** — Toutes affections pyrogènes et septiciémiées.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

— 3 amp. de 2 cc.

Furonculose, Eczéma, Erysipèle.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc.

— 3 amp. de 10 cc.

Brûlures, Plaies, Anthrax, Phlegmons, etc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc.

**Broncho-Vaccin « Virultra ».** — Grippe, Broncho-Pneumonies et toutes affections broncho-pulmonaires.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

— 3 amp. de 2 cc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc.

**Dermultra « Virultra ».** — Pour toutes affections dermatologiques.

Une seule forme : Pommade-Vaccin.

**Enterultra « Virultra ».** — Colibacillémies, Enterococcémies et toutes affections intestinales.

Une seule forme : Ampoules buvables.

6 amp. de 5 cc.

**Gynécologique « Virultra ».** — Métrites, Salpingites, Fièvre puerérale, etc...

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc.

— 3 amp. de 10 cc.

**Ophthalmologique « Virultra ».** — Toutes affections oculaires suppurées.

Une seule forme : Pansement.

6 amp. de 2 cc.

**Oto-Rhino-Laryngologique « Virultra ».** — Rhinites, Sinusites, Mastoidites, Coryzas, Laryngites, Oïtes, Rhume des foies, etc.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

Forme pansement : 6 amp. de 5 cc.

— 6 amp. de 2 cc.

**Uro-Vaccin « Virultra ».** — Toutes affections gonococciques.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc.

Forme pansement (pour homme) : 6 amp. de 5 cc.

Forme pansement (pour femme) : 6 amp. de 10 cc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc.

**Nota.** — L'Uro-Vaccin « Virultra » — Pansement (H ou F.) peut être utilisé *in loco* pour le traitement de l'ophtalmie purulente du nouveau-né.

**Ultravul « Virultra ».** — Pour pansement génital de la femme dans toutes affections microbiennes utérines.

Une seule forme : ovules-vaccin.

**G. TAUPIN,** Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Dépôt général pour la France : O. C. P.

**Laboratoires « VIRULTRA »**

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure). — (Tél. : 19 à Serquigny.)

## VACLYDUN

**Lysats-vaccins du Docteur Louis Duchon.**

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

**Voir :** Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Rhino, Staphylo et Strepto-Vaclydun ; Grippo-Vaclydun.

## VACLYDERM

**Composition.** — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

**Indications.** — Réalise une vaccinotherapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furunculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

**Mode d'emploi.** — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 22 fr. 30.

**Laboratoire CORBIÈRE et Pansements brevetés CORBIÈRE S.A.**

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.) — Télégr. : Pantuto 74 Paris.

## VAGORIANE

**Troubles du Vago-Sympathique à prédominance Vagale.**

### Formule :

Lobe antérieur d'hypophyse .....	0,01	Extrait de Crataegus .....	0,01
Camphre monobromé .....	0,05	— Valériane ....	0,015
Diéthylmalonylurée .....	0,05	— Boldo .....	0,015
Chlorure de Magnésium .....	0,05	— Guarana .....	0,015
Extrait de Passiflore .....	0,025	— Jusquiame .....	0,0075
— Ballote .....	0,01	— Marron d'Inde .....	0,005
— Combretum .....	0,01	— Belladone .....	0,005

Par comprimé dragéfié.

**Indications.** — VAGOTONIE, dépression, vertiges, anxiété, insomnies ou mauvais sommeil, torpeur et inquiétude, désordres psychiques frustes, douleurs erratiques variées, céphalées frontales et occipitales, état nauséux, auto-intoxication, spasmes, anabolisme, perturbations circulatoires, désordres mensuels chez la femme et dysgénésie chez l'homme.

**Posologie.** — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 17 fr. 20 (40 dragées par boîte).

Pour les Sympathicotoniques, voir : SYMPATHORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le n° 988-2.

**Laboratoire FOSSET**

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

## VAGOSÉDYL

**Sédatif du vague.**

Phényléthyl-Malonylurée .....	} 0 gr. 017
Extrait de Jusquiame titré en alcaloïdes .....	
Extrait de Valériane fraîche et stabilisée .....	
Oxyde de zinc préparé par voie humide .....	

VAGOSÉDYL réalise une formule de Méglin améliorée.

**Doses moyennes.** — 2 à 4 comprimés par jour.

**Indications principales.** — Hypervagotonie, Spasmodicité, Algies et Spasmes viscéraux, Entéronévroses, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des ptoses, Malaises en rapport avec la Menstruation, la Grossesse, la Ménopause, Symptômes subjectifs du Cœur, Artériospasme, Dyspnées spasmodiques, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Neurasthénie, Excitation psychique, Troubles du Sommeil.

Prix du flacon : 16 fr. 50.

**Laboratoire biologique VALTRY**

122, Champs-Élysées. — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12).

## VAGOSTABYL MONIN

**Comprimés dragéfiés.**

A base de Marjolaine. — Sans Barbituriques.

Traitement phytothérapeutique de toutes dystonies Vago-Sympathiques. Communication Société de Biologie, tome CXV.

**Composition.** — Oléosaccharure de Marjolaine (Origanum majorana, labiées). Lactate de Calcium. Cimicifugine. Hyposulfite de magnésium.

**Propriétés.** — Régulateur et stabilisateur très actif du système nerveux.

Action tonocardiaque : diminue la fréquence, augmente l'amplitude.

**Indications.** — Toutes Dystonies vago-sympathiques. — Insomnies.

Affections cardiaques : Tachycardie, Arythmie, Palpitation, Angor.

Troubles de la vie végétative : Basedow, Ménopause, grossesse, déséquilibre du métabolisme basal.

— Asthme nerveux — Symptômes nerveux pré et post-opératoires.

— Algies : Céphalées rebelles, Névralgie faciale, Douleurs des sinusites — Troubles nerveux divers : Bourdonnements et sifflements d'oreilles, hoquet, mal de mer.

Aérophagie, Vertiges, spasmes. — Épilepsie, Agitation. Dermatoses nerveuses.

**Posologie.** — 1<sup>er</sup> jour : 6 à 8 dragées, doses fractionnées. Jours suivants : doses décroissantes jusqu'à 2 dragées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 696.

Prix : 23 fr. 50.

**Laboratoire MONIN**

Bureaux et Correspondances.

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trudaine 37-45.)

## VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

**Perles.** — 3 à 6 par jour avant les repas ; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

**Propriétés.** — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

**N. B.** — La Valbornine n'est pas un soporifique. Le sommeil n'est régularisé qu'au bout de quelques jours par sédation du système nerveux.

Le flacon : 14 fr. 40.

**Laboratoires Henry ROGIER**

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

## VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

### Composition :

Extrait alcoolique de valériane stabilisée.....	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 005
Extrait de datura.....	0 005
Extrait alcoolique de passiflore.....	0 03
K Br.....	0 05
Extrait alcoolique de cratægus.....	0 03

⊗ pour une dragée de 0 gr. 16.

40 dragées par étui — Prix en France : 17 fr. 20.

**Propriétés.** — Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jusquiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit synergiquement.

**Indications.** — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété, Insomnie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthyliisme, affections cardiaques ou vasculaires, digestives, génitales.

**Posologie.** — Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

20 jours de traitement.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL. pharm., 4, avenue Orban.

## VALEDYL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

**Indications.** — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

**Formule.** — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de gelsénium.

**Forme.** — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur et sous forme de comprimés.

**Mode d'emploi.** — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-34.

**Laboratoire HOCQUETTE**

12, rue Notre-Dame-de-Nazareth — PARIS (III<sup>e</sup>)

(Tél. : Arc. 47-13.)

## VALÉNAL

Sédatif nerveux. Hypnotique doux.

**Composition.** — Pour 1 dragée :

VALÉrianne extrait.....	0,045
Cratægus extrait.....	0,015
Saule blanc extrait.....	0,015
Passiflore extrait.....	0,015
Hamamélis extrait.....	0,01
LUGONAL (Phényléthylmalonylurée) ...	0,005

Association logique, bien dosée, active et sans danger.

**Indications.** — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitation nerveuse, Hyperémotivité, anxiété, palpitations. Etats nerveux de la ménopause. Hypertension (surtout spasmodique).

**Posologie.** — De 1 à 4 dragées par jour (dose pouvant être largement dépassée).

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

Simple ou Bromuré.

### Composition :

*Simple* : 0 gr. 50 d'extrait de Valériane, par cuillerée à café.

*Bromuré (Élixir Gabail)* : 0 gr. 50 d'extrait et 0 gr. 25 de Bromure de Strontium, par cuillerée à soupe.

**Indications.** — Toutes les affections nerveuses.

*Simple* : 4 cuillerées à café par 24 heures.

*Bromuré* : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

(Comme *Hypnotique* : 2 cuillerées à soupe une heure avant le coucher.)

Prix : Le flacon : 25 fr. 50.

**Laboratoires GABAIL**

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).  
(Tél. : Alésia 23-48.)

## VALÉRIANATE PIERLOT

### Composition :

Distillat représentant 2 fois son poids de racines fraîches et sauvages de valériane..... 5 cc.  
Carbonate d'ammoniaque ..... Q. S.  
pour saturer, par cuillerée à café.

**Indications.** — Neurotrope, sédatif, inoffensif, le *Valérianate Pierlot* rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

Prix : 23 fr. 20.

## DRAGÉES PIERLOT

à la Marjolaine

(Liqueur concentrée de *Valérianate Pierlot*, associée au *Cratægus* et à la Marjolaine.)

Absence totale de produits toxiques. Aucune odeur.

**Indications.** — Sédatif harmonisant du système nerveux.

### Composition :

Distillat représentant 15 fois son poids de racines fraîches et sauvages de valériane (*Valérianate Pierlot* concentré) ..... 1 cc.  
Carbonate d'ammoniaque ..... Q. S.  
Extrait de *cratægus* ..... 0,08.  
Extrait d'*origanum majoranum*.. 0,0125.

(Par dragée.)

**Mode d'emploi.** — Avaler avec une tisane ou un peu d'eau, de 4 à 6 dragées par jour en 2 fois.

Prix : 23 fr. 20.

**Laboratoires RIVIER**

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).  
(Tél. : Alésia + 22-46.)



## VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

**Indications.** — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est inodore et d'une saveur agréable.

### Laboratoires THOMAS

2, rue Sainte-Cécile — 31, fg Poissonnière  
PARIS (IX<sup>e</sup>)  
(Tél. : Provence 49-77.)

## VALÉROBROMINE LEGRAND

**Composition.** — Ethers-Sels de l'acide « Bromovalérianique ».

**Avantages.** — La VALÉROBROMINE LEGRAND (brome organique) offre, par rapport aux bromures (brome minéral), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (arsenic et phosphore organiques), par rapport aux arséniates et aux phosphates (arsenic et phosphore minéraux). Elle possède, contrairement au valériane d'ammociaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianes, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

**Indications.** — Toutes les névroses : Epilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc...

**Formes.** — Liquide : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour.

### DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## VALÉRONAL

Comprimés ou Solution.  
Sédatif puissant et inoffensif  
des troubles nerveux, Psychopathies.  
Hypnotique doux sans odeur.  
Antispasmodique.

Par comprimé ou par cuillerée à café :

Acide diéthylbarbiturique ....	0 gr. 05
Extrait sec de valériane .....	0 gr. 025
Extrait de passiflore .....	0 gr. 01

Pour un comprimé dragéifié terminé à 0 gr. 40.

**Dose sédative.** — 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

**Dose hypnotique.** — 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans une infusion.

Pas de contre-indication.

**Société des Laboratoires de MONTMOROT**

G. de MONTMOROT, pharmacien.

12 bis, rue Keppler — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Kléber 65-26, 65-27, 65-28.)

## VALLATHEN

**Traitement des maladies de la peau.**  
*Organothérapie Bellas.*

**Présentation.** — En boîtes de 50 dragées : 46 fr. 90.

**Composition.** — Suc intestinal, Extrait de pan-crées, Extrait hépatique, Soufre lavé.

**Indications.** — Eczémas, Furunculose, Anthrax, Blépharite, Orgelets, Séborrhée, Acné vulgaire, Acné rosacée, Urticaire et toutes dermatoses.

**Posologie : Adultes :** Dose moyenne, 2 dragées 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas ;

**Enfants** (au-dessus de 6 ans) : Dose, 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

*Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon la gravité des cas.*

Veiller à ce que le malade ait tous les jours une selle régulière.

Enreg. au L. N. C. M. n° 167-16.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

B. Abadie, pharmacien,

3, pl. Intérieure-St-Michel-TOULOUSE. (Tél. 213-06.)

## VALOVOSAN

### Composition :

Folliculine .....	40 U. I.
Poudre d'ovaire frais.....	0 gr. 40
Bromisovalérylurée.....	0 gr. 15

Pour 1 comprimé.

**Action.** — *Sédatif des troubles nerveux liés à l'insuffisance ovarienne.*

**Indications.** — Troubles psychiques de la puberté, du pré-menstrum et de la ménopause : Instabilité, Irritabilité, Angoisses, Insomnie, Palpitations, Prurit vulvaire. Vaginisme, Frigidité, Dysménorrhées, Aménorrhées occasionnelles, Vomissement incoercibles et troubles sympathiques de la grossesse.

**Posologie.** — 2 comprimés, 3 fois par jour.

**Présentation.** — Flacon de 40 dragées.

Laboratoire M. LEFEBVRE

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°).  
(Tél. : Ségur 60-77.)

## VALTHÈNE

### (Gouttes)

Antispasmodique puissant.

**Indications.** — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

**Composition.** — Alcoolature d'Alum Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

*Ne contient aucun toxique. Goût agréable.*

**Posologie.** — *Doses moyennes* à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an...	V à X gouttes.
— de 1 an à 5 ans .....	X à XX —
— au-dessus de 5 ans...	XX à XL —
Adultes.....	L à LX —

Flacon de 30 cc. Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire de la VALTHÈNE  
VALAT

166, rue de la Roquette — PARIS (XI°).  
(Tél. : Roquette 25-47.)

## VANADARSINE GUILLAUMIN

### GOUTTES

**Composition.** — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

**Propriétés.** — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence, le teint redevient frais.

**Indications.** — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

**Mode d'emploi.** — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler : dose moyenne : X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

## VANADARSINE GUILLAUMIN

### AMPOULES

#### (Sérum Vanadarsiné)

**Composition.** — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cc.

**Propriétés.** — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergétique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

**Indications.** — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cc. par jour ou tous les deux jours.

*Enfants* : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos, recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. et de 3 cc. (dose forte).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.  
(Tél. : Littré 26-92.)

## VANOXYLE MILLET

### AMPOULES

#### Composition:

Solution isotonique et isoionique de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, non arsénée.

#### Propriétés:

Médication vanadiée oxydante, amélioratrice du terrain. Stimulante et tonique.

#### Indications:

Toutes les asthénies, anémies, convalescences, tuberculose, pré-tuberculose, paludisme, syphilis.

#### Présentation:

12 Ampoules de 10 cc. correspondant à 20 mgr. de Métavanadates, soit 8 mgr. 3 de Vanadium métal.

#### Mode d'emploi:

En injections intra-musculaires, chez les adultes. Commencer par une demi-ampoule, puis 3/4, puis l'ampoule entière, tous les deux jours.

Prix : 24 fr. 70.

## GOUTTES

#### Composition:

Solution stable de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, non arsénée, à 5 p. 1000.

XX gouttes correspondant à 5 mgr. de Sels de Vanadium.

#### Propriétés et Indications:

Celles des ampoules.

#### Mode d'emploi:

Les gouttes de Vanoxyle se prennent au début du repas, dans un peu d'eau.

Adultes : XX à XXX gouttes deux fois par jour.

Enfants : selon l'âge, V à X gouttes deux fois par jour.

Prix : 18 fr. 60.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

1, rue Ambroise-Thomas — PARIS (9<sup>e</sup>).

(Provence 20-20 et 58-43.)

## VAN-SOL

#### Cachets

#### Formule:

Poudre de colchique.....	0,03
Acide acétylsalicylique .....	0,50
Acide phénylcinchoninique .....	0,25

Forme. — Boîte de 20 cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

Mode d'emploi. — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers, en laissant un intervalle de 4 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 19 fr. 50 la boîte.

Laboratoires TILLAT-CHANTEAUD

80 bis, avenue de Paris — VERSAILLES  
(S.-et-O.)

## VAPOSULPHIUM

Comprimés sulfurés pour inhalations.

Propriétés thérapeutiques. — Le Vaposulphium, comprimés inhalants sulfurés, rend pratique la cure soufrée externe par inhalation. Il complète la cure soufrée interne par le Sulphium.

Indications. — Rhumes, Enrouements, Laryngites, Pharyngites, Catarrhes, Sinusites et toutes affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Mettre un comprimé dans un bol d'eau bien chaude (salée, si on désire un liquide voisin de l'isotonicité) et respirer les vapeurs sulfureuses.

Laboratoires BRISSON

Docteur DEDET et Cie, Pharmaciens

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## VARIPHILE

**Forme.** — Pilules dragéifiées.

**Composition.** — Extrait de cupressus, 0,04 ; Extrait d'Hanémélis, 0,04 ; Extrait d'œsculus, 0,04 ; Poudre d'ovaire, 0,004 ; Poudre de surrénale, 0,004 ; Poudre de thyroïde, 0,004, pour une pilule.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Tonifie les vaisseaux, fluidifie le sang et active la circulation générale par une association médicamenteuse synergique d'extraits de glandes endocrines et d'extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives et hémostatiques.

**Indications.** — Affections veineuses (varices, hémorroides, varicocèle, phlébites).

**Troubles circulatoires** (accidents de la puberté et de la ménopause).

**Mode d'emploi.** — 2 pilules à chacun des 2 principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

**Prix :** 20 francs la boîte de 60 pilules pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

31, avenue Ledru-Rollin — PARIS (12<sup>e</sup>).

## VARISCLÉRINE

(Ampoules).

préparées selon les indications  
du professeur Sicard.

**Injectons sclérosantes intravariqueuses,**  
sans accidents, sans insuccès.

**Varisclérine A :** Salicyl. de soude.

**Varisclérine B :** Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 35 francs.

Laboratoire Angellini,

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous les commissionnaires  
de droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

## VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles  
de la ménopause.

**Composition.** — Gui, cratægus, formine  
iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et  
opothérapiques.

**Indications.** — Hypertension, Presclérose  
et Artério-sclérose, Troubles de la ménopause,  
Varices, Hémorroides, Obésité.

**Mode d'emploi.** — 2 dragées au début de  
chacun des deux principaux repas.

Prix : 24 fr. 85.

Laboratoire P. GUÉRIN

86, rue de la Réunion — Paris (XX<sup>e</sup>).

## VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications thérapeutiques.**

**Troubles circulatoires :** Troubles des règles et Ménopause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

**Troubles glandulaires :** Congestion thyroïdienne, ovarienne, pancréatique ; Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés Sécrétion lactée.

**Troubles sensitivo-moteurs :** Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

**Mode d'emploi.** — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

*Après* les repas, matin, midi et soir.

**Prix de vente au public :** 21 fr. 80 le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 35-25.)

## VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

**Forme.** — Solution huileuse.

**Composition.** — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol; Para-amidobenzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

**Indications.** — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

**Doses.** — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Prix : 4 fr. 75.

Enreg. au L. N. C. M. sous les nos 219-8 et 219-9.

**Laboratoires CALMEL-DOMERGUE**

S. A. R. L. au capital de 300.000 francs.

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

## VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

**Forme.** — Pommade pour enfants et adultes.

**Composition.** — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine.

Prix : 9 fr. 40.

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Prix : 10 fr. 40.

**Indications.** — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

**Doses.** — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

Enreg. au L. N. C. M. sous les nos 219-6 et 219-7.

**Laboratoires CALMEL-DOMERGUE**

S. A. R. L. au capital de 300.000 francs.

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

## V. A. V.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

**Indications thérapeutiques.** — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacilloses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

**Forme et mode d'emploi :**

a) *Emulsion forte* pour tuberculoses chirurgicales : injectable. Doses croissantes : 0,25, 0,50, 1, 1,5, 2 et 2 cc. tous les 4 jours. Doses massives : 2 cc. une fois par semaine.

b) *Emulsion faible* : injectable :

1° Pour tuberculoses pulmonaires et chirurgicales associées, 0,50 cc. une fois par semaine ;

2° Pour tuberculoses chirurgicales chez d'anciens tuberculeux pulmonaires, 0,25, 0,50, 1, 1,5, 2 et 2 cc. une fois par semaine.

3° Pour tuberculoses pulmonaires seules, 0,50 une fois par semaine.

Valable 2 ans.

Prix au public : 74,50 et 78 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1203.

**Laboratoire ELOCINE**

51, rue du Ranelagh — Paris (XVI°).

(Tél. : Auteuil 84-18.)

## VAXA

**Composition :**

Cultures de Bacterium Coli.....	55
— d'entérocoques.....	15,5
— de Proteus Vulgaris.....	15
— de Staphylocoques.....	8
— de Streptocoques.....	5
— de Sarcines.....	1
— de Bacilles Pyocyaniques.....	0,5
pour 100	

**Propriétés :** C'est un bouillon-vaccin polymicrobien et polyvalent, riche en corps microbiens, endotoxines et produits de lyse spontanée. Il est préparé avec des souches isolées et renouvelées pour chaque préparation.

**Indications.** — Enfants, Adultes. Colites, colibacilloses, entérocoques, pyélonéphrite, cystite, syndrome entéro-hépatique et entéro-génital ; troubles nerveux, eulanés.

En chirurgie, la cure pré et post-opératoire empêchera de graves complications, car c'est souvent l'intestin qui infecte l'opéré.

**Présentation :** Ampoules de 5 cc.

**Mode d'emploi :** Une ampoule le matin au reveil dans un peu d'eau. Attendre 30 minutes pour prendre le petit déjeuner. Une seconde ampoule le soir au coucher.

Il est intéressant de faire une cure de Vaxa et Lactéol-liquide pour supprimer les fermentations intestinales (1 ampoule de chaque avant chaque repas).

**Laboratoire du Docteur BOUCARD**

30, rue Singer — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 09-93.)

## VAXITIOL

Vaccin Intestinal Polyvalent  
à support sulfo-sodique.

**Composition.** — 1° Du vaccin : Colibacilles (10 milliards), Entérocoques (6), Staphylocoques (2), Proteus Vulgaris (1);

2° Du support sulfo-sodique : Hyposulfite de soude et Solution de Bourget.

**Indications.** — Syndromes entéro-rénal et associés, auto-intoxication intestinale et séquelles anaphylactiques, entéro-colite...

*Chirurgie et accouchements* : vaccination pré- et post-opératoire des complications (infections, phlébites).

*Gynécologie* : séquelles des maladies infectieuses et d'accidents colibacillaires.

**Forme.** — Ampoules buvables.

**Posologie.** — Cas aigus : matin et soir.

Cas moyens et chroniques : une fois par jour.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

## VÉGANINE

Médicament Analgésique, Antipyrétique,  
Antigrippe, à action renforcée.

Comprimés se désagrégeant immédiatement par un  
procédé nouveau de fabrication.

### Composition :

Phosphate de Codéine .....	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique ....	0 gr. 25	
Phénacétine .....	0 gr. 25	

### Action thérapeutique et Indications :

La Véganine, composée d'après les nouvelles théories de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés.

Sédatif puissant par la Codéine,  
Analgésique par l'Acide acétylsalicylique,  
Analgésique et antithermique par la Phénacétine,  
la Véganine constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, névrites, sciatique, lumbago; également utile en neurologie (états anxieux) et en cancérologie.

Par son association synergique, l'action thérapeutique de la Véganine est considérablement renforcée, et cela sans intoxication secondaire.

### Doses et mode d'emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec un peu d'eau, de café ou de thé.

Prix : 8 fr. 20 le tube de 10 comprimés,  
13 fr. 80 le tube de 20 comprimés.  
27 fr. 40 la boîte de 50 comprimés.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 150-1.  
Littérature et échantillonnage médical sur demande.

### LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en Pharmacie.  
13, rue Pagès — SURESNES (Seine).  
(Tél. : Longchamp 16.85, 16.86.)

Dépôt pour la Belgique :

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**  
53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

## VÉGÉCARNIS BENGUÉ

(Viande végétale.)

**Composition.** — Pour 100 gr. :

Farine de riz .....	4 gr.
Farine d'Arrow-Root .....	3 gr. 50
Phosphate tricalcique .....	1 gr.
Glycérophosphate de chaux .....	0 gr. 40
Poudre de champignons de Paris .....	4 gr.
Citrate de soude .....	0 gr. 70
Cacao pulvérisé .....	26 gr. 40
Sucre vanillé .....	60 gr.

**Propriétés et indications.** — Puissant reconstituant à base de champignons de couche et de cacao. Toutes maladies causées de débilité, tuberculose, lymphatisme, surmenage, phosphaturies, troubles de croissance, dépressions nerveuses.

**Forme.** — Poudre.

**Posologie.** — *Adultes* : Délayer une cuillerée à entremets de poudre dans un peu de lait. Ajouter une tasse de lait chaud et faire bouillir trois minutes environ.

*Enfants* : Une demi-cuillerée de poudre et une demi-tasse de lait suffisent.

*N. B.* — Toujours utiliser le lait et toujours tenir la boîte fermée.

**Prix** : 15 fr. 80.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils, Pharmaciens,  
16, rue Ballu, PARIS (IX<sup>e</sup>). (Tél. : Trinité 85-60.)

## VÉGÉLACT

**L'Aliment au Soja du Régime Lacté Restreint.**

**Toutes Intolérances au lait** : Troubles Dyspeptiques, Chez les Vomisseurs. Colites de l'enfant et de l'adulte, Putré factions intestinales, Pyuries, États infectieux, Tétanie, Eczéma infantile.

**Composition.** — Comparable à un lait sec demi-écrémé dont les 2/3 des protéines (20 p. 100) sont constitués par la *caséine du Soja*. Équivalent au lait, le VÉGÉLACT est utilisé soit préparé à l'eau, soit au lait coupé d'eau, en biberons (VÉGÉLACT « A » ou « B ») ou en bouillies (VÉGÉLACT « B » ou « C ») et réalise une ration équilibrée complète d'entretien et de croissance par ses *acides aminés*, ses *sels minéraux* (Fe, Mn Ca, P) et ses *vitamines naturelles* (soja, malt, lysat de levures).

**Valeur alimentaire** : 1 cuiller à soupe rase de VÉGÉLACT (9 gr.) = 45 gr. de lait de vache = 33 calories utiles.

Trois formes :

**VÉGÉLACT « A » (SPÉCIAL-ATOMISÉ).** — Contient 10 p. 100 de lait sec. Véritable lait de Soja *solubilisé*, malté selon les principes de Terrien, à utiliser comme un lait sec chez les nourrissons malades *dès la naissance*.

(Pour un régime exclusif de longue durée, donner à l'enfant un complément de vitamines A et C.)

*Vendu uniquement en pharmacie. Boîtes métal de 375 gr. et kilo.*

**VÉGÉLACT « B » (sans lait sec).** — Bouillie au Soja-Soyolk, maltée et sucrée, *liquide et d'aspect laiteux après cuisson*, pour biberons et bouillies liquides. Se prépare comme toute farine maltée. À utiliser dès le *troisième mois*. Recommandé pour le coupage du lait des biberons, qu'il maternise, le VÉGÉLACT « B » préserve l'enfant contre les accidents digestifs et lui assure une croissance parfaite.

**VÉGÉLACT « C » (sans cacao ou avec 6 p. 100 de cacao).** — Bouillie au Soja-Soyolk onctueuse et sucrée, *épaisse après cuisson*. Déjeuner de l'enfant, premier aliment des opérés, des *typhiques*, des colitiques et des convalescents. Déjeuner tonique pour tous. Aliment *galactogène* par ses protéines pour nourrices, il réalise également un *pansement alimentaire* dans l'ulcère gastrique.

Les VÉGÉLACT « B » et « C » sont vendus en boîtes carton de 250 gr. et de 500 gr.

Laboratoires BOUTROUX et DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## VÉGÉLAX

Laxatif végétal.

(Comprimés)

**Composition.** — Extraits de bourdaine, séné, cascara sagrada, boldo, artichaut. Poudres de scammonée et rhubarbe.

**Indications:**

Constipation rebelle. — Rééducation Intestinale. — Affections du foie. — Arthritisme. Action douce et progressive. Ne donne pas de coliques.

**Doses :**

De 2 à 4 comprimés par jour le soir au coucher.

*Enfants :* 1/2 dose.

### LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien

47, rue Nollet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## VÉGÉPHOS

Inosito Hexaphosphate de chaux  
et de Magnésie.

**Composition.** — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

**Propriétés.** — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.  
**Formes.** — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale de France

379, av. Président-Wilson, La Plaine-St-Denis (Seine).  
(Tél. : Plaine 16-70.)

## VÉGUMINE

Aliment à base de poudres de légumes frais stabilisés.

**Composition.** — Poudre totale de légumes et de fruits frais stabilisés (carottes, tomates, épinards, bananes mûres) associée aux hydrates de carbone et au dextro-maltose. Riche en éléments minéraux ; apport de vitamines A, B, C.

**Forme.** — Poudre.

**Propriétés.** — Complément indispensable de l'aliment artificiel, stimule et régularise les fonctions digestives, reminéralisateur, favorise la croissance et la dentition, pouvoir calorique élevé.

**Indications.** — Végumine facilite le sevrage, évite les carences, les accidents dyspeptiques dus au régime trop exclusif des farineux et du lait, éduque les voies digestives. Anorexie, avitaminoses.

**Dose.** — A 3 mois : 1/2 cuillerée à café par biberon. De 4 à 5 mois : 1 cuillerée à café par biberon.

De 6 à 7 mois : 2 cuillerées à café par biberon.

A partir de 8 mois : 3 à 4 cuillerées à café par repas. Boîte de 250 gr. Durée moyenne de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

## VEINICURA

du Dr DINET

Médication Spécifique des Troubles de la Circul. veineuse.

**Composition et forme.** — Association d'extraits végétaux à propriétés vaso-constrictives et toniques du système veineux, d'extraits glandulaires (thyroïde et hypophyse) modificateurs de la nutrition générale, et d'un sel fluidifiant du sang (citrate acide de soude). Présenté en comprimés bicolores : comprimés rouges extraits végétaux et Citrate ; comprimés blancs extraits glandulaires seuls (Thyroïde et Hypophyse), afin d'éviter leur altération qui se produit naturellement lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits, surtout hygroscopiques.

**Indications thérapeutiques.** — Troubles circulatoires dus à la stase veineuse ; varices et varicosités, hémorroïdes, varicoèles, congestions passives de l'utérus et de la prostate, pesanteur, œdème des jambes, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés de chaque couleur en moyenne par jour, les rouges pendant le repas, les blancs entre les repas.

Laboratoire de l'Angiolymphé du Dr Rous

D. SEVENS, Pharmacien

9, rue Soyot — NEUILLY (Paris)



## VEINOSÉROL

(ancien Veinosérum)

Enregistré au L. N. de C. des médic. sous le n° 167-10.

**Indications.** — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes et tous états congestifs.

**1° Forme gouttes :** Formule très active à base d'extraits représentant exactement leur poids de plantes (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamelis, rhamnées).

**Doses.** — XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 24 fr. 40.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

3, place Intérieure-Saint-Michel, TOULOUSE  
(Tél. : 213-06.)

## VEINOSINE

**Traitement spécifique complet des affections veineuses.**

**Comprimés à base de :** Hamamelis virginica, Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

**Indications.** — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques. Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

**Doses.** — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

**Laboratoires LEBEAULT**

Besins et Cie, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## VEINOTROPE

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de la maladie veineuse et de ses complications.

**Indications.** — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la puberté.

### Composition :

#### A. — VEINOTROPE M.

(Usage masculin, comprimés roses.)

Poudre de Para-thyroïde .....	0,001
— orchitique .....	0,035
— de surrénales .....	0,005
— de pancréas .....	0,100
— d'hypophyse .....	0,001
— de noix vomique .....	0,005
Extrait d'hamamelis virginica .....	0,010
— de marron d'Inde .....	0,005

Pour un comprimé.

#### B. — VEINOTROPE F.

(Usage féminin, comprimés violets.)

Poudre de Para-thyroïde .....	0,001
— d'ovaires .....	0,035
— de surrénales .....	0,005
— de pancréas .....	0,100
— d'hypophyse .....	0,001
— de noix vomique .....	0,005
Extrait d'hamamelis virginica .....	0,010
— de marron d'Inde .....	0,005

Pour un comprimé.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés au lever et 2 comprimés au coucher, ou suivant prescription médicale ; 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

**Formule F.** — Interrompre pendant la période menstruelle.

### VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.	
Extrait embryonnaire .....	1 gr.
Protéoses hypotensives du pancréas ..	3 —
Calomel .....	1 —
Talc stérile, Q. S. pour .....	100 —

**Mode d'emploi.** — Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

**Laboratoires LOBICA**

25, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

## VELOUCRÈME VIDAL

Pâte pelliculemplâtre, très efficace pour le traitement des maladies de peau, sur laquelle elle forme promptement un enduit sec, souple et adhérent, soluble à l'eau, sans corps gras, ne tachant pas le linge.

**Indications.** — Prurits, Eczémas, Herpès, Impétigos, Engelures, Érythème fessier des nouveau-nés, Coups de soleil, Brûlures, Radiodermites et toutes Dermatoses.

**Mode d'emploi.** — Étendre sur la peau, en couche mince, en frictionnant doucement et légèrement jusqu'à ce qu'il ne subsiste qu'une pellicule très mince.

Prix : 19 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 74-1.

**Laboratoires LOISEAU**

LOISEAU, Pharmacien

119, rue Cardinet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

(Tél. : Wag. 08-16.)

## BANDE DE CRÊPE VELPEAU

**Bande de tissu élastique sans caoutchouc.**

La meilleure des bandes de crêpe : Légère, douce, extensible, chaude lavable.

**Filet bleu** à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

**Plaies, Varices, Efforts.** 5 cm. ; 7 cm. ; 10 cm.

**Filet rouge.** — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire. Douleurs, Rhumatismes. 5 cm. ; 7 cm. ; 10 cm. ; 15 cm.

**Ceintures** de 20 cm. ; 25 cm. ; 30 cm. ; pour Grossesses et Opérations.

**Bande rose sans filet.** Même qualité que la bande filet rouge, spécialement créée pour l'usage féminin. Prati-  
quement invisible sous les bas fins.  
5 cm. ; 7 cm. ; 10 cm.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe Velpeau. Exiger la marque Velpeau.

**PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE**

379, av. Président-Wilson, La Plaine-St-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 16-70.)

## VÉNOCAPSYL

**Traitement phytothérapique.**

**Spécifique des troubles circulatoires.**

**Composition.** — Gouttes à base de Capsicum, Hydrastis, Marron d'Inde, Piscidia et Hamamelis, sous forme d'extraits stabilisés et de teintures.

**Indications :**

**Troubles circulatoires :** ménopause, puberté, grossesse.

**Atonie du système vasculaire :** varices, ulcères variqueux, hémorroïdes, phlébites.

**Doses.** — XX à XXX gouttes, 2 fois par jour aux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1765-1.

**Laboratoire du VENOCAPSYL**

Place du 9-October — CAMBRAI

(Tél. : 590.)

## VÉNULES

**Tubes à aspiration automatique pour prises de sang.**

N° 0	de	8 cc.
N° 1 A	de	8 cc. avec 5 cc. de bile stérile.
N° 1 B	de	8 cc. avec bile stérile et dispositif pour Vidal.
N° 1 C	de	8 cc. avec 0 gr. 50 de taurocholate de soude.
N° 1 D	de	8 cc. avec taurocholate de soude et dispositif pour Vidal.
N° 2	de	8 cc. avec perles de verre.
N° 3 A	de	8 cc. avec 1,5 cc. de sol. de citrate de soude à 3,8 %.
N° 3 B	de	8 cc. avec 0 gr. 08 de fluorure de sodium.
N° 3 D	de	8 et 15 cc. avec 1 et 2 cc. de sol. de liquoïde à 1 %.
N° 4 A	de	30 cc. avec bouillon de culture et perles de verre.
N° 5 A	de	30 cc. avec bouillon glucosé et perles de verre.
N° 7	de	15 cc. pour la pratique courante et l'interférométrie.
N° 8	de	30 cc.
N° 9	de	30 cc. avec 5 cc. de sol. de citrate de soude à 3,8 %.
N° 10	de	100 cc. avec 75 cc. de gélose glucosée.
N° 11	de	50 cc.
N° 12	de	100 cc.

**Produits « BAYER »**

S. A. R. L.

16, rue d'Artois — PARIS (VIII<sup>e</sup>). (Tél. : Élysées 79-93.)

## VERACHOL

Cholagogue physiologique.

Augmente et fluidifie la sécrétion biliaire.

**Composition.** — Dragées à base de sels biliaires associés à des laxatifs légers.

**Indications.** — Préventif et curatif de la lithiase biliaire. Ictères, Insuffisance hépatique, Gros foie des alcooliques et des coloniaux, Constipation par insuffisance biliaire.

**Mode d'emploi.** — Commencer par une dragée et jusqu'à trois, si nécessaire, le soir en se couchant, ou une dragée après chaque repas. A avaler sans croquer. Pas d'intolérance, pas d'incompatibilités.

Prix : 18 fr. 80 le flacon de 50 dragées.  
31 fr. 30 le flacon de 100 dragées.

Enreg. au Lab. N° de Cont. des Méd. sous le N° 443-5.

Échantillons médicaux sur demande :

**LABORATOIRES FOUGERAT**

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine).  
(Tél. : Pereire 00-32.)

## VÉRALGINE

**Supprime toute souffrance.** Complète l'action du traitement curatif.

Combinaison barbituro-analgésique (Phénétine-Amidopyrine-Sonéryl) agissant sur les centres encéphaliques de la douleur :

centres corticaux et pseudo-centres de Sherrington.

Non soumise aux formalités des Toxiques C,

Sans stupéfiant.

Sans intolérance.

Sans réaction cutanée.

**Indications.** — Tous les états douloureux quelles qu'en soient la cause ou l'origine : Névralgies, Rhumatismes, Douleurs opératoires, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Ulcères, Cancer, Menstruation, etc.

Art dentaire, Périostite, Pulpite, Extractions, Fraisages, etc.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/2 ou 1 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

12 Comprimés : 9 fr. 50 — 8 Cachets : 7 fr. 30.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie, à BONDY (Seine).

Échantillons sur demande. (Tél. : 24 Bondy.)

## VÉRAMONE CRUET

Analgésique puissant à effets renforcés

**Composition.** — Association d'une molécule du corps de Pfeiffer (une molécule de diéthylmalonylurée combinée à une molécule de diéthylaminophényl-diméthylpyrazolone) et d'une molécule de diméthylaminophényldiméthylpyrazolone.

Le VÉRAMONE exerce une action analgésique puissante ; il est exempt d'effets nocifs sur le cœur, ne produit pas de phénomènes de fatigue et ne provoque pas de sudation. Grâce à ces qualités, il est indiqué dans les douleurs de toute nature (céphalées, maux de dents, dysménorrhée, etc.).

**Posologie.** — L'unité de prise pour un adulte est de 2 à 4 comprimés de VÉRAMONE à la fois. Chez les enfants, 1 comprimé.

**Présentations :**

Tube de 20 comprimés .....	10 fr.
Sachet de 4 comprimés .....	2 fr. 50

**Laboratoires CRUET**

89, avenue de La Bourdonnais — PARIS (VII<sup>e</sup>).

E. KELLER, Docteur en Pharmacie

(Tél. : Invalides 74-19)

Z. N. O. : DECOUDRE, 87, avenue de Saxe — LYON

## VÉRIANE BURIAT

**Présentation.** — En liquide et en comprimés.

**Composition.** — Une cuillerée à café ou un comprimé = 0 gr. 12 amide barbiturique di-éthyle et 1 gr. de Valériane fraîche et inodore.

Un comprimé = une cuillerée à café.

**Indications.** — HYPNOTIQUE fidèle et inodore, sommeil calme, réveil normal. SÉDATIF du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats.

**Posologie :**

Adultes : 2 à 5 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés, soit espacés dans la journée comme sédatif, soit en une seule prise 2 heures avant l'heure du sommeil comme hypnotique.

Le liquide peut être pris dans une infusion quelconque ou dans de l'eau sucrée ou non.

Enfants : par demi-cuillerée à café à partir d'un an. Tolérance parfaite.

**Laboratoire BURIAT**

37, rue Spontini — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

(Tél. : Passy 64-23.)

## VÉRICARDINE

Tube de 30 comprimés glutinisés à base de **Papavérine**.

Chaque comprimé représente :

Chlorhydrate de Papavérine .....	0,015
Bromhydrate de Quinine .....	0,02
Phényléthylmalonylurée .....	0,02
Extrait de Cratægus stabilisé .....	0,05

Excipient ..... Q. S. pour 1 comprimé.  
Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-9.

**Indications.** — Traitement énergique et rapide de l'instabilité cardiaque, Troubles cardiaques, Etats d'anxiété et de nervosité, Spasmes digestifs, Insomnies.

Grâce à la Papavérine, antispasmodique puissant de tous les muscles lisses.

**Mode d'emploi.** — Par 24 heures :

1 à 3 comprimés avant chacun des principaux repas.  
Contre les insomnies : 2 à 4 comprimés en se couchant.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 21 fr. 10.°

**Laboratoire JUIN-GUIRAUD**

26, rue Saussier-Leroy — PARIS (XVII°).  
(Tél. : Carnot 94-28.)

## VÉRITABLES GRAINS DE SANTÉ DU DOCTEUR FRANCK

Contre la constipation et ses conséquences. Migraines, Congestions, Affections du foie.

**Composition.** — Mise au point, vers 1800, par le Dr Rouvière, ancien professeur d'hygiène au Lycée de Paris, membre fondateur de l'Athénée royale :

Aloès du Cap ....	0 gr. 06	} Pour un grain de 0 gr. 14 enrobé.
Gomme gutte ....	0 gr. 03	
Bile de bœuf et excipient .....	0 gr. 01	

Il est à remarquer : 1° que l'aloès et la gomme gutte sont associés en proportions judicieusement établies, qu'ils doivent être absorbés au début du repas, ce qui évite l'irritation de l'intestin, et qu'ils sont cholagogues par la bile de bœuf ; 2° et que, suivant des avis autorisés, ils doivent être considérés comme un purgatif idéal, simple, à base purement végétale, d'absorption facile et d'efficacité constante.

**Laboratoire TRONCIN**

156, avenue Victor-Hugo — PARIS  
(Tél. : Passy 68-14.)

## VERMIFUGE CHIARINI

Vermifuge dont la formule a été créée il y a un siècle et demi.

**Composition.** — Essence de plantes anti-helminthiques récoltées en Provence, additionnées de K Br en petite quantité et soigneusement dosé, en solution hydro-alcoolique.

**Indications.** — Expulsion des vers intestinaux, principalement Oxyures et Ascaris, sauf le Tænia (Voir *Tæniifuge Jacquème*). Tous les troubles nerveux des enfants. Insomnies, irritabilité.

**Présentation.** — Elixir agréable.

**Posologie.** — Jusqu'à un an : 1/2 cuillerée à café ; de 1 à 3 ans : 1 cuillerée à café ; au-dessus de 3 ans : 1 cuillerée à dessert.

**Adultes :** 2 cuillerées à potage.

Le matin à jeun, le soir en se couchant.

Enr. au L. N. C. n° 641-1.

Flacons toutes dimens. (dep. 1/16 de l. jusqu'au l.)

**Laboratoires CHIARINI**

68, Bd. du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE (B.-du-R.)

## VERMIFUGE CORNET

**Composition.** — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.), de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

**Forme.** — Liquide, de conservation indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

**Doses et mode d'emploi :**

Jusqu'à 1 an .....	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans .....	1 —
De 8 à 15 ans .....	2 —
Adultes.....	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Prix : 8 fr. 80.

Échantillons sur demande.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

**Laboratoires SERRE**

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. (Tél. : 840-78.)

## VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contra d'Alep de *chœnopodium anthelmenticum* et de *pyrethrum anthemis*, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contra, 50 mgr. de *pyrethrum anthemis* et 2 mgr. 5 d'essence de *chœnopodium*.

**Posologie :**

**Enfants de 1 à 5 ans :** Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

**Enfants de 5 à 10 ans :** Une cuillerée à dessert.

**Adultes :** Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë doubler les doses.

Dans les cas d'*oxyurase*, en plus de l'administration par la bouche, donner en outre le Vermirène, aux mêmes doses que ci-dessus, en lavement à conserver, mélangé à une ou deux cuillerées à café d'eau tiède.

Prix : 13 fr. 50.

**M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.**  
Cinq-Cantons — BAYONNE.

## VEROGÉNOL

Traitement des Insomnies et des Maladies nerveuses.

**Présentation.** — En liquide ou en comprimés (cette dernière forme étant en règle avec les décrets sur les barbituriques).

**Composition :**

En liquide : 0,25 de diéthylbarbiturate de soude et 0,10 d'extrait fluide de valériane, plante fraîche.

En comprimés (forme à recommander) : 0,03 de diéthylbarbiturate de soude, 0,15 de glucocloral, plantes fraîches de valériane, passiflore et crataegus.

**Indications.** — Insomnies de toutes sortes, états nerveux et anxieux, toux nerveuses, tics, etc.

**Posologie :**

**Pour dormir :** 2 cuillerées à café ou comprimés, le soir en se couchant.

**Pour calmer :** 2 à 3 cuillerées à café ou comprimés en 24 heures.

Prix : 19 fr. 70.

**Laboratoires VENOT**

Docteur en pharmacie

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV°).

(Tél. : Sulfren 68-20.)

## VÉRONIDIA

**Composition.** — Diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflore. Chaque cuillerée à soupe de solution renferme 0 gr. 25 de diéthylmalonylurée.

**Présentation.** — Flacon de 175 cc. Flacon de 85 cc.

**Propriétés.** — Hypnotique et sédatif nerveux; antispasmodique.

**Indications.** — Éréthisme nerveux, insomnies, convulsions, terreurs nocturnes, tremblements, bourdonnements d'oreilles, mal de mer, coqueluche, etc.

**Posologie.** — Adultes. Comme antispasmodique : 1 à 4 cuillerées à café espacées au cours de la journée.

Comme hypnotique : 1 à 2 cuillerées à soupe le soir.

<i>Enfants et nour- rissons :</i>	Au-dessous de 2 ans, nourrissons.	X à XXX gouttes
	De 2 à 5 ans .....	XX à LX —
	De 5 à 7 ans .....	L à C —
	De 7 à 9 ans .....	1/2 à 1 cuillerée à café
	De 9 à 11 ans....	1 cuillerée à café à 1 cuillerée 1/2

De 11 à 14 ans... 1 cuillerée 1/2 à 3 cuillerées à café

de préférence dans une infusion ou dans du lait.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>). (Tél. : Ségur 13-10.)

## VERRULYSE

**Composition.** — A base de magnésie lourde et légère, phosphore, chaux, fer, manganèse, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

**Propriétés.** — Reconstituant de la cellule. Antiverruqueux.

1<sup>o</sup> *Effet général* : Reconstituant. Amélioration très nette, chez les enfants, de l'appétit et des fonctions intestinales.

2<sup>o</sup> *Effet local* : Les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démanaison. Elles s'éliminent ou se résorbent peu à peu. Condition essentielle : Suivre le traitement sans arrêt, régulièrement, avec patience, jusqu'au résultat escompté.

**Indications.** — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.), traitement préventif de toute production cellulaire anormale.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 4 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles).

**Forme.** — Poudre divisée en petits cachets ouvrables. Boîtes de 80 cachets.

**Dose et mode d'emploi.** — Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes : 2 cachets par jour pendant 40 jours au début des repas.

Pour les enfants de moins de 8 ans : 1 cachet tous les jours.

Pour les enfants, et même pour les adultes, dans les cas rebelles, pour augmenter l'assimilation, ouvrir le cachet et prendre la poudre délayée dans un peu de potage, purée, compote, etc., la poudre ne communiquant aucun goût désagréable.

**Remarques.** — Des observations récentes ont montré que, dans les cas difficiles, l'efficacité de **Verrulyse** est accrue si l'on provoque un déséquilibre brusque du pH humoral, constaté par ses variations urinaires.

**Prix public** : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 19 fr. 40. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-4.

Voir à **Formule JACQUEMAIRE n° 60.**

Laboratoires FLUXINE  
Produits BONTHOUX

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie :  
VILLEFRANCHE (Rhône).

## VERTICURINE

**Composition.** — Silicate de soude colloïdal.

**Action.** — Hypotensive-antiathéromateuse, — déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

**Indications.** — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux. Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose. Vertiges, Ménopause.

**Formes et doses.** — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

*Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.*

Verticurine, liquide : le flacon, 24 francs.

Verticurine, comprimés : le flacon, 17 francs.

**Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**  
47, rue Feray — CORBEIL (S.-et-O.).

## VERTOX

**Comprimés vermifuges** pour parasites intestinaux (trichocéphales, oxyures).

Dosés à 0,15 de poudre de semen-contra.

**Action.** — Se dissolvent dans la seconde partie du tube digestif et agissent électivement sur : trichocéphales, anguillules, oxyures, etc...

**Doses.** — (Moyennes) 5 Vertox et 2 comprimés Leptab, avalés avec un peu d'eau, loin des repas. Les adultes peuvent répéter 2 à 4 fois cette dose, dans la journée, si la crise de parasitisme est grave. Suivre le traitement pendant 3 à 4 jours, au moment des lunaisons.

**Présentation.** — En boîte aluminium 50 comprimés dragéifiés : 14 fr. 25 (10 jours effectifs).

Enregistré au L. N. C. sous n° 1039-7.

**Laboratoires A. V. E.**

81, quai Valmy — PARIS (X<sup>e</sup>)

(Tél. : Nord 69-01.)

## VÉRYL

**Composition.** — Dérivé organique aminé du cyanure de mercure, nettement plus actif, beaucoup moins toxique que le cyanure ordinaire. Pas d'intolérance.

**Indications, Posologie et Mode d'emploi.** — Toutes les indications du cyanure de mercure, Syphilis à toutes les périodes. Même posologie que HgCy : 1 ampoule de 1 cc. par jour.

En injections intraveineuses ou intramusculaires profondes indolores.

**Diurétique mercuriel** de toxicité minimum, 1 à 3 ampoules par 24 heures.

**Présentation et Prix.** — La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 29 fr. 30.

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

(Tél. : Nord 76-85.)

## VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

**Au Cantharidate de Soude.**

**Le Vésicatoire Rose Beslier** à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au Médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

**Indications.** — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonies, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

**Présentation.** — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10 × 10.

Prix : la pochette : 7 francs.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

L. N. C. n° 508.

**M. COQUEL, Pharmacien-Fabricant**  
DIGOIN (S.-et-L.) (Tél. : 45.)

## VIATOL

### Composition :

Facteur oxydant de levures.....	0,002
Vitamines B-1.....	10 U. I.
Vitamines B-2.....	2 Unités physiologiques.
Saccharomyces cerevisiae.....	0,04

Pour un comprimé.

**Propriétés.** — C'est un fortifiant et un reconstituant naturel qui améliore le rendement de la nutrition et équilibre les fonctions vitales.

**Indications.** — Enfants, adultes.

Maladies chroniques, Convalescences, Fatigue générale, Dépression, Surmenage, Grossesse, Enfants débiles, Tuberculose, Troubles de l'assimilation, États de dénutrition.

**Présentation.** — Comprimés.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 2 comprimés au milieu de chaque repas. Les croquer ou les avaler avec une gorgée de liquide.

Enfants : 1 comprimé au milieu de chaque repas.

En prenant le Viatol 20 minutes avant les repas, on a une action stimulante sur l'appétit.

Laboratoire du **D<sup>r</sup> BOUCARD**  
30, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Auteuil 09-93.)

## VICALPHOS

### VICALPHOS SIMPLE

**Composition.** — Parathyroïde, surrénale, thymus : phosphate, glycérophosphate et gluconate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

**Forme.** — Cachets ou granulé sucré aromatisé à la mandarine, d'un goût très agréable.

**Prix :** Cachets ou gran. P. M. : 19 fr. 70. — Gran. G. M. (trait<sup>e</sup>) : 53 fr. 60.

### VICALPHOS IRRADIÉ

**Composition.** — Ergostérine irradiée, carotène : parathyroïde, surrénale, thymus : fluorure de calcium, phosphate et glycérophosphate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

**Forme.** — Cachets ou granulé sucré aromatisé à la framboise, d'un goût très agréable, est très bien accepté par les enfants.

**Prix :** Cachets ou gran. P. M. : 26 fr. 20. — Gran. G. M. (trait<sup>e</sup>) : 71 fr. 40.

**Indications.** — Tous les états de déminéralisation : Tuberculose et Prétuberculose, Troubles de croissance, Rachitisme, Convalescence, Surmenage, Fractures, Caries dentaires, Grossesse, Allaitement, etc.

### CACHETS

### Posologie :

### GRANULÉ

Adultes : 3 par jour	au début	Adultes : 2 cuillerées à café.
Adolesc. : 1 à 2 par jour.	des repas.	Adolesc. : 1 cuillerée à café.
		Enfants : 1/2 cuillerée à café.
		Nourris. : 1/4 cuillerée à café.

Aucune contre-indication.

Laboratoires du **VICALPHOS**  
P. LAURENT, Pharmacien, 48, rue Saint-Jean — LYON.

## VIGANTOL

**Composition.** — Vitamine D<sub>2</sub> pure, cristallisée.

**Propriétés.** — Élève le taux du calcium et du phosphore sanguins.

**Indications.** — Rachitisme, ostéomalacie, spasmophilie infantile, décalcification, tuberculose pulmonaire, états ganglionnaires.

**Présentations.** — Dragées : boîtes de 50 dragées à 0 mgr. 06 de vitamine D<sub>2</sub>. Solution huileuse en flacons compte-gouttes de 10 cc. (1 cc. = 3/10 de mgr. de vitamine D<sub>2</sub> cristallisée = XXX gouttes).

**Posologie.** — A titre prophylactique :

Nourrissons et petits enfants : III à VI gouttes par jour.

Adolescents : VI gouttes ou 1 dragée par jour.

A titre thérapeutique :

Nourrissons : X à XV gouttes par jour.

Adolescents : XII à XVIII gouttes ou 2 à 3 dragées.

Adultes : VI à XII gouttes ou 1 à 2 dragées.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck.

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

Le VIGANTOL est vendu par les Maisons E. MERCK (Darmstadt) et BAYER (Leverkusen).

## VIGANTOL

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Vitamine D<sub>2</sub> cristallisée.

**Propriétés et indications.** — Vitamine antirachitique. Élève le taux du calcium et du phosphore sanguins.

Rachitisme, Ostéomalacie, Caries dentaires, États ganglionnaires, Spasmophilie, Tétanie.

**Posologie.** — Doses quotidiennes :

Adultes : XII gouttes ou 2 dragées.

Enfants : VI à XVIII gouttes ou 1 à 3 dragées.

Nourrissons : V à XV gouttes.

**Présentation.** — Boîte de 50 dragées à 0 mgr. 1. Solution huileuse : flacon de 10 cc. (1 cc. correspond à XXX gouttes environ et contient 0 mgr. 5 de vitamine D<sub>2</sub> cristallisée).

Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)



## VIGOFRUITS

**Composition.** — Acide phosphorique associé aux divers glycérophosphates et aux chlorures de Calcium et de Magnésium, dissous dans des jus de fruits naturels.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sans strychnine ni arsenic, sans alcool, stimule et tonifie sans exciter.

**Indications.** — Toutes les asthénies cérébrales ou musculaires, combat la fatigue et les effets du surmenage, abrège les convalescences.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 22 fr. 40, flacon 240 cc.

Laboratoire des **ABÂTILLES**

Route du Moulleau — ARCACHON.

## VIN ANTI-DIABÉTIQUE TALON

**Composition.** — A base de quinium associé à des toniques végétaux et arsenicaux. Médication complémentaire de l'insuline.

**Indications.** — Diabète et ses conséquences. Revitalise les tissus, arrête la déminéralisation, empêche la formation du sucre.

**Dose.** — 1 verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

*Brochure franco sur demande.*

Laboratoire du **D<sup>r</sup> TALON**

153, boulevard Montparnasse — PARIS.

Paris c/c 1557-94 (Tél. : Danton 51-07.)

## VINCE

Poudre antiseptique, desodorisante et cicatrisante.  
Soluble dans l'eau.

**Composition.** — A base de parahydroxybenzoate de propyle, de perborate de soude spécialement préparé et d'une pureté absolue, additionnés d'essences antiseptiques et aromatiques qui en corrigent le goût et en augmentent l'activité.

**Indications.** — Spécialement l'angine de Vincent, les ulcérations fusio-spirillaires, les stomatites ulcéro-membraneuses, les gingivites ulcéreuses, les accidents de dent de saïesse et la pyorrhée. S'emploie également comme dentifrice.

**Mode d'emploi.** — Pour lavages, bains de bouche ou gargarismes : une cuillerée à café de Vince dissoute dans un verre d'eau tiède. En applications, sous forme de pâte, dans les cas d'angine de Vincent, stomatites ulcéro-membraneuses, pyorrhée ou irritation des gencives. A laisser de 4 à 10 minutes.

Prix : 15 francs la boîte P. M. ; 28 fr. 90 la boîte G. M.  
Littérature et échantillonnage médical sur demande.

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. Guérault, Docteur en pharmacie.  
13, rue Pagès — SURESNES (Seine).  
(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

## VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphate.

**Composition.** — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

**Avantages.** — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

**Indications thérapeutiques.** — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

**Posologie.** — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le n° 544-2.

**Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD**

Docteurs en Pharmacie  
12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

## VIN GIRARD

### Iodo-tannique phosphaté.

**Nature.** — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage.

Un verre à madère ou deux cuillerées à soupe de Vin Girard correspondent à :

Iode .....	0 gr. 04
Tannin.....	0 gr. 08
Lactophosphate de chaux .....	0 gr. 30

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

**Indications.** — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

Prix : 27 francs.

Pour un traitement de 12 à 15 jours.

### Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National sous le n° 405-2.

## VIN RACI-BEL

**RACINE de BELLadone**  
en décoction à 5 p. 100.  
« Cure Bulgare. »

**Traitement des rigidités extrapyramidales :** maladies de Parkinson, Little, Wilson, Athétoses avec rigidité, spasme de torsion, etc.

Titré en alcaloïdes totaux.

Stabilisé, se conserve.

**Avantages.** — Egalité d'action, activité constante. Beaucoup moins toxique et plus actif que les fortes doses d'atropine.

**Posologie.** — Demander notre notice.

En principe, doses croissantes : de CXXV gouttes à sept cuillères à café par jour.

Flacons de 210 centimètres cubes à 25 francs.

### Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

(Tél. : Odéon 73-92.)

Z. N. O. : 2, rue du Pénionnat — LYON.

## VIN TONIQUE DE VIAL

Strychnine, Quinine, Arséniate de Sodium, Viande, Lacto-Phosphate de chaux, Quinquina, Malaga.

Composition pour un verre à liqueur (30 cc.)	Sulfate de strychnine .....	1/2 milligr.
	Quinine pure .....	2 centigr.
	Arséniate de sodium .....	1/2 centigr.
	Substances extractives de la viande .....	50 centigr.
	Lacto-phosphate de calcium .....	50 centigr.
	Ecorces quinquina .....	2 grammes
	Malaga et Muscat .....	Q. S.

**Posologie et mode d'emploi.** — Suivant indications — et couramment un verre à liqueur pour les adultes — une cuillerée à bouche pour les adolescents, 1/4 d'heure avant les 2 principaux repas. *Le goût est très agréable.*

**Indications.** — Asthénies de toutes espèces, Convalescences, Rachitisme léger, Croissance et puberté, Grossesse, Allaitement, Etats déficitaires des vieillards.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 687-1.

### Laboratoires pharmaceutiques VIAL FRÈRES

7, rue Damon — VILLEURBANNE (Rhône).

(Tél. : Vill. 95-11.)

## VIOFORME

**Iodochloroxyquinoléine.**  
**CIBA**

ANTISEPTIQUE, CICATRISANT.

*Poudre inodore. Non toxique, jamais irritant.*

**Indications.** — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

**Doses.** — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100. Se formule magistralement.

Boîte poudreuse : 12 francs.

Usage interne. — Voir Entéro-Vioforme.

**OVULES AU VIOFORME.** — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

**Formuler.** — Boîte de six ovules.

### Laboratoires CIBA — Dr P. DENOYEL

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

## VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :

**Propriétés.** — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids.

2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinémique.

**Indications.** — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures, aux repas, Boissons abondantes. Cure intermittente.

**Présentation** : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

Prix : 20 fr. 70.

**Viophan Injectable** : associé à l'Iodure de Na.

2 formes : **Viophan amp.** M (intramus.) avec novocaïne.  
— **amp. V** (intraveineux).

5 ampoules : Prix 31 fr. 30.

Laboratoire National de Contrôle, 196-1 et 2.

Laboratoires du Viophan

44, Grande-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.). Tél. 506.

## VIOSTEN DU D<sup>r</sup> LESCÈNE

**Composition.** — Principes actifs de l'huile de foie de morue. Lipolides irradiés. Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzyl-cinnamique. Vitamines.

**Comprimés.** — **Granulé.** — **Injections sous-cutanées de 1 cc.**

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme, Grossesse, Suites de couches.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs, employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Vitamines).

**Doses.** — **Enfants** : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour avant les repas.

De 3 à 7 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 7 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

**Adultes** : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

### LABORATOIRES LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## VIOXYL

**Médication Céro-arsénio-hématique.**

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale.

**Indications.** — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

**Formes.** — Elixir, Granulé et Comprimés.

### Posologie :

**Adultes** : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

**Enfants** : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

### Etablissements MOUNEYRAT

#### Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine  
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

## VIRADÈNE (Dragées de)

*Tonique et reconstituant général.*

*Traitement de toutes les dépressions physiques et intellectuelles.*

**Composition.** — Synergie de glandes génitales, composés phosphoriques, identiques au phosphore des céréales. Extrait de noix vomique. Nucléinate de manganèse. Extrait de maté (médicament d'épargne).

**Indications.** — Dépressions physiques et intellectuelles, *Faiblesse générale*, Troubles par *carence alimentaire*, *Croissance difficile*, *Surmenage*, *Formation tardive*, *Convalescences traînantes*, *Tempéraments délicats*, *Sénilité précoce*.

Le **Viradène** convient à toute personne anémiée, déprimée, opérée, convalescente ou sous-alimentée.

**Doses.** — 4 dragées par jour en moyenne.

**Enfants** : demi-dose.

La boîte de vente contient un traitement de trois semaines.

Prix de la boîte : 28 fr. 80.

### Laboratoire du FÉMINADÈNE

1 bis, rue Carcel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## VIRMONAL « PIAM »

A base de phosphore organique.

**Forme et dosage.** — Comprimés contenant 0 gr. 0033 de phosphore organique.

**Posologie.** — 3 à 4 comprimés, 3 fois par jour, avant les repas, par périodes de dix jours. Ces doses peuvent être augmentées, le VIRMONAL ne renfermant ni alcaloïdes, ni substances toxiques.

**Indications.** — Neurasthénie, Hystérie, Hypochondrie, Faiblesse nerveuse, Tics, Épilepsie, Insomnie, Surmenage.

**Prix :** 27 francs, le flacon de 90 comprimés. Inscrit au L. N. C., n° 1207-3.

Échantillons et vente en gros,

Concessionnaire en France :

F. GÉRIN, Pharmacien,  
10, rue Jacquard — LYON.

## VISCO-SÉRUM

**Visco-sérum injectable** reproduit exactement la formule minérale

du plasma sanguin :  $\frac{K + Na}{Ca + Mg} = 30; \frac{K}{Ca} = 2.$

Stimulation du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des organes hématopoïétiques.

**Indications.** — Tous les états asthéniques. Les affections chroniques déprimantes. Convalescences. Neurasthénies, Surmenages. Débilité physiologique. Pré-sénilité.

**Posologie.** — Une ampoule de 5 cc. tous les jours ; voie sous-cutanée ou intramusculaire.

**Visco-sérum buvable.** — Complète l'action du Visco-Sérum injectable, mais peut également être administré isolément.

Solution phosphorique acide radioactive. Fer, manganèse, zinc.

Catalyseur des métabolismes, fait l'appoint des carences minérales, ramène à la normale l'acidité humorale.

**Indications.** — Les déminéralisations, les anémies quelles que soient leurs causes. Tous les états asthéniques avec hypoacidité urinaire. Tous les états de dénutrition.

**Posologie.** — 2 ampoules buvables de 3 cc. par jour, 10 à 20 jours.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 25 fr. 30. Boîte de 10 ampoules buvables de 3 cc. : 25 fr. 30.

Laboratoire G. FERME

22, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>) (Tél. Europe 49-50.)  
Z. N. O. : PETRIER, 30, rue Créqui, Lyon.

## VISCOVEINE

**Composition.** — XL gouttes =

Citrate de soude.....	0,10
Ext. stab. de Marron d'Inde Dausse ...	0,10
Ext. stabilisé de Monesia.....	0,05
Ext. stabilisé de Gui (fluide) .....	0,02
Bourse à pasteur.....	0,05
Ext. fluide de Viburnum, Cupressus.	0,10
En milieu glyciné.	

**Indications.** — Hémorroïdes et tous états variés, Aménorrhée, Dysménorrhée, Règles douloureuses, Troubles de la ménopause.

**Posologie.** — XXX à XL gouttes aux repas. Enr. au Lab. de Cont. des Méd. sous le n° 988-3.

Prix : 17 fr. 20

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue—MONTFERMEIL(S.-et-O.)

## VITACALCINE MONCOUR

Complexe reminéralisant et énergétique.

**Reminéralisant** par sa vitamine D, ses poudres de glande thyroïde et surrénale et son carbonate de calcium.

**Énergétique** par sa vitamine A, sa poudre totale de foie de bœuf, son phosphate de magnésium et son nucléinate de manganèse.

**Indications.** — Toutes affections déminéralisantes et hyposthénisantes : carences vitaminiques, états de déchéance organique, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, fragilité des os, fractures, anémies, chlorose, cachexies, troubles de croissance, carie dentaire, neurasthénie, psychasthénie, scrofule, prébacillose, bacillose, etc.

**Posologie :**

**Adultes :** 2 à 8 comprimés par jour, ou 1 à 4 cachets.

**Enfants :** 1 à 4 comprimés ou 1 à 2 cachets (suivant l'âge).

Dose d'entretien : la moitié de la dose normale.

Le traitement sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Prix : 28 fr. 80.

Laboratoires MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.  
(Tél. Molitor 01-14.)

## VITACHOLINE

Rééducatrice des fonctions entéro-hépatiques.  
Puissant tonique du foie.

**Composition.** — VITAMINE A. Sulfate de Magnésie.  
Extrait d'Artichaut, Lacto-sérum.

**Propriétés.** — L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une action tonifiante et anti-infectieuse considérable de la cellule hépatique. Active la sécrétion et l'excrétion biliaires. Régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif. Diurétique. *Saveur agréable.*

**Indications.** — Congestion du foie et de la vésicule. Lithiase, Ictère, Cholécyte chronique, Cholémie, Insuffisance, Constipation, Entérocolite, Urticaire. Prurit, Eczéma chronique, Acné chronique, Asthénie et fatigue générale.

**Présentation.** — Granulé. Prix : 18 fr. 25.

**Mode d'emploi.** — *Drainage biliaire* : 1 à 3 c. à café de granulé à jeun avec 1/2 verre d'eau tiède.

**Cure d'entretien** : 1/2 à 1 c. à café de granulé, 20 minutes avant les repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1139-F.

LABO-VITA

29, rue Duret — PARIS (XVI°).

## VITACRINE

Association hormono-vitaminique.

Deux formules : Vitacrine M (Masculine)  
Vitacrine F (Féminine).

**Composition.** — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant pluri-glandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

**Mode de présentation.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Asthénies, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Troubles de la puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoire DEFFARGE

S. Chenilleau, Docteur en pharmacie  
188, cours de la Somme — BORDEAUX  
(Tél. : 91-609.)

## VITADIASE

**Composition et présentation :**

Inositolphosphate de chaux et magnésie associé aux extraits hydroalcooliques de levure de bière, de son et germe de blé.

**Indications :**

Surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, convalescence, rachitisme, tuberculose, grossesse et allaitement.

**Doses et mode d'emploi.** — 3 à 6 comprimés par jour, ou 3 à 6 cuillers à café de granulé.

**Enfants :** 2 comprimés, ou 2 cuillers à café de granulé.

Prix au public :

Le flacon de comprimés : 18 fr. 30.

La boîte de granulés : 23 francs.

L. N. C. M. n° 515-4 et 515-5.

Docteur J. GALIMARD O. 

145, rue Yves-Le Goz — VERSAILLES.

## VITADONE

Vitamines A et D en ampoules injectables.

Titrage : 20 000 u. i. de vitamine A. }  
20 000 u. i. de vitamine D. } par ampoule de 2 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — La VITADONE agit puissamment contre la tuberculose pulmonaire, par sa vitamine D, qui calcifie les lésions tuberculeuses, et par sa vitamine A, anti-infectieuse et protectrice des épithéliums (notamment de l'épithélium pulmonaire).

**Indications et posologie.** — Dans la tuberculose pulmonaire, 2 injections intra-musculaires par semaine ; cures de 10 semaines, séparées par des périodes de repos de 15 jours.

La VITADONE, qui se fait aussi en GOUTTES (nouvelle concentration : 10 à 20 gouttes et davantage par jour) et en CHOCOLATES (2 à 4 par jour en moyenne), peut remplacer, dans toutes ses indications, l'huile de foie de morue, dont elle contient tous les principes actifs. Elle est, en somme, une huile de foie de morue synthétique et hyperconcentrée.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV°). (Danton 08-11.)

## VITAGAR

à base de Vitamine B

**Composition.** — Muclage exclusivement végétal, à base de Vitamine B (300 U. I.), Agar-Agar, Bourdaine exempte de principes amers et irritants.

**Forme.** — Petits grains dragéifiés, faciles à absorber.

**Action.** — Déconstrictant complet. Par sa Vitamine B, régénère les fibres lisses de l'intestin auxquelles il restitue le tonus contractile. Combat ainsi en même temps la constipation et sa cause principale, l'atonie intestinale. — La Vitamine B agit également contre l'auto-intoxication due à la stase stercorale.

**Indication.** — Traitement complet et rationnel de la constipation. Laxatif purement physiologique. D'action douce et d'emploi agréable, particulièrement indiqué chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

**Posologie.** — 1 ou 2 cuillerées à café (1/2 ou 1 pour les enfants) après chacun des deux repas. Avaler sans mâcher à l'aide d'une gorgée de liquide.

**Laboratoires UROMIL, L. BÉLIÈRES, D<sup>r</sup> en Ph<sup>l</sup>**  
19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
(Tél. : Provence 04-00.)

## VITALACTYL

**Forme.** — Pommade.

**Indications.** — Ulcères variqueux, Plaies sphacélées, Dermatoses simples chroniques.

**Formule.** — Huile de Flétan 3 gr. = 30 000 U. I. Vitamines D et 1 300 000 U. I. Vitamines A.

Pour 100 grammes.

**Mode d'emploi.** — Après lavage à l'eau bouillie sans addition d'aucun antiseptique, sécher à la gaze stérile et étendre la Pommade VITALACTYL en couche légère et recouvrir d'un pansement aseptique.

**Laboratoires de V. BATTUT**

Docteur en Pharmacie.  
MONTREUIL-PARIS.

## VITALYNE

Traitement phytothérapique rationnel de tous désordres organiques imputables à la diathèse arthritique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique urinaire et hépatique; balsamique et diurétique; dissolvant remarquable des phosphates, acide urique et urates.

**Indications.** — Goutte aiguë et chronique, Gravelle urique, Lithiase biliaire, Rhumatismes, Affections de la peau, Cellulite, Ménopause, Artériosclérose sous toutes ses formes.

**Principaux constituants.** — Cynara scolymus, Chimaphylla umbellata, Ylex paraguayensis, Hydrocotyle asiatica, Fabianus imbricata, Barosma crenulata, Rhamnus frangula, Hemidesmus indicus, etc.

**Posologie.** — Sauf avis contraire du médecin traitant, une infusion quotidienne le soir durant une semaine; deux infusions quotidiennes, une le matin à jeun, une le soir durant la deuxième semaine; une infusion quotidienne le soir pendant la troisième semaine. Se reposer 8 à 10 jours et reprendre, dans les mêmes conditions, le traitement pendant les deux mois suivants.

**Présentation.** — 1<sup>o</sup> Boîtes de 15 ou 30 sachets cellophane, rigoureusement dosés pour une tasse d'infusion. Très agréable au goût. 2<sup>o</sup> Comprimés.

Prix de vente au public. — La boîte : 15 fr. 50. La double boîte : 30 fr. Comprimés : la boîte 16 fr. 50.

**Laboratoires MINERVA** — 10, rue Bayard — TOULOUSE.

## VITAMINE D CORTIAL

Vitamine D cristallisée.

**Composition.** — Vitamine D cristallisée incorporée au chocolat. Pastilles dosées à 4 centièmes de milligramme de vitamine cristallisée pure.

**Indications.** — Spécifique de toutes les formes du rachitisme.

**Curatif.** — Chez l'enfant : retard de croissance, déformations osseuses, retard de la dentition, carie dentaire, troubles scorbutiques. Chez le nourrisson : accidents convulsifs, tétanie, décalcification, avitaminoses.

Chez l'adulte : pré-tuberculose, grossesse, allaitement, consolidation des fractures, ostéomalacie.

**Préventif.** — Enfants prématurés ou de constitution faible, pour prévenir les troubles rachitiques; dans les convalescences de maladies infectieuses.

**Avantages.** — Dosage précis, pureté de la vitamine D, conservation indéfinie, absorption agréable pour les enfants.

**Mode d'emploi et doses.** — Au-dessous d'un an, 1/2 pastille chaque matin. — Jusqu'à 10 ans : 1/2 pastille matin et soir. — Au-dessus : de 1 à 2 pastilles par 24 heures.

Pour les nourrissons, faire fondre la pastille dans du lait tiède. Prix : le tube de 20 tablettes (20 à 40 jours de traitement) : 24 fr. 60.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS.  
(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

## VITAMINE P-P GERDA

Comprimés de 0,05 amide nicotinique.

« L'emploi de la Vitamine nicotinique est actuellement bien établi depuis quatre ans qu'on l'administre sur une très vaste échelle dans le monde entier » (L. JUSTIN-BESANÇON).

L'acide ou l'amide nicotinique ont été employés indistinctement sous le nom de VITAMINE P-P, mais l'amide s'est montré d'une façon générale mieux toléré par l'organisme (troubles de vaso-dilatation).

0 gr. 60 à 1 gr. par jour pour les grands accidents de la Pellagre les psychoses graves, la maladie des rayons X et du radium, toutes les grandes porphyrinuries — par voie buccale.

0 gr. 20 à 0 gr. 50 par jour, pour manifestations digestives, cutanées, psychiques ou autres chez l'adulte, les intoxications sulfamidées par voie buccale.

0 gr. 05 à 0 gr. 20 par jour dans les troubles de la digestion et de la croissance chez l'enfant. On a intérêt à répartir les doses en 3 ou 4 prises dans la journée. Le traitement devra toujours être prolongé dans les cas sévères et chaque fois qu'une cause physiologique ou pathologique augmente les besoins en vitamine nicotinique (infection, alcoolisme, grossesse, irradiations solaires prolongées). Le traitement prolongé n'entraîne ni intolérance, ni accoutumance.

(Les déficiences vitaminiques et hormonales, L. JUSTIN-BESANÇON, p. 110.)

Laboratoires GERDA — F. GERIN, Pharmacien  
10, rue Jacquard — LYON

## VITAMINE P. P.

Lematte et Boinot.

Voir

NICOBION

## LES VITAMINES BYLA VITAMINES LIPOSOLUBLES

### Amunine (Vitamine A)

*Solution huileuse* per os, à 120 000 U. I. au cc.  
5 à 10 gouttes par jour.

*Plaquettes de chocolat* dosées à 2 milligr. 3 de vitamine A par plaquette. 1/2 à 1 par jour.

*Ampoules injectables*, à 20 000 u. i. par ampoule.

*Pommade*, à 20 mgr. de carotène pur cristallisé par 100 gr.

*Solution* pour lavements.

### Irrastérine (Vitamine D).

*Solution huileuse* per os, à 0 mgr. 5 de vitamine D cristallisée au centimètre cube.

*Chocolatés*, à 0 mgr. 1 de vitamine D cristallisée.

### Vitadone (Vitamine A + D).

*Solution huileuse* per os (50 000 U. I. de vitamine A et 10 000 u. i. de vitamine D au cc.).  
10 à 20 gouttes par jour.

*Plaquettes de chocolat* (5 mgr. 5 de vitamine A et 0 mgr. 125 de vitamine D par chocolat).  
1/2 à 1 par jour.

*Solution injectable* (20 000 U. I. de vitamine A et 20 000 U. I. de vitamine D par ampoule de 2 cc.).

### Vitamine E Byla.

*Ampoules injectables* de 1 cc., contenant en solution huileuse la matière insaponifiable liquide de 15 gr. d'huile de germe de blé fraîche (cette matière insaponifiable est 25 fois plus active que l'huile de germe de blé).

*Comprimés* contenant chacun la matière insaponifiable de 2 gr. 50 d'huile de germe de blé.

**Panvioral.**

*Plaquettes de chocolat* vitaminées A, B, C, D.  
(Voir ce texte.)

**VITAMINES HYDROSOLUBLES****Vitamines B.**

**Vitamine B<sub>1</sub> Byla**, en *comprimés* à 1 mgr.  
et en *ampoules injectables* à 2 mgr. et à  
1 cgr. de vitamine B<sub>1</sub> cristallisée.

**Vitamine B<sub>2</sub> Byla**, en *ampoules injectables*  
dosées à 1 mgr. de flavine cristallisée.

**Vitaminol**, contenant toutes les vitamines B et les acides aminés. Présenté en granulé, comprimés et sous forme de poudre maltée, cette dernière servant au maltage des bouillies.

Mentionnons aussi les *Comprimés vitaminés B Byla* pour diabétiques.

**Vitamine C Byla.**

(Acide ascorbique cristallisé naturel.)

*Comprimés* à 50 mgr. et *ampoules injectables*  
à 100 et 500 mgr.

**Vitamine P. P. Byla.**

(Amide nicotinique.)

*Ampoules injectables* dosées à 0 gr. 10.

*Comprimés* dosés à 0 gr. 05.

Littératures sur demande adressée :

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>),  
où il sera mis notamment à la disposition  
du Corps médical deux brochures sur la  
thérapeutique des maladies par carence :

**I. Vitamines Liposolubles.**

**II. Vitamines Hydrosolubles.**

**VITAMINES MASSON**

**Composition.** — Contiennent en quantités judicieusement équilibrées et standardisées en Unités Internationales les vitamines A, B, C, D et de l'inositolhexaphosphate mixte de chaux et magnésie.

**Indications.** — Déminéralisation, Rachitisme, toutes Carences et Convalescences, Fatigue musculaire, Allaitement, Pré-tuberculose.

**Présentation.** — *Granulé* d'un goût très agréable, parfumé à la mandarine et *comprimés* à croquer.

**Posologie :**

Granulés.	Comprimés.
<i>Enfants :</i> 2 ans : 1 cuillerée à café par jour. 10 ans : 2 cuillerées à café. 15 ans : 3 cuillerées à café.	<i>Enfants :</i> Au-dessus de 15 ans : 1/2 comprimés n° 1 et 1/2 comprimé n° 2, deux fois par jour. Au-dessus de 15 ans : 2 comprimés n° 1 et 2 n° 2, deux fois par jour. <i>Adultes :</i> 2 comprimés n° 1 et 2 n° 2, deux fois par jour.
<i>Adultes :</i> 4 cuillerées à café par jour.	

Prix de la boîte : 27 francs.

Conditions spéciales à MM. les Médecins.

**Laboratoires MASSON**

ROZAY-EN-BRIE (Seine-et-Marne). (Tél. 12.)

**VITAMORRHUINE  
GRANULÉS CHOCOLATÉS**

**Composition.** — Concentré d'huile de foie de morue à 1/50 associé au phosphore et au calcium sous forme de granulés chocolatés. Une cuillerée à café de Vitamorrhutine représente :

3 500 unités internationales Vitamine A. naturelle.  
750 — — — — — D. —

0 mgr. 02 de phosphore.

0 gr. 05 de calcium.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

**Indications.** — Croissance, Rachitisme, Scrofule, Convalescence, Carie dentaire, etc.

**Doses.** — *Enfants* : de 3 mois à 1 an : 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.



## VITAMORRHUINE

### Perles

#### Composition :

1 perle contient 0,10 cc. d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50 et correspond à :

3.500 unités internationales, Vitamine A. *naturelle* ;

750 unités internationales, Vitamine D. *naturelle*.  
Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

**Indications.** — Inappétence, anémie, aux femmes enceintes pendant la période de gestation, convalescence, etc.

#### Doses :

*Adultes* : 4 à 6 perles par jour.

*Adolescents* : 3 à 4 perles par jour.

*Enfants* : 1 à 2 perles par jour.

A avaler après les repas.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## VITAMYL

Vitamines A. B. et O. en extrait concentré.  
Une cuillerée à café à chaque repas.

Prix public : 24 fr. 60 le flacon.

### VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées.

Vitamines A. B. C. et D. en solution huileuse, finement émulsionnée. Une cuillerée à café ou 2 dragées à chacun des 3 repas.

Une cuillerée à café renferme 2 200 unités antirachitiques internationales, 1 dragée renferme 1 000 unités antirachitiques internationales.

#### Prix public :

Le flacon de solution grand modèle : 27 francs.

— — petit modèle : 16 fr. 40.

Le flacon de 40 dragées : 25 fr. 80.

### VITAMYL IRRADIÉ CHLOROPHYLLÉ

Ampoules buvables.

Chlorophylle pure associée aux vitamines A, B, C et D.

1 à 3 ampoules buvables par jour.

Chaque ampoule contient 10 cgr. de Chlorophylle et 2 500 unités antirachitiques internationales.

#### Prix public :

La boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 29 fr. 30.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière

**Indications.** — Toutes les indications du traitement de carence. Tous les cas de déminéralisation. Les différentes formes de ce produit sont aromatisées et d'un goût agréable.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

(Tél. : Archives 41-65.)

**VITAOL**

Huile de foie de morue survitaminée en vitamine A.

De très faible acidité facilement assimilable.

Teneur en vitamine A constamment contrôlée et ramenée à un titre uniforme de 2.000 unités internationales par gramme.

Produit très actif.

**Indications.** — Troubles de la croissance, état infectieux, lymphatisme, pré tuberculeuse et pré carence — sans contre-indication.

**Doses :** *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, avant le repas du soir.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café, avant le repas du soir.

**Présentation.** — Forme liquide :  
flacon de 180 cc.

**Lab. pharmaceutiques CHABRE Frères.**  
**TOULON.**

**VITARGYL**

**Composition.** — Protéose argentine.

**Propriétés.** — Antiseptique de toutes les muqueuses. Non irritant. Sédatif et décongestif externe. Non corrosif. Action absolument indolore.

**Indications.** — Traitements préventif, abortif et curatif de toutes les affections des muqueuses.

**Oto-rhino-laryngologie :** Coryzas, Sinusites, Amygdalites, Angines, Désinfection pré ou post-opératoire, Prophylaxie de grippe, oreillons, rougeole, otites :

**Vitargyl 1 % gouttes** ..... 14 fr. 70

Pour les cas aigus :

**Vitargyl éphédriné, gouttes** ..... 17 francs

**Ophthalmologie :** Conjonctivites banales ou purulentes, Ulcères, Ophtalmies, Préventif de l'ophtalmie des nouveau-nés :

**Vitargyl collyre 5 % gouttes** ..... 17 francs

**Urologie :** Blennorrhagie (préventif : instillations 10 p. 100 ou crayons ; abortif : injections 20 p. 100 ; curatif : lavages 1 et 5 p. 100), Urétrites, Cystites (injections 10 p. 100 ou crayons), Métrites du col, Bartholinites (crayons, ovules ou lavages).

**Vitargyl 20 % en boîtes de 6 tubes scellés de 5 cc.** ..... 24 fr. 40

**Vitargyl Crayons urétraux, en boîte de 6** ..... 17 francs

**Vitargyl Crayons utérins, en boîte de 6** ..... 17 francs

**Vitargyl ovules, en boîte de 6** ..... 22 francs

**POINTET & GIRARD**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Arch. 03-29.)

## VITARSENIC

Ses deux formes stables :

1 suppositoire : 1 gr. 30 ; 1 dragée : 0 gr. 25.

Contiennent :

Vitamine D ..... 500 unités.  
Triiodure d'Arsenic ..... 1 milligramme.

**Indications.** — Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Anémie, Convalescence, Anorexie.

**Mode d'emploi.** — 1° *Suppositoires* : 1 le soir pour les nourrissons jusqu'à 2 ans ; 1 matin et soir de 2 à 5 ans. 2° *Comprimés* : 4 par jour pour les enfants de 5 à 8 ans ; 6 à 8 pour les autres. Adultes : 9 par jour.

Laboratoires du **BLAGNY**

**René PAMELA**, pharmacien,  
85, rue Turbigo — PARIS (III<sup>e</sup>).  
(Tél. : Archives 12-39.)

## VITASCORBOL

Acide L-ascorbique

Médication spécifique des états de précaréance et de carence en vitamine C. Facteur de restauration du terrain.

**Indications :**

Scorbut, pré-scorbut, anorexie, retard de la marche, anémie, syndromes hémorragiques, retards de la dentition, allaitement artificiel, rhumatisme, convalescences, déficiences organiques, anémies.

**Présentations :**

Comprimés à 0 g. 05. (Tubes de 20) ..... 15 fr. 80

Vitascorbol injectable :

Boîte de 10 amp. de 1 cc. à 0 g. 05. Prix 34 fr.  
— 10 amp. de 2 cc. à 0 g. 10. Prix 48 —  
— 3 amp. de 5 cc. à 0 g. 50. Prix 41 —

**Posologie :**

**Nourrissons** : 1 comprimé à 0 g. 05 *pro die*.  
**Adultes et enfants** : 2 à 4 comprimés *pro die*.  
Par voie intraveineuse : 10 à 50 cg. *pro die* suivant les cas.  
Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Balzac 22-94.)

## VITAXYL

**Laxatif équilibré.**

Ne provoque aucune irritation intestinale.  
Ne détermine aucune accoutumance.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition :**

Vitamine B <sup>1</sup> crist. ....	33,3 U. I.
Entérokinase .....	0 gr. 01
Podophyllin .....	0 gr. 02
Extrait Cascara .....	0 gr. 05
Extrait Jusquiame.....	0 gr. 005
Extrait Belladone.....	0 gr. 005

**Posologie.** — **Adultes** : 1 à 3 comprimés avant les repas ou au coucher.  
**Enfants** : après 5 ans, 1/2 comprimé et plus.

**LABORATOIRES BIOLOGIQUES  
DE L'ÎLE-DE-FRANCE**

**A. DETROIS**, Pharmacien  
19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## VIT-E-LUTÉINE

Association de la vitamine E à l'hormone du corps jaune.

**Indications :**

Stérité, Avortements à répétition, Troubles de la grossesse, Hyperfolliculisme.

**Deux formes :**

**Comprimés** : 2 à 4 comprimés par jour, quinze jours par mois dès le début de la grossesse.  
**Ampoules injectables**, (solution éthéro-huileuse indolore). Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

En cas de menace d'avortement, 2 à 4 ampoules dans les 24 heures. Renouveler si nécessaire.

**Laboratoires FOURNIER Frères**  
7, rue Biscornet — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

## VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

Phosphatides cérébraux .....	0 gr. 025
Vitamine A .....	6000 unités Intern <sup>tes</sup> .
— D .....	2000 —
Huile d'olive .....	Q. S. pour 1 cc.
Capsules de 0 gr. 20 :	
Phosphatides cérébraux .....	0 gr. 025
Vitamine A .....	6000 unités Intern <sup>tes</sup> .
— D .....	2000 —
Huile d'olive .....	Q. S. pour 1 cc.

**Propriétés.** — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

**Indications.** — Chez l'enfant : Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — Chez l'adulte : Convalescence, Surmenage, Lésions bacillaires. — Chez la femme enceinte : Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — A tous les âges : Agent anti-infectieux.

**Mode d'emploi.** — Nourissons : X gouttes matin et soir. — Enfants : XX gouttes matin et soir. — Adultes : 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Enregistré au L. N. de C. sous le n° 544-4.

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

## VIVACURE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule :

	Adulte.	Infantlle.
Bi-iodure de Mercure (Hg) .....	0 gr. 02	0 gr. 01
Iodure de potassium .....	0 gr. 25	
Arséniate de soude .....	0 gr. 01	0 gr. 005
Extrait atropa bellad. ....	0 gr. 02	0 gr. 005
Arome q. s. ....	15 cc.	15 cc.

**Indications.** — 1° Toutes les indications de la syphilis soupçonnée ou connue et de l'hérédosyphilis.

2° Adjuvant indispensable de tous les traitements antisiphilitiques soit au cours de la grossesse, de la croissance ou entre les périodes de traitement (cure de repos).

**Avantages.** — Présentation spéciale (ampoules buvables) ne comportant aucune indication susceptible de dévoiler la nature du traitement.

**Mode d'emploi.** — A prendre immédiatement avant les repas dans un verre d'eau gazeuse de préférence.

**Posologie :** Une ampoule par jour. Cette dose ne peut être dépassée que sur indication spéciale du médecin.

**Note très importante :** En cas de prédispositions anaphylactiques contre l'iodure de potassium, prescrire la forme infantile.

La boîte de 14 ampoules : 26 francs.

Laboratoires de la JÉCOBIASE

D<sup>r</sup> R. PIONNEAU, Pharmacien

VAYRES (Gironde).

## VIVARGYRE

Traitement mercuriel dissimulé en ampoules buvables.

Deux dosages. — Adultes :

Phénoldisulfonate Hg et Na .....	0,05
Arséniate de soude .....	0,01
Excipient pour .....	10 cc.
Phénoldisulfonate Hg et Na .....	0,02

Enfants :

Méthylarsinate de soude .....	0,01
Excipient pour .....	5 cc.

**Présentation.** — Boîtes de 10 ampoules de 5 et 10cc.

**Indications.** — Traitement Hg d'entretien ; Trou les généraux ; Déficiences organiques ; Agent dépuratif et reconstituant.

**Doses.** — 2 ampoules par jour (enfants et adultes) dans de l'eau gazeuse, sucrée ou non.

**Prix :** Adultes : 27 fr. 60. — Enfants : 25 fr. 30.  
Enr. au L. N. C. sous les n°s 403-23 et 24.

ASSOCIATION

TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE

T. VINCENT, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

## VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines.

(Vitamines antirachitique et de croissance.)  
(Contrôle biologique rigoureux.)

**Forme.** — Liquide.

### Indications:

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

### Posologie:

*Enfants — Nourrissons :*

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

*Jusqu'à 3 ans :*

1/2 à 1 cuillerée à café.

*Au-dessus de 3 ans :*

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

*Adultes :*

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année.)

N. B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 20 fr. 10.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie. — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

(Tél. : Diderot 28-96.)

## VOGAN

**Composition.** — Vitamine A standardisée.

**Propriétés.** — Vitamine anti-infectieuse et anti-xérophtalmique; active la croissance, stimule l'état général.

**Indications.** — Amaigrissement, anémie, kératomalacie, kératite, cécité nocturne, furonculose, catarrhe des voies respiratoires, maladie de Basedow.

**Présentations.** — Solution huileuse en flacons compte-gouttes de 5 cc. (1 cc. = 120 000 unités internationales); dragées, boîtes de 50 (1 dragée = 12 000 unités internationales).

**Posologie.** — En moyenne V à X gouttes ou 2 à 4 dragées par jour.

### Laboratoires SANOMÉDIA

Spécialités Pharmaceutiques Merck,

J. HUMBERT, Pharmacien,

65, rue de la Victoire — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Trinité 14-86.)

Le VOGAN est vendu par les Maisons E. MERCK (Darmstadt) et BAYER (Leverkusen).

## VOGAN

Nom déposé. Licence Bayer.

**Composition.** — Préparation de Vitamine A.

**Propriétés et indications.** — Vitamine de croissance, anti-infectieuse et anti-xérophtalmique.

Affections des voies respiratoires, Amaigrissement, Troubles de la croissance, Anémies, Convalescence, Anorexie, Maladies infectieuses, Maladie de Basedow. Au cours de la grossesse, Xérophtalmie, Héméralopie. En applications locales pour activer la cicatrisation de certaines plaies.

**Posologie.** — *Adultes:* V à X gouttes ou 2 à 4 dragées par jour.

*Maladie de Basedow:* XXX gouttes, 3 fois par jour.

**Présentation.** — Boîte de 50 dragées à 12.000 unités internationales.

Solution huileuse: flacon de 5 cc. (1 cc. contient 120.000 unités internationales).

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

### THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

## VOXYNOX

**Comprimés.**

Puissant préventif des maladies de la gorge, du nez et des bronches.

**Composition.** — Sulfate neutre d'orthoxyquinoléine pur, 0,15 ; Essences aromatiques, 0,020 ; Baume du Pérou, 0,020 ; Bicarbonate de soude, 1,45. Pour 1 comprimé.

**Indications.** — Affections de la gorge, du larynx, Angines, Rhumes, Toux, Coryza, Gripes.

**Posologie.** — Matin, midi et soir. Dans un bol d'eau bouillante, inhalation avec 1 ou 2 comprimés. Respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant 5 minutes. Se gargariser plusieurs fois par jour en faisant dissoudre 1 comprimé dans un verre d'eau bouillie chaude.

Prix : 18 fr. 50.

*Publicité strictement médicale.*

**Laboratoires M. DE RIVE.**

A. DE RIVE, pharmacien.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert  
PARIS (XX<sup>e</sup>).

## VULCAPIL

**Lotion au soufre soluble  
pour le cuir chevelu.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Le VULCAPIL rend aisé, agréable et sans danger le traitement de la Séborrhée et des Alopécies. Il est indolore, inodore, ininflammable et ne grasse pas ; il apporte au cuir chevelu le soufre nécessaire à sa kératinisation et le débarrasse de ses sécrétions anormales et des desquamations de pellicules.

**Indications.** — Affections du cuir chevelu ; Alopécies, Séborrhées.

**Mode d'emploi.** — Tous les matins faire une friction suivie d'un massage du cuir chevelu.

**Laboratoires BRISSON**

**D<sup>r</sup> DEDET et Cie, Pharmaciens**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## VULCASE

**(Comprimés).**

**Laxatif-cholagogue.**

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

**Indications.** — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'*Intestin*. *Dermatoses*. *Arthritisme*.

**Mode d'emploi.** — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

**Laboratoires BRISSON**

**D<sup>r</sup> DEDET et Cie, Pharmaciens**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>)

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

## VULCRINOL

**Pilules dragéifiées.**

Opothérapie hépatique et chimiothérapie humorale associées.

### Composition :

Extrait total de foie de veau frais.

Thiosulfate de magnésium.

Hexaméthylènetétramine.

### Propriétés thérapeutiques :

Spécifique idéal des manifestations de l'insuffisance hépatique et des syndromes d'intolérance : agit comme excitant propre de la cellule hépatique et comme catalyseur de l'équilibre humoral.

### Indications :

- 1° *Maladies d'intolérance et états anaphylactiques.* — Dermatoses, Prurits, Urticaires, Migraines, Asthme, Rhume des foins, Accidents sériques, Intolérances diverses.
- 2° *États hépatiques.* — Torpeur du foie et troubles digestifs consécutifs, Hépatites chroniques, Ictères, Foie colonial, Cholémie familiale, Arthritisme sous toutes ses formes : obésité, goutte, certaines formes de rhumatismes chroniques.
- 3° *Intoxications.* — Médicamenteuses et alimentaires, Auto-Intoxications, Adjuvant des traitements anti- $\Sigma$  et de l'aurothérapie, Convalescences des maladies infectieuses.

### Posologie :

3 à 4 pilules avant les deux principaux repas. Cure de 7 jours consécutifs, à répéter plusieurs fois avec intervalle d'une semaine entre les cures.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Prix : L'étui de 50 pilules : 27 fr. 50.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).

(Tél. : Opéra 43-79.)

## VULNAMINE

*Pommade à base d'Huile de foie de Flétan.*

La *Vulnamine* contient 1 p. 100 d'huile de foie de Flétan correspondant à :

0 gr. 005 mgr. de Carotène pur cristallisé  
et 0 mgr. 0125 d'Ergostérol pur cristallisé.

**Indications.** — Plaies atones de toute nature, Brûlures thermiques et chimiques, Ulcérations, Engelures, Dermatoses chroniques.

**Emploi.** — Étendre la *Vulnamine* en couche épaisse et recouvrir d'un pansement à garder le plus longtemps possible.

**Prix :** 19 francs.

**Laboratoire C. GIREL**

**J. LACOUR, Pharmacien**

19, rue Godot-de-Mauroy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

(Tél. : Opéra 76-24.)

## YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

**Composition.** — Ferments bulgares vivants et sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

**Formes.** — Dragées et granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

**Posologie.** — *Nourrissons.* — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

*Enfants et Adultes.* — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

Prix : Dragées 14 fr. 90. — Granulés : 18 fr. 60.

Enr. au L. N. C. sous le n° 1816 (2 et 3).

**L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

18, place de Laborde — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

(Tél. : Laborde 64-90 à 95.)

## YO-ANDROL

Médication hormono-vitaminique.

**Composition :**

Un complexe endocrinien :

Lipoides orchitiques .....	0, 03 cgr.
Antéro-hypophysine .....	0,005 mmgr.
Cortico-surrénine .....	0, 02 cgr.
associé à la vitamine E .....	0, 02 cgr.
et à la Yohimbine .....	à dose infinitésimale

**Présentation.** — 1° Pilules (*tube de 60*).

2° Ampoules injectables en solution huileuse indolore. (*Boîte de 6.*)

**Mode d'emploi.** — *Per os* : 9 à 12 pilules par jour, avant chacun des principaux repas.

**Voie injectable :** 1 injection sous-cutanée ou intramusculaire journalière ou trihebdomadaire.

**Indications.** — Traitement spécifique des asthénies. Opothérapie complémentaire chez la femme:

**Note.** — Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : **Yo-Androl sans Yohimbine.**

## YO-GYNINE

Médication ovarienne renforcée.

Associant la totalité des hormones ovariennes à l'antéro-hypophysine, à la Vitamine E et à la Yohimbine.

**Présentation.** — Pilules.

**Mode d'emploi.** — 9 pilules par jour, avant chacun des principaux repas et dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

**Indication.** — Donne des résultats là où l'opothérapie ovarienne seule a échoué.

**Laboratoire ISCOVESCO**

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 04-39.)



## YOHIMBINE HOUDÉ

Alcaloïde cristallisé du *Pausinystalla Yohimbe*, spécialement purifié, constant et contrôlé par titrage physiologique.

### Propriétés :

- 1° **Aphrodisiaque** (par vaso-dilatation élective et excitation directe du centre érecteur);
- 2° **Système nerveux.** Sympathicolytique véritable (R. Hamet).
- 3° **Système vasculaire.** Vaso-dilatateur général, donc hypotenseur (Loeper et Lemaire). Bons résultats dans l'aménorrhée et la dysménorrhée.
- 4° **Sécrétions.** Augmente la sécrétion lactée (Cortia, Nolle, del Buono, de Coccola). Résultats remarquables et constants.

### Présentation :

- 1° Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes sous le nom de **Yohimbine Houdé**.
- 2° Sous le nom de **Gynimbine Houdé**, avec une littérature faisant abstraction complète des propriétés aphrodisiaques :

A. Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes.  
Prescrire : **Granules de Gynimbine Houdé**.  
B. Ampoules de solution stabilisée, de 2 cc., à 5 milligrammes de chlorhydrate par cc.

Prescrire : **Ampoules de Gynimbine Houdé**.

### Doses :

Frigidité, impuissance psychique : 6 à 10 granules par jour en 3 fois, avant les repas. Prescrire sous le nom de **Yohimbine** ou de **Gynimbine**.

Sympathicotonie, Exophtalmie basedowienne, Hypertension, Dysménorrhée : 3 à 6 granules par jour, ou 1 ampoule (sous-cutanée). Prescrire sous le nom de **Gynimbine**.

Hypogalactie : 1 ampoule **Gynimbine** de 10 milligrammes par jour, en injection sous-cutanée, pendant 4 à 6 jours; commencer autant que possible dans les 3 jours suivant l'accouchement. Pour l'hypertension, voir également *Cinquésine Houdé*.

### Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X<sup>e</sup>). (Tél. : Nord 40-58.)

## YOHOURTHOGÈNE CARRION

Pour la préparation domestique du Yohourth.

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, fournis par les cultures pures des microorganismes producteurs du Yohourth.

**Indications.** — Le Yohourthogène permet la fabrication du Yohourth lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

**Mode d'emploi.** — La technique à suivre en utilisant n'importe quel appareil est donnée par une notice spéciale.

### Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 12 fr. 50.

Le flacon (pour 8 pots de 125 cc.) : 5 fr. 70.

### Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

## YSEULT

(Gouttes).

### Indications :

- 1° Troubles de la ménopause et de la puberté ;
- 2° Troubles de la circulation veineuse chez la femme et chez l'homme (varices, hémorroïdes, états congestifs).

**Conception nouvelle :** La mesure de la tension veineuse montre que toutes ces affections correspondent à un stade spécial d'insuffisance hépatique et cardiaque.

**Composition.** — Adjonction à des vaso-constricteurs veineux d'action sûre du Boldo et du Cratægus, qui répondent admirablement à ce stade.

**Doses moyennes.** — X gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.

**Prix :** 20 fr. 70.

Dépôt chez tous les grossistes.

Dépôt à Paris : 2, rue Jobbé-Duval (XV<sup>e</sup>).

**E. ROCHE, Pharmacien**

9, rue de la Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

## ZOMO-STHÉNOL

### BOUILLON APÉRITIF

Tonique et reconstituant

#### Formule :

Sulfate de strychnine.....	0,001
Méthylarsinate de sodium.....	0,02
Sesqui-bromure de fer .....	0,03
Chlorure de manganèse .....	0,05
Glycérophosphate de calcium...	0,10
Acide orthophosphorique.....	0,10

Lysat de globules rouges correspondant à 2 grammes de sang frais. Extraits de viande et de légumes concentrés par procédé spécial à quantité suffisante pour 1 tube scellé de 10 cc.

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Anorexies, Dépressions, Neurasthénies, Convalescences, Surmenage, Amaigrissement, etc.

**Présentation et prix.** (Arrêté n° 2099 du 6 février 1942.)

*Adultes* : boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. : 28 francs.

*Enfants* : flacons de 150 cc. : 26 fr. 70.

#### Posologie :

*Adultes* : une ampoule dans une demi-tasse à café d'eau très chaude donne un excellent bouillon apéritif, stimulant nerveux et tonique général. A prendre avant le repas de midi ou du soir.

*Enfants* : une cuiller à dessert représente le 1/3 d'une ampoule.

Enregistré sous les n°s 1779-1 et 2.

Laboratoire **COURTIN**

**G. COURTIN**, Pharmacien.

134, avenue Jean-Jaurès — REIMS (Marne).

## ZYMATINE LESCÈNE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

**Composition.** — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

**Propriétés.** — Décongestionnant, Cholagogue alcalin, Pansement des muqueuses. Empêche les fermentations intestinales, Antiémétique. Eupéptique.

**Indications.** — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Dermatoses, Hépatisme.

*Adultes* : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Affections hépatiques, Dermatoses.

**Doses.** — *Enfants* : 2 à 6 1/2 cuillerées à café par jour dans le lait (biberons), eau, bouillies. (Éviter température supérieure à 50°.) Dans la constipation, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café suivant effet, dans un demi-verre d'eau avant le repas, 2 à 3 fois par jour.

## ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

**Composition.** — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

**Indications.** — Médications hépato-digestive et reminéralisante associées.

**Doses :** *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

— 1 an : — matin, midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 1 cuillerée à café matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires **LESOÈNE**

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)  
et LIVAROT (Calvados).

## ZYMION

**Traitement des affections rhumatismales chroniques.**

**Composition.** — Extrait total de levure de bière (Levurine extractive), Soufre colloïdal, Manganèse colloïdal, Étain colloïdal, Lithium.

**Présentation.** — Le flacon contient 60 capsules enrobées (absorption intestinale).

**Indications.** — Rhumatisme chronique simple, rhumatisme fibreux déformant, rhumatisme infectieux, Arthrites, Ankyloses, Lumbagos, Névralgies, Myalgies et toutes manifestations rhumatismales chroniques avec ou sans poussées subaiguës.

**Posologie.** — Dose antalgique de début : 20 à 25 capsules par jour, en 5 ou 6 prises.  
Dose d'entretien : 6 à 8 capsules par jour.

**Laboratoires COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS  
(Tél. : Carnot 18-75.)

## ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

**Mode d'emploi :**

**A. Adultes.** — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

**B. Nourrissons.** — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

**Indications.** — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 16 fr. 40.

Dépôt Général :

**J. LAFARGE, Docteur en pharmacie**

62, rue de la Branderie — CHATEAUXROUX

## ZYMOSTOL

**ZYMOSTOL, Vitamine D naturelle en association synergique avec les principes de la cellule vivante** qui lui sert de support (vitamines B, acides aminés, etc.) : agissant rapidement et très efficacement à des doses bien inférieures à celles des préparations inertes (100 U. I. R. seulement par ampoule au lieu de plusieurs milliers) ; d'où marge de tolérance pratiquement illimitée.

**Indications.** — Toutes déficiences du Calcium, du Magnésium, du Phosphore.

Chez les enfants : rachitisme, troubles de la croissance, anorexies.  
Chez les adultes : troubles du métabolisme calcique, asthénies psychiques et organiques, convalescences, grossesse et lactation, fractures (formation de cal), caries dentaires.

Décalcifications des tuberculeux et états pré-tuberculeux.

Engelures.

Le ZYMOSTOL, en milieu aqueux, n'a aucun mauvais goût et remplace très avantageusement les huiles de foie de morue.

**Posologie.** — Ampoules buvables à prendre à jeun et loin des repas, dans un peu d'eau, sucrée, à la dose normale d'une ampoule par jour, à tous les âges (avec ou sans ration minérale).  
Le traitement peut être suivi longtemps et sans interruption.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules de 3 cc. 5. Prix : 28 fr. 50.

**Laboratoires TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>). (Tél. : Odéon 73-92.)  
Z. N. O. : 2, rue du Pensionnat — LYON.



2<sup>e</sup> Partie

---

NOMENCLATURE  
DE  
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES  
CLASSÉES  
PAR LABORATOIRES



- Lab. Abadie-Tanzi**, 3, pl. Intérieure-St-Michel, Toulouse.  
— Algoboldine, Asclérogénol, Aubémone, Baume de la Faculté, Bellinguol, Cachets digestifs du D<sup>r</sup> Bern, Calcior, Diocol, Essence landaise, Gouttes calciques Zanil, Gouttes halogènes du D<sup>r</sup> Bern, Gouttes de Pecto-sérum, J.-B. 5 Bellas, Moruacase, Naphtholargol, Neurotrol, Névosérol, Ovules halogènes du D<sup>r</sup> Bern, Urolithol, Vallathen, Veinosérol (élixir et gouttes).
- Lab. Abarnon**, 72, av. Thiers, Le Mans. — Antidolor, Antigélures, Baume Robur, Fenurobur, Pelacide, Vermi-Robur, Verrucide Robur.
- Lab. des Abatilles**, rue du Moulleau, Arcachon. — Calci-vitum, Créofruits, Kodos, Seignet'fruits, Vigofruits.
- Lab. de l'Absuric**, 17, r. de Provence, Paris. — Absuric.
- Lab. Acidofoco**, 25, av. Michelet, Saint-Ouen. — Acidofoco.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 11, r. François-Giraud, Villefranche-sur-Saône. — Ultravitamine 4, Nérovitamine 4, Tensol, Serifer, Calcium J.-B., Gluxium, Actigermine, Algérine, Ultracao, Thiophytol.
- Lab. Adler**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — Biolax, Colylore, Formocholine, Gastrolean, Gynochlore, Hémocléan, Hémovarine, Hepacleon, Inhatillol, Iodaubépine, Pulmobiasse, Rhinogéramiol, Tonikéol.
- Lab. Adol (G. Viennois)**, 50, r. des Rancy, Lyon. — Baume Adol, Gouttes Antispasmodiques Adol, Potion Adol.
- Lab. de l'Aéine**, 6, pl. Glichy, Paris (IX<sup>e</sup>). — Aéine, Nuclhémose, Poudre Gast.
- Lab. de l'Aérocid**, Derambure, pharmacien, 20, r. de Péetrograd, Paris. — Aérocid (cachets, comprimés), Aquintol, Hép'Acti, Opocérés (comprimés et ampoules buvables).
- Lab. de l'Æthone**, 35, r. Boissonnade, Paris. — Æthone, Neurotrophène.
- Lab. Agénie**, 4, r. Nationale, Cloyes (E.-et-L.). — Embroslase, Fartex, Pyrolex.
- Lab. N. Aguettant**, 36, quai Fulchiron, Lyon. — Adré-naline Aguettant, Ampoules Aguettant, Bi-As Aguettant, Chrysalmide Aguettant, Néotrope Aguet-tant, Nosol Aguettant, Peptargyl Aguettant, Picricol Aguettant, Stry-Calcium Aguettant, Teinture de Cocheux, Thi-lip Aguettant.
- Lab. de l'Aigue d'Or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — Aigue d'Or.
- Lab. Alessandri**, 20, r. du Pré-Saint-Gervais, Paris. — Clinoborine, Glycocola, Iodosoufre, Koterine, Luozol, Salybore, Sacérase.
- Lab. Pierre Alexandre**, 201, r. de Grenelle, Paris (VII<sup>e</sup>). — Hamaméline Roya, Pitules Myosotis.

- Aliments de Santé Bénédicetus**, 124, r. du Quinconce, Angers (M.-et-L.). — Avenia, Cacao à l'avoine, Che-colate, Digest, Gruautine, Leguminus, Manno, Naturel, Neigia, Orgelia, Pastanila, Phosphanose, Racachout, Sène vitale, Soudanaise, Surnutritif, Survinose, Vitalisor.
- Aliments équilibrés Joly**, Bourg-la-Reine (Seine). — Alti-mavèna, Bovavèna, Supravèna.
- Lab. Alpha**, Montreux-le-Château (Ter. de Belfort). — Albu-Rénol, Anti-Diabète H. Gouttolysine, Grains de Seltz, Silithiosine, Lotion Napolitaine.
- Lab. de l'Ambrine**, 84, bd Garibaldi, Paris (XV<sup>e</sup>). — Ambrine, Néo-Morubiline.
- Lab. de l'Amibiasine**, 69, r. de Wattignies, Paris. — Amibiasine (Liquide, Comprimés, Suppositoires), Bioentérase, Rectopanement-Amibiasine.
- Lab. Amiros**, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII<sup>e</sup>). — Amicrargol, Étain Amiros, Fer Amiros, Orargol (Rhino-Orargol, Rhino-Orargol éphédriné, Gouttes Orargol, Collyre Orargol), Seda-Orargol.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>). — Amidol, Amposymihyl, Bacherine, Génatropine, Génésérine, Genhyoscycamine, Génomorphine, Génos-théniques, Génoscopolamine, Génostrychnine, Sed'-Hormone, Vilamyl traité.
- Lab. de l'Amiphédrine**, L. Hugon, docteur en pharmacie, 6, pl. Jean-Jaurès, Montrouge (Seine). — Amiphé-drine.
- Lab. H. Ammann**, 3, imp. Adam, Boulogne-sur-Seine. — Belhemine.
- Lab. des Ampho-Vaccins Ronchès**, 21, bd de Riquier, Nice, et 72, r. Charlot, Paris. — Amphomulh, Amphoprophyl T. A. B., Ampho-pulvérisateur, Ampho-Quintivaccin, Ampho-tablettes, Ampho-vaccin anti-infectieux, Ampho-vaccin anti-staphylococcique, Ampho-vaccin intestinal, Ampho-vaccin pansement antipyrène, Ampho-vaccin pansement rhino-pharyn-gien, Ampho-vaccin pulmonaire, Ampho-vaccin urinaire, Pyo-Amphogel, Rhino-Amphogel.
- Lab. de l'Amybdine**, 44, av. Pasteur, Courbevoile. — Amybdine.
- Lab. Ana**, 18, av. Daumesnil, Paris. — Euphoryl, Euphoryl Infantile, Hirudinase, Salicylate suractivé Ana, Sclérana (ex-Sclérosérum Ana), Spasmoryl.
- Lab. Androvar**, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort. — Androvar, Androvules, Erythéma.
- Lab. Angelini**, 61, r. de Seine, Paris. — Bromal, Depur-iode, Lactalimant, Nutrol, Onction Angelini, Onguent Borgia, Onguent Prunot, Ovulamides, Ovules Patrat, Pilules Tix, Polypeptine, Poudre Deol, Poudre Fiore, Tonal, Varsclérine, Vin des Indes.

- Lab. de l'Angiolympe, 9, r. Soyier, Neuilly-sur-Seine. — Anapylol, Angiolympe, Argycuprol, Elixir Rodi, Veinicura, Yprine.
- Lab. de l'Aniodol, 8-9, r. des Alouettes, Nanterre. — Algotan, Aniodol.
- Lab. des Antigénines, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — Antigénines, Biazan, Cresenyl, Iodosoufryl, Jovanyl, Sulfaboldine.
- Lab. de l'Antiphi, Rion-des-Landes. — Analgyl, Antiphi, Antispa, Libérine.
- Lab. de l'Antiphlogistine, 11, rue Collange, Levallois-Perret (Seine). — Antiphlogistine.
- Lab. de l'Aparoxal, 7, allée du Midi, Courbevoie. — Aparoxal.
- Lab. d'Applications biologiques. — (Voir à Labiola.)
- Sté d'Applications pharmacodynamiques (Laboratoires Delagrangé), 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII<sup>e</sup>). — Aminophylline, Caréna, Caréna-Calcium, Caréna-Injectable, Caréna-Ouabaine, Corydrane, Dinitra, Erythra, Iocasine, Mitosyl, Opo-Dinitra, Phylla, Rhinalator, Rhocya, Sédé-Caréna, Trinitrine-Caréna, Théophylline.
- Sté Générale d'Applications Thérapeutiques, 98, r. de Sévres, Paris (VII<sup>e</sup>). — Voir « Théraplix ».
- Pharmacie Ardoin, 33, bd Dubouchage, Nice. — Cigarettes Rebeaud, Digestif Dahl, Globules Rebeaud, Liqueur Rebeaud, Lubrigel, Olfactine, Pastilles norvégiennes, Poudre Rebeaud.
- Lab. de l'Armanite, 3, av. Daumesnil, Paris. — Armanite, Collarman.
- Lab. Armingeat et Cie, 43, r. de Saintonge, Paris (III<sup>e</sup>). — Tiodine Cognet, Thiosinamine Cognet, Agonol Cognet, Capsules Cognet, Dragées de fer Cognet, Dragées Dubourg, Hémoneurol Cognet, Poudre et Pastilles Paterson.
- Lab. Armoril, 7, r. de l'Armorique, Paris. — Anorexyl, Camformine, Soutensa.
- Lab. J.-C. Arnault, Saint-Just-en-Chaussée (Oise). — Ergépatine, Plasmocalcium, Sédergine.
- Lab. Aseptor, 31, av. Ledru-Rollin, Paris (XII<sup>e</sup>). — Aseptorhine, Auriculine, Boréol, Glycalcion, Otalgolax, Rhinaspir, Rosaseptor.
- Association Technique Pharmaceutique, Chef-Boutonne (D.-S.). — Adénoséptyl, Cresolargol, Digex, Rangol, Sérobrol, Vivargyre.
- Lab. P. Astier, 42, r. du D<sup>r</sup>-Blanche, Paris. — Arnéol, Colitigue, Kola-Astier, Lyxanthine Astier, Néoriodine, Philentérol, Riodyne, Stalysine.

- Lab. Atlas, 264, route d'Heyrieux, Lyon. — Marinergol, Radio-Osséine.
- Lab. de l'Atospirine et du Strontiodé, 19, r. du Bac, Paris. — Atospirine, Strontiodé.
- Lab. du D<sup>r</sup> E. Aubert, 71, r. Sainte-Anne, Paris. — Aseptoblastine Schmit, Créacalcine, Créatonine, Hépatoplasma, Kola Aubert caféiné, Métacarbine, Méta-citrine, Métaformine comprimé, Métaformine granulé, Métaférol, Mucigénol, Néosalicylate, Néosplénine, Neutrobil, Pancrébile, Parabenzyl, Pro-sulfamide, Suppo-créosote, Tot'Hépatine, Tous produits de marque « Bertal ».
- Lab. Marcel Audibert, Cinq-Cantons, Bayonne. — Vermirène Audibert.
- Lab. Augier, 2, r. des Lombards, Paris. — Affinex, Dragées périodiques P. A., Gouttes Sap, Mensuo-sédyl, Noctisédyll.
- Lab. A. V. E., 81, quai de Valmy, Paris (X<sup>e</sup>). — Cartilos, Chouxco, Comprimés N. B. M., Gelchol, Gluchol, Granulé Idonil, Idonil, Idonil au Maté, Leptab, Osmos, Sulsod, Vertox.
- Lab. Axos, 3, r. Sarrette, Paris (XIV<sup>e</sup>). — Aphonia, Argocarbine, Axorhine, Axopectine, Cholaxol Epi-dermine bougie et savon, Manganèse Axos, Pome-reine.
- Lab. Badel, 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme). — Florosine, Gouttes Bronchophiles André, Juglan-régine André, Kolasthène Badel, Mycidol Badel, Poudre laxative André, Soporine.
- Lab. G. Baetz, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — Cinascol, Perasurol, Pervosine.
- Lab. A. Bailly (SEPBA), 15, r. de Rome et rue du Rocher, Paris (VIII<sup>e</sup>). — Anaxéry, Bactéramide, Opobyl, Panbiol, Pulmosérum, Pyorex, Rhinamide, Sédacônes, Theinol, Urophile.
- Lab. du D<sup>r</sup> Baissade, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — Baume du D<sup>r</sup> Baissade.
- Lab. du D<sup>r</sup> Baraige, 24, r. Paul-Bert, Paris (XI<sup>e</sup>). — Glutipolysalyl, Glutisalyl, Rectabaïne, Spécifique Eldé.
- Lab. de la Barbiflore, H. Adam, pharmacien, 4, r. du Rocher, Monaco. — Cardioflorine, Cystoflorine, Hépaflorine, Sealandair, Trigosthène.
- Lab. Bardiaux, 39, r. de Reims, Vichy. — Citrophédrine, Dysseptol, Perles réductrices, Laxol Vichy, Laxinol Vichy.



- Lab. Bardou, 13, quai Ragobert, Joigny (Yonne). — *Sanargol*.
- Lab. Barthélemy, place Forbin, Aix (B.-du-Rh.). — *Anaural*, *Baume St-Roch*, *Biliboldo*, *Sirop Escolle*, *Sirop Pulmophile*, *Solvurène*.
- Lab. de V. Battut, 260, r. de Rosny, Montreuil, Paris. — *Aérogaster*, *Anthracalcine*, *Cafédrine*, *Calomel Solens*, *Chlorical*, *Citri-Na*, *Comprimés sulfureux de Luchon*, *Curasme*, *Dolozymes*, *Gayacons*, *Glottarsinol*, *Hypobromine*, *Limonade Moulin*, *Marrhama*, *Molinal*, *Myrtabyl*, *Neuridol*, *Oical*, *Olisot Ephédriné*, *Piperazine Solens*, *Saucholine*, *Spartédrine*, *Thyrocalcine*, *Vitalactyl*.
- Lab. P. Baude, 72, r. Saint-Dominique, Paris. — *Nestosyl* (*Pommade*, *Solution huileuse*, *Suppositoires*, *Ovules*), *Sérocabone*.
- Lab. Bayer, 16, r. d'Artois, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Compral*, *Novocaïne-Corbasil*, *Novocaïne-Suprarénine*, *Vénules*.
- Lab. Spécial Bazin, H. Garraud, pharmacien, 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux (Gironde). — *Opothérapie Bazin*.
- Lab. B. E. A., 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine*.
- Lab. Beaufour, 18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.). — *Romarine*.
- Lab. Beaugourdon, 43, av. Kléber, Paris. — *Fluosaly*, *Beaugourdon*, *Laxatif Fluol*, *Pandermol* (amp. et pommade), *Pâte Magali*, *Sirop Magali*.
- Lab. Beauxis-Lagrave, 72, quai Jemmapes, Paris. — *Acalar*, *Bensamine*, *Palpitine*, *Prostatols*, *Rubargyre*, *Sédaortine*.
- L. Belières, 19, r. Drouot, Paris. — *Antirrhoïde*, *Biophène*, *Déensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurenol*, *Opoplasma*, *Orthogénol*, *Sirop Gribell*, *Vaccins Ivago* (procédé L. Goldenberg).
- Lab. Roger Bellon (Louis Ferrand, pharmacien), 78 bis, av. Marceau, Paris (VIII<sup>e</sup>) ; 24, chem. de Saint-Roch, Avignon (Vaucluse). — *Gambéol*, *Actiphos*, *Hémopylore « 3 »*, *Globiron buvable*, *Calyptol*, *Balsajormine*, *Ganderma*, *Comprimés de Proto-Gambier*.
- Benderitff et Cie, Vendôme (L.-et-Ch.). — *Bellacal*, *Cynhepatil*, *Gastrocal*, *Neutralcal*, *Trisodyl Rozel*, *Sulfolène du Dr Rozel*.
- Lab. du Dr Bengué et fils, 16, rue Ballu, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Baume Bengué*, *Chloréthyle Bengué*, *Anestile Bengué*, *Narcotile Bengué*, *Siphons de Méthyle Bengué*, *Dragées Bengué*, *Néseptol Bengué*, *Opticura Bengué*, *Vegecarnis Bengué*, *Eupurgo Bengué*, *Topique Bengué*.

- Lab. Béral, 36, av. Hoche, Paris. — *Adrénoïdes*, *Adréphédrine*, *Clearol*, *Ephédermine*, *Ephédraféine*, *Ephédrampoules*, *Ephédricones*, *Ephédrine*, *Ephédrisol*, *Ephédroides*, *Ephédromel*, *Ephéiodine*, *Ephétropine*, *Grains d'Ephédrine*, *Mydriédrine*, *Myrtine*, *Nasophédrine*, *Navidrine*, *Oléophédrine*, *Rhinodrops*, *Somnicomes*, *Spartophédrine*.
- Lab. Bernamont, 87-89, r. du Commerce, Nevers (Nièvre). — *Pommade et Gouttes Bernamont*.
- Lab. Bernard Garcin, St-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse. — *Bismullium*, *Mucyllum*.
- Lab. R. Bernardo, 47, av. de la République, Villeneuve-le-Roi (S.-et-O.). — *Siligone*, *Théostène* (*Scillitique et Simple*).
- Lab. G. Bernhard, 11, r. La Fayette, Paris. — *Ampéline Bernhard*, *Ampélicones Bernhard*, *Essence Alsacienne du Dr Frech*, *Gargarisme concentré G. Bernhard*, *Gargarisme sec Wuhrlin*, *Gouttes Sédatives Bernhard*, *Granules des Vosges*, *Kélenol Bernhard*, *Kyralgine Bernhard*, *Poudre antilastalgique Bernhard*, *Sirop Sédatif Bernhard*.
- Lab. G. Berthon (Nièvre), zone occupée — zone libre : 28, rte de Limoges, La Madeleine (Allier). — *Asthmo-Actine Berthon*.
- Lab. Berthoumeyroux, Souillac (Lot). — *Baume Heptalgine*.
- Lab. Bertrand, Nomexy (Vosges). — *Calciocholine*.
- Lab. A. Besnier, 1, rue Raynouard, Paris. — *Opo-Phyto-Draineurs Réaumur*, *Poly-Opo-Minéraline*, *Séneçonine*.
- Lab. de la Bexinine — L. Colin, 19, rue Saint-Jean, Caen (Calvados). — *Bexinine*.
- Lab. E. Beyaert, 65 bis, av. de Montrouge, Gentilly (Seine). — *Eupax*.
- Lab. Beytout, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl*, *Carbonésie*, *Dentoma*, *Hista Injectable*, *Hista Liniment*, *Hista Dimilli*, *Hordenol*, *Kaolinase*, *Kaolinase Belladonnée*, *Lacloma*, *Lait de Magnésie*, *Thiophyl*, *Tisane Cisbey*, *Véryl*.
- La Bière des Nurses, Bourg-la-Reine (Seine). — *Bières pures* : *Diasasée*, *Hypermallée*, *Santé*, *Élite*, *Lunch*, *Concentré des Nurses*.
- Lab. Bio-Bourgogne, 24, av. Albert-I<sup>er</sup>, Dijon. — *Arthria*, *Asthmo-hépatine Lebrot*, *Boldilia*, *Friga*, *Hépatovaine F et M*, *Pepto-Sucs*, *Surtensaol*.
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, docteur en pharmacie), 19-21, r. Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant*, *Collu-sulfar*, *Ektophanol*, *Sulfarsénol*.
- Lab. Biochimique de l'Est, Lure (Hte-Saône). — *Avicosyl*, *Lemonai*, *Sirop Poléry*.

- Lab. Biolabo, 9, bd Malesherbes, Paris. — *Atalante*, *Demorphène*, *Euneryl*.
- Lab. de Biologie médicale et de Dermothérapie, 8, av. Walkanaer, Nice. — *Antipiol*, *Entérofagos*, *Rhino-Antipiol*.
- Lab. Biologique de l'Île-de-France, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV<sup>e</sup>). — *Aloplastine*, *Iodocalcium*, *Neurocalcium*, *Pdte à l'eau Aloplastine*, *Phoscelène*, *Sirop Iodocalcium*, *Sirop Sédatif*, *Thymonol*, *Vitaxyl*.
- Lab. La Biomarine, Dieppe (Seine-Inf.), repliés à Salies-de-Béarn. — *Arthritose*, *Embryocytol*, *Embryol*, *Ionyl*, *Marinol*, *Plasmarine*.
- Lab. Biopharmaz, 40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon (I.-et-L.). — *Akésol Muzi*, *Hepactic Efa*, *Ultracrinol*.
- Lab. Bios, 10, r. Vineuse, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Biophylla*, *Bronchoseda*, *Carbonex*, *Euphydigital*, *Euphillin*, *Gouttes ionisées A*, *Hépatium*, *Produits Bios*, *Pulmone*.
- Lab. Biosedra, 60, r. de Rome, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Algonal*, *Biosedra*, *Gastélose*, *Hépanova*, *Higalex*, *Nuclergol*, *Opo-Veinogène*, *Potion Dioga*, *Suppo-Zinol*, *Sympathocrine*, *Veinogène*.
- Produits de la Biothérapie, H. Villette et Cie, pharmaciens, 5, r. Paul-Barruel, Paris. — *Antivirius*, *Arapal*, *Bilivaccin anticolibacillaire*, *Bilivaccin antityphique*, *Cellucrine*, *Crysiodal*, *Sanogyl*, *Spirogyl*.
- Lab. de Bissyl, 117 ter, r. Ordener, Paris. — *Bissyl*.
- Lab. Pharmaceutiques A. Blanc, Barcelonne-du-Gers (Gers). — *Germoléal*, *Hévoglan*, *Hévoglanol*, *Muoléal*.
- Lab. J. Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain). — *Acéryl*, *Cachets du Dr March*, *Colène*, *Nuclarrhol*.
- Lab. G.-L. Blin, 12, r. Alph.-Brault, Choisy-le-Roi (Seine). — *Baryxine*, *Baryx colloidal*, *Radio-Baryx*.
- Lab. P. Boivert, Montguyon (Char.-Mar.). — *Calmo-suppos sédatifs*, *Calmosuppos antithermiques*, *Hépatogénine*.
- Lab. Boize et Alliot, 9, av. du Maréchal-Lyautey, Lyon. — *Alzine*, *Alomine*, *Diurobromine*, *Diurocardine*, *Diurocystine*, *Logaphos*.
- Lab. Bomel, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer*, *Collutoire V.-E. Doumer*, *Pilules V.-E. Doumer*, *Pommade V.-E. Doumer*.
- Lab. Bonetti, 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine). — *Diadermine*.
- Lab. Raoul Bonnay, 78, r. de Monceau, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Biorgan*, *Pulmochrysine*.
- Lab. Bordelais, 47, r. Maleret, Bordeaux. — *Anacarboul*, *Anhépatol*, *Cephamedine*, *Chelicyne*, *Gelvicer*, *Enterargol*, *Nuxéol*, *Phosma*, *Phosphosodine*, *Physioscymamine*, *Poudre Arria*, *Salacitrine*, *Stomagyl*, *Sulciclilorine*.

- Lab. Borne, 24, r. des Ursulines, St-Denis. — *Benzéthol*, *Chocochoaux*, *Codéthylène*, *Diocamphine*, *Distilbène*, *Lysococcine*, *Thiosédal*.
- Lab. du Bornésool, 143 bis, rue Ordener, Paris. — *Bornésool*, *Éphédrolyptol*, *Solhysoy*, *Suprarhinal*.
- Lab. Bornet, 5, bd des Brotteaux, Lyon. — *Bismuth B3*, *Hépaticol*, *Olivéol*, *Vasconstrictine*.
- Lab. Bottu, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforme Bottu*, *Gaze néolée*, *Néalgyl Bottu*, *Néol Bottu*, *Néolides H. B.*, *Ouvnéol Bottu*.
- Lab. du Dr Boucard, 30, r. Singer, Paris. — *Bioléol*, *Crayon Termosan*, *Lactéol*: *Comprimés*, *liquide*, *ovules*, *pansement*, *suppositoires*, *Polyviatalol*, *Pulvi-Lactéol*, *Rhino-Lactéol*, *Vaxa*, *Viatalol*.
- Lab. A. Bouchand, pharmacien, Melle (Deux-Sèvres). — *Basmyl*.
- Lab. P. Bouchereau, 57, bd Aristide-Briand, Champigny (Seine). — *Diphasal*, *Phéniodine*, *Saliformiode*, *Sirop Bégessol*.
- Lab. Boudin, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Révulsif Boudin*.
- Lab. Bouillet, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne*, *Sous-Nitrate de Bismuth Tulasne pur*, *Néo-Pansement Tulasne*, *Néo-Pansement Tulasne quinolé*, *Bismu-Cônes*, *Iodulans*.
- Lab. G. Boulet, 14, r. Eugène-Delacroix, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Cratégol*.
- Lab. Bourdon, Frontignan (Hérault). — *Gyneplia*, *Heptyl Bourdon*.
- Lab. Bourillot, 6, r. Berbisey, Dijon. — *Bourdainol* (comprimés), *Bronphélie*, *Bronchialis*, *Bronchophilos*, *Bronxia*, *Choléocytol*, *Dragées et Elixir aux Algues Marines*, *Gouttes Iodocirculine*, *Ginéol* (comprimés), *Gercurol* (pommade), *Granulé Verdol*, *Hétraménol*, *Jouvén B*, *Lacta*, *Morufine*, *Odochloraline*, *Polycalcose*, *Renovir*, *Sirop Chevassus*, *Toxurool*, *Trimidor*, *Vermus* (sirop).
- Prod. Bourvis-Orthopédie, 28, cours Gambetta, Lyon. — *Bandes Giltex* (7, 8, 10 cm.), *Agrafes de fixation Giltex*, *Bas à varices Giltex*.
- Lab. Bousquet, 20, r. Grémont, Elbeuf (S.-I.). — *Cratégine*.
- Lab. G. Bousquet, Albi (Tarn). — *Anthelmis*, *Cardobyl*, *Tubes Ferlux Ratio*.
- Lab. Bouteille, 23, r. des Moines, Paris. — *Balseptol*, *Cantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Pulmorectol*, *Pulmo-vaccin*, *Tuberol*, *Vaccinovules*.
- Lab. R. Boutin, 8, r. Aumont-Thiéville, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Iso-Sels*, *Orthocynol*.

- Lab. Bontoux et Déjardin**, 10, r. Parent-de-Rosan, Paris (XVI\*). — *Végétact* (formules ABC), *Sojalose*, *Soja-Soyol*, *Carbargure*, *Cholérène*, *Chloripepsine*, *Microderme*, *Streptoderme* (voir également à : **Déjardin**).
- Lab. Bouty**, 3, r. de Dunkerque, Paris. — *Bittol*, *Gastrozymase*, *Globépal*, *Liqueur Thyroïdine*, *Liquides organiques injectables*, *Métasérum*, *Métharfer*, *Métharsol*, *Néphrine*, *Opostyl*, *Opothérapie Bouty*, *Ouigénine*, *Produits Pennés*, *Sérosthényl*, *Sirop de Gâtarsol*, *Surrénaline*, *Thyroïdine*, *Triglandine*, *Triglandol*, *Vacitil* **Bouty**.
- Lab. Boyer**, 18, r. de la Perle, Paris. — *Phosbiosé*, *Radiogastrol*, **Valax**.
- Lab. Braquemond et Cie**, 105, r. de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuetine Jungken*, *Morrhuetine Jungken Vitaminée*, **Sel d'Ewald**.
- Lab. d'Analyses Bréant**, 11, r. de Clichy, Paris. — *Gédrosan*, *Chlorure d'Ammonium Bréant*, *Daturasolène*, *Neurosolène*, *Osmo-Vaccins Bréant*, *Phostone*, *Précyl*, *Tegool*, *Vanolonyl*.
- Lab. Brichard et fils**, 23, bd Raym.-Poincaré, Bar-le-Duc. — *Alcalino-Gastryl*, *Baby-Bala*, *Belvuline*, *Bronchorose*, *Elixir St-Jean*, *Élycaptol* (sirop, capsules, pastilles), *Eucalybrol* (ampoules, sirop, suppositoires), *Forvital*, *Hémocéline*, *Inhalopin*, *Isalaxine*, *Juvénostyl*, *Nuxiodine*, *Nydol*, *Pastilles Bala*, *Pastilles Debar*, *Pecto-Bronchyl*, *Reinaxine*, *Rythmensine*, *Sirop Bala*, *Sirop Brichard*, *Sirop Debar*, *Thyroguine*, *Tonixyl*, *Urobarine*, *Veinhemone*, *Veinixir*, *Vigostérol irradié*.
- Lab. G. Briens**, 20-22, r. de la République, Lyon. — *Dragées Bondonneau*, **Iodostem**.
- Lab. Brisson**, 157, r. Championnet, Paris. — *Anytal*, *Bainsulphium*, *Denisolène*, *Entéricure*, *Laccodermes*, *Lenicade*, *Licardet*, *Néo-Séli*, *Procuta*, *Savon Denisol*, *Séli*, *Selipyrine*, *Sulphium*, *Vapo sulphium*, *Vulcass*, *Vulcapil*, *Uriclarine*.
- Lab. Brochon**, 202 bis, r. de Paris, Clamart (Seine). — *Combretine*, *Cratægus Bocquillon-Limousin*, *Huiles Durel*, *Icdures Cros*, *Ténifuge Limousin*.
- Lab. du Broncho-Lactol**, 6, place de l'Académie, Angers. — *Broncho-Lactol*, *Deschlerosel*, *Épithémia*, *Lithinés Magnésiés Maxim*.
- Lab. du Broncho-Sérum**, Rumilly (Hte-Saône). — *Broncho-Sérum*, *Dynamine*, *Laxorange*.
- Lab. Bruel**, Granville (Manche). — *Benzo-iodhydriene*, *Capsules Bruel*.
- Lab. Bruneau et Cie**, 17, r. de Berri, Paris. — *Bain de bouche à la Dunacaine*, *Bleu de Méthylène Dunacainé*, *Brunyl*, *Cultiphile*, *Cutiplaste*, *Dunacaine*, *Dunacainol*, *Dunaphorine* (ampoules et suppositoires), *Duna-13*, *Lobéline*, *Mélange type Bonain à la Dunacaine*, *Paraffinolol*, *Parémanol*, *Sénophile*, *Sérum de Jousset*, *Théophylline Bruneau* (comprimés, ampoules et suppositoires).
- Lab. A. Brunot**, 16, r. de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl*, **Sel de Hunt**.
- Lab. de Buccaseptyl**, 10, av. du Colifichet, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.). — *Buccaseptyl*.
- Lab. du Bufox**, 21, r. Grange-aux-Belles, Paris. — *Bufox*.
- Lab. Buriat**, 37, r. Spontini, Paris. — *Arséniodé Buriat*, *Vériane Buriat*.
- Lab. du Dr Butler**, **Boguet**, pharmacien, 1, r. Bossuet, Dijon. — *Pommade du Dr Butler*, *Poudre du Dr Butler*.
- Lab. du Buxema**, **J. Avril**, 18, r. Thiers, Mantes-Gassicourt (S.-et-O.). — *Buxema*, **Buxain**.
- Étab. Byla**, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. — *Voir : Laboratoires d'Endocrinologie appliquée*.
- Lab. des Spécialités Cabasson**, 183, r. de Rome, Marseille. — *Cyto-Sirop*, *Dynosthène*, *Granulé Cabasson*, *Novolax*, *Pulmoseptine*.
- Lab. du Cadior**, 19, r. Clapeyron, Paris. — *Cadior*, **Néo-Cadior**.
- Lab. Caducia**, 78, av. Schneider, Clamart (Seine). — *Clinax*, *Drainochol*, *Glulhional* (compr. et injectable), *Iodo-Glulhional*, *Phosphan Caducia*, **Sténacrine**.
- Lab. Caillaud**, 37, r. de la Fédération, Paris. — *Aldine*, *Choléo-Combretol*, *Cyanhermine*, *Hydratin*, *Mucosodine*.
- Lab. H. Calas**, 162, r. de l'Hay, Gentilly (Seine). — *Intestarsol*.
- Lab. Caimel-Domergue**, 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse. — *Anercol*, *Arsétonyl*, *Arthricéol*, *Bioudures Domergue*, *Complexe Ovarien Caldo*, *Dépuratif des Landes*, *Dermobel*, *Éphédro-Rhinol*, *Eucalcyl*, *Gomurol A et B*, *Glandocalcyl*, *Hépatozyl Caldo*, *Iodures Domergue*, *Nucléocytaze*, *Pangynol*, *Pharyngaseptyl*, *Polydigerol Caimel*, *Vaso-rhinol simple*, *Vaso-rhinol mentholé*, *Vaso-rhinol adrénaliné*, *Veinoposine*, **Viscosodine**.
- Lab. Camuset**, 18, r. Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal*, *Pyréthane*, *Silicyl*.

- Lab. Canat, 4 ter, r. Barbès, Courbevoie.** — *Bemax, Eno's Fruit Salt.*
- Lab. Canat, 22, r. Lalande, Paris (XIV\*).** — *Desitin, Desitinol, Kaviase.*
- Lab. du Canol, 5, r. de Clamart, Boulogne-Billancourt (Seine).** — *Aérogène, Canol.*
- Lab. Cantin, Palaiseau (S.-et-O.).** — *Comprimés Nican, Gouttes Nican, Somnohyril (pilules et suppositoires).*
- Lab. Carbou, 8, r. Jean-du-Bellay, Paris.** — *Cholélyse.*
- Lab. René Carlier, 43, r. de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine).** — *Colarsénol collutoire, Colarsénol pommade nasale, Infangyl Carlier.*
- Lab. A. Caron, 9, place des Terreaux, Lyon.** — *Carbo-peptyl, Gastroneurol, Terpene Boveil.*
- Prod. Biologiques Carrion, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.** — *Adrénaline, Antasthène, Cardio-Streptine, Coliflorine, Di-Hydan, Dyspeptine Hepp, Entéro-coccène Eukinase, Evalmine, Gonagone, Hématéthyréidine, Hépaglycéril, Hépanème, Kéfirogène, Lactifère, Lactoprotéide, Lactosérum, Opothérapie Carrion, Ovules au Gonagone, Pancréatokinase, Per-Extraits, Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Surrénalien, Per-Thymique, Phlébosine M. et F., Plasma de Quinton, Rétropiuhine, Solution du Dr Jacobson, Staphylogone, Sulfagone, Utéro-Streptine, Vaccins Carrion, Yohourigène.*
- Lab. Carron, 69, r. de St-Cloud, Clamart.** — *Amiphène, Fosfoxyf, Fosyls (calcofosyl, magnésosofyl, manganésosofyl, cuprososyl).*
- Lab. Carteret, 15, r. d'Argenteuil, Paris.** — *Bactioxine, Céleol, Chrysemine Carteret, Diurène, Euxoral, Fermentérol, Lusoforme, Sinchin, Vulcrinol.*
- Lab. Castel, 1, pl. Boulguerie, Nîmes.** — *Oxyfuge, Pavonol, Tenifuge, Vermifuge Castel, Zogol.*
- Lab. Catillon, 3, bd St-Martin, Paris (III\*).** — *Glycérine Catillon, Iodo-thyréidine Catillon, Peptone Catillon, Strophantine Catillon, Strophanthus Catillon.*
- Lab. du Dr R. Cavailles, 29, r. Singer, Paris (XVI\*).** — *Coloplastré, Crème du Dr Rap, Crème de Quinine Sapolan, Emplâtres Rogé-Cavaillès, Extrait du Dr Rap, Gaze Anadhère, Lait de Cèdre Sapolan, Lait de Sapolan, Lait de Soufre Sapolan, Poudre de Sapolan, Poudre de Soufre Sapolan, Sapobarbe, Sapocade, Sapocrème, Sapolan, Sapopâte, Saposide, Savon de Sapolan, Sulfostan, Tisane dépurative de Cavailles.*
- Lab. Cébé, St-Just-sur-Loire (Loire).** — *Thio-Goudron.*
- Lab. de la Cérébrine Fournier, 6 bis, r. Campagne-Pre-mière, Paris (XIV\*).** — *Cérébrine Fournier.*
- Lab. G. César Boss, 10, r. de la Viotte, Besançon.** — *Médico-ferment.*

- Lab. Pharmaceutiques Chabre Frères, Toulon.** — *A 313, Vitaol.*
- Lab. Yves Chabrol, 29, av. d'Orléans, Paris.** — *Gastrosthénol, Huilorhine, Quotibyl.*
- Lab. Chaix, 8-10, r. Alphonse-Bertillon, Paris (XV\*).** — *Colloïdogénine du Dr Bayle, Polyvaline du Dr Bayle, Glycérhépatéine, Rhinotopique (pommade), Spléno-médulla (opothérapie splénique et médullaire), Sphymatique (pommade).*
- Lab. Produits et Procédés Chalas, 75, r. Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine.** — *Anaphlox, Kolatinés, Xolphana.*
- Lab. Chambon, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne).** — *Antisciatique P. Chambon, Angoral, Algoil du Dr Guiraud, Révulsif Chambon.*
- Lab. Chambron, Portes-lès-Valence (Drôme).** — *Bio-régine.*
- Lab. Chantereau (Prod. Innothéra), Arcueil (Seine).** — *Mucinum, Sympathyl, Tol'Hamélis, Tol'Hema.*
- Lab. A. Chappellier, Saint-Aigulin (Char.-Mar.).** — *Cura-mida.*
- Lab. Chapotot, 56, bd Ornano, Paris.** — *Néo-laxati Chapotot, Pysoselline, Rhizotannin Chapotot.*
- Lab. des Charbons Fraudin, 4, av. Desfieux, Boulogne-Billancourt (Seine).** — *Benzoate de naphiol Fraudin, Biscals, Carboïdures Fraudin, Charbon Fraudin belladoné, Charbon Fraudin naphtolé, Charbon Fraudin simple (granulés comprimés), Laxol Fraudin.*
- Lab. Charpentier-Rodiet, 47, r. de Bretagne, Paris.** — *Biphédrine aqueuse, Biphédrine huileuse, Épanal, Néo-Codion (gouttes et dragées).*
- Lab. E. Charpentier, 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.** — *Boldolaxine Charpentier, Quinocarbine Charpentier.*
- Lab. A. Chassaing, R. Le Coq et Cie, 4, r. de la Coutellerie, Paris.** — *Comprimés Vichy-État.*
- Lab. Chassaing, Le Coq et Cie, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine).** — *Dioséine Prunier, Néo-Neurosine Prunier, Neurosine Prunier, Novacétine Prunier, Poudre du Dr Souligoux.*
- Lab. Chatelut, 65, r. Louis-Blanc, Paris.** — *Dragées Néurosthéniques, Dragées Yse, Hémagénine Giraud.*
- Lab. M. Chatron, 146-150, r. de la République, Mont-luçon (Allier).** — *Boldomucyl, Dystonine, Normucyl, Normucyl Belladone, Normucyl Bourdaine.*
- Pharmacie Chaumel, 87, r. La Fayette, Paris.** — *Iso-tonyl Bouret (poudre de Lausanne).*
- Établ. Alfred Chauvin, Aubenas (Ardèche).** — *Acogénol, Atropophédrine, Collohitrol, Dépuratif Chauvin aux hyposulfites, Désensibilisant Chauvin, Gallo-Chrome, Gouttes Chauvin à l'Audisclocrocine, Laborol, Osmotol, Paratyl, Phocéol, Phylglobline, Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine, Solutions otologiques Chauvin, Spartoforme, Tubes Blache, Tubes Chauvin*

- Lab. **L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Cachets Spévin, Selor.*
- Lab. **R. Chemineau**, Vouvray (I.-et-L.). — *Gargyl.*
- Lab. **Chéradame**, La Palisse (Allier). — *Exolithol.*
- Lab. **Chévillon**, rue de la Paix, Croix-de-Vie (Vendée). — *Gébilac, Morisland, Nocléigène, Paradoline, Phoryx.*
- Anc. **Établ. Chevretin-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir Lab. Lematte et Boinot.)
- Lab. **Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-Rh.). — *Élixir vermifuge Chiarini, Tœnifuge du Dr Jaquème.*
- Lab. **Chibret**, 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Collyres et Pommades Chibret « Optima », Humeur aqueuse artificielle, Chibro-bains d'yeux, Chibromercurobrome sous toutes ses formes : solution, ovules, ampoules lavages et ampoules injectables, pommade pour pansements, collutoire, tubes Chibret.*
- Lab. **Choay**, 48, av. Théophile-Gautier, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Opolthérapie. Extraits totaux, Extraits injectables, Syncrines, Peptosthénine. Adrénaline, Insuline et Insuline-Zinc-Protamine, Post-Hypophyse, Gélolanin Choay.*
- Lab. **Christiaens**, Dr René Marq, 8<sup>e</sup> (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale), 4, r. Colbert, Reims. — *Antialgos Christiaens, Benzophosphine Christiaens, Capsules Goubaux, Pilules anhépatiques Christiaens, Pilules prophylactiques Christiaens, Sédatine Christiaens.*
- Lab. **des Produits du Dr Churchill**, 92, av. de St-Mandé, Paris (XII<sup>e</sup>). — *Fosfomagnyl Churchill, Limol Churchill, Magol Churchill, Néo-granulé Churchill, Poliol Churchill.*
- Lab. **Ciba**, 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomènesine, Androstine, Ascéine, Atoguinol, Cibalgine, Coaguléne et Hémocoaguléne, Coramine, Dial, Didial, Digifoline, Elbon, Entéro-Vioforme, Ferrophytine, Fortossan, Fortossan irradié, Hémypnal, Lipoiodine, Lutocycline, Ovocycline, Perandrone, Percainal, Percaïne, Percortène, Péristaltine, Phytine, Quinino-phytine, Résyl, Salène-Salénal, Sanoquinol, Sistomensine, Trasantine, Vioforme.*
- Lab. **du Citra-Quint**, J. Corteel, pharmacien, 74, r. de La Fère, Saint-Quentin (Aisne). — *Citra-Quint, Dio-Quint, Magnoxol.*
- Lab. **Léon Claeys**, 1, bd St-Martin, Paris (III<sup>e</sup>). — *Babeurre Nutricia.*
- Lab. **du Dr J.-P. Clary**, Vaux, pharmacien, 72, av. Kléber, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Bromo-Magnésium, Iodo-Magnésium, Phoso-Magnésium.*

- Lab. **Clément-Colleson**, 11, r. Léon-Giraud, Paris (XIX<sup>e</sup>). — *Crème de Bismuth du Dr Quesneville, Crème de Bismuth Chl. magnésienne (ou Ma-bis-cal), Cupro-Salyl du Dr Quesneville.*
- Lab. **Clevenot et Rosso**, 3, r. Lamblardie, Paris. — *Angionévrol, Arsallyl, Aseptophédrine, Atouxin, Bili-chlorine, Biophényl, Bismuxyl, Calcium Rosso, Calminal, Camphogénine, Cratiode, Embrocation Rosso, Gaïacoline, Glucobicalcium, Glucalcium, Hormosthényl, Hormovényl, Lactiphage, Magnésium Rosso, Saccharol Rosso, Valéroquinquina.*
- Lab. **Clin**, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris (V<sup>e</sup>). — *Adrénaline Clin, Cinnozyl, Electragol, Arsaminol, Élixir et Gouttes Deret, Enesol, Néo et Sulfo-Trépar-sénan, Nargénol, Odarsol, Salicylate de soude Clin, Sérums Clin, Sirop d'Aubergier, Sirop de Sirtal, Paderyl, Solurol, Sparto-Camphré, Spartoval, Génisténal, Iogol, Lyso-Choc, Orthosiphène, Vaccins Clin, Puvargol, Strychno-Phospharsinée (injections et gouttes), etc.*
- Lab. **Cluzel**, 60, cours Émile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko, Michaline, Révulsif, Milko, Tablettes Zéva, Tonique Zéva.*
- Lab. **Codéal**, 1, bd Louis-Salvator, Marseille. — *Lacodal, Hépaline, Vichy amaigrissant.*
- Lab. **des Produits Cody**, Brive-la-Gaillarde (Corrèze). — *Lexiode (ex-Iodocitrol), Iodopeptone Cody, Pulmoryl Cody, Marisine.*
- Lab. **A. Coirier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Codérax, Marrucol, Tisane Borkou.*
- Lab. **Coirre**, 5, bd Montparnasse, Paris. — *Allium Coirre, Argyrophédrine, Chlorhydropeptine, Granules Phosphure de Zinc, Juranol, Leuvre Coirre, Parkipan, Sédibaïne, Solucalcine, Solution Coirre, Titane Coirre.*
- Lab. **Rob. Colas** (Anc. Lab. Odinot), 133, r. Lecourbe, Services commerc. : 21, r. Violet, Paris. — *Baldisedan (pilules, suppos., ovules), Choléotax, Filhosa, Filhosoules, Gynoster, Marrusera, Pulmoseptol, Purpurol, Urocarboul benzonaphthol, Calciline, Néo-Calciline, Gastro-Sodine, Pluribiase, Sel digestif Bé-Me-Cé, Soluderm.*
- Sté des Prod. Collas et Boudault, Mougnaud et Cie**, Longjumeau (S.-et-O.). — *Pyrélatine Collas, Pommade et savon au Goudron, Baume Chiron, Élixir et poudre de Pepsine Boudault, Pilules Écossaises Collas, Bougies camphrées Collas, Élixir des Jacobins de Rouen.*
- Lab. **Combefreyroux**, 134, av. Parmentier, Paris (XI<sup>e</sup>). — *Alcachel, Sirop Védia, Sérocytine.*
- Lab. **Comte**, 60-62, r. St-Guilhem, Montpellier. — *Marrubiase, Rythmosystol.*
- Lab. **Coquelin**, Digoin (S.-et-L.). — *Compressif Bestier, Coquelustate, Tulle rose Bestier, Vésicaloire Rose Bestier.*

- Lab. Corbière et Pansements Brevetés Corbière**, 27, r. Desrenaudes, Paris. — Alcalinose, Bluméol, Broncho-Vaclydun, Calcium Corbière, Cellargos, Cobrallyre, Cobratoxine, Coli-Vaclydun, Créagénol, Cytomanganol, Cytopespal, Cytophédrine, Cytosérum, Dermaline, Entéro-Vaclydun, Gono-Vaclydun, Gynéco-Vaclydun, Grippo-Vaclydun, Hémo-cytosérum, Katox, Katox-Intra, Oléoforimine, Ophthalmito 8, Opolaxyl, Pantavoine, Pyo-Vaclydun, Rhino-Vaclydun, Sérum anti-asthmatisque de Hechel, Staphylo-Vaclydun, Strepto-Vaclydun, Suppositoires à l'arsénobenzol Corbière, Vaclyderm, Vaclydovules.
- Lab. Cornaud et Brossard (E. Cornaud, Suc.)**, 1, r. du Cordouan, La Rochelle. — *Io-Salyt*, *Névralgol* Brossard.
- Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — Androcalcion, Cortiode, Gynocalcine, Iodaseptine, Iodaseptine salicylée, Lila, Septicémine, Vitamine C Cortial.
- Lab. Coudero**, 9 et 9 bis, r. Borromée, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Cachets Charvoz*, *Hépalogènes Charvoz*, *Inertyl Charvoz*, *Pyralium*, *Silenan*.
- Lab. Coudert**, 13, r. Antoine-Vallon, Paris (XII<sup>e</sup>). — *Hémostatique Coudert*.
- Lab. R. Coudert**, 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine). — *Hépartichaut adultes et infantile*, *Flétarhine*.
- Lab. Courtin**, 134, av. Jean-Jaurès, Reims. — *Dialonine*, *Diatergol*, *Zomo-Sihenol*.
- Lab. Couturieux**, 18, av. Hoche, Paris. — *Azufrol*, *Bismuthion*, *Bromiase*, *Cuprion*, *Gésol*, *Glycolactimase*, *Iodurase*, *Lantol*, *Leurine extractive*, *Leurine brute*, *Panglandine*, *Plurion*, *Sélienol*, *Stanion*, *Sulfurion*, *Zymion*.
- Lab. Couvert**, 11, r. de Mogador, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Bil Soda*, *Cachets Katal*, *Embrocation Katal*, *Gastroniger*, *Harledine*, *Pastilles Dyani*, *Tisane Carmina*.
- Lab. J. Cribier**, 19, r. de la République, Orléans. — *Oxémo*.
- Lab. Crinex-Uvé**, 1, av. du D<sup>r</sup>-Lannelongue, Paris. — *Crinex*, *Flavex*, *Frenovex*, *Métrex*, *Opothérapie Crinex-Uvé*, *Orex*, *Panphysex*, *Uvé*, *Uvéstérol*.
- Lab. du Crinoflux**, 52, r. Germain, Lyon. — *Crinoflux*, *Dragées Hyger*, *Paxineurol*, *Ultracalcine*.
- Lab. Crosnier-Dumesny**, 199, av. Michel-Bizot, Paris. — *Biosodine*, *Kaolin Terrial*, *Kinurée Terrial*, *Neuroflorine*, *Sirop Minéral sulfureux Crosnier*, *Stanno-Sufrol Crosnier*, *Sufrol Crosnier*.
- Lab. Crouy**, Vernon (Eure). — *Urophényl*.

- Lab. Cruet**, 89, av. de La Bourdonnais, Paris (VII<sup>e</sup>). — *Albucid*, *Atophan*, *Atophanyl*, *Cardiazol*, *Cardiazol éphédriné*, *Cardiazol quinine*, *Diurétine*, *Diurétine calcique*, *Diurétine iodo-calcique*, *Diurétine rhodanocalcique*, *Néotropine*, *Prognynon liquide*, *Prognynon comprimés*, *Prognynon B huileux*, *Pommade au Prognynon*, *Proluton*, *Proluton C*, *Solganal B huileux*, *Synthaline B*, *Aceto-Testoviron*, *Testoviron T*, *Urosélectan B*, *Urosélectan B rétrogradé*, *Véramone*.
- Lab. de Phytothérapie du D<sup>r</sup> Cuguillière**, 14, r. Gambetta, Toulouse. — *Sérum végétal*, *Vin Pyrola*.
- Lab. R. Cuniassé**, 6, pl. des Ternes, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Arg-Eph*, *Hyol*.
- Lab. de la Curatine Brunet**, 23, r. des Écouffes, Paris. — *Curatine Brunet*.
- Lab. du Cyprovelinol**, 12, r. du Dragon, Paris. — *Cyprovelinol*, *Hypophédrine*.
- Lab. Dagonnot**, 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.). — *Artobyl*, *Charleben*, *Cinarascol*, *Coli-lactol*, *Ficairine*, *Neurophos*, *Uvécalcion*.
- Lab. Daguin**, 7, r. Bobillot, Saint-Maur (Seine). — *Choléolactol*, *Novolactol*, *Pneumostyl (A et B)*, *Purganol Daguin*, *Hypolactol (pilules, ampoules)*.
- Lab. Dalayeu**, 15, r. de Paris, Sannois (S.-et-O.). — *Sulfan*.
- Lab. Dalloz et Cie**, 13, bd de la Chapelle, Paris. — *Antalgol*, *Glycérophosphate*, *Gosiérine*, *Tridigestine*.
- Lab. Daney**, 134, cours de Verdun, Bordeaux. — *Cryptosote Néda*, *Tonique Néda*.
- Lab. A. Daniel Brunet**, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine. — *Biocéane*, *Biocrina*, *Cholergine*, *Coréne*, *Neurène*, *Novo-Brol*, *Olipan*, *Sydenhamine*, *Sérum de cheval Olivier*, *Synthagène*, *Sial Kosal*, *Ténifuge Kirn*.
- Prod. Dannoeh (M. Martineau, pharmacien)**, 64, r. des Tournelles, Paris. — *Chloridia*, *Laxia*, *Manganésia*.
- Établ. Darrasse**, 13, r. Pavée, Paris. — *Flétobiol*, *Peptifer du D<sup>r</sup> Jaillet*, *Tamar Indien Grillon*, *Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus*, *Choléine lactique*, *Eupnine Vernade*, *Lactobacilline*, *Magecarine*.
- Lab. Pharmaceutique Daufresne**, 44, r. Thiers, Le Havre. — *Clonazone*, *Hydroclonazone*, *Stéramine*, *Talcazone*, *Vaccin Provac's*.

Lab. E.-M. Dumas, 1, r. Méhul, Pantin. — Exorphyl, Kalmobilor, Lysoeure, Neurokabyrl, Tripeuxine.

Lab. Daupez, 37, r. des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — Baume Fuba, Gouttes Dépuratives Fuba, Gouttes Pectiques du Dr Albert, Gynium, Myoden, Nasogyne, Santaline Daupez, Sedoseptyl, Sirop Kérída, Sirop Pectiline.

Lab. Dausse, 4, r. Aubriot, Paris. — Ampoules Névrosthé-  
niques, Bardane stabilisée, Beladone Dausse, Bromure de Codéine, Camphodausse, Carbodausse, Collobiase d'Or, Collobiase de Sulphydrargyre, Entérodau-  
sages et Entérodauasse calcique, Fondant de soufre, Fondant Iodotannique, Gouttes Arsénosthéniques, Gouttes Phosphosthéniques, Granulé Salicylé Dausse, Hémogénol, Hespérédine, Hormodausse, Intraits Dausse, Moréthyl, Pavéron, Prostatidauasse, Salicaire Dausse, Sédo-Hypotenseur Dausse, Sérodauasse, Stric-  
toforme, Tisane hépatique Dausse.

Lab. du Dr Debat, 60, r. de Monceau, Paris. — Andro-  
sthénol, Cutigénol, Exentérol, Fer-Hépacrine, Filtrat Inosepta, Frenitain, Galagénol, Hépacrine, Inogyl, Inolacine, Inorénol, Inorhinyl (vaccin et pommade), Inosepta Auriculaire, Inosepta ophthalmique, Inosplénol, Inotyl, Inoxémol, Inoxy, Insevacins, Novotyl, Ovules Inséva, Pancrinol, Pommade Inosepta, Pommade et Suppositoires Inséva, Sédo-  
peptine, Sédotyl, Septicarbonate, Sikiplastine, Solution du Dr Debat, Toni-Pancrinol.

Lab. Dechâtre, 11, r. de Flandre, Paris (XIX<sup>e</sup>). — Calco-  
Cénil, Cérinil, Cérimoine.

Lab. Déchosal, 39, r. Roger-Salengro, Bondy (Seine). — Aldor formogène, Curamdis, Dermibaume, Magnésie Déchosal, Méthinol, Opo-Vacuoline, Vacuoline.

Lab. Deffarge, 188, cours de la Somme, Bordeaux. — Hémostérine irradiée, Nucléocardyl, Pavilla, Vita-  
crine.

Lab. Defresne, 19, r. Jacob, Paris. — Audigénine, Pancreastase Defresne.

Lab. Deglaude, 15, bd Pasteur, Paris. — Cardibaine, Digibaine, Théoxanthine, Spasmosédine.

Lab. Dehaussy, 50, r. Nationale, Lille. — Anti-Asthmine, Biocalcium, Capsules et sirop Préga, Créossine, Crédone, Crypthermol, Diastogène, Entéroblyl, Ephasma, Formobenzyl, Hermarsinol, Hermomuthol, Koumyl, Leucosérum, Phytolax, Sédoneurol, Sinrénaline, Thérachine.

Établ. Déjardin (A. Bontroux, pharmacien), 10, r. Parent-  
de-Rosan, Paris. — Extrait de malt français Déjar-  
din, Farine malée Déjardin, Malt français Déjardin, Mallosine Déjardin, Peptomaltone Déjardin A. B. C.

Lab. Michel-Delalande, 16, r. Henri-Regnault, Courbe-  
voie. — Baume Suella, Entéro-granulé, Ephédro-  
camphre, Esculéol, Hypiode, Neuroplasma, Neuro-  
plasma Messil, Pectocanfor, Polyminal, Reziode, Sirop au Solucamphre, Solucamphre, Solucamphre  
Associations, Sulfocadol.

Lab. Delambre, Issoudun (Indre). — Ioguine Delba.

Lab. du Delta, 84, r. Rochechouart, Paris. — Arcica, Calmaby, Calobil, Chlorat Dalis, Névrol Fréval, Onguent Fréval, Percalcine, Suppoglandines.

Lab. du Dr Demasles, 8, rue du Musée, Vienne (Isère). — Artériocrinol, Bilicrinol, Biogénol, Crinhémol, Meno-  
sédine, Myrtilline, Phospholée, Sédospasmosé.

Lab. Demoulin, 27, r. Brezin, Paris (XIV<sup>e</sup>). — Lenientol.

Lab. Denis, 20, r. du Laos, Paris. — Glottyl, Rhino-Glottyl.

Lab. Denisot, 19, r. de Fleurus, Paris (VI<sup>e</sup>). — Carbo-  
lactyl simple, Carbocactyl bilité, Hémosédine, Iodo-  
sédine, Opophos.

Lab. Deodax, R. Renaud, Anould (Vosges). — Sinapol, Spasmalgot, Thermalgot.

Lab. Depruneaux, 23, r. du Parc, Fontenay-sous-Bois. — Chéralys comprimés, Diemenal, Dienol, Dragées Elkin, Gouttes Antigél, Phosphoneurol, Soderséine.

Lab. de la Dermofagine (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-  
Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — Dermofagine, Dys-  
pepsia, Dyuril, Holocalcine, Raiforyl.

Lab. Dernis, 12, r. Lamartine, Paris. — Ektogan Bocquil-  
lon (Poudre, Pommade, Pâte, Mèches, Gazes, Ovules, Ehto-Plaste), Hopogan Bocquillon (Cachets, Pilules glutinisées), Tot'Olea.

Lab. Derol, 34, r. Pergolèse, Paris. — Bolène, Grippalgine, Lipocrynyl, Quinimax, Rectoseptal simple, Recto-  
septal sulfamidé, Vytol, Sedovytol.

Lab. du Désartyl, 8, av. Walkanaer, Nice. — Désartyl, Bromoderme.

Lab. Deschiens, 9, r. Paul-Baudry, Paris. — Hémoglobine Deschiens, Hépathémo Deschiens, Holos, Spectrol.

Lab. Descouraux et fils, 52, bd du Temple, Paris. — Chloro-Magnésion, Dragéal (ex-Dragées Lumeval), Fer-Andrine Vitalis, Fer-Ovarine Vitalis, Tensoryl.

Lab. Dezo, 7, r. de la République, Puteaux (Seine). — Arguseptine, Biovital, Bismokhol, Calcipaine, Car-  
diotensyl, Citrilux, Collunovar, Dexiade, Dexogyne, Dexoplasma, Laximanne, Neurovital, Phénorquine, Thyméphadrine, Trophocalcine, Uroquino.

Lab. du Dissoléról, 26, r. de Norvins, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — Clangoryl, Diascléról, Flostris, Ovécalcion.

- Lab. **Didry**, Janville (E.-et-L.). — *Antiphymique Vadam*, *Synergyl*, *Thalassotonine Vadam*, *Thalassotonine Infantile*.
- Lab. **de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastrine*.
- Lab. **Disalgyl**, 62, r. Beaubourg, Paris (III<sup>e</sup>). — *Antalex*, *Disalgyl*, *Fluxex*.
- Lab. **Doladille**, Z. O. : Noyers-sur-Cher (L.-et-Ch.) ; Z. N. O. : Saint-Aignan-sur-Cher (L.-et-Ch.). — *Bronchopneumol*, *Histochrome*, *Histocollyre*, *Histomose* (Concentration et Injectable).
- Lab. **Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloidine*, *Cortone*, *Crinopantrine*, *Curiodé*, *Higadose*, *Hormobitline*, *Hormoléol*, *Hypno-Nervins*, *Mésosforme*, *Morrhualène Gauthier*, *Hémo-tonique Robert*, *Lithiosine*, *Stomophile*.
- Lab. **Dordin**, Harnes (P.-de-C.). — *Algosédine*, *Aspéca* *Kératoplastol*, *Rhinadrargol*, *Urby*.
- Lab. **de la Dosurine**, 16, r. Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (Trousses).
- Lab. **Douetteau frères**, 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Ficabyl*, *Neurovarol*, *Organésium*.
- Lab. **Drapier**, Rethel (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Dermo-Reipar*, *Intra-Reipar*, *Ostéopeptine*.
- Lab. **Drayer-Dufer**, Nogent-sur-Marne. — *Anurique Duplex*, *Iodophosfer Duplex*.
- Lab. **Drouet et Plet**, 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.). — *Anexol*, C. 40, *Eliptol*, *Lénibar* (poudre et granulé), *Magnésie hydratée*, *Néo-Physio*, *Oxyléine* (adultes et enfants), *Oxabiase*, *Phossoforme*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Salysérum*.
- Sté Française du Lait sec Dryco**, 5, r. St-Roch, Paris. — *Dryco* (lait sec).
- Lab. **Dubœuf**, 4, r. Raymond-Poincaré, Nancy. — *Francadra*, *Inhaltyptol*, *Scopandine*, *Surbaryte*, *Pancodine*.
- Lab. **Dubois**, 52, r. Montesquieu, Asnières. — *Campho-Spartéine*, *Camphryl*, *Cardialgine*, *Codarsyl*, *Collo-Iode*, *Iodo-tensyl*, *Oléo-Iode*, *Uroquinase*.
- Lab. **Duc**, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Cédrél Bel*, *Coquelicônes*, *Dragécalcion* (dragées), *Dragécalcion* (granulé).
- Lab. **Ducatte**, 10, r. Barbette, Paris. — *Entéro-antigènes Danyz*.
- Lab. **Ducatte**, 191, r. Saint-Honoré, Paris. — *Biosulfol*, *Cérébron*, *Cuprase*, *Cytoplasmine*, *Entéro-Antigènes*, *Gatarséan*, *Paraloxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. **Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Pilules de Boldo-Biftine Ducloy*, *Bradygastrine*, *Lactogélose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachygastrine*.

- Lab. **Henri Dufour**, 40, r. des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol*, *Codéphryl*, *Dymozyl*, *Edistol*.
- Lab. **du D<sup>r</sup> E. Duhourcau**, Legoux frères, pharmaciens, 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Gastricine* du D<sup>r</sup> E. Duhourcau, *Tœnifuge français* du D<sup>r</sup> E. Duhourcau, *Salvenase Legoux*.
- Lab. **Duleis**, D<sup>r</sup> Ferry, place Clichy, Monte-Carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés*, *Argolène*, *Cadmiol zinc*, *Cuprinol*, *Iodo-calcique*, *Iodo-Rubidium*, *Ichtyol zinc*, *Myosine forte et faible*, *Mydrasine*, *Novopline oxyde orangé* de Hg, *Ophthalamoforme*, *Tubes Dulcis*.
- Lab. **Dumesnil**, 10, r. du Plâtre, Paris. — *Crémo-plastol Dumesnil*, *Dacolan*, *Dermo-plastol Dumesnil*, *Poudre Pastorilos*, *Sacnel*, *Solu-Plastol Dumesnil*, *Théobromose Dumesnil*, *Zébo-Plastol Dumesnil*.
- Lab. **Durant-Monge**, 151, av. d'Orléans, Antony (Seine). — *Cystitol*, *Gouttes Abbé Grégoire*.
- Ph<sup>ie</sup> **E. Duriez**, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chlora bromuré Dubois*, *Élixir Ducro*, *Quinoidine Duriez*.
- Lab. **A. Duteil**, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Élixir Hymel*, *Quinorhène Duteil*, *Spasalgique Maréchal*, *Suppositoires Hymel*.
- Lab. **Echelman**, 26, r. des Moines, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Camphocaltyptol injectable*, *Eupnol* (poudre), *Eupnophédrol*, *Osmoléine*, *Stadhrine* (ex-Stovoléine), *Suppositoires de Camphocaltyptol et Suppositoires de Camphocaltyptol-Quinine*.
- Lab. **de l'Elaiadine**, 1, r. de Verdun, Montpellier. — *Elaiadine*.
- Lab. **de l'Élocine**, 51, r. du Ranelagh, Paris. — V. A. V. (vaccin Vaudremer).
- Lab. **de l'Embryex**, 162, bd du Montparnasse, Paris. — *Embryex*.
- Lab. **d'Endocrinologie Appliquée**, 26, av. de l'Observatoire, Paris. — *Adrénaline Byla*, *Amino-sel*, *Aminine*, *Antiélobine*, *Di-Iodotyrosine Byla*, *Di-bromotyrosine Byla*, *Énergétènes Byla*, *Galactogène Byla*, *Gélopeptone*, *Gonadormone*, *Hémosérol*, *Héparmone*, *Hépat-Musculosine*, *Hormoduodine*, *Hormostlavéine*, *Hormones Hypophysaires Byla*, *Hormovarine*, *Insu-*



line Byla, Irrastérine, Lactormone, Léiormone, Musculosine Byla, Neuormone, Neurotrophol, Ocytormone, Panvioral, Paralactine, Parathyron, Peptone Iodée Byla, Pellétérine Tanret, Peptone Byla, Phylaclone, Phytosphosphine, Phylogénine, Pitulobine, Somatormone, Splénamine, Splénarmone, Splényl, Surrasthénine, Thyraloxine, Thyromone, Thyroxine Byla, Vagotonine, Vitadone, Vitamine B, Byla, Vitamine B, Byla, Vitamine C Byla, Vitamine E Byla, Vitamine P-P Byla, Vitaminol.

Lab. de l'Endopancrine, 48, r. de la Procession, Paris (XV<sup>e</sup>). — Endopancrine, Endothymusine, Holo-splénine, Hologarine, Insuline (voir Endopancrine), Insuline Phylzo (poudre et pommade), Mucofoie, Perglandènes (ovarien, hépatique, orchitique), Permyase, Poudre et Pommade d'Insuline Phylzo.

Lab. Éon, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — Algéon, Iscautoxène, Pommade et suppos Éon, Érysulfure Éon, Psoréal, Psorène, Psoréon.

Lab. de l'Éranol, 45, r. de l'Échiquier, Paris. — Éranol.

Lab. de l'Érythéma, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine). — Androvac, Androvules, Érythéma.

Spécialités Escouflaire, Pharmacie Ternisien, Baisieux (Nord). — Cigarettes anti-asthmatiques Escouflaire n<sup>os</sup> 1 et 2, Poudres anti-asthmatiques Escouflaire n<sup>os</sup> 1 et 2.

Lab. Étienne, 19, av. Secrétan, Paris. — Asthmédrine, Bifidigène, Dimitensyl, Potion des Cordeliers de Séz, Tisane R. P. La Montagne.

Lab. général d'Études biologiques, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — Doloma, Énophos, Protidyne dragées.

Lab. d'Études et de Réalisations pharmaceutiques de Paris « ETRÉFA » (R. Gouin et J. Coulet, pharmaciens, H. Luzuy, docteur en pharmacie), 5 bis, rue de Berri, Paris (VIII<sup>e</sup>). Ag<sup>e</sup> en Z. L. : Le Rayol (Var). — Avantol, Charcolina, Corsivéra, Crino-marine, Cuprémone F, Cuprémone M, Cuprémone simple, Diapédina, Germidex, Grog médical, Demonclo, Lambarène, Neuroféryl, Pakufely, Parilina-Zoro, Prométhine, San-Colina, Sulfomaleyl.

Lab. de l'Eupulmol, Chavatte, pharmacien, 88, r. de France, Roubaix. — Eupulmol.

Lab. de l'Eusedyl, 32, rue des Vallées, Colombes (Seine). — Eusedyl.

Lab. Evine, 15, bd des Batignolles, Paris (VIII<sup>e</sup>). — Baume Pélevine, Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine.

Lab. de la Fabrique Internationale d'Objets de Pansements, 5, Grande-Rue, Montpellier. — Catguis et crins de Florence Astruc, Coton Cataplasme Astruc, « L'Accouchement aseptique Astruc », Lanières aseptiques Astruc, Olodraïns, Pansements aseptiques Astruc, Pansements Nemausa, Rhino-mèches grasses, Tulle gras Nemausa.

Fabrique Vendéenne de Produits Pharmaceutiques, 10, rue Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée). — Angioli, Mucoflogose, Néphractive.

Lab. Fagard, Lons-le-Saunier (Jura). — Antiasthme Bengalais, Bain Fagard Sulfador, Cigarettes Schulzé-Bengalais, Élatine Bouin.

Lab. Falvy, 40, r. des Acacias, Paris. — Adrénoleine, Anxoli, Broséyl, Chlorinol (huile, capsules), Cirrose, Édicamphre, Ektal, Épholéine, Fermenteryl, Gastropeptyl, Hemopectal, Holuryl, Pulmositoires, Rhinadrol, Synase, Trynol.

Lab. Famel, 16-22, r. des Orteaux, Paris (XX<sup>e</sup>). — Optrax (Bain oculaire), Sirop Famel.

Lab. du Fantol, 22, rue de l'Arsenal, Angoulême (Charente). — Fantol, Hormocalcium.

Lab. Faure, 85, bd de la Villette, Paris. — Citropeptol, Colizyl, Gouttes Glycidines, Hexacarbène, Hypovisol, Manacine, Neuropol, Sels Intar.

Lab. Faure et Dussuel, 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — Élixir Bonjean, Eupharine du D<sup>r</sup> Chaboud, Magnelax, Sinaplasme.

Lab. Faure et Lagente, à Montargis (Loiret). — Citrocholine, Kalmidor, Mictoseda, Mictosulfa.

Produits diététiques Favrichon, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). — Céréales BB, Crèmes et Farines d'orge, maïs, riz, avoine et flocons d'avoine ; grains grillés ; Phosphogène Favrichon.

Lab. du Féminadène, 1 bis, r. Carcel, Paris (XV<sup>e</sup>). — Colisel (granulé, poudre), Laxatif Coprex, Féminadène (gouttes et dragées), Polypirine (cachets ou comprimés), Viradène (dragées).

Lab. Ferecoq, La Varenne-St-Maur (Seine). — Antisuce, Arthrident, Hémoalcine avec et sans strychnine.

Lab. Ferlux, Albi (Tarn). — Tubes Ferlux.

Lab. G. Fermé, 22, r. de Turin, Paris. — Arsénamide, Muthanol, Néolyse, Psotanol, Solutanol, Staphylo-ethanol, Supamide, Tiradol, Viscosérum.

Ferme de Lafaye, Marlihes (Loire). — Babeurre léger Lafaye, Babeurre soupe Lafaye, Babeurre gras Lafaye, Lait naturels homogénéisés.

**Lab. du D<sup>r</sup> H. Ferré, pharmacien, 15, r. Valentin-Haüy, Paris.** — Broncho du D<sup>r</sup> H. Ferré, Cupressiade, Dismina Faurot, Entéropectine du D<sup>r</sup> Ferré, Immuncorps, Sirop Lamouroux, Tonique du D<sup>r</sup> Ferré, Uroboldine.

**Lab. E. Ferré, J. Leroy, pharmaciens, 142, bd Saint-Germain, Paris.** — Iodures L. Foucher, Litharsyne, Pâtes et Sirop Pectoral Édulcor, Poudre Rocher laxative, Sucre Édulcor, Tablettes Vych'Édulcor, Tonique Garnier.

**Lab. du D<sup>r</sup> Ferry, place Clichy, Monte-Carlo.** — Tubes Dulcis.

**Pharmacie du D<sup>r</sup> Fialip, 28, av. de La Motte-Picquet, Paris.** — Oxy-injecteur au D<sup>r</sup> Fialip.

**Lab. Fides (M. Vouzellaud), 14, r. de la Comète, Paris.** — Balsamorhinol, Inhalantyl.

**Lab. Fisch et Cie, Vibraye (Sarthe), et 104, fg Poissonnière, Paris.** — Baumolacipatine, Cataplasmes de Fango-Fisch, Cellona, Chlormagnésium Fisch, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Émpyrol, Fango Fisch, Lacipatine, Optiplaste, Poudre ORL, Prévaidine, Recytèle, Révulsif Fisch (anc. Procipha), Sulfocrème Liléss, Thorubrol.

**Lab. Flahaut, 74, r. Monge, Paris.** — Acépiline, Anadiposine, Laxoil, Sulfodermol, Terpène granulée Baron.

**Lab. Fluxine, Produits Bonthoux (Edm. Joët, D<sup>r</sup> en pharmacie), 42, r. Pasteur, Villefranche (Rhône).** — Evonyl, Fluxine, Formule Jacquemaire n° 60, Verrulyse.

**Lab. Roger Fosse, 86, r. du Pas-St-Georges, Bordeaux.** — Graphitil, Livartil, Lotuséline.

**Lab. Fosset, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.).** — Ago-Sels, Suppositoires Pelvinal, Sympathoriane, Vagoriane, Viscovéine.

**Lab. Fouard, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).** — Les Granions, Spasthème.

**Lab. H. Foucher, 22, r. Lakanal, Paris.** — Coprase, Élixir de Larsa, Entérohépatine, Ésératropine, Frénal, Gastérinase, Muxyl, Neuricure, Ortho-Stomine.

**Prod. Pharm. A. Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).** — Agobyl, Benzocarbène, Biodynol, Glycoccure, Maïas, Néobiline, Pansarcine, Pectoral Fouchère, Révulsif Fouchère.

**Lab. Fougerat, 44, r. Chaptal, Levallois (Seine).** — Gouttes Rami, Pâte Rami, Poudre Jifa, Sirop Rami, Vérachol.

**Lab. Foulon, 12, bd St-Martin, Paris.** — Colhépithyl, Cuscutine, Lutéovar, Lysarthroi, Valéramyl.

**Lab. Fournier et Cie, 18, rue de Jouvence, Dijon.** — Carbezamine, Cressonnyl, Éphéla, Éruphyl, Génoosséine, Impéticure, Opo-Jouvence, Pecto-Cherry, Thiolyptine, Vermicure Pingeon.

**Lab. Fournier frères, 7, r. Biscornet, Paris.** — Bileyl, Biolactyl, Crino-Menstryl, Crino-Stényl, Crino-Tensyl, Hormuler, Opothérapie Fournier, Ovaire Fournier, Phycrocrisine, Sanaféine, Splénocrisines, Vaccins Bruschetini, Vasolaxine, Vit-E-Lutéine.

**Lab. Fourton, D<sup>r</sup> en Pharmacie, 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.** — Dyspné-Inhal, Élixir Daumy, Pastilles Pepsa.

**Lab. Fraisse, père et fils, 8, r. Jasmin, Paris.** — Ampoules Ferrugineuses Fraisse, Ampoules Névrosthéniques Fraisse, Ampoules Anti-Paludiques Fraisse, Ampoules Scléro-Hémorroïdiques, Ampoules Sclérosantes, Baume Camphro-Solylé, Calcium injectable Fraisse, Camphro-Salyl Fraisse, Cupro-Nickel intraveineux Fraisse, Cyanure isotonique Fraisse, Fer intraveineux Fraisse, Gouttes Névrosthéniques Fraisse, Gouttes Hypolensives Fraisse, Injection désensibilisante Fraisse, Injection immunisante Fraisse, Bismuth insoluble injectable.

**Lab. Français de Chimiothérapie, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>).** — Benzo-Gynœstryl, Benzo-Gynœstryl-5, Bivalol, Collubiazol, Gynœstryl, Ecto-Gynœstryl, Isonal, K-Thrombyl, Lutazol, Lutogy, Phytogyl, Rubiaderm, Rubiazol, Sédo-gynœstryl, Solantyl, Stérandryl, Ecto-Stérandryl, Acéto-Stérandryl, Stérogyl, Stérogyl 15, Syncortyl.

**Lab. Français Gastro-Entérologie, 71, rue Sainte-Anne, Paris.** — Formicalcine, Hépatoplasma, Mangafine, Myonutrose, Néosplépine, Tot'Hépatine.

**Lab. Français de Produits chimiques et pharmaceutiques, S. Curie, pharmacien, 40, r. François-I<sup>er</sup>, Paris (VII<sup>e</sup>).** — Granulés Vita-D., huile Vita-D., Hydrar-41, Lacto-Sucre, Pastilles Vita-BCD, Sel Vita-D phosphaté, Sucre-Vita D.

**Lab. du D<sup>r</sup> Fraysse, 21, r. de Neuilly, Nanterre.** — Foltilobine, Hépasthényl, Hépatoplasmine, Opothérapie associée du D<sup>r</sup> Fraysse (Thyrodose, Neurodose, Splénodose, Placentodose), Revitalose.

**Lab. Freyssinge, 6, r. Abel, Paris.** — Capsules Dartois, Céthocal, Névrosthénine, Chloramine, Polyphorine, Quassine Frémint, Salicol Dusaule.

**Lab. H. Frilley, 94, bd. Lefebvre, Paris (XV<sup>e</sup>).** — Iodiformine, Mucigrains, Novospasmyl.

**Lab. du Fumigalène, R. Charbonnel, 7, r. du Marché, Blaye (Gironde).** — Fumigalène.

**Établissements Fumouze (H. Glover et Cie), 78, faub. St-Denis, Paris.** — *Baume Lartigol, Bébé-Poudre* composée *Delabarre, Cigarettes Barral, Crayons utérins Chaumel, Globules Fumouze, Granstimul, Ovules Chaumel, Poudre Chaumel, Sirop Berthé, Sirop Delabarre, Sirop Cassidor, Suppositoires Chaumel.*

**Lab. J. Fumouze, 156, bd Ney, Paris (XVIII<sup>e</sup>).** — *Pelvicoles, Plaxine, Styptogénine, Sulfocure.*

**Lab. Gabail, 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).** — *Anti-Kohyltine, Elixir valerobromuré, Gluphosol, Iodoscilline, Kalmangor, Néosaliodé, Valérianate Gabail désodorisé, Urogénine.*

**Lab. Gadreau, Savigny-sur-Orge.** — *Sedangor.*

**Lab. Gaillard (L. E. V. A.), 26, r. Péterelle, Paris (IX<sup>e</sup>).** — *Argincolor, Lénifédrine, Léniforme.*

**Lab. Gaizard, 95, r. Michelet, Alger.** — *Asthma, Carbo-septyl, Ixide A et B, Opunsine (Gouttes et Comprimés), Opunsine « Sahurante » poudre, Lenit-Gum, Phloxiode.*

**Lab. Galbrun, 10 et 12, r. Guynemer, Saint-Mandé (Seine).** — *Aristargol, Citronema, Iodolose Galbrun, Prosthénase Galbrun.*

**Lab. du D<sup>r</sup> Galimard, 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.** Tél. : Versailles 26-46. — *Curogène, Mucobismuthine, Vitadiase.*

**Lab. du D<sup>r</sup> Jacques Galimard, 68, r. de la Paroisse, Versailles.** — *Extrait de Myrtilles du D<sup>r</sup> J. Galimard.*

**Lab. R. Gallier, 1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris.** — *Ardemapectine Gallier, Arkébios, Basehowine, Daboïne, Gastro-Entéro-Pectine Gallier, Kidargol, Kidoline, Kidophédrine, Tot Cobra.*

**Établ. Gallina, 4, r. Candolle, Paris.** — *Huile Gallina, Iodentérol.*

**Lab. Gallo, docteur en pharmacie, Aurillac.** — *Urocédrol.*

**Lab. du Gastrhema, 17, av. de Villiers, Paris (XVII<sup>e</sup>).** — *Frénasma, Gastrhema, Néosulfa.*

**Lab. de la Gastrocitrine, Luc-sur-Orbieu (Aude).** — *Gastrocitrine.*

**Lab. Gatel-Léger, 35-37, r. du Maréchal-Pétain, Laval (Mayenne).** — *Alcalisalyl.*

**Lab. Gavin, Vimoutiers.** — *Sirop Lecœur.*

**Lab. Gelia, 16, r. St-Yon, La Rochelle.** — *Geliderm.*

**Lab. des Gels Médicaux, 8, quai du Châtelet, Orléans.** — *Gels gastriques et intestinaux Beaufils.*

**Lab. Genevet, 29, r. des Marchands, Avignon.** — *Kinechol.*

**Lab. Génévrier, 45, r. du Marché, Neuilly-sur-Seine.** — *Adolan, Alepsal, Bis-Hyd, Boues radioactives de Pisyran-les-Bains (Tchécoslovaquie), Concentré végétal Figadol (Vin et Capsules du D<sup>r</sup> Vivien), Neurinase, Panstomase, Tétra-magnésium.*

**Lab. Géraudel, 3, r. Watteau, Courbevoie.** — *Drag-Bil.*

**Lab. Gerda, 10, r. Jacquard, Lyon (Rhône).** — *Antidiabétique Requis, Arvensyl, Calsédine, Euphrénine Bastia, Guilose, Hémoantitoxine Sofos, Sulfarsiodé, Virmonal, Diavilase, Vitamine P-P Gerda (Médecine), Sodolactine, Tablette Perroud.*

**Établ. Germalpe, Laragne (H.-A.) ; dépôt central : 44, r. Blanche, Paris.** — *Germalpe.*

**Lab. du Germidor, av. Font-Laigière, Grasse (Alpes-Maritimes).** — *Germidor, Huile de germes de blé.*

**Lab. Gev, 21, r. Mouton-Duvernét, Paris (XIV<sup>e</sup>).** — *Isogev, Phlébogev (ex-Argurine).*

**Lab. Gewa, 32, r. Assalit, Nice.** — *Eductyl, Léthalgol.*

**Lab. Girel, 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris (IX<sup>e</sup>).** — *Hémédonine, Vulnamine.*

**Lab. du Glefina, 348, r. Saint-Honoré, Paris.** — *Dermalibut, Gléfina, Lasal, Novalibut (Gouttes et Pilules) (ex-Halibut), Novalibut Local (Localibut).*

**Lab. E. et G. Glomaud, 12, bd Saint-Michel, Paris (VI<sup>e</sup>).** — *Neurogastrine.*

**Lab. des Gloxines, 6 bis, r. Campagne-Première, Paris.** — *Gloxines, Gloxines Polyvalentes.*

**Lab. Gmet, r. du Faubourg-Montmartre, Paris (D<sup>r</sup> A. Lorot, pharmacien).** — *Antibé, Boldo Gmet, Composé Gmet, Condurango Gmet, Cratægus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrait Hamyd, Frêne Gmet, Fucus Gmet, Gui Gmet, Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Olivase, Piscidia Gmet, Quindynol, Quinquina Gmet, Sauge Gmet, Tilleul Gmet, Ulmaire Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet.*

**Lab. Gobey, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>).** — *Dipégyt, Laxatif Gobey, Opodermyl, Pectoral Gobey, Pyroformine, Sédatif Gobey, Uroformine.*

**Lab. Godeau, 73, r. Dutot, Paris.** — *Androstéone, Difolistérol, Gestormone, Néocortine.*

**Lab. P. Godfrin, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne.** — *Limonade Godfrin, Elixir Godfrin.*

**Lab. du Gomenol, 48, r. des Petites-Écuries, Paris.** — *Gomenol, Gomenolé et tous produits au Gomenol.*

**Prod. Gonnou, 14, r. Victor-Hugo, Lyon.** — *Antidiabétique Monaxon, Cacoçyle Gonnou, Créosote soluble Vacheron, Eupeptique Monaxon, Irénine Gonnou, Kola Monaxon, Lecithine Vacheron, Polybromure*

Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vacheron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gatacol, Suppositoires Gonnon, Terpene Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon.

Lab. Goupil, 171, av. Aristide-Briand, Cachan (Seine). — Lao-Dol cachets et embrocation, Pommade Zylor.

Établ. Goy, 23, rue Beautreillis, Paris. — Calcisan Cachets, Gouttes Magalo, Comprimés et Gouttes Notal, Digestif Goy, Globules Chomet, Granulés de Buxtol, Hémostatique Goy, Inhalation Goy, Narizol, Notaline, Oxycarbine, Panol, Pasticaine, Pastilles M. B. C., Pimpinol, Primulysse, Reclusol, Sahurateur Chomet, Sédalgot, Thiocosyl, Urosidal, Verrumag.

Lab. du Granuchol, 42, r. de Paris, Pantin (Seine). — Granuchol.

Lab. René de Grauwe, 19, r. du Bailli, La Plaine-St-Denis. — Élixir Duchamp, Fer Bravais, etc.

Lab. Grémy, 14, r. de Clichy, Paris. — Antéparsine Grémy, Diasténine, Épidosine Grémy, Eutensyl Grémy, Follestrine Grémy, Hépatocalcion Grémy, Immaniderm Grémy, Immuniperos Grémy, Immuniphages Grémy, Immunizols Grémy, Micranyl Grémy, Ocréine Grémy, Thionhydrol Grémy, Thyréline Grémy, Thyrocréine Grémy.

Lab. Grias, 47, r. Féray, Corbeil (S.-et-O.). — Verticurine.  
Lab. Grignon, 2, r. Duphot, Paris. — Éniode Lefebvre Valériane Grignon, Pâte de Terpene Guédet.

Lab. Grimaud, 51, r. François-1<sup>er</sup>, Paris. — Apiofine Chapoteaut, Cardiosithénine, Cigarettes de Grimaud, Cytobaume, Delbiase, Delbosel, Farine maltée Vial, Morrhuol Chapoteaut, Ortholaxine, Pharynxol, Phonédrine, Polyglobatine Grimaud, Quinine Pelletier, Santal Midy, Sédoprostyl, Sirop Grimaud (pectoral), Sirop Lagasse, Sirop phénique Vial, Sirop de Rairfort iodé de Grimaud, Vin et poudre de Peptone de Chapoteaut, Vin et sirop de Dusart.

Lab. Grorichard, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — Comitilol, Magnésium Grorichard, Métrostyptil Grorichard.

Lab. Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — Diurocalcine Gros, Diurocalcine iodurée, Dragées Hépatorénales Gros, Hépafluol, Hergénol, Puerol, Sanomint, Sédotonine, Spasmonal.

Lab. Grysa, 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe). — Cinéyl, Cuprobalt, Sylcase.

Lab. A. Guerbet et Cie, 22, r. du Landy, Saint-Ouen. — Lipidol Lafay, Lipidol F, Ténébryl.

Lab. Guéret, pharmacien, 89, r. Martre, Clichy. — Agorénal, Euplastyl, Jecopeptol, Mandocarbène, Néocrinol, Nohepar, Sédontal, Sicovaire, Traphéine.

Lab. P. Guérin, 86, r. de la Réunion, Paris (XX<sup>e</sup>). — Algocurine, Ferrocalcine, Néostomol, Vasculol.

Lab. R. et M. Guignard, 38, r. du Louvre, Paris. — Asthamatyl, Coqueluchyl, Kola Sthenyl, Phosphigem, Phyto Kola, Spasmoforine.

Lab. André Guillaumin, 13, r. du Cherche-Midi, Paris. — Acésine, Comprimés Guillaumin, Cyanargyre, Novargyre, Théosalvose, Vanadarsine.

Lab. Guillaumin et Gérard, 12, r. Charles-V, Paris. — Élixir eupeptique Tisy, Prodynase, Quinotane Valguy, Vin de Baudon antiminio-phosphaté, Vitène.

Lab. de la Guimelinde, Ancenis (L.-Inf.). — Guimelinde.

Lab. Pharm. de Guyenne, Pont-de-la-Maye (Gironde). — Algicure, Fluxoeine, Grippalgose, Hépadrainol, Hépagastrine, Pectogène, Tensosédyl, Tonibiase.

Lab. Paul Hardy, 22, r. François-Bonvin, Paris. — Cèdre bleu, Gastruth, Magnésium Hardy, Oliricyl, Pancarbo, Pulmonaire du D<sup>r</sup> Paul Bourgogne, Solution Tisch.

Lab. Hémorex, 9, r. Chaptal, Levallois-Perret. — Exubyle, Hémorex.

Lab. de l'Hépatomagnésion, 30, r. de Créqui, Lyon. — Carborexyl, Hépatomagnésion.

Lab. Herbel, 3, r. des Reculettes, Paris (XIII<sup>e</sup>). — Bande Mérinos-Bébé, Bio-Tilane-Prima, Crêpe Eglanos, Multiplast, Plasmoprima, Prima-Furoncles, Prima-plast, Prima-Stéryl, Primalex, Sticplast.

Prod. Heudebert, 85, r. St-Germain, Nanterre (Seine). — Pains et spécialités de régime, farines pour enfants, Café décaféiné, Féculysse, Nergine.

Lab. Louis Hinglais, Épernay (Marne). — Capsules Kuchner, Chenanthol.

Lab. Hinglais, 30, r. Miromesnil, Paris. — Follicormone buccale Hinglais.

Lab. Hocquette, 12, r. Notre-Dame-de-Nazareth, Paris. — Acobella, Anésolyne, Bromospasme, Carboseptol, Crésolargol, Désintoxine, Drosédine, Embryhormone, Fenocalcium, Fornicléine, Guisclérine, Guétoinos, Rangol, Renavatl, Sérobiol, Sympax, Splénomanganol, Sérum neuropsychique, Séropils Hoc, Urochlo, Valédyl, Vivargyre.

Lab. F. Hoffmann-La Roche et Cie, 10, r. Crillon, Paris (IV<sup>e</sup>). — (Voir : Produits « Roche ».)

- Lab. Houdé, 9, r. Dieu, Paris.** — *Aconitine Houdé, Adonidine Houdé, Aloïne Houdé, Apiotine Houdé, Atropine Houdé, Boldine Houdé, Caféine Houdé granulée, Cinquésine Houdé, Codéthylène Houdé, Colchicine Houdé, Ephédrine Houdé, Esérine Houdé, Gelsémine Houdé, Granules Houdé (tous alcaloïdes et glucosides), Gynimbine Houdé (voir Yohimbine), Hamaméline Houdé, Héline Houdé, Hydrastine Houdé, Hyoscine Houdé, Hyoscyamine Houdé, Papavérine Houdé, Pastilles Houdé à la cocaïne, Phosphure de zinc Houdé, Quassine Houdé, Scopolamine Houdé, Sparteïne Houdé, Strophantine Houdé, Strychnine Houdé, Yohimbine Houdé.*
- Lab. Jean Humbert, 1 bis, r. Carcel, Paris (XV<sup>e</sup>).** — *Entériode.*
- Lab. G.-Jean Huyghe, 4, bd de Port-Royal, Paris (V<sup>e</sup>).** — *Chocynol, Pommade Asciqué, Kaomag, Veinophos, Sarcosémol, Terpopneumol, Bronchopuerol, Choléciclinol.*
- Cie de l'Hydroxydase, 10, r. Blanche, Paris.** — *Hydroxydase.*
- Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, r. Bokanowski, Asnières (Seine).** — *Calcomagnésie, Cophed (Sirop), Dysthène, Félosine, Gynésodine, Myothermine, Nuciphos, Phocitra, Stopral.*
- Lab. Immunos, 16, av. George-Sand, Nice (A.-M.).** — *Cinol, Digicardine, Digicardine quininée, Ferments immuno-lactiques, Immuno-sérum marin, Immuno-vaccin antirhumatismal, Immuno-vaccin bronchopulmonaire, Immuno-vaccin antipyrorrhéique, Ovidil, S. I. V. A.*
- Lab. Inava (décentralisé à Limoges [Hte-V.]), 77, av. des Ruchoux; dépôt : 23, r. des Moines, Paris.** — *Antityphique « TP », Bouillon Antidysentérique « Db », Dientyl Anticolibacillaire, Ovules-Vaccins, Pâte dentaire immunisante, Pyodil Inava « B », Pyodarsénol Gelée, Pyogénol Gelée, Rhino-Vaccin Gelée, Vaccins Injectables « A » Antibrônchitique, « G » Antigonococcique, « P » Antipyogène, « D » Antistaphylococcique, « M » Gynécologique.*
- Lab. Ingé, 14, r. Maublan, Paris (XV<sup>e</sup>).** — *Amphotonyl, Ethyl-Pneumine, Iodochrome, Hydatoinal.*
- Lab. de l'Inhalo-Bol, 32, r. de l'Ouest, Paris.** — *Inhalo-Bol, Inhalo-Past, Inhalo-Sel.*
- Innothéra (Lab. Chantereau), Arcueil (Seine).** — *Mucinum, Sympathyl, Tot Hamélas, Tot Héma.*
- Lab. des Inocrinines, D<sup>r</sup> Furst, 4, av. du Maréchal-Pétain, Le Bouscat (Gironde).** — *Inocrinines, Tamarine.*

**Institut de Biologie appliquée (C. Cépède), 57-59-60, r. Mathurin-Régnier, Paris (XV<sup>e</sup>).** — *Panostyl, Vaccinothérapie aloxique Cépède, tous examens de laboratoire.*

**Institut Biologique Mérieux, 17, r. Bourgelat, Lyon.** — *Tuberculines.*

**Institut Pasteur, 28, r. du Docteur-Roux, Paris.** — *Sérums, Vaccins.*

**Institut de Sérothérapie Hémopoïétique, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI<sup>e</sup>).** — *Damicol, Gravidostyl, Hémostyl, Hormone Gonadotrope, Sérum polyvalent de Lelcinche et Vallée, Suiséryl, Tréphonyl.*

**Lab. des Iodures Cros, 202 bis, r. de Paris, Clamart (Seine).** — *Combretine, Cratægus Bocquillon-Limousin, Huiles Duret, Iodures Cros, Ténifuge Limousin.*

**Lab. Iscovesco, 8, passage Morel, Montrouge (Seine).** — *Adrénol total, Adrénol Cortex, Androcrinol, Androgouttes, Bis-Hep, Cardiacrinol, Cérébrocrinol, Gynocrinol, Gyno-Gouttes, Gynohypophysol, Gynolutol, Hépatocrinol, Novocortex, Opopéol, Opothérapie Iscovesco, Splénoocrinol, Yo-Gymène.*

**Lab. Ivago, 17, r. de Provence, Paris.** — *Vaccins intra-dermiques, Vaccins Ivago, Gelées-vaccins Ivago.*

**Établ. Jacquemaire, Villefranche (Rhône).** — *Blédine, Blécao, Diases, Galactogil, Mallogil, Peptogil.*

**Lab. Jammes, 86, r. Michel-Ange, Paris.** — *Boldocrinol, Cacodyline Jammes, Iodinjectol Jammes, Magnésio-Cacodyline, Néophage.*

**Lab. Jammes de Golbery, 102 bis, r. de l'Aigle, La Garenne-Colombes (Seine).** — *Gossypiol Maurin, Hormocrinol F et M.*

**Lab. Jatel, 60, Chaussée d'Antin, Paris.** — *Rhino-Sulforgan.*

**Lab. Jauffret, 181, av. Victor-Hugo, Clamart (Seine).** — *Impetigol, Néobiol, Iodocuprol.*

**Lab. de la Jéobiase, Vayres (Gironde).** — *Jéobiase, Soludex, Vivacure.*

**Lab. du Jécol, 3, r. Watteau, Courbevoie.** — *Allopha-Quina, Jécol (Cachets).*

**Lab. Jicem, 304, r. Saint-Jacques, Paris.** — *Citropaine, Iodarsine.*

**Lab. G. Jioffredy, 13, r. Florestine, Monaco.** — *Ferment Dep.*

**Lab. Jolly, 28, av. Carnot, Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.).** — *Spasmine Jolly (Elixir et Comprimés), Spasmidéal (Comprimés et Suppositoires), Terpoxy (Externe Interne, Ovules).*

- Lab. Jouenne**, 234, r. des Pyrénées, Paris. — *Léciflétone*.
- Lab. Journet**, 18-20, r. Vavin, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Bladérol du D<sup>r</sup> Jenrout, Iodofosfal, Orthoflorène, Paracrinase, Perles Nivernaises, Rhupharène, Sirop Lefeuve, Tonifosfal, Tridymol*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Jouve**, 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Balsurol, Cystorénol, Épipaline, Ovules Sédo-Hémostatiques du D<sup>r</sup> Jouve, Sylvinalant (Inhalation, Dragées), Vitimone*.
- Lab. Jouveinal**, 18, r. Saint-Ambroise, Melun (S.-et-M.). — *Nervo-Biolène*.
- Lab. du Juglane**, 8, r. Jaboulay, Lyon. — *Juglane*.
- Lab. Juin-Guiraud**, 26, r. Saussier-Leroy, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Phosphospinal Juin, Pulmodion, Pulvéol, Citralin, Iodarsénic Guiraud ou Gouttes Psithophiles du D<sup>r</sup> Guiraud, Véricardine*.
- Lab. Julien**, 105, r. de Rennes, Paris (VI<sup>e</sup>). *Benzoflorine, Corylase, Elgine Julien, Manganophosphat Julien, Pandrénaline Julien*.
- Lab. Kerckhove**, place Charles-Roussel, Tourcoing. — *Hépadrops, Surval*.
- Lab. Koshly**, 18, r. de Ménilmontant, Paris. — *Eubine*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Artérioveinine, Géraldine, Collyre Sommuères, Collyre Scarlène, Kainase arsénée*.
- Lab. René Krotoff**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — *Dolpoc, Matonyl, Neuropsychol*.
- Kuhlmann (Produits spécialisés des Établissements)**, S. Thiéry, pharmacien, 19, r. Franklin, Paris. — *Binoxol, Chloralosane, Dithioral, Sunalcol, Sunoxidon, Sunoxol*.
- Labiola, Lab. d'Applications Biologiques**, 52, r. de Cambrai, Lille (Nord). — *Encyral Cordonnier, Gymodine, Icorase, Kaneuron, Koddyl, Servo-Freinyll, Sidéranyl, Spasmocalcyl, Sinergyx, Stosédol, Strychneuron, Viabyllis*.
- Labora**, place de la Poissonnerie, Toulon, *Amygdarsol, Calciglandine*.
- Laboradium**, 25, r. Friant, Paris (XIV<sup>e</sup>). — *Balneradol, Dermoradol*.

- Labo-Vita**, 29, r. Duret, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Urovitine, Vitacholine*.
- Lab. Lachaise**, 9, av. Maréchal-Pétain, Tulle. — *Castanol, Dépuratif Sainla, Myrtoline, Thionaphle*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène, Do-sa-no-sal, Fanerval, Surbical*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Arsi-Quinoforme, Camphostyl simple, spariénol et strychniné, Luerol, Neurotrope, Phytocholone, Pilules Héliniennes Naud, Quinoforme, Santal sololé, Vanucléol*.
- Lab. J. Lafarge**, 62, r. de la Brauderie, Châteauroux. — *Neuréol, Sulfohyl, Zymogastrine Kervan, Mensival*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Lafay, F. Ferrand, docteur en pharmacie**, 69, r. de Provence, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Curaluès, Drainobyl, Ovules Hystan, Suppositoires mercuriels du D<sup>r</sup> Lafay*.
- Lab. Laffort**, Joué-lès-Tours (I.-et-L.). — *Biostrychnol, Captobyl, Calmoneuryll, Cellulax, Digestif Rose, Drainagar, Dubaïne, Écobiline, Fluokol, Génostéol, Juniophos, Lacodia, Lacodia BB, Lysosclérol, Pectoral Laffort, Phosctonyl, Polysel, Procarbène, Septolan, Sulfamyl, Uvolonyl*.
- Lab. Lafran**, 8, r. de Prague, Paris. — *Aspirine Lafran, Charbenzo Lafran, Dicodeïne Lafran, Glandimbine Lafran, Parégorique Lafran, Urotropine Lafran*.
- Lab. Lagoutte**, 85, cours Albert-Thomas, Lyon. — *Boldolactic, Calmodacine, Dermodulcis, Phlébos, Suppoalgos, Suppocamphryl, Suppopulmos, Suppothemos, Supptonic*.
- Cie Cie du Lait**, Rumilly (Hte-Savoie). — *Farine Mont-Blanc, Lait Mont-Blanc, Tonimait Mont-Blanc*.
- Lab. du Laitancyll (M. Panier)**, 69, r. Faidherbe, Malo-Bains ; transféré 19, r. de la Chaîne, Bayeux (Calvados). — *Laitancyll*.
- Lab. Laitier**, 52, r. Heurtault, Aubervilliers. — *Collyres (bleu, rose, irradié), Cuprazurol, Oucridine, Plurinauryll, Ricigonal*.
- Lait Guigoz**, Dir. gén. : Rumilly (Hte-Sav.) ; dépôt principal : 2 et 4, r. Catulle-Mendès, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Babeurre Guigoz, Lait en poudre Guigoz, Lait dextrose-malté Guigoz, Lait déchloruré Guigoz, Ravix (lait Guigoz irradié)*.
- Laits Molard**, 25, cours Lafayette, Lyon (IV<sup>e</sup>). — *Bouillie Molard aux amandes, Lait déchloruré Molard, Lait Calcia Molard ou Calcia Molard*.
- Lab. Laleuf**, 51, r. Nicolo, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Adrépatine, Collodine, Créosol, Crinocardine, Folliovarine, Lobéline, Pancrépatine, Pavérinol, Plexalgine Laleuf, Polyferments, Sirop Dubois au Créosol, Théocardine Laleuf, Théovérine Laleuf, Trinitrine Laleuf, Trinitral Laleuf, Trinitrine caféinée Dubois, Trinitrine-Papavérine Laleuf, Trinitrine simple Laleuf*.

- Lab. Lambert, rue de la Paix, Vichy. — *Épicoral*, *Oxylysine*, *Triseptine*.
- Lab. Lambert, place du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac*.
- Lab. des Produits Lambiotte frères, Prémery (Nièvre). — *Arhine*, *Crésoforme*, *Galform*, *Pertes Taphosote*, *Phosote*, *Thiosote*, *Urométine*.
- Lab. Lancosme, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris. — *Acéolitol*, *Algocratine*, *Anhémor*, *Argybil*, *Bain Carré*, *Bismuth Desleaux*, *Calcilève*, *Gargarisme Lancosme*, *Sirop Laincar*, *Hémodyrome*, *Inhalation Lancosme*, *Kaosal*, *Desleaux*, *Magnésie Lancosme*, *Silymar*.
- Lab. Landrier, Coulanges-sur-Yonne (Yonne). — *Arso mine*, *Bismoline*, *Dynosine*, *Gasrosédyl*, *Hépatogyl*, *Pectoral Landrier*, *Neuromil*, *Pectosyl*, *Polysatyl*, *Saturogène*, *Veinosol*.
- Lab. Landrin et Cie, 12, r. de la République, Puteaux. — *Cipromarol*, *Constrictol*, *Élixir de Virginie Nyrdahl*.
- Lab. J. Laroze, 54, r. de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol*, *Cytopan*, *Décholestrol*, *Dosotol*, *Kaobrol*.
- Lab. Latour, Aix-en-Provence. — *Galactogène Chalvet*.
- Établ. Latour, Terrasson (Dordogne). — *Bruzarine*.
- Lab. du Dr Laurent-Gérard, pharmacien, 40, r. de Bellechasse, Paris. — *Acélamone*, *Evolazine*, *Plexamine*, *Radioétrane*.
- Lab. Lauriat, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Anti-Asthénie Lauriat* (ex-Lauriatol), *Bronchoseptol*, *Isorgane*.
- Lab. du Dr Lavoué, Rennes (I.-et-V.). — *Ephydion*, *Feli sédine*, *Goullés I. A. M.*, *Mangarsenic*, *Salicylina*, *Sirop I. A. M. (enfants)*, *Uro-Bestol*.
- Lab. Lavril, Pacy-sur-Eure (Eure). Bureaux : 11, r. Anatole-de-la-Forge, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Gyno-Lactosome*, *Lactosérum Lavril*, *Lactacyd*, *Lactosome*, *Ovulacyd*.
- Lab. Lebeauult, Besins et Cie, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citrolargol*, *Germose*, *Glucamonix*, *Glucocithine*, *Glucosyl*, *Glucosium*, *Gluminix*, *Inhess*, *Levutinyl*, *Mycolysine*, *Olégel*, *Protéol*, *Staphylase du Dr Doyen*, *Solubéol*, *Veinosine*, *Vin de Eugeaud*.
- Lab. Le Blond, 15, r. Jean-Jaurès, Puteaux (Seine). — *Ortho-Gastrine*, *Orthophorine*, *Pyurol*.
- Lab. Le Brazidec, 1, r. Moncey, Paris. — *Micrargol*, *Phylogermine vitaminée*, *Salvurol*.
- Lab. Le Brun, 5, r. de Lubeck, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Dragées Isni-cardiaques*, *Eucalyptine*, *Miclasol*, *Miclasouites*, *Mictazine*, *Pancalcion*, *Sirop d'Eucalyptine*, *Solucalyptine*, *Suppositoires Eucalyptine*, *Suppositoires Miclasol*, *Tonisyol*.

- Lab. Lecoute, 12, r. des Petits-Carreux, Paris. — *Albu-Colit* (apozème, comprimés, granulé), *Ambocurine*, *Bilaxyl*, *Choléluine* comprimés, *Euférine*, *Goullés Lecoute*, *Hémocholine*, *Morsine*, *Peptidol*, *Rénoline*, *Urolavose*, *Variclyt*.
- Lab. Lecoq, 14, r. A.-Briand, Levallois-Perret. — *Antipso-rine*, *Galran*, *Helminthyl*, *Lipaurol*, *Molène*, *Mulhiode*, *Néosolmulh*, *Pentarsyl*, *Tréparsol*.
- Lab. Lécuyer, 5, pl. Lévis, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Évirène*, *Pepsine-Ferment*, *Myosérum*, *Myostyl*.
- Lab. Ledent, Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — *Opo-germine*, *Sédalan*.
- Lab. du Dr Yves Ledoux, place de la Liberté, Le Havre. — *Bactérase*, *Endophos*, *Fermentine*, *Iodémoglobine*, *Néuralgide*, *Pavone*, *Uro-Mais*, *Vilex*.
- Lab. Lees, Directeur : Dr P. Rolland, 127, bd St-Michel, Paris (V<sup>e</sup>). — *Balmiga*, *Métrilols*, *Natrosyl*, *Suppogynals*.
- Lab. M. Lefebvre, 25, bd de Latour-Maubourg, Paris. — *Chlorammonic*, *Demalgon*, *Neutracétyl*, *Neutracétyl chocolaté*, *Nourvit*, *Rubrophène*, *Strychnotonine*, *Synthéma*, *Valovosan*.
- Lab. du Dr J. Lefèvre, 200, r. du Faubourg-Saint-Martin, Paris. — *Alousulfase*, *Borena*, *Bromobéu*, *Ganglionyl*, *Pommade G.D.I.*, *Sirop du Dr Lagnoux*, *Total Vital*.
- Lab. Lefrançois, 36 à 46, av. de Metz, Romainville (Seine). — *Bovcardiac*, *Bovhépatie*, *Bovstrol*, *Cardiophylline*, *Carmine*, *Extrait de bile*, *Extrait hépatique*, *Hépalocarmine*, *Hormoplasmine*, *Néo-Carmine*.
- Lab. Legendre, B. P. Courbevoie (Seine). — *Gasmar Legendre*, *Pâte Mireille*, *Pilules Corail*, *Sirop Mireille*.
- Lab. P.-V. Léger, 17, av. Thermale, Vichy. — *Cupranine*, *Cuproil*, *Sédovarine*.
- Lab. Legoux frères, 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. (Voir Lab. du Dr E. Duboureaux.)
- Lab. Lejeune, 142, r. de Picpus, Paris. — *Indhaméline* simple, *Indhaméline purilug.*, *Pommade Lenoir*, *Pro-lensène*.
- Lab. Lematte et Boinot, 52, r. La Bruyère, Paris. — *Acécolax*, *Acécoline*, *Acécoline-papavérine*, *Acécoline-sparteine*, *Acécoline-camphre*, *Acécoline-Yohimbine*, *Biocaldose*, *Calcional*, *Hémo-Tonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Hypotan-papavérine*, *Hypotan injectable*, *Lipocérébrine*, *Nicobion* (Vitamine P-P), *Pressyl*, *Tonikéine*.
- Lab. R. Léonardon, 28, pl. Gaston-Pailhous, Tours (I.-et-L.). — *Quinithéryl*.
- Lab. Le Perdriel, 11, r. Milton, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Biosine Le Perdriel*, *Coaltar Saponiné Le Baul*, *Fucoglycine* du Dr Gressy, *Sels de lithine effervescents Le Perdriel*, *Tolém Le Perdriel*.

- Lab. du D<sup>r</sup> Leprince, 62, r. de la Tour, Paris (XVI<sup>e</sup>). — Bilordyl, Cascarine Leprince, Eumictine, Freinospasmyl, Guipsine, Néo-Rhommol, Pilules du D<sup>r</sup> Séjournel, Rhommol, Sulféumictine.
- Lab. Lescène, 58, r. de Vouillé, Paris. — Anaquintine Lescène, Balsamol, Balsaquintine, Choléo-Zymatine, Rhinaquintine, Sténopon, Viosten, Zymatine.
- Lab. G. Lesourd, 88, r. Duhaime, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — Anthelox, Anthylline, Antinerveux Lesourd, Antiphymique Nomys, Bolcitol, Colitisane, Comprimés Nomys, Gastrolisane, Péricols du D<sup>r</sup> Legros, Pulmo-tisane, Sels-Mags, Splénocarbène, Traitement Lithol ABC.
- Lab. Lettry, 69, r. de Sèvres, Paris. — Agoxyl, Hederyl.
- Lab. Leurquin, Dreux (E.-et-L.). — Bromocarbène, Kinégastrine, Pulmo-fluide, pulmo-fluide éphédriné, Sels Na 4, Tablettes Gélol.
- L. E. V. A., 26, r. Petrelle, Paris. — Argincolor, Lénijédre, Léniforme.
- Lab. Licardy, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — Fluobyl, Gélogastrine, Hémoductyl, Laxamall, Sédosine, Stovédrine, Tonuol.
- Lab. Lindeux, 7, av. des Marronniers, Fontenay-sous-Bols (Seine). — Novoplasmine, Opo-Signal, Phosthénine.
- Lab. des Lipides, 14, r. des Minimes, Paris, et provisoirement : 9, av. Frizac, Toulouse. — Dermosplénine, Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc, Splénogastrine.
- Lab. de la Liposeptine, 2, pl. des Vosges, Paris. — Ankylosyl, Dépurogène, Dépurogène T, Fennugrène, Fucisol, Hémorenragine, Hémoptysol, Isolatin, Isolamin G., Lux-Hormone « Lipo », Liposeptine, Liposeptol, Marrubine, Pansolanée, Parascélrose, Rhino-Liposeptine.
- Lab. des Lipo-Vaccins, 32, r. de Vouillé et 1, r. Santos-Dumont, Paris (XV<sup>e</sup>). — Vaccins Lemoignic, Lipo-Vaccins, Lipo-Antigène, Lipoides.
- Lab. Lobica, 25, r. Jasmin, Paris (XVI<sup>e</sup>). — Azotyl, Béatol, Garditone, Lactobyl, Lactochol, Sérénal, Taxol, Dralysol, Veinotrope.
- Lab. Lobru, Louis Brun, pharmacien, 92, r. Bobillot, Paris. — Asthmolysin, Posterisan, Produits Polypharma : Artrococlchine « G », Atens, Cuproxil, Nésal.
- Lab. Lobry, 6, r. Parrot, Paris. — Néphrylan.
- Lab. des Spécialités Scientifiques Logeais, 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine. — Organotol S.-S., Panxylon (Ampoules et Granulés), Pommade Logeais, Suppositoires Logeais.
- Lab. Jacques Logeais, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux. — Boricine Meissonnier, Entérospasmyl simple et mucilagineux, Fluidostérol, Globules

- Secrétan, Iodamélis (Gouttes et Comprimés), Opo-Iodamélis, Naïodine A et B, Naïodine Suractivée A et B, Thionaiodine A et B, Thionaiodine (Comprimés).
- Lab. P. Loiseau, 119, r. Cardinet, Paris. — Cyanovaine, Galactogènes Jolivet, Globules Larchey, Hépatol. Sels Larchey, Veloucrème.
- Lab. Longuet, 34, r. Sedaine, Paris. — Arsi-Strychnal, Carbofixine, Cholépan, Citrosodine, Clisemine Hamaciro, Liniment Longuet, Nareyl, Phospho-Strychnal, Phytojava, Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy, Quinuryl, Rénalgine, Rhinalginol, Siphuryl (Orthosiphon Longuet), Strychnal, Urisanine.
- Lab. Lorrain de Produits purs, Étain (Meuse). — Caparlem, Collosoufre, Cryosan, Sérocalcine.
- Lab. J. Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris. — Biotrigon, Carborigon (synonyme Biotrigon hépatique), Diurophyle.
- Lab. André Lucien, 19, r. du Bac, Paris (VII<sup>e</sup>). — Atospirine, Hélénase, Sédogoutte, Vésiculine, Salicure, Strondiole.
- Lab. Lucinia, 154 bis, r. Breteuil, Marseille. — Fusol, Galabacéine, Lactis Sall, Lucimarine.
- Lab. Lumière (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, r. Villon, Lyon. — Allaurol Lumière, Allocaine Lumière, Allochrysine Lumière, Antipaludique, Borosodine Lumière, Cryogénine Lumière, Cryptargol Lumière, Denlochrysine Lumière, Diapros Lumière, Enigé Lumière, Entalua Lumière, Entérovaccin Lumière, Gelée Lumière, Granulochrysine Lumière, Hémo-plase Lumière, Hermophényl Lumière, Iodure d'amidon Lumière, Néogaïacol Lumière, Néohola Lumière, Oléochrysine, Oléochrysol Lumière, Opozones Lumière, Persodine Lumière, Rhéantine Lumière, Tulle gras Lumière.
- Lab. Madyl, 14, r. de Miromesnil, Paris. — Bromovose, Euphytose, Tapo.
- Lab. du Magsalyl, 10, r. de la Mairie, Ivry-sur-Seine. — Catalyl, Magbromyl, Magiodyl, Magsalyl.
- Lab. Mahé, pharmacien, 85, r. de Trignac, Saint-Nazaire-Penhoët (L.-Inf.). — Sirop Hercul.
- Lab. du Mainguy, M. Bassin, Bondy. — Stupho, Véral-gine.
- Lab. de la Maisleriasse, 143, r. d'Alésia, Paris (XIV<sup>e</sup>). (L.-A. Marceron, Phien). — Maisleriasse (formes F., P. M., et injectable).



- Lab. **Ch. Malaval et J. Rousselin**, 8, r. Fleury, Oullins (Rhône). — Baume Dolopax, Bi-Carbène, Bili-drainine, Bi-Sodine, Biopectol, Calcitanine S, Carbonaphthine, Carnicalcine, Cynaboldine, Dépurhème, Dynaphosol, Dynavitamine, Eusepton, Floranémone, Iodocène, Jécoboldine, Jécosédyl, Jécolaxine, Lubridax, Normaflox, Pilules Erdibrom, Terpine Barbier, Urimiral, Vigorstyl.
- Lab. **Mannet, Loudun** (Vienne). — Dragées Mannet ferro-ergotées, Élixir Mannet ferro-ergoté, Élixir tribromuré Mannet au Salol, Élixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol, Élixir Mannet à l'iodure de sodium et au Salol.
- Lab. **Margex**, 13, r. Mélingue, Paris. — Créositoires, Gencigel.
- Lab. **Marin de Pontailiac**, Royan (Chte-Mme). — Algozone, Iosine Castanet, Radio-tépic G, Sapodermes.
- Lab. **Marinier**, 23, r. Ballu, Paris. — Bi-Citrol, Carbagol.
- Lab. **Maronneau-Morel**, 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie (Seine). — Curiosan, Gamostyl, Trépositoires, Vaccin anticollibacillaire polyvalent M.-M.
- Lab. **Mars**, Guérande (L.-I.) et Condest-La-Roché-Bernard (Morb.). — Argyrescine Mars, BB Derm Mars, Sanubrol Mars, Seindern Mars, Veinomars (voir Argyrescine).
- Lab. **Martin**, 2, r. du Débarcadère, Paris (XVII<sup>e</sup>). — Olcanfral A et B.
- Lab. **Martin**, 47-49, r. Bonnabaud, Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — Drainhépar, Linnéol, Rhinochrome, Vitachrome (collutoire, ovules), Sève de Bon Secours.
- Lab. **Martin**, 25-27, r. du Commandant-Rivière, Colombes (Seine). — Cytobiase, Quinosiphon.
- Lab. **du Dr H. Martinet**, 16, r. du Petit-Musc, Paris. — Digestobiase, Granoxyl, Gynarsol, Hémopausine, Hépacupryl, Hépadrinase, Hormovitol, Hygioline, Insuline Novo, Lipolysine, Lymphode, Magnésosoules, Néocollargol, Pangaduite, Pulmophédryl.
- Lab. **Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — Phlebotonine, Uvargol.
- Lab. **Martin-Mazade**, St-Raphaël (Var). — Élixir Eupnéique Martin-Mazade, Gigarettes-Papier-Poudre Antiasthmatiques Martin-Mazade, Pilules antidiabétiques Jaillardon, Sirop d'Hémoglobine Jaillardon.
- Lab. **du Marubor**, 1, rue d'Arras, Béthune. — Carbolaxine, Marubor.
- Lab. **Masson**, Rozay-en-Brie (S.-et-M.). — Vitamines Masson.
- Lab. **H. Masson**, 44, r. Alexandre-Dumas, Paris (XI<sup>e</sup>). — Continol, Viperol.

- Lab. **Mauchant**, 22, bd Circulaire-d'Épinay, Gennevilliers (Seine). — Asthmapepton, Cassitol, Fluveinose Mauchant, Hépamine Mauchant (Ampoules buvables et comprimés), Iodonuclyl, Lipovila, Minéplastine, Minérale du Dr C. Baud, Myodyne Mauchant, Phoscamine, Rhodocoboryl, Salubrine (Liquide et Comprimés), Solburic, Trilactine.
- Lab. **J. Maunand**, 146, av. Parmentier, Paris. (Comptoir général pharmaceutique). — Chlorangil, Drainoflox, Orgadyne, Quinosédyl, Reumafénine, Umcha.
- Lab. **Maussion**, 5, av. Émile-Boissier, Nantes (L.-I.). — Bebia, Foimolax, Dracoline.
- Lab. **Mayoly Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — Baume Aroma, Borostyrol, Dicaliode, Euphon, Fluenzyl, Isoluel, Kalastyl, Pérubore, Pipettes nasales M. S., Rhino-Borostyrol, Sanoformine, Stillargol, Valbrol.
- Lab. **Péchin**, Foussais (Vendée). — Arrhénuclène Bergevin.
- Lab. **de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. — Fludiose, Formocarbène, Opochol, Spasmocarbène, Sodochol.
- Lab. **de Médecine moderne**, 81, r. Réaumur, Paris (II<sup>e</sup>). — Calmopelvine (suppos. et dragées), Calmovarine (suppos. et cachets), Sedasix.
- Lab. **Médial**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon. — Analgésique Kafa.
- Lab. **Médicia**, 7, imp. de la Sous-Préfecture, Roanne. — Coryzamide, Entéropathyl, Gastropathyl, Nervisthényl, Sédatonyl, Spasmo-Entéropathyl.
- Lab. **Médico-Pharmacologique de Vichy**, 1 et 3, r. Laflotte, Vichy, et 5, pl. des Ternes, Paris. — Fructines-Vichy, Frugelines-Vichy, Neutroses-Vichy, Radiosels-Vichy, Somio.
- Lab. **Médico-Scientifiques**, 1 et 3, r. de l'Arsenal, Bordeaux. — Phlogiplasmine.
- Lab. **Mercier**, 41, route de Turin, Nice. — Acétumine, Iodorganine.
- Lab. **du Mercurochrome 220 H. W. D.**, 25, r. Saint-Augustin, Paris. — Mercurochrome 220 H. W. D.
- Lab. **Merminod**, 49, r. de Paradis, Paris. — Aseptamide, Dermamide, Gamamide, Colloïxols du Dr Riquoir, Néoplatysine du Dr Riquoir.
- Lab. **Paul Métadier**, Tours. — Métaspirine, Méta-Tilane, (crème, savons), Méta-Vaccin (ovules), Rhino-Tilane, S. I. C.
- Lab. **Mexyl**, 12, r. Henry-Rivière, Le Perreux (Seine). — Colluloire Mexyl, Filtraxyl Mexyl, Solarsal, Tri-neuxyl, Wipla.
- Lab. **M. G.**, 92, r. Émile-Guichenné, Pau (B.-P.). — Dro-pargyl.

- Lab. du D' Mialhe**, 8, r. Favart, Paris. — Acoqlol, Adréna-line Mialhe (Adénine), Digi-Lanatine, Didi-Mial-Baine, Digitaline Mialhe, Ouabaine-Mialhe, Nusyl, Perquinol.
- Lab. Michelon**, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Æsculase*.
- Lab. Michels**, 4 bis, r. du Colonel-Moll, Paris (XVII<sup>e</sup>). — Chloro-calcion, Silisode.
- Lab. du Mictasol**, 5, r. de Lubeck, Paris. — Mictasol, Mictasol Bleu, Mictasovules, Miclazine, Suppositoires Mictasol.
- Lab. Midy**, 67, av. de Wagram, Paris. — Algipan Midy, Antidiabétique Midy, Antigastralgique, Antigrip-pine Midy, Bétul-ol Midy, Bi-iodure de mercure indolore Midy, Carbolin Midy, simple et composé, Cascara Midy, Cocaïne Midy, Colchi-Sal Midy, Collargol Midy, Panlacto Midy, Piperazine Midy, Pommade Midy, Provénaise Midy, Suppositoires Midy, Thiodacaine Midy, Thiodérazine Midy (Ampoules et Gouttes).
- Lab. L. Mignard**, 24, bd de Sébastopol, Paris. — Entelactol, Total Magnésien.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — Carbos, Comprimés de Carbonate de chaux, Formocarbos, Musi-carbos, Mucilaxine, Rectoplasme.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 4, r. Richer, Paris. — Gubline, Kénol, Laclaris, Paxène, Quinenol, Vanoxyle.
- Lab. Millot**, 177, r. de Courcelles, Paris. — Benzo-bismuth Millot, Comprimés néothorium Millot, Crayons néo-thorium Millot, Inophytine (comprimés, ampoules intramusculaires, intraveineuses, suppositoires), Inophytine-Ouabaine (ampoules veineuses), Inophytine sédative, Siropphanlique, Scillitique, Spartéinée, Trinitrinée, Papavérinée, Digitalique (comprimés), Orargol (Rhino, Gouttes, Collyre, Ampoules), Ovules néothorium Millot, Pommade néothorium Millot, Sarcopiol, Soluté Gaube du Gers.
- Lab. Miluc** (L. Ragoucy), 2, r. Joseph-Bara, Paris (VI<sup>e</sup>). — Allergantyl Miluc, Lotuphar (ex-Nervantyl).
- Lab. Minerva**, 10, rue Bayard, Toulouse (H.-G.). — Baume dermique Minerva, Embrocation Minerva, Hématorexyl, Vitalyne.
- Lab. Miquel**, 1, av. Lowendal, Paris. — Glyco-M, Selunic.
- Lab. A. Mironneau**, pharmacien, à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — Drinal, Glucochaux, Hormiadyne, Sodergyll.
- Valentin Aage Moller**, 57, r. Pierre-Duhem, et 39, r. Fon-daudège, Bordeaux. — Insuline « Leo », Insuline Retard « Leo », Seringues « Leo », Leotamine, Sanocrysine et Oléo-Sanocrysine de Mollgaard, Sulfosine « Leo », Exhepa, Metallosal « Leo ».
- Lab. Monal**, 13, av. de Ségur, Paris. — Boléase, Coro-sédine, Dermo-Sulfuryl, Diurophylline, Globules Romon, Iodolipine, Laxo-Sulfuryl, Prosal, Rhino-Sulfuryl, Santal Monal ou Bleu de méthylène, San-tamide, Sulfuryl Monal, Surtensine, Tensédine. Terkal Monal, Trinivérine.
- Lab. Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — Opothérapie Moncour (Sphérulines), Sélécine. Vitacalcine, Parathyrocalcine.
- Lab. Monin**, 49, r. de Maubeuge, Paris. — Biostabyl, Cruxol, Dépuratif Rob Lechaux, Élixir Grez, Liqueur de l'Étoile anti-asthmaticque, Pilules antinévralgiques du D<sup>r</sup> Cronier, Poudre Blot laxative, Vagostabyl.
- Lab. Montagu**, 10, r. de La Barouillère, Paris. — Bro-méine Montagu, Carbalcaloïdes, Carpatropine, Carbo-sanis, Dragées Hecquet, Génacide, Iodéine Montagu. Papier réactif du Génacide.
- Lab. de Montmorot** (Sté des), 12 bis, r. Keppler, Paris (XVI<sup>e</sup>). — Hépalomel Védé, Paquets Védé, Sufo-Rhinol du D<sup>r</sup> Fayès, Salbrine, Veloucors, Sirop Flamand, Valéronal, Glutinettes d'Aspirine.
- Lab. Moreau**, 18, r. Saint-Martin, Paris. — Lanceryl, Pla-ganaze, Plaganol, Trialgine.
- Lab. Morellet**, 8, place de la Gare, Pierrefitte (Seine). — Eucol (comprimé et injectable), Sulfur concentré Dax.
- Lab. Moser et Cie**, 8, chem. de Montheillant, Lyon (Rhône). — Mallea Moser cristallisée.
- Lab. Mouneyrat**, D<sup>r</sup> Mouneyrat, Prof. Agrégé Faculté de Médecine, 12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — Hislogénol, Vioxyl, Hectine, Hectargyre, Kinectine, Aristonmyl, Néo-Obbia, Exobol, Pul-morex, Lysamide, Lysapyrine, Lysothiazol.
- Lab. L.-J. Mounier**, 18, place Laborde, Paris (VIII<sup>e</sup>). — Nestamine, Yaourtine.
- Lab. Mouré**, P. Cotard, pharmacien, 5 bis, bd des Ita-liens, Paris. — Arlério-Phan, Crino-sérum, Élixir Morlas, Saly-Sulfite, Sirop Morlas.
- Lab. J. Mousnier-Delorme**, 28, r. Velpeau, Antony (Seine). — Dragées du D<sup>r</sup> Gelineau.
- Lab. du Muxagol**, 43, r. de Chartres, Neuilly-sur-Seine. — Muxagol, Ureinol.
- Lab. du Myoral**, 3, r. Saint-Roch, Paris. — Calcium-Fran-calcium, Francalcium, Glycosithène, Myoral.
- Lab. Nacher**, pharmacien, licencié ès sciences, 71, bd Carnot, Toulouse. — Glucosyl Nacher.
- Lab. Nader**, 6, r. de l'École, Versailles. — Ampoules auto-injectables Nader.

Lab. Nativelle, 27, r. de la Procession, Paris (XV<sup>e</sup>). — Digitaline Nativelle, Iodhéma, Natibaine Nativelle, Natirose, Ouabaine Arnaud, Quinicardine.

Néoplastex (Thuasne et Cie), 71, fg St-Martin, Paris (X<sup>e</sup>). — Attaches Néoplastex, Bandes, Sangle-Ceinture.

Lab. du Néo-Rhénium, 82-84, r. de Belleville (XX<sup>e</sup>). — Dolménal, Gomhydrine, Néo-Rhénium.

Lab. de la Néphralbine, 2, r. Carnot, Melun (S.-et-M.). — Fervallène, Néphralbine.

Société Nestlé, 6, av. César-Caire, Paris. — Babeurre en poudre Elédon, Lait en poudre Nestogène, Lait entier acidifié en poudre, Farine Nestlé sans lait.

Lab. Noël, 24, r. Saint-Augustin, Paris (IX<sup>e</sup>). — Cacydylode, Ferrocrolin, Gaiaphos, Hépatricine, Hormoglobine, Stomaco-Sodine, Uricolysé, Vivacol.

Lab. Noelline, Guingamp (C.-du-N.). — Pommade Noelline, Poudre Noelline, Noelline (Sirop laxatif), Noelline (Savon).

Lab. H. Noguès, 7, r. Galvani, Paris. — Grains de Vals, Baume maternité, Capsules Noguès, Comprimés Purgos, Néorésite, Pilules Gip, Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Noguès, Thébaïl, Urémiase.

Lab. Nollet, 47, r. Nollet, Paris (XVII<sup>e</sup>). — Alpiléx, Boroformyl, Borosol, Héducol, Pyrocuro, Végélex.

Lab. Norgan, 201, r. de Grenelle, Paris (VII<sup>e</sup>). — Contracide, Carbomucil, Decorpa, Enzypan, Hépanmult, Norgangine, Normacol, Profondol, Spasmacol.

Lab. Novalis, Oullins (Rhône). — Adrénargol, Gouttes Eryl, Lénadryl, Lugocalcine, Nasobore, Novolug, Purargol, Résocaïne, Révulsif Lug, Sulfoxy, Urométhyl, Valénal.

Lab. du Novigol, 24, r. de Lesson, Rochefort-sur-Mer (Ch.-Mar.). — Novigol.

Lab. Nutri-Vita, 24, r. de la Paix, Paris (II<sup>e</sup>). — Nutri-Vita.

Lab. Oberlin, 17, r. Cadet, Paris. — Aliment Tinardon, Analgénine, Baume Oberlin, Biodynamine, Capsules grises Cabanès, Ferropéptone Oberlin, Gastrocalcine, Gouttes Linober, Granulé Tinardon, Gymaicol, Hamaméliode, Iode Oberlin, Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin, Rob Cabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Saloté Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sirop Tinardon, Suppositoires Cabanès, Uraséol.

Lab. Odlia, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — Gynopausine, Inolène (simple, thymolé), ovules à l'Inolène, pommade à l'Inolène, poudre à l'Inolène, Nasolène, Sedofolline.

Lab. de l'Oliphédrol, 25, bd Edgar-Quinet, Colombes. — AS. I. P., Oliphédrol, Oliphédrol BB, Quintozone.

Lab. J. Olive, 14, r. des Minimes, Paris, et 9, av. Frizac, Toulouse. — Normogastryl, Pelvisiformine, Plasmolithène.

Lab. Omithér, 33, r. Barthou, Angoulême (Charente). — Suprathényl.

Lab. de l'Opocalcium (A. Ranson), 96, r. Orfila, Paris. — Anacalaine, Anacalaine Infantile, Opocalcium, Oposferrine vitaminée.

Lab. d'Opochimiothérapie, 20 bis, r. des Jumeaux, Toulouse (H.-G.). — Agocrolin, Anaplagan, Anatsensyl, Bacilac, Biokola, Cystocure, Cystosuppos, Dolophan, Entérocuprol, Gripponyl, Gynéseptyl, Gastéryl, Héparicrinol, Hépatocure, Lacta-calcium, Nasamide, Iodocyanyl, Opocalcul, Passibromine, Prostacure, Pulmocones, Pulmothiol, Révulsigène, Veinostase.

Lab. Opos (Homps, Phien), 13-13 bis, r. Matabian, Toulouse. — Aubéliode, Colibyl, Coliséptine, Féroposséine, Oponergyl, Oposséine, Septisan, Thiophan, ex-Rhumofan.

Lab. de l'Orcalcine, 9, r. de la Platière, Lyon. — Gouttes Iodopan, Gouttes Yseult, Orcalcine, Procolyl, Pro-gaster.

Lab. de l'Ossyl, D<sup>r</sup> F. Vasseur, Glageon (Nord). — Ossyl.

Lab. de l'Ostréiode, 344, bd de la Plage, Arcachon (Gironde). — Ostréiode, Ostréiode injectable.

Lab. d'Oxyaminothérapie, 13, r. Pavée, Paris. — Okamine cystéinée, Okamine dragées, Okamine simple.

Lab. de l'Oxyplastine, 78, av. de Saint-Ouen, Paris. — Oxyplastine.

Lab. de l'Ozol, 6, pl. des Ternes, Paris. — Arg-Eph, Hyol, Ozol, Ozolase.

Lab. Ozothine, 23, rue Sébastien-Mercier, Paris. — Ozothine.

Lab. Pachaut, voir : Lab. Thomas, 2, r. Sainte-Cécile et 31, faub. Poissonnière, Paris.

Lab. R. Paméla, 85, r. Turbigo, Paris (III<sup>e</sup>). — Blagny (dragées, gouttes, sirop), Vilarsenic (dragées et suppositoires).

Lab. du Papier Eymonnet, 14, Grande-Rue, Pont-de-Vaux (Ain). — Papier Iodogène Eymonnet, Rhumacrescol.

Lab. du Parafode, 23, r. Doudeauville, Paris. — Ovules au Parafode, Parafode.

- Lab. F. Parat, Saint-Leu-la-Forêt (S.-et-O.). — *A sygnathol*, *Mysol*, *Pilules du Dr Smiths*.
- Lab. Paret, 28, r. Guibal, Marseille. — *Azym*, *Cellules Paret*, *Fixase* et *Fixase irradiée*.
- Lab. A. Paris, 4, r. de La Motte-Picquet, Paris. — *Hémostaphoshyll*, *Lactolase*, *Oxydothyrine*, *Oxydovarine*, *Phagosthyll*, *Phagosthyll Mangané*.
- Lab. de Pathologie générale, 5, r. François-Ponsard, Paris. — *Néopancarpine*, *Rhinofluine*, *Vaso-neurine*.
- Lab. Pauche, 139, cours Tolstoï, Lyon. — *Galegon*, *Garaspirine*, *Sels Droser*.
- Lab. Pautauberge, 10, r. de Constantinople, Paris. — *Broncurol*, *Dragées Pautauberge*, *Gaiacol Pautauberge*, *Kolarsine Pautauberge*, *Solution Pautauberge*, *Suppositoires Pautauberge (Adultes et Enfants)*.
- Lab. du Pectosédyl, 24, r. de Meaux, Paris (XIX<sup>e</sup>). — *Pectosédyl*.
- Lab. Pépin et Leboucq, 30, r. Armand-Silvestre, Courbevoie. — *Bromogénol*, *Gaulol*, *Guelhural*, *Iodogénol*, *Saburasse*, *Vaccin R. N*.
- Lab. du Pepticol, 13, av. du Maréchal-Foch, Dammarivilles-Lys (S.-et-M.). — *Pepticol*.
- Lab. Perrier, 12, r. Henner, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Convalbaïne*, *Scillitrine*, *Théocalciodé*.
- Lab. H. Perrin, 55, r. Auguste-Comte, Lyon. — *Lactoler*, *Linicaïne*, *Pancréptol*.
- Lab. Perrochon, Tours (I.-et-L.). — *Eurectol*, *Grains d'Évian*, *Pulmocardine (simple et éphadrinée)*, *Rénocardine*.
- Lab. J.-P. Petit et Cie, 72, bd Davout, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Neurotensyl*, *Sojaminsyl*.
- Lab. de la Phagolysine, 14, r. Cantin, Courbevoie. — *Carbonal Princeps*, *Carbonal Magnésien*, *Phagolysine*.
- Lab. Pharmaceutique du Rhône (P. Guély, docteur en pharmacie). — 16, cours Gambetta, Lyon. — *Bronchosédol*, *Glutines Chabre (KI ou Na)*, *Migrainol*, *Phosphobiol*, *Poudre Beau chloroformée ou Éther*.
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées, 62, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Chlorosfelyte*, *Hazellium*, *Isocolium*, *Maté Douglas*, *Thermageline*.
- Pharmacie Biologique, A. Cépède, pharmacien, 57, r. Mathurin-Régnier et 47, r. Barge, Paris. — *Panostyl*, *Vaccinothérapie Atoxique Cépède*.
- Pharmacie Centrale de Belgique, 12, r. du Téléphone, Bruxelles. — *Carbobel (simple et benzonapholé)*, *Digitabiline (Gouttes et Pilules)*, *Hypersan*, *Liquisan*, *Néurosane*, *Quino-C*, *Vitamorrhine (granulés, perles, pommade, cônes et pâte anale)*.

- Pharmacie Centrale de France, 379, av. du Président-Wilson, La Plaine-Saint-Denis. — *Adréaline Invar*, *Crêpe Velpéau*, *Digitaline Invar*, *Pyroléol Edet*, *Théobromine Invar*, *Vegephos*.
- Lab. de Pharmacie appliquée, rue Frédéric-Chevillon, Allauch (B.-du-R.). — *Amido-Septine*, *Biotone*, *Cynabiline*, *Fluase*.
- Lab. de Pharmacologie générale (Vial et Cie). — Voir Lab. Grimault, 51, r. François-1<sup>er</sup>, Paris.
- Lab. Philippe, 5, r. Mazard, Lyon. — *Fluidbos Moyet*, *Likan asiatique*, *Orexyl*, *Phosocytol*.
- Produits du Dr Philippe, 36, quai de Fulchiron, Lyon. — *Ampoules Lémery*, *Antidote-Malaria*, *Capsules Henry*, *Cartouches Lémery*, *Gouttes Scandinaves*, *Kérascilcyl*, *Kéraspirine (Aspirine kératinisée)*, *Pilules Philippe*, *Bromure*, *Pilules Philippe Harlem*, *Pilules Philippe Ki ou Nai*, *Pilules Lémery*, *Pilules Philippe Pancréatine*, *Santal Henry*, *Septichrome*, *Suppositoires Lémery*.
- Lab. Phosma (M. Labrousse, Phien), 47, rue Maleret, Bordeaux. — *Entérargol*, *Phosma*.
- Lab. des Phosphates Vitaminés (Caubin), 39, r. Camille-Godard, Bordeaux. — *Santogénol granulé*, *Phyto-calcine*, *Phylarsine*, *Phyladrénine*, *Phytovarine*.
- Lab. Phygène, 7, r. Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine). — *Coltval*, *Hormantoxone*, *Pineoleum*, *Quinolac*, *Salsanos*, *Saproxyl*.
- Lab. de Physiologie et de Thérapie, 10, r. de Strasbourg, Paris (X<sup>e</sup>). — *Atural*, *Microlyse*.
- Lab. de Phytothérapie de Paris, 113, bd Voltaire, Paris. — *Ballotyl*.
- Lab. de Phytothérapie Expérimentale « Sophyta », 61, bd Malesherbes, Paris. — *Hygiocholine*, *Neurogalène*, *Philebocratyl*.
- Lab. Pialoux, 55, r. de Chabrol, Paris. — *Airoglyce*, *Bengouté*, *Cédro-Méthyle*, *Chlorurol*, *Dynamoférol*, *Hépaturol*, *Iodophume*, *Maniodhamamelis*, *Rectocalm*.
- Lab. Pichon, 20, r. Lamarck, Amiens. — *Trisalyl (baume, compr., solution, ampoules)*.
- Lab. Picot, 14, r. du Temple, Calais (P.-de-C.). — *Anervol Mons*, *Angivore*, *Anthraxivore*, *Buccaniz*, *Cicafer*, *Dinacode*, *Gastrophyle*, *Hémostuine*, *Hémovitate*, *Hépatosol*, *Métrivore*, *Otinol*, *Pectokid*, *Phostonine*, *Pluriphos*, *Pulmocalm*, *Rhinol*, *Théobrophos*.
- Lab. du Dr Pillet, 222, bd Pereire, Paris. — *Beef Lavoix*, *Contréxurique (ex-Anti-urique de Contréxeville)*, *Gyno-Coccyll*, *Hygioline*, *Néo-Coccyll (comprimés, ampoules, crayons chirurgicaux; crayons gynécologiques, bougies urétrales, mèches)*, *Néo-Salyl*, *Pulvococcyll*.
- Lab. Pillier, 8-10, rue Masséna, Nice. — *Laxior*, *Sanex-Inhalant*.

- Lab. du D<sup>r</sup> Pinard, 90, bd St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du D<sup>r</sup> Pinard, Calcigénol, Halocalcion.*
- Lab. M. Pinguet, 38, r. de la République, Montluçon (Allier). — *Quinti-Suppos.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Plantier, Annonay (Ardèche). — *Hémopanbiline, Panbiline, Rectopanbiline.*
- Lab. J. Plé, 111 bis, r. de Turenne, Paris. — *Calcium-Plé, Histamyl, Hystamil « D », Phytosplénol Plé, Phyto-Vitamines Plé.*
- Lab. du Flexosédol, 24, r. Carnot, Haubourdin (Nord). — *Cynophan, Pectocodine, Plexosédol A et B.*
- Lab. Pointet et Girard, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline, Hépatodiagnose, Novismuth, Soporalose, Vitarglyl.*
- Produits Polypharma. Concessionnaire : L. Brun, pharmacien, 92, r. Bobillot, Paris (XIII<sup>e</sup>). — *Artrocolchine « C », Atens, Cuproxil, Nesal.*
- Lab. Pompanon, 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Sulfureux Pouillet.*
- Lab. Porcher, 35, r. des Blancs-Manteaux, Paris. — *Angusturyl Porcher, Dermacide\* Porcher, Eczéda, Eczosec Porcher.*
- Lab. Porsin, 39, r. Claude-Bernard, Paris. — *Apivène.*
- Lab. du Praticien, Hussygnay-Godbrange (M.-et-M.). — Filiale : place Saint-Jacques, Eu (S.-I.), pendant la durée de la guerre. — *Angihormol, Axyol, Bioxyol, Diatol, Ecsugyl, Minurex, Oxythylol, Thioxyl, Traitement Ambulatoire.*
- Lab. D. Prigniaux, 52, r. des Cinq-Diamants, Paris (XIII<sup>e</sup>). — *Glyphéranol, Mercure-Past.*
- Lab. Prijac, 3, pl. des États-Unis, Château-Thierry (Aisne). — *Gynazur, Phosidiane, Phytocalm, Salicaria, Sirop Prijac.*
- Lab. Probios, 4, r. de Miromesnil, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Amisflorine, Azama, Biosérum, Camphrolyse, Comprimés Probiamide, Comprimés Probios (antiprogènes, voies respiratoires, intestinal), Dentifrice Probios, Diorine, Dogastro, Germinol, Hypotensa, Kao-Carbo, Embryona, Florix, Granules de Bourgel, Hepatonia, Intesto, Obsor, Onogo, Ooules Oape, Ooules Probios, Pastilles Dryga à la Probiamide, Pépione, Pommade Probios, Propulsif Probios, Pulvo-Probiamide, Sedabios et Suppos. Sebadios, Sirop Pectonax, Spasa, Triano, Vaccinothérapie Probios.*
- Lab. Procham, 8, bd de Cessole, Nice (A.-M.). — *Gouttes B. O. P.*
- Lab. des Produits Biologiques I. M. (S. Savigneux, pharmacien), 17, r. Bourgelat, Lyon. — *Biosérine, Séro-Comprimés, Sérolactyl, Séro-liquide.*

- Soc. des Produits du Maïs, 29, r. de Berri, Paris. — *Dextrosol, Maïzena.*
- Lab. des Proxystases, 97, r. de Vaugirard, Paris. — *Angioxyl, Disonyl, Insulanol, Insulyl, Insulyl-Retard, Proxylol.*
- Lab. Pruvost, 117, r. Victor-Hugo, Houplines (Nord). — *Bucho-bleu, Musculogenol, Thymoseptol, Sirop Rapid, Uroclorol.*
- Lab. du Pugéol, 19, r. de Pontevès, Marseille. — *Boldolive, Dermolive, Sulfolive, Suppolive, Urosalyl.*
- Lab. de la Pyodolysine (F. Martin, pharmacien), 2, r. des Trois-Mages, Marseille (B.-du-R.). — *Pyodolysine.*
- Lab. Quies, 8, r. Auguste-Chabrières, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Boules Quies.*
- Lab. du Quina Baron, 3, pl. de la Miséricorde, Lyon. — *Quina Baron.*
- Lab. du Quina Boureel, 7, avenue du Doyenné, Lyon. — *Bain de Bouche du D<sup>r</sup> A. Boll, Bronchial Luna, Quina Bourcel, Thibyl Bourcel.*
- Lab. du Quinsal (R. Didillon), 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Quinsal.*
- Lab. du Quintocoq, 32, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine. — *Quintocoq.*
- Lab. Quiret, 21, pl. du Maréchal-Pétain, Béthune (P.-de-C.). — *Laxaseptol, Ostricalcium, Pipéritol.*
- Lab. Ranque et Senez, 16, r. Dragon, Marseille. — *Vaccins bactériens I. O. D., Phylaxines.*
- Lab. D. Raquet, 114, r. Solférino, Lille. — *Cavéform, Kéldol et Suppo-Kéldol.*
- G. Reaunbourg et Cie, 115, r. de Paris, Boulogne-sur-Seine. — *Passicarbonate, Passiflorine, Néo-Passiflorine.*
- Lab. Reboul, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine). — *Cardio-bromine, Cholagol, Citratagus, Créosuppo-campbre, Ergostol Violet, Gymophyl, Périviol, Stabyne, Sulfamido-Suppo, Tanode, Thymovules, Tonibronchique, Tridigestif Reboul.*
- Lab. Regagnon et Cie, 276, r. Lecourbe, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Amorhinol, Bicolyre, Bronchosédyl, Énergésine, Sédoplasme, Sédorhinol.*

- Lab. Renard, 35, r. de Paris, Clichy (Seine). — *Algane*, *Cryptolol*, *Pneumogène*.
- Lab. Renard et Cie, 35, r. de Paris, Clichy (Seine). — *Gadruamine*.
- Lab. Renaud, 2, r. Pierre-Demours, Paris. — *Lachésine*.
- Lab. du Dr Renaud, 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes. — *Cupro-Glycol*, *Ampoules Cardio-camphre simple et spartéine*, *Suppabaine*.
- Lab. Rey, 12, r. Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Casol F. Rey*, *Ludin*, *Pommade Crème Ludin*, *Puérictine Rey*, *Sericine Rey*, *Seroma Rey*.
- Lab. Reygagne, 160, av. d'Italie, Paris (XIII<sup>e</sup>). — *Actitonic liquide*, *Ampoules Anti-H*, *Bioélixir*, *Bioorganie*, *Collutoire Collargent*, *Comprimés Broncho-Organie*, *Comprimés Laxocrinol*, *Néo-Bioélixir*, *Poudre Anti-H*, *Lotion Sud*, *Baume Glacia*, *Dentifrice Stérise*.
- Lab. Rhemda, 51, r. d'Alsace, Courbevoie (Seine). — *Boues radioactives Rhemda*, *Bougies radioactives Rhemda*, *Dermathorium*, *Mésothine*, *Mésolthorium Rhemda*, *Radioules Rhemda*, *Radiargyl*, *Thorix (Thorium X Rhemda)*.
- Lab. Ricardon et Cie, 38, r. du Capitaine-Ferber, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Hyostinal*, *Bicrozol*, *Charbon Vehem*, *Hécanéphrol Gaïol (amp. et sup.)*, *Pastilles Evans*, *Phospharsol*, *Spécialités de Brides*.
- Lab. M. Richard, Aubenas (Ardèche). — *Desintex*, *Gastrilène*, *Gripposédine*, *Neurosthénol*, *Péruglan*, *Phosphantyl*, *Rhinalène*.
- Lab. Richer, 45, fg St-Denis, Paris. — *Androgestill*, *Carbogénase*, *Comprimés et Cachets Salvé*, *Embrocation Richer*, *Florhépaline*, *Gynométine*, *Kolarsan*, *Mictophile*, *Morucalcose*, *Néo-pulmine*, *Neuraxial*, *Novoiodal*, *Nucléarsan*, *Oxnal*, *Paraveinine*, *Salvébyl*, *Stavafer*, *Tercod*, *Vixol*.
- Lab. Richou, 39, r. Taïtbout, Paris. — *Gotira (Phytoderm)*, *Ovules « Phyllovules »*, *Ultréma (Phylocicatrisol)*.
- Lab. Rissa, 46, r. Claude-Lorrain, Lille. — *Produits Iodex*.
- Lab. M. de Rive, 11 bis et 13, r. Levert, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Aérocylol*, *Amphostabil*, *Antalgyl*, *Aurixéma*, *Biodarcine*, *Calyptophydril*, *Collargophédrine*, *Collucromex*, *Éphédriavaine*, *Éphédrocure*, *Gomhydriane*, *Hépavita*, *Minervol*, *Panfluine*, *Pulbo-Éphédrocure*, *Soluphédrine*, *Strongénol*, *Voxynox*.
- Lab. H. Rivier, 10, passage Morel, Montrouge (Seine). — *Anégrine*, *Ascoléine Rivier*, *Dragées Pierlot à la Marjolaine*, *Valérianate Pierlot*.

- Phar. J. Robert (J. Boudier, succ.), 37, r. de Bourgogne, Paris. — *Hémocalciopectine*, *Tonique Boudier*.
- Lab. Robert, place des Halles, Niort. — *Antiseptoma*, *Cardirène*, *Robrodyne*.
- Lab. Robert et Carrière, 1, av. de Villars, Paris. — *Bacté-Intesti-Phage*, *Bacté-Coli-Phage*, *Bacté-Pyo-Phage*, *Bacté-Staphy-Phage*, *Bacté-Rhino-Phage*, *Biocholone*, *Biomucine*, *Carbalex*, *Endocarbonate Ercé*, *Entéromucine*, *Ercerhinol*, *Hémostatique Ercé*, *Lobuline*, *Lysacréme L. M. L.*, *Lysaxins L. M. L.*, *Pantamine*, *Stannoxyol*, *Vaccin de Weill et Dufourt*.
- Lab. Robia, M. Robillart, pharmacien, 33-35, r. Faidherbe, Lille. — *Cardior*, *Fémidiol*.
- Lab. Robin, 13, r. de Poissy, Paris (V<sup>e</sup>). — *Bismulhoidol Robin*, *Bromone Robin*, *Camphydril Robin*, *Camphydril spartéine*, *Camphydril strychno-spartéine*, *Glycérophosphate Robin*, *Iodone Robin*, *Nucléarsitol*, *Nucléatol*, *Parulcine*, *Pâte Robin*, *Peptonate de fer Robin*, *Peptokola Robin*, *Sirop Robin*, *Strychnarsitol Robin*, *Sulfoidol Robin*, *Analgesol Marcel Logeats*, *Choléopeptine Marcel Logeats*, *Salbroderm Marcel Logeats*, *Sanicérène Marcel Logeats*.
- Lab. Robinet, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnésotubes Robinet*.
- Produits « Roche », 10, r. Crillon, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Adoverne*, *Allonal*, *Amino-Vit* « Roche », *Arsylène*, *Bénerva* « Roche » (vit. B.), *Bioliapse*, *Cachets* « Roche » de *Thiocol*, *Choline*, *Comprimés* « Roche » de *Thiocol*, *Cyclitol*, *Dibromotyrosine*, *Digalène*, *Diiodotyrosine* « Roche », *Éphynal* « Roche » (vit. E), *Globinofer*, *Hémostira*, *Imido*, *Lactoflavine* (vit. B.), *Laristine*, *Larocaine*, *Larosans*, *Laroscobine* « Roche » (vit. C), *Liquide*, *Nestrovit*, *Narconumal* « Roche », *Nunad*, *Oestrobrol*, *Oestroglandol*, *Ovules* « Roche » au *Thigénol*, *Pantopon*, *Prostigmine*, *Saridon*, *Sécarcorine*, *Sédobrol*, *Sédormid*, *Sirop* « Roche » au *Thiocol*, *Soluprotine*, *Somnifène*, *Spasmalgine*, *Syntropan*, *Tampol* « Roche » au *Thigénol*, *Théobryl*, *Thigénol* « Roche », *Thyroxine* « Roche », *Tonique* « Roche ».
- Lab. Roche, pharmacien, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Iodopan*, *Orcalcine*, *Procolyl*, *Progaster*, *Yseult*.
- Lab. Ch. Roche, 2, r. Michelet, Alger. — *Cocadréine*, *Ioglotit*, *Ovules Résolis*, *Pantokinon*, *Perles Ferro-Vitales*, *Salinaglut*, *Solicide*, *Thalassol*, *Urticide*, *Urtiplaste*.
- Lab. Roher, 32, r. de Grenelle, Paris. — *Bromocarpine*, *Élixir tonique antiglaireux du Dr Guilié*, *Nucléol*, *Pilules Florentines*, *Pommade Florentine*.
- Pharmacie Rogé Cavailles, M. Lachartre, docteur en pharmacie, succ., 116, bd Haussmann, Paris. — *Anotide*, *Capillosol*, *Collobes*, *Comprimés Roy*, *Élixir iodépuratif Pépin*, *Pepsinacid*, *Phytovéinol*, *Sulfobore Roy*, *Suppositoires Rocav*.

- Lab. Rogerma, rue des Jardins, Lens (Pas-de-Calais). — *Histogerma*, *Neurosol*, *Rogerma*.
- Lab. Henry Rogier, 56, bd Pereire, Paris. — *Baume Delacour*, *Kymosine Rogier*, *Suppositoires Pepet*, *Urseptine Rogier*, *Valbournine Rogier*, *Vitamine Rogier*.
- Lab. Albert Rolland, 4, r. Platon, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Activorol*, *Hépatrol*, *Hepbi*, *Micelliode*, *Octensanol*, *Stomarel*.
- Lab. Roger Rolland, 1, r. Nélaton, Puteaux. — *Olfamide*, *Otomide*.
- Lab. Romon, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Ampoules Romon*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Lab. Rogues, 36, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris. — *Delcaine Rogues*.
- Lab. Rosa, 11, r. Roger-Bacon, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Chophytol Rosa cristallisé* (ampoules injectables de 5 cc.), *Chophytol gouttes*, *Chophytol dragées*, *Cymurol Rosa* (dragées), *Rosalax* (pilules).
- Lab. L. Rouanet, 48, r. de la République, Antibes (A.-M.). — *Apiol Tanit*, *Tisane Tanit*.
- Lab. R. Rougeyrolles, place de la République, Gramat (Lot). — *Septicoline* (simple et naphtolée).
- Lab. du Dr Roure-Guiot, 23, r. Louis-Astruc, Marseille. — *Bulgartropine*, *Bulgadone*.
- Lab. Rousseau, 49, r. du Château-d'Eau, Paris. — *Vivian*, *Gastrobellone*, *Somécrine*.
- Lab. du Dr Rousseau, 4, r. Gambetta, Sens (Yonne). — *Nervyl Rousseau*.
- Pharmacie Roussel, 10, r. Washington, Paris. — *Élixir Tonicardiaque Roussel*, *Sirop et Gouttes au Nitrite de Soude Roussel*, *Tétranitrol Roussel*, *Trinitrine Roussel*.
- Lab. du Dr Roussel, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Angioxyl*, *Bronchivax*, *Colivax*, *Coqueluxax*, *Damicol*, *Disonyl*, *Gravidaxyl*, *Hémostyl*, *Hépagyl*, *Hormone Gonadotrope*, *Insulanol*, *Insulyl*, *Insulyl-Retard*, *Microgel*, *Proxylol*, *Sérum Polypvalent de Leclairche et Vallée*, *Suiseryl*, *Trephonyl*.
- Lab. du Dr Roussel, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Acéto-Stérandryl*, *Benzo-Gynestryl*, *Benzo-Gynestryl 5*, *Bivatol*, *Casaldyl*, *Collubiazol*, *Ectiazol*.
- Lab. R. Roussel, 72, Grande-Rue, Flers (Orne). — *Prurilyse*.
- Lab. M.-A. Roux (M. A. R.), 58, r. de Maubeuge, Paris. — *Antiseptique Nénita*, *Aromosine*, *Bili-Magnétol*, *Entéroglandex*, *Gastronaldine*, *Glandex*, *Gutharyl*, *Kaolovules*, *Phlogogyne*, *Phlogovules*, *Purgelettes Roux*, *Sirop Iodacônit*, *Stechovules*, *Sulhyp*, *Totaiode*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Urimagnétol*.

- Lab. Roux, 60, route de Châtillon, Malakoff. — *Calm-Asmine*, *Cinalose*, *Félétophos*, *Miroxyl*, *Opocarbyl*, *Origanyl*, *Sédosalyl*, *Trachédrine*.
- Lab. Émile Roux, 26, r. des Petits-Champs, Paris. — *Thiopon*.
- Lab. Royannais, 17, r. Bodin, Lyon. — *Hépat 5*.
- Pansements Ruby, Voiron (Isère). — *Bande plâtrée Presto*, *Résolutif Ruby*, *Tulle gras Ruby stérilisé*.
- Lab. Sabatier-Emptoz, 10, r. René-Bazin, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Fluodyle*, *Ouataplasme D<sup>r</sup> Langleber*.
- Lab. Salantale, Melun (S.-et-M.), anciennement : Strasbourg. — *Vaccins Salantale*: *Auriculo*, *Cysto*, *Gingivo*, *Ophthalmo*, *Oto*, *Ovules*, *Pommade*, *Recto*, *Rhino*, *Suppo*, *Tracho Samantale*.
- Lab. du Salibra, 1, r. des Jardins, Asnières (Seine). — *Salibra*.
- Lab. du Salifréne, 210, av. de Toulon, Marseille. — *Salifréne*.
- Prod. Sandoz, 20, r. Vernier, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Allisatine*, *Baserine*, *Baume-Panthésine*, *Belladénal*, *Bellafoline*, *Bellergal*, *Calcibronal*, *Calcium-Sandoz*, *Calgluquine* (ex-Quinine-Calcium Sandoz), *Sédilanide*, *Digilalide*, *Félamine*, *Gynergène*, *Ipecopan*, *Lobéline*, *Néo-Gynergène*, *Optalidon*, *Raphabil*, *Sandopial*, *Scillarene*.
- Lab. Sanomédis, 65, r. de la Victoire, Paris. — *A. T. 10*, *Cardiovasculaire*, *Cébon*, *Cuprex*, *Doryl*, *Ephédrine Merck*, *Ephétonine*, *Eucodal*, *Evion*, *Fibrollysine*, *Iodo-Tétragnosol*, *Eupaco*, *Korane*, *Luminal Merck*, *Magnésium-Perhydrol*, *Novabor*, *Oestromévine*, *Optonique*, *Perhydrol*, *Phanodorme*, *Prominal*, *Prominalettes*, *Scophédal*, *Sédalmerck*, *Sirop Merck à l'éphétonine*, *Stypticine*, *Syntavérine*, *Ultracarbonate*, *Vigantol*, *Vogan*.
- Lab. de la Santhéose, 4, r. du Roi-de-Sicile, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Santhéose pure*, *caféinée*, *lithinée*, *phosphatée*, *scillitique*, *spartéinée*.
- Lab. du Sapolinol, 38-40, cours Richard-Vitton, Lyon. — *Capsules Atlanta*, *Comprimés Aminase*, *Crème à raser Drialba*, *Sapolinol* (crème, dentifrice, ovules), *Sapolinol Hôpital*, *Sapolinol normal*, *Sapolinol stilligoutte*, *Ionoscope Sinclair*, *Pommade Sinclair* « A », *Pommade Sinclair* « B ».
- Lab. Saporex (S. A. R.), 184, route de Genas, Lyon. — *Barytol*, *Bloc Saporex* (Saxon solide), *Bucco-Saporex*, *Baume Saporex*, *Epoxa*, *Réulsif Saporex*, *Ovules Saporex*, *Thysochrome*, *Tot-Harlem*, *Saporex* (liqueur).

- Lab. du Sarcopitol, 177, r. de Courcelles, Paris. — *Sarcopitol*.
- Lab. de Thérapentique Antirhumatismale Sarcin, 14, av. Perrichont, Paris. — *Baume Sarcin, Entérosalicyl, Glucosatl, Histalgine, Sulfosatl, Sulfode*.
- Lab. Sasset, 32, bd Beaumarchais, Paris. — *Cacospermine, Dercusan, Dermose anti-impétigineuse, Entéro-septyl, Rinoleina, Sanalepsi Russi*.
- Lab. Saudemont, Grenay (P.-de-C.). — *Atroblyl, Biosurgon, Pectosol*.
- Lab. Saugier-Thoral, Dôle (Jura). — *Bronchasmine, Diuréphédrine, Ephédrasmine, Garéphédrine*.
- Lab. Saunier, 35, av. de Versailles, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Baume Gélulol, Cachets Saunier, Hédopeptol, Libérase*.
- Lab. Sauvageon, 18, r. Mademoiselle, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Papavéryl, Sulfamidex*.
- Lab. Sanze, 60, r. Jean-Jaurès, Firminy (Loire). — *Euquinargol, Ultraformine B et S*.
- Lab. Roger Savoie, 2 et 4, place St-Martin, Vendôme (L.-et-Ch.). — *Eulaxol, Phytocytol, Psoryl, Pyocotine*.
- Lab. Henri Schéhadié, 9, impasse Thoréton, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Actimaryl, Alcatensyl, Arthriylse, Asthmasédine, Capsothinol, Euvagol, Gaïacodyl, Normalax (pur et au Cascara), Ova-Crine, Rhinédrine, Néoboldine, Solution Leluc*.
- Lab. Schoum, 15, r. de la Sablière, Bécon-les-Buyères (Seine). — *Lotion Py, Neutadol, Phostyl, Solution Schoum*.
- Lab. des Prod. Scientia (Dr E. Perraudin, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe), 21, r. Chaptal, Paris. — *Bain Bagnor, Calcoléol, Diabétifuge, Digestonic, Ergotine Bonjean, Globexine, Huile iodée et Calcium Finikoff, Iodocitrane, Oxymenthol, Pancrepar, Peptalmine, Peptalmine magnésée, Polycalcin, Quinéine, Staphylococcine Fraquet, Tricalcine*.
- Lab. Seclo, 6, r. Adolphe-La-Lyre, Courbevoie. — *Baume Kamol, Bécédine, D<sub>2</sub> Seclo, Ekineurol, Halivite 42, Kéférol, Osmolax, Pastilles Seclo, Pâte vitaminée Halivite, Uricure*.
- Lab. de la Sédatussine, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Sédatussine*.
- Lab. de la Sedhepatine, 124, r. St-Dominique, Paris (VII<sup>e</sup>). — *Sanarteryl, Sedhepatine*.
- Lab. Ch. Séguin, 7, r. Sainte-Isaure, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — *Articholine, Biose «D», Iodaspirine, Ultra-tannal*.

- Lab. Serindat, 4, r. Lecomte-de-Nouy, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Phosphobrom, Phosphomagnésium*.
- Lab. du Séroxéma, 1, r. de Phalsbourg, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Séroxéma*.
- Lab. du Serpent, 5, bd Gambetta, Grenoble (Isère). — *Sal-Sodyl*.
- Lab. J.-M. Serre, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Vermifuge Cornet*.
- Lab. Servier, 25, r. Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Bilt-Muxol, Chlorosane, Gaduse (dragées et sirop), Iminasthme, Morrhuae, Muxol, Ozodor, Pyripyridium, Spiralgine, Ovules Stérigyne, Stimulol*.
- Lab. Sevenet, 38, r. de Ponthieu, Paris. — *Hémagène Tailleux*.
- Lab. Sévigné, 76, r. des Rondeaux, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Ulcéoplaque, Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol, Ulcéobalméine*.
- Lab. Stéat, 15, r. Catulienne, Saint-Denis. — *Bucco-Progone, C. B. K., Oléovules, Progone, Septigone, Suppositoires SFEAT*.
- Établ. Silbert et Ripert, 30, r. Bénédit, Marseille. — *Murones du Dr Robert Jacques*.
- Lab. S. I. T. S. A. (Droguerie et Spécialités dentaires du Dr Pierre Rolland), 15, r. des Champs, Asnières (Seine). — *Aseplargol, Bis-Ka-Ma, Choléokinase, Comprimés d'Alibour, Cystocone, Hépatosodine, Histropa, Hypalène, Kaoleo, Nobial, Nycal, Pelvisedyl, Peptonal, Pyroclase, Quinobrome, Saturel, Seroquinol, Thaolaxine, Tussédyl*.
- Lab. du Sodésyl, Nevers (Nièvre). — *Comprimés Luc, Iodo-Dépuratif Jacquet, Sodésyl, Venisette*.
- Étab. Soudan, 48, r. d'Alésia, Paris. — *Ampoules Boissy (Iodure d'Éthyle), Ampoules Boissy (Nitrite d'Amyle), Biophorine Girard, Bromomaisine, Caséoline Girard, Diabétosan, Euonymine Thibault, Glycérophosphate de chaux, Granulé Girard, Iode organique Boissy, Iodomaisine, Lactagol, Laxatif Miralon, Laxopentine Girard, Nucleo-Fer Girard, Oléocidase Thibault, Oléosodine P. Thibault, Sirop Girard, Valérium Thibault, Vasogènes Pearson, Vin Girard*.
- Lab. du Soufre Organique, Orsay (S.-et-O.). — *Sulforgane, (ampoules, pilules, pommade, ovules, suppos.)*.
- Lab. Souriguère, Angoulême (Charente). — *Orthoneurol*.
- Lab. du Spasmonéural, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — *Spasmonéural*.



- « Specia » (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, r. Jean-Goujon, Paris. — Acétylsarsan, Alunozal, Anthéma, Anthiomaline, Aplexil, Ascabiol, Asciatine, Aspirine « Usines du Rhône », Balsoforme, Baume Rhodia, Béviline, Butelline, Chaloforme anesthésique, Chloro-Kéline, Coryphédrine, Crisalbine, Culi-Dmelcos, Dagenan, Dermoseptazine, Diagnothorine, Diagonoréol, Didakène, Didakol, Dmelcos, Ergorone, Éther anesthésique, Fléase, Foriod, Gardenal, Gélobarine, Gonacrine, Huile de foie de morue médicinale suracétinée Rhône-Poulenc, Kéline, Mélange de Schleich, Mixtiod, Moranyl, Myochrysine, Néocardyl, Néo-Dmegan, Néo-Dmetys, Neptal, Novarsénobenzol Billon, Orsarine sodique, Orléarine, Pastilles Rhodia, Pastilles de Stovaine, Pâte Gingivale, Pivadorme, Planochrome, Præguine, Prémaline, Propidex, Propidon, Propivane, Prosympal, Pyramidon « Usines du Rhône », Quinacrine, Quinio-Præguine, Quinio-Stovarsol, R odarsan, Rhodazil, Rhodiocarbène, Rhodiaphylline, Rhodopraeguine, Rhodoguine, Rhofène, Rulonal, Sanédrine, Scurocaine, Scuroforme, Septazine, Sotudagenan, Soluseptazine, Soneryl, Soneryl sodé, Stibyl, Stovarsol, Stovarsol sodique, Strychno-Gardenal, Thiazomide, Tochtorine, Tryparsamide, Trypoxyl, Vaccins aloxiques stabilisés, Vitascorbol.
- Lab. du Spécifique Bejean, 12, r. des Hospitalières-Saint-Gervais, Paris (IV<sup>e</sup>), et 30, rue des Francs-Bourgeois. — Spécifique Bejean.
- Lab. Spes-Guiraud, 26, r. Saussier-Leroy, Paris (XVII<sup>e</sup>). — Élixir Spes du D<sup>r</sup> Guiraud, Tubes du D<sup>r</sup> Guiraud.
- Lab. Stelvia, 59, r. Boissière, Paris (XVI<sup>e</sup>). — Bromésérine, Carbo-Combrosol, Combrosol, Équisétol, Granulé Edges, Opodigestifs, Phytomensyl, Plasthaméline, Pulsamone, Tisane Ferlys.
- Lab. H. Stouls, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — Borinhalant, Pangastrol, Pan-Neuro.
- Lab. Substantia (S. A.), 13, r. Pagès, Suresnes. — Anusol, Cal-Mag-Na, Hémotulol, Loraga, Molagar, Panosan, Véganine, Vince.
- Lab. Substantia, 53, r. du Poinçon, Bruxelles. — Agarol, Anusol, Cal-Mag-Na, Véganine.
- Sud-Labo, R. Teychené, Phien, 52, r. Puvis-de-Chavan-nes, Marseille. — Carbokaol, Euclinol, Gelsédinol.
- Lab. Sujal, 62, r. de la Brauderie, Châteauroux (Indre). — Flétagène, Flétagex, Mensival, Neatol-Sujal.
- Lab. du Sulfobiol, 242, av. Félix-Faure, Lyon. — Sali-tropine, Sulfobiol « S ».
- Lab. Sulfo-Thiorine, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — Bacturyl, Hypo-Thiorine, Inhalo-Thiorine, Insuline danoise « Léo », Laxo-Thiorine, Pulmo-Thiorine, Sanocrysine de Mollgaard, Sulfo-Thiorine.
- Lab. Suppovita, 260, bd Saint-Germain, Paris. — Suppovita. Ovules Alavita.
- Lab. Synthesis, 45, av. Trudaine, Paris (IX<sup>e</sup>). — Caré-parine, Collutoire Trepallix, Euplagex, Novatropine, Pantocamphre, Perparine, Surparine, Trepallix.
- Lab. Tachot et Vigan, 103, r. Saint-Lazare, Paris (IX<sup>e</sup>). — Cytosol, Entéraspirine, Hépalismine, Iodascé-rine, Magnacaline, Magnésie Roger's, Osmo-Péptine, Psyllum Langlebert, Séru (gouttes et pomnade), Tablettes animigraineuses du D<sup>r</sup> Le Tanneur, Tannurgyl, Tisane Savona, Uricémine, Urose, Vigan.
- Lab. du D<sup>r</sup> Talon, 153, bd Montparnasse, Paris. — Histo-nyl, Pomme de Talon, Savon Talon, Solution Talon, Tisane Talon, Vin Anti-Diabétique Talon.
- Lab. de la Tamarine, D<sup>r</sup> Furt, 4, av. du Maréchal-Pétain, Le Bouscat (Gironde) (tél. : Bordeaux 59-27). — Tamarine, Incorinines.
- Lab. L. Tattevin, docteur en pharmacie, 3, r. E.-Burgault, Vannes. — Asthmosine.
- Lab. P. Tavernier, 32, r. de l'Ouest, Paris. — Biopau-sine, Ergocoline, Hépar, Inhalo-bol, Inhalo-Past, Inhalo-sel, Leucolyse, Luostyl, Phospho-Gaïacol Mary, Polytonyl, Préfagyl, Pulmodynol, Reconsti-tuant Mary, Sédarhryl.
- Lab. Tereins et Roulier, 1, r. de Maistre, Chambéry (Savoie). — Sulfo-Challes pastilles, Surplasmol.
- Lab. Teyssède, 74, fg d'Angoulême, Limoges. — Sirop Teyssède.
- Lab. Thaidelmo, 45, av. Mozart, Paris (XVI<sup>e</sup>). — Derma-suline (ex-Pomade Fornet), Néosuline, Pansuline (ex-Insuline buccale Fornet), concentration I et concentration III.
- Lab. A. Thépénier, 10, r. Clapeyron, Paris. — Amylo-dias-tase, Bulgarine Thépénier.
- Lab. de Thérapeutique appliquée, P. Clément, pharmaci-en, 105, r. St-Jacques, Étampes (S.-et-O.). — Eukénol, Eurhéine, Lusitol, Masbi, Phytela.
- « Théraplix », Sté générale d'Application thérapeutique, 98, r. de Sèvres, Paris (VII<sup>e</sup>). — Acidol-Pepsine, Amidosol, Adaline, Benzoplix, Bioferrine, Bromical, Campoferrone, Campolon, Catalgine, Corlenil, Cres-col, Cyrène « B » Fort, Demanyl, Dentamine, Dycho-lium, Ejefita, Efryl, Élitran, Erelon, Érugon, Évipan, Évipan-Sodique, Exoseptoplix, Féroxal, Festale, Freinix, Glucoplix, Grassyl, Gynoplix, Helmitol, Hémotonine, Ifranol, Iodoseptoplix, Icium, Insuline Bayer, Lacarnol, Luminal, Luminalettes,

**Lab. du Sene, Mandelium, Mitigal, Mésothorium, Néoperoxal, Niliun, Novalgine, Nujol, Ostréine, Padutine, Pancoïcaine, Per-Abrodil, Phanodorme et Phanodorme-Calcium, Preloban, Priovit, Prolan, Prominal, Prominalettes, Protargol, Quinohorium, Réalphène, Rivanol, Rivanolettes, Sedent, Sedol, Septoplix, Iodures Souffron, Spasedol, Suppo-Dolantine, Supponéryl, Suppo-Salvargine, Suppo-Sedol, Théominal, Tonophosphane, Torantil, Vaccins Demonchy, Véronidia, Vigantol, Vogal.**

**Lab. Thévenot, 21, r. des Roses, Dijon. — Azigol, Boro-calcyl, Choleboldine, Eupnéol, Juntodyl, Lactofermentine, Phoshémoquinol, Santurol, Thiocitrane, Triseptyl.**

**Lab. Thirist et Cie, 26-28, r. des Ponts, Nancy. — Paroxyl.**

**Lab. Thirode, 33, Grande-Rue, Besançon. — Belcarmine, Eczémine, Génécarmine, Gorgex, Hydramélis, Naziline, Omonos, Pilules Norma, Sédorgine.**

**Lab. Thomas et Lab. Pachaut, 2, r. Sainte-Cécile, 31, fg Poissonnière, Paris. — Asthmenthol, Baume Thomas, Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alfa et Gamma, Eupacéryl Pachaut, Huile de Harlem, Iodures Pachaut, Limonade hypotensive Pachaut, Phosphogène Pachaut, Purgettes Lentilhac, Rhinadorine, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Terbinthiol, Valériane Pachaut.**

**Lab. Tillat-Chanteaud, 80 bis, av. de Paris, Versailles. — Boldine Plagnol, Gaïacamphre, Nasylum Blondin, Van-Sol (cachets), Granulés Chanteaud, Kénapirine Chanteaud, Séditz Chanteaud, Sulphydral Chanteaud, Uréol Chanteaud, Granulés Antinausiques.**

**Lab. G. Tinard, 134, bd Pereire, Paris. — Dulcilax, Pangestyl, Salyptol.**

**Lab. du Dr G. Tissot, 34, bd de Clichy, Paris. — Bronchodermine, Charbon Tissot, Diasto-pepsine, Gerasol Gimon, Magnecyline, Nervocithine (Hépatocithine), Panurol, Supparygres.**

**Lab. R. Tixier, 8-10, r. Croix-Belle-Porte, Saint-Quentin (Aisne). — Flucholinase, Septiderme.**

**Lab. du Tophol, 3, r. Condillac, Grenoble. — Tophol.**

**Lab. Toraude, 22, r. de la Sorbonne, Paris. — Bain Flévar, Camphopneumine, Ephédramid, Ephédroléol, Hypostrontium, Hyposulfène, Iodassium, Iodosulfène, Jabosulfène, Leucagine, Leucagine sulfamidée, Néotrépol, Précibiane, Psychobiasés, Rectagine, Relhagine, Sorbocalcion, Spirochlan, Staprolysal, Trépol, Trépoquinol, Ultra-Levure, Vin Raci-Bel, Yptor, Zymostol.**

**Lab. du Toti-Phos, 81, r. de la Roquette, Paris. — Toti-Phos.**

**Lab. du Trisalyl, 20, r. Lamarck, Amiens. — Trisalyl.**

**Lab. Troncin, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — Grains de Santé du Dr Franck.**

**Lab. Trouette-Perret, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — Aphloïne, Cimicifuga, Gelsemium, Gouttes Livoniennes, Monol, Néoby, Papiïne, Nisaméline, Opocnuclyl, Salix, Romarantyl, Sels Fros.**

**Union Chimique et Biologique. (Voir Sté d'Applications Pharmacodynamiques.)**

**Lab. Unis-Spès, 14, r. Demarquay, Paris (X<sup>e</sup>). — Algorpha (baume), Algorphagine, Anti-Coryza-Rex, Anulisia, Adolol, Babinox, Borogényl, Carboléine, Colluquinol, Diarex, Époc, Exonagar, Flélonic, Fluxivénol, Gastiasse, Hépalodiase, Hémostal (granulés), Hémostal (élixir), Iodolactyl, Laxatif Baillet, Nox Dépuratif, Pectoral Gierna, Pépilar, Placidol, Ricipurgol, Sanovénol, Santatex, Sels Marva, Séroforce (6 amp.), Séroforce (10 amp.), Sirop Artil (enfant), Sirop Artil (bébé), Sophos, Stomalex, Tercodal (comprimés), Tercodal (sirop), Tercodyt, Vacciderm, Vanilactyl.**

**Lab. de l'Uroclase, 95, r. de Prony, Paris. — Cathacide, Chotal, Uroclase.**

**Lab. Uroflux, 31, av. Ledru-Rollin, Paris (XII<sup>e</sup>). — Uroflux, Prostalyse, Variphile, Métricure, Anuacalm, Sédomicol, Mictosédine.**

**Lab. de l'Uroïodine, 17 bis, r. Juge, Paris (XV<sup>e</sup>). — Lactosodine, Uroïodine.**

**Lab. Uromil (L. Bélières, docteur en pharmacie), 19, r. Drouot, Paris (IX<sup>e</sup>). — Uromil, Radio Salit, Vitagar.**

**Lab. de l'Urosiphon, 1, r. de l'Odéon, Paris. — Pastilles Lezin, Urosiphon, Vin Rénovateur Huchedé.**

**Usines Chimiques des Laboratoires Français, 89, r. du Cherche-Midi, Paris. — Myovarsyl, Prévarsyl, Uclarsyl.**

**Lab. des Vaccins en Plasma marin, 17, r. de Sauve, Nîmes (Gard). — Vaccins Antibrucelliques, Polymicrobiens.**


**Lab. de la Valthène (A. Valat), 166, r. de la Roquette, Paris (XI<sup>e</sup>). — Valthène.**

**Lab. Valtry, 122, Champs-Élysées, Paris. — Actine, Asmocrine, Collotex, Curozema, Floctylisine, Pediozema, Sulfolax, Utersan, Vagosédyl.**

**Lab. du Vénocapsyl, place du 9-Octobre, Cambrai (Nord). — Vénocapsyl.**

- Lab. Venot**, 139, av. Emile-Zola, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Bain Salvia*, *Pilules Salvia*, *Santonina*, *Sinusyl*, *Vérogénol*.
- Lab. E. Verdon**, pharmacien, Celles-sur-Belle (D.-S.). — *Choleo-Fluase*, *Colave*, *Gasmanyil*.
- Lab. Ch. Vergelot**, 163, r. de Flandre, Paris. — *Ampolases*, *Amlyodine*, *Bromogastrine*, *Bromosédine*, *Capsules Vielte*, *Cholicalcion*, *Elixir Descroizez*, *Dragées F. E. F.*, *Henrich's pills*, *Laxatif Vielte*, *Mangratinés*, *Maléine Dufert*, *Morrhuxine*, *Mucéine*, *Opolases*, *Oposclérine*, *Paquets P. C. L.*, *Rhinaldose*, *Rhinarsénol*, *Roziodé*, *Salithymol*, *Sédo Vielte*, *Siforcina*, *Sirop Santa Croce*, *Sirop Vielte*, *Splenocalbiose*, *Tonique Vielte*, *Transfusine*, *Urago*, *Urobleu*.
- Lab. Verne**, 13, r. du D<sup>r</sup>-Mazet, Grenoble (Isère). — *Boldine Verne*, *Boldo Verne*, *Pulmoverne*.
- Lab. Vial**, 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon. — *Artériolex* (ou *Minéralogène*), *Sel Vial*.
- H. Vial**, pharmacien, 7, r. Damon, Villeurbanne (Rhône). — *Vin tonique Vial*, *Sirop phospho-vitaminé Vial*, *Gouttes sthéniques Vial*.
- Lab. du Vicalphos**, 48, r. St-Jean, Lyon. — *Vicalphos irradié*, *Vicalphos simple*.
- Lab. Vigier (J. Huerre et Cie)**, 9, r. de la Gare, Levallois. — *Albuplast*, *Aristoplast*, *Aristoplastic*, *Crème Mégève*, *Crème de Lainine*, *Extensoplast*, *Europalst*, *Hermoplast*, *Kiroplast*, *Lactophorine*, *Manganifer*.
- Lab. Vigier-Lesure**, 70, r. du Bac, Paris (VII<sup>e</sup>). — *Arguéritol Lesure*.
- Lab. Vigor**, 26, chaussée de la Madeleine, Nantes (L.-Inf.). — *Ampoules Vigor*, *Bromocodyl Raison*, *Féculine A. D.* (*pommade vitaminée*).
- Lab. G. Villard**, 3, pl. Sainte-Claire, Grenoble. — *Grip-pine*, *Phosphorine*.
- Lab. Vincent**, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Angiten*, *Gholécystine*, *Iodocaine*, *Nigérine*.
- Lab. Vincent**, 8, pl. Victor-Hugo, Grenoble. — *Poudre digestive et rafraîchissante*, *Poudre alcaline rafraîchissante*, *Sirop dépuratif Vincent*.

- Lab. du Viophan**, 44, Grande-Rue, Argenteuil (S.-et-O.). — *Viophan*, *Organi-calcioy simple*, *Organi-calcion endocrinien polyvitaminé*, *Rhino-Colloïdol*, *Dysariode*.
- Lab. Virultra**, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables*, *Vaccins-pansements* et *Vaccins buisables Virultra*.
- Lab. Vogein**, 2, 4 et 6, r. des Deux-Ponts, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Freinoluléine*, *Pantuléine*, *Homomuléine*.
- Prod. Wander**, P. Bastien, pharm., Champigny-sur-Marne (Seine). — *Alcalyl*, *Alucol*, *Cristolax*, *Formitrol*, *Héparéguline*, *Jémalt*, *Pepso-Pancré-Malt*.
- Sté anonyme des Étab. Wander**, avenue Pétain, Champigny (Seine). — *Carotase*, *Glomalt* (*Malt Wander*), *Maltosan*, *Nutromalt*, *Ovonalline*, *Végumine*, *Veguva* (voir **Prod. Wander**).
- Lab. Warin**, 5, r. François-Ponsard, Paris. — *Bucmine*, *Cachels Rava*, *Citrocarbine*, *Citrofluyl*, *Edulax*, *Fidulax*, *Hépatogastrine*, *Hernosturum*, *Hydrogemmine Lagasse*, *Inhaloxyl*, *Juglamarine*, *Micturyl*, *Panfortan*, *Psycho-Neuryl*, *Sirop Irsi*, *Staphydex*.
- Lab. Weber**, 76-78, r. Dareau, Paris. — *Glyco-Thymoline*.
- Lab. A. Welcker et Cie**, 22, r. de l'Est, Boulogne-sur-Seine. — *Bacté-Ricly*, *Sanas*.
- Lab. Yvrard**, 17, r. Soufflot, Paris. — *Gérébro-lipase*, *Helguerol*, *Pneumolipase*.
- Lab. du Docteur Zizine**, 24, r. de Fécamp, Paris (XII<sup>e</sup>). — *Agocholine*, *Entéropansement*, *Gastropansement*, *Hémifuge Zizine*, *Lait Calcique Zizine*, *Peptodiase*, *Sédogastrine*, *Sulfapyridine Zizine*, *Vivoleol*.



8463 - 3 - 1943  
IMP. CRÉTÉ, CORBEIL.  
Autorisation n° 10.279.



